







MUSEO
INSTITUTO DE BOTANICA
"SPEGAZZINI"
BIBLIOTECA

Registro No. 49

Ubicación

Proced. Leg. Spegazzini

Fecha

Mochales



J. Meyerson
53 m. 477
La Plata

SYLLOGE FUNGORUM

OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM

DIGESSIT

P. A. SACCARDO

VOL. XXI.

SUPPLEMENTUM UNIVERSALE

Pars VIII.

Hymenomycetæ - Phycomycetæ

AUCTORIBUS

P. A. SACCARDO ET ALEX. TROTTER

Neminem latet, Syllogen nostram diagnoseon collectionem ordinatam, non vero [nisi in observatis propriis] opus criticum sistere. Hoc faciant monographi et floristæ et benevole meminerint, quid vere sit Syllogo nostra, ne nobis tribuant errores, qui nostri non sunt.

Syll. Fung. V (1887) in præmonitu.

Fol. 59 — Pretium it. lib. (francs) 59

PATAVII

Die XV Martii MCMXII — Sumptibus P. A. SACCARDO
TYPIS SEMINARII

1912



PRÆFATIO

Factum sane mirandum: summa jam enormis mycetum cognitorum novis inventis sine intermissione incrementum pergit! Post edita *Syloges* supplementa VI-VII (vol. 17-18), quinquennio vix absoluto, innumeræ jam formæ fungorum novorum innotuerunt, imprimis ex Africa tropicali et America australi, non paucæ quoque ex insula Java, Japonia, Australia, America boreali et ipsa Europa. Quo factum est ut *Syloges* nostræ supplementum novum edere oporteat, ne mycologis systematicis intermittatur subsidium pæne necessarium.

Hæc autem, quæ sequuntur, nobis præmonenda esse existimamus.

I. Volumen præsens et proxime proditurum XXII species novas fungorum amplectuntur, quæ usque ad integrum annum MCMX undique editæ sunt; nonnullas addimus ex anno MCMXI, quæ apud nos in Instituto botanico Patavino descriptæ sunt.

II. Studiosis commendamus, velint in inquirendis v. determinandis speciebus jugiter uti *Indice iconum fungorum* (Syll. vol. XIX-XX) ubi non tantum citationem iconum sed simul mycetum præcipuam bibliographiam facile invenient.

III. In volumine XI *Syloges* adnumeravimus plurimas cl. BRITZELMAYRI species Hymenomycetum, additis

tantum iis paucissimis verbis, quibus tunc eas descripserat auctor. Ipse vero postea earum plenas diagnoses in lucem edidit, quas in notitiam studiosorum nos quoque in præsentì volumine latine translatas offerimus.

IV. Quod vero attinet ad bonitatem specificam, ut ita dicamus, specierum tam copiosarum cl. BRITZELMAYRI nec non illarum imprimis ex Polyporeis cl. MURRILLII, quas quoque hic referre oportuit, sponsors omnino facimus auctores.

V. Mycologi nonnulli contra regulas a botanicis jam statutas, quibus plantis ex novo inventis præscribuntur *diagnoses normales latine*, pergunt eas prætermittere et, e contrario, utuntur descriptionibus prolixis, intricatis et sæpe inordinatis. Quantum potuimus, ex his notas essentielles et differentiales eruimus et diagnoses normales composuimus; tamen affirmare nequimus sententiam auctorum non semper recte arripuisse neque characteres primarios a secundariis distinxisse. Velint ergo botanici omnes, præter descriptiones, non omittere *diagnoses normales latinas*, quæ profecto rei studiosis totius orbis sunt maximæ utilitatis, ne dicamus necessitatis.

VI. Liceat verbum unum dicere de anno, quem decernere oporteat pro validitate nomenclaturæ generum specierumque Fungorum (et ceterarum Cryptogamarum) *) Iuxta regulam approbatam (rite?) in conventu Botanicorum bruxellensi (1910), in quaque fere classe Mycetum varius esset et annus et auctor adhibendus ad jus prio-

*) Cfr. P. A. SACCARDO, *Da quale anno debba cominciare la validità della nomenclatura scientifica delle Crittogame* in Ann. mycol. VII (1909) p. 339 et in Bull. Soc. bot. ital. 1909, p. 168.

ritatis, non vero annus unicus 1753 et auctor LINNAEUS, ut sancitum est pro ceteris plantis, magna cum utilitate studiosorum. Sperare liceat, decretum bruxellense ut vere incongruum et meo sensu prope inexplicabile, in proximo conventu Botanicorum ad normam nomenclaturæ ceterorum Vegetabilium reformari possit!

VII. Cl. v. HÖHNEL exsiccata mycologica auctorum nonnullorum et imprimis defunctorum Dr. J. FELTGEN luxenburgensis et Prof. P. HENNINGS berolinensis acute scrutatus est et revisit. Quamplurima genera et species - quarum jamdudum diagnoses in Syllogen rite recepimus - eheu omnino reformanda v. corrigenda v. quidem delenda testatus est. Longus et ingratus fuisset nobis labor innumeras has observationes et castigationes, quæ in plurimis opusculis Höhnelianis prodierunt, in Syllogen recipere. Ceterum et quia notio « generis » et « speciei » apud biologos nondum constans est, neque nos, insuper, cum auctore de synonymis et emendationibus ab eo propositis semper consentimus, satius duximus reperta Höhneliana plerumque præterire. Ad hoc propositum inducti sumus etiam ex eo quod pro certo habemus, cl. v. HÖHNEL conspectum alphabeticum omnium suarum correctionum proxime prolaturum esse, magno cum comodo mycologorum.

VIII. Etiam cl. mycologus T. PERCH, horti botanici Ceylanici Peradeniyæ præfectus, non paucas revisit species fungorum, quæ abhinc multis annis collectæ a cl. THWAITES, ab ill. BERKELEYO divulgatæ, prostant adhuc in Museo Peradeniyæ. Dolendum et illum non paucas species duplicatas et proinde abolendas v. emendandas reperisse, quarum notitias jam edidit in *Ann. of R. Bot. Gard. Peradeniya* (1907). De his correctionibus vero lector be-

nevolus velit consulere opusculum Petchianum, nam si eas omnes in Syllogen reciperemus, ab instituto nostro nimis recederemus.

IX. Plurimæ species vel varietates imprimis ill. Doct. REHM, seu in suis *Ascomyc. exsicc.* seu in opusculis vel exsiccatis cl.^{rum} ADE, JAAP, RICK, STRASSER etc. sine ulla diagnosi prodierunt. Eximius Auctor, in præsentî (ut ad me scripsit) alio mycologico studio distentus, nequit diagnoses concinnare mycetum prædictorum, qui revera, ipso auctore fatente, sæpius confirmatione egent. Cum hi vero in mycotheecis publicis prostent et proinde rursus et facile examinari possint, hic enumerare non omisimus, addita matrice et loco.

X. Non paucæ fungorum species exstant, imprimis germanicæ, quarum exemplaria edita sunt in Exsiccatis KLOTZSCHII et RABENHORSTII, quæ vero in Sylloge sunt omissæ, quia diagnosi expertes. Exoptabamus auctores Floræ cryptogamicæ Germanicæ, WINTER, REHM, ALLESCHER, LINDAU etc., eas examinatuos et de iis iudicium in eo opere prolaturus, sed cum pleræque in eodem opere adhuc desiderentur, nomina in Sylloge modo referimus, ut mycothecarum possessores de iis inquirant.

XI. Ex investigationibus accuratioribus et secundum novissimas methodos peractis, supra laudatorum mycologorum v. HÖHNEL et PETCH nec non cl. BRESADOLA, MAIRE, LLOYD, POTEBNIA, REHM, STARBAECK, THEISSEN etc. *) (plurimis ad exemplaria authentica in Museis Londini, Pari-

*) De dispositione et divisione systematica *Uredinearum*, a cl. ARTHUR et *Polyporearum* a cl. MURRILL propositis, iudicium nullum ferre possumus; nobis vero fundamentum systematicum illorum auctorum characteribus nimis minutis et labilibus videtur innixum.

siorum, Leydæ, Upsaliæ, Peradenyiaë peractis etc.) mutationes non paucæ patuerunt in interpretandis generibus, speciebus et synonymis; quo factum est, ut multa reformanda et emendanda essent in Sylloge nostra, quæ ante XXX annos inchoata, elementis antiquioribus uti coacta est. Tamen ne nimis subvertatur totius operis structura et ut, quantum fieri potest, ejus unitas servetur, acceptis tantum emendationibus majoris momenti, omnem renovationem generalem renunciare oportuit.

Navent assiduum operam juvenes et eximii mycologi, quorum numerus in dies feliciter crescit, et ita faciant ut intra semisæculum habeatur Sylloge fungorum non tantum aucta, sed funditus revisa et ex toto renovata *).

Palatii, XV Martii MCMXVII

P. A. SACCARDO

*) Singularis sententiarum contradictio! Mycologus alter Syllogen opus merae compilationis esse censet, alter vero vellet esse revisionem criticam omnium Fungorum! Non negarem opus meum ex magna parte esse collectivum; quis enim sexaginta millia mycetum microscopio submittere potuerit?; sed, quæso, censores velint considerare quæ erat ab hinc quadraginta annis scientia systematica Fungorum et imprimis Micromycetum et certe non negabunt meum fuisse improbum laborem in excogitando et ædificando novo systemate (sporologico) tunc unico et necessario, sine quo profecto plura millia specierum in opuscula innumera dispersarum in ordinem digeri certissime nequiverant.



Mycologi qui opera v. opuscula benevole communicaverunt (1905-1911)*)

(continuatio)**)

Austria - Hungaria.

BRETSCHNEIDER ART. (*Wien*) — DEMELIUS PAULA (*Wien*) —
v. KEISSLER K. (*Wien*) — KÖCK GUST. (*Wien*) — KORNAUTH KARL
(*Wien*) — LITSCHAUER VIKT. (*Wien*) — MOESZ G. (*Budapest*) —
NAMYLOWSKI BOLESL. (*Krakow*) — PAUL JOSEF (*M. Schönberg,
Brünn*) — PETSCHENKO BORIS (*Krakow*) — ROUPPERT C. (*Kra-*

*) Quibus mycologis, æque ac prius laudatis, editor devinctissimus gratias agit.

**) Cfr. elenchos præcedentes in *Sylloges* vol. VIII (1889) p. IX, vol. X (1892) p. V, vol. XI (1895) p. VII, vol. XIV (1899) p. V, vol. XVI (1902) p. V, vol. XVII (1905) p. VII.

E citatis elenchis eruitur summa pæne absoluta studiosorum qui ab anno 1875 circ. usque ad dies nostros in toto orbe mycologiam tractant et qui, secundum regiones, ita numerantur:

Austro-Hungarici	54	Scandinavici	28
Belgici et Hollandici	22	Australienses et Novo-Zeland.	7
Britannici	29	Australi-et Centrali-Americani	11
Gallici	100	Boreali-Americani	128
Germanici	88	Erythræi et Algerienses	3
Helvetici	23	Indici	5
Hispano-Lusitanici	10	Javanici	6
Italici	126	Japonici	15
Romanici et Serbici	2	Summa	657

Ingens, ut patet, est nostra ætate Mycologorum numerus, qui, ut ex elenchis evincitur, a semisæculo de anno in annum rapidissime crevit et quidem crescit. Nec omnes profecto in elenchis nostris mycologos recensitos existimo! Fructus tantorum laborum recentiorum ex eo patet quod, dum mycologia tota, usque ad annum 1888 cognita, octo Sylloges prioribus voluminibus erat comprehensa, additamenta posteriora non minus quam novem volumina occupant; quod (mirabile dictu) demonstrat messem fungorum, in spatio vix XXII annorum, esse plus quam duplicatam!

kov) — SCHORSTEIN JOSEF (*Wien*) — SOMMERSTORFF H. (*Graz*) —
 STECKI CONSTANTY (*Krakow*) — THEISSEN FERD. (*Innsbruck*) —
 VAHNA J. (*Brünn*) — ZIMMERMANN HUGO (*Eisgrub*).

Britannia.

ADAMS J. (*Dublin*) — BORTHWICK A. W. (*Edinburgh*) —
 COTTON A. D. (*Keir, London*) — GIBBS THOM. (*Wirksworth*) —
 JOHNSON (*Dublin*) — PRICE S. R. (*Cambridge*).

Gallia.

ARNAUD GABR. (*Montpellier*) — BATAILLE FRÉDÉRIC (*Besancon*) —
 BEAUVÉRIE J. (*Lyon*) — BEURMANN DR. (*Paris*) — BOURDOT HUB. (*St. Priest-en-Murat*) —
 BROCC-ROUSSEU DENIS (*Nancy*) — CHENANTAIS J. E. (*Nantes*) — DUCOMET V. (*Rennes*) —
 FOËX ÉTIENNE (*Montpellier*) — GALZIN A. (*St. - Sernin*) — M. GARD (*Bordeaux*) —
 GOUGERQT, DR. (*Paris*) — GRIFFON ED. (*Paris*) — GUILLERMOND A. (*Lyon*) —
 HENRY E. (*Nancy*) — LEMÉE E. (*Alencon*) — MAUBLANC A. (*Paris*) —
 MOREAU FERN. (*Paris*) — POTRON M. (*Thiancourt*) — RIEL PHILIB. (*Lyon*) —
 SELIBER G. (*Paris*) — SOUCHÉ B. (*Pamproux*).

Germania.

ADE ALF. (*Weismain*) — BOCK RUD. (*Hamburg*) — DIEDICKE H. (*Erfurt*) —
 v. FABER F. C. (*Berlin*) — HERPELL G. (*St. Goar*) — LEBERLE HANS (*München*) —
 LINGELSHEIM A. (*Roslock*) — PETERS L. (*Berlin*) — RUMBOLD C. (*München*) —
 SCHIKORRA WALTER (*Berlin*) — TOBLER F. (*Münster*) — WOLLENWEBER H. W. (*Berlin*).

Helvetia.

BURRI R. (*Bern*) — CRUCHET DENIS (*Montigny*) — LENDNER ALFR. (*Genève*) — MÜLLER WILHELM (*Bern*) — PROBST RENÉ (*Bern*) — RYTZ WALTH. (*Bern*) — SCHINZ HANS (*Zürich*) — STOEMPFLI RUTH (*Bern*) — STAUB W. (*Bern*).

Hispania.

LAZARO E IBIZA B. (*Madrid*).

Hollandia, Belgium.

KOORDERS S. H. (*Leiden*) — PAQUE EGIDE (*Anvers*).

Italia.

BERGAMASCO G. (*Napoli*) — BIANCHI GIOVANNI (*Parvia*) — CAMPBELL CARLO (*Sora*) — CASU ANG. (*Cagliari*) — CAVAZZA DOMIZIO (*Bologna*) — CENI CARLO (*Cagliari*) — CHIAPPAZZO G. (*Milazzo*) — COBAU ROB. (*Milano*) — FERRO GIOVANNI (*Lodi*) — FONTANA EFISIA (*Torino*) — GABOTTO L. (*Casale-Monferrato*) — GAJA LEANDRO (*Genova*) — MAFFEI LUIGI (*Parvia*) — MAMELI EVA (*Parvia*) — MARIANI GIUDITTA (*Roma*) — MARIGNONI GIUS. BRUNO (*Schio*) — MIGLIARDI VITTORIO (*Venezia*) — MUNERATI OTTAVIO (*Rovigo*) — NAZARI V. (*Roma*) — RADAELI FR. (*Firenze*) — RODILLA ANT. (*Padova*) — ROTA-ROSSI GUIDO (*Brescia*) — SALVI GUIDO (*Pisa*) — SEVERINI G. (*Perugia*) — SPESSA CAROLINA (*Treviso*) — TAROZZI GIULIO (*Modena*) — TIRABOSCHI CARLO (*Roma*) — TRINCHIERI GIULIO (*Roma*).

Rossia.

SEREBRIANIKOW (*St. Petersburg*) — WORONOW G. (*Tiflis*).

Scandinavia.

DOMBROWSKI W. (*Kjöbenhavn, Kopenhagen*) — FERDINANDSEN C. (*Kjöbenhavn*) — HAGEM OSC. (*Christiania*) — LIND J. (*Kjöbenhavn*) — PALM BJÖRN (*Stockholm*) — PETERSEN H. E. (*Kjöbenhavn*) — VLEUGEL J. (*Umea*) — WESTLING RICH. (*Stokholm*) — WINGE O. (*Kjöbenhavn*).

Serbia.

RANOJEVIC NICOLA (*Beograd, Belgrad*).

America borealis.

ANDERSON J. P. (*Iowa*) — BACHMAN FREDA M. (*Madison, Wisc.*) — BUCHANAN R. E. (*Ames, Iowa*) — CHARLES K. VERA (*Washington*) — DAVIS J. J. (*Racine, Wisc.*) — DUGGAR B. M. (*Geneva, N. Y.*) — EDGERTON C. W. (*Baton Rouge, Louis.*) — FAWCETT H. S. (*Gainesville, Fla.*) — FULTON H. R. (*Baton Rouge, Louis.*) — GROSSENBACHER J. G. (*Geneva, N. Y.*) — HALL J. C. (*West Raleigh, N. C.*) — HARTLEY C. P. (*Minneapolis*) — HEALD F. D. (*Lincoln, Nebr.*) — KAUFFMAN C. H. (*Ann Arbor, Mich.*) — LEWIS CH. E. (*Orono, Maine*) — MORSE W. J. (*Orono, Maine*) — OVERTON J. B. (*Madison, Wisc.*) — PATTERSON FLORA (*Washington*) — REDDICK D. (*Ithaca*) — REED G. M. (*Columbia, Mo.*) — SCOTT W. M. (*Washington*) — SUMSTINE D. R. (*Kittaning, Pa.*) — THOM CHARL. (*Washington*) — VEIHMEYER FR. J. (*Washington*) — WALLACE ERR. (*Ithaca*) — WILSON G. M. (*New York*) — WHETZEL H. H. (*Ithaca*).

America meridionalis et centralis.

DROST A. W. (*Paramaribo, Surinam*) — GASSNER GUSTAV (*Montevideo*) — HORTA PAULO (*Rio de Janeiro*) — JONGE A. E. domina (*Paramaribo, Surinam*) — PUTTEMANS ARSENIO (*Sao Paulo Bras.*) — RORER J. B. (*Trinidad*) — STEVENS F. L. (*Mayaguez, Porto Rico*) — VAN HALL C. J. J. (*Paramaribo, Surinam*).

India, Java, Oceania.

BERNARD CH. (*Buitenzorg, Java*) — BUTLER E. J. (*Pusa Ind.*)
— CHEESMAN W. N. (*Auckland N. Zel.*) — PETCH T. (*Peradeniya, Ceylon*).

Japonia.

HARA KANESUKE (*Tokyo*) — HORI S. (*Tokyo*) — YAMADA GENTARO (*Tokyo*) — ITO SEIYA (*Tokyo*) — KAWAMURA S. (*Rigakushi*) — KUSANO S. (*Tokyo*) — MIYAKE ICHIRO (*Tokyo*) — SAITO K. (*Rigakushi*) — SHIRAI MITSUTARO (*Tokyo*).

MUSEO INSTITUTO DE BOTANICA "SPEGAZZINI"	
BIBLIOTECA	
Registro No . . .	49
Ubicación	
Procedencia	Lg. Spegazzini
Fecha	



HYMENOMYCETÆ

Syll. V pag. 3, IX pag. 1, XI pag. 1, XIV pag. 63, XVI pag. 1, XVII pag. 1.

Fam. 1. Agaricaceæ FR. *)

Sect. 1. Leucosporæ FR.

Ser. I. HAPLOPHYLLÆ Sacc.

Subsect. I. Molles.

AMANITA Pers. — Syll. V p. 8, IX p. 1, XI p. 1, XIV p. 63, XVI p. 1, XVII p. 1.

1. **Amanita echinocephala** (Vittad.) Gill. — Syll. V p. 16. — var. 1 **bicollariata** Boud. Ic. mycol. I tab. 4 (ser. III p. 26, n. 298). — A typo differt annulo duplicato, ceterum eadem.

Hab. ad terram argillaceam in silva Ecouen Gallie.

2. **Amanita Emilii** Riel, Bull. Soc. Myc. de France, XXIII (1907) 2 p. 1, tab. I. — Maxima, 12-20 cm. alta, pileo 13-17 cm. lato, stipite 1,5-3 cm. crasso; stipite pleno, valde incrassato in bulbum sphericum, rarius fusiformem, 3-4 ordinibus floccorum concentricis et crenatis in summo ornatum; stipite, bulbo, annulo, volva et verrucis fere ut in *A. muscaria* sed albis, haud subcitrinis; pileo viscoso, primitus luteolo, colore butyraceo, dein pallide fulvo-purpurascens, disco postremo fusco-fuliginoso, margine pallidiore, primum levi deinde striato; lamellis albis, leviter roseis haud subcitrinis, latis, confertissimis, denticulatis; carne alba, sub cuticula hyalino-rosea, haud aurantiaca nec lutea; sapore avellanam jucunde referente; sporis fere rotundatis, magna copia, albis, sub lente hyalinis aut subgranulosis, cum vacuolo medio rotundato, 9-10 μ . crassis.

*) Opportunitatis causa, dispositio systematica hic adhibita, eadem est ac illa ceterorum *Syloges* voluminum, nec *Tabularum* in vol. XIV expositarum.

Hab. in silvis solo argillaceo « Les Echets, bois Michon » dicto, prope Lugdunum Gallie. — Species valde decipiens, forsitan non rarissima sed commixta cum speciebus longe recedentibus, vero e grege *Am. muscaria*, sed ab ea specie ex prima fronte aberrans et certe distincta sporis rotundioribus, colore pilei et carnis sub cuticula, amplitudine media paulo majore et præcipue latiore, lamellis albis subtiliter roseis haud subcitrinis, sapore gratiore, et firma connexionione earumdem notarum.

3. **Amanita calyptroderma** Atkinson et Ballen, Ann. Mycol. VII (1909) 3 p. 365; Science, N. S. XXIX (1909) p. 944, Botanical Gazette XLVIII (1909) pag. 293 c. icone. — Magna, robusta, 10-15 cm. alta, pileo 10-12 cm. lato; stipite 2-4 cm. crasso; pileo stramineo, stipite et velo et lamellis subconcoloribus, volva alba; pileo crasso, carnoso, hemisphærico-expanso, calyptra volvæ adhærente, margine libero et striato; lamellis latis, adnexas; sporis albis, levibus, ellipsoideis, 8-12 \approx 7-8; annulo membranaceo, supero, evanescenti; volva crassa, circumscissa, margine repando demum reflexo; stipite e farcto cavo.

Hab. in silvis montium, Santa Cruz Co. California (Mrs. VIRGINIA GARLAND BALLEEN).

- immata*
F. H. V. 25
4. **Amanita amici** Gill., Hym. France, Suppl. p. 1 cum tab. — Pileo 4
carnoso, ad marginem tenuato, conico dein obtuse umbonato, margine striato, udo subviscido, flavo-ochraceo, vertice brunneolo, ibique verrucis majusculis, irregularibus, adnatis, albo-griseis consperso; pellicula secernibili; lamellis copiosis, ventricosis, utrinque æque angustatis, albis, acie minute denticulatis, brevioribus plurimis immixtis; stipite cavo, æquali, bulboso, albo, sursum leviter striato, supra annulum squamuloso-floccoso; annulo margine irregulari, subinde annulo altero supra bulbum accedente; bulbo sub-sphærico deorsum acute radicato; carne alba sub cute ochracea.

Hab. in silvis Gallie borealis, raro, autumnno. — Pileus 9-10 cm. lat.; stipes 10-11 cm. alt., 1,5-1,7 cm. cr., bulbus 3 cm. cr.

5. **Amanita olens** (Britzelm.) Sacc., Syll. XI, p. 2, Britzelmayr, Revis. 5
Hymenomyc. I, 1898, p. 2. — Pileo 10 cm. lato v. minori (f. *minor*), convexo, centro subapplanato v. umbonato, veli residuis nullis, brunneo v. griseo-brunneo, margine albescente; stipite 15 cm. long., basi quandoque 3 cm. cr., supra 1,2 cm., albo, brunneo-fibrilloso, vix cavo, annulo lato albo; lamellis 12 mm. latis, albis, subconfertis v. e libero adnexas; carne alba, molli, odore raphani, sapore tenui; sporis hyalinis, 10 \approx 7-8.

Hab. in silvis Coniferarum Baviariæ. *Am. pantherinæ* affinis.

6. **Amanita bivolvata** Peck, Bull. Torr. Bot. Club XXXVI (1909) p. 329. — Pileo carnosio, convexo v. subplano, primum viscidulo, margine striato, albo, centro brunnescente, carne alba; lamellis confertis, inæqualibus, liberis, albis; stipite æquali, solido, flocculoso, annulato, albo; annulo angusto, maturitate sæpe evanescente; volva magna, crassa, molli, spongiosa, margine exteriori lobato, interiori integro; sporis subglobosis vel ellipsoideis, 10-12 \approx 8-10. 6

Hab. in quercetis Claremont Californiæ (C. F. BAKER). — Pileus 7-10 cm. latus, stipes 13-15 cm. longus, 1,6-2,5 cm. crassus.

7. **Amanita velatipes** Atkinson, Mushrooms (1903) pag. 63, fig. 64-67. — Pileo udo viscido, rotundato e late ovoideo et convexo expanso, margine striato, senio subrevoluto, flavo v. flavido, centro obscuriore v. brunneo, carne subtenui centro æquali, ad marginem tenuissima; squamulis pilei tenuibus, irregularibus, sparsis, applanatis v. ætate subrevolutis, facile secedentibus, colore pallidioribus; lamellis albis, medio 1 cm. c. latis, utrinque angustatis; sporis inæqualiter ovoideis, 8-10 \approx 6-7, primum granuloso-farctis dein guttulatis; stipite cylindraceo, subbulboso, albo, glabro v. floccoso-squamuloso, centro cavo v. laxe fibrilloso-farcto; velo ex fragmentis stipitis crescentis formato; annulo inferiori, situ variabili. 7

Hab. ad terram in silvis prope Ithaca N. Y. Amer. bor. — Statura 15-20 cm., pileus 8-10 cm. latus, 1-1,5 cm. crassus. *Am. excelsæ* affinis.

8. **Amanita elliptosperma** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 366. — Pileo albo, convexo-conico; annulo amplo, supero; volva ampla apice dehiscenti; sporis ellipsoideis, levibus, 8-13 \approx 5-8. 8

Hab. in silvis, Chapel Hill, N. C., Amer. bor. — *Am. vernæ* similis sed differt sporis ellipsoideis.

9. **Amanita Boudieri** Barla in Bull. Soc. mycol. Fr. 1887, p. 195 et Champ. Alp. maritim. tab. VI, f. 10-12, p. 19; Torrend in Broteria IX (1910) p. 93, t. IV, f. 2-3. — Pileo globuloso dein convexo-plano, demum depresso, levi, nitido, vix hygrophano, albo, centro fulvello-nitido, 6-8 cm. lat., verrucis confertis, inæqualibus, flocculosis, albidis v. fulvellis consperso; lamellis latis, ventricosis, stipitem attingentibus, ex albo dein flavidis; stipite 10-13 cm. longo, 1-2 cm. cr., farcto, subcylindraceo, inæquali, sursum albo et albo-furfuraceo, deorsum flavido, basi in bulbum turbinatum incrassatum; volva oblitterata, fulvo- v. rufo-terrea, denique evanida; 9

annulo tenui, flocculoso, molli, albo, demum evanido; sporis amplis elliptico-oblongis, hyalinis.

Hab. ad terram in montibus Montdaour (Nizza) et in pinetis Lusitaniæ.

10. **Amanita lusitanica** Torrend in Broteria IX (1910) p. 94, t. IV, 10 f. 3. — Pileo carnosio ex convexo applanato, udo, 5-7 cm. lato, nudo, levi, albo, margine quoque levi; lamellis albis attenuato-depressis, ventricosis, acie integra; stipite e farcto subcavo, elongato, 8-10 cm. longo, 6-10 mm. cr., concolore, ad apicem striato, infra annulum furfuraceo, basi tenuiter incrassato; annulo supero, tenui, subsistente; volva tenui, fugaci, ad basim annuli reflexi persistente; carne ex albo nitidula; sporis ellipsoideis 11-14 \approx 6-7.

Hab. in pinetis arenosis locisque incultis in regione trans-tagana Lusitaniæ. — Inter *Amanitam Boudieri* et *A. baccatam* media.

11. **Amanita Morrisii** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 139 (1910), p. 42, 11 tab. W, fig. 1-4. — Pileo carnosio, subcampanulato, deinde late convexo, 5-10 cm. lato, viscido, glabro, margine levi, pellicula separabili, griseo-brunneo seu atro-brunneo, in senectute et siccitate pallidiore, carne alba; lamellis tenuibus, confertis, angustis, leviter adnexis, albis; stipite æquali v. sursum attenuato, solido farctove, 8-14 cm. long. 12-20 mm. cr., minute flocculoso, aliquando griseo et ad apicem striato, vulgo albo, annulo crasso, molli, supra radiato-striato et albo, infra luteolo; volva in fragmenta mox diffracta et evanescente, aut stipitis parti inferiori in fragmentis partim adhærente; sporis subglobosis v. ellipsoideis, 8-10 \approx 6-8.

Hab. ad terram humosam et muscosam, Natick Mass. Amer. bor. (G. E. MORRIS).

12. **Amanita permunda** (Britzelm.) Sacc. — Syll. XI p. 2. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 2. — Pileo 6 cm. lato, margine late et remote sulcato, opaco, veli residuis nullis, albido, centro brunneo-griseo subflavescenti; stipite 15 cm. long., basi incrassato et 2 cm. cr., supra 1 cm. cr., albo, infra annulum album ad colorem brunneum nutante, farcto; lamellis 12 mm. latis, confertis v. subliberis, albis; carne alba, odore et sapore nullo; massa sporarum alba; sporis breviter ellipsoideis, 10 \approx 6.

Hab. gregatim ad marginem silvarum Baviariæ austr. — *Am. aridæ* affinis.

13. **Amanita bellula** (Britzelm.) Sacc. — Syll. XI p. 2. — Britzelmayr, 13 Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 2. — Pileo 5 cm. lato, opaco,

vel, velo amisso, e carneo pallide rubro-sanguineo, convexo, dein applanato et centro depresso; stipite 14 cm. longo, conoideo, basi 2 cm. cr., supra 1 cm., fibrilloso-carnoso, non squamoso, albido, rubido-albo, albo-annulato, vix cavo; lamellis albis v. rubro-albis, 10 mm. latis, adnato-adnexus, confertis; carne senio quoque non spongiosa, rubida, inodora; sporis hyalinis, breviter ellipsoideis, $10 \approx 6$.

Hab. in silvis Algovix et Bavariæ. — *Am. rubescenti* affinis.

14. **Amanita recutitiformis** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX p. 57. 14
— *Agaricus recutitiformis* Britz., Revis. Hymen. I (1898) p. 2, tab. 109, fig. 564. — Pileo 6 cm. lato, convexo-expanso, centro umbonato, veli residuis nullis, griseo v. plumbeo, margine albescenti, striatulo; stipite 9 cm. long., conoideo, infra 1,5 cm. cr., supra 6 mm., basi volva adhærente cincto, extus albo et albo-annulato, tubuloso, pariete 2 mm. cr.; lamellis albis, 5 mm. latis, adnexus; carne alba, odore et sapore nullo; massa sporarum alba; sporis subsphæroideis, 12 μ . diam.

Hab. in silvis fagineis Algovix. — *Am. recutitæ* affinis.

15. **Amanita bisporigera** Atkins., Bull. Conn. St. Nat. Hist. Surv. III 15
(1905); Lewis, Botan. Gazette XLI (1906) p. 348 cum icone. — Alba, plerumque solitaria, 9-13 cm. alta; pileo 4-6,5 cm. lato; stipite 5-8 mm. cr., bulbo 2-2,5 cm. cr.; pileo e convexo expanso, tenui, sæpe gibboso v. parum late umbonato, levi, udo viscido, tenui; lamellis subellipticis, postice plerumque angustatis, sed rotundatis et subliberis, subconfertis, acie floccosis; stipite subæquali v. sursum leviter tenuato, solido, vegeto flocculoso-squamoso, præcipue prope annulum, ætate subnudato; annulo tenui, membranaceo, fragili, subinde integro, superiori; volva crassa apice dehiscente margineque in lobos duos v. tres lacerata; basidiis bisporis; sporis globosis v. subgloboso-ovoideis, levibus, minute apiculatis, 8-10 μ . diam.

Hab. ad terram in silvis prope Ithaca Amer. bor. — *Aman. vernæ* affinis, a qua differt habitu angustiore et basidiis bisporigeris.

16. **Amanita ochreatea** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXVI (1909) 16
p. 330. — Pileo carnosio, convexo v. subplano, glabro, margine levi, candido, carne alba; lamellis confertis, inæqualibus, late sinuatis, albis; stipite æquali, solido, glabro v. leviter fibrilloso infra annulum, supra minute floccoso, candido; annulo tenui, membranaceo; volva molli candida, margine integro, libero; sporis subglobosis v. ellipsoideis, $10-12 \approx 8-10$.

Hab. in quercetis, Claremont Californiæ Amer. bor. (C. F. BAKER). — Pileus 4-6 cm. latus, stipes 8-10 cm. longus, 1-2 cm. crassus.

17. **Amanita glabriceps** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. 131 (1909) p. 18 17
tab. V, fig. 1-4. — Pileo tenui, ovato v. ovali mox convexo v. centro depresso, glabro, juventute volvæ ruptæ fragmentis parce ornato, viscido, margine sæpe striato, albo v. flavido-albo, aliquando centro leviter fusco; carne sub cute separabili, alba; lamellis tenuibus, confertis, liberis, inæqualibus, albis; stipite gracili, elongato, farcto, glabro v. floccoso-squamuloso, bulboso, albo; annulo tenui, aliquando rupto et partim adhærente ad marginem pilei, quandoque omnino evanescente; bulbo volvæ reliquiis persistentibus marginato; sporis globosis, 8 μ . cr.

Hab. ad terram inter folia dejecta, Coopers Plains, Steuben Co.; Sand Lake Renssælær Co., Amer. bor.

18. **Amanita floccocephala** Atkinson, Mushrooms (1903) p. 62, fig. 63. 18
— Pileo ex hemisphærico convexo-expanso, levi, albido, stramineo tincto, plagulis tenuibus flocculosis ex volva circumscissa tecto; lamellis albis et adnexis; sporis globosis 7-10 μ . diam.; stipite cylindrico v. supra leniter angustato, intus cavo v. farcto, subtus floccoso-squamoso et abrupte bulboso; annulo apici stipitis approximato, membranaceo, tenui, quandoque lacero; volva circumscissili.

Hab. ad terram in silvis prope Ithaca N. Y. Amer. bor. — Statura 6-8 cm., pileus 3-6 cm. latus, stipes 4-6 mm. crassus.

19. **Amanita elongata** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. 131 (1909) p. 33. — 19
Pileo tenui, 2,5-5 cm. lato, conico v. ovato, deinde late convexo, glabro, margine levi v. striato, luteo v. aurantiaco, sæpe centro saturatiore, carne alba; lamellis confertis, liberis, albis; stipite elongato, 7,5-15 cm., gracili, 4-8 mm. cr., flexuoso, apice albo vel albido, deorsum pallido, basi leviter incrassato, subradicato; annulo flavido; sporis 8-10 \approx 6-8.

Hab. in herbosis in Pennsylvania, Amer. bor. (E. B. STERLING).

20. **Amanita cothurnata** Atkinson, Mushrooms (1903) p. 66, fig. 68- 20
70. — Pileo carnosio e subgloboso hemisphærico, dein convexo, expanso, demum etiam margine subrevoluto, plerumque albo, quandoque vero centro flavo-citrino v. brunneo-olivaceo, superficie præcipue uda viscida, squamis flocculosis albis, ex superiore volvæ parte oriundis, hinc inde tecta, ad marginem minute striato-squamulosa; lamellis ad stipitem rotundatis et ab eo remotis; acie sæpe

erosa v. ob veli fragmenta fimbriatula; sporis globosis v. subglobosis, guttula magna præditis; stipite cylindrico, æquali, basi late bulboso et supra bulbum residuo volvæ annuliformis prædito, superficie minute floccosa v. subsquamulosa, intus cavo v. juniore laxo fibrilloso.

Hab. ad terram, Blue Ridge mountains, Blowing Rock, N. C., Amer. bor. — Pileus 3-7 cm. v. ultra latus, stipes 7-12 cm. altus 4-10 mm. crassus. *A. Frostianæ* proxima sed distincta.

21. **Amanita cinereoconia** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 366. — 21
Pileo 3 cm. lato, convexo-expanso, cinereo, granuloso-floccoso; lamellis rotundis, liberis; sporis subellipsoideo-suboblongis, levibus, granulosis, 8-12 \approx 4-6; stipite granuloso-floccoso, radicato, 4-6 mm. cr.; annulo supero, floccoso, evanescente.

Hab. in silvis, Chapel Hill, N. C., Amer. bor. (W. C. COKER). — Fungus 5 cm. altus.

22. **Amanita calyptratoides** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXVI (1909) 22
pag. 329. — Pileo carnosio, convexo, demum subplano, margine striato, in centro veli universalis candidi fragmento magno aut fragmentis parvis adhærentibus tecto, ochraceo, cremeo, griseo-brunneo v. plumbeo, carne alba, sapore miti; lamellis subconfer-tis, inæqualibus, sinuatis, adnexas, albis; stipite subæquali, cavo, albo, ad apicem striato; annulo levi mox evanescente v. inconspicuo; sporis sæpe uninucleatis, late ellipsoideis, 10-12 \approx 6-8, vulgo basi apiculatis.

Hab. in quercetis, Claremont Californiae Amer. bor. (C. F. BAKER). — Pileus 4-8 cm. latus; stipes 8-12 cm. longus, 8-16 mm. crassus.

23. **Amanita lignophila** Atkins. in Peck, Bull. N. Y. St. Mus. n. 94 23
(1905) p. 19 (nom. nud.) et Ann. Mycol. VII (1909) p. 366. — Pileo 2,5 cm. lato; stipite 3 mm. crasso; bulbo abrupto, rotundo, 12 mm. cr.; pileo cinereo-brunneo, levi v. fragmentis calyptræ volvæ squamoso; lamellis sordidis, subventricosus, adnexas; sporis globosis, granulosis, 8-10 μ .; stipite pallido, fibroso-striato supra an-nulum subfarinoso; annulo amplo, membranaceo, albo, supero; volva crassa, cinereo-brunnea, margine libero.

Hab. ad ramulos dejectos emortuos in silvis, Ithaca, N. Y. Amer. bor. — Fungus 5 cm. altus. Annulus ab apice stipitis 1 cm. distans.

AMANITOPSIS Roze — Syll. V p. 20, IX p. 2, XIV p. 64, XVI p. 2 et 1110, XVII p. 2.

1. **Amanitopsis pulverulenta** Peck, New York State Mus. Bull. n. 116 24 (1907) p. 17. — Pileo tenui, convexo dein plano, 2,5-5 cm. lato, pulverulento, centro squamoso, margine æquali, albo v. cremeo-albo, odore tenui v. nullo; lamellis tenuibus, inæqualibus, dein angustis, liberis v. subliberis, modice confertis, subventricosis, albidis; stipite æquali vel leviter apice angustato, bulboso, solido, pulverulento vel furfuraceo, albo, 2,5-5 cm. long., 4-6 mm. cr.; sporis subellipsoideis 7,5-10 \approx 5-6.

Hab. ad aggeres umbrosos, Port Jefferson, Suffolk Co. Amer. bor. — *Aman. pubescenti* affinis.

2. **Amanitopsis Chevalleri** (Hariot et Patouillard) Sacc. et Trott. — 25 *Amanita Chevalleri* Har. et Pat. in Bull. Mus. Hist. Nat. (1909) n. 2, p. 88. — Pileo campanulato, albido-rufescenti, circ. 3 cm. diam., levi, margine (in sicco) vix striato; stipite gracili, albido, 6-8 cm. alto, exannulato; volva alba, vaginata, membranacea; sporis sub lente dilute ochraceis, ovoideis, levibus, 12 \approx 7.

Hab. ad terram, Baguirmi, Congo Africae trop.

3. **Amanitopsis vaginata** (Bull.) Roze — Syll. V p. 21. — var. **lutescens** Boud. Ic. mycol. I, t. 8 (ser. I, p. 9). — A typo colore citrino et sporis minoribus, nempe 10-12 \approx 9-11 dignoscitur.

Hab. ad terram in Gallia.

CATATHELASMA Harrison Lovejoy, Botan. Gazette vol. L (1910) p. 383 (etym. ex lamellis distincte decurrentibus). — Pileus subcarnosus, convexus dein expansus; lamellæ decurrentes, subinæquales, acie acutæ; stipes annulatus, contextu simili pileo; volva lata, alba, margine crasso; sporæ albæ. — Est quasi *Amanita* lamellis decurrentibus.

1. **Catathelasma evanescens** Harrison Lovejoy l. c. p. 384. — Pileo 27 13 cm. lato, albo, centro cremeo, e late convexo subplano, levi, udo, perimetro late elliptico, margine integro; carne albida, compacta, centro crassiore; lamellis longe decurrentibus, aliis longioribus, aliis brevioribus, albis, ad marginem pilei 2-3 cm. latis, ad stipitem angustioribus, subdistantibus, acie acutis; stipite brevissimo, crasso, 1 cm. longo, 4 mm. cr., carnosus, cavo, levi, albo; annulo delicatulo, evanido, lamellis proximo; volva lata, alba, levi, persistente ad stipitis basim adpressa; stipite albo, basi bulboso; sporis albis, levibus, ex ellipsoideo fusoides, 14-17,5 \approx 3-5.

Hab. ad terram humosam in silvis editioribus Rocky Mountains Amer. bor.

LEPIOTA (Fr.) Quél. — Syll. V p. 27, IX p. 3, XI p. 2, XIV p. 65, XVI p. 2, XVII p. 3.

1. **Lepiota gigantea** Speg. An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX²⁸ (1909) p. 260. — Laxe gregaria v. solitaria, erecta; pileo primo ovato dein hemisphærico-campanulato, eximie grosse acuteque umbonato, 12-25 cm. diam., 8-16 cm. alt., in umbone levi avellaneo, ceterum e lutescente v. ferrugineo-cervino, dense fibrilloso-reticulato-virgato, squamulis minutis adpressis, obscurioribus adperso, margine incurvo levissimo; carne alba exsucca, subtenui, 5 mm. cr., immutabili; lamellis tenuiter membranaceis, candidis, confertissimis, acie integerrimis, utrinque attenuato-acutatis 5-10 cm. long., 1-1,5 cm. lat.; stipite erecto 50-90 cm. alto, apice albo, levi vel vix furfurello, 10-15 mm. diam., basi pallescenti, irregulariter scrupuloso, 20-30 mm. diam., ceterum cervino, non v. vix subfibrilloso, ad tertium superum annulo, membranaceo simplici descedente persistente pro ratione parvulo, 2-3 cm. diam., candido coriacleo ornato; sporis albis sed sub vitro non inspectis; odore fere nullo et sapore subdulci, non v. vix acri.

Hab. inter folia delapsa atque putrescentia in silvis densissimis secus Rio Dorado, Misiones, Argentina.

2. **Lepiota sociabilis** (Britzelm.) Sacc. Syll. XI p. 7. — Britzelmayr, ²⁹ Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 3. — Pileo 15 cm. lato, sicco, hemisphærico- v. campanulato, primum ut stipite obscure rubro-brunneo, demum flavido-albescente; stipite 8 cm. long., basi 5 mm. supra 3 mm. cr., rupto albo-fibroso, vix cavo; lamellis 5 mm. lat., crassis, pallide carneis, marginem non attingentibus; sporis hyalinis, 8-10 \approx 4, breviter ellipsoideis.

Hab. solitaria vel gregaria ad terram muscosam Bavarie. — *Lep. granulose* affinis.

3. **Lepiota Drymonia** Morg., Journ. of Mycol. XIII (1907) p. 13. — ³⁰ Pileo carnosio e subgloboso convexo et expanso, carne crassa, alba; cute crassa ex avellaneo pallide umbrina, mox in squamulas squaroso-reflexas in superficie alba sparsas diffracta; stipite valido, solido, sursum e basi incrassata attenuato, squaroso cum squamulis reflexis, pileo concolori; velo tenui, albo, membranaceo, lacerato, appendiculato; lamellis latis, confertis, albis, liberis.

Hab. ad terram inter folia dejecta, Pomfret Vt. Amer. bor.

(MORGAN). — Pileus 8-10 cm. diam., stipes 10-14 cm. longus, apice 12-16 mm. basi 3-4 cm. crassus.

4. **Lepiota sulphureo-floccosa** Speg., Ann. Mus. Nac. Buenos Aires 31 t. XIX (1909) p. 261. — Sæpius solitaria, fere e solo erumpens; pileo primo subgloboso dein hemisphærico-expanso 6-8 cm. diam., 2-3 cm. alt., centro non umbonato nec umbilicato ibique levi, non v. vix fuscescenti, ceterum squamis crassis confertis e gossypino flocculoso-farinosis facillime evanidis sulphureis vestito, carne compacta alba, sed tacta mox flavescente, sublactescente, 8-10 mm. cr., ad centrum; lamellis polymacriis subcrassiusculis constipatis albis, sed tactis flavescens, acie integris, antice obtusis, postice attenuato-sinuatis, a stipite vix remotis; stipite primo bulboso-conico, dein conoideo-elongato, postremo subcylindræo basique plus minusve incrassato, 12-16 cm. long., 8-25 mm. diam., farcto, intus albo, fibroso, a pileo ægre separando, utrinque albescente atque subglabro, medio grosse sulphureo-farinoso-pulverulento, fragili, annulo amplissimo densissime longitudinaliter sulcato descedente flocculoso-sulphureo mox fatiscente, torquato; sporis hyalinis (sub vitro non inspectis); sapore dulci, substiptico sed non acri; odore nullo.

Hab. in silvis secus Rio de Las Piedras, Salta, nec non secus Rio Soberbio, Misiones, Argentina. — Species in juventute, primo intuitu, *Amanitam mappam* in mente revocans.

5. **Lepiota manilensis** Copeland, Ann. mycol. III (1905) p. 29. — Sa- 32 pida, fere inodora; pileo campanulato-conico, denique explanato, subumbonato, apud marginem striato, squamulis brunneis minutis disco dense, marginem versus parcissime oblecto, 5-9 cm. lato; carne albida, immutabili; lamellis liberis, confertis, albidis, utrinque subacutis, latis; collario nullo; stipite valido, canaliculato, albedo vel pallide brunneo, glabro, æquali vel deorsum leviter incrassato, ad 10 cm. alto, 1 cm. crasso; annulo integro, fusco-marginato, interdum reflexo, mobili vel subfixo; sporis hyalinis, variis, vulgo $10 \approx 6-7 \mu$, maximis $13-15 \approx 7,5-9 \mu$.

Hab. ad terram sub Pithecolobiis et Terminaliis, Manila ins. Philippin.

6. **Lepiota Missionis** Berk. — Syll. V p. 55. — var. **radicata** Eichelb., 33 Verh. Naturw. Ver. Hamburg, 3. Flge, XIV (1906) p. 88. — A typo differt stipite radicato, radice usque 1 metr. longa, flexili, tenaci.

Hab. ad terram prope Aman i Africae trop.

7. Lepiota cinerescens Quél. in Assoc. Franç. Avanc. Sc. XXII 34

(1893) p. 1, t. III, f. 1 (extr.) non Speg. — Pileo convexo, 5-7 cm. lato, flocculis fibrilloso-sericeis consperso, pallide cinereo, dein obscurato, carne tenera, dulci, alba; lamellis remotis, angustis, albo-cereis; stipite fibroso-carnoso, sericeo-medullato, fragilissimo, albo, sursum pruinoso, infra annulum membranaceum, deciduum, album, fibrilloso-sericeo; sporis oblongo-pruniformibus, 8-9 μ . long., hyalinis.

Hab. in silvis prope Massiliam (Marseille) ubi legit RÉGNIS. — *Lep. holosericeæ* affinis. — *Lep. cinerescens* Speg. (1899) — Syll. XVI, p. 4 — nuncupanda est **L. Spegazzinii** Sacc. et Trott., ex-tante homonyma et anteriore Quéletii.

8. Lepiota tenella Boud., Icon. Mycol. I, tab. 18 (ser. I, p. 24). — 35

Minuta, gracilis, 5-7 cm. alta; pileo campanulato, violaceo-flocculoso, dein expanso, albo, floccis minutis violaceis medio congestis et ad marginem striatum rarioribus; stipite elongato, subbulboso, fistuloso, albo, infra annulum medium violaceo-flocculoso; lamellis albis, liberis et a stipite remotis; carne alba; sporis albis, 12-14 \times 7-8.

Hab. ad terram in calidario, Montmorency Galliæ. — Ab affinis *L. Brebissonii* et *L. serena* colore et stipite inferius furfuraceo distincta.

9. Lepiota valens Boud. Icon. Mycol. I, t. 13 (ser. VI, p. 20). — 36

Magna, robusta, 7-10 cm. alta, totidem fere lata, tota albida; pileo umbonato centro fuscescente, supra minutissime granuloso; stipite elato, apice non furfuraceo, longitudinaliter pallide fusco-lineato, ceterum glabro; inferne clavato-bulboso; annulo membranaceo denticulato; lamellis latis albidis; carne concolore, non rufescente; sporis albis, ovoideis, intus non v. vix granulosis, 10 \times 7; carne farinam recentem redolente.

Hab. ad terram sub Abietibus in silvis, Haut Jura Galliæ. — Affinis *L. naucinæ* sed major et stipite fusco-lineato, basi que clavato-bulboso.

10. Lepiota nivea Quél. in Assoc. Franç. Avanc. Sc. XVIII (1889) p. 1, 37

t. XV, f. 1 (extr.). — Pileo campanulato, 5-7 cm. lato, tenui, sub velo floccoso striato; stipite gracili, sericeo-medullato, subbulboso, sursum pruinoso v. farinoso, infra annulum tenuem striatum et reflexum floccoso; lamellis remotis, angustis, lacteis; sporis elliptico-pruniformibus, guttulatis, 7-8 μ . long.

Hab. in solo coriario calidariorum pr. Lyon (Pr. PÉTEAUX). — Affinis *L. capestipedi*.

Lepi
holoser
minuta
VI 42

- nanitopsis
ermmata
H, V, 25*
11. **Lepiota Barlæ** Quél. Assoc. Franç. Avanc. Sc. XXVI (1897) 38 p. 1, t. 4, f. 1 (extr.), *L. cristata* Barla, Champ. Alp. marit. p. 57, t. XVI, f. 1-4, non Alb. Schw. — Pileo globuloso dein convexo, 5-7 cm. lato, fibrilloso-sericeo, albo, cuticula in lacinias fulvas vertice coalitas et brunneas excoriata; carne tenui, 2 mm. cr., alba, oleum rancidum olente; stipite fistuloso, intus sericeo-medullato, 5-8 cm. longo, vix 4-8 mm. cr., basim versus fusoideo, fibrilloso-sericeo, albo dein rubido; annulo membranaceo, pendulo, fimbriato, albo, deciduo; sporis ellipsoideis, 6-9 μ . long.

Hab. in silvis montanis Alpium maritimarum (BARLA). — Subaffinis *L. clypeolaricæ* et *L. felinæ*.

- naucina
V, 43*
12. **Lepiota naucinoides** Peck 48 Rep. (1894) p. 162, t. XIX. — 39 Pileo molli levi albo v. sordide-albo; lamellis liberis, albis, ætate rubido-brunneis v. fumoso-brunneis; stipite annulato, basi leviter incrassato, pileo concolori; sporis subellipsoideis, uniguttulatis, albis, 7-8,5 μ . long.

Hab. ad terram in herbidis raro in agris New York Amer. bor. — *Lep. naucinæ* affinis. — Pileus 5-7 cm. latus; stipes 5-7 cm. long., 5-10 mm. cr.

13. **Lepiota destinata** (Britz.) Sacc. et Traverso — Syll. XIX p. 1079. 40 — *Agaricus destinatus* Britz. Rev. Hymen. I (1898) p. 3, tab. 71, fig. 407. — Pileo 6 cm. lato, convexo, applanato, centro umbonato, carnosus, opaco, glabro, viscoso, albo-cremeo; stipite 8 cm. longo, 1,6 cm. cr., basi subincrassato, farcto, e basi ad annulum vix distinctum albo, flavido-fibrilloso-floccoso, supra annulum albo; lamellis 4 mm. latis, sat confertis, liberis; carne albida, subinodora; sporis albo-hyalinis, 6 \approx 3-4, rotundato-elongatis, quandoque grosse uniguttulatis.

Hab. in silvis frondosis, Gunzenhausen, Jura. — *Lep. polystictæ* affinis.

14. **Lepiota Chudæi** Pat, Bull. Soc. Myc. Fr. XXII (1906) p. 195. — 41 Pileo convexo, 6 cm. diam., carnosus, levis, albo, nonnullis squamulis griseis prædito, cute difficile separabili; lamellis æqualibus, stipatis, albis, leniter flavidis, angustis, partem superiorem stipitis attingentibus; basidiis clavatis 50 \approx 10 circ., sterigmatibus binis præditis; sporis hyalinis, ovoideo-rotundatis, levibus 10-12 \approx 6-8, guttula magna lucente præditis; cystidiis nullis; stipite cylindraceo, albo, levi (in sicco striato), nonnullis squamulis griseis basim versus donato; stipite cum hymenophoro continuo, 7-8 cm. alto; odore nullo; annulo supero, membranaceo, albo, persistente.

Hab. inter In-Salah et Aggahar, 1000 m. alt., Africa borealis (CHUDEAU). — *Lep. holosericeæ* proxima.

15. **Lepiota candida** Copeland, Annal. mycol. III (1905) p. 29. — 42

Pileo sicco, candido, fere glabro, explanato, valde umbonato, 7 cm. lato, disco, carneo, margine tenui, substriato, minute crenato, carne immutabili; lamellis albis, tenuibus, confertissimis, liberis, approximatis, lanceolatis, utrinque subacutis; sporis hyalinis, apiculatis, guttulatis, $9,5 \approx 6$; stipite glabro, candido, in umbone pilei profunde immerso, 15 cm. alto, sursum tereti, 5 mm. crasso, fistuloso, deorsum fusiformi-incrassato et solido, haud bulboso; annulo supero, deciduo; odore nullo, sapore miti.

Hab. in prato graminoso, solitaria, Manila, Philipp. — Species parte tertia infera stipitis distincte fusiformi mox dignoscenda.

16. **Lepiota chlorospora** Copeland, Ann. mycol. III (1905) pag. 28. 43

— Pileo carnosio, primo globoso, dein campanulato, postremo late conico, ambitu interdum explanato, 8 cm. lato, 4 cm. alto, disco brunneo-calypttrato, integro vel fisso, ambitu squamis fibrillisque pallido-brunneis parce obtecto, apud marginem integrum vel subciliatum albido; lamellis liberis, remotis, 5 cm. longis, 8 mm. latis, sursum attenuatis, confertis, albo-cyanescentibus; basidiis 10 μ . cr., 4-sporis; sporis hyalino-viridibus (ut *Aspergilli glauci*) levibus, $8 \approx 5$, breviter pedicellatis, grosse 1-guttatis; stipite 8-10 cm. alto, 6-8 mm. crasso, recto vel tortuoso, farcto, noduloso, extus intusque brunneo, medulla alba, a pileo ægre secedente; annulo fixo, persistenti, 1 cm. lato, plicato fissoque, superne albicante dum sporis consperso.

Hab. ad terram in pratis apricis, Manila, Philipp. — Potius *Lepiota* quam species generis novi *Chlorophylli* Masee in Kew Bulletin of Miscell. Informat. (1898) pag. 135 conditi, nam aliæ *Lepiotæ* species chlosporæ videntur, teste Copeland. — A *Lepiota esculenta* (Masee) Sacc. et Syd. præcipue squamis brunneis nec albis et annulo fixo differt.

17. **Lepiota bentista** Morg, Journ. of Mycol. XIII (1907), p. 14. — 44

Pileo carnosio e globoso convexo et explanato; carne tenui, alba; cute tenui levi albida v. pallide alutacea, viscida; stipite basi leniter bulboso, subæquali, farcto, albo, levi sed viscido, annulo tenui, albo, membranaceo; lamellis angustis, confertis, albis, liberis; sporis ellipsoideo-ovoideis, $9-11 \approx 5-6$.

Hab. ad terram, Blue Mounds, Wis. (DENNISTON). — Pileus 5-8 cm. diam., stipes 6-8 cm. longus, 8-12 mm. cr.

18. **Lepiota carecti** (Britzelm.) Sacc., Syll. XI, p. 7. — Britzelmayr, 45
Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 3. — Pileo 4 cm. lato, e plano
convexo, centro umbonato, non lucenti, albido vel subcarneo vel
brunneo, centro flavescenti; stipite 3,5 cm. longo, 3 mm. cr., ru-
bido v. lilacino, cavo, rigido; lamellis 5 mm. latis, albidis v. sub-
flavidis, confertis; massa sporarum alba; sporis 3-3,5 \times 2, breviter
ellipsoideis.

Hab. ad terram inter cæspites Caricis albæ in silvis Co-
niferarum Baviariæ. — Species membranaceo-cartilaginea potius
quam carnosæ. *Lep. parvannulatæ* affinis.

19. **Lepiota xylophila** Peck, Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) 46
p. 97. — Pileo tenui, campanulato v. convexo, umbonato, minute
squamuloso, initio albo v. albido et margine æquali, dein ætate v.
arescendo brunneo, umbone obscuriore et margine plicato-striato;
lamellis mox angustis, liberis, margine denticulatis, minute pul-
verulentis, albidis, flavo v. griseo-flavo tinctis; stipite angusto,
æquali v. subæquali, cavo, pallide-flavido v. griseo-flavo; sporis
ellipsoideis, uniguttulatis, 8-12 \times 6-7.

Hab. in ligno Pini rubræ, Abietis Douglasii, Sequojæ,
ins. Hawaii (N. A. COBB). — Pileus 2-4 cm. latus; stipes 2-4 cm.
longus, 2-4 mm. cr. *Lep. cepæstipiti* affinis.

20. **Lepiota spanista** Morg., Journ. of Mycol. XII (1906) p. 198. — 47
Pileo carnosæ, ex ovoideo campanulato et expanso, subumbonato;
carne tenui alba; superficie radiatim fibrillosa, primum continua,
ex alutaceo pallide umbrina, dein cute secedente et tunc adpresse
squamulosa; velo lacerato, appendiculato; stipite supra angustato,
basi incrassato, fistuloso, fibroso-farcto, infra annulum squamuloso
et pileo concolori; lamellis latiusculis, confertis, albis, approxima-
tis; sporis ellipsoideo-oblongis, 8-11 \times 5.

Hab. ad terram inter ligna putrida in silvis, Preston, Ohio,
Amer. bor. — Pileus 3-5 cm. diam., stipes 4-6 cm. altus, 5-8 mm. cr.

21. **Lepiota rufescens** Morg., Journ. of Mycol. XII (1906) pag. 246, 48
Agaricus fusco-squameus Morg. — Pileo carnosæ, ex ovoideo con-
vexo et expanso, subumbonato; carne tenui, alba, fracta rubida;
superficie radiatim fibrillosa; cuticula primum continua, albida,
cinnamomea et rufescenti, demum secedente et tunc minute squa-
mulosa; stipite supra angustato, fistuloso, fibroso-farcto, sub cuti-
cula albo-fibrillosa rufescenti; annulo tenui, membranaceo; lamellis
latiusculis, confertis, albis, rufescentibus, liberis, approximatis;
sporis ellipsoideo-ovoideis, oblique apiculatis, 6-8 \times 4-5.

Hab. ad terram inter folia dejecta, Preston, Ohio Amer. bor. — Pileus 3-5 cm. diam.; stipes 5-7 cm. longus, apice 4-6 mm. cr., basi 7-10 mm.

22. **Lepiota obscuro-umbonata** P. Henn. in Engl. Jahrb. XXXVIII 49 (1905) p. 124. — Pileo carnosulo, ovoideo-campanulato, vertice obtuso-umbonato, fusco-brunneo, radiatim striato, albido, fusco-squamuloso, margine tenui, c. 2-4 cm. lato, 2-3 cm. alto; stipite subfistuloso, tereti, 3-7 cm. longo, 2,5-3,5 mm. crasso, fusco, pruinoso, annulo membranaceo, pallido, evanescente; lamellis liberis, confertis, ventricosis, primo pallidis dein incarnato-fuscescentibus; sporis ellipsoideis, basi oblique apiculatis, hyalino-carnescentibus, 1-2-guttulatis, 8-9 \times 5-7,5.

Hab. ad terram prope Bipindi, Kamerun Africæ (ZENKER). — *Lep. Meleagris* Sow. affinis sed distincta.

23. **Lepiota ?juyuyensis** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 50 (1909) p. 261. — Laxissime gregaria v. solitaria; pileo primo subgloboso, carneo, sublevi, sericeo, plus minusve hemisphærico-expanso, 5-6 cm. lat. 1-2 cm. alt. atque numquam umbonato nec umbilicato, centro grosse, ambitu minute rimoso-squamoso, margine membranaceo lato subinvoluta appendiculato; carne subspongiosa subhygrophana alba immutabili; lamellis antice subacutiusculis, postice rotundatis, stipite adpressis sed plane discretis, acie integerrimis albis; stipite subcylindræo deorsum vix incrassato, 5-6 cm. alt., 1-2 cm. diam., utrinque albo, glabro, levi, medio dense grosseque carneo-squamoso, amplissime annulato-torquato; sporis hyalinis (sed vitro non inspectis).

Hab. in pratis, sub umbra dumetorum, circa Perico, Jujuy Argentinæ. — Odor saporque gratissimi; species edulis.

24. **Lepiota intermedia** Blytt, Norg Hymen. in Vid. Selsk. Skrift., n. 6 51 (1904) p. 83. — Pileo albido, disco brunneo, satis plano, interdum excentrico, subtiliter pubescenti et adpresse fusco-fibrilloso, nitido, margine sulcato-striato, primitus involuto; lamellis tenuibus, confertissimis, demum decurrentibus, aquose cinnamomeis v. ochraceis; stipite solido, adpresse fibrilloso, sursum subfarinoso; sporis sordide albidis.

Hab. ad terram prope Christiania Norvegiæ.

25. **Lepiota glischra** Morg., Journ. of Mycol. XII (1906) pag. 203. 52
Agaricus oblitus Morgan. — Pileo carnosulo, e subovoideo convexo et expanso; carne subtenui, alba; epidermide stratu glutinoso brunneo tecta, centro crassiore et tunc obscuriore; stratu glutinoso

cum velo marginali continuo et stipitem etiam obtegente; stipite supra angustato, firmo et sub glutine albo-fibrilloso; lamellis latis, confertis, albis, postice rotundatis, liberis, approximatis; sporis globosis v. ovoideis, apiculatis, $4-5 \approx 4$.

Hab. ad terram in silvis, Preston, Ohio, Amer. bor. — Pileus 3-4 cm. diam., stipes 4-6 cm. long., 3-4 mm. cr.

26. **Lepiota Demangei** Pat., Bull. Soc. Myc. France, XXIII (1907) 53 p. 78. — Pileo initio campanulato dein plano-convexo, carnosio, orbiculari, 3-8 cm. diam., margine integro v. lacerato, undulato, albo, centro elevato-mammoso, ochraceo-brunneo, squamulis furfuraceis tecto; lamellis liberis, adpressis, inæqualibus, albis, 5 mm. latis; sporis ovoideis, basi attenuatis, albis, levibus, guttula centrali præditis, $10 \approx 7$; stipite firmo, dein cavo, glabro, albo, æqualiter cylindræo, 6-8 mm. cr.; annulo supero, membranaceo, albo; carne tenera, alba, aëris ope præcipue ad basim rubescente; odore et sapore dulci.

Hab. ad terram herbosam, Hanoi Indo-Cinæ (DEMANGE). — *Lep. cristatæ* et *L. seminudæ* proxima.

27. **Lepiota gemmata** Morg., Journ. of Mycol. XII (1906) p. 202. — 54 Pileo carnosio, primum globoso dein convexo et expanso; carne crassa alba; cute crassiuscula, alba, minute aculeato-verrucosa, ætate fuscescenti, subfarinosa, velo appendiculato; stipite sursum attenuato, fistuloso, fibroso-farcto, albo, supra annulum flocculososquamoso, squamulis dein fuscescentibus; lamellis latis, confertis, albis, postice obtusis et approximatis; sporis oblongis, oblique apiculatis, $4-6 \approx 2,5-3$.

Hab. ad terram humosam, Preston, Ohio, Amer. bor. — Pileus 2-4 cm. diam., stipes 3-5 cm. long., 3-5 mm. cr.

28. **Lepiota flavescens** Morg., Journ. of Mycol. XIII (1907) p. 5. — 55 Pileo submembranaceo, ex ovoideo campanulato et explanato subumbonato; cute radiatim fibrillosa, dein squamulosa, ad centrum subsulcata, pallide flavescenti, umbone fulvescenti; stipite supra angustato, gracili, fistuloso, subtus cuticula albo-fibrillosa rufescenti, annulo tenui membranaceo, flavo, persistente; lamellis angustis subdistantibus, liberis, albis vel flavidis; sporis ellipsoideo-oblongis, oblique apiculatis, $5-6 \approx 3-4$, uniguttulatis.

Hab. ad terram sub Robinia et Gleditschia, Preston, Ohio, Amer. bor. — Pileus 2-4 cm. diam., stipes 3-5 cm. long., 2-4 mm. crassus.

29. **Lepiota elata** Copeland, Annal. mycol. III (1905) pag. 29. — 56

Pileo e conico mox expanso, 4-6 cm. lato, umbonato, carnosio, discum versus sericello-squamuloso, ceterum glabro, margine substriato, ætate late reflexo, disco brunneolo, ambitu albo, vetustate denique rubro-nigrescente; lamellis albis, rubro-nigrescentibus, liberis, approximatis, confertis, ventricosis; stipite glabro, fistuloso, deorsum leniter incrassato nec bulboso, 5-8 cm. alto, medio 5 mm. crasso; annulo medio libero, convexo, angusto, integro, brunneo, fugaciter margine pilei interdum adhærente; sporis hyalinis, symmetricis, 9-10 \times 5-6; odore saporeque mitibus.

Hab. in pratis pinguibus, Manila, Philipp. — *Lep. inebriatæ* B. et Br. et *Lep. microspilæ* Berk. in Ceylon lectis, (ex descr.) similis.

30. **Lepiota Patouillardi** Sacc. et Trott. *Lep. Barlæ* Pat., Bull. Soc. 57

Myc. Fr. XX (1905) p. 117 (= *Lepiota helveola* Barla, non Bres.) non *Lep. Barlæ* Quél. — Differt a *Lep. helveola* Bres. colore violaceo v. vinoso, statura robustiore, stipite etiam magis robusto et crasso, squamulis latis circularibus basim versus obsito, ceterum flocculoso, basi obscuriore sursum albido; annulo parvo rubro-brunneo; squamulis et annulo demum evanescentibus.

Hab. in herbidis sabulosis prope Laghouat in Alpibus Maritimis Galliæ (BARLA).

31. **Lepiota infundibuliformis** Jacobasch, Verh. Bot. Ver. Brandenburg 58

XXXIII (1891) p. XLII. — Pileo late infundibuliformi, tenuiter carnosio, flavo v. flavo-aurantio, verruculis cinnabarinis consperso, 1,5-5 cm. lato; lamellis confertis, albis, liberis; stipite basim apicemque versus incrassato, ima basi bulboso, farcto, aurantiaco, sed toto v. infra annulum floccis candidis tecto, 2-3 cm. longo, 2-5 mm. cr.; annulo squamuloso, cinnabarino; carne alba, firma; sporis ovato-oblongis, 4-5 \times 2-3,7, albo-hyalinis.

Hab. in silvaticis Grunewald prope Berolinum. — *L. cinnabarinæ*, quacum inventa est, et *L. granulosa* affinis.

32. **Lepiota asperula** Atkinson, Mushrooms (1903) pag. 82, fig. 84. — 59

Pileo convexo v. subcampanulato, dein plus minusve expanso, brunneo v. brunneo-olivaceo; superficie sicca squamulis minutis, erectis, acuminatis tecta; lamellis albis v. flavidis, liberis, sed ad stipitem parum confertis, angustis, sæpe acie erosis, quandoque ad stipitem furcatis, nonnullis etiam binatim connexis; sporis oblongis, levibus, minutis 5 \times 2; stipite pileo concolori, cylindrico, intus cavo et fibrilloso, basi bulboso, minute pubescenti; velo albo, sericeo, tomentoso.

Hab. ad terram inter folia dejecta prope Ithaca N. Y. Amer.

bor. — *Lep. asperæ* affinis sed statura et sporis etiam multo minoribus. — Pileus 2-4 cm. latus, stipes 5-8 cm. alt., 4-6 mm. cr.

33. **Lepiota umbrosa** Morg., Journ. of Mycol. XII (1906) p. 199. — 60

Pileo carnosio, ex ovoideo campanulato et expanso, subumbonato, carne tenui, alba; superficie radiatim fibrillosa, brunneo-fusca centro obscuriori, matura minute squamulosa, velo flocculoso subappendiculata; stipite subæquali supra bulbum mycelialem, fistuloso, fibroso-farcto, supra annulum albo et levi, infra floccoso-fibrilloso et rufescenti, squamulis fuscis tecto; lamellis subangustis, confertis, albis, postice rotundatis, liberis, approximatis; sporis ellipsoideo-oblongis, oblique apiculatis, 5-6 \approx 3.

Hab. ad terram, Preston Ohio, Amer. bor. — Pileus 1,5-2,5 cm. diam.; stipes 4-5 cm. longus, 2-4 mm. cr.

34. **Lepiota rufipes** Morg., Journ. of Mycol. XII (1906) p. 156. — Pileo 61

carnosulo, convexo, levi et glabro, rufescenti, apice pallido; annulo evanescenti; lamellis latis, confertis albis, liberis, approximatis; sporis oblongis, 4-5 \approx 3.

Hab. ad terram inter folia dejecta, Preston, Ohio, Amer. bor. — Pileus 1 cm. circ. latus, stipes 2-3 cm. longus.

35. **Lepiota rhodopepla** Morg., Journ. of Mycol. XIII (1907) p. 6. — 62

Pileo submembranaceo, ex ovoideo campanulato et explanato, subumbonato, superficie radiatim fibrilloso, ad centrum rimuloso-sulcato, sub cute ex albo roseo; cute tenuissima, pallide flava, in squamulas furfuraceas mox separabili; stipite supra angustato, fistuloso, sub cuticula albo-fibrillosa roseolo; annulo tenui, membranaceo, pallide flavo; lamellis latiusculis, subdistantibus, ex albido cinnamomeis; sporis ellipsoideo-oblongis, 6-8 \approx 4-5.

Hab. ad terram herbosam cultam, Preston, Ohio Amer. bor. — Pileus 1-2 cm. diam., stipes 2-3 cm. longus et 1-2 mm. cr.

36. **Lepiota phæosticta** Morg., Journ. of Mycol. XII (1906) p. 248. 63

— Pileo carnosio, subovoideo et apice obtuso, expanso et explanato; carne tenui, alba, cute radiatim fibrillosa, mox minute et crebre punctiformi-squamulosa; stipite supra angustato, basi clavato, firmo, glabro, annulo membranaceo persistente; lamellis confertis, albis, postice angustatis, liberis et subremotis; sporis ellipsoideo-oblongis, oblique apiculatis, 5-6 \approx 3-3,5.

Hab. subcæspitosa ad terram in silvis, Preston, Ohio Amer. bor. — Pileus 10-15 mm. diam.; stipes 15-20 mm. longus, 1-2 mm. crassus.

37. **Lepiota nudipes** Peck, Bull. Torr. Bot. Club XXXIII (1906) 64

p. 213. — Pileo tenui convexo, umbonato, minute brunneo-squamuloso, margine demum obscure striato, albido, umbone obscure brunneo et æquali; lamellis tenuibus, modice confertis, liberis, ventricosis, albis; stipite angusto, fibroso, æquali vel subæquali, supra pallido, basi brunneo et fibrilloso; sporis albis, ellipsoideis, 5-6 μ . longis, 3-4 μ . latis.

Hab. prope St. Louis, Missouri, Amer. bor. (N. M. GLATFELTER). — Pileus 1,2-2 cm. latus; stipes 2,5-4 cm. longus, usque 1 mm. crassus.

38. **Lepiota neophana** Morg, Journ. of Mycol. XII (1906) p. 248. — 65
Pileo carnosulo ex ovoideo campanulato et expanso, subumbonato, carne tenui, firma, alba; cute tenui, tenaci, superficie levi et glabra, e ferrugineo pallide umbrina, centro obscure brunnea, continua v. maturitate irregulariter areolatim disrupta; stipite angusto, subæquali, tenaci, fistuloso, supra anulum albo, infra pallide umbrino, cuticula albo-fibrillosa prædita; lamellis latis, confertis, albis, postice obtusis, liberis, approximatis; sporis oblongis, oblique apiculatis, 4-5 \times 3.

Hab. ad terram in silvis, Preston, Ohio Amer. bor. — Pileus 2-3 cm. diam.; stipes 3-4 cm. longus, 2-3 mm. cr.

39. **Lepiota microspora** Masee, Kew Bull. (1906) pag. 92. — Pileo 66
carnosulo, convexo dein expanso, late umbonato, pallido, primo villosulo-fibrilloso postea squamulis rufescentibus adpressis vestito, 1,5-2 cm. lato; lamellis liberis, subconfertis, angustatis, albis; sporis angustis, cylindræo-ovatis, hyalinis, 4,5-5 \times 2-2,5; stipite brevi, 2 cm. longo, fistuloso, æquali, basi bulbilloso, pallido, infra anulum floccis albis cito deciduis primum vestito.

Hab. ad terram, Narcondam in ins. Andaman (ROGERS). — Habitus *L. metulisporæ* B. et Br. sed characteribus sporarum distincta.

40. **Lepiota Lucandi** Qué. Assoc. Franç. Avanc. Sc. XXIV (1895) 67
p. 1, t. XXXIII, f. 6 (extr.). — Pileo convexo, 2-3 cm. lato, centro subumbonato, cuticula crassa, levigato, lubrico, pallide griseo, margine lamellas excedente; carne tenui, tenera, sapida, alba; lamellis subconfertis, a stipite liberis, albis; stipite gracili, sericeo-medullato, basi incrassato-ovoideo, pruinoso, albo; annulo membranaceo, erecto dein reflexo, caduco, albo; sporis elliptico-pruniformibus, 10 μ . long., ocellatis, hyalinis.

Hab. in silvis Coniferarum, Morvan Gallie (BIGEARD). — Velo humido *L. medullatæ*, habitu *L. mastoideæ* accedit.

41. **Lepiota globularis** Qué. Assoc. Franç. Avanc. Sc. XXII (1893) 68

p. 1, t. III, f. 2 (extr.). — Pileo globuloso, 1 cm. diam., minute papilloso, brunneo v. badio-violaceo, dein aperto et 2 cm. diam., margine excoriato fulvo-incarnato; carne tenui, alba, dein rosea, Nasturtium redolente; lamellis remotis, albis; stipite gracili, fistuloso, sericeo-medullato, albo-roseo, levigato, e mycelio reticulato albo oriente; annulo membranaceo tenui, brunneolo, sæpe fimbriam ad marginem pilei formante; sporis ovoideis, 5 μ . long.

Hab. ad terram humosam silvaticam, Nièvre Galliæ (Domina V. DAULNOY). — *Lep. felinæ* subaffinis.

42. **Lepiota mauritiana** P. Henn. in Voeltzkow, Reise Ostafrika III 69 (1908) pag. 27, tab. II, fig. 27. — Pileo membranaceo, ovoideo-campanulato, obtuso-umbonato, radiatim sulcato, cinereo, umbone brunneo squamuloso, margine tenuiter plicato fissoque, c. 16-22 mm. diam.; stipite subfistuloso, tereti, æquali, pallido, levi glabroque, basi vix incrassato; annulo membranaceo, albido; lamellis liberis, confertis, ventricosis, pallidis; sporis subovoideis, 1-guttulatis, hyalino-subcarnescentibus, 9-12 \times 6-7.

Hab. ad terram, ins. Mauritius Africae. — *Lepiota denudatæ* proxima.

43. **Lepiota maculans** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXII (1905) 70 p. 77. — Pileo tenui, convexo, subumbonato, sicco, minute et dense squamuloso, flavo-rubro, centro obscuriori; lamellis latis, subdistantibus, liberis, albis, ad rubrum v. cinnamomeum nutantibus; stipite æquali, molli, floccoso v. fibrilloso, cavo, albido v. flavido; annulo tenui evanido; sporis ellipsoideis, uninucleatis, utrinque acutatis, 8-12 \times 5-6.

Hab. prope St. Louis Mo. Amer. bor. (N. M. GLATFELTER). — Pileus 1,5-2 cm. latus; stipes circ. 5 cm. longus et 2-3 mm cr.

44. **Lepiota geniculispora** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 372. — 71 Pileo 15 mm. lato, convexo-subexpanso, subumbonato, brunneo, sericeo, squamulis adpressis ornato; lamellis albis, ventricosis, siccitate brunnescentibus; basidiis 4-sporis; sporis 12-15 \times 5-6, subellipsoideis, geniculatis; stipite 2,5 mm. cr., pallide brunneo, floccoso-squamoso.

Hab. ad terram in silvis, Ithaca N. Y. Amer. bor. (C. J. HUMPHREY). — Statura 4-5 cm. alta.

45. **Lepiota candida** Morg., Journ. of Mycol. XII (1906) p. 202. — 72 Pileo carnosio, ex ovoideo convexo et explanato, subumbonato, carne tenui, alba; cute radiatim fibrillosa, levi, candida, stratu viscoso tenuissimo tecta, primum continua, demum in squamulas minutas

disrupta; stipite longo, supra angustato, basi clavato, fistuloso, fibrilloso-argenteo v. omnino levi, candido; annulo tenui, membranaceo, persistenti; lamellis angustis, confertis, liberis et subremotis, candidis; sporis ellipsoideo-oblongis, oblique apiculatis, 5-7 \times 3-4.

Hab. ad terram inter folia dejecta, Preston, Ohio Amer. bor. — Pileus 1-3 cm. diam.; stipes 5-7 cm. longus, basi 5-6 mm. cr., apice 2-3 mm.

46. **Lepiota Guegueni** Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 1081. — *Lepiota Boudieri* Guéguen, Bull. Soc. Myc. Fr. XXIV (1908) p. 127 cum icone, non Bres. — Syll. V, p. 38. — Tota sulphurea, solitaria aut subcæspitosa, marcescens; pileo margine tenuissime membranaceo, centro debiliter carnosio, primum ovoideo, dein expanso-subumbonato, margine inflexo, 18 mm. diam., usque ad carnem striato-plicato, articulis fugacissimis sub microscopio sphæroideis 20 μ . diam. pedicellatis velato; stipite gracili, erecto, 30 mm. longo, glabro, infra 1,2-1,5 mm., basi pistillato 3 mm. diam., non cavo sed laxe fibrilloso; annulo tenuissime membranaceo, persistente; lamellis confertis, æqualibus, nunquam ventricosis, rectis, acie cystidibus irregulariter clavulatis 25 \times 10 sparse congregatis denticulatis, a stipite usque ad 1 mm. remotis, sine collario attenuatis; basidiis ellipsoideis aut doliiformibus, 12-14 \times 6-7, duobus sterigmatibus divergentibus 6 μ . long. coronatis; sporis amygdaliformi-ovoideis, maturatione uni- aut bi-ocellatis, 5-6 \times 3

Hab. in calidariis Scholæ pharmaceuticæ Parisiensis.

47. **Lepiota permixta** Barla — Syll. V, p. 31. — var. **brasiliensis** Rick, Broteria VI (1907) p. 68. — A typo differt annulo griseo-brunneo et lamellis viridibus; sporis albis, ellipsoideis, 11-13 \times 7-8, obtuse apiculatis.

Hab. in silvis Rio Grande do Sul Brasiliæ.

48. **Lepiota Spegazzinii** Sacc. et Trott. Ita dicatur *L. cinerescens* Speg. (1899) — Syll. XVI, p. 4 — non Quél. (1893). *sed Quél. = L. holosericea* Fr. H

49. **Lepiota hesperidea** Risso, Flore de Nice, pag. 576, cum tabula. — In agro Nicaënsi. Species omnino dubia. V, 42

ARMILLARIA (Fr.) Quél. — Syll. V p. 73, IX p. 11, XI p. 7, XIV p. 70, XVI p. 17.

1. **Armillaria subimperialis** (Britzelm.) Sacc. — Syll. XI, p. 7. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 4. — Pileo 17 cm. lato, hemisphærico, plano v. medio depresso, aliquando profunde depresso, flavo, rubido-flavo v. brunneo, veli fragmentis albis ob-

ducto; stipite 18 cm. alto, 6 cm. cr., albido, sæpe flavido-squamuloso, annulo duplici prædito; lamellis 15 mm. latis, subconfertis, decurrentibus, albis, quandoque brunneo-marginatis, crassis; carne alba, odore farinaceo; massa sporarum alba; sporis 12-14 \times 5-6, breviter ellipsoideis.

Hab. cæspitosa in silvis Salisburgiæ, Algoviæ et Friburgiæ.

2. **Armillaria nauseosa** A. Blytt, Norg. Hymen. in Vid. Selsk. Skrift. 78 (1904) n. 6, pag. 22. — Pileo pallido, fusco-fibrilloso, lento, margine lacerato, 15 cm. lato; lamellis crassis, albis, dein flavo-maculatis, profunde emarginatis, antice angustioribus; stipite fusco, deorsum lacero-fibrilloso, sursum albo-farinoso, 14 cm. longo, annulo obliquo; odore nauseoso.

Hab. in pinetis Norvegiæ. — *Arm. focali* affinis.

3. **Armillaria Bresadolæ** Rick, Broteria VI (1907) pag. 71, tab. IV, 79 fig. 2. — Pileo primitus hemisphærico dein expanso, crassissimo, maximo, 13 cm. lato, 5 cm. cr., duro compacto, griseo-albo, velutino, demum avellaneo-murino, jam primitus in verrucas innatas, irregulares, obtusas, magnas, profunde diffracto; margine involuto, albo-velutino; carne alba, compacta, cum stipite cohærente; lamellis densissimis, inæqualibus, versus stipitem ventricose angustatis, liberis a stipite, albo-roseis, $\frac{2}{3}$ cm. latis; stipite solido, curto, 3-6 cm. alto, 4 cm. lato, firmo, carnosocartilagineo, non bulboso, veli reliquiis albis, annulatim pluries cincto, supra albu-pruinoso, ceterum fuligineo-luteo; sporis albis, ellipsoideis, 6-7 μ . long., 4 $\frac{1}{2}$ -5 μ . latis; sapore miti.

Hab. ad terram, Rio Grande do Sul, Brasiliæ. — Fungus exsiccando nigrescit.

4. **Armillaria fracticia** (Britzelm.) Sacc. — Syll. XI, p. 7. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 4. — Pileo 12 cm. lato, glutinoso, e flavo rubro-brunneo, hemisphærico, sæpe centro late umbonato et umbone subumbilicato; stipite 11 cm. alto 1,2 cm. cr., basi nunc incrassato nunc attenuato, albido, annulo fibroso flavo-rubro v. brunneo prædito; lamellis 15 mm. latis, adnexis, confertis, albidis v. flavidis; carne albida vel flavido-rubida, fragili, odore farinaceo; massa sporarum alba; sporis sphæroideis, 4-5 μ . diam.

Hab. gregaria in silvis, Gennach prope Buchloe Bavariæ. — *Arm. robustæ* affinis.

5. **Armillaria subannulata** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXVI (1909) 81 p. 330. — Pileo carnosocartilagineo, convexo v. late convexo, subviscido, fi-

brilloso, alutaceo, in centro obscuriore ibique fibrillis rufo-brunneis ornato, margine levi, carne alba, odore saporeque farinaceis; lamellis confertis, adnexus, albis, aliquando acie brunnescentibus; stipite æquali, solido, subradicante, rufo-brunneo, ad apicem albo; velo crasso, molli, albo, evanescente; sporis ellipsoideis, 10-12 \times 8-9.

Hab. inter folia dejecta in quercetis, Claremont Californiæ (C. F. BAKER). — Pileus 10-11 cm. latus; stipes 9-15 cm. longus, 2-3 cm. crassus.

6. **Armillaria subdehiscens** (Britzelm.) Sacc. — Syll. XI, pag. 8. — 82
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 4. — Pileo 8 cm. lato, hemisphærico, centro sæpe umbonato v. depresso, margine revoluto, e flammeo rubro-brunneo, glutinoso, levi; stipite concolori 12 cm. alto, 1,8 cm. cr., basi crassiori v. etiam tenuiori, minute et crebre squamuloso, supra annulum albo; lamellis 1 cm. latis, confertis, ex albo rubro-brunneis, emarginatis; carne ex albo flavo-rubra, odore farinaceo; massa sporarum alba; sporis 6 \times 4-5, breviter ellipsoideis, hyalinis, grosse uniguttulatis.

Hab. in silvis frondosis Salisburgiæ, Algoviciæ et Juræ. — *Arm. dehiscenti* affinis.

7. **Armillaria fuscipes** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya v. IV, 83
 Pt. V (1909) p. 299 et Circul. Roy. Gard. Ceyl. V (1910) tab. X. — Pileo 6 cm. c. lato, primum late convexo dein plano, margine recurvato, centro obtuse umbonato et zona depressa circumdato, sæpe umbilicato, medio brunneo v. flavo-brunneo, extus pallide brunneo, medietate exteriori in album vergente; centro corrugato; medietate centrali verrucis minutis conspersa, ceterum glabra; margine striato; carne tenui, alba, fracta ad colorem brunneum vergente; stipite 10 cm. c. longo, basi plerumque ascendente, 9 mm. cr., sursum attenuato et apice 5 mm. c. cr., nigro-brunneo, floccis griseis vestito, ad annulum pallido et longitudinaliter fibrilloso, supra annulum longitudinaliter striato et rubido, solido, extus obscure brunneo intus brunneo-albo; annulo prope apicem, amplo, satis crasso et floccoso; lamellis albis, parum confertis, angustis, 3-4 mm. lat., decurrentibus, antice attenuatis; sporis albis, ovoideis v. subglobosis, æqualibus, 6-8 \times 5-7.

Hab. gregaria v. cæspitosa in radicibus Acaciæ decurrentis, Uda Pussellawa, Ceylon. — Rhizomorphæ 2-3 mm. diam., primum rubidæ dein nigræ.

8. **Armillaria albo-lanaripes** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 54. — 84
 Gregaria; pileo e convexo expanso, glabro, umbonato, udo vi-

scoso, margine subrepando, flavo-brunneo, 5-6 cm. lato; lamellis adnexo-sinuatis, albidis, demum sordide flavidis; sporis hyalinis, ellipsoideis, glabris, 6-9 \times 4-5; stipite albo, ab annulo ad basim floccoso-lanoso, supra annulum glabro, intus cavo, 6-8 cm. alto, 8-10 mm. cr.

Hab. inter folia ad terram in silvis mixtis, Corvallis Oregon Amer. bor.

9. **Armillaria ventricosa** (Peck) Peck, Bull. Torr. Bot. Club XXXIV 85 (1907) p. 104. — Ita vocandus est *Lentinus ventricosus* Peck. — Syll. XIV p. 28. — teste ipso auctore.
10. **Armillaria macrorrhiza** (Lasch) Jacob, Verh. Bot. Ver. Brandenb. 86 XXXVII (1895) p. LXI. — Ita vocandum est *Tricholoma macrorrhizum* (Lasch) Fr. — Syll. V, p. 105 — teste Jacob. l. c.

TRICHOLOMA Fr. (Quél.) — Syll. V p. 87, IX p. 13, XI p. 8, XIV p. 71, XVI p. 20, XVII p. 9.

1. **Tricholoma gigantulum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 12. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 12. — Pileo 20 cm. lato, albo, fibroso-tomentoso, griseo-squamuloso, campanulato, demum convexo-applanato, centro late umbonato; stipite 16 cm. longo, 6 cm. cr., basi incrassato, albo, basi rubido vel brunneo; lamellis 20 mm. latis, albis, subconfertis, rotundatis; carne alba, odore nullo; massa sporarum alba; sporis 8-10 \times 6.

Hab. in silvis Algoviæ et Friburgiæ. — *Trich. Columbettae* affine.

2. **Tricholoma transforme** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 12. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 9. — Pileo 15 cm. lato, convexo, sæpe late umbonato, flavo-brunneo-griseo, centro fibrilloso-squamuloso v. vix fibrilloso; stipite 9 cm. longo, incrassato, supra 7 cm. lato, basi angustato, albido, basi brunneolo; lamellis 10 mm. lat., crassiusculis, emarginatis v. rotundatis, angustis, sæpe venosis et undulatis, albidis; carne alba, trita nigricante, parca sed grate olente; massa sporarum alba; sporis 8 \times 6, 3- vel 4-angulosis.

Hab. in silvis fagineis, Teisenberg Salisburgiæ. — *Trich. deliberto* affine.

3. **Tricholoma horribile** Rea, Trans. Brit. Mycol. Soc. II (1905) p. 94, 89 tab. 7. — Pileo carnosio, 10-12 cm. lato, convexo, dein expanso, dense squamuloso, squamulis obscure brunneis, demum præcipue ad centrum squarroso, maturo rubescenti-brunneo margine tenui

lamellas excedente; stipite 8-9 cm. longo, 2 cm. cr., basi incrassato, albo, cavo, levi; carne tenui, alba dein rubescenti fusco-maculata, maculis linearibus, interruptis; lamellis emarginatis, 2 cm. latis, confertis, margine inæquali, albidis, dein ætate cinnamomeis; sporis albis, globosis, 5 μ . diam.

Hab. ad terram, Swarraton Hants Britannicæ (W. L. W. EYRE). 90

4. **Tricholoma subalpinum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI p. 12. — Britzelmayr, Revis. Hymen. I (1898) p. 7. — Pileo 12 cm. lato, non hygrophano, convexo-depresso, late umbonato, ex albido flavido-ochraceo, opaco, epidermide tenui, levi, facile transverse rimosa; stipite 9 cm. long. 1,5 cm. æqualiter crasso, basi subincrassato, albo, fibroso, carnosio; lamellis 10 mm. latis, confertis, mollibus, albis, emarginatis; carne alba v. albo-flavida, odore grato florum; massa sporarum alba; sporis 10-12 \approx 4-5, breviter ellipsoideis.

Hab. in silvis Algovicæ et Friburgicæ. — *Trich. strictipedi* affine.

5. **Tricholoma candidum** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. 91
Skr. (1904) n. 6, p. 25. — Album; pileo plano, squamuloso, usque ad 12 cm. lato; lamellis confertis, leviter emarginatis, antice angustioribus; stipite solido, 9 cm. longo, 2 cm. crasso; sapore miti odore nullo.

Hab. in pinetis regionis subalpinæ Norvegiæ. — *Trich. terreo* affine.

6. **Tricholoma adscriptum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 11. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 9. — Pileo 11 cm. lato, conoideo, campanulato, dein plano, umbonato v. etiam depresso, pallide flavo-brunneo, sublevi; stipite 10 cm. long. 1,5 cm. cr., basi incrassato, carnosio-fibroso, albido vel plerumque ad basim brunneo; lamellis 10 mm. latis, subconfertis, etiam furcatis et venosis, ex albo brunneis, emarginatis et sæpe subdecurrentibus; carne et lamellis contusis nigricantibus, odore tenui farinaceo; massa sporarum alba; sporis 10-11 \approx 6, rhomboideis.

Hab. in silvis Salisburgicæ, Algovicæ, Friburgicæ. — *Trich. deliberato* affine.

7. **Tricholoma Allescheri** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 12. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 6. — Pileo 12 cm. lato, conoideo v. hemisphærico, demum applanato, albo v. albido, leniter rubro-carneo v. flavido, tenui, floccoso-fibroso, fere levi; stipite 9 cm. long., 3 cm. cr., farcto, ad basim plerumque attenuato, pileo concolori, tenui floccoso-fibroso; lamellis 8 mm. latis, confertis, albis, aquose albis, pallide flavido-albis, rotundatis; carne alba,

serius odore farinaceo prædita; massa sporarum alba; sporis 6 \approx 3-4, breviter ellipsoideis.

Hab. in silvis et turfosis Bavaricæ. — *Trich. albello* affine.

8. **Tricholoma subluteum** Peck, Rep. Stat. Bot. 1903 (ed. 1904) p. 21, 94
t. O, f. 26-29. — Pileo late campanulato dein convexo, umbonato, 5-10 cm. cr., obscure fibrilloso, flavido, carne alba; lamellis confertis, emarginatis, adnexis, albis; stipite æquali v. supra leniter angustato, solido, fibrilloso, flavido, basi albo et acutato, intus albedo 7,5-10 cm. long., 8-16 mm. cr.; sporis globosis, 5-6 μ cr.

Hab. in silvis Coniferarum, Lake Pleasant Amer. bor. — *Tr. chrysentero* et *chrysenteroidi* affine.

9. **Tricholoma venenatum** Atkinson, Botan. Gazette XLVI (1908) 95
p. 461, cum icone 1 et 2. — Album, leviter sordide luteum, 4-8 cm. longum; pileo 4-7 cm. lato, convexo-expanso, subumbonato, squamulis minutis obducto; lamellis adnexis, late sinuatis, tactu sordide luteis; sporis hyalinis, glabris, ovatis vel subellipsoideis, 5-7 \approx 3,5-5; stipite subnullo, 1-1,5 cm. cr., fibroso-striato, tactu sordide luteo.

Hab. prope Detroit, Mich. Amer. bor. (Doct. O. F. FISCHER).

10. **Tricholoma lautiusculum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 12. — 96
Britzelmayer, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 8. — Pileo 8 cm. lato, hygrophano, convexo, sæpe late ed depresso umbonato, albo-ochraceo, centro obscuriori; stipite 11 cm. long., 1 cm. cr., basi incrassato, demum angustiori, albo; lamellis 5 mm. lat., confertis, albis, rotundatis; carne alba, fere sericea, odore particulari nullo; massa sporarum alba; sporis 10 \approx 4, breviter ellipsoideis.

Hab. prope Rottachberg Algovicæ. — *Trich. subpulverulento* affine.

11. **Tricholoma immarcescens** (Britz.) Sacc. et Trott., Britzelmayer, 97
Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 9 sub *Clitocybe*. — Sacc. Syll. XI, p. 15. — Pileo 12 cm. lato, hygrophano, convexo, late depresso, levi, griseo, griseo-brunneo, margine pallidiore; stipite 7 cm. longo, 10 mm. cr., supra et infra incrassato, cavo, parietibus 2 mm. cr., brunneolo; lamellis 6 mm. latis, rotundatis v. emarginatis, albidis, brunneolis, confertissimis; massa sporarum alba; sporis globoso-elongatis, 6-8 \approx 4-5.

Hab. ad caudices Populi in Bavaria. — *Trich. urbo* affine.

12. **Tricholoma subimmundum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 12. — 98
Britzelmayer, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 5. — Pileo 10 cm. lato, hemisphærico, applanato, centro depresso v. umbonato, al-

bido, v. griseo-brunneo, sæpe indistincte fibroso, maculato, non glutinoso; stipite 6 cm. longo, 1-2 cm. cr., basi incrassato v. attenuato, albido-fibrilloso, basi griseo brunneo; lamellis 8 mm. latis e rotundato adnato-emarginatis, albidis, pallide brunneo-lilacinis; carne inodora, albido-brunnea, contusa nigricante; massa sporarum alba; sporis 6-7 \times 3, breviter ellipsoideis, non omnino hyalinis sed fere flavidulis.

Hab. in silvis Coniferarum, Turkheim Baviaræ. — *Trich. immundo* affine.

13. **Tricholoma gravabile** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 12. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 7. — Pileo 10 cm. lato, subconvexo, depresso umbonato, levi, pallide brunneo; stipite 7 cm. long., æqualiter 2 cm. cr., farcto, albido, brunneo-fibrilloso; lamellis 1,4 cm. latis, confertis, flavo-brunneis, emarginatis; carne brunnea, odore farinaceo; massa sporarum alba; sporis 8 \times 6-7, fere globosis, hyalinis, grosse uniguttulatis.

Hab. in silvis udis Baviaræ. — *Trich. duracino* affine.

14. **Tricholoma subæquale** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 12. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 7. — Album, leviter flavidulum; pileo 10 cm. lato, non hygrophano, subconvexo, vix umbonato; stipite 7 cm. long., 1,2 cm. cr., æquali, sed quandoque basi attenuato, farcto sed ætate subcavo; lamellis confertis, emarginatis v. rotundatis; carne odore et sapore nullo donata; massa sporarum albo-rubida v. albo-lilacina; sporis 5 \times 3, breviter ellipsoideis, uno apice acutatis.

Hab. gregarium ad terram in Bavaria.

15. **Tricholoma vepallidum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 13. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 5. — Pileo 9 cm. lato, subconvexo, centro umbonato, tenue carnosum, minute fibrilloso, albo, centro griseo-carneo; stipite 8 cm. long., conoideo, farcto, basi 2,5 cm., supra 1,5 cm. cr., albo, minute fibrilloso, fere sericeo; lamellis 15 mm. latis, confertis, albis, emarginatis; carne alba, odore tenui farinaceo; massa sporarum alba; sporis 8-10 \times 5-6, breviter ellipsoideis, uno apice leniter acutatis.

Hab. in silvis Algoviarum. — *Trich. sculpturato* affine.

16. **Tricholoma luridatum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 12. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 5. — Pileo 9 cm. lato, late conoideo vel etiam umbonato, subfibrilloso-squamoso, griseo-albo, margine subaurato; stipite 7 cm. long., 2 cm. cr., basi parum attenuato, albido, basi sordide flavo; lamellis 12 mm. latis,

subconfertis, ex adnexo emarginatis, griseis, firmis; carne alba v. grisea, odore farinaceo; massa sporarum alba; sporis 8-10 \approx 6, breviter ellipsoideis uniguttulatis.

Hab. in silvis Coniferarum, Oberstausen Algovia. — *Tr. lurido* affine.

17. **Tricholoma mollicellum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 13. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 8. — Pileo 7,5 cm. lato, subconvexo et umbonato, flavo-ochraceo v. alutaceo; stipite 8 cm. long., 8 mm. cr., basi subnodoso, albo, albo-brunneo striato; lamellis 5 mm. latis, albis, confertis, gracilibus et mollibus, emarginato-adnatis; carne aquose alba, odore et sapore nullo; massa sporarum alba; sporis 8 \approx 4, hyalinis, breviter ellipsoideis.

Hab. in silvis Bavarica. — *Trich. pulverulento* affine.

18. **Tricholoma luteolospermum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 13. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 8. — Pileo 8 cm. lato, convexo, centro depresso v. depresso umbonato, levi, brunneo, obscure rubro-brunneo et subgriseolo; subnitido; stipite 8 cm. long., 1 cm. cr., basi incrassato, supra pallidiori, rubido-brunneo, basi nigro-brunneo; lamellis 8 mm. latis, subconfertis v. confertis, albis, albidis v. brunneo-albis, emarginatis, fere decurrentibus; carne brunnea, basi stipitis nigro-brunnea; massa sporarum albo-flavida; sporis albidis v. flavidis, e granuloso asperulis, 8 \approx 4-6, breviter ellipsoideis, uno apice acutatis.

Hab. in silvis Bavarica. — *Trich. panæolo* affine.

19. **Tricholoma sulphurescens** Bres. Ann. Mycol. III (1905) p. 159, *Gyrophila resplendens* Qué. Flore Myc. Fr. pag. 287! vix Fr. — Pileo carnosio, e convexo plano, sericello, dein glabro, sicco, alutaceo-pallido, albescente, maculis subochraceis, 5-8 cm. lato, margine in vetustis sulcato; lamellis confertis, arcuatis, albis, postice rotundato-adnatis, fere liberis; stipite valido, subæquali, basi subradicato, albido, apice sericeo, deorsum fulvo-fuscidulo, punctato-squamuloso, tactu, præcipue basi, sulphurescente, 6-8 cm. longo, 1 $\frac{1}{2}$ -2 cm. crasso; carne alba, compacta, fracta sulphurescente, odore foetido, exacte ut in *Tricholomate sulphureo*, sapore miti, dein leviter piperato; basidiis clavatis, 30-35 \approx 8-9; sporis hyalinis, subglobosis, 5-6 \approx 4 $\frac{1}{2}$ -5, crasse apiculatis.

Hab. in silvis mixtis « Sopramonte » prope Trento, autumnio, rarissime.

20. **Tricholoma luteo-maculans** Atkins, Ann. Mycol. VII (1909) p. 376. — Album, demum sordide flavum, 4-5 cm. altum; pileo

et lamellis tactu flavescentibus; pileo 5-7 cm. lato, convexo, expanso, sæpe margine sulcato; lamellis emarginatis, albis, demum sordidis; basidiis 4-sporis; sporis ovatis, subglobosis, levibus, granulosis, 4-5 \approx 3,5-4,5; stipite 1-1,5 cm. cr., ad basim incrassato, albo, demum leviter flavo, squamuloso-floccoso.

Hab. ad terram inter folia dejecta, Enfield Gorge, Ithaca N. Y. (ATKINSON et REDDICK), Chapel Hill N. C. (W. C. COKER) Americæ borealis.

21. **Tricholoma megaphyllum** Boud. Ic. mycol. I, t. 28 (Ser. VI, 107 p. 19, n. 577). — Medium, 6-8 cm. alt., totidem latum, fuliginosum; lamellis latissimis, cinerescentibus glaucis; pileo glabro, subhygrophano, obscure umbonato; stipite cinereo-brunneo, superne pallidiore et pube brevi tecto, inferne obscuriore, fibrilloso; lamellis late emarginatis, medio latissimis, ad marginem attenuatis; carne cinereo-fusca, uda fuliginosa; sporis albis oblongo-ovoideis, intus guttulosus, 10-12 \approx 5-6; basidiis 4-sporis, clavatis, 40-45 \approx 10-12; cystidiis elongato-fusoideis, hyalinis, cuspidatis apiceque massa grumosa conica sæpius tectis, 50-70 \approx 8-12.

Hab. ad terram muscosam, Doubs Galliæ (GROSJEAN).

22. **Tricholoma subrancidum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 12. — 108 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 7. — Pileo, lamellis et stipite brunneis, griseo-brunneis, centro obscuriore; pileo 7 cm. lato, tenue carnosum, irregulariter convexo-applanato, opaco; stipite 5 cm. long., 8 mm. cr., farcto, basi sæpe attenuato; lamellis 7 mm. latis, confertis, adnexis, emarginatis vel rotundatis; carne brunnea, odore farinaceo; massa sporarum alba; sporis 10 \approx 4-5, breviter ellipsoideis.

Hab. gregarium in silvis prope Augsburg Baviariæ. — *Tr. graveolenti* affine.

23. **Tricholoma tenuisporum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 12. — 109 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 6. — Pileo 7 cm. lato, subconvexo, sæpe centro depresso, flavo-brunneo, margine plerumque farinaceo v. furfuraceo et albo; stipite 5 cm. long., 7 mm. cr., æquali, basi angustiori, farcto, supra albido, infra griseo-brunneo; lamellis 5 mm. latis, confertis, sordide albis, e flavido ochraceis v. griseo-brunneis, adnatis emarginatis v. rotundatis; massa sporarum alba; sporis 10-12 \approx 4-5, breviter ellipsoideis, apice attenuatis sed non acutatis, uniguttulatis.

Hab. in silvis Coniferarum prope Augsburg Baviariæ. — *Tr. cerino* affine.

24. **Tricholoma cuneiforme** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 12. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 6. — Pileo 7 cm. lato, convexo, dein applanato, sæpe centro plus minusve depresso, albido, centro flavo-brunneo; stipite 5 cm. long., cuneiformi, supra 2 cm. cr., albido, basi brunneo-flavo; lamellis 4 mm. latis, albis, emarginato-decurrentibus; carne alba, odore aniseo; massa sporarum alba, colore rubro leniter suffusa; sporis 6-8 \times 4, breviter ellipsoideis.

Hab. in silvis prope Augsburg Baviariæ. — *Trich. inamæno* affine.

25. ? **Tricholoma crucigerum** (St. Amand) Sacc. et Trott. *Agaricus crucigerus* St. Amand, Flora agenaise, Agen (1821) pag. 577. — Pileo ambitu subrotundo, tenui, 3-4 cm. lato, medio umbonato, umbone centro umbilicato, flavo-rufo, impressione cruciata pallide flava signato; carne firma, sicca, flavida; lamellis inæqualibus, latis, flavo-fuscis; stipite sursum incrassato, sæpe flexuoso, obscure flavo-rufo.

Hab. ad terram in silva prope Agen Galliæ. — Totus fungus 12-14 cm. alt. An status abnormis alius speciei?

26. **Tricholoma selectum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI p. 11. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 9. — Fragile; pileo 6 cm. lato, brunneo, levi, hemisphærico v. applanato v. umbonato et expanso, quandoque depresso; stipite concolori, 7 cm. long., 8 mm. cr., basi incrassato v. sæpe etiam attenuato; lamellis 6 mm. latis, albis, remotis, emarginatis et subdecurrentibus; carne alba, griseo-brunnea, fere spongiosa, odore particulari nullo; massa sporarum alba; sporis 10-14 \times 5-7, rhomboideis.

Hab. in silvis Salisburgiæ, Algoviæ. — *Tricholoma deliberato* affine.

27. **Tricholoma tenuiceps** Cooke et Masee, Br. Fungus-Flora III, p. 198, *Agaricus tenuiceps* C. et M. in Cke. Ill. tab. 1166. — Pileo convexo obtuso, subinde subgibboso, tenuissimo, centro tantum carnosulo, 5-8 cm. lato, sicco granuloso, opaco, fuligineo-brunneo; lamellis adnexis et postice rotundatis, 4-5 mm. lat, antice tenuatis, albis; stipite 5-8 cm. alto, 2-2,5 cm. cr., solido, firmo, sursum paullo tenuiore, ochraceo-albo, superficie minute granuloso, basi abrupte in radicem longam chordiformem abeunte; sporis subglobosis, 6-7 μ . diam.

Hab. in graminosis, sub arboribus in Britannia. — Solitarium v. 2-3 individua in cespitem juncta.

28. **Tricholoma ignorabile** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 12. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 10. — Pileo 6 cm. lato, effuso, fere applanato, centro depresso, opaco, brunneo, levi; stipite 4 cm. long., 1 cm. cr., basi angustato, supra albido, basi brunneo-nigrescenti; lamellis 10 mm. latis, remotis, albo-brunneolis, adnexus, rotundatis v. emarginatis; carne albida, griseo-brunnea, odore tenui farinaceo; massa sporarum alba; sporis $10 \approx 6-8$, breviter ellipsoideis, uniguttulatis.

Hab. ad terram in silvis Bavaricæ. — *Tricholomati pædido* videtur affine.

29. **Tricholoma illecebrosus** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 13. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 4. — Pileo 6 cm. lato, subdepresso, centro umbonato, tenui-carnoso, glutinoso, subfibroso, albido, centro obscure olivaceo; stipite 6 cm. long., 1 cm. cr., basi incrassato, ex albido subflavo-brunneo; lamellis 10 mm. latis, emarginatis, confertis, albis; carne albida v. flavo-brunneola, odore et sapore nullo; massa sporarum alba; sporis $8-9 \approx 6-7$, breviter ellipsoideis, aquosis uniguttulatis.

Hab. ad terram muscosam in silvis Salisburgicæ. — *Trich. coryphæo* affine.

30. **Tricholoma montanum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 13. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 7. — Pileo 6 cm. lato, convexo, centro depresso, tenui-carnoso, levi, vix fibrilloso, sordide brunneo-flavo, obscurius maculato; stipite 3,5 cm. long., 1,4 cm. cr., basi multo angustiore, albido, basi nigro-brunneo, cavo, parietibus 2 mm. cr.; lamellis 8 mm. latis, subcompactis, subconfertis, albidis, emarginatis; carne brunneola vel brunnea, odore peculiari nullo; massa sporarum alba; sporis $8 \approx 4-5$, irregulariter ovoideis, fere rhomboideis.

Hab. ad terram prope Hindelang Algovicæ.

31. **Tricholoma saponaceum** Fr. — Syll. V, p. 106. — var. **incon-** 117
suetum Roll., Bull. Soc. Mycol. Fr. 1904, p. 196, t. IX, f. 1. — A typo præcipue differt odore et sapore nullo.

Hab. in insulis Balearibus.

32. **Tricholoma luteo-citrinum** Rea, Trans. Brit. Myc. Soc. v. III 118
1908 (edit. 1909) p. 125, t. VIII. — Pileo 2-7 cm. lato, carnosus, e campanulato expanso-gibbosus, centro luteo, margine involuto citrino, floccosus, mox squamulis minutis obtecto, dein maturo in fibrillas revolutas secedente; stipite 6-7 cm. longo, 1-2 cm. crasso, solido, albido, flavo-maculato; carne albida, sub cute pilei citrina

et ad basim stipitis lutea, odore nullo, sapore miti; lamellis 4-5 mm. latis ex albido stramineis, sinuato-adnatis, subconfertis; sporis albis, ellipsoideis, $6 \approx 4$, hyalinis, 1-guttulatis, levibus.

Hab. in silva laricina Dunballoch Inverness Britanniae (A. COWAN). — *Trich. acerbo* affine, a quo distinguitur pileo floccoso, sapore non amaro etc.

33. **Tricholoma indepremsum** (Britz.) Sacc. — Syll XI, pag. 11. — 119
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p 10. — Pileo 5 cm. lato, conico, centro obtuso, tenui-carnoso, centro brunneo, rubro-brunneo, margine albido; stipite 7 cm. longo, æqualiter 15 mm. cr., albo, basi rubro-lateritio; lamellis 8 mm. latis, remotis vel remotissimis, albis, profunde et acute emarginatis; carne alba, odore nullo, sapore tenui; massa sporarum alba; sporis 6-8 \approx 4-5, breviter ellipsoideis, subasperulis.

Hab. prope Gessertshausen Bavariae. — *Tr. rasili* affine.

34. **Tricholoma densilamellatum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 13. — 120
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 8. — Pileo 4,5 cm. lato, subconvexo, centro depresso v. umbonato, sublevi, griseo-alutaceo; stipite 5 cm. long., æqualiter 7 mm., cr., albo, sæpe brunnescenti; lamellis 6 mm. latis, confertis, rotundatis v. emarginato-adnatis, albis; massa sporarum alba; sporis 8 \approx 5-6, breviter ellipsoideis, uno apice sæpe acutatis.

Hab. in silvis Coniferarum Bavariae. — *Tr. subpulverulento* affine.

35. **Tricholoma enudatum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 13. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 5. — 121
 Pileo 4 cm. lato, levi, subnitido, flavo-brunneo, hemisphærico; stipite 4 cm. long., 7 mm. crasso, basi crassiori, albo; lamellis 4 mm. latis, confertis, albidis, fere liberis, rotundatis; carne alba, trita brunnescenti et nigricanti, sapore et odore farinaceis; massa sporarum alba; sporis breviter ellipsoideis 8 \approx 6, uniguttulatis, aquosis.

Hab. in silvaticis Bavariae. — *Trich. immundo* affine.

36. **Tricholoma brasiliense** Rick, Broteria VI (1907) p. 72, tab. IX, 122
 fig. 7. — Pileo solido, expanso, leviter depresso, atro-violaceo, circa marginem cinereo-viridi, glabro-laccato, margine membranaceo, involuto, 4 cm. lato, $\frac{1}{2}$ cm. cr; carne fuligineo-rubente; stipite in pileum leviter dilatato, fuligineo-castaneo, versus pileum griseo-consperso, versus pedem velutino-chlorino, 5 cm. alto, 1 cm. crasso, carnosio; lamellis late flavo-aurantiacis, adproximatis inter se, angustis, solidis, inæqualibus, versus marginem dichoto-

mis, versus stipitem denticulo decurrentibus; sporis albis, ovalibus, $5 \approx 4$; odore farinaceo.

Hab. ad terram in silvis, Rio Grande do Sul Brasilæ. — Species polychroa, a ceteris cognitis diversa videtur, colore *Tr. Boudieri* similior et cum *Trich. nobili* quoque satis convenit. Stipes exsiccando rubescit et mycelio chlorino versus pedem tegitur, lamellæ quoque exsiccando rubescunt.

37. **Tricholoma Henningsii** (Eichelb.) Sacc. et Trott. *Agaricus Henningsii* Eichelb. Verh. Naturw. Ver. Hamburg, 3. Folge, XIV (1906) p. 84. — Pileo plano, membranaceo-carnoso; carne albida, brunneo-grisea, centro crassiusculo, margine sulcato-lacinulato, 4 cm. lato; stipite 4 cm. alto, 3 mm. cr., corticato, viscoso, canali-
culato, supra sulcato, infra fibris radiciformibus albidis prædito, squamulis pileo concoloribus omnino tecto; lamellis laxis, nonnullis brevioribus immixtis, sinuatis, anastomosantibus, leviter marginatis et breviter decurrentibus; hymenio cystidiis destituto; sterigmatibus tenuibus, patentibus 4 μ . long.; sporis albis, hyalinis, ovoideis, $5 \approx 3$.

Hab. in ramulis dejectis prope Amani Africæ bor.

38. **Tricholoma unifactum** Peck, New York St. Mus. Bull. n. 105 (1906) p. 36, tab. 94, fig. 1-5. — Pileis tenuibus carnosus, convexis sæpe irregularibus, quandoque concrecendo excentricis, albidis, 2,5-5 cm. latis; carne albida, sapore dulci; lamellis tenuibus, angustis, confertis, postice rotundatis, leniter adnexis, quandoque basi furcatis, albis; stipite æquali v. basi incrassato, solido, fibroso, albo v. pluribus basi concrecendo massam carnosam efficientibus, 2,5-5 cm. long., 6,5-12 mm. cr.; sporis albis, subglobosis, 3,5-5 μ . crassis.

Hab. ad terram sub Abiete canadensi, Horicon Warren Co. Amer. bor. — Species carnosus et edulis.

39. **Tricholoma subcinereum** Peck, New York St. Mus. Bull. 131 (1909) p. 27. — Pileo tenui, plano v. centro depresso, subglabro, albido, pallido-cinereo v. griseo-brunneo, aliquando in centro saturatiore et leviter pruinoso; carne alba, odore pungente, sapore leviter seroque acri; lamellis tenuibus, confertis, leviter sinuatis, albis; stipite centrali v. excentrico, æquali v. basi leviter incrassato, solido, sericeo-fibrilloso, albido v. extus brunneo, intus brunnescente; sporis latis, ellipsoideis, $8-9 \approx 6-7$.

Hab. ad ligna in cella vinaria, Pittsford, Monroe Co. Amer. bor. (F. S. BOUGHTON).

40. **Tricholoma hirtellum** Peck, New York State Mus. Bull. n. 116 126
(1907) p. 38, tab. 105, fig. 1-5. — Pileo carnosio-tenui, convexo, subumbonato, 2,5-3,5 cm. lato, sicco, piloso, pallide brunneo; carne alba, sapore dulci; lamellis tenuibus, angustis, confertis, leniter sinuatis, adnexas, acie minute floccosis, albo-flavidis v. pallidis; stipite angusto, æquali, farcto v. minute cavo, fibrilloso v. subsquamuloso, pileo concolori v. paullo pallidiori, 5-7,5 cm. long., 4-6 mm. cr.; sporis subglobosis, 6,5-7,5 \approx 5-6,5.

Hab. ad truncos Pini, Wading River, Suffolk co. Amer. bor.
— *Trich. albo-fimbriato* Trog proximum.

41. **Tricholoma suevicum** (Britz.) Sacc. Syll. XI, p. 13. — Brit- 127
zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 9. — Pileo 1 cm. lato, convexo, centro depresso; pileo et stipite brunneis v. flavo-brunneis; stipite supra pallidior, 20 mm. long., 2 mm. cr., farcto; lamellis 3 mm. latis, albis, subconfertis, emarginatis; carne alba odore nullo; massa sporarum alba; sporis 6-8 \approx 4-6, breviter ellipsoideis.

Hab. in silvis ad lignum putre, Bavaria. — *Tr. jurano* affine.

42. **Tricholoma cingulatum** (Fr.) Jacobasch, Verh. bot. Ver. Prov. 128
Brandenb. XXXIII (1890) p. 55. Ita vocanda esset *Armillaria cingulata* (Fr.) Quél. — Syll. V, p. 76 — et inter *Tricholoma terrestre* et *Tr. triste* inserenda, sec. Jacobasch l. c., sed ex iconibus Friesii et Bernardii annulus (etsi parvus et evanidus) non deest. Fries in *Linnaea* speciem tribuit Almfeltio, cujus nomen in sequentibus operibus omisit: Almfelt revera fuit tantum primus collector speciei, non auctor.

43. **Tricholoma purpureo-fuliginosum** Gill. Hymen. Franc. Pl. Suppl. 129
Pileo subcampanulato obtuso, serius convexo et subdepresso, margine tenui, regulari, plus minusve saturate purpureo-fuliginoso, ambitu pallidior, 6-7 cm. lato; lamellis longis, tenuibus, postice angustioribus, vix adhærentibus; stipite regulari, curto, farcto, fuligineo, levi; carne alba, firma.

Hab. inter folia Pini sp., raro, in Gallia.

44. **Tricholoma argyraceum** (Bull.) Gill. — Syll. V, p. 104. — var. 130
albatum Quél. in Assoc. franç. avanc. sc. (1889) p. 2, t. XV, f. 2 (extr.). — Album; pileo campanulato-convexo, 3-4 cm. lat, flexuoso, sericeo, nitide albo, dein lamellis que flavo-maculatis; carne tenui, fragili, hygrophana, alba, sapida, bitumen olente; lamellis latis, adnatis, albo-hyalinis, fissilibus; stipite fibroso-carnoso, deorsum tenuato, sericeo; sporis ovoideis, tenuiter aculeolatis, 5 μ . long.

Hab. ad semitas silvaticas, Nièvre Jura (Domina (DAULNOY).

45. **Tricholoma Salero** Barla, Fl. mycol. Alp. marit. pag. 44, t. 28, 131
f. 5-8. — Pileo carnosio, hemisphærico dein expanso, obtuso, levi,
udo viscoso, 4-12 cm. diam., sicco sericeo, rufo-brunneo v. casta-
neo, margine tenui undulato, sæpe fisso; lamellis latiusculis, emar-
ginato-adnatis, albis, demum pallide rubescentibus; stipite farcto,
cylindrico, subcurvo, 5-7 cm. long., 10-25 mm. cr., albo, sursum
squamuloso-fibrilloso, medio rubescente; carne alba, aere rubella;
odore oleum olivæ v. farinam revocante; sapore amarissimo.

Hab. ad terram in litore et montibus in agro Nicaeensi. —
Affine *Trich. ustali* et *Trich. albo-brunneo*. Ablutum et maceratum
edule fit.

CLITOCYBE (Fr.) Quél. — Syll. V p. 141, IX p. 18, XI p. 13, XIV
p. 74, XVI p. 23, XVII p. 11.

1. **Clitocybe turmaria** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 16. — Britzel- 132
mayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 12. — Pileo convexo, late
depresso, griseo-brunneo v. brunneo, 13 cm. lato; stipite 10 cm.
long., 3 cm. lato, sæpe basi angustato, albo v. albido, farcto vel
cavo; lamellis 2 cm. latis, subconfertis, decurrentibus, e flavo gri-
seo-brunneis; massa sporarum alba; sporis 6 \times 4,5, fere globosis.

Hab. gregatim in silvis prope Augsburg Bavariæ. — *Cl. ag-
gregatæ* affinis

2. **Clitocybe tumidosa** (Britzel.) Sacc. — Syll. XI, pag. 11 (*Tricho-* 133
loma). — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 11 (*Clit-
ocybe*). — Pileo 12 cm. lato, convexo v. late umbonato, brun-
neo, margine pallidiori, tenui-fibroso; stipite 13 cm. alto, 2 cm.
cr., basi incrassato, albo, brunneolo, carnosio, farcto; lamellis 6
mm. lat., subdecurrentibus, albis v. albidis, confertis; carne alba,
massa sporarum alba; sporis 5-6 \times 4-5, fere globosis.

Hab. in silvis et herbosis Salisburgiæ, Algovia, Bavariæ. —
Cl. fumosæ affinis.

3. **Clitocybe guttato-marmorata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 17. — 134
Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 13. — Pileo 12 cm.
diam., convexo, centro depresso; pileo stipite et carne opacis, pal-
lide ochraceis; pileo maculis obscurioribus udis prædito; stipite 8
cm. long., æqualiter 2,5 cm. cr., farcto; lamellis 8 mm. latis, con-
fertis, flavidis, crassis, flexuoso-venosis, decurrentibus; massa spo-
rarum alba; sporis 6-8 \times 4, elongatis, uniguttulatis.

Hab. in silvis fagineis Bavariæ. — *Cl. gilvæ* affinis.

4. **Clitocybe nobilis** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIV (1907) p. 97. — 135

Pileo carnosio, convexo, sæpe centro subdepresso, sicco, glabro, firmo, albo-cremeo, dein ætate vel arescendo fulvo vel brunneo, late umbonato et centro obscuriore, carne alba, sapore odoreque grato; lamellis tenuibus, confertis, decurrentibus, albidis; stipite solido, farcto v. indistincte cavo, supra angustato, parum bulboso, glabro, firmo, ætate v. arescendo albo vel albido-pallido v. brunneo et striato; sporis ellipsoideis, 7-8 μ . long., 4-5 μ . latis.

Hab. solitaria vel gregaria ad truncos et terram humosam prope lac. Ontario Amer. bor. (C. GUILLET). — Pileus 7-12 cm. latus; stipes 5-10 long., 6-8 mm. cr.

5. **Clitocybe albido-gilva** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 17. — Britz. 136

zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 10. — Pileo 10 cm. lato, plano-convexo, vix umbonato v. depresso, opaco, v. pallide flavido, maculis lilacinis rubro-roseolis prædito; stipite 8 cm. long., 1,5 cm. cr., sæpe basi crassiore, albido, supra minute furfuraceo-squarroso; lamellis 5 mm. latis, decurrentibus, subremotis, crassis, flavidis; carne alba rubido-maculata, odore nullo, sapore leniter amaro; massa sporarum alba; sporis 8-9 \approx 4-5, aquosis, uniguttulatis.

Hab. gregaria ad terram prope Teisenberg Salisburgiæ. — *Clitocybæ amaræ* affinis.

6. **Clitocybe Panizzii** Barla, Champ. Alp. maritimes, pag. 75, t. 61, 137

fig. 1-2. — Cæspitosa, basique connata; pileo convexo inæqualiter rotundato, dein umbilicato, depresso et infundibuliformi, plus minus excentrico, 7-10 cm. lat., albido-plumbeo, centro flocculis cotoneis albis consperso, tenuiter radiato et jove udo aspectu striato, margine tenui, levi, lobato-undulato, reflexo dein fisso; lamellis inæqualibus, tenuibus, antice angustioribus, longe striato-decurrentibus, ex albido pallido-subroseis; stipite 5-9 cm. longo, 5-10 mm. cr., farcto, subcylindrico, tenaci, flexuoso, albo, basi tenuato villosoque; carne tenui elastica, alba, inodora, fere inspida; sporis albis.

Hab. ad terram substantiis coriariis immixtam pr. S. Remo Liguriæ (F. PANIZZI). — Totus fungus 16-20 cm. altus.

7. **Clitocybe patuloides** Peck, 32 Rep. State Mus. (1879) p. 25 (*Aga-* 138

ricus), 54 Rep. (1900) tab. *E* (*Clitocybe*). — Pileo compacto, convexo v. explanato, glabro, cuticula subinde in squamulas minutas adpressas secedente, albido v. pallide flavo, margine incurvo; lamellis tenuibus, confertis, decurrentibus et reticulato-connexis;

stipite æquali, solido firmo, glabro, albido; sporis subglobosis v. late ellipsoideis 6,5-7,5 μ . long.; carne alba.

Hab. in silvaticis Brewerton Amer. bor. — Fungus 6-11 cm. alt.; pileus 3-10 cm. lat.; stipes 9-18 mm. cr. — Cl. Peck primo distinxit speciem, postea cum *Trichol. patulo* conjunxit, denique iterum merito separavit.

8. **Clitocybe atracta** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 16. — Britzelmayr, 139 Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 13. — Pileo fere infundibuliformi, 9 cm. lato; pilei et stipitis carne pallide flavo-rubida; stipite 10 cm. long., 1 cm. cr., basi subincrassato, vix cavo; lamellis 4 mm. latis, confluentibus, albis, subconfertis; carne odore tenui prædita; massa sporarum alba; sporis 8 \approx 4-5, breviter ellipsoideis, uno apice acutatis.

Hab. in silvis Algovix et Bavarix.

9. **Clitocybe situata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 17. — Britzelmayr, 140 Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 12. — Pileo crasso, convexo, centro depresso, 8 cm. lato, flavo-brunneo opaco, centro adpresse squamoso; stipite 9 cm. long., supra 2,5 cm., basi angustato, fibroso, squamuloso, flavo-brunneo; lamellis 12 mm. latis, breviter decurrentibus, griseo-brunneis, crassis, non confertis; carne grisea, odore farinaceo prædita.

Hab. in silvis Algovix. — *Clit. sinopicæ* affinis.

10. **Clitocybe cryptarum** (Letell.) Masee, Brit. Fungus-Flora II (1893) 141 p. 422; Niel, Bull. Soc. Amis Sc. nat. Rouen 1896, cum tabula, *Agaricus cryptarum* Letell. Champ. p. 92, f. 88. — Dense cæspitosa; pileo conico, adpresse floccoso, fulvo, brunneo-punctato; lamellis decurrentibus, angustis, arcuatis, albis; stipite albo, striatulo, virgato, sursum tenuato, plus minus compresso, anguste fistuloso; carne insipida, inodora.

Hab. in serragine lignea in cryptis et calidariis in Gallia et Britannia. — Fungus circ. 8 cm. alt.; pileus 6 cm. lat. et 2 cm. crassus.

11. **Clitocybe sphærospora** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXVI (1909) 142 p. 331. — Pileo carnosio, subplano, in maturitate centro depresso, glabro, lateritio, centro obscuriore; carne lenta, alba; lamellis subdistantibus, utrinque angustatis, decurrentibus, albis, interstitiis subvenosis; stipite æquali, subradicante, solido, albo; sporis globosis. 10-12 μ . latis.

Hab. in quercetis, Claremont Californix (C. F. BAKER). — Pileus 5,5-7 cm. latus; stipes 5-6,5 cm. longus, 1,5 cm. crassus.

12 **Clitocybe lepiphylla** Gill., Hymén. de France, Suppl., pag. 9. — 143

Pileo udo, convexo dein plano-depresso, sordide cinereo, unicolore, marginem versus tenuiter striato; lamellis pallidius cinereis, subalbis, adhærentibus, decurrentibus; stipite elastico, flexuoso, deorsum incrassato, cinereo, pruinoso, sursum pallidiore, longitudinaliter striato, striis albidis.

Hab. in collibus aridis, inter muscos et folia dejecta, quibus pulvere albo adhæret, in Gallia boreali.

13. **Clitocybe dulcidula** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 340, 144

Agaricus dulcidula Britz., Rev. Hymenomyc. I (1898) pag. 14, tab. 60, fig. 356. — Pileo hemisphærico, 8 cm. lato, centro parum impresso, griseo brunneo, hygrophano; stipite 4 cm. alto, 8 mm. cr., æquali, parum cavo, pariete 3 mm. cr.; lamellis 6 mm. lat., parum decurrentibus, subconfertis; carne *Lactarii glyciosmi* odore simili; sporis albo-hyalinis, 8×4 , rotundato-elongatis, illis *Cl. fritilliformis* valde similibus.

Hab. in silvis Coniferarum, Wöllenburg prope Augsburg Baviaræ.

14. **Clitocybe subgilva** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 15. — Brit- 145

zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 13. — Pileo convexo, subdepresso v. umbonato, 7 cm. lato, margine involuto, flavo v. brunneo-alutaceo, opaco; stipite 6 cm. long., æqualiter 2 cm. cr., albido v. flavido, farcto; lamellis 7 mm. latis, sordide brunneo-flavis, alutaceis, crassiusculis, subremotis, subdecurrentibus fere solum adnato-emarginatis; carne alba, odore parum ingrato, sed sapore miti; massa sporarum alba; sporis $8-10 \times 3-4$, breviter ellipsoideis.

Hab. in silvis Coniferarum Baviaræ. — *Clit. gilvæ* affinis.

15. **Clitocybe totmoda** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 16. — Brit- 146

zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 14. — Pileo ex convexo infundibuliformi, 6 cm. lato; pileo, stipite et carne rubido-brunneis; stipite 7 cm. long., 5 mm. lato, basi subincrassato, dein attenuato, subcavo, albo-fibrilloso; lamellis 5 mm. latis, decurrentibus, firmulis, albidis, flavo-brunneo-rubidis; carne ex albido-alutaceo brunneo-rubra, odore acute farinaceo; massa sporarum alba; sporis $8-10 \times 4$, elongatis.

Hab. ad terram muscosam Baviaræ. — *Cl. pruinosa* affinis.

16. **Clitocybe pallidispora** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 16. — Brit- 147

zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 13. — Pileo convexo, depresso, dein fere infundibuliformi, 6 cm. lato, levi, vix fibroso;

toto pallide ochraceo v. isabellino colorato; stipite 8 cm. longo, 5 mm. cr., basi radiciformi-attenuato et rhizoideo; lamellis 5 mm. latis, decurrentibus, confertis, transverse venosis; massa sporarum alba; sporis 5-6 \times 2-3, elongatis.

Hab. ad terram muscosam Bavariæ. — *Cl. expallenti* affinis.

17. **Clitocybe luridipes** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 16. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 11. — Pileo tenuiter carnoso, hemisphærico, 6 cm. lato, centro depresso, levi, albo; stipite 6 cm. long., æqualiter 5 mm. cr., fibroso, albo, basi sordide brunneo-griseo; lamellis 5 mm. latis, parum decurrentibus, albis, confertis; massa sporarum alba; sporis 6 \times 3, elongatis.

Hab. in silvis prope Türkheim Bavariæ. — *Cl. rivulosæ* affinis.

18. **Clitocybe luteo-rubescens** (Britz.) Sacc. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 15. — Syll. XI, p. 19. *Collybia*. — Rubro-flava, hygrophana; pileo 6 cm. lato, convexo, centro subdepresso; stipite 7 cm. longo, 4 mm. cr., basi subincrassato, vix cavo; lamellis 6 mm. latis, subdecurrentibus, emarginato-adnatis, subremotis; carne pallide rubro-flava, odore farinaceo; massa sporarum alba; sporis globoso-elongatis, hyalinis, 8 \times 4.

Hab. in silvaticis prope Teisenberg Algovix. — *Clitocybe albæ* affinis.

19. **Clitocybe confertifolia** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 338, *Agaricus confertifolius* Britz., Rev. Hymen. I (1898) p. 13, tab. 99, fig. 514. — Pileo infundibuliformi, brunneo, 6 cm. lato; stipite concolori, 8 cm. longo, 7 mm. cr., basi subincrassato, farcto; lamellis 6 mm. latis, confertis, decurrentibus, albido-brunneis; carne brunnea, subinodora; sporis albo-hyalinis, 12 \times 6, rotundato-elongatis.

Hab. ad terram in Bavaria. — *Cl. cyathiformi* affinis.

20. **Clitocybe glaucophylla** Boud. Ic. mycol. I, t. 63 (Ser. III, p. 27, n. 390). — Major, robusta, 6-7 cm. alta et lata; pileo nigricante, squamulis applanatis, minutis, albis præsertim in medio tecto; stipite crasso, plano, albido-glaucis, supra farinoso, inferne griseo, fibrilloso; lamellis adnato-decurrentibus, albido-glaucis, ad aciem pallidioribus; sporis ovoideis, intus nebulosis, 7-9 \times 4-5, albis,

Hab. ad terram in silva Ecouen Gallix.

21. **Clitocybe obscurata** Cooke, Trans. Brit. Mycol. Soc. v. II (1908) (ed. 1909) p. 109, t. V, f. C. — Pileo plano dein infundibuliformi, udo griseo-umbrino, levi, 5 cm. diam.; stipite basi leniter attenuato, pileo concolori, solido, levi v. leniter striato, 2,5-5 cm. long.;

lamellis decurrentibus, subdistantibus, albis; sporis subellipsoideis 3-4 μ . long.; odore farinaceo.

Hab. in herbosis, Edmond Castle, Carlisle Britanniae (Miss DECIMA GRAHAM). — *Clit. clavipedi* affinis, differt pileo infundibuliformi non conoideo, stipite brevioris etc.

22. **Clitocybe frustatoria** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 15. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 14. — Pileo subconvexo, centro breviter depresso, 5 cm. lato, flavo-brunneo; stipite 6 cm. longo, æqualiter 4 mm. cr., albo-brunneo, farcto; lamellis 5 mm. latis, sordide albis, griseo-brunneis, late decurrentibus, subconfertis; carne brunnea, odore nullo; massa sporarum alba; sporis 6 \times 4, breviter ellipsoideis.

Hab. ad terram in Bavaria. — *Cl. concavæ* affinis.

23. **Clitocybe planiuscula** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 351. — *Agaricus planiusculus* Britz., Rev. Hymenomyc. I (1898) p. 10, tab. 151, fig. 721. — Pileo ex alutaceo griseo, glabro, convexo, 6 cm. lato, centro umbonato v. leniter impresso; stipite 6 cm. alto, supra 1 cm. cr., basi usque ad 3 cm. incrassato, albido, brunneo, supra obscuriore; lamellis 5 mm. latis, decurrentibus, subconfertis, albidis v. albido-brunneis; carne albida, molli, subinodora; sporis albo-hyalinis 8-10 \times 4-5, rotundato-elongatis, utrinque acutatis.

Hab. in silvis Alpium Salisburgiæ, Algoviæ, Friburgiæ. — *Cl. clavipedi* affinis.

24. **Clitocybe vernifera** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 16. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 12. — Pileo convexo, e depresso infundibuliformi, 6 cm. lato; stipite et pileo albido flavo-rubro, opaco, sublevi, vix granuloso; stipite 80 mm. long., 10 mm. cr., basi incrassato, farcto; lamellis 5 mm. latis, longe decurrentibus, subconfertis, crassis, flavidis; carne stipitis intus aquosa, extus firma, sordide albida, odore tenui; massa sporarum alba; sporis 8 \times 4, breviter ellipsoideis, uno apice acutatis, fere conoideis.

Hab. in silvis Baviaræ. — *Cl. infundibuliformi* affinis.

25. **Clitocybe vicinalis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 16. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 14. — Fragilis; pileo plano-convexo, 5 cm. lato, centro parum depresso, minute fibrilloso, flavo-rubro-brunneo; margine pallidioris; stipite pileo concolore, 8 cm. long., supra 3 mm., basi 5 mm. cr., cavo; lamellis 6 mm. latis, vix decurrentibus, fere emarginatis, pallide flavo-brunneolis, subremotis; carne spongiosa, odore farinaceo; massa sporarum alba; sporis 6-7 \times 3-4, flavidis, elongatis.

Hab. in silvis Bavarix. — *Cl. pruinosæ* affinis.

26. **Clitocybe lentata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 16. — Brit- 157
zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 12. — Pileo flavo-mel-
leo, convexo, centro depresso, 5 cm. lato, margine striato; stipite
6 cm. long. fere æquali, 4 mm. cr., basi subincrassato, farcto, su-
pra pallidiore, basi brunneolo subpellucido; lamellis 5 mm. latis,
ex albido flavo-melleis, subconfertis, crassis, subdecurrentibus;
massa sporarum alba; sporis 8 × 4, breviter ellipsoideis.

Hab. in silvis Bavarix. — *Clit. lentiginosæ* affinis.

27. **Clitocybe odorabilis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 17. — Brit- 158
zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 12. — Pileo 5 cm. lato,
convexo, centro depresso, levi, sordide flavo-melleo; stipite 3,5
cm. long., 5 mm. cr., basi nunc incrassato nunc attenuato, brun-
neolo, cavo, parietibus 2 mm. cr.; lamellis 5 mm. latis, pallide
flavo-melleis rubricantibus, subconfertis, adnatis, subdecurrentibus;
carne odore farinoso; massa sporarum alba; sporis elongatis, 6-
7 × 3-4, uno apice acutatis.

Hab. in silvis Bavarix. — *Clit. lentiginosæ* affinis.

28. **Clitocybe incorporata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI p. 16. — Brit- 159
zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 14. — Pileo hemisphæ-
rico, 4,5 cm. lato, centro leniter umbonato vel depresso, albido-
brunneis; stipite 80 mm. alto, 4 mm. cr., basi albido-tomentoso,
sæpe radiciformi attenuato, supra pallidiore, basi obscure griseo-
brunneolo, albo-pulveraceo; lamellis 5 mm. latis, decurrentibus,
subconfertis pileo concoloribus; massa sporarum alba; sporis 8-
10 × 3-4, breviter ellipsoideis.

Hab. ad terram in Bavaria prope Augsburg. — *Cl. pruinosæ*
affinis.

29. **Clitocybe verrucipilea** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 17. — Brit- 160
zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 11. — Pileo plano-con-
vexo, 4 cm. lato, centro depresso, ibique umbone rotundato et
conoideo carnosulo prædito; pileo albido, flavo-rubido, carneo, in-
distincte zonato; stipite 8 cm. long., 4 mm. cr., sæpe basi te-
nuiore, pileo concolori, farcto, basi tomentoso-piloso; lamellis 5
mm. latis, parum decurrentibus, confertis, albido-carneis; carne
odore peculiari nullo, albido-rubella, basi sordide-rubescenti; massa
sporarum alba; sporis subglobosis 4 µ. c. cr., hyalinis.

Hab. ad terram in Bavaria. — *Clit. amaræ* affinis.

30. **Clitocybe brumosa** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 15. — Brit- 161
zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 14. — Pileo hygrophano,

convexo, 4 cm. lato, medio subdepresso, albido, centro obscuriore; stipite 7 cm. long., 5 mm. lato, basi attenuato, subcavo, supra pallidiore, basi griseo v. griseo-brunneo; lamellis 5 mm. latis, subdecurrentibus, subconfertis, griseis v. pallide griseo-brunneis; carne pileo concolori; massa sporarum alba; sporis breviter ellipsoideis, 6-8 \approx 3-4.

Hab. in silvis Bavariæ.

31. **Clitocybe fallax** (Quél.) Sacc. et Trott. *Omphalia fallax* Quél., 162

Assoc. franç. Avanc. Sc. XXIV (1895) pag. 3, tab. VI, fig. 5 (extr.). — Pileo convexo mammillato, dein cupulato, 3-4 cm. lato, leviter tomentososo; carne tenera, alba, odorata, amaricante, lamellis arcuato-decurrentibus, confertis, angustis, ex albo incarnatis; stipite farcto, deorsum sæpius tenuato et flexo, tenuiter floccoso; sporis pruniformibus, 6-7 μ . long., ocellatis, hyalinis, coacervatis dilute roseo-rubiginosis.

Hab. circinatim in silvis humidis sub Robinia, Loiret Gallia (Doct. BERTRAND). — Affinis *Clitocybæ catino* et *infundibuliformi*.

32. **Clitocybe umbrino-marginata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 16. — 163

Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 11. — Pileo forma variabili, convexo, umbonato, depresso, urceolato, 3 cm. lato, brunneo, nitido, centro brunneo v. brunneo-violaceo; stipite 4 cm. long., 4 mm. cr., farcto v. subcavo, carnosofibroso, brunneo-violaceo; lamellis 4 mm. latis, subdecurrentibus, subremotis, crassiusculis, albidis brunneo-marginatis, demum venosis trans pileum conspicuis; carne albida v. brunneola, odore et sapore nullo; massa sporarum alba; sporis 8-12 \approx 4-6, elongatis.

Hab. ad truncos, Oberstausen in Alpibus Algovia. — *Cl. socialis* affinis.

33. **Clitocybe subcyathiformis** Peck, N. York State Mus. Bull. n 122 164

(1908) pag. 137 et p. 158, tab. 110, fig. 1-6. — Pileo carnosissimo, tenui, late convexo, demum subplano v. centro depresso, glabro, hygrophano, madido albido, margine striatulo, sicco albo v. centro leviter flavo; carne alba, sapore miti; lamellis tenuibus, subconfertis, adnato-decurrentibus, albidis; stipite subæquali, farcto, fibrilloso-reticulato, albido, sæpe basi albo-tomentoso; sporis ellipsoideis, 6-8 \approx 4-5.

Hab. in locis humidis sub Alnis et Betulis, Amer. bor. — Pileus 2,5-5 cm. latus; stipes 2,5-4 cm. longus, 4-8 mm. cr.

34. **Clitocybe sevocata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 16. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 15. — 165

Hygrophana,

grisea v. griseo-brunneola; pileo convexo, centro depresso, 2,5 cm. lato; stipite pileo pallidiore, 6 cm. alto, 4 mm. cr., basi angustato, farcto, flexuoso; lamellis 4 mm. latis, parum decurrentibus, confertis; carne inodora; massa sporarum alba; sporis 6-7 × 5-7, subglobosis, flavidis, aculeolatis.

Hab. in silvis fagineis in Bavaria. — *Cl. echinosporæ* affinis.

35. **Clitocybe flavo-fusca** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 15. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 11. — Pileo tenui, carnoso, subconvexo, 3,5 cm. lato, centro depresso; stipite et lamellis albo-brunneis; lamellis subremotis, 6 mm. latis, adnatis, subemarginatis, vix decurrentibus; stipite 2,5 cm. long., 5 mm. lato, basi angustato, cavo, pariete 2 mm. crassa; massa sporarum alba; sporis 8 × 5, breviter ellipsoideis. 166

Hab. in herbidis alpestribus Algoviæ. — *Clit. alpestri* affinis.

36. **Clitocybe farcta** (Brit.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 341. — *Agaricus farctus* Britzelm., Revis. Hymen. I (1898) p. 11, tab. 67, fig. 394. — Syll. XI, pag. 11 (*Tricholoma*). — Pileo subconvexo, 3,5 cm. lato, medio depresso, glabro, albido, centro subcremeo, margine opaco, nitido, revoluto; stipite 7 cm. longo, 7 mm. cr., basi irregulariter curvato, contorto, attenuato, albido, pallide cremeo; carne humida ex albido cremea; sporis albo-hyalinis, 4-5 × 2, rotundato-elongatis, illis *Clit. difformis* similibus. 167

Hab. ad terram prope Augsburg Baviaræ.

37. **Clitocybe pruinosa** Harrison Lovejoy, Bot. Gazette vol. L (1910) p. 384. — Pileo 3,5 cm. lato, e plano-convexo subdepresso, distincte rubido-brunneo v. salmoneo, margine pallidiori, sicco, levi, nitido; margine revoluto integro; carne sompacta, alba, colore pilei subsimili; lamellis tenuibus, postice angustis, salmoneo-flavis, confertis, distincte decurrentibus, dein ex sporis albo-pulveraceis; stipite carnoso 5 cm. longo, 1 cm. cr., concolori sed pileo pallidiori, cavo, levi; sporis albis, aculeatis, globosis, 7-10,5 μ . diam. 168

Hab. in silvis Coniferarum, Rocky Mountain Amer. bor.

38. **Clitocybe pulcherrima** Peck, Journ. of Mycol. XIV (1908) p. 1. — Pileo carnoso, convexo dein umbilicato v. centro depresso, margine decurvato, glabro, flavo-citrino; carne alba, sub cuticula flavida; lamellis tenuibus, confertis, arcuatis, decurrentibus, albidis v. leviter flavo tinctis; stipite æquali v. supra leniter angustato, supra solido, basi cavo, subglabro, pileo concolori vel pallidiori; sporis plus minusve globosis, 4 μ . diam. 169

Hab. inter folia dejecta prope Detroit, Michigan Amer. bor.

(O. E. FISCHER) — Pileus 2,5-5 cm. latus; stipes 2,5-4 cm. longus, 6-8 mm. cr.

39. **Clitocybe orbispora** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 19. — Britz. 170
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 15 (*Collybia*). — Pileo
 25 mm. lato, conoideo, convexo vel etiam umbonato, brunneolo-
 griseo, hygrophano, albido-pallescenti; stipite 7 cm. longo, 5 mm.
 cr., albido, brunneo-griseolo, intus e spongioso cavo; lamellis 4 mm.
 latis, vix decurrentibus, emarginato-adnatis, subremotis, crassiu-
 sculis, griseis; massa sporarum alba; sporis globosis, 8-10 μ . diam.

Hab. in silvis Baviaræ. — *Cl. echinosporæ* affinis.

40. **Clitocybe microspora** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXVI (1909) 171
 p. 331. — Pileo tenui, late convexo v. centre leniter depresso,
 sicco, sæpe excentrico, glabro v. in maturitate obscure fibrilloso,
 in margine aliquando irregulari v. lobato, albo v. cremeo; carne
 alba, sapore odoreque farinaceis; lamellis tenuibus, confertis, an-
 gustis, inæqualibus, decurrentibus, albis; stipite æquali, subcarti-
 lagineo, cavo, albo; sporis globosis v. late ellipsoldeis, 3-4 μ . longis.

Hab. ad terram Claremont Californiæ Amer. bor. (C. F. BAKER).
 — Pileus 2,5-6 cm. latus; stipes 2,5-3 cm. longus, 6-8 mm. cr.
Clit. excentricæ Peck proxima.

41. **Clitocybe laccata** (Scop.) Quéf. — Syll. V, p. 197. — var. **reti-** 172
spora Roll. Rev. mycol. 1904, p. 136, t. CCXLII, fig. 1. — Pileo
 carneo; sporis globosis 10 μ . diam., reticulatis simul et spinulosis.

Hab. sub Pinis, Vizzavona Corsicæ.

42. **Clitocybe alpestris** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 15. — Britz. 173
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 11. — Pileo margine
 sæpe sulcato, opaco, flavo-rubro-brunneo, 2,5 cm. lato; stipite con-
 coloris sed dilutiore, 4 cm. longo, supra 5 mm. cr., basi attenuato,
 2 mm. cr., cavo, contorto; lamellis 5 mm. latis, albidis v. flavido-
 rubro-brunneis, subremotis v. remotis, adnato-emarginatis, vix de-
 currentibus; carne subfragili, inodora; massa sporarum alba; sporis
 flavidis, asperulis, sphæroideis, 3-4 μ . diam.

Hab. in alpibus Algoviarum. — *Clit. sociali* affinis.

43. **Clitocybe ambiformis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 17. — Britz. 174
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 14. — Pileo e convexo
 umbonato 2 cm. lato; pallide carneo-brunneo, hygrophano albi-
 cante; stipite 5 cm. long., 4 mm. crasso, basi attenuato; lamellis
 3 mm. latis, vix decurrentibus, pileo pallidioribus; carne odore
 farinaceo; massa sporarum alba; sporis elongatis, 7-8 \times 3,25-4.

Hab. in silvis Baviaræ. — *Clit. ambiguæ* affinis.

44. **Clitocybe simplaria** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 16. — Britz. 175
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 15. — Pileo subconvexo,
 umbonato 1,8 cm. lato; pileo et stipite subalutaceis v. flavo-brun-
 neis; stipite 4,5 cm. alto, æqualiter 3 mm. cr., farcto; lamellis
 parum decurrentibus, 3 mm. latis, confertis, albis v. griseolis; carne
 albida v. brunneola; massa sporarum alba; sporis elongatis $4 \approx 2-2,5$.

Hab. in silvis Coniferarum, prope Augsburg Baviaræ —
Cl. mortuosæ affinis.

45. **Clitocybe echinosperma** (Brit.) Sacc. — Syll. XI, p. 16. — Britz. 176
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 15. — Pileo hemisphæ-
 rico, convexo, 1,5 cm. lato, centro umbonato v. depresso, levi, vix
 fibroso; pileo et stipite flavo-brunneo vel brunneo; stipite basi
 pallidiore; stipite 5 cm. alto, supra 2 mm., basi 5 mm. cr., sub-
 cavo; lamellis 5 mm. latis, adnatis, subemarginatis, albidis, brun-
 neolis, subconfertis, compactis, trans pileum conspicuis; carne odore
 farinaceo; massa sporarum alba; sporis rotundatis v. etiam sub-
 angulatis, aculeolatis, 6-8 μ . diam.

Hab. in silvis Coniferarum in Alpibus Algoviarum. — *Cl. echi-
 nosporæ* affinis.

46. **Clitocybe ambifaria** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 13. — Britz. 177
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 14. — Pileo hemisphæ-
 rico, parum depresso, 1,2 cm. lato, griseolo v. brunneolo, hygro-
 phano, albido-pallescente; stipite 4-5 cm. longo, 2 mm. cr., basi
 subincrassato, albo, pellucido. farcto v. cavo; lamellis 4 mm. latis,
 adnatis vix decurrentibus, albis, remotis; carne odore nullo; massa
 sporarum alba; sporis elongatis, $8 \approx 4$, uniguttulatis.

Hab. in silvis Coniferarum prope Augsburg Baviaræ. —
Clit. ambiguæ affinis.

47. **Clitocybe cæspitosa** Pat. Add. Cat. Champ. Tunis. in C. R. du 178
 Congrès des Soc. Sav., 1908 (1909) pag. 248. — Cæspitosa; pileo
 carnosio, convexo-plano, dein infundibuliformi, albo, pruinoso, vix
 1 cm. diam.; lamellis albis, distantibus, crassiusculis, acie subob-
 tusa, integra, decurrentibus; sporis cuneiformibus, hyalinis, levi-
 bus, $9-10 \approx 4-5$; cystidiis nullis; stipite regulariter deorsum te-
 nuato, 1-2 cm. long., pruinoso, superne albo, inferne cinereo-cæsi-
 o, dein atro.

Hab. ad culmos emortuos Erianthi Ravennæ, Laghonat
 Tunisiæ. — Affinis *C. ericetorum* sed bene distincta.

48. **Clitocybe sinopica** (Fr.) Gill. — Syll. V, pag. 167. — var. **Ar-** 179
noldi Boud., Icon. Mycol. 1. (Nondum descripta).

ÆRUGINOSPORA v. Höhn., Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, CXVII (1908) Abt. I, pag. 1012. (Etym. *ærugo* et *spora*, ob hujus colorem) — Stipes sursum in pileum sensim abiens; velo nullo. Lamellæ adnato-decurrentes, ceraceæ, crassæ, acie obtusa, ex hyphis homomorphis, tenuibus in pileum abeuntibus tramantque unicam, viscoso-carnosam formantibus Pilei margo revolutus. Basidia tenuia, sporis viridibus v. cyaneo-viridibus. — Genus considerari potest velut *Clitocybe* v. *Hygrophorus* v. *Chantharellus* chlorospori. Pariter sporis chlorinis pollent genera duo condita a Cl. Masee in Europ. Fungus-Flora, Lond. 1902, nempe *Chlorophyllum* (= *Lepiota chlorospora*) et *Chlorospora* (= *Schulzeria chlorospora*) quæ vero sunt ulterius perpendenda.

1. **Æruginospora singularis** v. Höhn. l. c. p. 1012. — Pileo glabro, 180 e cremeo griseo-brunneo, centro sæpe rufescente, marginem versus depressiuscule zonato, tenuiter radiatim ruguloso, depresse umbonato, 2-5 cm. lato, opaco, medio stipiteque crassiuscule carnosus; pileo marginem versus sensim tenuato; carne alba, inodora, immutata; stipite cylindræo, farcto, sursum conice expanso, glabro, albido-cremeo, 2-5 cm. long., 4-7 mm. cr.; lamellis subremotis 2-3-seriatis, adnatis antice posticeque tenuatis, 3-10 mm. lat., siccis fragilibus, decurrentibus, albidis; stratu hymeniali 100 μ . cr.; sporis chlorinis, v. subazureis, globoso-ellipsoideis, 6-8 \times 5-5,5, basi acutiusculis, serius crasse 1-guttata.

Hab. ad terram præsertim inter *Bambusa*s, Buitenzorg Javae.

COLLYBIA (Fr.) Quél. — Syll. V p. 200, IX p. 27, XI p. 17, XIV p. 77, XVI p. 25, XVII p. 15.

1. **Collybia subdryophila** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 367. — 181 Pileo levi, purpureo-carneo-brunneo, 2-3 cm. lato; lamellis albis, adnexis; sporis obovato-subglobosis, granulosis, demum uniguttulatis, 3-4 μ .; stipite lento, cavo, levi, 5-9 cm. alt., 5 mm. cr.

Hab. in silvis, Chapell Hill N. C. Amer. bor. (W. C. COKER). — *Coll. dryophilæ* similis sed differt forma sporarum, stipite ad basim non inflato etc.

2. **Collybia fusipes** (Bull.) Quél. — Syll. V, p. 206. — var. **citrophylla** 182 Rick, Broteria VI (1907) p. 72. — Latissima, 10 cm., rubro-purpurea; stipite radicato, inflato, concolore; lamellis latissimis, distantibus, flavis.

Hab. ad terram in silvis, Rio Grande do Sul, Brasiliæ.

3. **Collybia campanella** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 (1907) 183

p. 19. — Pileo tenui, conico v. campanulato, apice papillato, 6-8 mm. lato, pilis strigulosis, obscure fuscis adpressis v. deflexis tecto; lamellis ascendentibus, modice confertis, albidis; stipite firmo, æquali, insiticio, piloso-floccoso, pileo concolori, 18-24 mm. longo, 1 mm. cr.; sporis non visis.

Hab. ad ramos siccos emortuos *Thujae occidentalis*, Warren Co. Amer. bor. — *Collybiæ stipitaricæ* affinis.

4. **Collybia aquosipes** (Britz.) Sacc. — Syll. XI p. 19. — Britzelmayr, 184
Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 17. — Pileo 6 cm. lato, hemisphærico-expanso, medio depresso, brunneolo-fibroso, centro brunneo; stipite 8 cm. long., 4 cm. cr., basi incrassato, albo, basi pallide brunneo, fere pellucido, fragili, intus albo, aquoso et cavo; lamellis 5 mm. latis, albis v. albidis, adnexus v. parce adnatis, confertis, margine sub vitro sæpe subserrulato; carne albida, in pileo brunneola, inodora et insipida; massa sporarum alba; sporis $6 \approx 4$ v. 4-6 μ . diam., uniguttulatis, ex aquoso flavidis.

Hab. ad truncos vetustos prope Teisenberg Salisburgiæ.

5. **Collybia subbutyracea** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 19. — Britzelmayr, 185
Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 16. — Pileo 4 cm. lato, campanulato, dein expanso, albido, centro flavido, opaco, hygrophano; stipite 7 cm. long., supra 6 mm. cr., infra crassiori, pallide rubido v. brunneolo, fibroso, intus spongioso-fibrilloso; lamellis 4 mm. latis, adnexus, rotundatis, confertis, albidis; massa sporarum alba; sporis $3-4 \approx 2-3$, elongatis, flavidis.

Hab. in silvis prope Augsburg Bavariæ. — *Coll. butyraceæ* affinis.

6. **Collybia Demangei** Pat., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIII (1907) p. 77. 186
— Pileo orbiculari, carnosio, convexo, medio depresso et centro mammillato, 4-6 cm. diam., fusco-nigrescente, centro saturatius colorato; lamellis liberis, albis, parum confertis; stipite gracili, duro, fibrilloso, glabro, initio flavido dein brunneo-nigro, 6-8 cm. longo, 3-4 mm. cr., firmo; carne tenui, brunnea; sporis ovoideis, verrucosis, $8-10 \approx 5$.

Hab. ad terram, Hanoi Indo-Cinæ (EBERHARDT). — Odor et sapor ut in *Marasmioreade*.

7. **Collybia maculata** (A. et S.) Quél. — Syll. V, p. 207. — var. **moschata** 187
Harrison Lovejoy, Bot. Gazette vol. L (1910) pag. 384. — Pileo carnosio, firmo, 6 cm. lato; stipite 3 cm. longo, 2 cm. cr.; sporis sæpe leniter apiculatis. $7 \approx 4$; odore moschi distincto.

Hab. gregaria in ligno Pini, Rocky Mountain Amer. bor.

8. **Collybia velutipes** Curt. — Syll. V, p. 212. — var. **solida** Jacobasch, Sitzb. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XXIV (1882) p. 88. — A typo differt pileo non glutinoso, crassiori, fortiter convexo, apice brunneo-aurantiaco, margine flavo-citrino; lamellis semper albidis; stipite crassiori, semper farcto v. raro ætate cavo, glabro, albido-flavo v. basi brunneolo, nec incrassato.

Hab. ad truncos Salicis prope Schöneberg Germaniæ.

9. **Collybia subsulphurea** Peck, Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) pag. 345. — Pileo carnosio sed tenui, subtenaci, humiditate reviviscente, late convexo, sæpe centro depresso, glabro, flavo-sulphureo, centro sæpe cinnamomeo- v. castaneo-colorato; carne hygrophana, alba sicca, odore gravi fungino; lamellis tenuibus, angustis, confertis, postice rotundatis, adnaxis v. subliberis, pallide sulphureis v. albidis; stipite longiusculo, tenaci, glabro, cavo, basi angustato, æquali, sicco striato-sulcato, sulphureo v. pallido; sporis ellipsoideis, $6 \approx 3$.

Hab. cæspitosa sub Quercubus inter folia dejecta, Stockton, Kansas Amer. bor. (E. BARTHOLOMEW). — Pilus 2,5-6 cm. longus; stipes 5-12 cm. longus, 2-6 mm. cr. — *Coll. dryophilæ* proxima.

10. **Collybia eriocephala** Rea, in A. L. Smith et Rea, Trans. Brit. Mycol. Soc. v. III, p. 46. Ita vocanda *Collybia veluticeps* Rea, l. c. v. I, p. 157 (1900), non Cke. et Masee. — Syll. IX, p. 28. — Pileo convexo dein expanso, velutino, 3-6 cm. lat., fulvo; carne pallida dein flavida, centro crassiore, marginem versus initio revolutum tenuata; stipite farcto dein cavo, 4-7 cm. alt., 5-15 mm. cr., concolore sed sursum pallidiore, fusiformi, in mycelium longum rhizomorphaideum protracto, striato, medio leviter velutino; carne inferne rufula; lamellis sinuato-adnatis, 5-8 mm. lat., saturate ochraceis, remotis; sporis oblongis, $7-8 \approx 3-4$; mycelio chordiformi, ramoso, prolifero.

Hab. cæspitosa ad truncos putres Ulmi, Northwick Britannia. 191

11. **Collybia subhyalina** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. Skr. (1904) n. 6, p. 33. — Pileo convexo, glabro, hygrophano, submembranaceo, striato, melleo; lamellis liberis, albis, subconfertis; stipite tenui, lutescenti, radicato, sursum velutino-pruinoso.

Hab. in fimo equino prope As Norvegiæ.

12. **Collybia stipitaria** Fr. — Syll. V, p. 216. — var. **omphaliæformis** Jacobasch, Abh. d. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XXX (1888) p. 330. — A typo differt pileo subinfundibuliformi, nec convexo.

Hab. prope Friedenau Germaniæ

13. **Collybia fimicola** Earle, Bull. of the New York Bot. Gard. (1904) 193 p. 298. — Pileo tenui 2-5 cm., e convexo expanso v. parum depresso, subumbonato, sordide cinereo-brunneo, centro obscuriori, levi, nitido, non striato; lamellis tenuibus, postice rotundatis, leniter adnexis, intervenosis, heterophyllis, distantibus, ventricosis, pallide cinereo-brunneis; sporis albis, ellipsoideis, $6 \approx 4$; stipite 3-5 cm. longo, 3-5 mm cr., æquali v. supra leniter expanso, subglabro, subtus dense hirsuto-tomentoso, basi brunneolo, apice albedo, cartilagineo, cavo; carne tenui, alba, immutabili, grata.

Hab. in fimo equino in herbidis, Stanford Univ. California (C. F. BAKER).

14. **Collybia brunnescens** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII (1906) 194 p. 214. — Pileo tenui, late convexo, sæpe leniter umbonato, glabro, subpruinoso, griseo-brunneo; lamellis tenuibus, confertis, emarginatis, albidis vel cremeo-coloratis; stipite æquali vel basi leniter incrassato, striato, glabro, solido v. farcto, albo; sporis albis, ellipsoideis, $8-10 \approx 5-6$.

Hab. solitaria v. cæspitosa ad terram in silvaticis Californiæ (C. A. HUNT). — Pileus 2-7 cm. latus; stipes 3-5 cm. longus, 4-6 mm. cr.

15. **Collybia macida** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 19. — Britzelmayr, 195 Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 17. — Pileo 3 cm. lato, plano-convexo, depresso umbonato v. depresso; pileo, stipite et carne aurantiacis; stipite 4 cm. long., 3 mm. cr., farcto; lamellis 4 mm. latis, pallide flavis, rotundatis, confertis; carne inodora, subacri; massa sporarum alba; sporis $4 \approx 2$, elongatis.

Hab. in silvis prope Dasing Bavarix. — *Coll. nitellinæ* affinis. 196

16. **Collybia miseranda** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 19. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1908) p. 17. — Pileo 3 cm. lato, plano-convexo et depresso umbonato, opaco, sordide griseo-flavo v. flavo-brunneo; stipite 3,5 cm. long., 2 mm. cr., cavo, supra albo-pulveraceo; lamellis 6 mm. latis, confertis, albo-brunneolis, crassis, adnato-emarginatis; carne odore forti farinaceo prædita; massa sporarum alba; sporis $7-8 \approx 3-4$, elongatis, biguttulatis (guttula altera majore).

Hab. gregaria in silvis prope Augsburg Bavarix. — *Coll. miseræ* affinis.

17. **Collybia fragilis** Quél., Ass. franç. Avanc. Sc. XXVI (1897) p. 2, 197 tab. IV, fig. 4 (extr.). — Pileo hygrophano, griseo-fusco, fragilissimo, membranaceo, convexo-plano, 2-3 cm. lat., atomis hyalinis,

Syll. fung. XXI (III-1911)

splendentibus punctato, pruinoso; stipite griseo-fusco, fistuloso, gracili, deorsum tenuato, fissili, apice albo et farinoso; lamellis sinuatis griseo-glaucis; sporis pruniformibus, hyalinis, 7-8 μ . long.

Hab. circinatim in pascuis siccis collinis Juræ.

18. **Collybia atratoides** Peck, in *Hard Mushrooms*, p. 116, fig. 86. — 198

Pileo tenui, convexo umbilicato, glabro, hygrophano, udo nigro-brunneo, sicco griseo-brunneo et nitido, 12-20 mm. lato; lamellis latiusculis, subdistantibus, adnatis, griseo-albis, sæpe supra transverse venosis et venoso-connexis; stipite æquali, cavo, levi, griseo-brunneo et basi tomento mycelioideo tecto, 2,5 cm. circ. longo; sporis subglobosis, 5 μ . circ. diam.

Hab. ad terram in ligno dejecto, Amer. bor. — *Coll. atratæ* affinis, differt pilei et lamellarum colore.

19. **Collybia hirticeps** Peck, *Bull. Torr. Bot. Club*, XXXIV (1907) 199

p. 98. — Pileo tenui, submembranaceo, convexo, umbilicato, sicco, dense et minute sæpe radiatim brunneo-tomentoso et in speciem sulcato-striato, margine fortiter incurvato; lamellis moderate confertis, postice rotundatis, leniter adnexis v. liberis, diu albis; stipite longo, tenaci, æquali, fibrilloso-farcto, tomentoso, pileo concolori v. pallidiori; sporis globosis v. subglobosis, 4-5 \approx 4.

Hab. ad truncos v. ramos dejectos in silvis prope Pigeon Lake, Ontario, et Pennsylvania Amer. bor. (C. GUILLET, R. SUMSTINE). — Plerumque cæspitosa. Pileus 1,5-2,5 cm. latus; stipes 5-7 cm. longus, 4 mm. cr. *Coll. zonatæ* affinis.

20. **Collybia muciflua** v. Höhn., *Stzb. k. Ak. d. Wiss. Wien*, CXVIII 200

(1909) Abt. I, p. 276. — Late et dense cæspitosa; pileo plano-hemisphærico plerumque 10 mm. lato, griseolo, centro et margine albido, strato mucoso hyalino, diaphano tecto, membranaceo; contextu pilei medio 700, margine 100-150 μ . cr.; ex hyphis densis gelatinosis conflato; stipite cavo 2-4 cm. longo, apice 600-800 μ . cr., deorsum sensim clavato et 1 mm. crasso ubique strato gelatinoso hyalino tecto, sursum albo, deorsum griseolo; lamellis late denticulato-adnatis 1,3-2 mm. latis, 200-250 μ . cr.; cystidiis nullis; basidiis cylindræis 12-16 \approx 4; sterigmatibus quaternis 3 μ . long.; sporis cylindræo-ellipsoideis, hyalinis, basi apiculatis, 5-6 \approx 2-3.

Hab. ad caudices arborum putres, eos fere omnino obtegens, in silvis Tjibodas Ins. Javæ.

21. **Collybia capillaris** A. Blytt, *Norges Hymen. in Vid.-Selsk. Skr.* 201

(1904) n. 6, p. 33. — Pileo minutissimo, primitus sphærico, dein

convexo, usque ad 3 mm. lato, albido, juvenili nitenti, membranaceo, glabro, striatulo; lamellis albis, postice ventricosis; stipite filiformi, flexuoso, pubescenti, 3 cm. longo.

Hab. in strobilis Pinorum apud Christiania Norvegiæ. — *Coll. conigence* affinis.

22. **Collybia dryophila** (Bull.) Quéf. — Syll. V, p. 234. — var. **al-** 202
vearis Cooke, Brit. Mycol. Soc. 1908, v. III (1909) p. 110, t. V, fig. B. — A typo differt pileo majore, 7,5 cm. diam., expanso, æquali, levi, disco rufescente; stipite crasso, basi 1 cm., cavo, rufescente.

Hab. inter folia dejecta, Edmond Castle prope Carlisle Britanniæ (Miss DECIMA GRAHAM).

23. **Collybia tuberosa** (Bull.) Quéf. — Syll. V, p. 224. — Var. **etu-** 203
berosa Jaap, Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. L (1908) pag. 45. — A typo differt sclerotio omnino nullo et habitatione in Hymenomycetibus putridis.

Hab. in Russulis et Lactariis putridis in silvis Coniferarum pr. Triglitz Brandenburg.

24. **Collybia striatula** Lloyd, Mycol. Notes V (1900) p. 35, fig. 4. — 204
Pileo convexo dein expanso, hygrophano, udo brunneolo, sicco pallidiori, udo distincte striato, levi; lamellis latis, distantibus, adnexis; stipite longo, cavo, fragili, distincte striato, levi.

Hab. ad terram in America bor.

25. **Collybia borealis** Lloyd, Mycol. Notes V (1900) p. 44, fig. 18. — 205
Pileo hygrophano, convexo expanso, pallide fulvo, centro obscure rufo-brunneo, sicco pallidiori, obtuso, levi; lamellis cinereis, liberis, angustis, confertis; stipite æquali, fiatuloso, fulvo-brunneo, æqualiter et diffuse villosa.

Hab. cæspitosa ad terram in silvis Coniferarum Amer. bor.

26. **Collybia glebarum** (Berk.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 378. — 206
Agar. glebarum Berk. in Hook. Fl. Antarct. II, t. 162, f. III. — Pileo breviter conico, umbonato, levi, glabro, dein sursum profunde involuto, umbone permanente, margine acutiusculo; lamellis subconfertis, postice adnatis, vix sinuatis; stipite cylindræo, æquali, levi, glabro, basi (ex densis cæspitibus herbarum nascente) truncato; sporis ovato-oblongis, levibus, basi distincte apiculatis, hyalinis 1-guttatis.

Hab. ad cæspites compactos herbarum in insulis Oceani Atlantici. — Diagnosis ex icone, hinc imperfecta. Pileus. (pallens?) 2-2,5 cm. lat.; stipes vix 2 cm. long., 3 mm. cr.

27. **Collybia eurhiza** (Berk.) v. Höhnel, Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien 207 CXVII (1908) Abt. I, p. 992, *Armillaria eurhiza* (Berk.) Sacc. — Syll. V, p. 85. — Sec. v. Höhn. l. c. ut synonyma certa v. probabilia hujus speciei sunt: *Lentinus cartilagineus* Berk., *Collybia sparsibarbis* Berk. et Br., *Agaricus (Pluteus) Rajap* Holt., *Flammula Janseana* P. H. et E. N., *Pholiota Janseana* P. H. et E. N., *Flammula filipendula* P. H. et E. N., *Pluteus Treubianus* P. H. et E. N., *Pluteus bogoriensis* P. H. et E. N., *Pluteus termitum* P. H., *Collybia radicata* Patouill. non Relh., *Tricholoma subgambosum* Cesati; sed revera judicium Höhnelianum nunc ægre acceptandum est nisi species latissime collectivæ, nunc refutatas, iterum admittamus vel nisi, adcuratissimo examine, exemplaria specierum originalia comparemus et inter se *identica* reperiamus. Nam qui sint limites « speciei » nondum definitum est.

MYCENA (Fr.) Quéf. — Syll. V p. 251, IX p. 34, XI p. 20, XIV p. 82, XVI p. 26, XVII p. 18.

1. **Mycena maxima** Jacobasch, Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 208 XXXIII (1891) p. X; Mitth. Thür. Bot. Ver. N. F. (1900) p. 91. — Pileo campanulato, umbonato, undulato, margine eroso, rugoso-striato, vertice denique fisso, atro-umbrino, margine pallidiore, tenuiter carnosus, marginem versus submembranaceus, 6-8 cm. lato; lamellis sinuato-adnatis, denticulo decurrentibus, venoso-connexis, flexuosis, subcarneis; stipite cartilagineo, vix radicato medullato-farcto, basi albo-villoso, 8-10 cm. longo, striatulo, atro-brunneo, sursum pallidiore; odore et sapore farinae recentis.

Hab. ad caudicem putrem pineum prope Berolinum. — Inter *M. rugosam* et *M. galariculatam* media.

2. **Mycena marasmioides** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 23. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 18. — Pileo 8 cm. lato, plano-convexo, medio depresso v. umbonato, centro obscure carneo v. rubro-brunneo v. albido-carneo v. albido; pileo molli, minute piloso; stipite supra 6 mm. cr., subcurvo v. tubuloso, basi attenuato et nigro-rubro-brunneo, supra pallidiore, rigido, levi, glabro, nitido; lamellis 8 mm. latis, adnexis, subconfertis, demum remotis, albidis, etiam albo-sulphureis, demum albido-carneis; massa sporarum alba; sporis 8 \times 4, elongatis, uno apice acutatis; carne odore peculiari nullo.

Hab. fasciculata ad truncos quercinos in silvis prope Augsburg Bavariae. — *Myc. coherenti* affinis.

3. **Mycena levidensis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 22. — Britzel- 210
mayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 18. — Pileo 4,5 cm. lato,
submembranaceo, plano-convexo, depresso umbonato, centro ochra-
ceo-flavo v. ceteris partibus fungi albido-alutaceis; stipite 6 cm.
longo, 4 mm. cr. basi subincrassato, cavo, parietibus 1,5 mm. cr.,
basi tomentoso-strigoso; lamellis 6 mm. latis, adnatis, emarginatis,
confertis; massa sporarum alba; sporis 8-9 \times 4, elongatis, uno apice
acutatis.

Hab. in ligno putrescente in Algovia. — *Myc. levigatæ* affinis.

4. **Mycena lacticularia** (Britz.) Lapl. — Syll. XX, pag. 149. — Brit- 211
zelm., Revis. Hymen. I (1898) p. 19, t. 101, f. 531. — Pileo 3 cm.
lato, campanulato, dein effuso, brunneo-griseo nigricante; stipite
concolori, 5 cm. alto, supra 4 mm. infra 5 mm. cr., fragili, facile
fisso, albo-lacteo; lamellis 4 mm. lat., subremotis, adnatis, griseis,
plerumque transverse venosis; sporis albo-hyalinis, 12-13 \times 6-7,5,
irregulariter subellipsoideis.

Hab. ad terram in Bavaria. — *M. leucogalæ* affinis.

5. **Mycena dissimulabilis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 22. — Brit- 212
zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 18. — Pileo 3 cm. lato,
campanulato, sulcato, griseo, centro nigro-brunneo; stipite 9 cm.
long., 2 mm. cr., basi subincrassato, brunneo-violaceo parum stri-
goso-tomentoso; lamellis 4 mm. latis, adnexis, griseis, subremotis;
carne inodora et insipida; massa sporarum alba; sporis 14-15 \times 6,
elongatis, uno apice acutatis.

Hab. ad terram muscosam Baviaræ. — *Myc. dissilienti* affinis.

6. **Mycena chlorocephala** Patouill., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIV (1908) 213
p. 9. — Pileo carnosio-tenui, subgloboso, pulchre viridi, levi v.
sulcatulo, glabro, 3-4 cm. diam.; lamellis adnatis, luteo-olivaceis,
cystidiis nullis; sporis ovoideis, levibus, hyalinis, 18 \times 10; stipite
cylindraceo, glabro, albido, 3 cm. circ. alto, gracili, deorsum in-
crassatulo.

Hab. ad terram in silvis humentibus inter Mont-Mou et Mont
Dzumac Novæ Caledoniæ (M. LE RAT).

7. **Mycena vitreata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 22. — Britzelmayr, 214
Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 18. — Fragilis; pileo 2,5 cm.
lato, superficialiter sulcato, non glutinoso; pileo et stipite brun-
neolis; stipite 10 cm. longo, 2 mm. cr., basi subincrassato, cavo;
lamellis brunneis, adnatis, emarginatis, subconfertis, albis v. albi-
dis, griseo-brunneolis; massa sporarum alba; sporis 10-12 \times 5, uno
apice acutatis.

Hab. ad terram udam in silvis Algoviaë et prope Augsburg Bavariaë. — *Myc. vitreæ* affinis.

8. ***Mycena incongruens*** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. fung. XX, 215 p. 148. — *Agaricus incongruens* Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 19, tab. 11, fig. 109. — Pileo 1,5 cm. lato, conoideo, pallide sordide flavido, glabro, subnitido; pileo et margine subdiaphano et tunc lamellas ostendente; stipite 10 cm. alto, supra 2 mm. infra 4 mm. cr., quandoque radiciformi-attenuato; stipite brunneo, brunneo-lilacino, minute furfuraceo, albido pulveraceo; lamellis 3 mm. latis, confertis, albis, adnatis; sporis albo-hyalinis $10 \approx 4$, breviter ellipsoideis.

Hab. ad squamas putres strobilorum Abietis, Freiburg Helvetiæ et prope Diedorf. — *Myc. amictæ* affinis.

9. ***Mycena mirabilis*** (Cke. et Quél.) Masee, British Fungus-Flora III, 216 p. 93, *Agaricus mirabilis* Cke. et Quél. Clavis p. 39, Cooke Illustr. tab. 951 A. Huc spectat *Mycena marginella* (Fr.) Quél., Syll. V, p. 252, non Pers, testibus Cooke et Masee. Cfr. *M. marginella* (Pers.) proxima.

10. ***Mycena marginella*** (Pers.) Sacc. et Trott., non Friesii, test. Cooke 217 et Masee, *Agaricus marginellus* Pers. Synops. p. 309. Ecce verba Persooni l. c.: — Pileo carnosomembranaceo, campanulato, albido-umbrino; disco obscuriore glabro; lamellis distinctis, alternis majoribus, albis, margine fimbriato, umbrino; stipite nitido basi subtuberoso, piloso.

Hab. in truncis putridis abietinis in Europa, Septembri. — Stipes 3,7 cm. long., 2 mm. cr. Lamellæ subdistinctæ, stipiti subarcuato-adnexæ, basi inter se dentato-connexæ. Pileus 6-9 mm. lat. et totidem altus, disco umbrino. Habitus fungi subrigidus.

11. ***Mycena carneo-sanguinea*** Rea, Trans. Brit. Mycol. soc. I (1900) 218 pag. 157. — Pileo convexo, subumbonato 2,5-3 cm. lato, livido, medio rufo-tincto, senio pallidiore, glabro; carne centro crassiuscula, marginem versus tenuata, alba, dein carneo-sanguinea; stipite 4 cm. longo, 5-9 mm. cr., griseo, basi flavescente et incrassato, cavo; carne apice sanguinea; lamellis atro-purpureo-brunneis, adnatis, acie atro-purpurea et denticulata; sporis ellipsoideis, $4-5 \approx 2-3$.

Hab. ad terram in silvis Scalby Britanniaë. — Inter species sect. *Calodontes* præcipue carne secta cruentata dignoscenda species.

12. ***Mycena denticulata*** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXII (1905) 219 p. 77. — Pileo tenui, subcampanulato v. convexo, obtuso, glabro,

griseo-brunneo, cuticula separabili; lamellis latiusculis, subdistantibus, ventricosis, dente decurrentibus, pallide brunneis, acie purpureis, plerumque denticulatis; stipite angusto, æquali, recto, cavo, glabro albido v. flavo; sporis 7-8 \approx 4-5.

Hab. prope St. Louis Mo. Amer. bor. (N. M. GLATFELTER). — Pileus 12-20 mm. latus; stipes 5-7 cm. longus, 1-2 mm. cr.

13. **Mycena usambarensis** (Eichelb.) Sacc. et Trott. *Agaricus usambarensis* Eichelb., Verh. Naturw. Ver. Hamburg, 3. Folge, XIV (1906) p. 79. — Pileo parum expanso, 5-7,5 mm. lato, parum carnosus, flavo-brunneo, centro obscuriori; carne albida hygrophana; stipite 2 cm. longo, 1 mm. cr., levi, sursum albido, basim versus brunneo et pileo concolori ibique incrassato et tomento pallide brunneo tecto; lamellis crassis, albis, acie in individuis maturis atro-purpurea, curvulis, circa stipitem annulato-connexis dein liberis; sporis albis, plerumque sphaeroideis, 3 μ . cr.

Hab. ad terram inter folia dejecta prope Amani Africae bor. Rara. — *M. balaninæ* proxima.

14. **Mycena cyanothrix** Atkinson, Mushrooms (1903) p. 98 fig. 101. 221 — Pileo ex ovato convexo, udo viscido et nitide cyaneo, dein pallido et albido, centro fuscidulo, margine minute striato, sicco æqualiter subochraceo v. brunneo; lamellis confertis, liberis, angustis, albis, dein albo-griseis, acie minute dentata v. fimbriata; sporis globosis, levibus 6-9 μ . diam.; stipite angusto, cavo, juveni minute purpurascenti, dein albido v. carneo, flexuoso v. recto, æquali, quandoque pluribus basi concretescentibus, ibique mycelio cyaneo tectis.

Hab. gregaria in radicibus prope Ithaca Amer. bor. — Pileus 1-2 cm. latus; stipes 6-9 cm. longus, 2 mm. c. cr.

15. **Mycena capillaris** Karst., Acta Soc. pro Faun. et Fl. fenn. XXVII, 4 (1905) p. 3. — Pileo membranaceo, conoideo-convexo, ochraceo, glabro, 1 cm. c. lato; stipite filiformi, gracillimo, flexuoso, glabro, pallidiori, circ. 3 cm. longo et 150 μ . cr.; lamellis adnatis, subconfertis, dilute ochraceis; sporis non visis.

Hab. ad terram prope oppidum Ufa Rossiae, (O. LÖNNBOHM).

16. **Mycena vulgata** (Britz.) Sacc. — Syll. VI, p. 22. — Britzelmayr, 223 Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 19. — Tenax; pileo 1,5 cm. lato, plano-convexo, centro depresso vel umbonato, glutinoso, griseo, flavo-griseo; stipite concolori v. etiam pallidior, 4 cm. long. 1 mm. cr.; lamellis confertis, albis, subdecurrentibus, 3 mm. latis; massa sporarum alba; sporis 8-10 \approx 4, elongatis, uno apice acutatis.

Hab. in silvis Salisburgiæ, Algoviæ, Friburgiæ, Baviariæ. —

Myc. vulgari affinis.

17. **Mycena olivaceo-marginata** Masee, British Fungus-Flora, III, 224 pag. 116, *Agaricus olivaceo-marginatus* Masee in Cooke Illustr. p. 959 A. — Pileo tenui carnosio, campanulato, 12 mm. alt., melleo, fulvo-tincto, striato, sicco obscuriore; lamellis adnexis et denticulo brevissime decurrentibus, subdistantibus, 2 mm. latis, venoso-connexis, pallidis, acie obscure olivacea, siccis totis griseis; stipite 3,7-5 cm. long., gracili, æquali, glabro, nitido, sicco, pileo subconcolori, deorsum rufescenti, basi albo-villosulo; sporis late ellipsoideis, $6 \approx 4-5$.

Hab. inter gramina minora in Britannia. — Dignoscitur colore melleo et lamellis vegetis olivaceo-marginatis.

18. **Mycena Brunaudiana** Sacc. et Trav. — Syll. XX, pag. 141. — 225 *Mycena echinulata* Quél. Assoc. franç. Av. Sc. XVIII (1889) t. XV, f. 7, non Berk. — Diaphana, griseo-cinerea, mox flaccida; pileo campanulato-convexo, 7 mm. longo, tenuiter striato, spinulis minutis, uncinatis, 200-300 μ . alt., hyalinis consperso; stipite capillari, 1 cm. alto, tubuloso, glabro, e disco sericeo fimbriato albo oriente; sporis ovoideis, 7 μ . long., punctatis, hyalinis.

Gab. in culmis siccis graminum in littore pr. Fouras Galliæ (BRUNAUD). — Habitus mucoroideus.

19. **Mycena impromiscua** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 23. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 19. — Pileo 5 mm. lato, campanulato, membranaceo, flavo-rubro; stipite 4 cm. long., $\frac{3}{4}$ mm. cr., albo, pellucido; lamellis 2 mm. latis, adnexis, subconfertis, albo-flavidis, trans pileum subconspicuis; massa sporarum alba; sporis hyalinis, 6-7 \approx 4, elongatis, uno apice acutatis, uniguttulatis.

Hab. in silvis prope Teisenberg Salisburgiæ. — *Myc. aciculæ* affinis.

20. **Mycena superincurvata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 22. — 227 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 19. — Pileo 1 cm. lato, campanulato, albo, opaco, vix sulcato, margine reflexo; stipite 5 cm. long., 2 mm. cr., supra albo, basi e rubido brunneo-violaceo, glabro; lamellis 2 mm. latis, adnatis, emarginatis, albis, confertis; massa sporarum alba; sporis elongatis, 8-10 \approx 4.

Hab. in silvis prope Augsburg Baviariæ. — *Myc. cladophyllæ* affinis; habitus lamellarum *Myc. parvannulatæ*.

21. **Mycena lactea** Pers. — Syll. fung. V, p. 259. — var. **macrospora** 228

Martin, Bull. Soc. bot. Genève, 1904-1905, pag. 115. — A typo differt lamellis omnino liberis; stipite profunde (ad 4 cm.) infosso, sporisque ovoideis, usque ad $16 \approx 10$, sæpius vero 12-14 \approx 7-8, unipluri-guttatis, serius granulosis, hyalinis; cystidiis irregularibus, ad 40-50 μ . emergentibus.

Hab. in abietinis pr. Salève Helvetiæ.

22. **Mycena digitalis** Bres., Ann. Mycol. V (1907) p. 237. — Pileo 229
tenui, membranaceo, digitaliformi, apice truncato-subconvexo, centro papillato, sulcato 1 $\frac{1}{2}$ mm. lato, 2 mm. circiter alto, pallide stramineo; lamellis latis, plane adnatis, distantibus, paucis, 12 circiter, concoloribus; stipite filiformi, basi bulbiloso, pellucido, concolori, 4-6 mm. longo; basidiis clavatis, 15-18 \approx 4; sporis hyalinis, subcylindræis, 5 \approx 2; hyphis contextus lamellarum 9-11 μ . cr.

Hab. in foliis cecidophoris, sæpe supra cecidia, in insula Java (HEINRICHER).

23. **Mycena albo-grisea** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 (1907) 230
p. 27. — Pileo tenui, submembranaceo, ovato v. subcampanulato, obtuso, glabro, sulcato-striato, griseo-albo; lamellis mox crassis, latis, distantibus, adnatis, pileo concolori; stipite angusto, glabro, cavo, pileo pallidiori, basi villositate alba strigulosa tecto, 2,5-5 cm. longo, 1 mm. c. cr.; sporis 7,5 \approx 3,5-5.

Hab. ad folia dejecta Coniferarum, Bolton Warren co. Amer. bor. — Ad sectionem *Basipedes* pertinet.

24. **Mycena longiseta** v. Höhn. Stzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, CXVIII 231
(1909) Abt. I, p. 282. — Pileo plano-hemisphærico, membranaceo, 3 mm. lato, margine fimbriato, læte griseo, setulis hyalinis, acutis, copiosis, longis, obducto; stipite cavo cylindrico, hyalino, tenuissime pruinoso, basi bulbilosa, 16 mm. long., 150-200 μ . cr.; lamellis satis laxis, albis, liberis 200-300 μ . latis; cystidiis nullis; sporis ellipsoideis, basi oblique apiculatis, hyalinis, 6-10 \approx 3-4.

Hab. in foliis et ramis putrescentibus dejectis in silvis Tijbodas ins. Javæ frequens. — Stipes basi disco circulari 520 μ . diam. radiatim striato cinctus.

25. **Mycena Meyeri-Ludovici** (Eichelb.) Sacc. et Trott. *Agaricus Meyeri-* 232
Ludovici Eichelb., Verh. Naturv. Ver. Hamburg, 3 Folge, XIV (1906) p. 82. — Pileo 1 cm., plano, margine subreflexo centro leniter umbilicato, sulcato, albido, rubido tincto, diaphano; stipite 2 cm. longo, 1 mm. cr., torto, rigido, albido, infra obscure viridescenti, ex strato mycelico viridescenti 7 cm. lato, membranaceo nascente; lamellis albidis, crassiusculis, nonnullis brevioribus immixtis, in-

distincte anastomosantibus; sporis sphæroideis, 3 μ . cr., hyalinis, levibus.

Hab. ad folia et ramulos putres prope Amani Africæ bor. —

Myc. pterigenæ proxima.

26. **Mycena farinella** (Feltg.) Sacc. et Trott. *Agaricus farinellus* Feltg., 233

Vorst. Pilz-Fl. Luxemb. II T., 1906, p. 55. — Tota alba, minute farinosa; pileo campanulato, parum umbonato, levi, margine integro, non revoluta, 3,2-4 mm. lato, 2-3 mm. alto; stipite 0,6-1 cm. long., 0,8-1,2 mm. cr., supra parum incrassato, basi pilis albis radiatis prædito, extus cartilagineo, farcto; lamellis laxis, parvis, adnatis; sporis elongato-ovoideis v. subclavatis, 8-10 \approx 4-5, basi cuneatis supra obtusis.

Hab. ad truncos putres Pini, Pfaffenthal-Höhl Luxemburgiæ.

Mycenæ lacteæ proxima.

27. **Mycena breviseta** v. Höhn., Stzb. k. Ak. d. Wiss. Wien CXVIII, 234

Abt. I (1909) p. 283. — Tota albo-nivea; stipite basi disco plano-conico, 1 mm. lato, radiatim striato et subfimbriato cincto; pileo radiatim sulcato, centro profunde umbilicato, margine fimbriis granulosus 60-70 \approx 10 cincto; cetera *Mycenæ longisetæ*.

Hab. sparsim in foliis siccis dejectis in silvis Tjibodas ins. Javæ.

28. **Mycena atramentosa** (Kalchbr.) v. Höhnel, Fragm. Mykol. in Sitzb. 235

k. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. CXVI, Abt. I (1907) p. 94. Ita vocandus, teste v. Höhnel, *Agaricus (Collybia) atramentosus* Kalchbr. Ic. sel Hymen. Hung. (1875) pag. 15, tab. 6, fig. 2, seu *Collybia atramentosa* (Kalchbr.) Sacc. — Syll. V, p. 246. — Quoad characteres cfr. v. Höhnel l. c.

HIATULA Fr. — Syll. V p. 305, IX p. 40, XI p. 23, XIV p. 84.

1. **Hiatula Gandour** (Har. et Pat.) Sacc. et Trott. *Leucocoprinus Gan-* 236

dour Hariot et Patouill, Bull. Mus. Hist. Nat., 1909, n. 2, p. 88. — Pileo subgloboso dein campanulato-expanso 10-15 cm. lato, umbonato, a stipite distincto, albo, in squamas 5-10 mm. latas, concentricè subimbricatas, griseolas diffracto, margine levi; stipite albo, cylindræo, 6-10 cm. longo, 12 mm. crasso, basi bulboso, superne cavo; annulo albo membranæo, ad medium adfixo, persistenti; lamellis primitus albis, dein pallide flavidis, in sicco subumbrinis, liberis, latis, postice attenuatis, confertis; contextu albo; sporis in cumulo et sub lente flavidis, levibus, globoso-ovoideis, 6-8 \approx 6, guttulam magnam includentibus.

Hab. ad terram in hortis, Chari, Kindja, Congo Africæ trop.

— *Lepiotæ Nympharum* affinis et species optime edulis. Genus *Leucocoprinus* Pat, præsentè annulo, in posterum merito admit- tendum.

OMPHALIA (Fr.) Quélet. — Syll. V p. 308, IX p. 41, XI p. 23, XIV p. 84, XVII p. 21.

1. **Omphalia fuligineo-nigrescens** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 24. — 237
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 24. — Pileo 2,5 cm. lato, tenui-carnoso, convexo, medio depresso, griseo-brunneo, brunneo-violaceo, centro obscuriore; stipite 3,5 cm. longo, 2 mm. lato, basi incrassato, obscure griseo, basi nigrescente, farcto; lamellis 4 mm. latis, decurrentibus, confertis v. subconfertis, albidis, brunneo-griseis; massa sporarum alba; sporis 10×6 , elongatis, uno apice acutatis.

Hab. ad truncos in silvis Bavariæ. — *Omph. mauræ* affinis.

2. **Omphalia fuscella** (Quélet.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 223. — 238
Omphalina fuscella Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XXII (1893) p. 2, tab. III fig. 3 (extr.). — Pileo convexo-plano, 2 cm. lato, umbilicato dein infundibuliformi, margine leviter zonato, pallide griseo-brunneo v. argillaceo; carne tenui, fragili, inodora; stipite fistuloso deorsum tenuato, leviter applanato, subgriseo, sursum albo et pruinoso; lamellis adnatis breviter decurrentibus, remotiusculis, crassiusculis, ex albo postice cinerescens; sporis elliptico-pruniformibus, 8 μ . long.

Hab. ad terram humosam sub Pinu maritima et Pinu Strobo, Touraine et in Vogesis Galliæ.

3. **Omphalia alpina** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 24. — Britzelmayr, 239
 Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 15. — Pileo 2 cm. lato, subcarnoso, convexo, centro depresso v. infundibuliformi, vitellino, margine sulcato; stipite 2 cm. long., 3 mm. lato, farcto v. subcavo, albo; lamellis 4 mm. latis, flavido-albis, subremotis, parum decurrentibus, submarginatis; carne alba, odore et sapore nullo; massa sporarum alba; sporis $8-10 \times 3-4$ elongatis.

Hab. in turfosis prope Immenstadt Algoviæ. — *Omph. chrysoleuce* affinis.

4. **Omphalia gracilipes** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 223. 240
 — *Agaricus gracilipes* Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) p. 16, t. 42, fig. 296. — Syll. XI, p. 15 (*Clitocybe*). — Pileo 2 cm. lato, plano, convexo subinde concaviusculo, hygrophano, brunneo, griseo-brunneo, albido pallescente, fragilissimo; stipite 5 cm. alto,

supra 2 mm., infra 4 mm. cr., farcto, brunneo; lamellis 3 mm. latis, albido-brunneis, confertis v. subconfertis, subdecurrentibus; sporis albo-hyalinis, sphaeroideis, aculeolatis, $8 \approx 6$.

Hab. in silvis prope Teisenberg. — *Omph. striipileo* affinis.

5. **Omphalia serotina** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 241 pag. 98. — Pileo submembranaceo, convexo, sæpe centro leniter depresso v. subumbilicato, udo margine distincte striato, sicco striatulo, griseo-brunneo, griseo-albo v. subcinereo; lamellis mox latis, subdistantibus, adnatis v. leniter decurrentibus, albis; stipite angusto, cavo, glabro, leniter basi villosotomentoso, pallido; sporis anguste ellipsoideis, $8-10 \approx 4-5$.

Hab. in silvis inter folia dejecta, prope Boston Massachusetts Amer. bor. (E. B. BLAKFORD). — Pileus 1-2 cm. latus; stipes 1,5-2,5 cm. longus, 1 mm. cr. *Omphaliæ griseæ* affinis.

6. **Omphalia Hectoris** Roumeg. Rev. Mycol. IV (1882) p. 15, tab. 25, 242 f. 4 (sub nom. *Agaricus cardinalis* in tabula). — Pileo orbiculari, membranaceo, convexo dein umbilicato et subinfundibuliformi 14-18 mm. diam., senio sæpe margine fisso, superficie inæqualiter plicato, margine tenuiter striato, glabro, cinnabarino, demum rubro-brunneo; lamellis decurrentibus, cinnabarinis, acie subundulata e flavido albida præditis, longitudine inæqualibus, deorsum sensim tenuatis; stipite cylindrico-compresso, filiformi, 5 cm. alto, fistuloso, sæpe sulcato, pileo concolori, intus flavo, basi flavo-aurantio et veluti in spatham tomentosam terminato; carne flava.

Hab. in silva Huet prope Dax, Landex Galliæ (HECTOR SERRES). — Affinis *O fibulæ*.

7. **Omphalia Rogersi** Masee, Kew Bull., 1906, p. 92. — Pileo membranaceo, tenaci, convexo-umbilicato, glabro, hygrophano, striato, ochraceo centro obscuriore, 1,5 cm. lato; lamellis subdistantibus, longe decurrentibus, albidis; sporis hyalinis, ellipsoideis, basi oblique apiculatis, $7-8 \approx 5$; stipite fistuloso, glabro, æquali, deorsum castaneo, sursum pallidiori, 4-5 cm. longo, 1 mm. cr., basi radicato, albo-lanoso.

Hab. ad terram Narcodam in ins. Andaman (ROGERS). — *Omph. camptophyllæ* Berk. proxima.

8. ? **Omphalia incerta** (Feltg.) Sacc. et Trott. *Cortinellus incertus* Feltg. 244 Vorst. Pilz-Fl. Luxemb. II T. (1906) pag. 36. — Pileo albo v. flavido-albo, centro brunneolo, levi v. rimoso-areolato, primum campanulato, mucoso-viscoso, demum plus minusve depresso, 1,5-3 cm. lato, carnosio dein tenuiori, margine revoluto setulis sericeis,

albis, tecto sed demum evanescentibus; lamellis primum tenuibus 1-2 mm., dein usque ad 3 mm. latis, plus minusve decurrentibus, albis demum albo-flavis, confertiusculis; stipite 2-4 cm. longo, 0,5 cm. cr., subæquali, mucoso-viscoso ex albido flavido v. brunneolo, supra albo-granulato-fibrilloso, basi sæpe crassiusculo et albo-piloso, farcto, demum raro cavo; sporis globosis v. subglobosis, 4-5 μ . cr., minute aculeolatis, hyalinis v. flavidulis.

Hab. ad terram inter folia abietina, Luxemburg-Stadtpark. — Cum *Tricholomate leucocephalo* Fr. et *Omphalia umbratili* Fr. nonnullis characteribus concordat sed diversa.

9. **Omphalia californica** Copeland, Ann. myc. II (1904) p. 507. — 245

Pileo carnosulo, 1-2 cm. lato, primum margine inflexo crenatoque, centro mox depresso, denique vulgo infundibuliformi, pallide brunneo, glabro; lamellis circ. 30, valde inæqualibus, postice latissimis, triangularibus, cum stipite roseis pallescentibus; stipite farcto, 1-2 cm. alto, 1-2 mm. cr., cartilagineo, utrinque glabro; sporis c. 4 \approx 3.

Hab. ad terram sub *Quercubus*, Chico Californiæ. — *Omphaliæ umbelliferæ* affinis.

10. **Omphalia Allenii** R. Maire in Trans. Brit. Mycol. Soc. III (1910) 246

p. 169, tab. XI. — Hygrophana; pileo e convexo plano leviter umbilicato, levi glabro, tenui, olivaceo-griseo, sicco albido, 1-2 cm. lat.; lamellis decurrentibus angustissimis, crassiusculis, distantibus, inæqualibus, plus minus undulatis, venulis connexis, citrinis; stipite cylindrico, cavo, levi, glabro, subcartilagineo, citrino, basi albido et strigoso; sporis albidis, hyalinis, ellipsoideis, levibus, 6,5-7,5 \approx 3,5-4; basidiis clavatis, tetrasporis, 20-27 \approx 5.

Hab. ad truncos vetustos pr. Bakewell Britannia. — *Omph. xanthophyllæ* et *chrysophyllæ* affinis. Sapor dulcis, odor nullus.

11. **Omphalia curvipes** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 247

pag. 345. — Pileo submembranaceo, convexo, umbilicato, glabro, molli, sæpe ad marginem incurvato et obscure striato, brunneo, griseo-brunneo v. obscure-brunneo, sæpe in sicco centro pallidiori; lamellis tenuibus, moderate confertis, arcuatis, adnatis v. leniter decurrentibus, albis v. albidis; stipite brevi, curvo, farcto v. cavo, albo v. albido, basi leniter incrassato et distincte albo-villoso; sporis minutis 4 \approx 2.

Hab. ad ligna dejecta, Ontario, Canada Amer. bor. (C. GUILLET). — Pileus 4-10 mm. latus; stipes 1,5-2,5 cm. longus, 1-2 mm. cr.

12. **Omphalia notabilis** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 225. — 248

Agaricus notabilis Britzelmayr, Revis. Hymenomyce. I (1898) p. 16, tab. 145, fig. 705. — Pileo 7 mm. lato, hemisphærico, medio apiculo verruciformi prædito, griseo, nigro-griseo, margine albido-griseo; stipite 4,5 cm. alto, 1,5 mm. cr., farcto, pellucido, albido-griseo; lamellis 2 mm. latis, subdecurrentibus, valde confertis, albidis; carne grisea, serius odore farinaceo donata; sporis albo-hyalinis, 6-8 \times 3-4, breviter ellipsoideis.

Hab. in silvis pr. Westheim Bavar. — *Omph. setipedi* affinis.

13. *Omphalia pusillissima* Peck, N York State Mus. Bull. n. 116 249 (1907) pag. 27. — Pileo membranaceo, late convexo v. subplano, glabro, umbilicato, in sicco margine leniter striato, albo, 2-4 mm. lato; lamellis paucis, distantibus, decurrentibus, albis; stipite angusto, filiformi, minutissime cavo, flexuoso, glabro, albo, 6-10 mm. longo; sporis subglobosis v. late ellipsoideis, 5-6 \times 3,5-5.

Hab. ad terram humosam in pinetis Delmar, Albany Co. Amer. bor. — *Omph. integrellæ* proxima a qua differt præcipue statura multo minore, pileo umbilicato.

14. *Omphalia vestita* Peck, Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) 250 p. 345. — Pileo tenui, membranaceo, e. convexo subplano v. centro leniter depresso, minute pruinoso vel tomentoso, albo; lamellis paucis, distantibus, adnatis v. decurrentibus, albis v. albidis; stipite angusto, brevi, solido v. farcto, toto v. tantum basi pruinoso-pubescenti, sæpe ætate brunneolo; sporis subglobosis, 4-5 μ . diam.

Hab. ad terram humosam, Horseshoe isl., Ontario, Canada Amer. bor. — Pileus 2-3 mm. diam.; stipes 6-10 mm. longus, 0,5-1 mm. crassus. Omnium specierum minima, *Omph. integrellæ* et *pusillissimæ* affinis.

15. *Omphalia cylindraceo-campanulata* (P. Henn.) v. Höhn., Stzb. k. 251 Ak. d. Wiss. Wien, CXVIII (1909) Abt. I, p. 289, cum icone. — Ita vocandus *Marasmius cylindraceo-campanulatus* P. Henn. (Munsonia I, p. 53, Syll. XVI, p. 52) teste v. Höhn. l. c.

16. *Omphalia pseudodirecta* W. G. Sm., Syn. Brit. Basidiomyc. (1908) 252 p. 88. — Pileo plano-depresso, albo-pruinoso, 1,5-1,6 mm. diam.; stipite setiformi albo, deorsum farinaceo-granuloso, 2 mm. cr., e disco floccoso albo dein evanido oriente; lamellis paucis, adnatis ex albo croceis, pruinosis.

Hab. in conis Encephalarti culti in viridario Veitchiano Chelsea Britannia. — Totus fungillus 12-14 mm. alt. Stipites subinde pileo carentes.

17. *Omphalia byssiseda* Bres., in Rick Fung. austro-amer. n. 47 (1906); 253

Ann. Mycol. IV (1906) p. 309 et Contrib. Monogr. Agaric. etc. Broteria VI (1907) p. 73, t. IX, f. 4. (Diagnosis desideratur). — Insidens mycelio membrenaceo albo, cæspitosa; pileo udo pallide cervino, infundibuliformi, tenui, submembranaceo, glabro, levi, margine acutiusculo, facile fisso; stipite brevi gracili.

Hab. in lignis arborum frondosarum, tempore pluvio in silvis Rio Grande do Sul Amer. austr. — Notæ supra allatæ ex icone Rickii l. c. depromptæ.

18. **Omphalia condisciplata** Berk. — Syll. V, p. 319. — Huc teste 254 ipso auctore mscrp. pertinet *Mycena levigata* v. *campanulata* Rick Contr. monogr. Agar. et Polyp. Brasil. in Broteria 1907, p. 73, tab. III.

PLEUROTUS (Fr.) Quéf. — Syll. V p. 339, IX p. 45, XI p. 24, XIV p. 88, XVI p. 36, XVII p. 23.

1. **Pleurotus fuligineo-cinereus** (Britz.) Sacc., *Agar. fuligineo-cinereus* 255 Britzelmayr, Revis. Hymenomyce. I (1898) pag. 20. — Syll. XI, p. 27 (sub *Pl. Juglandis* Britz.). — Pileo 35 cm. long., 20 cm. lato, rotundato-elongato, conchato, levi, fere nitido, brunneo, griseo-brunneo, sæpius pluribus pileis concretescentibus, sessili; lamellis 18 mm. latis, udis albis, pallide griseis v. brunneolis, subconfertis; carne alba, basi 6 cm. cr., centro pilei 2 cm. cr.; massa sporarum alba; sporis elongato-cylindræis, 12-14 \times 3-4.

Hab. ad truncos vetustos *Juglandis* prope Augsburg Bavaricæ. — *Pl. ostreato* affinis.

2. **Pleurotus magnificus** Rick, Broteria V (1906) pag. 22. — Pileo 256 amplo 20 cm. lato, rigido, squamis fibrosis griseis tecto, ceterum sulphureo, margine striato, laterali, infundibuliformi; stipite excentrico, 10 cm. long., 2 cm. cr., striato, versus substratum albo-tomentoso, versus pileum annulato; annulo fibroso, evanescente, dilute stramineo; lamellis distantibus, ventricosis, rigidis, inæqualibus, raro anastomosantibus, versus pedem reticulatim unitis, luteo-albis; sporis cylindræis 12 \times 5, albis.

Hab. ad truncum *Psidii*, Rio Grande do Sul Brasilicæ. — *Pl. corticato* affinis et forsitan varietas ejus; differt colore intenso et pileo striato.

3. **Pleurotus imbricatus** (Earle) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 452. — 257 *Phyllotus* Earle, Estac. agronom. Cuba I (1906) p. 233, t. XXXIII. Pileo sessili, subtenui, 8-15 cm. diam., applanato, albo, velutino-pulveraceo, margine uniformi et striatulo; lamellis distinctis non

anastomosantibus, basi incurvatis, subremotis, parum latis, pleurumque in sicco rubentibus; sporis albis, fere cylindræis, 10-12 \times 4-5; odore grato.

Hab. dense cæspitoso-imbricatus ad truncos in ins. Cuba.

4. **Pleurotus populeti** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 27. — Britzel- 258
meyr, Revis. Hymenomyc. I, 1898, p. 20. — Pileo 14 cm. long.,
10 cm. lato, levi, brunneo, basi pallidiore, conchato; pileis con-
crescentibus sessilibus; lamellis 10 mm. latis, albidis; carne alba;
massa sporarum alba; sporis elongatis, 10 \times 3-4.

Hab. ad truncos Populi prope Burgau Bavariæ. — *Pleur. ostreato* affinis.

5. **Pleurotus Bourdotii** (Quélet) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 448. — 259
Calathinus Quélet Assoc. franç. avanc. Sc. XXVI (1897) pag. 3,
tab. IV, fig. 7 (extr.). — Pileo sessili v. vix in stipitem lateralem
tenuato, obovato, 15-25 cm. longo, mucro gelatinoso semifluido
hyalino obducto; carne tenera, farinam recentem redolente; la-
mellis adnato-decurrentibus, angustis; sporis elliptico-pruniformi-
bus, 8-10 μ . longis, hyalinis.

Hab. ad ramos dejectos quercinos, Bourbonnais Galliæ (Ab.
H. BOURDOT). — *Pl. fluxili* affinis.

6. **Pleurotus violaceospermus** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 27. — 260
Britz., Revis. Hymen. I (1898) p. 20. — Pileo 15 cm. long., 10 cm.
lato, conchato, varie laciniato, flavo-brunneo, subnitido, levi, vix
fibroso; stipite 5 cm. longo, 2 cm. cr., albido, lilacino-striato, quan-
doque stipite nullo; lamellis 12 mm. latis, confertis, albidis, flavo-
brunneolis, decurrentibus; carne alba, subtenui, sapore grato;
massa sporarum violacea; sporis elongatis cylindræis, 10-12 \times 3-4.

Hab. ad truncos arbororum variarum in Bavaria. — *Pl. ostreato*
affinis.

7. **Pleurotus convivarum** Dunal et Delile apud Lagarde, Bull. Soc. 261
mycol. France, XVII (1901) p. 231, t. IX, f. 2. — Longe stipi-
tatus, totus 18-20 cm. longus; pileo flabellato-conchato, fusco-
griseo, squamuloso, 5 cm. longo; lamellis decurrentibus, roseo-
albidis, subconfertis; stipite cylindræo, incurvato, prælongo,
crasso, albo, carnosio, glabro, 12-14 cm. longo, 2 cm. cr.

Hab. in fragmentis ligneo-coriariis pr. Monspelim Galliæ. —
Videtur forma monstrosa *Pleuroti ostreati*, sed stipite prælongo,
valde incurvato distinguitur. Comeditur.

8. **Pleurotus elongatipes** Peck, Journ. of Mycol. XIV (1908) p. 1. — 262
Pileo carnosio sed tenui, convexo v. subplano, margine æquali,

glabro, albo; carne alba; lamellis tenuibus, confertis, postice rotundatis, adnexus albis; stipite longissimo, solido v. farcto, plus minusve curvo v. flexuoso, plerumque excentrico, supra glabro, basi plus minusve tomentoso, albo; sporis globosis, 4 μ . diam.

Hab. in ligno dejecto in silvis prope Detroit, Michigan Amer. bor. (O. E. FISCHER). — Pileus 5-10 cm. latus; stipes 5-15 cm. longus, 6-10 mm. cr.

9. **Pleurotus tahitensis** Pat., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXII (1906) 263 p. 51. — Pileo carnosio, imbricato, dimidiato, sessili, albido, postice gibboso, glabro, margine incurvo, plicato-lobato, levi; lamellis albidis fuscescentibus, distantibus, strictis, acie integra, interstitiis levibus; sporis albis, ovoideis, 6-9 \approx 3-4; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos emortuos Pandani, Tahiti, Fakahina, Tikahan Polynesie (SEURAT). — *Pleur. ostreato* affinis.

10. **Pleurotus terrester** Peck, New York State Mus. Bull. n. 116 264 (1907) pag. 29. — Pileo tenui, late convexo, æquali, glabro, udo, albido 5-7,5 cm. lato; lamellis tenuibus, confertis, latis, leniter emarginato-adnexus, albidis; stipite æquali, levi, curvo, glabro, solido, excentrico, albido 5-7,5 cm. long., 6-8 mm. cr.; sporis albis, globosis, 7-8 μ . diam.

Hab. ad terram ad marginem silvarum West Fort Ann, Washington co. Amer. bor. (S. H. BURNHAM). — Pertinet ad sec. *Tricholomatarii*.

11. **Pleurotus Dracænæ** Torrend, Brotéria, ser. bot. VIII (1909) 265 p. 130. — Totus albus v. albo-flavescens; solitarius v. gregarius sed non imbricatus; dimidiatus; pileo excentrico, sublaterali, 4-5 cm., hemisphærico, floccis tenuibus ad modum squamularum consperso, postice subdepresso-marginato; stipite brevi, 1-1,5 cm. longo, glabro, ascendente; lamellis decurrentibus, basi discretis, inæquilongis, confertis, acie integra; basidiis clavatis; sporis ellipsoideis, interdum fusoides, 10-12 \approx 3-4.

Hab. ad truncum vetustum Dracænæ indivisæ, in insula Madeira (J. BARRETO). — *Pleur. pantoleuco* Fr. peraffinis.

12. **Pleurotus brunescens** (Earle) Sacc. et Trav., Index iconum 266 fungorum (Syll. XX), pag. 48. — *Geopetalum brunescens* Earle Estac. agronom. Cuba I (1906) p. 235, tab. XXXIII, fig. 2. — Pileo tenui medio disrumpente, 3-4 cm. lato, spathulato, applanato, fusco-pallido, non striato, glabro, basi leniter albo-sericeo; lamellis adnatis, vix decurrentibus, confertis, angustis, irregulariter connexis, pileo pallidioribus; sporis globosis, albis, 3-4 μ .

diam.; stipite laterali 1 cm. longo, 3 mm. cr., cylindrico, albo-sericeo, farcto.

Hab. solitarius ad fragmenta putrescentia, Guanajay in ins. Cuba. — *Pl. petaloidi* affinis.

13. **Pleurotus hygrophanus** (Earle) Sacc. et Trav. — Syll. XX p. 452. 267

— *Phyllotus hygrophanus* Earle, Estac. agronom. Cuba I (1906) p. 233, tab. XXXIV, fig. 2. — Pileo tenui, centro facile diffracto, 4-6 cm. diam., applanato, albo, hygrophano (in sicco opaco, udo pellucido), minute tomentososo, usque ad discum striato; lamellis distinctis, satis angustis, basi latioribus, tenuibus, medio sinuatis, albis; sporis albis, ellipsoideis, 8-10 \times 4-5; carne tenera, sapore grato, in sicco fragrante.

Hab. gregarius v. imbricatus ad truncum *Cocos butyraceæ* (*palma real*), Santjago de las Vegas in ins. Cuba. — *Pleur. imbricato* et *P. pinsito* affinis.

14 **Pleurotus serotinoides** Peck, in Hard Mushrooms p. 161, f. 124. — 268

Pileo carnososo, 2,5-7,5 cm. lato, compacto, convexo v. subplano, udo et juveni viscido, subreniformi v. rotundato, solitario v. cæspitoso et imbricato, varie colorato, obscure flavo, rubro-brunneo, viridi-brunneo vel olivaceo, margine primum involuto; lamellis confertis, determinatis, albidis v. flavidis; stipite brevissimo, laterali, crasso, basi flavido, minute lanuginoso v. minute nigro-squamuloso; sporis minutis, ellipsoideis, 5 \times 2,5.

Hab. ad truncos in Amer. bor. — Edulis; *Pl. serotino* affinis. 269

15. **Pleurotus salignus** (Schrad.) Quél. — Syll. V, p. 539. — var. **allochrous** (Pers. ex p., Lév.) *Pleurotus allochrous* (Lév.) Sacc. — Syll. XX, pag. 447. — Boudier, Icones mycol. I, n. 391, Paulet, Traité Champ. tab. XVII et XVIII fig. 1 (*Dendrosarcos Juglandis*). — A typo fuligineo-cinereo dignoscitur colore totius fungi ochraceo v. flavescente.

Hab. ad truncos cæsos in Gallia, Austria etc.

16. **Pleurotus concha** (Hoffm.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 449. — 270

Ag. concha Hoffm., Veget. Hercyn. subterr. p. 32, t. XVII, f. 3. — Pileo subcarnoso dimidiato, anguste flabellato, acute marginato, glabro, longitrorsum levissime striolato, stipiteque spadiceis; lamellis confertis, angustis, undulatis, inæquilongis, concoloribus; stipite brevissimo cylindrico omnino laterali, glabro.

Hab. ad ligna fodinarum putrida in Hercynia. — Initia fungi subinde resupinata, radiato-lamellata. — Pileus 6 cm. long., 3-4 cm. latus; stipes 8-10 mm. long., 5 cm. diam.

17. **Pleurotus eleuterophyllus** (Lév.) Sacc. et Trott. *Agaricus Pleurotus eleuterophyllus* Lév. Mém. Soc. Linnéenne 1825, pag. 31, pl. IV. — Pileo dimidiato, conchiformi, carnosio, fuscescenti; stipite subnullo v. tuberculoso; lamellis basi liberis, rotundatis, crassioribus, pileo dilutioribus. 271
Hab. ad truncos in Gallia. — Pileus 5-6 cm. alt., 8-9 cm. latus; lamellæ basi 10-12 mm. latæ. Videtur diversa a *Pano farinaceo* (= *Ag. eleuterophyllus* March.).
18. **Pleurotus umbonatus** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXII (1905) pag. 77. — Pileo carnosio, convexo, umbonato, fibrilloso, subsquamuloso, brunneo v. nigro-brunneo; carne alba, cuticula quandoque rimosa; lamellis latis, subdistantibus, adnatis v. leniter decurrentibus, in sicco brunneis; stipite excentrico, æquali v. supra angustato, farcto v. cavo, pileo concolori v. pallidiori; sporis albis, subglobosis v. late ellipsoideis, 5-6 \approx 4-5. 272
Hab. ad terram Kittaning Pa. Amer. bor. (D. A. SUMSTINE). — Pileus 2-7 cm. latus; stipes 2-4 cm. longus, 0,5-1 cm. cr.
19. **Pleurotus rhodophyllus** Bres. Ann. mycol. v. III (1905) p. 159. — Cæspitosus, raro simplex; pileis carnosio, flabelliformibus, siccis, albis, glabris, 1 $\frac{1}{2}$ -4 cm. latis, ad 1-3 cm. productis; lamellis albis, dein incarnato-isabellinis, confertis, postice attenuato-decurrentibus; stipite laterali, albo 2-3 mm. longo, crassoque in cæspitibus tuberculoso, unico; sporis hyalinis, in cumulo carneolis, oblongo-obovatis, 7-9 \approx 4-5; basidiis clavatis, 20-25 \approx 8; carne alba, molli, odore et sapore haud notabilibus. 273
Hab. ad truncos Ulmi campestris « Paludi pontine » pr. Romam (MARIANI). — *Pleuroto Opuntiae* Lév. proximus, a quo tamen optime distinctus.
20. **Pleurotus Eugeniæ** (Earle) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 451. — *Geopetalum Eugeniæ* Earle, Estac. agronom. Cuba I (1906) p. 234, tab. XXXII, fig. 3. — Pileo tenui, 2-4 cm. lato, applanato, suborbiculari v. subreniformi, albo v. basi cinerescenti, sicco, fibrilloso, excepto margine glabro et non striato; lamellis distinctis, decurrentibus, subremotis, angustis sed medio parum ventricosis et albis; sporis ellipsoideis, subcurvulis, 5 \approx 3; stipite 4-8 cm. long., 2 mm. cr., cylindrico, pilis densis, albis, rigidis prædito. 274
Hab. solitarius vel congregatus ad truncos vel radices putres Eugeniæ Jambos, Santiago de las Vegas in ins. Cuba.
21. **Pleurotus albus** (Earle) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 447. — *Geopetalum album* Earle, Estacion agronom. Cuba I (1906) p. 234, 275

tab. 34, fig. 1. — Pileo carnosio, duriusculo, fere sessili, plerumque non supino, 1-3 cm. diam., reniformi v. suborbiculari, convexo, primum pallide cinnamomeo, dein albido, sicco, basi minute tomentoso sed pro maxima parte glabro, contextu molli alutæ, margine uniformi, regulari non striato; lamellis adnatis v. dente decurrentibus, subremotis, latis, medio ventricosis, albis, in sicco ad colorem rubro-cinereum nutantibus; sporis anguste ellipsoideis, 8-10 \times 3-5; stipite (si adest) laterali, brevissimo, 4 \times 2 mm., adpresse piloso; albo, rigido.

Hab. solitarius v. gregarius ad ramos dejectos, Alto Cedro etc. in insula Cuba.

22. **Pleurotus Hollandianus** D. R. Sumstine, Journ. of Mycol. v. XII 276 (1906) pag. 59. — Horizontalis, imbricatus; pileo carnosio, tenui, sessili vel postice in stipitem brevem producto, semiorbiculari, ubique tomento denso tecto, albo vel luteo-albo, 1-3 cm. lat., 1-4 cm. long.; lamellis subdistantibus, simplicibus, inæqualibus, divergentibus, albidis, 1-3 mm. lat.; sporis subglobosis; cystidiis cylindraceo-fusoideis sursum acuminatis.

Hab. ad truncos putridos, Latrobe, Pennsylvania. — Tomento pilei denso species mox dignoscenda; quæ dicata est Doct. W. J. HOLLAND Musei Carnegiani directori. *P. petaloidi* affinis sed forma, tomento pilei, latitudine lamellarum differt.

23. **Pleurotus calceolus** (Pat. et Demange) Sacc. et Trott., *Calathinus* 277 *calceolus* Pat. et Dem. Bull. Soc. mycol. Fr. 1910, pag. 39. — Pileo sessili v. subsessili, versiformi, pro more unguato, 6-12 mm. lato, griseo-fusco, levi, non striato, in sicco rigido, villo albo, brevi, laxiusculo plerumque postice tecto, pilis cylindræis 75 μ . long.; pellicula grisea; trama heterogenea, strato sup., 300 μ . cr., gelatinoso, inferiori, 150 μ . cr. carnosio; lamellis albis, siccis flavidis, radiantibus, confertis, inæqualibus; cystidiis copiosis, fusoides valde emergentibus, 60-70 \times 10, sæpe incrustatis; sporis globosis, incoloribus, levibus, guttulatis, 6 μ . diam.

Hab. ad culmos Bambusæ spec. Hanoi, Tonkin. — Affinis *P. spiculifero*.

24. **Pleurotus aratus** (Pat. et Demange) Sacc. et Trott. *Calathinus* 278 *aratus* Pat. et Demange Bull. Soc. mycol. Franc. 1910, p. 38. — Dimidiatus, lateralis, postice non marginatus; stipite subnullo, nigricanti; pileo 1-4 cm. lato, subcarnosio, juniori regulari, dein flexuoso undulato, velutino, cinereo-fusco, striis confertis a margine ad centrum exarato; trama tenui, incolori, homogenea, non

gelatinosa; lamellis radiantibus, griseis v. flavidis; cystidiis acutis, hyalinis, levibus, $5 \approx 3-4$.

Hab. ad corticem *Artocarp*i *integrifolii*, Hanoi, Tonkin. — *Pl. applicato* valde affinis, sed sulcis regularibus, villo brevi, colore etc. diversus.

25. **Pleurotus applicatus** (Batsch) Quél. — Syll. V, p. 379. — var. 279
calopogon Pat. et Dem. Bull. Soc. mycol. Fr. 1910, p. 38 (*Calathinus*). — A typo differt pilei indumento piloso multo magis evoluto sporisque majoribus, usque ad $12-15 \approx 4-5$.

Hab. ad ligna putrescentia, Hanoi Tonkin.

26. **Pleurotus pruinosus** (Pat. et Demange) Sacc. et Trott. *Cala-* 280
thinus pruinosus Pat. et Demange, Bull. Soc. mycol. Fr. 1910, p. 38. — Pileo sessili, semiorbiculari dein spathulato, 5-10 mm. diam. ex albo cinerescente, postice flocculis pilosis, erectis, albidis consperso, antice glabro, striolato; trama homogenea, molli, gelatinosa, tenui, incolori; lamellis radiantibus, roseis v. rufescentibus; cystidiis fusoides, emergentibus, $35 \approx 10$; sporis . . .

Hab. ad ramos dejectos *Leguminosarum* arborescentium post pluvias, Hanoi Tonkin. — Affinis *Pl. applicato*.

27. **Pleurotus subsepticus** Henn., in Voeltzkow Reise in Ostafrika 281
(1908) p. 27, t. II, f. 16. — Pileo submembranaceo resupinato, sessili, albido, subsericeo, c. 1,5-3 mm. diam.; lamellis subconfertis, inæquilongis, pallidis; basidiis clavatis, $15-24 \approx 4-5$; sporis ellipsoideis, hyalinis, $6-7 \approx 5-6$.

Hab. ad ramos foliaque putrescentia, ins. Mauritius Africae. — Affinis *Pleur. septico* sed lamellis confertioribus, sporis majoribus distinctus.

28. **Pleurotus leucochrius** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 27. — Brit- 282
zelmayr, Revis. Hymenomyc. I (1898) pag. 20. — Pileo 1 cm. long., 1,8 cm. lato, conchato, ex albo-lacteo albido, molli, opaco, aspectu papyraceo, fere membranaceo, sessili; lamellis 3 mm. latis, confertis, albis; massa sporarum alba; sporis globosis et breviter apiculatis, $6-7 \mu$. diam.

Hab. in ligno fagineo putri, prope Teisenberg Salisburgiæ.

29. **Pleurotus Zimmermanni** (Eichelb.) Sacc. et Trott. *Agaricus Zim-* 283
mermanni Eichelb., Verh. Naturw. Ver. Hamburg, 3. Folge, XIV (1906) p. 77. — Pileo pallescente, conchiformi, 1 cm. lato, carnosio, margine parum gibboso et undulato, diaphano; stipite excentrico, albo-melleo, subnitido, sulcato, basi rubro-piloso, 2 mm. long. vix 1 mm. cr.; lamellis laxis, nonnullis brevioribus immixtis,

albis, acie flava dentata; sporis albis, hyalinis, levibus, sphaeroidis, 4-5 μ . cr.

Hab. ad caudices prope Amani Africæ bor. — Rarius occurrit.

30. **Pleurotus longipes** Boud. Bull. Soc. Myc. Fr. XXI (1905) p. 69, 284
tab. III, fig. 1. — Pileo excentrico v. spathulato, 1,5-2 cm. lato, carnosus, glabro, centro depresso, fusco-umbrino; stipite pleno, levi, pallidiori, 3 cm. c. longo, 2-3 mm. cr., cylindraco v. basi attenuato; lamellis subdecurrentibus, albido-ochraceis, 1,3 mm. latis; basidiis bisporis, 40-45 μ . (cum sterigmatibus) longis, 12-14 μ . cr., capitulo granuloso, conoideo 18-35 μ . longo, ad basim 18-20 μ . cr.; sporis albis, oblongis, levibus, intus granulosis, hylo conspicuo, 11-13 \approx 5-6.

Hab. in sphagnetis pr. Chaux-des-Prés Jura Galliæ (HETIER).

31. **Pleurotus pusillus** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 285
(1909) p. 262. — Pileis excentrice orbiculatis, unguiformibus, 2-5 mm. diam., tenuissimis, margine integris, primo subinvolutis serius rectis, non striatis, puncto latiusculo adfixis; lamellis e centro radiantibus confertiusculis utrinque attenuato-acutatis, acie integerimis; basidiis clavulatis, 15 \approx 4,5, sterigmatibus sæpius 4 brevissimis coronatis; sporis elliptico- v. subovato-subnavicularibus, 4-5 \approx 2,5, eguttulatis hyalinis levibus.

Hab. ad terram humosam in foveis prope Jujuy Argentinæ. — Species *P. septico* Fr. affinis sed magis carnosus et sporis conspicue minoribus distinctus.

32. **Pleurotus ambiguus** (Lév.) Sacc. et Trotter, *Agaricus (Pleuropus)* 286
ambiguus Lév. Mém. de la Soc. Linnéenne (1825) pag. 6 (extr.) pl. V, f. 2. — Gregarius, minimus; pileo albo, farinaceo, 4-5 mm. lat., membranaceo, irregulari; stipite excentrico, filiformi, pleno, 7 mm. alto, 0,5 mm. cr., albo, basi paullo incrassato; lamellis albis, stipiti adnatis, basi rotundatis.

Hab. ad ramos emortuos in Gallia.

33. **Pleurotus trutinatus** (Britz.) Sacc. — Syll, XI, p. 27. — Pileo 287
tenui, flabellato, breviter stipitato, sordide et pallide flavo-brunneo, 1,5 cm. long. et fere totidem lato, glabro; stipite 2-3 mm. long., 1,5 mm. cr.; lamellis ex albido flavo-brunneolis, angustis, utrinque acutis, confertis; sporis oblongo-ellipsoideis, hyalinis, 6 \approx 3-4.

Hab. in truncis putridis in Bavaria australi. — Affinis *Pleur. petaloidi*.

34. **Pleurotus Caldwellii** Mac Key, Proc. and Trans. Nova Scotia 288

Inst. Sc. XI (1905) (sec. Just Jahresb. 1906). — Diagnosis nunc desideratur.

Hab. in Nova Scotia, Amer. bor.

35. **Pleurotus japonicus** Kawamura, Bot. Mag. Tokyo XXIV (1910) 289 p. (165-177) et (203-213) Japonice. Diagnosis desideratur.

Hab. in Japonia.

HYGROPHORUS Fr. — Syll. V p. 378, IX p. 52, XI p. 27, XIV p. 91, XVI p. 39, XVII, p. 26 *). — Ab hoc genere cl. Maire (Recherch. cytol. et taxon. Basid., 1902, p. 116, tab. IV et VII) seposuit *Hygroph. conicum* et *Hygr. ceraceum* sub nomine *Godfria*, quæ distingueretur ob tramam pilei omnino regularem et imprimis ob basidia constanter bispora.

1. **Hygrophorus spectandus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 29. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 14. — Pileo ex igneo-rubro lateritio, centro obscuriore, margine pallidiore, campanulato, dein late convexo et centro umbonato, vix fibrilloso, 12 cm. lato; stipite 12 cm. longo, supra 1 cm. cr., basi incrassato, subcavo; lamellis remotis, emarginato-decurrentibus, pallide igneo-flavis, 12 mm. latis; carne inodora; massa sporarum alba; sporis elongatis 10-11 \approx 5-6, nunc grosse nunc minute uniguttulatis.

Hab. ad terram Baviaræ. — *Hygr. specioso* affinis.

2. **Hygrophorus acutisporus** Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) pag. 13, tab. 438, fig. 20. — Pileo 10 cm. lato, convexo, late umbonato, pallide rubido-flavo; stipite 10 cm. alto, 2,5 cm. cr., basi angustato, farcto v. subcavo, pileo concolori; lamellis remotis, crassis, albidis, albido-carneis, ex adnato decurrentibus, 10 mm. lat.; carne alba; sporis albo-hyalinis, 8-10 \approx 4, elongato-rotundatis, granulosis, elongatis et acutatis, interdum obtuse acuminatis.

Hab. ad terram sabulosam, silvaticam in Bavaria.

3. **Hygrophorus rubro-fibrillosus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 28. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 12. — Pileo glutinoso, 9 cm. lato, albo, e centro rubro-carneo-brunneo minute fibrilloso, margine albo, parum fibrilloso; stipite 10 cm. long., 1,5 cm. cr., basi subincrassato v. etiam attenuato, albo. supra parum rimoso, farinoso, farcto; lamellis remotis, albidis, rubidis, decur-

*) Cfr. F. BATAILLE, *Flore monographique des Hygrophorus*. Besançon, 1910.

rentibus 10 mm. latis; carne alba; massa sporarum alba; sporis 10 \approx 6, elongatis.

Hab. in silvis Coniferarum Baviariæ. — *Hygr. pudorino* affinis.

4. **Hygrophorus viscosissimus** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.- 293
Selsk. Skr., 1904, n. 5, p. 86 (e subg. *Limacium*). — Valde glu-
tinosis; pileo subconvexo, sine umbone, glabro, isabellino, disco
obscuriore distincte determinato; lamellis albidis, decurrentibus;
stipite glabro, æquali, pallido.

Hab. prope Christianiam Norvegiæ.

5. **Hygrophorus eburneolus** Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV 294
(1899) p. 12, tab. 435, fig. 6, tab. 448, fig. 68, tab. 450, fig. 79. —
Pileo glutinoso, convexo, medio umbilicato vel depresso, albo, cen-
tro subflavido, 8 cm. lato; stipite glutinoso, farcto vel subcavo,
20 cm. longo, supra 1,5 cm. cr., basi nunc incrassato nunc atte-
nuato, albo; lamellis albis, demum cremeis, venosis, adnatis v.
decurrentibus, 1 cm. lat.; sporis albo-hyalinis, ellipsoideis, altero
fine acuminatis, 9-11 \approx 4-5.

Hab. frequens in silvis præcipue fagineis alpium Salisbur-
giæ, Algovia, Friburgiæ.

6. **Hygrophorus persistens** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 29. — Brit- 295
zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 14. — Pileo plerumque
glutinoso, flavo, flavo-rubro, conoideo sed etiam campanulato-ex-
panso, 8 cm. lato; stipite 11 cm. long., supra 4 mm. lato, basi
incrassato, cavo, pileo concolori, glutinoso; lamellis adnatis, 10
mm. latis, albo-flavidis, subconfertis; carne flavida non nigricante;
massa sporarum alba; sporis 10-16 \approx 6-10, irregulariter elongatis,
sæpe utrinque applanatis.

Hab. in silvis et turfosis Algovia et Baviariæ.

7. **Hygrophorus albo-roseus** Britz. — Sacc. Syll. XI, pag. 28. — 296
Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 12. — Pileo con-
vexo, late umbonato, carnosio, margine curvato, albido, rubro-roseo
leviter rubro-sanguineo, 8 cm. lato; stipite 7 cm. longo, 2 cm.
cr., basi nunc attenuato, nunc incrassato, farcto, pileo concolori,
sed pallidiori; lamellis 4 mm. latis, albis v. albidis, acie roseis,
remotis; carne alba, lenissime roseo-tincta; massa sporarum alba;
sporis globosis 10-12 μ . diam.

Hab. in silvis Baviariæ. — *Hygr. purpurascenti* affinis.

8. **Hygrophorus Lauræ** Morg. — Syll. V, p. 388. — var. **decipiens** 297
Peck, 58 Rep. (1904) p. 46, tab. 88, fig. 8-11. — A typo differt

colore persistente, etiam in sicco, forma graciliori et plerumque cæspitosa.

Hab. ad terram inter folia dejecta in Amer. bor.

9. **Hygrophorus hypotheius** Fr. — Syll. V, p. 396. — var. **expallens** 298
Boud. Ic. mycol. I, tab. 33 (Ser. III, p. 14, n. 240). — A typo colore pallidiore et in pileo vix olivaceo, minus viscoso et lamellis dilutius flavis.

Hab. in silvis sub Pinis in Gallia.

10. **Hygrophorus squamulifer** Boud., Icon. Mycol. I, tab. 35 (ser. II, 299
p. 15). — Medius, sat robustus, 7 cm. altus, totidem latus, omnino pallide cinereo-ochraceus; pileo expanso, subumbonato, tenui, squamulis minutis acuminatis saturatoribus undique tecto; stipite valido, farcto aut subcavo, ad basim potius attenuato, inæquali, pallido, inferne ochraceo; lamellis latis albidis, emarginatis, dente decurrente; carne pallida ad basim stipitis lutescente; sporis albis centro 1-guttulatis, 4-6 \approx 3-4.

Hab. ad terram argillaceam silvaticam, Ecoeuen Gallia. — Habitus fere *Tricholomatis tigrini* sed genuinus *Hygrophorus*.

11. **Hygrophorus nitrosus** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. 300
Skr., 1904, n. 6, p. 88 (ex errore *nitiosus*) *H. metapodius* Fr. sec. Kalchbrenner t. 25, f. 2, Cooke Ill. t. ? 918 — A typo imprimis differre videtur odore conspicue nitroso (nitrati potassici), nec farinæ recentis.

Hab. ad terram in Norvegiæ pluribus locis.

12. **Hygrophorus pertractus** Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV 301
(1899) p. 14, tab. 440, fig. 39. — Pileo conoideo, dein applanato v. etiam campanulato et demum expanso, medio parum acute umbonato, flavo, flavido-rubro, 6 cm. lato; stipite 9 cm. alto, 5 mm. cr., basi incrassato, cavo; pileo concolori, quandoque subpallidiori; lamellis adnaxis, 10 mm. lat.; flavis, sed initio e pallido albidis, remotis; carne flavida nunquam nigrescente; sporis albo-hyalinis, 5-6 \approx 2-3, breviter ellipsoideis, sæpe uniguttulatis.

Hab. in silvis Algovia. — *Hygr. obrusseo* affinis.

13. **Hygrophorus flavipes** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 28. — Britz 302
zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 13. — Pileo convexo, late umbonato sed etiam centro depresso, 6 cm. lato, subluceni, griseo, violaceo v. rubido-griseo, opaco v. sericeo, non glutinoso; stipite 6 cm. long., 2 cm. cr., varie incrassato, attenuato et curvato, griseo-albido sed basi flavido; lamellis ex adnato-emarginatis decurrentibus, 5 mm. latis, griseo-albidis, griseis, remotis, venosis;

carne grisea v. rubro-grisea, basi in stipite flava, inodora; massa sporarum alba; sporis 6-8 \times 6, subglobosis, subapiculatis.

Hab. in margine silvarum Algoviæ. — *Hygr. glauco* affinis.

14. **Hygrophorus corticola** (Feltg.) Sacc. et Trott. *Limacium corticola* 303

Feltg. Vorst. Pilz-Fl. Luxemb. II T. (1906) p. 108. — Pileo applanato v. ad marginem parum involuto, 5-6 cm. lato, superficie mucoso-glutinosa, alba; lamellis crassis, inæqualiter longis, albis; stipite centrali, albo, basi crassiusculo, brunneolo, supra albo-farinoso 3-4 cm. longo, 1,5 cm. cr.; sporis globosis vel ellipsoideo-ovoideis, flavidulis, contentu granuloso, 16-19 (raro usque 22) \times 16.

Hab. solitarius ad corticem putrescentem, Bereldinger Wald, Luxemburg. — *Hygroph. eburneo* proximus.

15. **Hygrophorus ?solifugus** Feltg., Vorst. Pilz-Fl. Luxemb. IV (1905) 304

pag. 22. — Pileo applanato v. margine parum revoluta, mucoso, albo, 5-6 cm. lato; lamellis crassis, varie longis, adnexus, parum decurrentibus, concoloribus; stipite centrali, concolori, basi parum incrassato ex albo brunneolo, supra albo-farinaceo, 3-4 cm. long.; 1,5 cm. cr.; sporis globosis v. ellipsoideo-ovoideis, pallide flavis, granuloso-farctis, 16-19(-22) \times 16.

Hab. ad truncum corticatum lichenosum Fagi, Bereldinger Wald, Luxemburg.

16. **Hygrophorus subvirens** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 28. — Britz. 305

zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 15. — Pileo campanulato dein expanso-umbonato, 4 cm. lato, centro viridi, margine mucoso et subflavido; stipite 8 cm. long., supra 5 mm. cr., basi incrassato, subcavo, supra viridi, basi pallidiore vel flavido v. albedo; lamellis adnexus, etiam adnatis, remotis, flavis, viridi-flavis, 5 mm. latis; massa sporarum alba; sporis elongatis, 8 \times 4.

Hab. in silvis Algoviæ. — *Hygr. psittacino* affinis.

17. **Hygrophorus discolor** (Feltg.) Sacc. et Trott. *Limacium discolor* 306

Feltg., Vorst. Pilz-Fl. Luxemburg, II T. (1906) p. 109. — Pileo plano-convexo, subumbonato, margine tenui parum incurvato, velo intus albo, extus nigrescente, margini adhærente, centro flavo-brunneo v. griseo-viridi-flavo, margine griseo-brunneo nitido, humido glutinoso, 3 cm. lato; carne centro 6-7 mm. cr., versus marginem tenuiori, alba stipite 7 cm. longo, 6-7 mm. cr., supra albedo et parum granuloso, subtus griseo-brunneo et parum fibroso, cavo, basi subincrassato et albo-tomentoso; lamellis crassiusculis brevioribus et longioribus regulariter alternantibus, latis, adnatis dense decurrentibus, acie denticulato-villosula, superficie

griseo-roseola, subglutinosa, 0,5 mm. lata; sporis ovoideo-ellipsoideis, plerumque inæquilateris, basi lateraliter apiculatis, levibus, contentu griseo-lubido, 8-9 \times 4-5.

Hab. in pinetis, Grünewald-Dommeldingen Luxemburgiæ.

18. **Hygrophorus coloratus** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 122 307 (1908) pag. 21 et p. 159. — Pileo carnosio, convexo v. subplano, sæpe umbonato, levi, viscoso, luteo, aurantiaco vel cinnabarino; carne alba, sub pellicula flava; lamellis inæqualibus, distantibus, arcuatis, adnato-decurrentibus, ex albo flavescentibus; stipite æquali, subinde deorsum incrassato, glutinoso, farcto v. cavo, albo v. leviter flavo, in juventute subinde ad apicem velo floccoso tecto; sporis subellipsoideis, 8-10 \times 5-6.

Hab. in locis humidis sub Abietibus et Laricibus, Amer. bor. — Pileus 2,5-6,5 cm. latus; stipes 5-7,5 cm. altus, 4-8 mm. cr.

19. **Hygrophorus cantharelliformis** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 28. — 308 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 14. — Pileo convexo centro emarginato, 3 cm. lato, albo-flavido v. carneo-flavido; stipite pileo concolori, farcto, 2 cm. long., 4 mm. cr.; lamellis remotis, venoso-plicatis, albidis, flavidis, decurrentibus; massa sporarum alba; sporis 8 \times 6, globosis, uno apice acutatis, guttulatis.

Hab. ad terram prope Bergwald Salisburgiæ. — *Hgrophoro micaceo* affinis.

20. **Hygrophorus Burnhami** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 309 (1907) p. 24 et p. 56. — Pileo carnosio, e late conoideo convexo v. subplano, 2,5-5 cm. lato, tempore humido molli, glabro v. margine leniter et obscure innato-fibrilloso, brunneo-nigro, carne alba; lamellis angustis, quandoque furcatis, subdistantibus, adnatis vel leniter decurrentibus, albis; stipite æquali, basi sæpe angustato, fibrilloso-striato, solido, ex albido pileo concolori, intus albo et basi albo-tomentoso 3,5-7,5 cm. longo, 8-12 mm. cr.; sporis ellipsoideis, 7,5-10 \times 5-6.

Hab. gregarius in silvis West Fort Ann, Washington Co. Amer. bor. (S. H. BURNHAM).

21. **Hygrophorus laricinus** Peck, Edible fungi (1900) p. 146, tab. 41, 310 fig. 1-12. — Pileo carnosio, convexo v. subplano, udo viscido, rubido, rubro-brunneo v. griseo-rubro usque ad 2,5 cm. lato; carne alba sub cuticula adnata flavida; lamellis distantibus, adnatis vel leniter decurrentibus, albidis; stipite æquali, firmo, cavo v. etiam farcto, albo 2,5-5 cm. long., 4-6 mm. cr.; sporis ellipsoideis, 5-7 \times 3-5.

Hab. ad terram prope Warrensburg Amer. bor.

22. **Hygrophorus croceophyllus** Bres. Ann. Mycol. V (1907) p. 237. — 311

Pileo carnosio, e convexo umbilicato, substramineo (in alcohole), 2-3 cm. lato; lamellis arcuato-decurrentibus, distantibus, aurantiacis; stipite a basi attenuato, fistuloso, pileo concolori, usque ad 10 cm. longo, apice 4-5 mm., basi, 5-6 mm. cr.; basidiis clavatis, 36-45 \approx 8-9; sporis globoso-obovatis, substramineis, 10-11 \approx 7 $\frac{1}{2}$ -9.

Hab. ad terram in insula Java (HEINRICHER). — Specimina in alcohole unicoloria, luride sulphurea. *Hygr. gedehensi* P. Henn. videtur proximus.

23. **Hygrophorus lectus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 28. — Britzel- 312

mayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 14. — Pileo brunneolo centro obscuriore, hemisphærico v. convexo, umbone lato prædito; 2-4 cm. lato; stipite albido, 4 cm. long., nunc tenui nunc crasso, æqualiter 4-10 mm. cr., basi quandoque attenuato, farcto; lamellis albis, subremotis, adnatis v. subdecurrentibus, 4 mm. latis; carne brunneo-alba; massa sporarum alba; sporis 8-10 \approx 4-5, elongatis, sæpe uno apice breviter acutatis.

Hab. ad terram udam Bavaricæ. — *Hygr. fornicato* affinis.

24. **Hygrophorus erinaceus** Patouill., Bull. Soc. Myc. Fr. XXV (1909) 313

pag. 10. — Pileo carnosio e campanulato plano-depresso, 3-4 cm. alto, undulato-sinuato, pallide flavo, squamis recurvis, latis, nigricantibus variegato, margine sulcato; lamellis flavis, crassis, latis-
simis, distantibus, brevioribus immixtis, decurrentibus; sporis ovoideis, hyalinis 6 \approx 4; stipite farcto, flavo, sub lente squamulis minutis brunneis virgato.

Hab. ad terram humosam, Dalat, Dangkia, Annam (EBERHARDT).

25. **Hygrophorus gomphidioides** P. Henn., in Voeltzkow Reise Osta- 314

frika III (1908) p. 26, tab. II, fig. 15. — Pileo carnosulo, convexo, medio depresso dein subinfundibuliformi, subradiatim sulcato-rugoso, testaceo v. rufo-brunneolo, 2-4,5 cm. diam., margine tenui, subinvoluta et subrepando; stipite cavescente, tereti æquali, pallide rubescente, 2-3 cm. longo, 5-8 mm. crasso; lamellis decurrentibus distantibus, inæquilongis, basi anastomosantibus ventricosis, pallide olivaceis; basidiis clavatis, 30-36 \approx 5-7; sporis ellipsoideis v. subovoideis, intus granulatis, hyalinis 5-6 \approx 4.

Hab. ad terram, Sakana Madagaskar. — Species ob cutem rugosam valde distincta.

26. **Hygrophorus mephiticus** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII (1906) 315

p. 213. — Pileo tenui, convexo, dein plano v. subplano, glabro,

hygrophano, udo margine striatulo et flavido-brunneo, sicco ochraceo, griseo-tincto; carne albida, sæpe flavo-tincta; odore mephitico; lamellis latis, crassis, inæqualibus, distantibus, sinuatis, adnexis, venis sæpe connexis, undulatis, griseo-violaceis v. griseo-purpureis; stipite æquali v. basi angustato, curvato v. flexuoso, fragili, cavo, pileo concolori v. pallidiori, basi tomento myceliaceo albido vestito; sporis albis, ellipsoideis, 8-12 \times 6-7.

Hab. ad terram inter Sphagna, Stow, Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS). — Pileus 2-4 cm. latus; stipes 3-5 cm. longus, 2-5 mm. cr.

27. **Hygrophorus pseudericus** P. Henn., in Voeltzkow Reise Ostafrika III (1908) p. 26, tab. II, fig. 13. — Pileo carnosulo, convexo subumbonato, dein medio depresso umbilicato, albido, levi, glabro, margine, tenui, rigido, c. 2-2,5 cm. diam.; stipite cavo, compresso, superne subincrassato, albido, levi, glabro, 3-3,5 cm. longo, 4-6 mm. cr.; lamellis decurrentibus, distantibus, inæquilongis, ventricosis, ceraceis, c. 2-3 mm. latis, albidis; basidiis clavatis; sporis ovoideis, 1-guttulatis, hyalinis, 7-8 \times 6-7.

Hab. ad terram Ste. Marie, Madagascar. — *H. ericeo* proximus sed sporis ovoidois præcipue diversus.

28. **Hygrophorus Davisii** Peck, Bull. Torr. Bot. Club XXXIII (1906) p. 214. — Pileo convexo, membranaceo, fragili, glabro, viscido, juveni margine æquali, dein striato, olivaceo-brunneo, juveni et udo olivaceo-griseo variegato; lamellis tenuibus, inæqualibus, distantibus, decurrentibus, albo-griseis; stipite angusto, æquali vel supra leniter angustato, flexuoso, fragili, cavo, viscido, glabro, albo-griseo, dein brunneo; sporis late ellipsoideis, albis, 6-7 μ . long., 4-5 μ . latis.

Hab. ad terram in humidis silvaticis, Stow, Massachusetts Amer. bor. — Pileus 1-1,2 cm. latus; stipes 2-3 cm. longus, 1,5-2 mm. crassus.

29. **Hygrophorus obconicus** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. 131 (1909) p. 36. — Pileo carnosulo, medio crasso, convexo v. subplano, deinde centro depresso, 1,5-2,5 cm. lato, glabro, pruinoso, albo v. albido, disco flavido v. griseo-flavido, maturitate pallido-alutaceo; carne alba; lamellis crassis, distantibus, ventricosis, longe decurrentibus, albis; stipite recto v. flexuoso, 2-2,5 cm. long., æquali v. deorsum attenuato, 6-10 mm. cr., fragili, farcto, albo; sporis subglobosis, 4-6 \times 4-5.

Hab. inter Sphagna, Stow Mass., Amer. bor. (S. DAVIS).

30. **Hygrophorus citrinus** Rea, Trans. Brit. Mycol. Soc. III (1910) 319 p. 228, tab. XI. — Pileo tenui e convexo plano, citrino, viscido, 1-2 cm. lato, margine striato; stipite 1-2 cm. longo, 2-3 mm. cr., solido, basi attenuato, apice albo, deorsum citrino, viscido; carne concolori; lamellis 2-3 mm. latis, subconfertis, albido-citrinis, adnato-decurrentibus; sporis albis, ellipsoideis, 7-7,5 \times 5, uniguttulatis.

Hab. ad margines herbidos viarum pr. Grindleford Britanniae.

31. **Hygrophorus Reai** R. Maire in Trans. Brit. Mycol. Soc. III (1910) 320 p. 170, t. XI et Bull. Soc. mycol. Fr., 1910, pag. 164, tab. VI, f. 1-5. — Pileo carnosio, tenui convexo-campanulato dein plano coccineo, 1,5-2,5 cm. lato, margine flavo-aurantiaco, udo leviter striato, pellicula non separabili; stipite viscido glabro, lucido, nitido, cavo, aurantiaco-rubro v. flavo, basi albido, 3-6 cm. long., 2-3 mm. cr.; lamellis late adnatis, dente decurrentibus, latis, tenuibus, inæqualibus, non confertis, carneis dein aurantiis; acie ex albo flavida; carne aurantia, fortiter amara et inodora; sporis albis hyalinis, ellipsoideis, apiculatis, levibus, 7-8 \times 3,5-4,5; basidiis clavatis, tetrasporis, 35-40 \times 7-8.

Hab. in pascuis prope Basslow Britanniae nec non in Gallia et Suecia. — Ab *Hygr. coccineo* et affinibus differt sapore amaro et stipite viscido.

32. **Hygrophorus Lauræ** Morg. — var. **decipiens** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 94 (1905) p. 39 et 46. — Pileo tenui; stipite angusto, usque ad 12 mm. cr., basi plerumque caespitoso et attenuato, pileo arescendo colore immutabili; lamellis propterea fere immutabilibus.

Hab. ad terram pr. Elm Lake Hamilton co. Amer. bor. — Edulis.

33. **Hygrophorus isabellinus** P. Henn, in Voeltzkow Reise Ostafrika III (1908) p. 26, tab. II, fig. 14. — Pileo membranaceo-ceraceo, convexo, medio depresso, squamosulo, 7-11 mm. diam., isabellino, margine tenui, interdum subundulato; stipite tereti æquali, levi, glabro, 1,5-2 cm. longo, 1,5-2 mm. lato, pallido; lamellis decurrentibus inæquilongis c. 1 mm. latis, cinereis; basidiis clavatis; sporis ellipsoideis v. ovoideis, hyalinis, 8-10 \times 7-8.

Hab. ad terram argillaceam, Mahafaly Madagascar.

34. **Hygrophorus ruber** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 (1907) 323 p. 32. — Pileo tenui, conico, acuto vel subobtusio, cuspidato vel anguste umbonato, viscido v. glutinoso, viridi-rubro, arescendo non nigricante, 1,5-5 cm. lato; lamellis angustis, ascendentibus, adnatis, subdistantibus, flavis v. flavo-brunneis; stipite æquali, vi-

scido, cavo, pileo concolori, 2,5 cm. longo, 2 mm. cr.; sporis sub-ellipsoideis, 5,5-7,5 × 3,5-5.

Hab. in locis silvaticis humidis, Ellis, Stow, Cohasset, Mass. Amer. bor. (G. E. MORRIS). — *Hygr. conico* proximus sed distinctus.

35. **Hygrophorus serotinus** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 324 (1907) p. 32 et in Hard, Mushrooms p. 221, fig. 177. — Gregarius v. cæspitosus; pileo carnosio sed tenui, convexo v. subplano, margine tenui, sæpe sursum incurvato, glabro v. parce fibrilloso, centro rubro, margine albido, 16-30 mm. lato; carne alba, sapore dulci; lamellis tenuibus, subdistantibus, adnatis v. decurrentibus, albis, interstitiis leniter venosis; stipite æquali, farcto vel cavo, glabro, albido, 2,5 cm. longo, 3-5 mm. cr.; sporis albis, ellipsoideis, 7,5 × 5.

Hab. in silvis Quercus et Pini, Hammond prope Boston Mass. Amer. bor. (E. B. BLACKFORD). — *Hygr. Queletii* et *Hygr. subrufescenti* affinis.

36. **Hygrophorus flavo-nitens** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. 325 Skr. (1904) n. 6, p. 89 (E subgen. *Camarophyllus*). — Pileo carnosio, convexo, margine substriato, primitus cinereo-livido, demum pallido, glabro; lamellis dente decurrente, canescentibus, postice nitido-flavescentibus; stipite solido, albo, nitido, sericeo-fibrilloso, vegeto flavescente.

Hab. in clivibus aridis Norvegiæ.

37. **Hygrophorus basidiosus** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 326 (1907) p. 57. — Ita vocanda est *Clitocybe basidiosa* Peck — Syll. IX, p. 25 — teste auct.
38. **Hygrophorus rubro-punctus** Peck nom. nov., N. Y. St. Mus. Bull. 327 n. 116 (1907) p. 49. Est *Hygrophorus glutinosus* Peck (Syll. XVII, p. 27) nec *Hygr. glutinosus* (Bull. ut *Agaricus*) Peck.

AGARICOCHÆTE Eichelb., Verh. Naturw. Ver. Hamb. 3 Folge, XIV (1906) p. 58 (Etym. *Agaricus* et *chæte* seta). — Lamellæ foliiformes, crassæ, in stipitem decurrentes, longe aculeatæ. Sporæ albæ, rotundatæ v. oblongatæ. — Gen. *Hymenochætæ* Lév. et *Hydnochætæ* Bres. affine; ob lamellas sat crassas prope *Hygrophorum* collocandum videtur, etsi non parum dubium.

1. **Agaricochæte Hericium** Eichelb. l. c. p. 59. — Pileo 3 cm. lato, 328 luride albido, superficie præcipue centrum crebro papillis verruciformibus prædito; stipite 4 cm. alto, 3 mm. cr., rigido, cavo, concolori, papilloso; lamellis liberis, crassiusculis, confertis, nonnullis

brevioribus immixtis, pileo concoloribus, raro furcatis, verrucoso-aculeatis; basidiis raris 8,6 μ . cr., sterigmatibus 3 \times 1,5; sporis albis, levibus, hyalinis, ovoideis, 8 \times 4,3.

Hab. ad terram, ut videtur, Bomole, Amani Africae trop. — Raro.

2. **Agaricochæte mirabilis** Eichelb. l. c. pag. 58. — Pileo convexo, 329 centro leniter depresso, 2 cm. lato, carnosulo, hygrophano, viscosulo, luride atro-umbrino, velo omnino destituto, piloso, margine pallidiori revoluta; carne rosea; stipite 3 cm. alto, 0,75 cm. cr., corticato, farcto, extus fibroso, pallide brunneo, deorsum acutato; lamellis flavis, crassis, laxis, nonnullis brevioribus immixtis, curvatis; hymenio aculeis longis cystidiiformibus, medio incrassatis, apice rubris undique tecto, 172 \times 17; sporis levibus, albis 8 \times 5; basidiis apice non clavatis; sterigmatibus 6 μ . long.; cystidiis typicis 60 \times basi 20, apice 16 μ . cr.

Hab. ad terram, ut videtur, Mongaweg Amani Africae trop. — Raro.

LACTARIUS Fr. — Syll. V p. 423, IX p. 56, XI p. 31, XIV p. 94, XVI p. 43, XVII p. 29 *).

1. **Lactarius azonus** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 31. — Britzelmayr, 330 Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 16. — Pileo non zonato, 11 cm. lato, effuso-convexo, centro depresso, sæpe subviscoso, carneo, carneo-brunneolo, griseo-carneo; stipite pallidior 9 cm. long. 1,5 cm. cr., farcto v. lacunoso-cavo, basi attenuato v. incrassato, sæpe subbulboso; lamellis 5 mm. latis, non late decurrentibus, subconfertis, pallide flavidis subcarneis; lacte et carne albis, albidis, dein violaceis; sapore subingrato; massa sporarum alba; sporis 10-14 \times 8-10, ellipsoideis, asperulis.

Hab. in silvis fagineis Salisburgiæ. — *Lactarius violascenti* affinis.

2. **Lactarius Russula** Rick, Broteria v. V, 1906, p. 20, VI (1907) 331 pag. 74, tab. IX, fig. 2, 5. — Pileo depresso, usque 1 dm. lato, carnosofragili, rugoso, glabro, cinereo-fuligineo, margine depresso; stipite 5 cm. alto, cavo, brunneo, subtiliter velutino; lamellis latis, adnatis, rigidis, fragilibus, late distantibus; lacte albo, acerrimo;

*) Cfr. monographiam cl. ræ G. S. BURLINGHAM: *A Study of the Lactariæ of the United States*; New York, 1908 (Mem. of the Torr. Bot. Cl. XIV).

pileo fracto nigrescente; sporis subrotundis, guttulatis, 6 μ . diam., echinulatis, albis.

Hab. ad terram in silvis, Rio Grande do Sul Brasiliæ. — Habitus *Russulæ nigricantis* sed verus *Lactarius*; differt præcipue stipite atro-purpureo et velutino sed primitus cinereo.

3. **Lactarius platicus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 31. — Britzel- 332
mayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 16. — Pileo hemisphæ-
rico dein expanso, 10 cm. lato, centro brunneo, margine pallidiore
v. albo; stipite lacunoso-cavo, 7 cm. long., supra 1,5 cm. cr., basi
angustato, albido; lamellis subconfertis, albis, tritis brunnescenti-
bus, rotundatis ex adnexo adnatis, 6 mm. latis; carne alba; sporis
suboblongis, asperulis 8 \approx 6.

Hab. in silvis fagineis Salisburgiæ. — *Lact. pallido* affinis.

4. **Lactarius nominabilis** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 31. — Brit- 333
zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 16. — Pileo carneo-
alutaceo, subopaco, 10 cm. lato, carnosio, convexo, centro depresso;
stipite pileo pallidiore, farcto, vix lacunoso-cavo, 6 cm. long., 2,5
cm. cr., basi angustato; lamellis 10 mm. latis, rotundato-adnatis,
quandoque subadnatis, albidis v. albido-carneis; lacte aquoso, albido,
sapore miti; massa sporarum alba; sporis oblongis, asperulis 10 \approx 6.

Hab. in silvis fagineis Salisburgiæ. — *Lact. pallido* affinis.

5. **Lactarius paludestris** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 31. — Brit- 334
zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 16. — Fragilis; pileo
levi, vix fibrilloso-sericeo, fulvo-carneo-brunneo, 11 cm. lato, con-
vexo et centro depresso; stipite pileo pallidiori, subcavo, 9 cm.
long., supra 1 cm. cr., basi parum incrassato; lamellis confertis,
albidis, carneis, 7 mm. latis; lacte aquoso, albido, sapore acri; carne
inodora; massa sporarum alba; sporis flavidis, oblongis, 10 \approx 8.

Hab. in turfosis Algoviæ. — *Lact. vieto* affinis.

6. **Lactarius acerrimus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 31. — Britzel- 335
mayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 15. — Pileo lateraliter
stipitato, irregulari, conchato, carnosio, 9 cm. alto, 7 cm. lato,
opaco, flavo, indistincte flavo-rubro zonato; stipite 2 cm. long.,
1,5 cm. cr., sensim in pileum abeunte, distincte fibroso-radici-
formi; lamellis decurrentibus, confertis, flexuosis, minute venosis,
albidis v. pallide flavo-rubidis, 10 mm. latis; carne subtenaci, co-
lore immutabili, acerrima; massa sporarum flavida; sporis 12-14 \approx
9-10, oblongis, uno apice acutatis, asperulis.

Hab. in silvis Algoviæ. — *Lact. insulso* affinis.

7. **Lactarius delicatus** Burlingh., Mem. Torr. Bot. Club, XIV (1908) 336

p. 40, fig. 4 (*Lactaria*). — Pileo carnosio, firmo, convexo umbilicato demum subinfundibuliformi, flavo-aurantiaco sed centro flavo-salmoneo, tenuiter sed distincte zonato, viscido-glutinoso sed glabro, 8-12 cm. lat., margine involuto et ruditer tomentoso demum tantum deflexo et glabro; lamellis albidis ætate aurantiacis, nonnullis prope stipitem furcatis, confertis, leviter decurrentibus, 5-7 mm. lat.; stipite ex albido subaurantiaco, salmoneo-tincto, plus minus scrobiculato-punctato, æquali v. deorsum tenuato, subglabro e farcto cavo, 4-5 cm. long., 1,5-2,5 cm. cr.; carne alba fortiter odorata; sporis subglobosis, echinulatis, 7-8 μ diam., coacervatis flavo-salmoneis; lacte albo demum sulphureo, acri, parco.

Hab. in silvis quercinis et castaneis solo arenoso in Carolina bor. Americæ bor. — *Lact. thejogalo* et *Lact. scrobiculato* subaffinis.

8. **Lactarius compactus** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. Skr. 337 1904, n. 6, p. 92. — Pileo 6-8 cm. lato, depresso v. infundibuliformi, margine involuto, albo v. pallido, denique dense rufo-maculato; lamellis confertis, postice attenuatis, pallidis, demum rufo-maculatis; carne alba, firma; stipite albo-flavescenti, solido, glabro, deorsum attenuato, 2-5 cm. longo; lacte acri albo.

Hab. in silvis frondosis prope Christiania Norvegiæ.

9. **Lactarius speciosus** Burlingh, Mem. Torr. Bot. Club. XIV (1908) 338 pag. 34, fig. 2 (*Lactaria*). — Pileo carnosio, satis firmo, convexo umbilicato, demum centro depresso, margine arcuato, ex albido melleo v. subaurantiaco, zonato, viscido, tomento conspicuo concentricè disposito consperso, 5-8 cm. lat., margine involuto demum expanso; lamellis albis dein flavidis, tactis violaceo-tinctis, raro furcatis, laxiusculis, levissime decurrentibus, 5-8 mm. lat.; stipite melleo-tincto, tacto violaceo-maculato, æquali, viscido, basi subinde tomentello, e farcto cavo 2,5-7 \approx 1-1,5 cm.; carne alba, vulnerata violacea, inodora; sporis ellipsoideis, fortiter echinulatis 9,5-10 \approx 8-8,5; lacte initio albo, dulci, v. subacri.

Hab. in silvis quercinis in sabulosis in Carolina bor., Tennessee et Virginia Americæ bor. — *Lact. scrobiculato* et *L. representaneo* subaffinis species.

10. **Lactarius Peckii** Burlingh., Mem. Torr. Bot. Club, XIV (1908) 339 pag. 76, fig. 13 (*Lactaria*). — Pileo carnosio firmo, late convexo, dein centro depresso subinde umbonato, ex lateritio rubescente saturatius zonato, tomento brevi, subvelutino consperso, demum centro glabrescente et subareolato, 5-15 cm. lato, margine involuto

sed mox tantum arcuato, subinde flexuoso, initio striatulo; lamellis pallide fulvis mox brunneo-tinctis demum rubiaceo-brunneis, plerumque integris, confertis, dente decurrentibus, 3 mm. lat.; stipite pallide rubescenti v. sublateritio, subinde rufo maculato, rupto obscuriore, subæquali v. basi abrupte tenuato, glabro v. tantum albo-pruinoso, firmo e farcto cavo 4,5 cm. long., 1-2 cm. cr.; carne lateritio tincta; sporis subglobosis, fortiter echinulatis, albidis, 7-8 μ . diam., lacte albo immutabili, adstringente dein acri, copioso.

Hab. in silvis deciduis præsertim quercinis, New York, Carolina bor. et Alabama, Amer. bor.

11. **Lactarius agglutinatus** Burlingh., Mem. Torr. Bot. Club, XIV 340 (1908) p. 42, fig. 5 (*Lactaria*). — Pileo convexo-umbilicato dein centro depresso demum infundibuliformi, margine zonulato, fulvo, senio sordide fulvo, leviter zonato, viscido, verrucis vel papillis consperso, sicco subsquamuloso v. subsquarroso, 6-10 cm. lat., margine involuto et minute pubescente, demum fere glabro; lamellis flavo-fulvis, nonnullis stipitem versus furcatis, confertis, leviter decurrentibus, 2-4 mm. lat.; stipite concolore v. pallidiore subinde maculato, æquali v. deorsum tenuato, viscido, glabro, firmulo demum e spongioso cavo 2,5-4 cm. long., 1-1,5 cr.; sporis subglobosis, echinulatis, cremeis 7-8 μ . diam.; carne alba. odore sæpe cucumerino; lacte albo immutabili, acri.

Hab. in silvis quercinis inter folia et solo arenoso in Carolina bor. America bor.

- 12 **Lactarius croceus** Burlingh., Mem. Torr. Bot. Club, XIV (1908) 341 p. 37, fig. 3 (*Lactaria*). — Pileo carnosio fragili, late convexo umbilicato, margine involuto dein expanso, centro depresso, margine deflexo, e croceo aurantiaco subzonato expallente, udo valde viscido, glabro 5-10 cm. lat., margine pruinoso-velutino demum glabrescente; lamellis pallidis dein melleis demum fulvescentibus, cæsis v. tactis flavis, raro furcatis, laxiusculis, adnatis, 5-6 mm. lat.; stipite concolore sed pallidiore, maculato, æquali, glabro vel basi tomentello, e farcto cavo, obtuso, 5 cm. long., 16 mm. cr.; carne albida, cæsa flava, inodora; sporis flavidis, late ellipsoideis, echinulatis 8-8,5 \approx 7; lacte albo, parco, e pallido flavo et lamellas maculante, recente subacri.

Hab. in silvis quercinis et castaneis inter folia in Carolina bor. et Virginia, Amer. bor. — *Lact. chrysorrhæo* et *Lact. theiogalo* subaffinis species.

342

13. **Lactarius rufulus** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907)

pag. 346. — Pileo carnosio, firmo, e late convexo subinfundibuliformi, brunneo-rubro; carne alba, lacte pauco, flavo-albo, sapore acri; lamellis confertis, adnatis v. leniter decurrentibus, cinnamomeo-flavis ætate obscurioribus et pruinosis; stipite æquali v. basi leniter angustato, farcto, sæpe velutino et basi pilis strigosis flavido-brunneis vestito, sæpe radicante, pileo concolori v. pallidiori; sporis albo-cremeis, globosis, verruculosis, 8-10 μ . cr.

Hab. ad terram humosam, Standford University California (Miss A. M. PATTERSON et S. NOHARA). — Pileus 5-10 cm. latus; stipes 4-8 cm. longus, 5-6 mm. cr. *Lactario rufo* similis.

14. **Lactarius mucidus** Burlingh., Mem. Torr. Bot. Club, XIV (1908) 343 p. 56, fig. 7 (*Lactaria*). — Pileo carnosio sat tenui, convexo-umbilicato, dein plano demum infundibuliformi, centro brunneo lacte sepiaceo, marginem versus pallidior, azono, fertiter viscido et lucido, glabro, 3-9 cm. lat., margine primum æquali dein undulato; lamellis albis colore fere immutabilibus e latice viridulo-griseo maculatis, prope stipitem sæpe furcatis, confertis ex adnato decurrentibus, 7 mm. lat.; stipite concolori, sursum tenuato, viscidulo, glabro, subinde striatulo, farcto dein cavo, 4-7 cm. longo, 7-10 mm. cr., circ., basi 10-15 mm. cr.; carne alba inodora; sporis albis late ellipsoideis, echinulatis, 8-9,5 \approx 7-8; lacte albo ætate cyaneo-virescente, acri.

Hab. sub Pinis, Vermont et Carolina bor., America bor. — *Lac. cinereo* affinis.

15. **Lactarius lanuginosus** Burlingh., Mem. Torr. Bot. Club, XIV 344 (1908) p. 43, fig. 6 (*Lactaria*). — Pileo carnosio firmo, convexo-umbilicato, dein expanso et centro depresso, ex albo flavido-carneo, zonato, viscido, tomento rudi albo brevi glutinoso consperso, 7-8 cm. lat., margine involuto et tomentello demum glabrescente et revoluta; lamellis albidis demum flavo-aurantiis v. fulvidis, raro furcatis, confertis, leviter decurrentibus, 3-5 mm. lat.; stipite albo demum flavido-fulvo, maculis obscurioribus plus minusve tincto, æquali v. deorsum tenuato, viscido e pubescente hirto-tomentoso demum subglabro, firmo e farcto cavo, 3 cm. long., 1-2 cm. cr.; carne alba immutabili, odore forti; sporis subglobosis echinulatis 6-7 μ . diam., albis; lacte albo, parco immutabili, adstringente non vere acri.

Hab. inter folia Quercus, Aceris, Alni et Rhododendri in Carolina bor. Americæ bor.

16. **Lactarius xanthogalactus** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 345

(1907) p. 346. — Pileo carnosio, convexo v. subplano, dein infundibuliformi, glabro, zonato, e cinnamomeo-flavo in sicco rubro-brunneo; carne flavida, lacte flavo, sapore acri; lamellis confertis, adnatis v. decurrentibus, cinnamomeo-flavis, ætate et arescendo pruinosis; stipite cylindrico v. sæpe compresso, farcto v. cavo, farinoso-pruinoso v. subglanduloso, albido v. pallido; sporis globosis, 7-8 μ . diam.

Hab. ad terram sub Quercu, Stanford Univers. California, Amer. bor. — Pileus 5-6 cm. latus; stipes 5-6 cm. longus, 1-1,5 cm. cr.

17. **Lactarius proportionalis** Britz. — Sacc. Syll. XI, pag. 31. — 346
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 16. — Pileo vix fibroso, 7 cm. lato, convexo, centro depresso, flavido v. flavido-ochraceo; pileo opaco; stipite pileo concolori, 5 cm. longo, 10 mm. cr., basi subincrassato; lamellis subconfertis, adnatis, parum decurrentibus; lacte albo, acri; carne parum compacta; massa sporarum alba; sporis subglobosis 8 \approx 6, asperulis.

Hab. ad terram in Bavaria. — *Lact. cyathulæ* affinis.

18. **Lactarius Sumstinei** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII (1905) 347
 p. 78. — Pileo subtenui, sicco, glabro, æquali v. leniter et radiatim rugoso, centro depresso, margine expanso v. decurvo, griseo v. pallide brunneo-fumoso; carne albida, lacte albido, immutabili, sapore acri; lamellis tenuibus, distantibus, inæqualibus, decurrentibus, flavo-cremeis; stipite subæquali, glabro, farcto v. cavo, pileo concolori; sporis globosis, echinulatis, flavidis, 7,5-10 μ . latis.

Hab. in herbidis silvaticis, Kittanning Pa. Amer. bor. (S. R. SUMSTINE). — Pileus 2,5-7,5 cm. latus; stipes 2,5-5 cm. longus, 6-12 mm. cr.

19. **Lactarius irregularis** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. 348
 Skr. (1904) n. 6, p. 97. — Pileo 4-5 cm. lato, irregulari, margine undulato, tenui, partim striato, nitido, arido, initio rufo-fusco dein pallido, argenteo, glabro, demum angulato-rimoso; lamellis rotundato-adnatis, antice tenuibus, albis, dein flavescentibus; stipite 3 cm. long., albo, glabro, subcavo, apice constricto; lacte albo, immutabile, acerrimo.

Hab. in silvis ad Pænsberg Norvegiæ.

20. **Lactarius subalpinus** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. 349
 Skr. (1904) n. 6, p. 94. — Pileo 4 cm. lato, plano, disco subdepresso, nitido, viscido, glabro, versicolori, margine albido, dein cinereo-zonato, flavescenti, centro atro; lamellis confertis, postice

dente adnatis, albis, inæqualibus, ex parte furcatis; stipite 4-5 cm. longo, sursum attenuato, albo, nitido, glabro, cavo; lacte parco, albo, immutabile, acri.

Hab. in pinetis, Dovre Norvegiæ.

21. **Lactarius isabellinus** Burlingh., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 350 (1907) p. 88. — Pileo carnosio, subcrasso, convexo, tenui, dein late convexo, demum infundibuliformi, umbonato, sicco, glabro, sed præcipue maturo centro rugosulo v. minute crispato, initio margine dein ætate toto ferrugineo, 3-4,5 cm. lato; margine glabro, maturo æquali v. minute striato, quandoque etiam areolato-crispato; lamellis pallide flavis v. fractis rubris, confertis, tenuibus, sæpe furcatis, leniter decurrentibus, 3 mm. latis; stipite pileo concolori, æquali v. supra leniter angustato, basi tomentoso, farcto, dein cavo, 4 cm. longo, 6 mm. cr.; sporis albis, echinulatis, 7-8,5 \times 6-7,5; carne alba, lacte primum albo, paullo post sulphureo-flavo, copioso, astringenti v. acri.

Hab. ad terram in silvis Newfane, Amer. bor.

22. **Lactarius Hometi** Gillet, Champ. Fr. Hymen. Suppl. pag. 14, 351 tab. 532, *L. vellereus* var. *Hometi* Boudier, Icon. mycol. I, tab. 49 (Ser. I, p. 9, n. 47). — Pileo laterali, carnosio, convexo, pallide flavo-ochraceo, 3-4 cm. lato, rarius amplius, margine irregulari; carne alba, ope aeris violascente, imprimis juxta lamellas; lamellis numerosis, angustis, utrinque tenuatis, breviter decurrentibus, albidis, flavido-tinctis, subinde quoque violascentibus; stipite sat crasso, pileo concolore, laterali, 2-3 cm. longo, 1 cm. cr.

Hab. ad caudices vetustos in Gallia boreali.

23. **Lactarius nitidus** Burlingham, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 352 (1907) p. 89. — Pileo carnosio, mox tenui, e convexo centro depresso, umbonato, margine paulisper arcuato, glabro, levi, udo lucenti-viscido, atro-purpureo, margine rubro-aureo, umbone dein obscuriore, 3 cm. lato; lamellis flavidis, pruinosis, confertis, quandoque furcatis, leniter decurrentibus; stipite atro-purpureo, æquali, levi, glabro, farcto dein cavo, 4,5-5 cm. longo, 5-8 mm. cr., in locis humidis ventricosio; sporis albis, echinulatis, 6-8 \times 5-6; carne subfulva, cæsa rubida; lacte albo, immutabili, dulci.

Hab. ad terram in herbidis et in silvis Newfane Americæ borealis.

24. **Lactarius luteus** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selk. Skr. 353 (1904) n. 6, p. 93. — Pileo subdepresso, levi, glabro, ochroleuco, splendente, pellicula separabili, 3 cm. lato; lamellis adnatis, ochro-

leucis, antice furcatis; stipite albo, solido, glabro, 2 cm. longo; lacte parco, albo, odore aromatico.

Hab. in betuletis, Dovre Norvegiæ.

25. **Lactarius helvinus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 31. — Britzel- 354
mayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 17. — Pileo piloso non zonato, isabellino, convexo, centro depresso, margine incurvato, 3 cm. lato; stipite 8 cm. long., supra 8 mm. cr., basi distincte incrassato, parum lacunoso-cavo, pileo concolori sed pallidiori; lamellis confertis, albidis, isabellinis, 2 mm. latis, subdecurrentibus; lacte albo; carne albida, isabellina, trita rubro-lateritia, odore peculiari nullo; massa sporarum alba; sporis $8 \approx 6$, oblongis, asperulis.

Hab. in turfosis Algovia. — *Lact. helvo* affinis.

26. **Lactarius aspideoides** Burlingh., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 355
(1907) pag. 87. — Pileo carnosio, dein firmo, convexo-umbilicato, dein plano, demum infundibuliformi, 3-4,5 cm. lato, flavo-sulphureo zonis angustis obscurioribus prædito, udo viscido, margine involuto et initio minute tomentoso; lamellis ex albido cremeis, flavo maculatis, confertis, sæpe prope stipitem furcatis, adnatis sed postice acutis, 4 mm latis, ruptis lilacinis; stipite flavo-sulphureo, distincte flavo-maculato, juveni vel udo viscido, æquali vel basi subattenuato, glabro, farcto dein cavo, 2-3,5 cm. longo, 6-10 mm. cr.; sporis albis, sphæroideis v. late ellipsoideis, echinulatis, $5-7 \approx 7-8$; carne alba, contactu aeris lilacina; lacte albo; sapore amaro.

Hab. in herbidis, Newfane Amer. bor. — *Lact. aspideo* Fr. proximus.

27. **Lactarius colorascens** Peck, New York St. Mus. Bull. n. 94 356
(1905) p. 33. — Pileo tenui, subplano, dein centro depresso, udo, glabro, initio albido v. pallido, dein ætate brunneo-rubro, lacte albo, actione aeris mox sulphureo-flavo, sapore amaro, 2,5-5 cm. lato; lamellis tenuibus, confertis, adnatis v. leniter decurrentibus, albidis, dein ætate flavidis; stipite æquali, 2,5-3,5 cm. long., 4-6 mm. cr., solido, æquali, albido, dein rubro-brunneo; sporis globosis, asperulis, $7,5 \mu$. cr.

Hab. in silvis, Port Jefferson Amer. bor. (G. F. ATKINSON). — *Lact. camphorato* proximo.

28. **Lactarius subvelutinus** Peck, Rep. State Bot. 1903 (1904) p. 18. 357
— Pileo carnosio, firmo, convexo v. subplano, subumbilicato, 2,5-5 cm. lato, sicco, tenuiter velutino v. pruinoso-velutino, quandoque rugoso, fusco-aurato; carne alba, lacte albo, sapore farinaceo; lamellis angustis, confertis, adnatis, vel leniter decurrentibus, fla-

vidis v. cremeis, dein ætate obscurioribus; stipite brevi, 1,2-2,5 cm. longo, 4-6 mm. cr., æquali, solido, pileo concolori v. pallidiori; sporis albis globosis, subæqualibus, 7,5 μ . cr.

Hab. ad terram, Meadowdale et Cemetery Albany Co. Americæ borealis.

29. **Lactarius brevis** Peck, N. York St. Mus. Bull. n. 94 (1905) 358 p. 33, tab. Q, fig. 1-5. — Pileo tenui, late convexo, plano vel centro leniter depresso, glabro, azono, albido, sæpe leniter alutaceo, 2,5-5 cm. lato; carne alba, lacte albido, actione aeris mox sulphureo-flavo, sapore acri; lamellis tenuibus, angustis, confertis, adnatis, albidis v. pallidis; stipite brevi, æquali v. infra leniter angustato, solido v. intus subspongioso, glabro, albo, 2,5 cm. longo, 4-8 mm. cr.; sporis subglobosis, 7,5 \approx 6,5-7,5.

Hab. ad terram in America bor. — *Lact. theiogalo* affinis.

30. **Lactarius rimosellus** Peck, New York State Mus. Bull. n. 105 359 (1906) p. 37, tab. 95, fig. 1-6. — Pileo tenui sed firmo, late convexo, subplano v. centro depresso, sicco, azono, plerumque medio papillato v. subumbonato, minute rimuloso-areolato, vinoso-cinamomeo; carne albida, parce lactescente, aquoso, sapore farinaceo, 20-40 mm. lato; lamellis tenuibus, angustis, confertis, decurrentibus, pallidis vel initio flavidis, dein pileo subconcoloribus; stipite angusto, firmo, æquali vel subæquali, glabro, cavo, pileo concolori, 2,5 cm. longo, 4-5 cm. cr.; sporis albis, leniter flavidis, subglobosis, 7,5-8,5 μ . cr.

Hab. ad terram, Wading River, Amer. bor. — *Lactario camphorato* proximus.

31. **Lactarius Hibbardæ** Peck, Journ. of Mycol. XIV (1908) p. 2. — 360 Pileo carnosus, late convexo v. subplano, umbonato v. non, leniter zonato, sicco, minute tomentosus v. pubescentis, griseo-brunneo cinamomeo tincto, centro obscuriore et leviore, margine æquali, tenui, sæpe undulato; carne albida, odore nullo v. debili; lacte albo, sapore acri; lamellis tenuibus, angustis, confertis, adnatis, nonnullis furcatis, cremeis; stipite æquali v. supra leniter angustato, farcto, deorsum glabro, apice tomento minuto albido tecto, cinamomeo-albo; sporis globosis, 6-8 μ . latis.

Hab. ad terram in pinetis, West Roxbury Massachusetts Amer. bor. (Miss A. HIBBARD). — Pileus 1,5-2,7 cm. lat.; stipes 2,5-4 cm. longus, 3-6 mm. cr. *Lactario glyciosmo* proximus.

32. **Lactarius bryophilus** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 139 (1910) 361 p. 44, tab. x, fig. 1-5. — Pileo tenui, late convexo subplanove,

1-4 cm. lato, margine levi, subumbonato, viscoso, rufo deinde subochraceo, aliquando juxta marginem zona angusta aurantiaca ornato; carne alba, sapore miti, lacte aquoso, parco; lamellis inæqualibus, confertis, adnatis, albidis, deinde flavo-ochraceis; stipite molli, æquali, 1,5-3,5 cm. long., 4-8 mm. cr., glabro, farcto v. cavo, colore pileo simili v. pallidiori; sporis subglobosis, 6-8 μ . latis.

Hab. ad terram muscosam, Natick Massachusetts Amer. bor. (G. E. MORRIS et S. DAVIS).

33. **Lactarius Bensleyæ** Burlingh., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 362 (1907) p. 87. — Pileo firmo, carnosio, subplano, margine incurvato, papillato, dein centro depresso et margine subrecurvato, superficie dense tomentoso, sicco, juveni et udo cyaneo-nigro, obscure griseo zonato, demum brunneo-griseo, centro obscuriori, 12-15 mm. lato; lamellis albidis, nonnullis prope stipitem furcatis, confertis, leniter decurrentibus; stipite sæpe ferrugineo, plus minusve griseo-pruinoso, glabro, sicco, subæquali, dein cavo, 1 cm. v. minus longo, 2-3 mm. cr.; sporis leniter cremeo-coloratis, sphaeroideis v. nonnullis leniter ellipsoideis, echinulatis, 5-6,5 raro 6,5 usque ad 8 μ . cr.; carne pilei grisea, stipitis ferruginea; lacte albo, immutabili, acri.

Hab. gregarius v. subcæspitosus ad terram, Newfane Amer. bor. (AGNES H. BENSLEY).

34. **Lactarius minusculus** Burlingh., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 363 (1907) p. 88. — Pileo carnosio, tenui, late convexo, subumbonato, dein plano, demum centro parum depresso, glabro, tempore humido viscido, azono, centro fulvo, margine cremeo, ceterum cremeo-fulvo, 1,1-3 cm. lato, margine minute crenato, primum pruinoso, dein undulato vel quandoque substriato; lamellis confertis, tenuibus, adnatis, raro furcatis, latis; stipite pileo pallidiori, æquali, farcto, basi tomentosulo, 2,5 cm. circ. longo, 4 mm. cr.; sporis albis, subglobosis, leniter echinulatis, 6-8 μ . cr.; carne albo-isabellina; lacte albo, immutabili, acri.

Hab. inter Muscos et ligna humida, Newfane Amer. bor. — *Lact. subdulci* affinis.

35. **Lactarius camphoratus** (Bull.) Fr. — Syll. V, p. 451. — var. 364 **fragilis** Burlingh., Mem. Torr. Bot. Club, XIV (1908) p. 99. — Pileo mox centro depresso, umbonato v. exumbonato, valde tenui brunneo-umbrino non maculato, azono, sicco, glabro, pruinoso, interdum centro rugoso, 2,5-3,5 cm. lat., margine crenato v. leviter sulcato; lamellis aurantio-flavis, non confertis, crassitudine pilei

quintuplo crassioribus; stipite umbrino, e farcto cavo, 2-5 cm. longo, 4-6 mm. cr.; lacte aquoso, dulci, copioso; cætera *L. camphorati*.

Hab. in silvis Carolinæ bor., Amer. bor.

36. **Lactarius mitissimus** Fr. — Syll. V, p. 450. — var. **acer** Blytt, 365 Vid. Selsk. Skrift., n. 6 (1904) p. 99. — Dignoscitur pileo obscure aurantiaco, carnis sapore acri, nec miti.

Hab. ad terram in Norvegia.

37. **Lactarius tabidus** Fr. — Syll. V, p. 452. — var. **obscurior** Blytt, 366 Vid. Selsk. Skrift., n. 6 (1904) p. 99. — Totus e rubentii flavo-brunneus, quam in typo obscurior; pileo 2,5-3,5 cm. lat., levi; lamellis ob sporas pruinosis.

Hab. ad terram in Norvegia.

38. **Lactarius glycyosmus** Fr. — Syll. V, p. 444. — var. **fragilis** A. 367 Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. Skr., 1904, n. 6, p. 98. — Pileo e cyaneo rufo-brunneo, 3-4 cm. lato, fragili; stipite brevi, 1-2 cm longo, 6-10 mm. cr.; lamellis 3 mm. latis.

Hab. ad terram in Norvegia.

39. **Lactarius rufus** (Scop.) Fr. — Syll. V, p. 442. — var. **exumbonatus** Boud. Ic. mycol. I, t. 52 (Ser. III, p. 22, n. 278). — A typo differt tantum pileo umbone carente.

Hab. sub Pinis in silva Montmorency Gallia.

40. **Lactarius telinolens** (Bellardi) Sacc. et Trott. — *Agaricus telinolens* Bellardi in Mémoires Acad. Sciences Turin, VI (1801) p. 137, 369 t. II. — Odorem gravem *Fœni-græci* (græce *telis*) emittens et sectus succum fuscum effundens; pileo e convexo infundibuliformi, carnosotenui, fusco, dein (sicc) radiatim sulcato, margine acutiusculo demum inflexo; stipite subcylindrico, fistuloso, fusco, basi leviter tuberoso, 5-7,5 cm. alto, erecto, rarius curvato; lamellis conspicue decurrentibus, simplicibus, linearibus, subparallelis, albis.

Hab. solitarius in silva Castaneæ vescæ prope chartusiam vallis Pisii (Pesio-Cuneo) Pedemontii. — Verisimiliter forma *L. camphorati*; lac fuscum dicitur, forsan quia siccum observatum.

41. **Lactarius trivialis** Fr. — Syll. V, p. 430. — var. **gracilis** Peck, 370 38 Rep. St. Mus. Nat. Hist. (1885) pag. 120 et in Burt in Botan. Gazette XXV (1898) tab. XIV, fig. 4. — Pileo minore, fuligineo, 2,6-5 cm. lato; stipite æquilongu v. longiore, pallidiore, rupto viridescenti, lacte albo acri.

Hab. ad terram silvaticam, Sandlake, Albany et Adirondack Amer. bor. — Var. **maculatus** Peck 38 Rep. pag. 121. — Pileo

zonato v. maculato; stipite quoque interdum maculato. Lectus ubi præcedens var.

42. **Lactarius hepaticus** Plowr., in Boudier Icon. mycol. I, tab. 56 371
(Ser. III, p. 12, n. 336, sed sine diagnosi!).

Hab. sub Pinis in silvis Montmorency Gallia. — Lac album, dein sulphureum fit.

43. **Lactarius lactifluus** (L.) Burlingh. Mem. Torr. Bot. Club, XIV 372
(1908) p. 90. — Ita vocandus *Lact. volemus* Fr. — Syll. V, p. 447
— cum huc vere spectet antiquus *Agaricus lactifluus* Linnæi.

RUSSULA Pers. — Syll. V p. 453, IX p. 59, XI p. 29, XIV p. 96
XVI p. 46, XVII p. 30 *).

1. **Russula paludosa** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 30. — Britzelmayr, 373
Revis. Hymen. IV (1899) p. 17. — Pileo 16 cm. lato, hemisphæ-
rico, expanso, convexo, centro depresso quandoque subelevato,
margine scabro, cute separabili, sanguineo v. rubro-cinnabarino;
stipite 16 cm. long., 3,5 cm. cr., utrinque angustato, albo, san-
guineo colorato, farcto, demum intus spongioso et lacunoso; la-
mellis subconfertis, pure albis, 15 mm. latis, emarginato-adnatis,
simplicibus, non furcatis; carne alba, sub cute rubida, sapore non
acri; massa sporarum albido-flava; sporis 10 × 8, flavidis, elongatis,
subinde apiculatis, asperulis.

Hab. in turfosis Bavariae. — *Russ. emeticæ* affinis.

2. **Russula albida** Blytt, Norg. Hymen. Vid.-Selsk. Skrift (1904) n. 6, 374
p. 104. — Pileo 14 cm lato, convexo, albido, pellicula tenui, se-
parabili, margine pectinato-sulcato, disco obscuriore; carne alba;
lamellis postice furcatis, antice latioribus; stipite 5 cm. longo, albo,
striato-reticulato.

Hab. in silvis prope Christiania Norvegiae. — Affinis partim
R. foetenti, partim *R. pectinatae*.

3. **Russula grata** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 31. — Britzelmayr, 375
Revis. Hymen. IV (1899) p. 17. — Pileo 13 cm. lato, convexo,

*) Cfr. cl.mi R. MAIRE exquisitam dissertationem: *Les bases de la classific. dans le genre Russula* (Bull. Soc. Mycol. Franc. 1910, XXVI) ubi plures species analytice describuntur et iconibus anatomicis illustrantur; præterea multa synonyma emendantur. Cfr. quoque KAUFFMAN: *Monograph of the Russula of the State Michigan*. Ann Arbor, Mich. 1909. Totius difficilis generis epicrisis vere desiderabilis.

centro parum depresso, tenui carnosio, albido v. brunneo-alutaceo, ex opaco nitido, margine scabro; stipite farcto, lacunoso dein cavo, 10 cm. long., supra 2 cm. sæpe basi plus minusve attenuato, 12 mm. cr., albo, basi sordide brunneo-flavo; lamellis emarginato-adnatis, vix decurrentibus, 10 mm. latis, subremotis, non furcatis, ceraceis, pellucidis; carne non firma nec compacta, albida, pallide alutacea, basi in stipite obscuriori, odore distincte grato amygdalino, sapore non acri; massa sporarum alba, vix flavida; sporis 10 μ . diam., asperulis, flavidis.

Hab. in silvis Salisburgiæ et Algoviæ. — *Russ. foetenti* affinis.

4. **Russula cavipes** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 30. — Britzelmayr, 376
Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 18. — Pileo albido, sordide rubido, cute separabili, convexo, centro plano-depresso, 10 cm. lato; stipite 7 cm. long., medio 2 cm. cr., utrinque angustato, cavo, parietibus 5 mm. cr., cavitate utrinque subcarnoso-farcta, albido v. rubido; lamellis confertis, albis, parum decurrentibus; carne sapore acri; massa sporarum albida, leviter flavescenti; sporis 10 \approx 6-8, oblongis, asperulis.

Hab. in silvis Algoviæ. — *Russ. fallaci* affinis.

5. **Russula pseudo-integra** Arn. et Goris, Bull. Soc. mycol. France 377
(1907) p. 177, Maire l. c. (1910) pag. 111, fig. 113 (analysis). — Majuscula, 10-12 cm.; pileo roseo, sanguineo-tincto et albo-marmorato, cuticula viscosa et facile secedente; carne caseoso-spongiosa, rosea sub cuticula; stipite albo, curto, 8-10 cm. longo, 2-3 cr.; lamellis latis, crassiusculis, subdistantibus, flavidis; sporis ochraceo-flavidis, leviter depresso-verruculosis, subglobosis, 7,5-9 \approx 7-8; basidiis clavatis, 45-50 \approx 9-10; cystidiis plerumque appendiculatis, 70-100 \approx 10-13.

Hab. in silvis prope Ham, St.-Gobin et Montmédy Galliæ.

6. **Russula tenuiceps** Kauffman, XI Rep. Mich. Acad. 1909, p. 81. 373
— Pileo tenui, 7-12 cm. lato, fragili, e convexo expanso, pellicula viscidula separabili, margine primitus revoluta, striato, roseo-rubro v. sanguineo, interdum albo, aurantio-maculato, interdum minute rugoso; carne alba, dein sub cuticula rubra, maturitate admodum fragili; lamellis albis, dein flavo-ochraceis, confertis, angustis, fragilibus, anguste adnatis liberisve, paucis furcatis, venoso-connexis, æqualibus; stipite fragili albo- v. roseo-tincto, spongioso-farcto, subæquali v. ventricoso, intus albo immutabili, 5-9 cm. alt., 2-2,5 cm. cr.; sporis flavo-ochraceis, subglobosis, 6-8 μ . diam. echinulatis; sapore acri; odore subnullo.

Hab. gregatim in silvis mixtis in Michigan Americæ bor. —
Russ. sardonice et *Russ. rugulosæ* subaffinis.

7. **Russula melliolens** Quél. Assoc. Franç. Avanc. Sc., 1897, p. 4 (extr.), 379
Maire in Bull. Soc. mycol. Fr. (1910) p. 108, f. 2 (analyt.), *R. in-*
tegra Quél. et Gill. ex p. (Cfr. synonym. apud Maire l. c.). — Media
v. grandis, 6-12 cm., firma v. laxa, sed fragilis, dulcis, vetusta et
præcipue in sicco mellis odorem intensum redolens; pileo e convexo
applanato subviscoso, rubro, violaceo, badio, virente; carne alba,
senio brunneo-ochraceo tincta; sporis e hyalino dilute stramineis,
subglobosis, fere levibus sed obsolete reticulato-rugulosis, 8-12 \approx
8-11; basidiis 40-50 \approx 10-14; cystidiis sæpius appendiculatis, 50-
100 \approx 8-11; stipite albo v. roseo-tincto, 4-6 cm. alto, 1-2 cm. cr.

Hab. in silvis frondosis in Gallia, Hungaria et versim. alibi.
— var. **Chrysmantiæ** Maire, Bull. Soc. Mycol. France (1910) p. 62,
fig. 3. — A forma typica rubra et firma distincte differt sapore lu-
culenter acri; sporis 7,5-9 \approx 7-8, hinc quam typi paullo minoribus.
In silva Fréhaut pr. Luneville Galliæ, ubi unica vice sed abunde
lecta fuit a Domina CHRISMANT.

8. **Russula borealis** Kauffman, XI Rep. Mich. Acad., 1909, p. 69. — 380
Pileo firmo, subcompacto, 5-9 cm. lat., subinde sinuoso, sanguineo,
centro saturatiore v. concolore, pellicula subseparabili, subviscida,
margine sublevi; carne alba, sub cuticula rubra; lamellis subdi-
stantibus, ochraceis, mediocriter latis, antice latioribus, adnatis,
acie sæpe rubella, nonnullis furcatis et venoso-connexis; stipite
albo, hinc inde rubro-maculato, firmo, spongioso-farcto, sursum
incrassato, 5-7 cm. long., 1,5-2 cm. cr.; sporis saturate ochraceo-
flavis; sapore dulci demum subacri; odore nullo.

Hab. solitaria in silvis mixtis in Michigan bor. Amer. bor. —
Russ. alutaceæ et *R. ochrophyllæ* subaffinis.

9. **Russula heterophylla** Fr. — Syll. V, p. 465. — var. **chlora** Gill. 381
Champ. Franc. Hymen. p. 241, tab. 536. — A typo differt pileo
flavo-chlorino, margine ardesiaco.

Hab. ad terram in Gallia boreali.

10. **Russula decolorans** Fr. — Syll. V, p. 476. — var. **albida** Blytt, 382
Vid.-Selsk. Skrift. (1904) n. 6, pag. 107. — A typo dignoscitur
pilei colore albido.

Hab. in silvaticis Norvegiæ.

11. **Russula emetica** Fr. — Syll. V, p. 469. — subsp. **alpina** Blytt, 383
Vid.-Selsk. Skrift. (1904) n. 6, p. 105. — Pileo albido; stipite ex
albo griseo; lamellis flavidis.

Hab. in montanis Norvegiæ.

- 12 **Russula rubella** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. Skr. 384 (1904) n. 6, p. 104. — Pileo 10 cm. lato, amœne lateritio, arido, polito, margine striato; lamellis confertissimis, inæqualibus, postice furcatis, fere liberis; antice latioribus; stipite albo, 7 cm. longo, apice crassiore.

Hab. in silvis frondosis, Lavock Norvegiæ.

13. **Russula variata** Banning, in Peck N. Y. St. Mus. Bull. n. 105 385 (1906) p. 41, tab. 101, fig. 1-5; id. n. 116 (1907) p. 75. — Pileo firmo, e convexo centro depresso v. subinfundibuliformi, 5-10 cm. lato, viscido, subtili æquali, pellicula tenui a margine tenui æquali separabili, rubro-purpureo v. brunneo-purpureo, sæpe viridi- v. prasino-viridi variegato; carne alba, sapore acri v. subacri; lamellis tenuibus, angustis, confertis, sæpe furcatis, utrinque angustatis, adnatis v. leniter decurrentibus, albis; stipite æquali v. subæquali, solido v. sæpe cavernoso, albo, 3,5-7,5 cm. longo, 10-16 mm. cr.; sporis albis, subglobosis, 7,5-10 \approx 7,5.

Hab. communis in silvis Amer. bor. — *Russ. furcatae* et *R. æruginascenti* affinis.

14. **Russula squalida** Peck, New York State Mus. Bull. n. 116 (1907) 386 p. 80. — Ita vocanda *Russ. atro-purpurea* Peck (Syll. XI, p. 61) nec *Russ. atro-purpurea* (Krombh.) Peck.

15. **Russula atro-purpurea** (Krombh.) Peck l. c. *Agaricus atro-pur-* 387 *pureus* Krombh. Schwämme IX, pag. 6, t. 64, f. 5-6. — Teste cl. Maire, Bull. Soc. mycol. France (1910) p. 70 huc pertinent: *R. Clusii* Bataille et forte Friesii, *R. rubra* Cooke, non Fr., *R. depallens* Cooke (et Fr.?). — Rubro-sanguinea, fragilis, acris; pileo plano, disco depresso, margine levi, 8-9 cm. lato; lamellis liberis subdistantibus, levissime flaveolis; stipite cylindræo, albo, farcto, levi, 6-7 cm. longo, 2-2,3 cm. cr.; sporis albidis, globosis, 10 μ . diam.

Hab. in silvaticis Bohemiæ, Galliæ, Britanniæ etc.

16. **Russula subsordida** Peck, N. Y. State Mus. Bull. n. 105 (1906) 388 p. 40, tab. 99, fig. 1-5. — Pileo carnosio, firmo, e convexo subplano v. centro depresso, 8-10 cm. lato, glabro, viscido v. initio molli, margine æquali ex albido ætate fumoso-brunneo, quandoque viridi-olivaceo; carne albo-grisea, cæsa v. trita obscuriori v. fumoso-brunnea, sapore dulci v. demum acidulo; lamellis tenuibus, confertis, adnatis, nonnullis brevioribus intermixtis, albidis; stipite brevi, 3-4 cm. longo, 2 cm. cr., firmo, glabro, intus spongioso v.

quandoque cavernoso, albido v. cæso fumoso-brunneo; sporis albis, globosis 7,5 μ . cr.

Hab. ad terram, Horicon alibique in America bor. — *Russ. sordidæ* affinis. Edulis.

17. **Russula aurantio-lutea** Kauffman, XI Rep. Michig. Acad. (1909) 389 pag. 81. — Pileo tenui, fragili, convexo dein depresso, 5-10 cm. lato, citrino-luteo v. aurantio tincto, margine tuberculoso-striato, pellicula viscida, nitidula, subseparabili; carne alba, marginem versus tenui, immutabili; lamellis pallide flavis, subconfertis, æqualibus v. nonnullis brevioribus, adnato-secedentibus, sæpe furcatis et venoso-connexis; stipite albo, 4-8 cm. longo, 1,5-2 cm. cr., glabro, levi, spongioso-farcto, intus concolore; sporis ochraceo-flavis, subglobosis, 8-9 μ .; sapore acri; odore subnullo.

Hab. solitaria in silvis, Michigan bor. Amer. bor. — *Russulæ ochroleucæ* subaffinis.

18. **Russula rosea** (Schæffer?) Quélet, Fl. myc. de Fr. p. 349, Maire 390 in Bull. Soc. mycol. France (1910) p. 71 et 100. — Pileo convexo-plano, 5-8 cm. lato, dein depresso, subviscoso, roseo-incarnato, dein rubescente, centro cremeo v. albo, cuticula tenui, separabili; carne tenera, alba, sapore avellanaceo; lamellis sinuatis, furcatis, tenuibus, mollibus, albis; stipite spongioso, sursum expanso, fusoideo, subinde excentrico, striato, pruinoso, albo, raro basi roseo; sporis tenuiter aculeolatis, 8 μ . diam., 1-nucleatis, hyalinis, albis (flavidis sec. Maire l. c.).

Hab. in silvis umbrosis sabulosis in Gallia. — Edulis, delicata. Sec. Fries *Agaricus roseus* Schæff. est *Clitocybe opipara* Fr. — Syll. V, 148.

19. **Russula subfœtens** W. G. Smith., Syn. Brit. Basidiomyc. (1908) 391 p. 288. — Pileo convexo-plano, subdepresso, leviter viscido, flavo-ochraceo v. fulvo, margine striato-tuberculoso pallidiore, 8 cm. lato; stipite æquali, levi, albido v. fulvescente, 1,7 cm. cr.; sapore acri amaro; odore ingrato.

Hab. in graminosis Britannia. — Totus fungus 5-6 cm. altus, elasticus.

20. **Russula subvelutina** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 392 p. 215. — Pileo firmo, convexo v. centro leniter depresso, sicco, minute pubescenti v. velutino-tomentoso, margine æquali, obscure rubro, sæpe centro parum obscuriore, cuticula adnata; carne alba, crassa, sapore grato; lamellis moderate confertis, adnatis, sæpe basi furcatis, albis, dein flavo-cremeis, interstitiis venosis; stipite

æquali v. basi angustato, intus farcto v. spongioso, impolito, albo, rubro tincto; sporis sublevibus, subglobosis, pallide flavis, 7-10 μ . latis.

Hab. ad terram prope St. Louis Missouri Amer. bor. (N. M. GLATFELTER). — Pileus 5-11 cm. latus; stipes 5-10 cm. longus, 10-15 mm. cr.

21. **Russula pubescens** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. Skr. 393 (1906) n. 6, p. 101. — Pileo 7 cm. lato, subconvexo; carne alba, firma, virosa, disco flavescente, rimoso, margine levi, canescente, dense pubescente; lamellis cremeis, æqualibus, subliberis, postice attenuatis, sæpe furcatis; stipite niveo, firmo, 4 cm. longo, sursum attenuato; sapore miti.

Hab. in betuletis, Dovre Norvegiæ.

22. **Russula Romellii** Maire, Bull. Soc. mycol. France (1910) p. 57, 394 fig. 1. *Russ. integra* Quél., Cooke, Bres., non Fries. — Pileo convexo dein applanato et centro plus minus depresso, parum crasso, margine rotundato, nunc vix striato nunc sulcato-tuberculoso, versicolori e purpureo ad viridi-olivaceum v. viridi-flavidum nutante et olivaceo v. violaceo-tincto, quandoque decolorato, sæpe centro innato-fibrilloso, viscoso, membrana separabili; carne alba v. subcute subviolacea; lamellis albis dein cremeis ob sporas demum cremeo-olivaceis, postice tenuatis, antice rotundatis, crassiusculis, æqualibus, rarius furcatis, venis plus minus connexis, remotiusculis; basidiis clavatis, 36-48 \times 10-11; cystidiis sæpe appendiculatis, 60-90 \times 8-10; sporis globoso-ellipsoideis, 7-9 \times 6-7, apiculatis, flavis, cristulato-subreticulatis.

Hab. in silvis frondosis, solo sæpius siliceo, in Gallia, Germania, Anglia, Austria, Italia.

23. **Russula Theissenii** Rick, Broteria VI (1907) pag. 74. — Pileo 395 primitus involuto, postea expanso-depresso, subfragili, 6 cm. diam., carnosus, luteo-lateritio, udo viscido, glabriusculo, margine primitus barbato ad modum Lactariorum barbatorum, dein luteo-fibrilloso, striato; lamellis confertis non ventricosis, uncinato-adnexis, sæpius venoso-connexis, valde inæqualibus (5-macriis), jam primitus luteo-ochraceis, acie integra; carne pilei molli, ex albo lutea, miti; stipite solido, 1 cm. cr., 7 cm. alto, lateritio, fere æquali, fortiter striato-lineato, dense luteo-farinoso; sporis flavidis, sphericis, rugosis, 7,5 μ . diam.; odore nullo.

Hab. ad terram, Rio Grande do Sul Brasilæ. — *Russ. foetenti* et *R. simili* affinis.

24. **Russula sericeo-nitens** Kauffman, XI Rep. Michig. Acad. (1909) 396 p. 84. — Pileo regulari, sat tenui, convexo v. depresso, 4-6 cm. lato, atro-violaceo-purpureo, disco sæpe livido-nigricante, pellicula separabili, uda subviscida, vix striata, aspectu sericeo; carne alba, ad marginem tenui, immutabili, sub pellicula purpurea; lamellis albis, subdistantibus, ætate flaccidis, latiusculis, postice tenuatis, siccis æqualibus, paucis furcatis, venoso-connexis; stipite albo, æquali v. sursum incrassato, intus spongioso, sublevi, 3-5,5 cm. longo, 1 cm. cr.; sporis albis, globosis, echinulatis 6-7,5 μ . diam.; sapore dulci; odore subnullo.

Hab. solitaria in silvis, Michigan bor. Amer. bor. — *Russulæ Quéletii* subaffinis.

25. **Russula serissima** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 139 (1910) p. 44. 397 — Pileo carnosio, tenui, fragili, convexo, deinde subplano v. centro depresso, 5-7 cm. lato, jove humido viscido, glabro, margine levi aliquando in senectute leviter striato, olivaceo v. brunneo-purpureo, aliquando centro maculato, raro pruinoso; carne alba albidave, sapore miti v. leviter tardeque acri; odore ingrato, persistente; lamellis tenuibus, confertis, 4-8 mm. latis, adnexas, cremeis v. luteolis, deinde fumidis; stipite æquali v. sursum attenuato, 4-7 cm. long., 8-20 mm. cr., solido, intra spongioso, albo, deinde fumoso; sporis subglobosis, luteo-flavis, 10-12 \approx 8-10.

Hab. ad terram inter folia dejecta, Ellis Mass. Amer. bor. (E. B. BLACKFORD et G. E. MORRIS).

26. **Russula rubicunda** Quélet. Assoc. franç. avanc. Scienc. (1895) p. 4 398 (extr.) t. VI, f. 9. — Pileo convexo-plano, 6-9 cm. lato, cuticula tenui, viscosa, separabili, vivide rubro-sanguinea, ad marginem pallidiore (aquam roseo-tingente); carne tenui, alba, molli, initio dulci dein acri-piperata, odore subviroso; lamellis furcatis interdum anastomosansibus, basi reticulatim junctus, fragilibus, albis dein cremeo-junquilleis; stipite spongioso, dein cavo, fragili, sub vitro venoso-reticulato, nitide albo; sporis subsphæricis, 8 μ . diam., granulosis, ocellatis, citrinis.

Hab. in silvis argilloso-sabulosis, Nivernais Gallie (Domina DAULNAY) et in Alsatia, Jura etc. — Affinis *R. veterinosæ* et *R. maculatæ*.

27. **Russula subcompacta** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 30. — Britz 399 zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) pag. 19. — Pileo 5 cm. lato, convexo, demum applanato, glutinoso, centro flavido fere flavo-olivaceo, margine in pallide rubrum v. violaceum nutante;

stipite 4,5 cm. long., 8 mm. cr., basi incrassato, albo, farcto; lamellis e flavido ochraceis, adnexis, parum adnatis, 4 mm. latis, confertis; carne etiam in speciminibus vetustis non fragili, nec molli, sed firma et compactiuscula; sapore grato, minime acri; massa sporarum ochroleuca; sporis ellipsoideis flavidis, $10 \approx 8$, asperulis.

Hab. in silvis Coniferarum in Algovia. — *Russ. chamæleontinæ* affinis.

28. **Russula viridella** Peck, New York State Mus. Bull. n. 105 (1906) 400 p. 41, tab. 100, fig. 1-7. — Pileo firmo, subgloboso, hemisphærico v. convexo, dein subplano v. centro depresso, quandoque subinfundibuliformi, 6-10 cm. lato, margine æquali, sicco, mox præcipue ad marginem minute squamuloso v. furfuraceo, pallide griseo-viridi, centro plerumque levi, pallidiori v. subochraceo; carne albida, sapore acidulo; lamellis tenuibus, angustis, confertis, nonnullis furcatis, basi quandoque anastomosantibus, paucis brevioribus intermixtis, albis; stipite æquali v. subæquali, intus solido v. spogioso, albo, 5-7,5 cm. longo, 11-18 mm. cr.; sporis albis, flavido-tinctis, globosis v. subglobosis 6-7,5 μ . crassis; cystidiis subfusiformibus, 65-75 \approx 15.

Hab. ad terram sub Pinu canadensi, Horicon Amer. bor. — *Russ. virescenti* affinis. Edulis.

29. **Russula verrucosa** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. Skr. 401 (1906) n. 6. p. 105. — Pileo subdepresso, luteo, verrucoso-squamoso, 6 cm. lato, pellicula separabili, margine striato; carne firma, alba; lamellis albis, postice furcatis, inæqualibus, subdecurrentibus; stipite albo, firmo, rimoso-squamoso, 4 cm. longo, 2 cm. cr.

Hab. ad terram prope Christianiam Norvegiæ.

30. **Russula farinipes** Rom. in Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 30. — 402 (lapsu typ. *parvipes*). — Pileo convexo opaco flavido, margine vix tuberculoso, 5 cm. lato; stipite albo, subfarinaceo, 4-5 cm. longo, 1 cm. cr.; lamellis confertis ex albido flavidis, angustis, tactu flavido-brunneolis; sporis globulosis, 8-9 \approx 6-7; carne satis firma, albida; sapore submiti.

Hab. in silvis Bavaricæ australis.

31. **Russula Britzelmayri** Rom. in Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 30. — 403 Pileo convexo, opaco, flavido, sanguineo-maculato, 6-7 cm. lato, margine levi; stipite sæpius excentrico, 2,5 cm. long., 1,5 cm. cr.; lamellis non furcatis, flavidis; carne alba, firma; sapore acri; sporis globulosis, 10-12 \approx 10, flavido-ochraceis, asperulis.

Hab. in silvis Bavaricæ australis.

32. **Russula sphagnophila** Kauffmann, XI Rep. Mich. Acad. (1909) 404 p. 86. — Pileo valde fragili, 2-4,5 cm. lat., convexo, umbonato, margine demum elevato et disco depresso, purpureo v. roseo, circumcirca usque ad marginem striatum olivaceo-brunneo, pellicula viscosa, glabra; carne sub cuticula rubescente fragili; lamellis albis, dein pallide ochraceis, angustis, adnato-decurrentibus, subconfertis, paucis furcatis; stipite roseo, inæqualiter inflato, spongioso-farcto, dein lacunoso, valde fragili, rivuloso-inæquali, 4-5 cm. long., 7-12 mm. cr.; sporis globosis, echinulatis, cremeis, 6-7 μ . diam.; sapore dulci.

Hab. sparsim ad Sphagna in paludibus Cold Spring Harbor Michig. Amer. bor. — *Russ. puellari* affinis.

33. **Russula atro-rubens** Quéf. Assoc. franç. avanc. Scienc. (1897) p. 4 405 (extr.) tab. IV, f. 12. — Pileo plano, 5-7 cm. lato, cuticula separabili, sanguineo-rubra, disco violaceo-nigro et interdum tota violaceo-nigra; carne tenui, fragili, alba, rubescente sub cuticula, acri-piperata; lamellis angustis, adnatis, albis dein cereis; stipite pruinoso, ruguloso, albo, raro rubescenti-tincto; sporis globoso-ellipsoideis, 8-9 μ . diam., e hyalino subcitrinis.

Hab. in silvis argilloso-sabulosis, Nivernais (Domina DAULNAY). — Affinis *Russulæ emeticæ*.

34. **Russula amethystina** Quéf. Assoc. franç. avanc. Scienc. (1897) 406 p. 5 (extr.) t. IV, f. 13. — Pileo convexo-plano, dein leviter excavato, 4-5 cm. lato, margine levi, farinoso, roseo-lilacino, demum interdum paleaceo- vel olivaceo-tincto; carne tenera, alba, dulci, odora; lamellis adnatis, junquilleis dein luteis; stipite firmo, basim versus tenuato, pruinoso, albo; sporis subellipsoideis 8-9 μ . long., ocellatis, tenuissime aculeolatis.

Hab. in silvis sabulosis sub Coniferis prope Lyon Gallicæ (PÉTEAUX).

35. **Russula Cypriani** Gill. Champ. Franc. Hymén. Fasc. suppl. 407 p. 21. — Pileo carnosio, firmo, convexo, sicco, centro leviter depresso, margine omnino extrio, rubro, medio saturatiore; lamellis latis v. griseo-luteolis, subliberis, antice latioribus, furcatis, crassis, albis dein flavido-ochraceis, acie ad pilei marginem rubente; stipite albo, cylindrico, farcto, firmo; carne firma, sapore dulci, odore nullo.

Hab. in silvulis in Gallia bor.

36. **Russula foetentula** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 (1907) 408

p. 89. — Pileo tenui, subplano, viscido, glabro, margine striato, rubro-flavo 3,5-7,5 cm. lato; carne alba; sapore demum acri; odore amygdalæ amaræ; lamellis tenuibus, confertis, adnexis, v. subliberis, albidis, interstitiis venosis; stipite æquali, firmo, cavernoso, albo v. flavido-albo, basi plerumque rubro-brunneo maculato, 2,5-3,5 cm. longo, 6-10 mm. cr.; sporis pallide flavis, globosis 7,5-8,5 μ . cr.

Hab. inter folia dejecta in silvis, Suffolk Co. Amer. bor. — *Russ. foetenti* proxima, a qua differt lamellis confertis et pileo basi rubro-brunneo.

37. **Russula pectinatoides** Peck, New York State Mus. Bull. n. 116 409 (1907) p. 43, tab. 105, fig. 6-10. — Pileo tenui, expanso, e convexo subplano v. centro depresso, 2,5-7,5 cm. lato, udo viscido, margine laxè tuberculoso-striato, brunneo v. flavo-brunneo, centro sæpe obscuriore; carne alba, albo-grisea sub separabili cuticula; sapore dulci v. leniter acri; lamellis tenuibus, basi parum furcatis, adnatis, ex albo pallidis; stipite æquali, intus spongioso, levi, glabro, albo, 2,5-5 cm. longo, 6-8 mm. cr.; sporis albidis subglobosis, 6-7,5 μ . cr.

Hab. in herbidis Amer. bor. — *Russ. pectinatae* (Bull.) Fr. et *Russ. sororicæ* Fr. affinis.

38. **Russula armeniaca** Cooke, Ill. Hymen. tab. 1064, Handb. Brit. 410 Fungi II ed. p. 336. — Valde fragilis; pileo convexo, dein depresso, 3-5 cm. lato, levi, glabro, armeniaco, margine pallidiore, tenui, plano; stipite sursum tenuato, levi, albo, cavo; lamellis adnatis, postice rotundatis, latiusculis, subdistantibus, ochraceo-vitelinis; sporis subglobosis, 10 \approx 8, asperulis.

Hab. in graminosis, sub arboribus, Epping Forest Britanniae.

39. **Russula nigrescentipes** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII 411 (1906) pag. 214. — Pileo convexo, subplano v. centro depresso, glabro, margine striato, nitide rubro; carne alba; sapore grato; lamellis postice angustatis et unitis, antice latioribus, confertis, æqualibus, liberis v. subliberis, albis; stipite æquali, glabro, intus farcto v. spongioso, tenaci, elastico, albo, tacto vel fracto nigrescenti; sporis globosis v. subglobosis, albis, 6-8 μ . diam.

Hab. ad terram in silvis prope St. Louis Missouri Amer. bor. (N. M. GLATFELTER). — Pileus 3-5 cm. latus; stipes 3-5 cm. longus, 6-8 mm. cr. *Russ. unciali* proxima.

40. **Russula modesta** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 116 (1907) p. 78. 412 — Pileo firmo sed tenui et flexibili, late convexo, dein subplano

v. centro depresso, 2,5-6 cm. lato, sicco pruinoso, æquali v. margine obscure striato, griseo-viridi, margine pallidiori; carne alba; sapore dulci; lamellis tenuibus, confertis, basi furcatis, nonnullis paullo brevioribus, utrinque angustatis, adnatis v. leniter decurrentibus, ex albo flavidis, interstitiis venosis; stipite brevi cylindrico, solido, glabro, albo 2,5-3,5 cm. long., 6-10 mm. cr.; sporis subglobosis, pallide flavidis, 6-7,5 μ . cr.

Hab. in silvis Albany Co. Amer. bor. — Species pileo pruinoso distincta.

41. **Russula olivaceo-violascens** Gillet, Hymen. Franc. Planch. suppl. 413 (Diagnosis deest in operibus Gilletianis). — Parva, gracilis; pileo convexo-explanato, dein umbilicato, virescente, zona exteriori sensim violascente, margine acutiusculo, striato; lamellis subconfertis, angustis, postice non sinuatis, albis; stipite cylindræo deorsum paullo incrassato, levi, glabro, farcto; carne alba; sporis spheroidis, asperulis, albis,

Hab. in silvaticis Gallia borealis. — Diagnosis ex icone de prompta.

42. **Russula Blackfordæ** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 139 (1910) 414 p. 43, tab. Z, fig. 9-13. — Pileo carnosulo, late convexo subplano, 2,5 cm. circ. lato, humido viscido, margine striato, albido, pallido-griseove, centro brunneo; carne alba; sapore miti; lamellis tenuibus, angustis, confertis, adnatis, flavidis vel cremeis; stipite æquali, 2,5 longo, 4-6 mm. cr., glabro, farcto v. cavo, albo; sporis globosis, flavis, 8-9 μ . lat.

Hab. ad terram, Ellis Mass. Amer. bor. (Domina E. B. BLACKFORD). — *Russ. fallaci* proxima sed colore pilei, sporarum et lamellarum nec non sapore dulci diversa.

43. **Russula olivicolor** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 30. — Britzel- 415 mayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 17. — Pileo 2,5 cm. lato, irregulariter hemispherico, opaco, olivaceo, griseo-brunneo; stipite 2 cm. long., 6 mm. lato, basi incrassato, albo, infra sordide viridi; lamellis 3 mm. latis, submarginatis adnexis, albis, confertis; carne firma, albida, basi in stipite olivaceo-viridi; sapore acri; massa sporarum alba vix flavida; sporis 9 \approx 7, ellipsoideis, asperulis.

Hab. in silvis Coniferarum Bavariæ. — *Russ. furcatæ* affinis.

44. **Russula pseudopectinata** P. Henn. in Voeltzkow, Reise Osta- 416 frika III (1908) p. 26, tab. II, fig. 12. — Pileo carnosulo, campanulato-convexo, rigido, flavido-albo, c. 1,5-2 cm. diam., margine dense sulcato, verruculoso; stipite tereti, fistuloso, brevi, glabro,

albido, c. 1,5 cm. longo, 4 mm. cr., curvulo; lamellis ventricosis, confertis, æquilongis, pallidis; basidiis clavatis, 25-30 \times 7-8; sporis globosis, hyalinis, 8-9 μ ., aculeato-echinulatis.

Hab. ad terram in silvis Ste. Marie, Madagascar.

45. **Russula pusilla** Peck State Mus. Rep. 50 (1897) p. 99 et Bull. 417 n. 116 (1907) p. 95. — Pileo 2,5 cm. lato, admodum tenui subplano vel centro leviter subumbilicato-depresso, glabro, margine striatulo, rubro, interdum medio saturatiore, pellicula tenui separabili; carne alba, dulci; lamellis latis, subventricosis, subdistantibus, adnatis v. postice leviter rotundatis, albis, demum senio v. in sicco flavido-ochraceis; stipite curto, 15-30 mm. long., 5-8 mm. cr., molli, intus solido v. spongioso, albo; sporis flavidis, globosis, 7-8 μ . diam.

Hab. ad terram nudam in silvis, Suffolk Co. Amer. bor.

46. **Russula cyanescens** Kickx in Sturm, Deutsch. Fl. Pilze III, 33, 418 1 (Strauss). — Alba; pileo convexo, margine obtuso, exitrio; carne cyanescente; lamellis albis æqualibus; stipite æquali, cylindrico.

Hab. ad terram in Hollandia. — Inventa et picta a Steerbeck post annum 1675 et in lucem educta a cl. Kickx (1842) et Strauss, l. c.; revera ab auctoribus posterioribus batavo-belgicis non amplius memorata.

47. **Russula graveolens** Rom. in Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 31. — 419

Pileo convexo purpureo-vinoso, margine levi; lamellis rotundatis carneque ex albido flavis; carne odore gravi Clupeæ prædita; sapore dulci; sporis ellipsoideis, apiculatis, 8 \times 6, hyalinis, sublevibus.

Hab. in silvaticis Baviariæ australis. — Pileus 8 cm. lat.; stipites 4-5 cm. alt., 2 cm. cr. — Var. **rubra** Britz. Hym. Südbayer. IX, p. 17, fig 105: pileo rubro; lamellis albidis, tactu flavo-rubro tinctis; stipite rubente; carne alba firmula; odore et sapore typi. — In silvis Baviariæ australis.

48. **Russula truncigena** Britz. — Sacc. Syll. XI, pag. 30. — Britz. 420 zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 18. — Pileo opaco, flavo, flavido vel alutaceo, margine inciso, 3 cm. lato, convexo, centro plano-depresso; stipite 3 cm. long, supra 6 mm. cr., basi incrassato albo; lamellis adnatis, non furcatis, confertis, 4 mm. latis; carne alba; sapore acri; massa sporarum alba; sporis 8 \times 6, asperulis.

Hab. ad truncos fagineos, Salisburgia. - *Russ. fragili* affinis.

NYCTALIS Fr. — Syll. V p. 499.

1. **Nyctalis Coffearum** Eichelb., Verh. Bot. Ver. Brandenb. 3. Fge. 421 XIV (1906) p. 57. — Pileo plano, vix 1 cm. lato, squamulis concentricis, brunneolis, flocculosis consperso; velo manifesto; stipite albido medio incrassato, 2,5 cm. alt., 2-3 mm. cr., squamulis albis, crebris vestito, inferne brunneo-fibrilloso, basi stipitis in ligno superficiali et facile secedente; lamellis laxis, pallide brunneis, adnexus, arcuatis, brevioribus intermixtis, acie crassiuscula præditis, sterilibus (semper?); conidiis in superficie pilei effusis, catenulatis, ovoideo-oblongis 77×21 , interdum septatis, membrana duplici præditis, externa levi, interna ruguloso-undulata.

Hab. ad ramos languidos Coffeæ in Kwamkoro Usambara, Afr. occid., in laboratorium Amani transfertos.

CANTHARELLUS Adans. — Syll. V p. 482, IX p. 63, XI pag. 32, XIV p. 99, XVI p. 48, XVII p. 34.

1. **Cantharellus cibarius** Fr. — Syll. V, pag. 482. — var. **longipes** 422 Peck, Rep. St. Bot. 1903 (1904) pag. 24 (non Lamb.). — Pileo irregulari, margine lobato v. undulato, centro sæpe depresso et rimoso-squamoso; lamellis angustissimis, confertis, fortiter decurrentibus, frequenter anastomosantibus; stipite longo, latitudinem pilei subæquante v. longiori.

Hab. in silvis Coniferarum, North Elba Americæ bor. — Subsp. **squamulosus** Blytt, Vid.-Selsk. Skrift. n. 6 (1904) p. 108. — Dignoscitur pileo squamulis consperso, rufo-brunneo. Ad terram in Norvegia. — Var. media inter *C. cibarium* v. *rufipedem* et *C. Friesii*.

2. **Cantharellus glutinosus** Patouill., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXV 423 (1909) pag. 7, tab. I, fig. 2. — Solitarius v. cæspitosus, 4-8 cm. altus; pileo carnoso e cylindraceo turbinato, truncato, plano-umbilicato dein infundibuliformi, glutinoso, lateritio, margine recto integro dein involuto; hymenio vitellino e levi plicato-venoso, plicis obtusis, numerosis, ramosis; basidiis clavatis, $30-45 \times 9$ 4-sporis; cystidiis nullis; sporis ovoideis, albidis, vix rugulosis, $12-16 \times 6-8$; carne compacta, alba.

Hab. ad terram subtus Pinis, Dalat Annam Asiæ orientalis (EBERHARDT).

3. **Cantharellus pseudocibarius** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII 424 (1905) p. 123. — Pileo carnoso, subflabellato v. convexo, medio depresso, aurantiaco, levi, glabro 2-5 cm. diam., margine integro

v. undulato lobatoque; stipite laterali v. excentrico, tereti, farcto, levi v. substriato, basi bulbilloso, 4-6 cm. longo, 3-4 mm. crasso, concolori; lamellis subpliciformibus v. usque ad 2 mm. latis, decurrentibus, subconfertis, furcatis, inæquilongis, acie crassis integris, aurantiis; sporis subglobosis v. ovoideis, hyalinis, 4-5 \approx 3,5-4; odore grato.

Hab. ad basim truncorum in silvis prope Bipindi, Kamerun Africæ (ZENKER). — Edulis. *Canth. cibario* affinis.

4. **Cantharellus Götzenii** Eichelb., Verh. Naturw. Ver. Hamburg 425 3. Folge XIV (1906) p. 55. — Pileo albo-flavido, centro saturatiore, squamoso-fibrilloso; squamulis ad centrum obscurioribus et confertioribus, et $\frac{1}{2}$ cm. a margine remotam zonam circularem formantibus; margine extremo atro-piloso, inflexo; pileo medio carnosio 1 cm. cr., marginem versus tenuato et diaphano; carne albida, leviter farinam redolente; stipite æque atro-squamuloso, 5 cm. long., 1 cm. cr.; lamellis facile secedentibus, potius foliaceis, vix pliciformibus, decurrentibus, albidis, pluries dichotomis; sterigmatibus 6 μ . long.; sporis sphericis, levibus, hyalinis, 5-6 μ . diam.

Hab. ad terram, Amani Africæ orient. — Affinis *C. aurantiaco*, ad *Paxillum* nutans.

5. **Cantharellus croceus** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 426 (1909) p. 263. — Solitarius v. 2-3 cæspitosus; pileo subexcentrico infundibulari, subpellucido, rubro-croceo 1-2 cm. diam. sæpe lineis e centro radiantibus obscurioribus obsolete notato, membranaceo; stipite e cylindræo sursum sensim ampliato in pileum expanso concolore, glabro, insititio, vix ima basi nodulo fuscidulo, non rarius albo-puberulo donato; lamellis paucis acie integerrimis utrinque acutis non v. vix decurrentibus, sæpius bifidis; basidiis panduriformibus 25 \approx 7; sporis tenuiter tunicatis, 7-8 μ . diam., levibus, hyalinis.

Hab. ad terram pinguem, ramentis foliisque commixtam in alveo Rio Seco prope Oran Jujuy Argentinae.

6. **Cantharellus luteolus** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 427 (1909) pag. 263. — Solitarius; pileo ex orbiculari flabelliformi 15-20 mm. diam., profunde umbilicato margine crenato-repandulo non pellucido, levi glaberrimo luteo; stipite tereti 25-35 long., 1-1,5 mm. cr., levi glabro apice subpruinuloso et abrupte in pileo expanso, virescenti-luteo; lamellis confertiusculis acie integerrimis (0,5-1 mm. lat.), semel v. vix furcatis, spatiis regulis transversis

sæpe notatis, utrinque attenuatis posticeque decurrentibus citrinis; basidiis e clavulato panduriformibus 22-24 \times 5-6; sporis grossis 1-guttulatis 6-8 \times 5-6, levibus, ovatis, hyalinis.

Hab. ad folia coacervata putrescentia secus Rio Chico prope Oran Argentinæ. — An *Flammulæ brasiliensis* Fr. tantum varietas?

7. **Cantharellus rufipes** Gillet, Champ. Fr., Hymén. fasc. suppl. p. 4. 428

— Pileo depresso, margine undulato attenuatoque, 3-4 cm. diam., ochraceo-flavo, centro flavo-carneo; lamellis distantibus, decurrentibus, angustis, tenuibus, subsimplicibus, flavo-carneis; stipite firmo, duriusculo, 1-2 cm. longo, deorsum sensim tenuato, basi acuto, supra pallide flavo, deorsum rufo-ferrugineo; carne firma pallide flava, pileum versus subaurea; odore et sapore subnullis.

Hab. in graminosis silvarum in Gallia boreali.

8. **Cantharellus infundibuliformis** (Scop) Fr. — Syll. V, p. 490. — 429

var. **subramosus** Bres. Fungi trident. I, p. 87, tab. 97, Britzelm. Hymen. tab. 531, fig. 16. — Pileo submembranaceo e convexo umbilicato subinfundibuliformi, luride flavo expallente, 1-5 cm. lato; stipite irregulari, glabro, flavo, basi connato, farcto, ætate tantum subcavo, sæpe subramoso, 2-5 cm. long., 3-20 mm. cr.; carne albida, fracta subcarnea dein cinereo-subviolacea; basidiis 60-70 \times 6-8, subclavatis; sporis ellipsoideis sub vitro citrinis, intus granulosis, 9-10 \times 5-6.

Hab. in silvis frondosis, cæspitose nascens, in Agro Tridentino. *Canth. ramosus* Schulz. est proximus *Canth. cibario*, et a præsentibus diversus.

9. **Cantharellus mamillatus** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. 430

Skr. (1904) n. 6, p. 110. — Pileo 2 cm. lato, mamillato, gibboso, brunneo v. rufo-brunneo; stipite pallide griseo, 3-4 cm. long., 2-3 mm. cr.; lamellis pliciformibus, crassiusculis, cinereo-griseis.

Hab. ad terram, Krokhang Norvegiæ. — Habitus *Omphalice* sed characteres *Cantharelli*.

10. **Cantharellus tubiformis** Fr. — Syll. V, p. 489. — var. **pallidus** 431

Gillet, Champ. Fr. Hymén. fasc. suppl. p. 4. — Pileo tenui, pallide sulphureo, plus minus convexo, dein centro depresso et infundibuliformi, squamuloso, 3-4 cm. lat.; lamellis bifurcatis, subrectis, decurrentibus; stipite cylindrico, æquali v. deorsum subtenuato; carne alba v. flavo-albida.

Hab. in silvis Gallia borealis.

11. **Cantharellus Bambusæ** Pat. et Demange, Bull. Soc. mycol. Fr. 432

(1910) p. 32. — Pileo tenui, carnosomembranaceo, convexo-plano, dein centro depresso, margine elevato et sinuoso, initio nigro dein griseo-fusco, centro expallescens, glabro v. vix sub vitro flocculoso lamellis decurrentibus, confertis, crassis, crispis, pluries dichotomis, acie obtusis, cæsiopallidis, strato hymeniali 25-30 μ . cr.; stipite cylindræo, æquali, gracili, pallide cinereo, glabro, cavo; sporis ovoideis, incoloribus, levibus, 8 \approx 6.

Hab. ad radículas Bombusæ, Hanoi Tonkin. — Fungus 2 cm. alt; pileus 10-12 mm. lat.; stipes 1-2 mm. cr. Habitus *Clitocybes*, sed lamellæ *Cantharelli*.

12. **Cantharellus? niveus** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 433 (1909) p. 263. — Solitarius; pileo orbiculari, sæpius leniter excentrico 8-15 mm. diam., tenui sed tenacello, convexulo atque plus minusve profunde umbilicato, primo toto farinoso, serius marginem versus glabrato; stipite incurvulo 10-15 mm. long., 0,5-0,7 mm. cr., albo, glabro, molli, superne abrupte in pileum expanso; lamellis paucis remotissimis a basi, semel bifidis veniformibus, tenuibus cum hymenio toto albo-farinoso; basidiis minutis clavulatis, 15-16 \approx 5-6; sporis ex elliptico ovatis 3,5-4, levibus, eguttulatis, hyalinis.

Hab. ad ramulos dejectos putrescentes in silvis secus Rio Seco prope Oran Argentinæ. — An melius *Marasmii* sp.?

13. **Cantharellus Feltgeni** Sacc. et Trott. — *Cantharellus* sp. nov., 434 Feltgen, Vorst. Pilz-Fl. Luxemb. II T. (1906) p. 122. — Pileo 0,5-1 cm. lato et alto, flavo-brunneo, irregulariter marginato, infundibuliformi, lateraliter usque ad centrum inciso; lamellis laxiusculis, irregulariter decurrentibus, dichotomice ramosis, 0,5-1,5 mm. latis, utrinque attenuatis; stipite 4 cm. alto, 0,4-0,5 cm. cr., ochraceo-brunneo, farcto, levi; basidiis clavatis, 4 sterigmatibus præditi, 21-30 \approx 6-8; sporis globosis, hyalinis, uniguttulatis, levibus, 5-6 μ . diam.

Hab. ad caudicem ? fagineum putrem, Laubwald Grünewald-Helmsingen Luxemburgiæ. — Cæspitosus; fungi plures basi profunde infossa coalescentes.

14. **Cantharellus retirugus** (Bull.) Fr. — Syll. V, pag. 497. — var. 435 **marginatus** R. Maire, *Dictyolus membranaceus* (Dicks.) R. Maire, Champ. Asie min., Bull. Soc. Sc. Nancy (1906) p. 25 (extr.) var. *marginatus* R. Maire l. c. — Pileo lateraliter v. vix postice fibrillis adfixo, udo fulvo, 1-2 cm., margine atro-brunneo; lamellis e basi radiantibus fulvis, reticulatis; basidiis cylindræo-clavatis,

20-25 \times 7-8, tetrasporis; sporis ovoideis, hyalinis, levibus, 1-guttulatis, 8 \times 5-6.

Hab. ad Hypna in turfosis subalpinis Olympi bithynici.

15. **Cantharellus canalipes** (Laz. et Ibiza.) Sacc. et Trott. *Dictyolus* 436
canalipes Lázaro é Ibiza, Mem. R. Soc. Españ. Hist. Nat. V (1907) p. 30. — Pileo usque ad 3 cm. diam., integro v. quandoque usque ad medium limbi in 5 v. ultra lobos diviso, margine parum undulato et revoluto; pileo in pedicellum unciformem abrupte attenuato, pedicello intus albido et canaliculato, extus griseo demum etiam albido; pileo juveni pallide griseo et zonis griseis obscurioribus donato, senio alutaceo; lamellis griseolis usque ad marginem pilei productis, ad centrum angustatis.

Hab. ad terram, Casa de Campo y de la Moncloa Hispaniæ.

16. **Cantharellus fulvo-cærulescens** Valenti Serini, *Funghi senesi* t. 47, 437 fig. 1.

Hab. in agro Senensi Etruriæ. — Species dubia.

17. **Cantharellus olivaceus** (Paul) Lév. in Paulet *Traité Champ.* p. 50, 438
Hypophyllum olivaceum Paulet l. c. t. 98, f. 5-6.

Hab. ad terram in Gallia — Species dubia.

Subsect. II. Tenaces.

MARASMIUS Fr. — Syll. V p. 503, IX p. 65, XI p. 32, XIV p. 101, XVI p. 50, XVII p. 38.

1. **Marasmius longistriatus** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 105 439 (1906) p. 25, tab. S, fig. 1-4. — Pileo membranaceo, convexo dein plano, 7,5-15 cm. lato, centro depresso v. quandoque late infundibuliformi, juveni udo et centro striato, udo rufo-brunneo, sicco griseo-rubro; lamellis tenuibus, angustis, confertis, adnatis, inæqualibus, albidis; stipite æquali, extus cartilagineo, farcto v. cavo, tomento griseo, basi longiore, tecto, 18-26 mm. longo, 11 mm. cr.

Hab. in pinetis, Bolton Landing Americæ bor. — *Marasmiio subnudo* affinis.

2. **Marasmius cæspitum** Quélet, Ass. franc. Avanc. Sc. XXII (1893) 440 p. 3, tab. III, fig. 7 (extr.). — Pileo hemisphærico, dein applanato, 2-3 cm. lat., margine striato, pruinoso, ex albo ochraceo dein fulvo; carne tenui, albida, Marasmii Oreadis odore; lamellis emarginatis cremeis v. cereis, dein ex ochraceo incarnatis; stipite fibrilloso deorsum tenuato, fibroso, furfuraceo-tomentello, supra ex albo ochraceo-griseo, deorsum brunneo.

Hab. cæspitosus ad radices Graminum et Juncorum, Aunis, Nivernais Galliæ (Domina DAULNOY). — Affinis *Marasmiio lupuletorum* (Weinm) Bres. = *Collybia lupuletorum* (Weinm) QuéL. — Syll. V, p. 221.

3. **Marasmius pergamenus** Pat. et Demange, Bull. Soc. myc. Fr. (1910) 441 pag. 37. — Pileo hemisphærico, dein plano, 1-2 cm. lato, sulcis profundis et latis usque ad centrum exarato, plicato, glabro, ruguloso, sicco, pergameneo, tenui, ochraceo-brunneo, ad cristas saturatiore; lamellis parcis, distantibus, integris, inæqualibus, adnatis, pallide flavo-brunneis; stipite gracili, cylindrico v. compresso, cavo, flavo-albido, sicco, tenaci, pruinoso, basi mycelio flavido sat copioso cincto; sporis fusoides, levibus, 21-34 \approx 6.

Hab. in foliis et rhizomatibus putridis Graminum in sabulosis, Mat Son, Than Hoa, Tonkin. — Fungus 5-7 cm. alt. Habitus quasi *Heliomycetis*.

4. **Marasmius Hautefeuillei** Pat. et Demange, Bull. Soc. myc. Fr. (1910) 442 p. 37. — Mycelio albo, tenui, pulverulento, folia et fragmenta Bambusæ obducente; stipite cylindrico, æquali, erecto, asperulo, tenaci, brunneolo, pruina lilacina tecto, 5-7 cm. alt., 2 mm. cr.; pileo convexo-plano, dein depresso et umbilicato, tenui, plicato, flexuoso, glabro, sicco, albo centro lilacino, pellicula peculiari nulla; lamellis valde inæqualibus, adnatis, copiosis, albis; odore et sapore gratis.

Hab. in foliis et detritis Bambusæ putrescentibus, dejectis, Hanoi Tonkin. — *M. Wynnei* affinis.

5. **Marasmius nuptialis** Morg., Journ. of Mycol. XI (1905) p. 238. — 443 Pileo carnosulo, e campanulato expanso, subumbonato, fulvo, expallenti, superficie rugosulo et impresso; stipite cartilagineo, supra angustato, cavo, supra levi et glabro, infra dense albo-villoso, apice albo, inferne fulvescenti; lamellis parum angustis, confertis albis, adnexo-secedentibus; sporis lanceolatis, hyalinis, 9-11 \approx 3-4.

Hab. inter folia et ligna putrescentia in Amer. bor. — Pileus 3-4 cm. diam.; stipite 7-10 cm. longus, 4-7 mm. cr.

6. **Marasmius opalinus** Masee, Kew Bull. 46 (1906) p. 46, fig. 7-11. 444 — Pileo primo hemisphærico-globoso, dein applanato-hemisphærico, 3-4 cm. lat., centro late profundeque umbilicato, margine incurvo et striatulo, integro, membranaceo, tenacello, rufescente, disco obscuriore, glaberrimo; lamellis remotis, strictissimis, utrinque attenuatis, membranaceis, opalino-pallidis; stipite longiusculo, 6-8 cm., gracili, tereti, deorsum vix incrassato, glaberrimo, can-

dido; sporis hyalinis, ellipsoideis, deorsum lateraliter acutatis, 10-11 \approx 6.

Hab. in ligno ex Jamaica recepto.

7. **Marasmius Sutliffæ** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII (1905) 445 p. 78. — Pileo tenui, molli, subcampanulato v. convexo, glabro, udo nitido, rubro-brunneo, centro sæpe obscuriore; sapore amaro; lamellis latis, moderate confertis, subventricosis, adnexis, albis, sæpe subcinnamomeis, interstitiis venosis; stipite angusto, cartilagineo, cavo, glabro v. leniter pruinoso, pallido, basi albo-tomentoso; sporis albis, ellipsoideis, 8-10 μ . long., 5-6 μ . latis, sæpe nucleo lucente præditis.

Hab. in umbrosis nudis prope Sacramento Californiae (Miss M. L. SUTLIFF). — Pileus 1-2 cm. latus; stipes 2,5-4 cm. longus, 2-3 mm. cr.

8. **Marasmius michailowskoensis** P. Henn. Hedw. XLV (1905) p. 25. 446 — Pileo subcoriaceo, convexo explanato, levi, glabro, gilvo, 4-5 mm. diam.; stipite fistuloso, subtereti compresso, aurato, flavo-brunneo, farinaceo-pruinoso, 5-8 mm. longo, 0,5 mm. cr.; lamellis sinuoso-adnatis, subdistantibus, late ventricosis, acie crassis, minute serratis, ochraceis; basidiis clavatis, 10-15 \approx 4-5; sporis clavatis, basi apiculatis, 3-guttulatis, 6-9 \approx 3-3,5, hyalinis.

Hab. in ramis Tiliæ parvifoliæ, Michailowskoe Russiae. — *M. calopodi* Pers. et *M. rameali* Bull. affinis sed sporis clavatis probe distincta.

9. **Marasmius vinosus** Speg. An. Mus. Nac. t. XIX (1909) p. 264. — 447 Pileis convexulis leniter excentricis, 10-20 mm. diam., membranaceo-subcarnosulis non pellucidis, tenacellis, glaberrimis, obsolete laxeque radiatim striatis, centro plus minusve umbilicatis, margine rectis integerrimis, lividis v. cyaneo-rubrescentibus; lamellis simplicibus, angustis, fere pliciformibus, integerrimis non furcatis, spatiis levibus non rugosis; stipite e nodulo parum manifesto, sæpius leniter pruinuloso, exurgente recto v. curvulo, tereti 5-15 mm. longo, 0,5-1 mm. cr.; pileo obscuriori, glaberrimo, opaco, tenaci sed non rigido nec lignoso; basidiis clavulatis 20-25 \approx 10, sterigmatibus 2 longiusculis coronatis; cystidiis clavulatis, appendice cylindræa non v. vix brevioribus ornatis commixtis; sporis ex ovato subnavicularibus, 8-14 \approx 4-7, sæpius biguttulatis, brevibus, hyalinis.

Hab. ad ramos dejectos putrescentes in Parque Roca Tucuman Argentina.

10. **Marasmius Schiffneri** Bres., in v. Höhnelt, Ergeb. Bot. Exp. 448

Südbras. (1901); Denk. k. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. LXXXVIII (1907) Extr. p. 15. — Albus, exsiccando luride stramineus; pileo membranaceo, convexo-expanso, rarius, in speciminibus excentricis, flabellato, pruinato, 2-4 mm. lato; lamellis adnatis, distantibus; stipite centrali, excentrico v. laterali, pruinato, 0,5-2 mm. longo, $\frac{1}{4}$ mm. crasso; basidiis clavatis, 40-45 \approx 10-12; sporis obovatis 9-11 \approx 6-8.

Hab. ad ramos putres prope Rio Grande, San Paulo Brasiliæ.

11. **Marasmius phyllophilus** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 449 (1907) p. 26. — Pileo membranaceo, convexo v. subplano, sicco, conspicue rugoso-striato v. rugoso-sulcato, albido, sicco leniter rubro, 8-16 mm. lato; lamellis angustis, tenuibus, postice rotundatis adnexis, albis, interstitiis venosis; stipite tenaci, angusto, insititio, cavo, tomento albo minuto v. velutino tecto, 20-30 mm. longo, 1 mm. cr.; sporis 5-6 \approx 2,5-3,5.

Hab. gregatim ad terram inter folia dejecta, Wading River Suffolk co. Amer. bor. — *Mar. insititio* Fr. proximus.

12. **Marasmius felix** Morg., Journ. of Myc. XII (1906) p. 2. — Pileo 450 membranaceo, e convexo plano, glabro, parum plicato-ruguloso, rufescente; stipite plus minusve elongato, capillari, minute pubescente, brunneo v. nigrescente, apice albo, basi innato; lamellis inæqualibus, nonnullis furcatis, parum angustis, distantibus, adnatis, albis; sporis ovoideo-oblongis, apiculatis, 7-9 \approx 3-4.

Hab. in foliis siccis Platani in petiolis et nervis insidens, Preston, Amer. bor. — Pileus 2-6 mm. diam.; stipes 2-8 cm. longus, pallide rufus v. ex albescenti testaceus, arescendo obscurior. *M. epiphylo* proximus.

13. **Marasmius delectans** Morgan, Journ. of Mycol., XI (1905) p. 206, 451 Hard, Mushrooms p. 151, fig. 114. — Pileo subcoriaceo, e convexo expanso et depresso, glabro, ruguloso, ex albo arescendo pallide alutaceo; stipite longo, angusto, supra leniter angustato, glabro, brunneo et nitido, apice albido, mycelio copioso albo circumdato; lamellis moderate expansis, inæqualibus, subdistantibus, infra trabeculatis, albis, emarginato-adnexis; sporis oblongo-lanceolatis, hyalinis 7-9 \approx 4.

Hab. inter folia dejecta in Amer. bor. — Pileus 1-2 cm. diam.; stipes 3-5 cm. long., 1-1,5 mm. cr.

14. **Marasmius dasypus** Speg. Ann. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 452 (1909) p. 264. — Solitarius v. laxe gregarius; pileo sæpius orbiculari, 15-35 mm. diam., margine undulato-repandulo, centro plus

minusve depresso, non striato, e membranaceo-subcarnosulo, tenacello opaco; stipite concolore, recto, gracili, 25-35 mm. long. 1 mm. cr., basi insitio non incrassato, rigido sed non corneo, villo denso adpresso crispuloque omnino vestito; lamellis utrinque attenuatis postice adnatis, candidis; basidiis clavulatis 25×7 ; sporis eguttulatis $9-10 \times 4$, levibus, subnavicularibus, hyalinis.

Hab. ad ramenta foliaque putrescentia in silva prope Ledesma, Jujuy Argentinæ.

15. **Marasmius bellipes** Morgan, Journ. of Mycol. XI (1905) p. 207. 453

— Pileo tenui, carnosulo, e campanulato expanso, glabro, plicato-sulcato, e pallido rubro-purpureo; stipite longo, angusto, supra incrassato, glabro, inferne brunneo et nitido, apice purpurascenti, mycelio copioso albo circumdato; lamellis moderate expansis, æqualibus, subdistantibus, albis, approximatis; sporis lanceolatis, hyalinis, $10-12 \times 3-4$.

Hab. inter folia dejecta in Amer. bor. — Pileus 1,5-2,5 cm. diam.; stipes 4-6 cm. longus, 1 mm. cr.

16. **Marasmius alienus** Peck, New York St. Mus. Bull. n. 139 (1909) 454

p. 25. — Pileo tenui, lento, convexo, 6-12 mm. lat., subpruinoso, sicco pallido v. subluteolo, margine tenui, recto; lamellis subarcuatis, distantibus, leviter decurrentibus, cremeis, in siccitate brunnescentibus; stipite gracili, firmo, 2,5-5 cm. long., 0,5-1 mm. cr., fistuloso, subpruinoso, pallido; sporis oblongis v. anguste ellipsoideis, $8-10 \times 4-5$.

Hab. ad truncos muscosos, Fine St. Lawrence co. Amer. bor.

17. **Marasmius castaneo-velutinus** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII 455

(1905) p. 124. — Pileo membranaceo-coriaceo, convexo-expanso, vertice obtuso, umbilicato vel rotundato, subumbonato, obscuriori, radiato-striatulo, velutino, castaneo, 1-3 cm. diam.; stipite cavo, subtereti, corneo-corticato, ex atro-fusco pallescente, pruinoso, 4-8 cm. longo, 1,5-2,5 mm. cr., basi incrassato sæpe mycelio radiato flavo-brunneo circumdato; lamellis adnatis, confertis, angustissimis, inæquilongis, subincarnato-fuscescentibus; sporis subglobosis, hyalinis flavidulis, levibus, $2,5-3,5 \mu$. cr.

Hab. in ligno putri, Bipindi Kamerun Africae (ZENKER). —

Mar. Todeæ P. Henn. proxima.

18. **Marasmius ficicola** (Pat. et Demange) Sacc. et Trott. *Androsaceus* 456

ficicola Pat. et Dem. Bull. Soc. mycol. Fr. (1910) p. 35. — Pileo convexo, dein plano, membranaceo, rufo, centro saturatiore, in vivo striato- in sicco profunde sulcato, 2-10 mm. lato; stipite nigro,

rigido v. flexuoso, criniformi, glabro, 1-5 cm. longo; lamellis paucis (8-10) albis, adnatis, venis nullis; basidiis cylindricis, 15-18 \times 5-6; cystidiis hyalinis, fusoides; pelliculæ cellulis ovoideo-rotundatis, 12-15 μ . diam., sursum verrucosis, rufis, deorsum hyalinis et levibus; sporis

Hab. ad petiolos putres infossos Fici elasticæ, sparse vel gregatim, Hanoi Tonkin.

19. **Marasmius omphalinus** (Pat. et Demange) Sacc. et Trott. *Androsaceus omphalinus* Pat. et Dem. in Bull. Soc. mycol. France (1910) pag. 35. — Delicatus; stipite filiformi, flexuoso, badio-nigricanti, glabro, 1 cm. longo, apice in pileum 3-4 mm. lat., albidum, tenuissimum, pellucidum, non striatum, profunde umbilicato-infundibuliformem dilatato, margine reflexo; pellicula cellulis brunneolis, 12 \times 8, verrucis elongatis, obtusis, hyalinis dense obsitis obtecta; hymenio obverse conico, levi v. vix plicatulo, ubique fertili; sporis elongato-fusoides, hyalinis, 10-12 \times 5.

Hab. in foliis putridis dejectis ad viam a Phu Ly ad Chi Né Tonkin.

20. **Marasmius sæpiarius** (Pat. et Demange) Sacc. et Trott. *Crinipellis sæpiarius* Pat. et Dem. Bull. Soc. mycol. Fr. (1910) p. 36. — Pileo plano-convexo, dein depresso, 10-15 mm. diam., zonato, fusco, centro saturatiore, floccis concoloribus, adpressis, consperso; floccorum hyphis tenacibus, gracilibus, prælongis, trama tenui, sicca; lamellis albis, adnatis, parum crassis, distantibus; stipite rigido plano, 2-3 cm. longo, cylindræo, gracili, basi fusco-nigro superne pallide brunneo, floccis brunneis sparsis squarroso; sporis hyalinis, levibus, ovoideo-rotundatis, 6-8 μ . lat.

Hab. ad fragmenta herbacea in sæpe quadam Bambusæ, Hanoi Tonkin. — *Mar.* (*Collybia*) *stipitario* affinis.

21. **Marasmius bicolor** (Pat. et Demange) Sacc. et Trott. *Crinipellis bicolor* Pat. et Dem., Bull. Soc. mycol. Fr. (1910) p. 36. — Sessilis, postice resupinatus, e globuloso dein expansus, cochleatus, minutus, 1-2 mm. diam., margine reflexo, rufo-castaneus, peripherice pallidior, tuberculo albo villosus suffultus; pileo levi, glabro, pelliculoso; trama tenuiter carnosus, alba; lamellis crassiuseculis radiantibus, confertis, inæqualibus, obtusis; cystidiis nullis; basidiis 24 \times 6; sporis ovoideis, incoloribus, 8 \times 6, levibus, pluriguttulatis.

Hab. ad ramulos tenellos emortuos, Su Yut Tonkin. — Habitu *Pleurotum Craterellum* in memoriam revocat.

22. **Marasmius elatus** (Patouill.) Sacc. et Trott. *Crinipellis elatus* Pa- 460

touill., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIV (1908) p. 167. — Sparsus vel gregarius; pileo convexo, obtuso, sericeo, argenteo-nitenti, centro brunneolo, margine incurvo; lamellis adnexis, fuscidulis; stipite longissimo, criniformi, 6-20 cm. longo, rigido, hirsuto, rufo, apice albo-hyalino.

Hab. in foliis dejectis in Nova-Caledonia (LE RAT). — *Marasmius* (*Collybia*) *stipitario* proximus.

23. **Marasmius Trabutii** Maire in Bull. Soc. bot. France, LVI (1909) [edit. 1911] p. CCLXXIX, tab. XX. — Pileo e convexo plano, interdum umbonato, dein depresso, 0,5-1 cm. diam., membranaceo, albo v. albido, centro subochraceo, glabro, opaco, margine ex incurvo expanso, substriato; lamellis latis, adnato-decurrentibus, triangularibus, rectis v. subarcuatis, distantibus; sporis oblongis, basi acutis, levibus, hyalinis, 13-20 \times 6,5-7; basidiis 4-sporis 45-50 \times 10-11; cystidiis nullis; stipite brevi, 0,3-0,6 cm., atro, prope lamellas albido, velutino, subtomentoso, sæpe excentrico, solido, insititio, intus albo. 461

Hab. in calamis et radicibus Scirpi Holoschœni in Tunisia. — Affinis *M. Delilei*, differt stipite velutino et lamellis distantioribus.

24. **Marasmius Bambusæ** (Pat.) Sacc. et Trott. *Crinipellis Bambusæ* Patouill., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIV (1908) p. 8. — Reviviscens, gregarius v. solitarius, mesopus, minutus; pileo membranaceo, 1-2 mm. lato, convexo, subgloboso, sericeo, albido-nitente, centro brunneo, margine levi v. sulcatulo; cellulis prostratis pelliculæ longissimis, tenacissimis, albidis, 3-4 μ . cr; lamellis strictis, albidis, adnatis, integris, subdistantibus; sporis albis, ovoideis 8 \times 5; stipite cylindraceo, gracilis, fibroso, fusco-brunneo, pruina alba consperso, 3-4 mm. longo. 462

Hab. in culmis Bambusæ, Brasilia (NOACK). — *Marasmius excentrico* affinis et a *Collybia stipitaria* (= *Marasmius scabello*) multo diversus. Ad gen. *Crinipellis* pertinet etiam, sec. PATOUIL-LARD, *Agaricus trichialis* Lév. seu *Naucoria ? trichialis* Sacc., Syll. V p. 853.

25. **Marasmius rarus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 38. — Britzelmayr, 463 Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 20. — Pileo subopaco, campanulato, apice obtuse conoideo, rugoso, albido-flavo-rubro, carneo, 2,2 cm. lato; stipite 12 cm. long., 2 mm. cr., cavo, tenaci, basi albo-tomentoso, supra albido, basi nunc rubro-brunneo nunc obscure rubro-brunneo; lamellis subremotis, flavido-albis, carneis,

pallide flavo-rubidis, 4 mm. latis, confertis; carne inodora; massa sporarum alba; sporis subglobosis, apiculatis, $8 \times 6-7$.

Hab. in silvis Coniferarum Bavaricæ. — *M. molyoidi* affinis.

26. **Marasmius subrufescens** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 38. — Britzelmayr, Revis. Hymen. IV (1899) p. 19. — Pileo opaco, alutaceo centro obscuriore, convexo, expanso, etiam late umbonato, 9 cm. lato; stipite 9 cm. long., 1-2 cm. lato, basim versus angustato v. acutato, farcto, supra flavido, basi rubro-brunneo et piloso-stri-goso; lamellis crassis, confertis, ochraceis, griseis vel brunneolo-ochraceis, 3 mm. latis, adnatis v. rotundato-adnaxis, sæpe subli-beris; carne tenaci, albida, sapore combusti; massa sporarum alba; sporis elongatis, $10-12 \times 4$, uno apice acute elongatis, hyalinis.

Hab. in silvis Bavaricæ. — *Mar. peronato* affinis.

27. **Marasmius arenivagus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 38. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 20. — Pileo albo, isa-bellino tincto, irregulariter convexo, applanato, umbonato, sæpe superficie undulata prædito, 2,5 cm. lato, rugoso; stipite farcto, 4 cm. longo, 1 mm. cr., quandoque supra incrassato albido, v. ex albo brunneo-rubido demum nigricante, varie incurvato; lamellis albis, vix flavidis, remotis, venosis, undulatis, 3 mm. latis; carne tenaci; massa sporarum alba; sporis 16×6 , hyalinis, elongatis, utrinque angustatis, fere acutatis, sæpe curvulis.

Hab. in sabulosis Bavaricæ. — *Mar. amadelpho* affinis.

28. **Marasmius subsplachnoides** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 38. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 20. — Pileo he-misphærico, convexo, albo, centro flavescenti, subopaco, subpapy-raceo, 8 mm. lato; stipite contorto, 9 cm. long., 1 mm. cr., cavo, glabro, flavo vel flavido-rubro, supra albido; lamellis confertis, albis, liberis, adnaxis, subadnatis, 4 mm. latis; carne tenaci; massa sporarum alba; sporis $6-7 \times 2-3$, elongatis, vix acutatis, quandoque subcurvulis.

Hab. inter folia dejecta in Bavaria. — *Mar. splachnoidi* affinis.

29. **Marasmius Theobromæ** F. C. v. Faber in Arbeit. K. Biol. Anst. Berlin. VII (1909) p. 227. — Minutus, gregarius; stipite centrali, filiformi, atro, 1-1,8 cm. longo; pileo late campanulato, plicato, membranaceo, brunneo, margine dilute ochraceo, 0,8 cm. diam.; lamellis paucis simplicibus, membranaceis, dilute ochraceis; sporis continuis, hyalinis, ovoideis, basi acutis, apice rotundatis, $5-7 \times 3-4$.

Hab. in foliis emortuis Theobromæ Cacao, Camerun. — Pilei hyphæ brunneæ.

30. **Marasmius tenuatus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 38. — Britzel- 468
mayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) pag. 19. — Pileo convexo
centro depresso, demum margine recurvato, 1,8 cm. lato, tenui
carnoso, margine fere membranaceo, subopaco, fere subpiloso, isa-
bellino, carneo-isabellino; stipite farcto, 3 cm. long. 1 mm. cr.,
supra albido, basi nigro-brunneo; lamellis remotis, albidis, isabel-
lino tinctis, ex emarginato, adnatis decurrentibus, 3 mm. latis; carne
pileo concolori, tenaci, odore et sapore nullis; massa sporarum
alba; sporis 10-12 \approx 5-6, pallide aquosis, elongatis, uno apice acu-
tatis.

Hab. in sabulosis Bavaricæ. — *Mar. calopodi* affinis.

31. **Marasmius Allium** Eichelb., Verh. Naturw. Ver. Hamburg, 3. 469
Flge. XIV (1906) p. 64. — Pileo 3 cm. lato, albido, conchiformi,
dimidiato; stipite laterali, brevissimo, albido, pilosulo; lamellis laxis
nonnullis brevioribus intermixtis, radiantibus, pileo obscurioribus,
quandoque retiformi-anastomosantibus; basidiis clavatis, crassis,
basi 25 μ . apice 8 μ . cr.; sterigmatibus inconspicuis; sporis hya-
linis, albis, levibus, parum elongatis 6 \approx 4.

Hab. ad ramos dejectos prope Amani Africæ borealis. — Inter
species apodes odore fortiter alliaceo distinctus.

32. **Marasmius archyropus** Fr. — Syll. V, p. 521 et XI, p. 38. — 470
var. **suaveolens** Rea, Trans. Brit. Mycol. Soc. 1905 (1906) p. 129,
tab. XII — A typo differt statura majori; pileo margine striato;
lamellis latioribus et odore grato ut *Marasmii oreadis*.

Hab. inter folia dejecta, Grange Park, Swarraton, Hants Angliæ.

33. **Marasmius epodius** Bres. — Syll. XI, p. 34. — var. **microsporus** 471
Maire, Bull. Soc. Myc. Fr. XXIV (1908) p. LVI (*Androsoceus*).
— A typo differt sporis minoribus, 12-15 \approx 3-4.

Hab. ad vegetabilia putrescentia, Carnac Gallicæ, in Græcia et
prope Tridentum (BRESADOLA).

34. **Marasmius scabellus** (A. et S.) Morg., Journ. of Mycol. XI (1905) 472
p. 202 = *Agaricus scabellus* A. et S. — Ita vocandus est, teste
Morgan l. c., *Agaricus stipitarius* Fr. seu *Collybia stipitaria* (Fr.)
Gill. — Syll. V p. 216.

35. **Marasmius hygrometricus** Brig. — Syll. V, p. 543. — Huc du- 473
cendus est *Marasmius corbariensis* Roumeg., Rev. mycol. II (1880)
p. 198, tab. VII, fig. 5.

36. **Marasmius ascophorus** (Peck) Cooke, Grevillea 1891, p. 104. — 474
In Sylloge omissus est quia ab ipso auctore Peck in litt. aliisque
auct. refutatus ut forma abnormiter evoluta. Ceterum ab auctore

inter *Hebelomata* ochrospora receptus, hinc non *Marasmius*. Cfr. *Agaricus* (Hebeloma) *ascophorus* Peck 22 Report (1871) pag. 68, t. III, f. 1-6; Berkeley, Gard. Chron. III (1875) p. 503, fig. 106; De Seynes, Grevillea III (1875) tab. 46.

HELIOMYCES Lév. — Syll. V p. 569, IX p. 70.

1. **Heliomyces verpoides** Rick, in Ann. Mycol. III, p. 236 (1905), 475
cum icone. — Pileo campanulato, cespitoso, cartilagineo-gelatinoso, 2 cm. lato, superne fulvo-luteo, egregie costato-reticulato, minute velutino, tactu fuscescente; stipite tereti, 2-3 cm. alto, 5 mm. lato, cartilagineo-fibroso, firmo, concolore, superne albo-farinoso, e basi albo-villosa oriundo; lamellis inter se versus pedem in anulum junctis (annulo apico stipitis arcte adnexo et striis subdecurrente) inæqualibus, conspersis pube minuta ex cystidiis formata, albidis, postea stramineis, confertis, solidis, subventricosis, tactu nigrescentibus; paraphysibus 100 \approx 12, clavatis, hyalinis, plasmate vacuis magnis interrupto; cystidiis paucis elliptico-ovatis, apice obtuso, 80 \approx 40, pede brevi; basidiis 70 \approx 12-14, 2-4-sterigmaticis; sterigmatibus 6-12 μ . longis; sporis subrotundis, 12-15 μ . diam., apiculatis, hyalinis, in sicco polygonalibus membrana contracta.

Hab. in trunco putrido in Brasilia.

LENTINUS Fr. (incl. *Pano* p. p.). — Syll. V p. 571 et 614, IX p. 71 et 66, XI p. 39 et 41, XIV p. 117 et 122, XVI p. 61, XVII p. 48.

1. **Lentinus holophæus** Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII (1907) p. 76. 476
— Pileo sessili, dimidiato, coriaceo, semiorbiculari, 15 cm. lato, 8 cm. longo, plano-convexo, omnibus partibus brunneo, tomentosohispido, longe radiato, antice striato; margine inflexo, acuto et integro; lamellis 2 cm. latis, distantibus, pallidioribus, inæqualibus, acutis in acie lacerato-dentata, coriaceis, hispidis ex prominentiis pilosis copiosis; trama tenui.

Hab. ad caudices putres, in valle Da Pounian, 1200 m. alt. Indo-Cinæ (EBERHARDT).

2. **Lentinus connatus** Berk. Enum. fung. Philipp. in Journal of Botany (1842) p. 145. — Fasciculatus; pileis lato-infundibuliformibus, 10 cm. et ultra lat., 6-7 mm. prof., lobatis, tenuibus, glabris, umbrinis, lineis tenuissimis creberrimis virgatis; lamellis confertis, angustis, æqualibus, integerrimis, longe decurrentibus, fulvis; sti-

pitibus connatis velutinis, spongiosis, 12-14 cm. long., 6-8 mm. cr., ligneo-pallidis.

Hab. in lignis putridis in insulis Philippinis (CUMING). — *Lentino exili* affinis.

3. **Lentinus fusco-ferrugineus** Speg. An. Mus. Nac. Buenos Aires 478 t. XIX (1909) p. 266, fig. 1-2. — Cæspitosus (an semper?); stipitibus erectis rectiusculis; pileo suborbiculari, 9-11 cm. diam., plus minusve excentrico quandoque integro quandoque cordato-subdimidiato, super stipitis confluentiam subumbonato-incrassato latiuscule umbilicato, ceterum planiusculo, obsolete sulcato-zonato, obscure sordideque ferrugineo, partibus magis elevatis lenissime subnitentibus, margine recto modice grosseque crenato-repandulo; lamellis papyraceo cartilagineis, tenuibus, latissimis, 5-8 mm. lat., utrinque attenuato-acutatis, margine acutissimis irregulariter erosoreticulatis, non anastomosantibus nec furcatis nec costatis; pileo vix pallidioribus, in stipitem decurrentibus ac rugulas v. costulas subfurcatas et basim fere usque productas efficientibus; stipite tereti 70-75 mm. long., 7-8 mm. diam., lamellis concolore, utrinque non v. vix incrassato, glabro v. ima basi tantum obsolete squarulosopuberulo, farcto, cum pileo continuo, carne compacta stupposa obscure fulvo-ferruginea cum stipite continua, in pileo 2 mm. cr., marginem versus sensim attenuata; sporis non visis.

Hab. ad truncos dejectos putrescentes in silvis prope Fracrán Misiones Argentinae.

4. **Lentinus spretus** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 105 (1906) 479 pag. 24. — Pileo tenui, tenaci, e convexo plano, 5-12 cm. lato, obtuso v. umbonato, rimose squamuloso, griseo-brunneo v. pallide alutaceo, centro obscuriore, albo-carneo; lamellis sat angustis, serratis, decurrentibus, albidis, margine laceratis; stipite plerumque longiusculo 2,5-7,5 cm. long., 6,5-13 mm. cr., æquali v. quandoque basi angustato v. etiam subincrassato, substriato, solido, plus minusve squamoso, distincte excentrico, albido, basi quandoque brunneolo; sporis albis, oblongis, 7,5-10 \approx 4.

Hab. in ligno dejecto Coniferarum, Horicon Warren Co., ad trabeculas viæ ferratæ, Albia Rensselaer Co. Americae bor. — *Lentino lepideo* proximus.

5. **Lentinus baguirmiensis** Pat. et Har., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIV 480 (1908) p. 14. — Solitarius v. gregarius; pileo explanato, vix depresso, ochraceo, 5-7 cm. lato, orbiculari, glabro, centro sparse et distanter squamoso, squamis erectis, acutis, concoloribus, margine

levi inflexo; stipite cylindræo, centrali, 5-7 cm. longo, 15 mm. circ. cr., concolori, nonnullis squamis appressis obscurioribus distantibus eleganter maculato, inferne paullulum inflato, longissime radicato-ramoso; lamellis confertissimis, strictis, acie integra, postice anastomosantibus decurrentibusque, concoloribus.

Hab. ad terram arenosam, Baguirmi (A. CHEVALIER). — *Lent. Woermanni* affinis.

6. **Lentinus ramosipes** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. (1909) 481

n. 2, p. 88. — Pileo flaccido, convexo, glabro, orbiculari, albido, centro umbilicato, margine subintegro, inflexo, usque ad 6 cm. diam.; lamellis subdistantibus, inæqualibus, strictis, decurrentibus, eximie crenulatis, pallide alutaceis; stipite subcentrali, albo, glabro, exannulato, lignoso, sæpissime ramoso, 10 cm. circ. longo, 4-8 mm. cr.

Hab. ad lignum cæspitose crescens, Chavi Snoussi, Baguirmi, Congo Africae trop. — *L. flaccido, pergameno, claudopodi* affinis, sed lamellis crenulatis distinctus.

7. **Lentinus vestidus** (Earle) Sacc. et Trav. — Syll. fung. XX. — 482

Pocillaria vestida Earle, Estac. Agronom. Cuba I (1906) p. 231, tab. 31, fig. 2. — Pileo crasso, duro, 5 cm. diam., umbilicato-convexo, subbadio, tomento rigido, subsquarroso subfasciculato obscuriore tecto, margine distincte incurvato, non striato; lamellis bifurcatis, basi distincte anastomosantibus, glandulosis, subdecurrentibus et stipitis partem superiorem lineis anastomotis, confertis subbadiis signantibus; sporis anguste ellipsoideis v. subcylindricis, subincurvatis, 6-8 \times 3; stipite 4 cm. long., 4-5 mm. cr., utrinque incrassato, supra velutino ad basim subhirsuto, unicolori sed pilis obscurioribus, farcto, firmo et lignoso.

Hab. solitarius ad truncos vetustos, Santjago de las Vegas in ins. Cuba. — Rectius « vestitus » dicendus!

8. **Lentinus Palmeri** (Earle) Sacc. et Trav. — Syll. fung. XX. — 483

Pocillaria Palmeri Earle, Estacion Agron. Cuba I (1906) p. 232, tab. 31, fig. 4. — Pileo tenui, in sicco subflexibili, 3-4 cm. lato, infundibuliformi, obscure cinnamomeo, primum subtomentoso dein subglabro, margine subtomentoso striato; lamellis distantibus, simplicibus, non glandulosis, decurrentibus, subconfertis, angustis, margine integris, pileo pallidioribus, ob sporas albescentibus; sporis ellipsoideis 8-9 \times 4-5; stipite 1-2 cm. longo, 4-5 mm. cr., cylindrico, unicolori, farcto, dense et adpresse squamuloso.

Hab. solitarius in substantiis putridis, San Diego de los Baños in ins. Cuba.

9. **Lentinus cinnamomeus** (Earle) Sacc. et Trav. — Syll. fung. XX. 484

— *Pocillaria cinnamomea* Earle, Estac. Agronom. Cuba I (1906) p. 231, tab. 31, fig. 3. — Pileo tenui 3-4 cm. lato, infundibuliformi, obscure cinnamomeo, dense piloso, margine striato subsquamuloso; lamellis distinctis, non glandulosis, in stipitem pilosum decurrentibus, subconfertis, angustis, margine integro crassiusculo, pileo pallidioribus; sporis non visis; stipite 3-4 cm. longo, 3-4 mm. cr., subcylindrico, ubique piloso, unicolori, farcto.

Hab. solitarius v. gregarius in substantiis putridis Herradura in ins. Cuba. — *Lent. velutino* affinis.

10. **Lentinus reflexus** (Earle) Sacc. et Trav. — Syll. fung. XX. — 485

Pocillaria reflexa Earle, Estac. Agronom. Cuba I (1906) p. 231, tab. 31, fig. 1. — Pileo tenuissimo in sicco duro et rigido, 1,25 cm. diam., profunde infundibuliformi, rubro-brunneo, primum tomentoso, demum fere glabro, margine jugiter tomentoso, revoluto; lamellis non ramosis nec furcatis, subglandulosis, decurrentibus, confertis, linearibus, albidis; sporis anguste ellipsoideis, $6 \approx 3$; stipite 2-3 cm. long., 1-2 mm. cr., subcylindrico, velutino dein fere glabro, infra firmiore et obscuriore.

Hab. gregarius ad truncos vetustos in silvis Candelaria in ins. Cuba.

11. **Lentinus similans** (Earle) Sacc. et Trav. — Syll. fung. XX. — 486

Pocillaria similans Earle, Estac. Agronom. Cuba I (1906) p. 232, tab. 32, fig. 1. — Pileo tenui, molli, regulari, 1-2,5 cm. lato, subinfundibuliformi, rubro-brunneo, primum subpurpurascenti v. lilacino, hinc inde villosulo, margine ciliato, non striato; lamellis bifurcatis, sed anastomosantibus, non glandulosis, decurrentibus, confertis, subangustis, albis, minute villosulis; sporis ellipsoideis, $6 \approx 4$; stipite centrali, 2 cm. long., 2-3 mm. cr., farcto, basi subincrassato, unicolori, supra dense furfuraceo, basi hirsuto.

Hab. gregarius ad terram, Santjago de las Vegas in ins. Cuba. — *Lent. strigoso* affinis.

12. **Lentinus Zenkerianus** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 487

p. 123. — Pileo coriaceo-lento, convexo-campanulato, centro depresso v. umbilicato, radiato, striato, alutaceo-rufescente, 1-2,5 cm. diam.; stipite centrali, tereti, subferrugineo, pruinoso v. subtomentoso, 3-4 cm. longo, 2-3 mm. crasso, basi radicato v. incrassato; lamellis sinuoso-adnatis vel decurrentibus, confertis, ventricosis usque ad 3 mm. latis, pallidis, acie atro-brunnea, serratis; sporis ovoideis, curvatis, hyalinis, $6-9 \approx 4-5$.

Hab. locis deustis in silvis Bipindi Kamerun Africæ (ZENKER).

13. **Lentinus pulcherrimus** Sumstine, *Torreyia* VII (1907) p. 60. — 488

Pileo integro, coriaceo, umbilicato, indistincte concentrice zonato, pilis castaneo-flavis fasciculatis tecto, fasciculis in series radiatas dispositis; margine inflexo, 2 cm. lato, pilis lanatis tecto; carne alba, vix 1 mm. cr.; lamellis albis, angustis, subdistantibus, postice rotundatis, liberis, margine integro; stipite centrali, pileo concolori, tomentoso, æquali, solido, intus albo, 3 cm. longo, 1,5 mm. cr.; sporis albis, late ovoideis.

Hab. in ramis terra infossis, Kittaning Pa., Amer. bor. — Odor fœtidus, præcipue in fungo adulto, illi *Claudopodis nidulantis* similis.

14. **Lentinus obconicus** Peck, *Bull. Torr. Bot. Club*, XXXII (1906) 489

p. 215. — Pileo obconico, carnosio, sæpe centro leviter depresso, albido, centro squamulis fusco-brunneis prædito; carne alba; lamellis angustis, confertis, decurrentibus, acie laceratis et dentatis; stipite longo, flexuoso, solido, apice albido, basi obscure brunneo et squamoso; sporis oblongis, 8-10 \times 4-5.

Hab. cæspitosus ad ligna dejecta, Minneapolis Minnesota Amer. bor. (M. S. WHETSTONE). — Pileus 2,5-6 cm. latus; stipes 4,5-8 cm. longus, 6-10 mm. cr. *Lent. cyathiformi* (Schw.) Bres. proximus.

15. **Lentinus microspermus** Peck, *Bull. Torr. Bot. Club*, XXXII 490

(1906) p. 216. — Pileo carnosio, tenui, convexo, parum irregulari, sæpe margine lobato, glabro, rubro-brunneo; carne alba; sapore e grato amaro; lamellis tenuibus, confertis, emarginatis, adnaxis, albis, dein cremeo-flavis, acie erosa vel denticulata; stipite cæspitoso, æquali, glabro, carnosio-fibroso, cavo, albo vel albido, sæpe excentrico; sporis minutis, globosis, albis v. leviter flavo tinctis, 3-4 μ . lat.

Hab. ad ligna dejecta, Creve Cœur Missouri Amer. bor. (N. M. GLATFELTER). — Pileus 2,5-5 cm. latus; stipes 5-6 cm. long., 6-10 mm. cr.

16. **Lentinus pallide-alutaceus** P. Henn., *Engl. Jahrb.* XXXVIII 491

(1905) pag. 123. — Cæspitosus; pileo tenui-coriaceo, convexo-expanso, excentrice stipitato, obsolete radiato-striato, levi, glabro, pallide alutaceo, 0,5-2,5 cm. diam., margine tenui, integro; stipite farcto, tereti, æquali, usque ad 3 cm. longo, 1-2 mm. cr., striatulo, levi, basi subincrassato, alutaceo; lamellis adnatis, interdum decurrentibus, confertis, membranaceo-coriaceis, subventricosis, c. 1-1,5 mm. latis, acie integris, pallidis; sporis ovoideis v. subellipsoideis, intus granulatis, hyalinis, 4-5 \times 3-4.

Hab. in ramis putridis Bipindi Kamerun Africae (ZENKER). —

Lent. leucochroo Lév. et *Lent. pergameneo* Lév. affinis sed diversus.

17. **Lentinus Gibbsiæ** A. L. Smith in L. S. Gibbs, *Contr. Fl. Fiji*, 492
Journ. Linn. Soc., Bot. XXXIX (1909) p. 199. — Pileo coriaceo,
 tenui, rotundato, 0,5 cm. lato, e resupinato excentrice affixo, setulis
 brevibus brunneis vestito, margine fimbriato; lamellis e puncto
 excentrico radiantibus, æqualibus, flavo-brunneis, acie obscuriori-
 bus, circiter 0,5-0,6 mm. latis.

Hab. in ramis emortuis in silvis montanis Nadarivatu ins. Fiji.

18. **Lentinus gogoensis** Hariot et Patouillard, *Bull. Mus. Hist. Nat.* 493
 (1909) n. 2. p. 87. — Pileo flaccido, convexo, orbiculari, glabro,
 fuscescenti, primitus umbilicato dein infundibuliformi, 8-25 mm.
 diam. margine involuto, integro, pilis paucis brevibus, rigidis,
 acutis, pallidioribus ciliato; lamellis strictis inæqualibus, acie inte-
 gris, decurrentibus, alutaceis; stipite gracili, subcentrali, concolori,
 exannulato, levi, lignoso, glabro, 10-15 mm. longo, 1-2 mm. cr.,
 e basi suborbiculari tomentella oriundo.

Hab. ad terram, Baguirmi, in paludibus Beta-Lairi prope Gogo,
 Congo Africae trop. — *L. tenero* affinis.

19. **Lentinus Courtetianus** Hariot et Patouillard, *Bull. Mus. Hist. Nat.* 494
 (1909) n. 2, p. 87. — Pileo convexo, centro depresso, explanato
 dein infundibuliformi, orbiculari, margine integro, alutaceo, centro
 minute furfuraceo, ceterum glabro, levi, carnosulo, 1-3 cm. diam.;
 lamellis pallidioribus, inæqualibus, decurrentibus, strictis, non con-
 fertis, acie integra; stipite subcentrali, brevi, 5-12 mm. longo,
 3 mm. cr., cylindraceo, minute furfuraceo, basi subglobosa tuber-
 culi usque ad 1 cm. diam. instar.

Hab. ad terram, Haut-Oubangui, Griko, Congo Africae trop. —
L. omphalomorpho affinis.

20. **Lentinus undulatellus** Britz. — *Sacc. Syll.* XI, p. 41. — Brit- 495
 zelmayr, *Revis. Hymenomyc.* IV (1899) p. 20. — Pileo conchato,
 2,5 cm. alto et lato, laciniato, carneo v. griseo-carneo, zonis indi-
 stinctis rubro-brunneis notato, tomentoso-lanoso, sessili v. latera-
 liter subsessili; lamellis flavo-brunneis, plerumque margine albo
 dentato v. serrulato, crispato, undulato, confertis, 4 mm. latis;
 carne alba; massa sporarum alba; sporis elongatis 6-7 \approx 2.

Hab. in ligno emortuo in silvis Algoviae. — *Lent. flabelliformi*
 affinis.

PANUS Fr. — Syll. V p. 614, IX p. 76, XI p. 41, XIV p. 122, XVII p. 50.

1. **Panus ochraceus** Masee, Kew Bull. (1906) p. 92. — Pileo car- 496
noso-lento, tenui, primo plano dein expanso-depresso, subcyathi-
formi, testaceo- v. luride ochraceo, squamulis punctiformibus ob-
sito, ætate glabrescente, 4-6 cm. lato; lamellis angustissimis, con-
fertissimis, valde decurrentibus, albis dein pallide ochraceis, acie
integra; sporis subcylindræis, hyalinis, 7-8 \times 4-5; stipite solido,
excentrico aut fere laterali, squamulis ochraceis obtecto, 2-3 cm.
longo, 4-6 mm. crasso.

Hab. in ligno emortuo, Dehra Dun Indiæ bor. Asiaticæ (BUTLER).

Pan. toruloso Fr. proximus.

2. **Panus domicola** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1900) 497
pag. 265. — Pileis sæpius 2-3-gregariis, non raro plus minusve
adnato-confluentibus, pendulis, eximie patellari-peltatis, 1-3 cm.
diam., mollibus sed valde tenacibus, pro ratione tenuiusculis, anguste
dorso adfixis, levissimis v. obselitissime zonatis, adpresse crispulove
puberulis, margine primo involuto dein rectis tenui integerrimo v.
subrepandulo; lamellis non furcatis polymacriis e centro glabro
levique v. hispidulo orientibus, primo laxis angustis, serius confertis
sublatiusculis (1 mm. lat.) utrinque attenuato-acutatis; basidiis cla-
vulatis 22-24 \times 6-7, sterigmatibus 4 coronatis; sporis ex elliptico
cylindræis inæquilateralibus 6 \times 3, hyalinis, levibus.

Hab. ad trabes in cella vinaria, La Plata Argentinæ.

3. **Panus meruliceps** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII (1905) 498
pag. 78. — Pileo firmo, compacto, convexo, glabro, rugis anasto-
mosantibus reticulato, margine involuto e pallide rubro-lateritio
centro flavido tincto; carne alba 1-1,5 cm. cr.; lamellis angustis,
confertis, adnatis v. dente leniter decurrentibus, basi leniter con-
nexis, albidis; stipite excentrico, curvo, solido, fibroso, glabro, ca-
naliculato, albo; sporis subglobosis v. late ellipsoideis, cinnamomeis,
7 \times 6.

Hab. ad truncos Ulmi, St. Louis Mo. Amer. bor. (N. M. GLAT-
FELTER). — Pileus 2,5-4 cm. latus; stipes 2,5-4 cm. long., 8-12
mm. crassus. Ob sporas coloratas a typo generis desciscit.

4. **Panus carpathicus** Fr. in litt. ad Kalchbrenner in Mathem. Ter- 499
mész. Közlem. V (1867) p. 265, tab. 1, fig. 5. — Solitarius, totus
albus; stipite laterali, curvo, 1-1,5 cm. long. v. brevior, aut ob-
litterato, 6-7 mm. cr., pubescente; pileo tenui sed compacto et te-
naci, dimidiato, horizontaliter porrecto, e convexo plano, postice

coarctato et cum stipite confluyente, sinuato lobatove 5-7 cm. long. et lat., levi, glabro, margine primum arcte involuto; lamellis longe decurrentibus, simplicibus v. passim ramosis, 3-5 mm. lat., are-scendo ligneo-pallentibus, subconfertis, acie integerrima.

Hab. ad truncos pineos putres in silvis in Hungaria — Habitus fere *Pleuroti lignatilis*, sed verus *Panus* dicitur.

5. **Panus rudis** Fr. — Syll. V, p. 616. — Synonymon ibi citatum 500
Agaricus Swainsonii Lév. est recte: *Agaricus Sainsonii* Lév.,
Voyage Russie mérid. II (1842) p. 85, t. I, fig. 3.

XEROTUS Fr. — Syll. V p. 630, IX p. 78, XI p. 42, XIV p. 123,
XVI p. 67, XVII p. 51.

1. **Xerotus luteolus** Patouill., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII (1907) p. 84. 501
— Pileo reniformi, 3-4 cm. lato, antice curvato, postice depresso,
in stipitem lateralem, cylindraceum producto, glabro, pallide flavo
dein obscure fusco, leniter striato-sulcato; lamellis excentricis, di-
stantibus, atro-brunneis, brevioribus immixtis, non anastomosanti-
bus; sporis hyalinis, $6 \approx 3$.

Hab. ad ramos emortuos, Sudan Africae centr. (CHUDEAU).

LENZITES Fr. — Syll. V p. 637, IX p. 78, XI p. 42, XVI p. 67,
XVII p. 52.

1. **Lenzites Clemensiae** Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) 502
p. 416. — Pileo flabelliformi, supra appianato, subtus convexo,
leniter flexibili, postice angustato, subsessili, $6 \approx 7 \approx 1-1,5$ cm.; su-
perficie sulcis concentricis parvis notata, minute reticulata, alba et
margine regulariter radiatim striata, postice griseo-pallida striisque
et reticulationibus carente; margine 1,5 cm. lato, subintegro, vere
crasso, et supra lamellarum extremitatem producto; contextu al-
bo-lacteo 1 mm. cr.; lamellis profundis usque ad 1 cm. v. amplius,
plerumque unifurcatis, 2 mm. cr., sepimentis integris, obtusis, fir-
mis, leniter cremeis.

Hab. in ligno emortuo, Camp Keithley, Mindanao ins. Philipp.
Amer. centr. (MARY S. CLEMENS).

2. **Lenzites cyclogramma** Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII (1907) 503
p. 73. — Sessilis, orbicularis v. dimidiata, ex latere inserta, plano-
convexa, 6-10 cm. lata, albida, zonis v. sulcis parum profundis,
angustis, confertis, numerosis, velutino-strigosis tecta; margine
deorsum curvato, integro v. lobato, acuto; trama coriacea, alba,

parum crassa; lamellis albidis, siccis, confertis, inæqualibus, acie inciso-dentatis, 5 mm. circ. latis.

Hab. ad truncos emortuos *Cocos*, Indo-Cinæ (EBERHARDT). — *Lenz. flaccidæ* et *L. Berkeleyi* proxima.

3. **Lenzites pinicola** Karst., Trav. Soc. Imper. Russe de Géograph. 504 t. VIII (1905) p. 62. — Pileo coriaceo, tenui, dimidiato, applanato, concentrice sulcato, tomentello, carne unicolori, 4-5 cm. lato; lamellis fuscescentibus, ad latera transversim rugulosis, glaucopallidis, ad basim usque incisiss, acie inæqualibus.

Hab. ad corticem Pini prope Yamarovka Transbaicaliæ.

4. **Lenzites betuliniformis** Murrill, North Amer. Fl., v. IX, pt. II 505 (1908) p. 128. — Pileo tenui, e coriaceo ligneo, sessili, dimidiato, imbricato, concavo 2-3 \approx 3-5 \approx 0,3-0,5 cm.; superficie velutino-tomentosa, anguste multizonata, levi, ex isabellino avellanea, nonnullis zonis parum obscurioribus; margine tenui, fertili, raro lobato; contextu albo membranaceo, ne 1 mm. quidem cr.; sulcis intus ochraceis, frequenter antice et postice anastomosantibus; poris et bifurcationibus interruptis, 0,5-1 mm. lat., 2-3 mm. prof., acie tenui, undulato-lacerata, distincte porosa.

Hab. in ligno emortuo, Jalapa Mexico, Amer. bor. (CH. SMITH).

5. **Lenzites submurina** Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) 506 p. 416. — Pileo tenui, tenaci, leniter flexibili, dimidiato, sessili utrinque applanato, 5 \approx 9 \approx 1 cm., superficie glabra, antice anguste sulcata, avellaneo-isabellina, postice late sulcata et murina; margine tenui, undulato; contextu albo, dissepimentis isabellinis vere distinctis; margine tenui, postice 3 mm. incrassato; areolis lamellatis, 1 mm. latis, 5 mm. profundis, acie integra v. leniter undulata, ætate non laciniata.

Hab. in ligno emortuo, Camp Keithley Mindanao ins. Phillipin. Amer. centr. (MARY S. CLEMENS).

6. **Lenzites laricina** Karst., Acta Soc. Fauna et Flora fenn. XXVII, 507 4 (1905) p. 4. — Pileo coriaceo, effuso-reflexo v. dimidiato, tenui, concentrice sulcato, velutino, e cinereo canescenti; lamellis coriaceis, crassiusculis, simplicibus, raro anastomosantibus transversim costatis, fuscescentibus, subinde demum dentato-laceris.

Hab. ad Larices prope lacum Baical Sibiricæ (O. LÖNNBOHM). — Pilei seriatim concrecentes aut imbricati, circiter 1 cm. lati.

7. **Lenzites ambigua** Karst., Acta Soc. Fauna et Flora fenn. V XVII, 508 4 (1905) p. 5. — Pileo coriaceo, effuso-reflexo, 0,5 cm. cr., tenui, zonato, velutino, canescenti, zonis marginalibus pallidioribus; la-

mellis coriaceis, crassiusculis, dentato-laceratis, fuscescentibus, initio in colorem violaceum leviter vergentibus

Hab. in cortice Pini silvestris prope Kuopio Fennicæ (O. LÖNNBOHM). — *Polystictum abietinum*, *Irpicem fusco-violaceum* et *Lenzitem laricinam* in memoriam revocat.

8. **Lenzites sæpiaria** Fr. — Syll. V, p. 639. — var. **rubra** Falck in 509
A. Möller et R. Falck, Hausschwamm-Forschungen, Jena, (1909)
p. 42, tab. I a, fig. 3-4, tab. III, fig. 2. — A typo differt initio
colore aurantiaco-rubro, senio atro-purpureo, in sicco brunneo; la-
mellis inter se 0,5 mm. circ. distantibus; hymenio initio dædaleo-
polyporoideo.

Hab. ad trabes Abietis excelsæ et pectinatæ, Germa-
nia. — var. **hydnoidea** Henn., Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb.
XL (1898) pag. 131, tab. I, fig. 4: tota resupinata; hymenio ex
aculeis latis, usque ad 1 cm. long., integris v. incisiformato; acu-
leis marginalibus subinde in alveolos connexis. — Ad ligna pu-
trida pinea in calidario Palmarum horti bot. Berolinensis.

9. **Lenzites bicolor** R. Falck, in A. Möller et R. Falck Haussch- 510
wamm-Forschungen, Jena, (1909) p. 40. — Forma et hymenio ut
in *Lenz. sæpiaria* sed minor, umbrina, basi mycelio (in culturis) ini-
tuo vitellino dein umbrino prædita; lamellis inter se $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ mm.
distantibus; odore petrolei.

Hab. in lignis arborum frondosarum et coniferarum, Germa-
nia. — Hymenium et pilei superficies *L. abietinæ*, substantia *L. sæpiariæ*.

10. **Lenzites thermophila** R. Falck, in A. Möller et R. Falck, Haussch- 511
wamm-Forschungen, Jena, (1909) p. 40, p. 116, fig. 13, III; tab. I,
fig. 3. — Pileo effuso-reflexo 20 cm. long., 2 cm. lat., 0,5 cm. cr.,
initio polyporeo et subcarnoso, dein lamellato et coriaceo, griseo-
brunneo demum fuligineo; hymenio theobromino; lamellis inter
se mm. 0,2-0,3 distantibus; odore ingrato herbaceo.

Hab. ad truncos Pini plerumque et ad palos in Germania.

11. **Lenzites Earlei** Murrill, North Amer. Fl. v. IX, pt. II (1908) 512
p. 128. — Pileo rigido, e suberoso lignoso, e dimidiato flabellifor-
mi, applanato v. convexo, $4 \times 6 \times 0,3-0,5$ cm.; superficie subvelu-
tina, zonata, rugosa, tomentosula, isabellina; margine tenui, ochra-
ceo, fertili; contextu molliter suberoso-membranaceo, 1-2 mm. cr.,
isabellino; sulcis pluries furcatis, 1 mm. latis, acie crenata vel
crispata, lata, concolori.

Hab. in ligno emortuo, Cuba Amer. bor.

12. **Lenzites abietinella** (Murrill) Sacc. et Trott., *Gleophyllum abietinellum* Murrill, North Amer. Fl. v. IX, pt. II (1908) p. 129. — Pileo tenui, membranaceo, flexibili, sicco, e dimidiato reniformi lateraliter connato, applanato, 2-4 \times 3-6 \times 2-2,5 cm.; superficie conspicue tomentosa, dein postice fere glabra, anoderma, crebro zonata, levi, ex avellaneo fulva; margine tenui, undulato v. leniter lobato, late strigoso usque ad maturitatem, fertili, pallido; contextu tenui, membranaceo, fulvo-fuligineo; tubulis initio lamellosis ex avellaneo fuligineis, 0,5-1 mm. latis, 2-3 mm. profundis, subintegris, dein irregulariter dentatis.

Hab. ad truncos in Rocky Mountains Americæ bor. (JOHN MACOUN).

13. **Lenzites undulata** (Hoffm.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 1070. 514
Agaricus undulatus Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr. pag. 7, tab. IV. — Tota amœne rufo-fulva, margine acuto, eroso-dentato, undulato, villosa, concolori-zonata; lamellis angustis, dilutius rufis.

Hab. in lignis semiputridis in fodinis Hercyniæ. — Verisimiliter forma *Lenz. scæpiariæ* e loco.

14. **Lenzites ferruginea** (Harrison) Sacc. et Trott., *Gleophyllum ferrugineum* Harrison Lovejoy, Botan. Gazette L (1910) p. 385. — Pileo tenaci, e suberoso ligneo, ex oblongo-dimidiato flabelliformi, 1-2 \times 2-12 \times 1-1,5 cm.; superficie azona, strigoso-tomentosa, scruposa, obscure ferruginea umbrina; margine subcrasso, sterili, tomentoso, nitide ferrugineo; contextu suberoso, homogæneo, nitide ferrugineo, indistincte zonato, 7 mm. circ. crasso; tubulis lamelloideis, distincte decurrentibus, tomentosis, ferrugineis sed ad marginem pallidioribus, intus griseolis, 1-2 mm. latis, 2-5 mm. profundis; acie subtenui, tomentosa, undulata; sporis globoso-ellipsoideis, levibus, hyalinis, 10-14 \times 7.

Hab. in ligno emortuo in editioribus Rocky Mountain Americæ borealis.

- Lenzites ferruginea* Berk.
15. **Lenzites edulis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Gleophyllum edule* Murr., 516
Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) p. 480. — Pileo imbricato, sessili, dimidiato, conchato v. applanato, ætate leniter decurrente, 4-7 \times 6-10 \times 0,3-0,6 cm.; superficie e breviter tomentoso glabrescenti, subzonata, ex ochraceo-isabellino pallide fulva, ætate albescenti, sulcis paucis brevibus concentricis prædita; margine acuto, integro v. undulato, ochraceo, tomentoso, lacerato brunneo; contextu ferrugineo, spongioso, 2-4 mm. cr., juveni submolli; hymenio lenzitoide, sulcis interdum furcatis, 2-4 mm. profundis, 1 mm. c. latis,

acie e pallido avellaneo-fulva, integra et initio subcrassa, dein tenui et ætate parum lacerato-dentata; sporis elongato-ellipsoideis, levibus, hyalinis, $7 \approx 3$; hyphis pallide ferrugineis, 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos dejectos Pini insularis, Baguio Luzon ins. Philippin. Amer. centr. (R. S. WILLIAMS). — Statu juvenili edulis.

16. **Lenzites nigro-zonata** (Murr.) Sacc. et Trott., *Glaeophyllum nigro-* 517
zonatum Murrill, Bull. Torr. Bot. Club XXXV (1908) p. 415. — Pileo rigido, subtriangulari, postice angustato, sessili, supra convexo, subtus plano, $7 \approx 6 \approx 1-2$ cm.; superficie glabra, sublevi, postice cinerea, antice isabellina, zona lata nigra basim versus et duabus v. tribus brunneis indistinctis marginem versus prædita; margine crasso, obtuso, sterili, minute tomentoso, subintegro, isabellino v. leniter avellaneo; contextu ferrugineo, suberoso, homoganeo, 5 mm. cr.; tubulis postice et centro 1 mm. long., avellaneis, dissepimentis fulvis, ore e ferrugineo cinereo-fusco, forma et latitudine irregulari, dædaloideo et postice $1-2 \approx 2-5$ mm., acie irpiciformi, poroidea margine vero vix 1 mm. acie integra; sporis ovoideis, levibus, hyalinis, paucis $5 \approx 3,5$; hyphis ferrugineis 3 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo prope Baguio Luzon ins. Philippin. Amer. centr. (A. D. E. ELMER).

Ser. II. SCHIZOPHYLLÆ Sacc.

- OUDEMANSIELLA** Speg. — Syll. V, p. 653, IX, p. 81, XVI, p. 69. — char. emend. v. Höhnel, Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, CXVII (1908) Abt. I, p. 1007 et CXVIII (1909) pag. 275. — Ad hoc genus, ch. emend., ducendus est, teste v. Höhnel, *Agaricus Canarii* Jungh. (= *Amanitopsis Canarii* (Jungh.) Syll. V, p. 27 = *Collybia apalosarca* B. et Br., Syll. V, pag. 230), qui tunc *Oudemansiella Canarii* (Jungh.) v. Höhn. vocandus esset.

Sect. 2. Rhodosporæ

- VOLVARIA** Fr. — Syll. V p. 656, IX p. 82, XI p. 43, XIV p. 124, XVI p. 69, XVII p. 52.

1. **Volvaria sollerensis** Roll., Bull. Soc. Myc. Fr. XX (1904) p. 198, 518
tab. IX, fig. 2. — Pileo carnosio, firmo, margine attenuato non striato, primum ovato dein expanso, fibrillis adpressis virgato, sicco,

griseo, ochraceo-viridescente, fragmentis volvæ parce tecto; lamellis liberis, latis, confertis, serrulatis, diu albis, dein roseis; carne alba, compacta, infra cutem pilei cinerea, inodora; sporis ellipsoideis, roseis 14-16 \times 8; stipite solido, firmo, bulboso, cylindraceo-conico, fibrilloso-striato, sursum villosulo, volva vaginali spissa, glabra ochreato.

Hab. in fimo, Can Ti in ins. Balearibus. — Procera species, 10 cm. lata.

2. **Volvaria fuscidula** Bres. Ann. Mycol. v. III (1905) pag. 159. — 519

Pileo carnosulo, e convexo-subcampanulato expanso, subviscido, mox sicco, levi, griseo-fuligineo, centro fere nigro et nigro-virgato, margine striato, 3-4 cm. lato; lamellis subconfertis, ex albo carneis, postice adpressatis et rotundato-liberis, acie albo-fimbriata; stipite tereti, albo, fuscescente, sursum albo-pruinato, deorsum fibrilloso, solido, 6-7 cm. longo, 4-5 mm. crasso; volva stramineo-subfuscidula, vaginante, lobata; carne alba, inodora; sporis obovatis, carneis, 7-9 \times 4-5; basidiis clavato-subfusoides, 25-30 \times 8-9, cellulis aciei lamellarum cystidioideis, fusiformi-cuspidatis, apice subobtusulo, 69-70 \times 12.

Hab. in silvis mixtis ad terram « Margone » pr. Trento, autumnno. — Videtur quasi forma minima *Volvaria glojocephalæ*, a qua tamen sporis multo minoribus præcipue distinguitur.

3. **Volvaria ilicicola** Speg., Annal. Mus. Nac. Buenos Aires t. XVII 520

(1908) p. 114. — Majuscula, cæspitosa; volva maxima, 60-70 mm. alt., 45-55 mm. diam., tessellato-marmorata, per ætatem irregulariter rimoso-fixa, inferne subattenuata pallide sordideque fuscescente; pileo hemisphærico-campanulato, 70-100 mm. diam., non umbonato dense adpresseque villosulo-subsquamuloso albo, sed villo citrino vestito, centro pallidiore ambitu floccoso-fimbriato; carne alba tenui rigidula, immutabili, subexsucca, in pileo et stipite continua; lamellis primum candidis dein roseis, amplis, 10-14 mm. lat., tenuibus confertis a pileo remotis, a pileo facile secedentibus, acie integris; stipite sublevi 70-90 mm. long., 7-9 mm. cr., farcto, rigido, candido, levi exannulato; sporis . . . amissis; odore fungino grato; sapore leniter acri.

Hab. ad truncos cariosos adhuc erectos Ilicis paraguayensis in silvis Cerro de los Tigres, Argentina Amer. bor.

4. **Volvaria luteola** (Lév.) Sacc. et D. Sacc. *Agaricus luteolus* Lév. in 521

Mém. Soc. Linnéenne, 1825, pag. 4 (extr.) pl. V, fig. 1. — Pileo carnosulo, centro leviter umbonato, sordide albo, in luteum leviter

vergente, subviscoso, cuticula facile secedente; lamellis pallide rubescentibus, confertis, inæquilongis, liberis, utrinque rotundatis, antice latioribus; carne alba; stipite firmo, farcto, albo, exannulato, initio pilosulo dein nudato, basi bulboso et volva alba, intus glabra extus velutina cincto.

Hab. in palea semiputrida, dejecta, Nievre Galliæ. — Pileus 7-8 cm. lat.; stipes 9-10 cm. alt., 10-12 mm. cr.; lamellæ 10-11 mm. latæ. Verisimiliter vel eadem vel peraffinis *V. speciosæ* (Fr.).

5. **Volvaria fibrillosa** Bres. apud Rick, Broteria vol. VI (1907) t. VII, 522 fig. 5 (sine diagnosi). — Gracilis, minuscula; pileo convexo-expanso, subumbonato, fibrilloso (pallido?), margine acutiusculo, non revoluta; lamellis angustis; stipite cylindrico, exili, albo, basi volva minuta prædito.

Hab. ad terram in Brasilia. — Diagnosis omnino incompleta, ex icone deprompta.

6. **Volvaria villosa-volva** Lloyd, Mycol. Notes, n. 4 (1899) pag. 31, 523 fig. 2. — Pileo convexo, levi, sicco, argenteo-fibrilloso, rimuloso, griseo; lamellis liberis, distantibus; stipite cylindræo, sursum paullo attenuato, farcto, candido, glabro; volva globosa, pilis longis copiosis, mycelialibus, albis obsessa; sporis globosis, 5 μ . diam.

Hab. gregatim inter folia putrescentia dejecta ad terram humosam in America boreali. — Ex icone fungus 4-5 cm. alt.; pileus 2 cm. latus.

7. **Volvaria plumulosa** (Lasch) Karst. Hattsv. I (1879) pag. 252. — 524 Syll. XIX, pag. 1140. — Vix vel non differt a *V. hypopite* (Fr.) Karst. — Syll. V, p. 658 — teste Quél. Flore mycol. p. 190.
8. **Volvaria regia** (Fr.) Gill. Hymén. Fr. pag. 386. — Syll. XIX, 525 p. 1410. — Ex icone cit. Pauletii omnino dubia species. Cfr. Fr. Hymen. Europ. p. 184.

ANNULARIA Schulz. — Syll. V p. 668, IX p. 82, XI p. 43, XIV p. 125, XVII p. 53.

1. **Annularia sphærospora** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 526 pag. 216. — Pileo carnosio sed tenui, conico v. subcampanulato, dein expanso, umbonato, argenteo-fibrilloso e flavo plus minusve albescenti, umbone brunneo; lamellis tenuibus, confertis, liberis, initio albis v. cremeis, maturis carneis; stipite æquali vel supra leniter angustato, solido, fibroso, substriato, albido, annulato, annulo albo quandoque ad medium quandoque ad basim stipitis inserto; sporis globosis v. subglobosis, 5-6 μ . diam.

Hab. ad ligna dejecta, prope Detroit, Michigan Amer. bor. (O. E. FISCHER). — Pileus 3-6 cm. latus; stipes 3-8 cm. longus, 4-8 mm. cr.

2. **Annularia mamillata** Longyear, Rep. Michig. Acad. of Sc. III 527 (1902) p. 59, fig. 4 (diagnosis desideratur).

Hab. ad terram in America boreali.

PLUTEUS Fr. — Syll. V p. 665, IX p. 83, XI p. 44, XIV p. 125, XVI p. 72, XVII p. 53.

1. **Pluteus Romellii** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 44. — Britzelmayr, 528 Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 1. — Pileo e brunneo obscure brunneo-purpureo, e velutino minute squamuloso, conoideo vel campanulato, demum expanso, sæpe centro subdepresso, 10 cm. lato; stipite 8 cm. long., 10-12 mm. cr., flavo, basi plerumque expanso, supra albo, basi flavo vel vitellino, farcto vel subcavo; lamellis ex albo flavido-roseis, confertis, 10 mm. latis, liberis vel rotundato-adnexus; carne subfibrosa, stipitis concolori, inodora; massa sporarum rosea v. carnea; sporis e rotundato oblongis, 6-8 μ . diam.

Hab. ad terram in hortis et silvis prope Augsburg Bavariæ et Gruyères Friburgiæ. — *Plut. cervino* et *nano* affinis.

2. **Pluteus grandis** Peck, New York State Mus. Bull. n. 105 (1906) 529 p. 27. — Pileo carnosio, firmo, convexo, 10 cm. lato, margine tenui quandoque revoluta, sericeo fibrilloso, albo v. albido; carne alba, sapore farinaceo; lamellis tenuibus, confertis, liberis, margine denticulatis, initio albidis dein carneis; stipite longiusculo, 10 cm. longo, 20-25 mm. cr., æquali, firmo, farcto, sericeo-fibrilloso, albo; sporis subglobosis, angulatis, uninucleatis, 7,5 μ . cr.

Hab. inter folia dejecta, Bolton Landing Americæ bor.

3. **Pluteus occultus** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 446. — 530 *Agaricus occultus* Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 1, tab. 184, fig. 86. — Pileo 4,5 cm. lato, albido, albido-carneo, a centro leniter et sparse brunneo squamuloso-fibrilloso; stipite 9 cm. alto, supra 5 mm. infra 6 mm. cr., albo, carnosio-fibroso, farcto; lamellis liberis, pallide albo-rubidis, 6 mm. latis, confertis; carne alba, odore peculiari nullo.

Hab. in silvis fagineis prope Teisendorf Austriæ. — *Pl. pel-lito* affinis.

4. **Pluteus tomentosulus** Peck 32 Rep. N. York State Mus. (1879) 531 pag. 28, Atkinson, Mushrooms pag. 140, fig. 136. — Pileo tenui

convexo v. expanso, subumbonato, sicco, minute squamuloso-tomentoso, albo, quandoque margine cinnamomeo; lamellis latiusculis postice rotundatis, liberis, confertis ex albo carneis; stipite æquali, solido, striato, puberulo v. subtomentoso, albo; sporis subglobosis 5-7 μ . diam., carneis, grosse uniguttulatis; cystidiis tenuiter tuniatis, hyalinis.

Hab. in ligno dejecto in montibus Catskill et Gansevoort Amer. borealis. — Fungus 5-12 cm. alt.; pileus 2,5-7 cm. lat.; stipes 3-6 mm. cr.

5. **Pluteus luctuosus** Boud. Bull. Soc. Mycol. Fr. XXI (1905) p. 70, 532 pl. III, f. II. — Pileo convexo, obtuse umbonato, primum nigricante dein fuliginoso, disco nigrescente, pruina atomata nigricante omnino tecto, ad marginem striatulo; lamellis liberis primo pallidis dein griseo-rufescentibus acie brunneola; stipite cylindraceo, farcto, sat tenui, griseo-rufescenti; carne fuliginosa; sporis rotundatis, intus granulosis, sub microscopio pallide rufescentibus, magna copia vero roseo-ferruginosis, 7-9 \times 6-7; basidiis crassis, brevibus, ad basim non v. vix attenuatis, 22-23 \times 9-11; pruina pilei et acie lamellarum cellulis piriformibus succo infuscato repletis, 20-25 \times 14-16 formata.

Hab. ad terram argillaceam in silvis prope Montmorency Gallia. — Minor, 3-4 cm. alt. 2-3 cm. latus.

6. **Pluteus murinus** Bres. Ann. mycol. III (1905) p. 160. — Pileo 533 carnosulo, e convexo expanso-umbonato, sicco, murino-fuscidulo, primitus tomentosoflocculoso, dein fibrilloso-rimoso, fibrillis subreticulatis et squamulis minutis exasperato, 3-5 cm. lato; lamellis confertis, ventricosis, ex albo carneis, acie integra vel obsolete crenulata, postice rotundato-liberis; stipite solido, tereti vel compresso, candido, longitudinaliter obsolete fibrilloso, basi pubescente, subattenuato vel subbulboso, 3-6 cm. longo, 3-6 cm. crasso; carne alba, fibrosa, odore et sapore nullis; sporis subglobosis vel ellipticis, carneolis, 6 $\frac{1}{2}$ -8 \times 5-6; basidiis clavatis, 20-27 \times 7-9; cystidiis fusoido-ventricosis, levibus, 50-75 \times 14-24; cellulis terminalibus squamarum pilei fuscis, longe fusoidis, 12 μ . circiter crassis.

Hab. in pratis ad terram « Gocciadoro » pr. Trento, autumnus.

7. **Pluteus granularis** Peck, 38 Rep. New York Stat. Bot.; Hard 534 Mushrooms p. 238, fig 190. — Pileo convexo dein expanso, leniter umbonato, rugoso, minute nigro-granuloso, e flavo brunneo, 2,5-5 cm. lato; lamellis latiusculis, confertis, ventricosis, liberis, albidis, carneis; stipite æquali, solido, pallido vel brunneo, apice

pallidiore, tomentososo-velutino, 6-8 cm. long., 2-4 mm. cr.; sporis subglobosis, 5 μ . circ. diam.

Hab. ad terram Amer. bor. — *Pl. cervino* affinis Edulis.

8. **Pluteus kajanensis** Karst., Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. XXVII, 535
4 (1905) p. 12. — Pileo carnosio, tenui, molli, convexo, dein expanso, obtuso, levi, glabro, nudo, viscidulo (?), pallescenti (in sicco), circiter 4 cm. lato; stipite stricto, basi incrassato, glabro, pallido, circiter 5 cm. alto; lamellis liberis, confertis, roseo-pallidis; sporis ellipsoideis 6-8 \times 3-4; cystidiis nullis.

Hab. ad terram prope Kajana Fenniae. — Spec. unicum ab O. LÖNNBOHM lectum.

9. **Pluteus Diettrichii** Bres. Ann. mycol. III (1905) p. 160. — Pileo 536
carnosulo e subcampanulato expanso-umbonato, fusco-grisello, sub lente subtiliter granuloso v. subvelutino, haud striato, sicco, 1 $\frac{1}{2}$ -2 cm. lato; lamellis confertis, subattenuato-liberis, a stipite subdistantibus, ex albo carneis, acie albo-fimbriata vel subtiliter denticulata; stipite albo, glabro, a basi subattenuato, 2 $\frac{1}{2}$ -3 cm. longo, apice 2-2 $\frac{1}{2}$ mm. basi 3-3 $\frac{1}{2}$ mm. crasso; sporis carneolis, ellipticis, 9-11 \times 6; basidiis clavatis, 25-30 \times 8-9; cellulis aciei lamellarum clavatis vel clavato-subventricosis, 36-60 \times 12-21; cellulis superficiei pilei fuscis, clavato-subcapitatis, 30-60 \times 17-20.

Hab. in nemoribus ad terram « Arco » in regione tridentina (DIETRICH) et « Gocciadoro » pr. Trento (BRESADOLA). Claro D. E. DIETRICH, qui primus eum legit, jure merito dicata species.

10. **Pluteus caloceps** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 373. — 537
Pileo 2,5-4,5 cm. lato, convexo, umbonato, aurantio-cinnabarino, levi v. leviter granuloso; lamellis late ellipsoideo-subventricosis; basidiis tetrasporigeris; sporis suboblongis, 5-8 \times 4-6; cystidiis hyalinis, ventricosis, 60-75 \times 12-20; stipite fibroso-striato, 3-5 mm. cr.

Hab. ad terram, Dead Lake Michig. (C. H. KAUFFMAN) et ad ligna putrida Ithacæ N. Y. (C. W. EDGERTON) Amer. bor. — Totus 2,5-6 cm. altus.

11. **Pluteus roseo-candidus** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 373. 538
— Gregarius 3-4 cm. altus; pileo 2-3 cm. lato; stipite 3-4 mm. cr.; utroque omnino albo, dein jove pluvio lamellis roseis et pileo leviter roseo; pileo convexo-expanso, ad marginem striato; lamellis ellipticis, leviter adnexis; basidiis clavatis, tetrasporigeris, 30 \times 8-9; sporis globosis v. subglobosis, levibus, 7-8 μ . cr.; cystidiis hyalinis, ventricosis, 60-80 \times 20-30; stipite cavo, levi, fibroso-striato, ad apicem leviter granuloso, ad basim sæpe leviter strigoso.

Hab. ad terram graminosam in silvis Ithacæ N. Y. Amer. bor. (JACKSON). — *Plut. candido* P. Henn. (= *P. Henningsii*) et *Plut. candido* Pat. similis sed differt notis datis.

12. **Pluteus neurodermus** Patouill., Bull. Soc. Myc. Fr. XXV (1909) 539 p. 11, t. II f. 2. — Pileo carnosio, tenui, convexo-plano, umbonato, dilute fusco-brunneo, glabro, venulis radiantibus, anastomosantibus reticulato, margine vix striato; lamellis ex albido roseis, liberis inæqualibus, ventricosis, sub lente nigro-punctatis; basidiis 45×10 ; cystidiis elongatis, $75-90 \times 25-30$, tenuiter tunicatis, obtusis, sæpe nigro-incrustatis; sporis levibus, ovoideis, roseis, $14-17 \times 10-14$; stipite elongato, gracili, tubuloso, albido, villosulo deorsum bulboso.

Hab. ad terram in montibus Lang-Biang, Annam (EBERHARDT).

13. **Pluteus cervinus** (Schæff.) QuéL. — Syll. V, pag. 665. — var. 540 **Bullii** Cooke, Illustr. Brit. Fungi tab. 357, Handb. Brit. Fungi, II ed., p. 115, *Agaricus Bullii* Berk. ms. — Pileo pallido, disco saturatiore, e convexo expanso, glabro; stipite crasso, solido, brunneo, basi incrassato, fibrilloso, sursum albo sericeo; lamellis latis, postice rotundatis, liberis, carneis.

Hab. ad ligna putrida in Britannia.

14. **Pluteus candidus** Patouill. (non Henn.) Tab. anal. 1887, pag. 31, 541 fig. 576. — Pileo convexo, albo, sericeo, non striato, 8-10 mm. diam.; stipite albo, gracili, farcto, tenuissime villosulo, basi inflato, 2 cm. alto; lamellis liberis, roseis, rotundatis; cystidiis fusoides; sporis globuloso-ovoides, $6-7 \times 5$, roseis, guttulatis.

Hab. ad ligna putrida pr. Lons-le Saunier Gallia.

15. **Pluteus Henningsii** Sacc. et Trott. Ita vocandus *P. candidus* P. 542 Henn. (1899) — Syll. XVI, p. 73 — extante homonymo priore.

16. **Pluteus pellitus** (Pers.) QuéL. — Syll. V, p. 668. — var. **Clusianus** 543 Istv., Clus.-Istv. Icon. Fungor. tab. 33. — A typo differre videtur statura duplo majori, stipite sursum leviter incrassato et pileo magis explanato.

Hab. ad terram in Pannonia.

ENTOLOMA Fr. — Syll. V p. 679, IX p. 83, XI p. 44, XIV p. 126, XVI p. 76, XVII p. 55.

1. **Entoloma principale** (Britz.) Sacc. — Syll. XI p. 45. — Britzel- 544 mayr, Revis. Hymen. II (1898) p. 2. — Pileo albo-brunneolo, subgriseo, violaceo, fibrilloso, sericeo, 14 cm. lato, expanso-campanulato; stipite 15 cm. long., 2 cm. cr., basi incrassato, farcto, fibroso,

pileo concolori sed vix pallidiore, basi pallido; lamellis rotundatis v. plerumque emarginatis et ex adnexo adnatis, albidis, rubidis, saturate roseis, subconfertis, senio margine dentato v. inciso, 15 mm. latis; carne alba subsericea, inodora sapore levi; massa sporarum rosea; sporis regulariter sexangulosis, 8-10 μ . diam.

Hab. in silvis Friburgiæ et Baviariæ. — *Ent. porphyrophæo* affinis species.

2. **Entoloma mediocre** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 45. — Britzel- 545
mayr, Revis. Hymen. II (1898) p. 3. — Pileo hemisphærico, dein expanso, albido, flavido, brunneolo, margine albido, tenui, carnosio, 10 cm. lato; stipite albo irregulariter curvato et compresso, albo, cavo, parietibus 2 mm. cr.; lamellis 20 mm. latis, carneis, subrotundatis v. emarginatis, adnatis; carne alba, inodora; massa sporarum rubra; sporis 10-11 \approx 8, irregulariter quinque- v. sexangulatis.

Hab. in silvis Algoviciæ. — *Ent. turbido* affinis species.

3. **Entoloma sublividum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 45. — Brit- 546
zelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 2. — Pileo flavo-griseo, griseo, brunneo-griseo, crasse fibroso, centro subcolliculoso; pileo campanulato, margine curvato-undulato, fere subopaco, 9 cm. lato; stipite 8 cm. long., supra 2.5 cm. cr., basi distincte attenuato, albo, farcto; carne albida, odore farinaceo; massa sporarum rubra; sporis 11-12 \approx 7-8, irregulariter quinque- v. sexangulatis.

Hab. in silvis prope Westheim Baviariæ. — *Ent. livido* affine.

4. **Entoloma turbidatum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 46. — Brit- 547
zelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 3. — Pileo flavo-brunneo, brunneo, fibroso, fere piloso, hemisphærico, centro plerumque profunde umbonato, 8 cm. lato, sæpe rugoso; stipite 6 cm. long., supra 1.5 cm. cr., basi plus minusve attenuato, farcto, fibroso, supra subpiloso; lamellis subconfertis, rubidis v. sordide roseis, 10 mm. latis, emarginatis, adnatis, fere decurrentibus; carne brunneola, inodora.

Hab. in silvis prope Augsburg Baviariæ. — *Entolomati turbido* affinis species.

5. **Entoloma subcostatum** Atk. Journ. of Mycol. XII (1906), p. 236, 548
tab. 92; Hard, The Mushrooms p. 245, fig. 198. — Gregarium v. cæspitosum, 6-8 cm. alt.; pileo 4-8 cm. lato; stipite 1-1.5 cm. cr.; pileo ex obscure griseo castaneo v. olivaceo-brunneo, sæpe lineis obscurioribus subvirgato; lamellis pallide salmoneis, dein griseis; stipite pileo concolori sed pallidiori, arescendo vero obscuriori;

pileo udo subviscido, e convexo expanso, plano v. subgibboso, non umbonato, irregulari, expanso, margine incurvo; carne alba, subtenui, margine tenuissima; lamellis latis, 1-1 1/2 cm. latis, margine pilei angustioribus, profunde sinuatis, angulis plerumque rotundatis, adnexus, dein liberis, acie plana quandoque venis connexis, quandoque costatis præcipue ad marginem pilei; basidiis tetrasporis; sporis subglobosis v. subangulatis, 8-10 μ . diam., sub lente roseolis; stipite æquali, fibroso-striato, cortice subcartilagineo, carne alba farcto, dein fistuloso; odore parum farinae vetustæ et juglandino; sapore similari.

Hab. in herbidis, Campus, Ohio State Univ. Columbus Ohio Amer. bor. (R. A. YOUNG). — *Ent. prunuloidi* et *Ent. clypeato* affinis species.

6. **Entoloma amethysteum** (B. et Br.) Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradenya IV, pt. II (1907) p. 52. — *Clitocybe lanata* Scop. var. *amethystea* B. et Br. herb. — Totum amethysteum; pileo primitus late conico-campanulato usque ad 9 cm. lato, margine regulari incurvo, dein repando et irregulariter lobato, udo striato prædito, umbonato, glabro; carne tenui æque amethystea; lamellis angustis, subconfertis, antice tenuatis, sinuatis, acie sublobata; stipite cylindraceo, facile fisso, 8 cm. long., 1 cm. cr., glabro, basi tomentoso, solido, æquali, sæpe irregulari; sporis ovoideis v. subglobosis, 5-6 \times 3-4, roseis.

Hab. ad terram in insula Ceylon, ubi frequens.

7. **Entoloma plumbeum** Earle, Bull. of the New York Bot. Gard. 550 (1904) p. 298. — Pileo 4-7 cm. lato, irregulari, sæpe assymetrico, expanso v. demum depresso, pallide plumbeo, sæpe brunneo tincto, centro plerumque obscuriori, levi, non hygrophano, margine irregulari, non striato; lamellis anguste sinuatis, confertis, heterophyllis, parum angustis, planis v. subventricosis, e cremeo salmoneo tinctis; sporis pallide salmoneis, ellipsoideis, levibus, guttula magna prædita, 7 \times 5; stipite 2-3 cm. longo, 6-7 mm. cr., æquali sublevi v. subfibrilloso, subconcolori, sordido, solido, carnosofibroso; carne alba v. cremea, immutabili, sapore et odore grato.

Hab. in herbidis prope Palo Alto Californiæ (C. F. BAKER).

8. **Entoloma sericatum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 45. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 4. — Pileo nigro-brunneo, brunneo, rubro-brunneo, sicco leviter sericeo, campanulato, dein expanso, 6 cm. lato; stipite pileo pallidiore, fere albido, 5

cm. long., 5 mm. cr., basi plerumque incrassato e farcto cavo; lamellis adnaxis, confertis v. subconfertis, brunneis, griseo-brunneis, 5 mm. latis; carne brunnea; odore farinaceo; massa sporarum rosea, carnea; sporis e rotundato sexangularibus, 8-10 μ . diam.

Hab in silvis Baviaræ. — *Ent. sericeo* affine.

9. **Entoloma praticola** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 45. — Britzel- 552
mayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 3. — Pileo brunneo, fibroso, 4,5 cm. lato, convexo et centro subacuminato; stipite 7 cm. long., supra 3 mm., basi 5 mm. cr., farcto, demum cavo, brunneo, fibroso; lamellis confertis vel subconfertis, emarginatis, adnatis, pallide brunneis, rubido-brunneis; carne odore farinaceo; massa sporarum carnea; sporis irregulariter quinque- v. sexangularibus, 8-10 μ . diam. vel 10 \times 8.

Hab. in apricis silvarum Baviaræ. — *Ent. costato* et *sericeo* affine.

10. **Entoloma griseum** Peck, Rep. State Bot. 1903 (1904) p. 14. — 553
Pileo carnosio, firmo, late campanulato v. convexo, obtuso v. leniter umbonato, 2,5-7,5 cm. lato, glabro, quandoque irregulari, hygrophano, udo griseo-brunneo, sicco pallidiori; carne albida, odore et sapore farinaceo; lamellis adnaxis, emarginatis, dente decurrentibus, 4 mm. c. latis, pallide cinnamomeis; stipite æquali v. supra leniter attenuato, sericeo fibrilloso, apice pruinoso v. farinoso, farcto v. cavo, albo-griseo, 2,5-5 cm. long., 7-10 mm. cr.; sporis subpolygoniis, 7,5 μ . diam.

Hab. ad terram in silvis abietinis, Lake Pleasant Amer. bor. — *Ent. Grayano* proximum.

11. **Entoloma suave** Peck, Journ. of Mycol. XIV (1908) pag. 2. — 554
— Pileo tenui, late convexo, umbilicato, margine decurvo, glabro, nitido, griseo-brunneo; lamellis moderate confertis, postice leniter rotundatis, adnaxis, e flavido carneis; stipite æquali v. subæquali, glabro, farcto, albido v. pallide flavo; sporis late ellipsoideis vel subglobosis, æqualibus, 6-8 \times 5-6.

Hab. ad truncos vetustos, Ellis, Magnolia, Newton Massachusetts Amer. bor. (G. E. MORRIS). — Pileus 2,5 cm. circ. latus; stipes 2,5 cm. longus, 2-3 mm. cr.

12. **Entoloma murinum** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 555
p. 98. — Pileo tenui, fragili, conico, convexo v. subplano, umbonato, sicco, simulate sericeo, tactu glabro, griseo-brunneo v. murino, margine tenui laciniato, in sicco striato; lamellis tenuibus, confertis, sinuatis, adnatis, ex albo pallide coccineis; stipite angusto,

fragili, æquali v. supra leniter angustato, recto v. flexuoso, cavo, albo v. albido ætate obscuriori; sporis angulatis, uniguttulatis, 10-12 \approx 6-8, apiculatis,

Hab. inter gramina et sphagna, Falmouth Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS). — Pileus 2-3 cm. latus; stipes 2-3,5 cm. longus, 1,5-2 mm. cr. *Ent. Peckiano* Burt. proxima species.

13. **Entoloma modestum** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 556 p. 347. — Pileo tenui, campanulato v. convexo, glabro, obtuso, hygrophano, obscure fumoso-brunneo et udo striatulo, arescendo isabellino v. pallide griseo-brunneo; lamellis latiusculis, subdistantibus, adnatis, primum pallidis dein carneis; stipite angusto, æquali, cavo, glabro, pileo concolori; sporis angulatis, uninucleatis, apice oblique apiculatis, 10-14 \approx 8-9.

Hab. ad terram, Stow Massachusetts Amer. bor. (G. E. MORRIS et S. DAVIS). — Pileus 1,5-2,5 cm. latus; stipes 2,5-4 cm. longus, 2-4 mm. cr.

14. **Entoloma flavifolium** Peck, N. York State Mus. Bull. 105 (1906) 557 p. 21, tab. S fig. 9-15. — Pileo tenui sed firmo, late convexo v. subplano, 2,5-5 cm. lato, glabro, hygrophano, initio aquose albo et quandoque margine udo striatulo, dein albo, pilei superficie concolori; sapore dulci v. demum acidulo; lamellis tenuibus, confertis, rotundatis, adnexis, margine leniter eroso v. inæquali, pallide flavis dein rufescentibus; stipite firmo æquali, sericeo-fibrilloso, apice albo-farinoso, farcto v. cavo, albido, 3,5-5 cm. longo, 5-10 mm. cr.; sporis vivide rubris, subglobosis, subangulatis, 7,5-10 μ . diam., apiculatis.

Hab. in silvis inter folia dejecta, Port Henry Essex co. Americæ borealis.

15. **Entoloma deminutivum** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 558 (1907) p. 99. — Pileo tenui, fragili e convexo subplano, umbonato, hygrophano, castaneo-brunneo, juveni vel udo margine nigro et striatulo, dein pallidiori et lucenti, umbone pileo obscuriore, odore farinaceo; lamellis tenuibus angustis, subconfertis, leniter adnexis, subventricosis, ex albo coccineis; stipite fragili, æquali vel supra leniter angustato, glabro, lucenti, albo v. albido; sporis angulatis, uniguttulatis, 10-12 \approx 6-8.

Hab. ad terram humosam, Stow Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS). — Pileus 1,3-3 cm. latus; stipes 1,3-3 cm. longus, 2 mm. cr. *Entol. sericeo* affine.

16. **Entoloma minus** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 (1907) 559

p. 23. — Pileo tenui, subconico v. hemisphærico, dein late convexo, glabro, griseo-brunneo, centro obscuriori 16-24 mm. lato; lamellis tenuibus, confertis, primum ascendentibus dein sinuatis, ex albo carneis; stipite tenui, cavo, albo, 2,5-3,5 cm. longo, 2 mm. c. cr.; sporis subglobosis, angulatis, 7,5-10 μ . diam.

Hab. ad terram in silvis, East Schaghtikoke Rensselaer co. Amer. bor.

17. **Entoloma pulvereum** Rea, Trans. Brit. Mycol. Soc. 1906, p. 170, 560 tab. XIV. — Pileo 5-30 mm. lato, campanulato, dein expanso et applanato, fuligineo dense et minutissime squamuloso, squamulis centro erectis, primum striato, margine leniter incurvato; carne tenui, fuliginea; stipite 20-50 mm. longo, 2-3 mm. cr., primum farcto dein cavo, æquali dense velutino, juveni rubro-ferrugineo farinoso ætate obscuriori, extus et intus fuligineo; lamellis adnatis et leniter sinuatis, 2-5 mm. latis, griseis demum ob sporas rubro-ferrugineis, venosis, subdistantibus margine parum exeuntibus, acie irregulari, crassa, primum pallida v. cinnamomea, dein obscure rosea; sporis cinnamomeo-ferrugineis, irregularibus, angulosis, 12-13 \approx 6.

Hab. inter folia quercina dejecta, Preston Oak Hills, Hampshire Angliæ. — Inodorum.

18. **Entoloma viridans** Harrison Lovejoy, Bot. Gazette vol. L (1910) 561 p. 385. — Pileo 3,5-5,5 cm. lato, carnosio, late convexo, udo hygrophano, griseo, margine roseo-cinnamomeo tincto, disco dein leniter viridescente v. coloribus opposite distributis, sicco toto nitide sericeo; carne alba, dein sicca, tenui; margine revoluta, integro, levi; lamellis æqualibus, subcinnamomeo-flavis, dein subsalmoneis, 2 mm. latis, subsinuatis, adnatis dein separatis, interstitiis venosis; stipite carnosio, albo, pruinato, cavo, rotundato, basi bulboso, supra attenuato, 4-5 cm. longo, 1,5 cm. cr.; sporis crebro verrucosis, cinnamomeis, 10 \approx 7.

Hab. ad terram udam humosam in editioribus, Rocky Mountain Amer. bor.

19. **Entoloma sericellum** Fr. — Syll. V, p. 691. — var. **decurrens** 562 Boudier, Icon. Mycol. vol. I. — A typo recedit tantum lamellis manifeste decurrentibus.

Hab. ad terram in Gallia.

20. **Entoloma Bloxami** (Berk.) Sacc. — Syll. V, p. 684. — var. **triste** 563 Boud. Icon. Mycol. I, t. 92 (ser. IV, p. 12, n. 337.). — A typo colore pilei nigricante dignoscitur.

Hab. ad terram, Saint-Sever (Landes) Galliæ.

CLITOPILUS Fr. — Syll. V p. 698, IX p. 85, XI, p. 45, XIV p. 128, XVI p. 77.

1. **Clitopilus subignitus** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 46. — Britzel- 564
mayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 5. — Pileo levi, flavo-
rubro, margine pallidiore, subopaco, 12 cm. lato; stipite sæpe ex-
centrico, primum subcavo demum cavo v. etiam lacunoso-cavo,
6 cm. longo, 1 cm. cr.; pileo concolori; lamellis confertis, cras-
siusculis, flavo-rubro-lilacinis, sæpe quasi lacte obductis, rotundatis
v. emarginatis, adnatis v. parum decurrentibus, 8 mm, latis; carne
odore levi farinaceo, flavo-rubra, primum in stipite spongiosa;
massa sporarum sordide carnea v. rosea; sporis fere angulosis,
9-10 \approx 5-6.

Hab. in turfosis Algoviæ et Bavarix. — *Clit. ignito* affinis.

2. **Clitopilus mirificus** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 46. — Britzel- 565
mayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) pag. 4. — Pileo isabellino,
alutaceo, intricato-subfibroso, subopaco, 11 cm. diam., convexo,
dein expanso, centro late depresso; stipite farcto, ex albido isa-
bellino, 5 cm. long., 2,5 cm. cr., basi quandoque radiciformi atte-
nuato; lamellis subconfertis, adnatis, rotundatis v. parum decur-
rentibus, albidis, pallide isabellinis, sæpe late incisiss vel serratis,
10 mm. latis; carne odore et sapore grato, alba; massa sporarum
sordide rubro-rosea v. rubro-roseo-lilacina; sporis subglobosis, uno
apice acutatis 6 \approx 4, uniguttulatis.

Hab. in silvis fagineis, Teisenberg Salisburgiæ. — *Cl. popi-
nali* affinis.

3. **Clitopilus reollectus** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 46. — Brit- 566
zelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 4. — Pileo hygrophano,
flavo-brunneo, levi, vix fibroso, 9 cm. lato, tenui carnosio, con-
vexo, centro umbonato; stipite 6 cm. longo, 8 mm. cr., farcto v.
subcavo, supra pallido, basi obscure flavo-rubro-brunneo; lamellis
isabellinis, albido-rubro-flavis, confertis, rotundatis, ex adnexo ad-
natis, tritis subrubidis, 8 mm. latis; carne brunneola, isabellina,
basi in stipite sordide brunnea, inodora; massa sporarum carnea;
sporiss elongatis, 6-7 \approx 3.

Hab. ad terram prope Augsburg Bavarix. — *Clit. popinali*
affinis. Ob lamellas non decurrentes potius ad subgen. *Hypomnemæ*
(Britz. 1883) videtur spectare.

4. **Clitopilus ignitus** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 356. — 567
Agaricus ignitus Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 4,
tab. 182 fig. 79, tab. 191, fig. 121. — Pileo convexo, tenui-car-

noso, rubro-flammeo, ad marginem sæpe obscurius maculato, 6 cm. lato; stipite concolori, subcavo, 7 cm. alto, 5 mm. cr.; lamellis subconfertis, crassiusculis; pileo et stipite pallidioribus, subincurvatis, adnexus, vix decurrentibus; carne flavo-rubra; odore farinaceo; sporis rubris, 8-10 \approx 4-5, breviter ellipsoideis.

Hab. in silvis Algoviaë, Oberstaußen. — *Cl. neglecto* affinis.

5. **Clitopilus carnosotenax** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 46. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 4. — Pileo subopaco, albo-brunneolo maculis et striis subzonatis prædito, aspectu fere coriaceo, sæpe rugoso-sulcato, 6 cm. lato, convexo, centro late depresso, non hygrophano, margine primum revolutum; stipite farcto, pileo concolori sed pallidiore, 3 cm. longo, 6 mm. cr.; lamellis confertis crassiusculis, albidis, flavidis, flavido-carneis, 4 mm. latis, vix sinuatis, decurrentibus; carne pallide flava v. brunneola, odore et sapore peculiari nullo; massa sporarum pallide rubra v. rosea; sporis subglobosis, apiculatis, 5-6 \approx 4.

Hab. in silvis prope Wöllenburg Bavariæ. — *Clit. hydroidi* affinis.

6. **Clitopilus cinereifolius** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 46. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 4. — Pileo subnitido, laccato, albido, albido-griseo, plumbeo, nitido, 4 cm. lato, convexo, centro plus minusve depresso, tenui carnosum; stipite brunneolo, basi nitide albo et piloso, 4 mm. cr., subcavo; lamellis confertis v. subconfertis, albido-griseis, brunneo-griseis, 3 mm. latis; carne inodora; massa sporarum carnea v. griseolo-carnea; sporis subglobosis, indistincte acutatis, 6 \approx 4-5.

Hab. ad terram muscosam in silvis Bavariæ. — *Clit. undato* affinis.

7. **Clitopilus rhodosporus** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 46. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) pag. 4. — Pileo 2,5 cm. lato, convexo centro umbonato, griseo-rubido, griseo-lilacino, subnitido, quandoque zona indistincta prædita, margine revolutum; stipite 5 cm. longo, supra 2 mm. basi 4 mm. cr.; pileo concolori, farcto; lamellis decurrentibus, sinuatis v. non, subconfertis, crassis, albidis, griseolis; massa sporarum carnea; sporis subglobosis, apiculatis, 6-7 \approx 4-5.

Hab. in apricis silvarum Bavariæ. — *Cl. popinali* affinis.

8. **Clitopilus submicropus** Rick, Broteria VI (1907) p. 77. — Pileo carnosulo, subfragili, e convexo expanso, centro depresso, sericeo-velutino, albo, 2-3 cm. lato; stipite flexili, solido, versus pileum

albo-farinoso, apice leniter incrassato, basi mycelio albo cæspitose juncto; lamellis confertis, valde inæqualibus, adnatis, albis, facile secedentibus, tenuibus; sporis roseis, oblongis, $6 \approx 2,5$; statura 3 cm. adæquante; stipite 3-4 mm. cr.; odore farinaceo.

Hab. gregarius ad terram inter ramenta, Rio Grande do Sul Brasiliæ. — A *Cl. micropode* colore et sporis differt, ac stipitis altitudine, sed forsitan potius ejus varietas.

9. **Clitopilus squamulosus** Peck, New York State Mus. Bull. n. 105 572 (1906) p. 16, tab. S, fig. 5-8. — Pileo tenui, fere plano, 2-4 cm. c. lato, profunde umbilicato, centro floccoso-squamuloso, brunneo-griseo et lucenti; carne albida; lamellis confertis, adnatis v. leniter decurrentibus, carneis; stipite 7-10 cm. longo, 4,5-7 mm. cr., supra leniter angustato, cavo, fibroso-striato, colorato sed pileo pallidiori, infra albido; sporis carneis, polygoniis, 12 μ . circ. lat., nucleo magno lucenti præditis.

Hab. ad terram inter folia dejecta, Bolton Landing Amer. bor. 573

10. **Clitopilus Davisii** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXVI (1909) pag. 153. — Pileo tenui, convexo, dein subplano, glabro, flavo; carne albida, odore saporeque farinaceo; lamellis angustis, tenuibus, confertis, adnatis v. leviter decurrentibus, albis, dein incarnatis; stipite gracili, æquali v. sursum leviter attenuato, solido v. farcto, subbulboso, nitido, albido, in maturitate brunnescenti, sæpe basi mycelio albo prædito; sporis subglobosis, angularibus, uniguttulatis, 8-10 μ . latis.

Hab. gregarius in locis aridis glareosis, Stow Massachusetts Amer. bor. — (S. DAVIS). — Pileus 2-3 cm. latus; stipes 4-7 cm. longus, 2-6 mm. crassus.

11. **Clitopilus subplanus** Peck, N. York State Mus. Bull. (1908) n. 122, 574 p. 18 et p. 159. — Pileo tenui, late convexo, demum subplano, centro leviter depresso aut distincte umbilicato, glabro, albido, carne alba; lamellis tenuibus, confertis, adnato-decurrentibus, sordide incarnatis; stipite tenui, glabro, tereti compressove, farcto, demum cavo, albido; sporis incarnatis, angulosis, uninucleatis, 10-12 \approx 6-8.

Hab. inter folia putrescentia in silvis, Sand Lake Renssælær co., Gansevoort Saratoga co. Amer. bor. — Pileus 2,5-4 cm. latus; stipes 2,5-4 cm. longus, 2-4 mm. latus.

12. **Clitopilus orcelloides** Pat. et Demange in Bull. Soc. Myc. Fr. (1910) 575 p. 40. — Pileo orbiculato, cyathiformi, 5-15 mm. diam., tenui, albo, nitido, margine revolutato; carne alba, tenera, farinam redo-

lente, sapore grato; lamellis decurrentibus, albidis, dein leviter roseis v. flavidis; sporis pallide fulvo-flavis, sub vitro incoloribus, basi apiculatis, ovoideis, vix angulosis, verruculis parvis longitudinalibus conspersis, 6-8 \approx 4, basidiis 25-30 \approx 8-10, cystidiis nullis; stipite gracili, cylindrico, farcto, albo, 2-3 cm. longo, 2 mm. cr.

Hab. ad terram silvaticam, La Pho Tonkin. — Videretur *Cl. Orcella* deminutus.

13. **Clitopilus fragilis** Rick, Broteria V (1906) p. 23. — Pileo excen- 576
trico, cæspitoso, 8 cm. lato, 0,5 cm. cr., molli, fragili, griseo-sericeo, cute sæpe diffracta; stipite 5 cm. alto, 5 mm. cr., curvo, fragili, albo-griseo, versus substratum tomento albo tecto; velo evanido; lamellis confertis, inæqualibus, angustis, sinuato-adnatis; carne fibrillosa; sporis irregularibus, ovalibus v. ellipsoideis, apiculatis, 7 μ . long., 3,5 μ . latis, membrana minutissime verrucosa; odore forti farinæ, sapore acido.

Hab. ad truncum, Rio Grande do Sul Brasiliæ. — *Clitop. micropodi* affinis sed caret zonis et est excentricus.

LEPTONIA Fr. — Syll. V p. 706, IX p. 87, XI p. 46, XIV p. 128.

1. **Leptonia altissima** Masee, Kew Bull. (1906) p. 93. — Pileo tenui, 577
primo convexo dein plano-umbonato, interdum depresso, cinereo, fibrillis obscurioribus virgato, 4-7 cm. lato; lamellis distantibus, postice sinuato-adnexis, uncino decurrentibus, ex albo cærulescentibus; sporis subglobosis, basi oblique apiculatis, 7-8 \approx 6-7; stipite altissimo, 9-14 cm. longo, sursum attenuato, subfibrilloso cinereo, cavo.

Hab. ad terram in Horto bot. Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Lept. chalybæ* Pers. et *L. euchroæ* proxima.

2. **Leptonia incarnato-fuscescens** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 47. — 578
Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) pag. 5. — Pileo convexo centro depresso, levi, opaco, carneo, brunneo, subpellucido, 3 cm. lato; stipite 3 cm. long., 1 mm. cr., e griseo cyaneo-nigro v. griseo-chalybæo, farcto, tenaci; lamellis carneis subconfertis, 4 mm. latis; massa sporarum rubra; sporis 10-12 \approx 6-8, irregulariter quinque-sexangularibus.

Hab. in silvis prope Augsburg Bavariciæ. — *Lept. lampropodæ* affinis.

3. **Leptonia similis** Rick, Broteria V (1906) p. 223. — Pileo plano, 579
3 cm. lato, carnosulo, leviter umbonato, griseo-ardesiaco, centro nigrescente, squamulosulo, fibrillis brunneis picto; lamellis appro-

ximatis, carneis, a stipite remotis, acie laxè minutissime serrulatis; stipite pallido, 6 cm. alto, 3 mm. lato, glabro, æquali aut basim versus leviter incrassato, cum pileo cohærente; sporis ovatis, 6-8 μ . long., 4-5 μ . latis, carneis, uniguttulatis, sæpe oblique apiculatis.

Hab. ad lignum arboris frondosæ in Brasilia.

4. **Leptonia Torrenteræ** Roll. Bull. Soc. Mycol. XX, (1904), pag. 198, 580 tab. X, fig. 1. — Pileo hemisphærico, vix carnosulo, umbilicato, firmulo, striato, squamulis revolutis sursum et præcipue ad umbilicum ornato, 3 cm. circ. lato, dilutissime griseo-brunneo et sub lente viridescente; lamellis latis, distantibus, marginem versus ventricosis, primo candidis; sporis ocellatis, angulatis, roseis 10 μ . cr.; stipite cavo, gracili, stricto, elastico, firmo, minute striatulo, albo, infra floccoso, circiter 5 cm. alto.

Hab. locis incultis sub Pinis, Quercubus etc. non rara in ins. Balearibus ad Sa Coma, prope torrentem Torrentera.

5. **Leptonia abnormis** Peck, Journ. of Mycol. XIV (1908) p. 2. — 581 Pileo tenui convexo, late umbilicato, glabro, hygrophano, nigro-brunneo, udo margine nitido et obscure striatulo, arescendo obscure griseo-brunneo, carne pileo concolori; lamellis latis, subdistantibus postice leniter rotundatis, adnexis, cinnamomeis v. maturis pallide carneis; stipite æquali, glabro, cavo, albido; sporis late ellipsoideis v. subglobosis, 6-7 \times 5-6.

Hab. ad terram, Ellis Massachusetts Amer. bor. (G. E. MORRIS). — Pileus 2-2,5 cm. latus; stipes 2,5 cm. c. longus, 2 mm. cr.

6. **Leptonia flavo-brunnea** Peck, Bull. Torr. Bot. Club XXXVI (1909) 582 p. 332. — Pileo convexo, tenui, fragili, umbilicato v. centro depresso, margine decurvo, quandoque subplano, centro minute tomentoso, subhygrophano, rufo-brunneo juveni et humido, sicco flavo-brunneo, sapore leviter farinaceo; lamellis adnatis aut decurrentibus, subconfertis, citrinis, demum roseolis, aliquando transverse venosis; stipite gracili, fragili, flexuoso, tereti v. compresso, farcto v. cavo, glabro, fibroso, pallido v. citrino, deinde brunneo-luteo, sæpe basi curvo et albo; sporis subglobosis, angularibus, uninucleatis, oblique apiculatis, 8 μ . diam.

Hab. gregaria inter ramulos dejectos in humidis, Stow Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS et G. E. MORRIS). — Pileus 10-25 mm. latus; stipes 5-7,5 cm. longus, 2-3 mm. crassus.

7. **Leptonia transformata** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 583 (1907) p. 32. — Pileo tenui, submembranaceo, leniter convexo v. subplano sæpe umbilicato, sericeo-tomentoso, tempore humido sicco

v. submolli, margine primum incurvato, striatulo, sæpe ætate undulato v. lacerato, albo, carne alba, sapore farinaceo 10-20 mm. lato; lamellis sinuatis, adnaxis, confertis, inæqualibus, ventricosis, ex albo coccineis; stipite longo, angusto, erecto v. flexuoso, æquali v. supra leniter angustato, apice pruinoso, infra glabro et lucenti, subcartilagineo, farcto v. cavo, albo et basi mycelio albo prædito, 2,5-5 cm. longo, 1-2 mm. crasso; sporis carneis, angulatis, uninucleatis, 10-12,5 \approx 7,5-8,5.

Hab. in silvis prope Falmouth Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS).

8. **Leptonia Reaë** R. Maire, Trans. Brit. Mycol. Soc. III (1910) p. 170, 584 t. XI. — Pileo convexo dein expanso, submembranaceo, 0,5-1 cm. lat., disco carnosio, levi glabro, sicco, vix hygrophano, maturitate raro umbonato v. papillato; cuticula non separabili, margine subincurvato, dein expanso et subinde striatulo; stipite æquali flexuoso, undulato, glabro, nitido, sicco, 2-3 cm. long., 1-5 mm. cr., cyaneo-nigrescente dein sæpe vinoso, e farcto cavo, apice obsolete pruinoso; lamellis sat confertis, brevibus, latis, profunde sinuatis, acute adnatis dein liberis, albidis dein griseo rubris; carne vinosa dulci, odore nullo; sporis obsolete polygoniis v. subglobosis, 8-10 \approx 7-8, salmoneis, pluriguttulatis; basidiis tetrasporis clavatis, 39-40 \approx 8-10.

Hab. in pascuis prope Grindelford etc. Britanniaë.

9. **Leptonia ejuncida** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 47. — Britzel- 585 mayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 5. — Pileo nigro-brunneo, minute squamuloso, 2 cm. lato; stipite pileo concolori, 8 cm. longo, 1-2 mm. cr.; lamellis subremotis, albo-rubidis v. carneis, 3 mm. latis, confertis v. etiam subadnatis; massa sporarum rubra; sporis 10-14 \approx 9-10 irregulariter quinque-sexangularibus.

Hab. in silvis prope Augsburg Bavariaë. — *Lept. lampropodæ* affinis.

10. **Leptonia transnumerata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 47. — Brit- 586 zelmayer, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 6. — Pileo flavo-brunneo, centro brunneo, 8 mm. lato; stipite et lamellis albidis, pallide brunneolis; stipite 3 cm. long., 1 mm. cr., cavo; lamellis confertis, 2 mm. latis, subsinuatis, adnaxis v. parum adnatis; carne pilei brunnea; massa sporarum rubra; sporis subquinque-sexangularibus, 8-9 \approx 6.

Hab. ad terram muscosam prope Teisendorf Salisburgiaë. — *Lept. asperellæ* affinis.

11. **Leptonia parasitica** QuéL., Bull. Soc. bot. Fr. 1878, pag. 287, 587

tab. III, fig. 6. — Tenuiter tomentoso-pubescent, nivea; pileo membranaceo, translucido, convexo-plano, 5-7 mm. diam., leviter umbilicato; lamellis sinuato-ventricosis, albis dein roseis; stipite gracili arcuato apice dilatato; sporis pentagonis, guttulatis, roseis, 12 μ . diam.

Hab. parasitice in parte sup. stipitis *Cantharelli cibarii*, quam mycelio araneoso obducit, in Gallia.

NOLANEA Fr. — Syll. V p. 716, IX p. 88, XI p. 47, XIV p. 129, XVI p. 80, XVII p. 59.

1. **Nolanea subacceptanda** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 47. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 6. — *Fragilis*; pileo 5 cm. lato, brunneo, centro obscuriore, convexo dein expanso, centro plano-depresso v. parum elevato; stipite 12 cm. longo, supra 4 mm. infra 8 mm. cr., cavo, brunneolo, basi præcipue albo-fibrilloso; lamellis 5 mm. latis, sordide rubidis, subconfertis; massa sporarum rosea; sporis 9-10 \approx 7-8, irregulariter quinque- v. sexangularibus; carne odore farinaceo.

Hab. in silvis Baviaræ. — *Nol. acceptandæ* affinis.

2. **Nolanea paludicola** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 199. — *Agaricus paludicola* Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 7, tab. 184, fig. 91 et tab. 210, fig. 183. — Pileo 3 cm. lato, subconvexo, fere applanato, centro depresso, umbonato; stipite brunneolo, albo-fibroso, 6 cm. alto, 3 mm. cr., farcto; lamellis 7 mm. latis, rotundatis, adnexus, sordide carneis, remotis; carne odore tenui farinaceo; sporis rubris, 10 \approx 8, subregulariter 6-angulosis.

Hab. in turfosis Baviaræ. — *N. limosæ* affinis.

3. **Nolanea inutilis** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 199. — *Agaricus inutilis* Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1908) p. 7, tab. 185, fig. 101 et tab. 209, fig. 181. — Pileo ex obscure brunneo nigro-brunneo, fibroso, campanulato, 2,5 cm. lato; stipite 5 cm. alto, 4 mm. cr., cavo, nigro-brunneo; lamellis 5 mm. latis, remotis, obscure flavo-brunneis, brunneis, rotundatis, adnexus; carne concolori; odore nullo; sporis roseis, 12 \approx 8, irregulariter 4-6 angulosis.

Hab. in silvis prope Augsburg et Inningen. — *N. clandestinæ* affinis.

4. **Nolanea summissa** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 48. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 7. — *Hygrophana*; pileo 2,5 cm. lato e conoideo campanulato, centro acute umbonato, ru-

bro-flavo, brunneo dein lamellas confertas ostendente, striato; stipite 4,5 cm. long., 1 mm. cr., cavo, brunneo-violaceo; lamellis 4 mm. latis, albidis, carneis v. griseo-brunneis, rotundatis, adnexis; massa sporarum rosea; sporis regulariter quinque- vel sexangularibus $10 \approx 7$.

Hab. in silvis Algoviae et Bavariae. — *Nol. macrae* affinis.

5. **Nolanea ambrosia** (Quélet.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 197. — 592

Rhodophyllus ambrosia Quélet, Assoc. franc. Avanc. Sc. XXIV (1895) p. 4, tab. VI fig. 7 (extr.). — Pileo campanulato, levigato, 2-3 cm. long., e brunneo dein pallide avellaneo, vertice saturatiore, udo striato et fusco-olivaceo; carne tenuissima, Fragariam v. Jasminum redolente; lamellis adnatis, ventricosis, cremeo-ochraceis, dein roseis; stipite fistuloso, tenaci, fusco-olivaceo, fugaciter pruinoso, demum cornicolore, basi incrassatulo, villosa, albo; sporis oblongo-polygoniis, roseis, 10-12 μ . long.

Hab. in silvis sabulosis et humidis, Bourbonnais (ab. H. BOURDOT). — Affinis *Nol. cetratae*; odore *Entoloma ameides* in memoriam revocat.

6. **Nolanea suaveolens** Peck, Rep. State Bot. N. York State Mus. 593

(1907) Bull. n. 122, p. 23 et p. 159. — Pileo submembranaceo, convexo, umbilicato, obscure fibrilloso v. impolito, margine indistincte striato, fumoso, 1,5-4 cm. lato; lamellis tenuibus inaequalibus, confertis, adnatis, albidis, demum sordide rosaceis; stipite tenui, glabro, cavo, fusco, 3-5 cm. longo, 1 mm. cr.; sporis angulosis uninucleatis, 10-12 \approx 6-8.

Hab. in silvis in America bor. — Specimina exsiccata odorem gratum *Lactarii glyciosmi* et *L. camphorati* simulantem emittunt.

7. **Nolanea chlorolivacea** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 372. — 594

Pileo 10-15 mm. lato, 10 mm. alto, olivaceo-chlorino, campanulato, sericeo, fibroso-striato, membranaceo; lamellis oblanceolatis, adnexis; basidiis tetrasporigeris, 30-40 \approx 10-12; sporis elongatis, 5-7 angulatis, 9-11 \approx 6-8; cystidiis fusoideis, ventricosis, 70-80 \approx 12-20; stipite solido demum cavo, cartilagineo, minute floccoso, 2,5 mm. cr.

Hab. ad terram in silvis Ithacæ N. Y. Amer. bor. (JACKSON). — Tota 3 cm. alta. *Nolan. pisciodoræ* similis.

8. **Nolanea pellucidula** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 47. — Britzel- 595

mayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 8. — Pileo 12 mm. lato, campanulato, dein expanso, pellucido, carneo, pallide brunneolo, fere subopaco; stipite pellucido pileo concolori, minute albo-fibril-

loso, infra albo-maculato, 6 cm. long., supra 2 mm. infra 5 mm. cr., farcto, non raro contorto; lamellis 2 mm. latis, albis, pallide-rubidis, subconfertis, rotundatis, ex adnexo adnatis; carne brunneolo-carnea, inodora; massa sporarum rubra; sporis 10-12 \times 6-8, irregulariter quinque-sexangulosis.

Hab. ad terram muscosam in silvis Baviariæ. — *Nol. Kretschmari* affinis.

9. **Nolanea cælestina** Fr. — Syll. V, p. 727. — var. **violacea** Kauffm. 596
X. Rep. Michigan. Acad. Sc. (1908) p. 67. — A typo imprimis differt lamellis angustioribus sporisque magis ellipsoideis.

Hab. ad terram, Michigan Americæ borealis. — Pileus subviolaceus, conico-campanulatus, 8-10 mm. diam; stipes gracilis, 5 cm. long., 1 mm. cr., saturatius violaceus; sporæ ellipticæ, tuberculatæ, 9-11 \times 6-7, carneæ.

ECCILIA Fr. — Syll. V p. 729, IX p. 88, XIV p. 129, XVI p. 80, XVII p. 60.

1. **Eccilia flavida** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXVI (1909) p. 153. 597
— Pileo tenui, convexo, glabro, umbilicato, flavido, sicco obscure striato; lamellis tenuibus, subconfertis, decurrentibus; stipite gracili, glabro, fistuloso, pileo concolori, sæpe basi mycelio albo; sporis subglobosis, angularibus, 8-12 \times 6-8.

Hab. ad terram, Stow Massachusetts Amer. bor. (G. E. MORRIS). — Pileus 2-2,5 cm. latus; stipes 2,5-3,5 cm. longus, 1,5-2 mm. cr.

2. **Eccilia unicolor** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) p. 99. 598
— Pileo tenui, submembranaceo, conico v. convexo dein expanso, umbilicato, glabro, sericeo, lucenti, hygrophano, udo flavo-brunneo et margine striatulo, dein arescendo pallidiori vel brunneo-aurantiaco; lamellis inæqualibus, tenuibus, angustis, confertis, arcuatis, decurrentibus, quandoque margine adnexis, pileo concoloribus; stipite extus cartilagineo, recto v. flexuoso, glabro, lucenti, farcto, apice pruinoso, pileo concolori v. pallidiori, basi tomento mycelioideo albido prædito; sporis angulatis, uniguttulatis, 8-12 \times 6-8.

Hab. ad terram sabulosam, Falmouth Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS) — Pileus 1-2,5 cm. latus; stipes 3-6 cm. longus, 1-3 mm. cr.

3. **Eccilia subacus** Peck, Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) p. 100. 599
— Pileo tenui, submembranaceo, conico, convexo v. expanso, late depresso, umbilicato v. truncato, udo levi et lucenti, sicco dense

pruinoso, albo; lamellis tenuibus, distantibus, adnatis vel leniter decurrentibus, ex albo rubris; stipite angusto, fragili, æquali vel supra leniter angustato, glabro, farcto v. cavo, albo; sporis angulatis, uniguttulatis, 10-12 \approx 6-8.

Hab. gregaria ad terram in herbis, Stow Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS). — Pileus 0,6-2,5 cm. latus; stipes 2-5 cm. longus, 1-2 mm. cr.

4. **Eccilia roseo-albo-citrina** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 369. 600
— Alba, 4-6 cm. alta; pileo 1-2,5 cm. lato, albo, ad centrum sæpe leviter flavo, convexo, sericeo, centro leviter depresso, dein expanso, levi; lamellis pallide carneis, adnatis, decurrentibus, subdistantibus, leviter ventricosis; sporis pallide carneis, 9-11 \approx 6-9; stipite primum tomentoso, demum levi, ad apicem floccoso, cavo, cartilagineo, 2-3,5 mm. cr.

Hab. ad terram, Ithaca N. Y. Amer. bor. (LAWRENCE).

5. **Eccilia cinericola** Peck, Bull. Torr. Bot. Club. XXXIV (1907) 601
p. 347. — Pileo tenui, fragili, glabro, leniter scabro, late convexo, dein expanso et late umbilicato v. centro depresso, ex albo flavo dein cremeo; lamellis crassis, distantibus, latis, adnatis v. leniter decurrentibus, sæpe leniter sinuatis, ex albo cinnamomeis, ob sporas pulverulentis; stipite subcartilagineo, fragili, cavo, apice leniter expanso, primum albo dein pileo concolori; sporis subglobosis, angulatis, 10-12 \approx 8-10.

Hab. in sabulosis herbosis et præcipue in areis carbonariis, Boston Massachusetts Amer. bor. (G. E. MORRIS et S. DAVIS). — Pileus 1,2-2,5 cm. latus; stipes 2-2,5 cm. longus, 2 mm. crassus.

CLAUDOPUS W. Sm. — Syll. V p. 733, IX p. 89, XI p. 48, XIV p. 130, XVI p. 82, XVII p. 61.

1. **Claudopus reptans** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 48. — Britzel 602
mayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 8. — Pileo 3 cm. lato, fere plano, brunneolo carneo, minute albo-fibrilloso, basi piloso-fibroso, fragili; stipite nullo; lamellis 5 mm latis, confertis, sordide carneis; massa sporarum rubra; sporis irregulariter angulosis, fere verrucoso-angulosis, 10 \approx 6.

Hab. ad terram in silvis Salisburgiæ. — *Claudopodi depluenti* affinis.

2. **Claudopus odorativus** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 48. — Britzel 603
mayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 8. — Pileo 9 cm. lato, convexo, margine flexuoso, crasse carnosio, piloso-intricato, albido

et albo-flavido piloso, subopaco; stipite nullo; lamellis 8 mm. latis, subcrassis, flavo-rubidis non numerosis; carne albida v. e flavido sordide flava, odore particulari melonis; massa sporarum rubro-rosea; sporis ellipsoideis, curvatis, 6-7 \times 2-3.

Hab. ad caudices Pini in Bavaria.

3. **Claudopus commixtus** Bres. in litt., *Crepidotus commixtus* Bres. in 604
Krieger Fungi Sax. exsiccati n. 1766-1767, *Crepidotus variabilis*
Quél. et Alior. — Pileo carnosulo, e resupinato reflexo, levi, pu-
berulo, margine tenuissime pubescenti-ciliato, glabrescente, albo,
4-10 mm. lato. stipite brevissimo, primitus centrali, incurvo, dein
lateralis et oblitterato, albo, villosulo; lamellis albis, dein carneolis,
rotundato-adnaxis, demum ad basim concurrentibus, subdistantibus;
sporis sub microscopio hyalinis, oblongis, uno latere subdepressis,
6-8 \times 2-3; basidiis clavatis, 20-23 \times 5-6.

Hab. ad corticem, ramulos, folia arborum frond. et ad caules
herbarum, autunno, in regione tridentina, Gallia, Germania, Italia
(Romæ, D. SACCARDO). — Species hæc hucusque cum *Claudopode va-*
riabili Fr. confusa, qui aliquod major est, lamellas latiores, distan-
tiores et sporas jugatas, subellipticas, 7-9 \times 4-5 habet.

Sect. 3. Ochrosporæ.

PHOLIOTA Fr. — Syll. V p. 736, IX p. 90, XI, p. 48, XIV p. 131,
XVI p. 83, XVII p. 62 *).

1. **Pholiota arcuatifolia** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 50. — Britzel- 605
mayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 10. — Pileo non hygro-
phano, glutinoso, minute fibrilloso, flavo-rubro-brunneo v. rubro-
brunneo-melleo, centro obscuriore margine albido, 10 cm. lato,
campanulato v. tantum convexo, dein expanso; cute facile secedente;
stipite albido hinc inde vel omnino usque ad anulum flavo-brun-
neo-fibrilloso, farcto, 12 cm. long., 1 cm. cr., basi incrassato; la-
mellis 10 mm. latis, confertis v. subconfertis, albidis, pallide gri-
seo-brunneis, fere aspectu aquosis, mollibus, emarginatis, adnatis;

*) Cl. W. G. SMITH in sua Synopsi Basidiomyc. 1908, p. 121, a gen. *Pholiota*
sub nom. *Togaria* separat species nonnullas a typo recedentes imprimis habita-
tione terrestri nec truncigena, sed discrimen hoc, saltem pro tempore, non satis
validum videtur.

carne sapore miti, albida, in centro et basi stipitis parum brunneolo-flava; massa sporarum brunnea, griseolo-brunnea; sporis elongatis $6 \approx 3$.

Hab. gregaria ad marginem silvarum in Bavaria. — *Ph. sphaeromorphæ* affinis.

2. **Pholiota cubensis** Earle, Estac. Agron. Cuba I (1906) pag. 242, 606
tab. 42. — Pileo carnosus, duro, 6-12 cm. lato, plano, cinnamomeo, primum viscoso sed demum sicco, non striato, disco villososquamoso, margine areolato-fisso; lamellis undulatis sed dente adnatis, confertis, angustis, subcinnamomeis; sporis cinnamomeis, ovoideis, $6-7 \approx 4$; velo valido rufo anulum magnum 2 cm. a stipite remotum efformante; stipite 5 cm. longo, 1 cm. cr., fere cylindrico sed basi subincrassato, supra anulum villosus, subtus fere glabro, pallide rufo, farcto et duro; carne pilei rubescenti, sapore non valde distincto sed peculiari et fere ingrato.

Hab. solitaria v. gregaria ad terram, Santjago de las Vegas in ins. Cuba.

3. **Pholiota Johnsoniana** Peck, 23 Rep. N. Y. St. Mus. (1889) p. 98 607
(*Agaricus*); Atkinson, Mushrooms p. 153, t. 49, f. 149 (*Phol.*). — Pileo carnosus centro crasso, convexo dein expanso-applanato, 5-10 cm. lato, levi, quandoque udo ad tenuem marginem striatulo, flavidulo v. fulvo, margine albido; lamellis dente adnexis, rotundatis, nonnullis subliberis, primum griseis dein brunneo-ferrugineis; sporis irregulariter ovoideis, $4-6 \approx 3-3,5$; stipite cylindrico v. supra leviter conoideo, levi, supra anulum leniter striato, albido, solido, dein subcavo 7-15 cm. long., 6-12 mm. cr.; velo crasso, anulo angusto sed crasso v. tumido, facile secedenti.

Hab. in silvis et in herbosis Amer. bor. — Edulis

4. **Pholiota lutea** Peck, Mycologia I (1909) p. 84, tab. VII, fig. 4. — 608
Pileo crasso, carnosus, firmus, e convexo subapplanato, 5-10 cm. lato; superficie sericea, centro squamulosa, e flavo lutea, margine sterili et leniter incurvato; carne flavida odore grato sed sapore amaro; lamellis ex adnexo subdecurrentibus, e flavido obscure ferrugineis; sporis ellipsoideis, ferrugineis, $9 \approx 5$; stipite 5-7 cm. longo, 0,6-1 cm. cr., solido, firmo, ventricosus, fibrillosus, infra concolori, supra albido; anulo latiusculo et conspicuo, sporis copiosis mox colorato.

Hab. subcaespitosa ad truncos emortuos in silvis New York et New Jersey Amer. bor.

5. **Pholiota suberebia** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 348. — 609

Agaricus suberebius Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 9, tab. 270, fig. 321. — Pileo levi, albido flavo-ochraceo, convexo, expanso, medio depresso umbonato, 7 cm. lato; stipite 7 cm. alto, supra 1 cm. cr., basi attenuate, supra flavo-ochraceo infra rubro-brunneo, fibroso; lamellis 1 cm. latis, confertis vel subconfertis, subincurvatis, adnexis, e fulvo flavo-rubris; carne flavida; sporis flavo-rubro-brunneis, 6-7 \approx 4, uno apice plerumque acutatis.

Hab. in silvis et turfosis Algoviæ. — *Ph. erebiæ* affinis.

6. **Pholiota odoratissima** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. 610
Skr. (1904) n. 6, p. 49. — Pileo convexo, albo-griseo, initio granuloso, umbone flavescente, glabro, 4 cm. lato; lamellis initio albidis dein aquose rufo-fuscis, subtiliter denticulatis, liberis; stipite 4-8 cm. longo, æquali, albo, cavo, deorsum atro-fibrilloso, sursum albo-pruinoso, anulo subfugaci; sporis atro-cyaneis; odore gratissimo.

Hab. in pinetis prope Christiania Norvegiæ.

7. **Pholiota appendiculata** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 94 (1905) 611
p. 33, t. P, f. 8-17. — Pileo carnosio, firmo, late convexo v. subplano 2,5-7,5 cm. lato, udo viscido, lucenti, crebre squamoso, margine veli lacinulis appendiculato, initio obscure rubro, dein subcinnamomeo v. sæpe etiam flavo-brunneo, carne initio purpureo-rubra dein albida v. pallide flavida; lamellis tenuibus, confertis, postice rotundatis, adnexis v. dente decurrentibus, pallide flavis v. fere albis, dein brunneis; stipite brevi, 1-2,5 cm. long., 4-8 mm. cr. firmo, solido v. anguste cavo, supra albo infra brunneo et squamoso, intus albo, velo albo primum lamellas occultante dein margini et pileo plus minusve adhærente.

Hab. in serragine lignea, Mac Lean Tompkins co. Amer. bor.

8. **Pholiota duroides** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 122 (1908) 612
p. 148 et p. 159, (1909); Bull. 131 t. 116, f. 1-7. — Pileo tenui, convexo, demum subplano, glabro, subinde centro leviter rimoso-squamoso, ex albo ochraceo-luteo; carne alba, sapore miti; lamellis tenuibus, confertis, angustis, adnexis, subinde late sinuatis et dente decurrentibus, albidis, demum fusco-ferrugineis; stipite æquali, farcto v. cavo, glabro, albido, anulo crasso, lanuginoso, sæpe lacerto evanescenteque, albo; sporis late ellipsoideis, 6-8 \approx 4-5.

Hab. in silvis pr. Syracuse N. Y. et Massachusetts Amer. bor. (G. E. MORRIS). — Pileus 2,5-5 cm. latus; stipes 2,5-5 cm. longus, 4-8 mm. cr. Inter *Pholiotam* et *Strophariam* ambigua; carne molliore sporisque minoribus a *Phol. dura* diversa.

9. **Pholiota Musæ** (Earle) Sacc. et Trav. — Syll. XX, pag. 343. — 613

Pholiotina Musæ Earle Estac. Agron. Cuba I (1906) p. 241, t. 41.
— Pileo tenui aquoso, 1-4 cm. lato, e convexo plano vel subdepresso, subcinnamomeo, sicco pallidiore, glabro, hygrophano et striato; lamellis adnaxis, confertis, angustis, medio ventricosis et unicoloribus, senio obscurioribus; sporis fusco-pallidis, magnis, ellipsoideis, 15-18 \times 9-10; velo albo, villosa et facile appendiculari; anulo parvo et fugaci; stipite 4-6 cm. longo, 3-6 mm. cr., subcylindrico. glabro, nitido, pure albo, cavo et fragili.

Hab. cæspitosa ad folia dejecta putrida, Santjago de las Vegas in ins. Cuba.

10. **Pholiota phlebophora** Patouill., Bull. Soc. Myc. de Fr. XXV (1909) 714

p. 11. — Pileo carnosio, convexo-plano, 15 mm. lato, rufo-brunneo, glabro, venis obtusis tenellis reticulato, margine levi; lamellis dilute brunneis, adnatis, inæqualibus, interstitiis levibus; sporis ovoideis, levibus, ochraceis, 9 \times 5, apice poro pertusis; stipite cylindraceo, 2-3 cm. long., gracili, brunneo, subfarcto; anulo membranaceo, albo, erecto, integro.

Hab. ad terram in montibus Lang-Biang Indiæ (EBERHARDT).

11. **Pholiota vermiflua** Peck — Syll. V, p. 739. — var. **pusilla** Rick, 615

Broteria VI (1907) p. 77. — A typo differt statura minori.

Hab. ad terram, Rio Grande do Sul Brasiliæ.

12. **Pholiota platensis** Speg. — Syll. XVI, p. 83. — var. **perfecta** 616

Rick, Broteria VI (1907) p. 78, tab. V. — A typo differt pileo valde rimoso-reticulato.

Hab. in terra humosa, stercorata, Rio Grande do Sul Brasiliæ.

LOCELLINA Gill. — Syll. V p. 761, IX p. 94, XVI p. 87, XVII p. 65.1. **Locellina californica** Earle, Bull. of the New York Bot. Gard. 617

(1904) p. 299. — Pileo tenui, 5-9 cm. lato, dein late expanso, pallide castaneo, centro paullo obscuriore, udo viscido sed ætate sicco et levi, margine integro; lamellis liberis, ætate remotis, subconfertis, latis, planis v. subventricosis, pallide brunneo-salmoneis, dein subcinnamomeis; sporis brunneo-ferrugineis, irregulariter ellipsoideis, basi oblique et minute apiculatis, 17-18 \times 8-9; stipite 6-12 cm. longo, 5-10 mm. cr., subæquali, apice discoideo, basi leniter incrassato, præcipue ad apicem minute tomentosulo, e cremeo are-scendo leniter brunneo, solido, carnosio-fibroso; volva persistenti,

tenui, fragili, plerumque trilobata, cupula basali 1 cm. circ. alta; carne tenui, alba, immutabili, sapore et odore grato.

Hab. in herbidis prope Palo Alto California (C. F. BAKER).

2. **Locellina pygmæa** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) p. 267. — Solitaria; volva poculiformi 4-5 mm. alta, 3-3,5 mm. diam., margine denticulato-lacera, membranacea, candida; pileo hemisphærico exumbonato et exumbilicato, 8-12 mm. diam., glabro, levi, margine integro obsolete striatulo atque subpruinuloso, carnosulo-molli; stipite tereti deorsum non v. vix incrassatulo, 10-12 mm. long., 0,5 mm. cr., glabro, levi, intus angustissime subfistuloso, cum pileo continuo; lamellis membranaceis confertiusculis, latiusculis, adnatis, acie integerrimis membranaceis; sporis e globoso ovatis, 6-8 × 5-7, grosse 1-guttulatis, levibus, fulvis,

618 =
Volvariella
pusilla
(Weinm.)

Hab. ad terram sabulosam prope Jujuy et prope Orán Argentinæ.

INOCYBE Fr. — Syll. V p. 762, IX p. 95, XI p. 50, XIV p. 132, XVI p. 87, XVII p. 65 *).

1. **Inocybe albidula** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 54. — Britzelmayr, 619 Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 15. — Pileo campanulato vel convexo et centro subumbonato v. etiam fere depresso, piloso-fibroso, dein fibroso et demum vix minute squamuloso, flavo-albido, sæpe sanguineo-maculato, 15 cm. diam.; stipite concolori, fibroso, 16 cm. long., supra 2-5 cm., basi 3 cm. cr., supra plerumque flocoso-pulveraceo; lamellis subremotis, albido-flavis, sordide flavo-ochraceis, demum sæpe rubro-marginatis; carne alba vel albida, odore forte fructuum.

Hab. in silvis fagineis Algovie et Bavarie. — *In. incarnatæ* affinis.

2. **Inocybe servata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 53. — Britzelmayr, 620 Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 12. — Pileo usque 10 cm. lato, acute campanulato dein expanso, longe rimoso et fibroso, albo-flavo, flavo vel ex aureo-flavo brunneolo, sericeo, tenui-carnoso; stipite supra 10 mm., basi 20 mm. cr., 15 cm. long., albo, flavido, farcto; lamellis 6 mm. latis, parum adnexis v. adnatis, sordide al-

*) Cfr. F. BATAILLE, *Flore analytique des Inocybes d'Europe*, Besançon, 1910.

bido-flavis, griseo-flavis sæpe margine pulveraceo; carne albida, sericea, odore subacri; massa sporarum brunneo-flava; sporis 12-15 \times 8.

Hab. frequenter in silvis Salisburgiæ, Bavarie et Friburgiæ. — *In. Curreyi* affinis.

3. **Inocybe explanata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 54. — Britzel-⁶²¹mayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) pag. 15. — Pileo et stipite albis v. albidis, tactu rubidis; pileo late campanulato, 9 cm. lato, minute fibrilloso sed non rimoso; stipite 10 cm. long., 1 cm. cr., basi sæpe subbulboso; lamellis confertis v. subconfertis, albis, rubido-albis dein griseo-rubidis, 5 mm. latis, rotundatis, e libero adnexus; carne alba v. albida, trita e rubido rubro-lateritia, odore fructuum; massa sporarum flavo-brunnea; sporis elongatis, 8 \times 4-5.

Hab. in silvis fagineis prope Teisendorf Salisburgiæ. — *In. sindoniæ* affinis.

4. **Inocybe deminuta** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 105 (1906)⁶²² p. 23. — Pileo tenui, hemisphærico convexo v. subplano, 7,5-15 mm. lato, e piloso squamuloso, centro squamoso, margine fibrilloso, griseo-brunneo; lamellis subdistantibus, late sinuatis, adnexus, ventricosis, ex albido brunneis v. brunneo-ferrugineis; stipite brevi, 9-18 mm. longo, 2,2 mm. cr., firmo, solido, sericeo-fibrilloso, supra albido, basi griseo-brunneo et subsquamuloso; sporis subglobosis, nodulosis, 7,5-10 \times 7,5.

Hab. ad terram in silvis, Wading River Amer. bor.

5. **Inocybe mimica** Masee, Ann. of Bot. 1904, p. 492, Trans. Brit.⁶²³ Mycol. Soc. II (1905) p. 97; Rev. Mycol. (1905) p. 416. — Pileo campanulato, obtuse umbonato, flavo-brunneo fibrilloso, late et adpresse squamuloso, squamulis pileo obscurioribus, 6-8 cm. lato; lamellis latis, profunde sinuatis; stipiti breviter adnatis, flavo-brunneis; stipite solido, æquali, fibrilloso, pileo pallidiore, 6-8 cm. long., 1 cm. cr.; sporis subcylindræis oblique apiculatis, levibus, 14-16 \times 6-8; cystidiis nullis.

Hab. ad terram in silvis, Castle Howarr Yorks Britannia.

6. **Inocybe brunnescens** Earle, Bull. of the New York Bot. Gard⁶²⁴ (1904) p. 300. — Pileo 3-7 cm. lato, primum campanulato et subgibboso dein obtuse expanso, e nitide brunneo margine ad castaneum colorem nutante, centro pallidiore, superficie radiato-fibrosa, subglabra sed disco squamulis minutis floccosis prædito, margine æquali, raro laciniato, demum revoluta; lamellis subsinuatis dente parum decurrentibus, subconfertis, latis, ventricosis, margine ero-

sis, ochraceo-brunneis, acie sæpe albida; sporis levibus, ellipsoideis 10 \times 5 circ.; stipite 5-7 cm. longo, 8-12 mm. cr., æquali, levi vel parum fibrilloso, albo, supra brunneo, solido; carne alba, immutabili, sapore et odore grato.

Hab. inter folia quercina dejecta, Stanford, California (C. F. BAKER).

7. **Inocybe Patouillardii** Bres. Ann. mycol III (1905) p. 161, *Inocybe* 625
Trinii var. *rubescens* Pat. Tab. anal. n. 344, non Gillet. — Pileo carnosus, e conico-campanulato expanso umbonato, sicco, sericeo-fibrilloso, primitus albo, dein luride flavo, fibrillis saturatoribus seu luride fulvis, exsiccando roseo-incarnato vel subaureo, 4-6 cm. lato; lamellis confertis, ventricosis, postice emarginato-adnexis, ex albo olivaceis, demum tinctura aurea hinc inde imbutis, acie albo-fimbriata; stipite solido, subæquali vel basi bulbilloso, fere glabro, apice albo-pruinato, ex albo flavescente, dein exsiccando incarnato-aureo, 4-6 cm. longo, 1-1 $\frac{1}{4}$ cm. crasso; carne alba, fracta non mutata, inodora, sapore demum subpiperato; sporis levibus, subreniformibus, 11-13 \times 6-7; basidiis clavatis, 38-40 \times 12; cystidiis nullis, cellulis aciei lamellarum cylindræis apice attenuato vel subcapitato, 75-90 \times 8-9.

Hab. in silva mixta « Margone » prope Trento, æstate. — Ab *Inocybe Trinii* var. *rubescens* Gillet differt præcipue defectu cystidiorum quæ in icone Gilletii evidentissime delineantur.

8. **Inocybe lilacino-lamellata** (Britz) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, 626
p. 974. — *Agaricus lilacino-lamellatus* Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 2, tab. 277, fig. 370. — Pileo flavo-brunneo v. e flavido rubro-brunneo, fibroso, campanulato, dein expanso, plerumque acute umbonato, 6 cm. lato; stipite concolori, 6 cm. alto, 5 mm. cr., infra anguloso-incrassato; lamellis 7 mm. latis, confertis, vix adnatis, primum pallidis dein flavo-brunneo-lilacinis, carne pilei flavo-brunnea, stipitis albida, odore nullo; sporis flavis, in massa griseo-brunneis, 10 \times 6-8, obtuse angulatis.

Hab. in turfosis Bavarie. — *In. castaneo-lamellatæ* et *In. albidolamellatæ* affinis.

9. **Inocybe flavido-lilacina** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 53. — Britz 627
zelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) pag. 15. — Pileo 8 cm. lato, convexo, centro varie umbonato v. depresso, ex albido-flavido carneo, minute fibrilloso; stipite 7 cm. long., 10 mm. cr., basi vix incrassato, farcto, pileo concolori; lamellis subconfertis, albo-rubidis, carnis, brunneo-lilacinis, 8 mm. latis, e rotundato adnexis

adnatis; carne sordide albida, basi in stipite brunneola; massa sporarum brunnea; sporis elongatis, 10-11 \approx 4-5.

Hab. in silvis Coniferarum prope Augsburg Bavariæ. — *Inoc. sindoniæ* affinis.

10. **Inocybe inscripta** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 54. — Britzelm., 628
Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 15. — Pileo hemisphærico vel late campanulato, albo v. albido, pallide ochraceo-flavo, fibrilloso, centro sæpe fibrilloso-squamoso, 6 cm. lato; stipite 8 cm. longo v. usque ad 10 cm., 1 cm. cr., quandoque incurvato, albo, sordide albo, centro etiam farcto; lamellis liberis, ex albido pallide flavo-griseis, 10 mm. latis, confertis; carne alba, non v. vix rubescenti, odore levi fructuum; massa sporarum flavo-brunnea; sporis elongatis uno apice indistincte acutatis, 10-11 \approx 6.

Hab. gregaria in silvis Salisburgiæ, Algovia, Bavariæ.

11. **Inocybe duriuscula** Rea in A. L. Smith, Trans. Brit. Mycol. Soc. 629
1907, v. III (1908), p. 44, tab. III. — Pileo 6-7 cm. lato, carnososo, e campanulato expanso-gibboso, floccoso, mox longitudinaliter fibrilloso, fulvo-ochraceo, centro expallente, margine demum revoluta; carne crassa, alba, immutabili, duriuscula; stipite 8 cm. longo, 1,5 cm. cr., solido, apice et basi incrassato, albo, striato, firmo; lamellis 6-8 mm. latis, subconfertis, ex albo fuscescentibus, sinuato-adnatis, dente decurrentibus; sporis umbrinis distincte nodulosis 9-10 \approx 7-8; cystidiis ventricosis, 52-60 \approx 13-15, copiosis.

Hab. ad terram in herbidis silvarum, Monk Wood Worcester-shire Britannia.

12. **Inocybe intricata** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. 131 (1909) p. 36. 630
— Pileo tenui, conico v. convexo, deinde expanso, 8-10 mm. lat., umbonato, fibrilloso, radiatim rimoso, pallido-brunneo, fulvo-brunneo, nitido, umbone plerumque nigro-brunneo, carne alba; lamellis confertis, adnatis v. sinuato-adnatis, albis v. albidis, deinde fulvis; stipite fragili, flexuoso, 3-5 cm. long., 1-2 mm. cr., pruinoso, farcto v. fistuloso, interdum leviter bulboso, sursum albido, deorsum brunnescente; sporis sparsim nodulosis, 10-12 \approx 6-8; cystidiis 55-80 \approx 20-30.

Hab. ad terram humidam inter ramos dejectos, Stow Mass. Amer. bor. (S. DAVIS).

13. **Inocybe serotina** Peck, Rep. St. Bot. 1903 (1904) p. 17. — Pi- 631
leo carnososo, firmo, e campanulato fere plano, 2,5-6,5 cm. lat., margine fibrilloso, albo, quandoque albo-flavo vel brunneo-flavo, carne alba; lamellis confertis, dein rotundatis, subliberis, in speci-

minibus late expansis subventricosis, initio albidis dein brunneo-cinnamomeis; stipite subæquali, basi bulboso v. angustato, longo v. brevi, solido, fibroso, albo, 2,5-5 cm. long., 6-12 mm. cr.; sporis oblongis, æqualibus, 12,5-15 \approx 6-7,5.

Hab. in sabulosis Sodus bay et Lake Ontario, Amer. bor. (E. B. BURBANK). — *Inoc. sambucinæ* proxima.

14. **Inocybe farcta** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 53. — Britzelmayr, 632
Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 16. — Pileo opaco, laccato, albo, omnino etiam ad marginem non fimbriato, 5 cm. lato, hemisphærico, sæpe centro late depresso; stipite albido, carneo, 10 cm. long. supra 6 mm. basi irregulariter nunc incrassato nunc attenuato et radiciformi elongato; lamellis confertis, decurrentibus, pallide carneis; carne alba; massa sporarum sordide pallide ochracea; sporis 4 μ . diam., globosis.

Hab. in silvis Bavarix. — *Inoc. Tricholomati* affinis.

15. **Inocybe nitidiuscula** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 53. — Britzelmayr, 633
Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 14. — Pileo subnitido, convexo, centro umbonato v. plano-depresso, 4,5 cm. lato, rubro-brunneo fibroso; stipite 6 cm. long. supra 5 mm. cr., basi incrassato, farcto, albido, supra rubido, basi sordide rubido; lamellis emarginatis, adnatis, 4 mm. latis, albis, dein griseis v. brunneo-griseis, confertis v. subconfertis; carne albo-rubida, odore terreo; massa sporarum flavida v. flavido-brunneola; sporis 8-10 \approx 5-6, oblongis.

Hab. in silvis Friburgiæ et prope Augsburg in Bavaria. — *Inoc. delectæ* affinis.

16. **Inocybe mutatoria** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 54. — Britzelmayr, 634
Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 11. — Pileo 4,5 cm. lato, convexo, centro umbonato v. non, depresso, fibroso-squamoso, flavo ochraceo; stipite 5 cm. longo, 5 mm. cr., flavo-ochraceo, basi angustato quandoque incrassato, farcto; lamellis 5 mm. latis, rotundatis, adnatis, confertis, cinnamomeis; carne albo-flavida, odore peculiari nullo; massa sporarum flava; sporis 10 \approx 4-5, elongatis.

Hab. in sabulosis Bavarix. — *Inoc. muticæ* affinis.

17. **Inocybe erubescens** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selk. Skr. 635
(1904) n. 6, p. 54. — Pileo convexo, sine umbone, albo, tactu erubescenti, mox rimoso-fibrilloso, 5 cm. lato; lamellis albidis, denticulatis, horizontaliter adnatis et lineatim decurrentibus; stipite albo, farcto, erubescenti, deorsum albo-tomentoso, sursum rufofarinoso, 5-6 cm. longo; sporis ferrugineis, levibus.

Hab. in silvis, Aiker Norvegiæ.

18. **Inocybe umbrinella** Bres. Ann. Mycol. III (1905) p. 161. — Pi- 636
 leo carnosulo, e campanulato expanso-umbonato vel rarius papillato aut gibboso, sericeo, demum fibrilloso-rimoso, umbrino vel luride griseo, centro umbrino-cinnamomeo, lubrico, mox sicco 2 1/2-4 1/2 cm. lato; lamellis confertis ex albo umbrino-argillaceis, acie albo-fimbriata, postice sinuato-adnatis; stipite solido, albo, basi fusciscente, fibrilloso-pruinato, apice furfuraceo-subflocculoso, glabrescente, subbulboso, 3-5 cm. longo, 4-6 mm. crasso; velo albo, cortiniformi, mox evanido; carne alba inodora, sapore subdulci; sporis reniformibus, levibus, 10-14 \times 5 1/2-6 1/2; basidiis clavato-capitatis, 35-40 \times 10-11; cystidiis nullis; cellulis aciei lamellarum clavatis vel clavato-subfusoides, 40-65 \times 10-16.

Hab. locis glareosis sub *Populo nigra* « Desert » pr. Trento per annum. — E grege *Inocybes fastigiatae* Schæff., sed semper constans ut separari mereatur.

19. **Inocybe squamosodisca** Peck, Rep. State Bot. 1903 (1904) p. 18, 637
 t. O, f. 10-13. — Pileo carnosulo, firmo, convexo, 2,5-5 cm. lato, sicco, margine fibrilloso, centro rimoso squamoso, ochraceo-ferrugineo; carne albida v. flavido-alba; lamellis latiusculis modice confertis, adnatis, pallide ochraceis, dein ætate obscurioribus; stipite brevi, 2,5 cm. c. longo, 4-6 mm. cr., firmo, æquali, solido, fibrilloso, pileo concolori; sporis ellipsoideis, æqualibus, 7,5-10 \times 5-6.

Hab. gregaria in pinetis ad litora Sacandaga Lake Amer. bor.

20. **Inocybe fallax** Peck, Rep. State Bot. 1903 (1904) p. 17, t. O, 638
 f. 20-24. — Pileo tenui, campanulato v. convexo, umbonato, obscure fibrilloso, quandoque minute et obscure squamuloso, albido vel albo-rubiginoso, sublucenti, margine decurvato vel incurvato, sæpe laciniato 2,5-5 cm. lat.; lamellis tenuibus, confertis, rotundatis, leniter adnatis, initio pallidis, dein brunneo-ruginosis; stipite longo, æquali, cavo, flexuoso, minute pruinoso-farinaceo, albido, 5-7,5 cm. long., 4-8 mm. cr.; sporis polygoniis, leniter nodulosis, 7,5-10 \times 6-7,5; cystidiis oblongo-ellipsoideis, 40-50 \times 15-17.

Hab. inter folia dejecta, Lake Pleasant Amer. bor. — *Inoc. geophyllæ* similis.

21. **Inocybe desquamans** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 639
 p. 216. — Pileo convexo, umbonato, subglabro, e flavido-brunneo ætate v. arescendo brunneo-rubro, umbone sæpe obscuriore, cuticula disrumpente, squamulas efformante et evanida umbone excepto; carne tenui alba; lamellis e pallido ferrugineo-brunneis; sti-

pite firmo, solido, fibroso, striato, subbulboso, supra albido et farinaceo, infra rubro v. brunneo et leniter fibrilloso, dein ætate toto brunneo; sporis irregularibus, nodulosis, 8-10 \approx 5-6.

Hab. in silvis prope St. Louis Missouri Amer. bor. (N. M. GLATFELTER). — Pileus 2,5-4 cm. latus; stipes 5-7,5 cm. longus, 2-4 mm. cr.

22. **Inocybe Bakeri** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXVI (1909) p. 332. 640

Pileo carnosio, late convexo, demum subplano, sicco, dense fibrilloso, cremeo v. subalutaceo, carne alba; lamellis confertis, adnexis, subventricosis, pallido-brunneis, deinde ferrugineo-brunneis; stipite subæquali, solido, gracili, glabro, ad apicem albo-farinoso, demum striato, subradicante, albo; sporis ferrugineo-brunneis, 12-14 \approx 6-7; cystidiis 40-50 μ . longis.

Hab. ad terram in quercetis, Claremont California, Amer. bor. (C. F. BAKER). — Pileus 2,5-5,5 cm. latus; stipes 5-8 cm. longus, 5-6 mm. crassus. — *Inoc. sambucinæ* proxima.

23. **Inocybe subæmula** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 53. — Britzel- 641

mayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 14. — Pileo campanulato dein expanso, tenui-carnoso, fibroso, pallide flavo, sordide ochraceo, centro flavo-brunneo, 4 cm. lato; stipite supra pallide flavo, basi obscuriore, 4 cm. long., 3 mm. cr., primum farcto dein cavo; lamellis 5 mm. latis, confertis, flavo-rubidis, flavo-brunneolis, rotundatis, liberis; massa sporarum flavo-brunnea; sporis oblongis, 10 \approx 6.

Hab. in herbis rupestribus Algoviæ. — *Inoc. æmulæ* affinis.

24. **Inocybe rubro-læsa** (Secr.) Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. 642

suppl. p. 13, *Agaricus rubro-læsus* Secr. Mycogr. Suisse I (1833) p. 327. — Pileo carnosulo, convexo-plano, umbonato, dein subinfundibuliformi, sæpe margine fisso, vertice rufo, ceterum albo; lamellis liberis, subventricosis, saturate violaceis; stipite longo, gracili, levi, pileo concolore, basi paullulum inflato.

Hab. in pratis in Gallia boreali et Helvetia.

25. **Inocybe favorabilis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 53. — Britzel- 643

mayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 12. — Pileo 3,5 cm. lato, campanulato, dein expanso, margine incurvato, tenui carnosio, sordide flavo, rubro-flavo, fibroso-squamoso, asperato; stipite fibroso, supra canaliculato, sordide-flavo, flavo-melleo vel brunneo-rubro, 4,5 cm. long., 3 mm. cr. farcto; lamellis 5 mm. latis, pallide griseo-violaceis, rotundatis v. sinuatis, ex adnexo parum adnatis; carne albida, violascente subsericea, odore et sapore nullo; massa sporarum brunnea; sporis oblongis, 10 \approx 5 6.

Hab. in silvis prope Nervenheil Baviariæ. — *Inoc. absistenti* affinis.

26. **Inocybe albido-incarnata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 53. — 644
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 16. — Pileo albido, pallide albo-rubro-flavo, 3 cm. lato, fere levi; stipite 6 cm. long., 5 mm. cr. basi quandoque subattenuato, albido-carneo, farcto; lamellis confertis; stipite concoloribus, 5 mm. latis, decurrentibus; massa sporarum pallide flavo-rubra; sporis globosis, apiculatis, 3-4 μ . diam.

Hab. in turfosis Baviariæ. — *Inoc. Tricholomati* affinis.

27. **Inocybe pseudo-scabella** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 53. — 645
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 15. — Pileo campanulato dein expanso, fibroso, flavo-rubro-brunneo centro obscuriore, 2,5 cm. lato; stipite 4 cm. longo, 3 mm. cr., farcto, demum subcavo, pallide rubido v. flavo-rubido; lamellis subconfertis albo flavo-rubro-brunneis, 4 mm. latis, ex adnexis adnatis; massa sporarum flavo-brunnea; sporis 8-11 \approx 4-6, oblongis.

Hab. gregaria in silvis prope Augsburg Baviariæ. — *Inoc. scabellæ* affinis.

28. **Inocybe heterogenea** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 54. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 11. — 646
 Pileo brunneo-flavido, squamoso, hemisphærico, convexo, 3-5 cm. lato; stipite 2,5 cm. longo, supra 10 mm. basi 5 mm. cr., albo, minute fibroso, fere levi, farcto; lamellis emarginatis, adnexis, confertis, griseo-brunneolis 5 mm. latis; carne alba; sporis elongatis 10 \approx 4-5.

Hab. in silvis Teisenberg Salisburgiæ. — *Inoc. muticæ* et *Inoc. Merletii* affinis

29. **Inocybe decipientoides** Peck, Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) p. 100. — 647
 Pileo mox tenui, subconico dein subplano, umbonato, fibrilloso, centro squamuloso, griseo v. griseo-brunneo, umbone brunneo, carne alba; lamellis adnexis, ventricosis, subdistantibus, ex albo brunneo-ferrugineis, margine albis; stipite fragili, æquali v. subæquali, cavo, lucenti, fibrilloso, apice striato et albido, basi brunneo; sporis subellipsoideis, obscure angulosis v. parum irregularibus, 10 \approx 6.

Hab. ad terram in herbidis, Boston Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS). — Pileus 2-3 cm. latus; stipes 2,5 cm. circ. longus, 2-3 mm. cr. — *Inoc. decipienti* Bres. proxima.

30. **Inocybe similis** Bres. Ann. mycol. III (1905) p. 161. — 648
 carnosulo, e campanulato vel conico-campanulato expanso-umbo-

nato, dense squamoso, squamis sæpe hirtis, centro interdum areolato et margine fibrilloso, argillaceo vel argillaceo-umbrino aut ochroleuco-umbrino, 2 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ cm. lato; lamellis confertis, ex albo griseo-umbrinis, interdum tinctura flavida imbutis, postice rotundato-adnexus, fere liberis; acie primitus albo-fimbriata; stipite æquali, solido, basi subincrassato vel submarginato-bulbilloso albido-fuscescente, subsericeo-striato, apice albo-furfuraceo, 3-5 cm. longo, 4-6 mm. crasso; carne alba inodora, sapore miti; sporis ochraceis, subreniformibus, 10-15 \times 6 $\frac{1}{2}$ -8 $\frac{1}{2}$; basidiis clavatis, junioribus fere capitatis, 35-40 \times 10; cystidiis subfusoides, apice muricellatis, 56-72 \times 15-17.

Hab. locis glareosis sub *Populo nigra*, « Desert » prope Trento, per annum. — Ab *Inocybe scabra* Müll., cui valde similis, differt præsentia cystidiorum, colore obscuriori et sporis crassioribus.

31. ***Inocybe vatricosoides*** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 139 (1910) 649 p. 67. — Pileo tenui, convexo, deinde subplano, 2-3 cm. lato, dum humido subviscido, obtuso v. subumbonato, margine velo abundante albido arachnoideo fibrilloso, albido, sæpe centro rufescenti, carne albida, odore Raphani; lamellis confertis, late sinuatis, adnatis, albidis, deinde fusco-ferrugineis, acie alba crenulata; stipite æquali, flexuoso, sæpe basi curvato, 2,5-5 cm. long., 2-6 mm. cr., farcto v. fistuloso, sericeo-fibrilloso, aliquando deorsum squamulis albis floccosis ornato, albido v. griseo; sporis ellipsoideis, levibus, 10-12 \times 6-8.

Hab. in herbidis humentibus, Ulster co. Amer. bor. — *Inoc. vatricosæ* proxima.

32. ***Inocybe bulbosa*** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXVI (1909) 650 p. 333. — Pileo carnosio, subplano, subumbonato, sicco, fibrilloso, leviter rimoso, alutaceo v. ochraceo; lamellis tenuibus, confertis, late sinuatis, luteolis, demum brunneo-ochraceis; stipite recto, solido, glabro, basi bulboso, pallido; sporis levibus, oblongis, 10-18 \times 6-7; cystidiis subcylindraceis, 60-80 \times 15-20.

Hab. solitaria ad terram in quercetis, Claremont California Amer. bor. (C. F. BAKER). — Pileus 3-4,5 cm. latus; stipes 5-7 cm. longus, 7-9 mm. crassus, bulbosus 15-17 mm. lato. — *Inocybe rimosæ* (Bull.) Fr. proxima.

33. ***Inocybe excoriata*** Peck, Rep. State Bot. 1903 (1904) p. 16, t. O, 651 f. 14-19. — Pileo carnosio, late conoideo, mox late convexo, 2,5-5 cm. diam., umbonato, fibrilloso v. fibrilloso-squamuloso, margine

parce sericeo v. tomentososo, griseo-brunneo v. pallide brunneis, cuticula sæpe rimosa at in areolas separabili, sed persistente in disco e quandoque ad marginem, carne alba; lamellis angustis, confertis, emarginatis, adnexis, dente decurrentibus, margine crenulatis, ex albo brunneo-griseis; stipite æquali, solido, sericeo-fibrilloso, extus et intus albo v. albido, 2,5-5 cm. long., 4-6 mm. cr.; sporis brunneo-flavidis, ellipsoideis, æqualibus, 7,5-10 \approx 5-7; cystidiis ampulliformibus, 50-60 μ . long.

Hab. ad terram inter folia dejecta, Lake Pleasant, Amer. bor.

34. **Inocybe albido-ochracea** (Britz) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, 652 p. 966. — *Agaricus albido-ochraceus* Britzelmayr, Revis. Hymen. III (1899) p. 4, tab. 250, fig. 258. — Pileo et stipite albido flavo-ochraceo; pileo adpresso fibrilloso; convexo, non v. parum umbonato, subnitido, 3,5 cm. lato; stipite 4,5 cm. alto, supra 4 mm. infra 6 mm. cr., subcavo; carne albida, flavo-brunneola; lamellis subliferis v. adnexo-emarginatis, 5 mm. latis, remotis, albidis dein flavo-brunneis; sporis griseo-brunneis, 8-9 \approx 5, flavo-brunneis, angulis paucis et obtusis præditis.

Hab. in turfosis Bavariæ. — *Inoc. trechisporæ* affinis.

35. **Inocybe cavipes** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 968. — 653 *Agaricus cavipes* Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 2, tab. 245, fig. 204 et fig. 205 (f. *minor*). — Pileo convexo, sæpe umbonato, quandoque centro impresso, rubro-brunneo, patenter squamoso, 3 cm. lato; stipite 3,5 cm. alto, 7 mm. cr., cavo vel subcavo, supra carneo infra rubro-brunneo; lamellis subconfertis, fere liberis, carneis; sporis brunneo-flavis, 10 \approx 6, obtuse angulatis.

Hab. ad ligna in silvis Salisburgiæ.

36. **Inocybe rhombispora** Masee, Rev. Mycol. (1905) p. 148. — Pi- 654 leo campanulato, umbone acutiusculo prædito, fibrilloso, brunneo, margine pallidiore, centro squamuloso, 2-3 cm. lat.; lamellis adnexis, subconfertis, flavido-brunneis; stipite fibrilloso, brunneo, infra zonam annularem imperfectam albo-sericeo-fibrilloso, 3-4 cm. long.; sporis rhomboideis, sæpe distincte apiculatis, lateraliter compressis, 6 \approx 5; basidiis 20 \approx 9-10; sterigmatibus papilliformibus.

Hab. ad ligna putrida, Nighiris Indiæ. — Forma sporarum præcipue distinguitur.

37. **Inocybe pluteoides** v. Höhn., Fragm. z. Mykol, Sitzb. k. Ak. d. 655 Wiss. Wien Bd. CXV, Abt. I (1907) p. 96. — Tota alba, præter lamellas læte roseas; pileo e conico expanso, leviter umbonato, 3 cm. lato, radiatim rimoso, sericeo-fibrilloso; stipite farcto, cylin-

draceo, deorsum subclavato, albo, sericeo-fibrilloso, 2-3 cm. longo, 5-6 mm. cr.; carne alba, inodora; cystidiis versiformibus, nunc ovoideo-conicis ad 25 μ . cr., nunc cylindrico-conicis, angustis, 60 μ . long., apice coronula oxalati calcici munitis; sporis amygdaloidis, inæquilateris, flavidis, vertice rotundatis, oblique apiculatis, 10 \times 5,5.

Hab. ad terram silvaticam pr. Pressbaum, Wienerwalde Austriae. — Inter gen. *Pluteum* et *Inocybem* fere media.

38. **Inocybe subignobilis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 53. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) pag. 15. — Pileo 1 cm. lato, campanulato, subopaco, flavo-brunneo v. e brunneo obscure brunneo, fibroso, in sicco griseo-fibroso; stipite 2,5 cm. long., 2 mm. cr., farcto, albido v. rubro-brunneo; lamellis confertis, griseo-flavis v. griseo-flavo-brunneis, 3 mm. latis, e libero adnaxis; carne rubido-alba; massa sporarum flavo-brunnea; sporis 12-14 \times 6-8, oblongis, uno apice acutatis.

Hab. sæpe gregaria in silvis Algovia. — *Inoc. ignobili* affinis. 657

39. **Inocybe observabilis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 54. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 11. — Pileo rubro-brunneo, convexo, 10 mm. lato, fibroso, depresso et squamuloso; stipite supra pallido basi obscuriore rubro-brunneo, fibroso-squamuloso, 3 cm. long., 2 mm. lato; lamellis confertis, flavo-rubro-brunneis, 3 mm. latis; carne stipitis supra brunneolo-alba, basi obscuriore nigro-rubro-brunnea; massa sporarum flavo-rubida; sporis 10 \times 4, elongatis.

Hab. ad terram turfosam Bavariae. — *Inoc. alienellæ* affinis.

40. **Inocybe ignobilis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 54. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 14. — Pileo e flavo-rubro rubro-brunneo, centro obscuriore, levi, vix fibroso, 1 cm. lato, campanulato dein expanso centro umbonato; stipite 2,5 cm. long., 1 mm. cr., albido, basi sordide flavo-rubro, farcto; lamellis 2 mm. latis, emarginatis, adnatis, ochraceis, rubido-flavis, subconfertis; carne rudi et fragili, odore terreo; massa sporarum brunnea; sporis 8 \times 4, elongatis.

Hab. in turfosis Bavariae. — *Inoc. nitidiusculæ* affinis.

41. **Inocybe Bucknalli** Masee, Ann. of Bot. (1904) pag. 473 Rev. mycol. 1905, p. 100; Trans. Brit. Mycol. Soc. II (1905) p. 96. — Pileo campanulato-convexo, fibrilloso, disco minute squamuloso, brunneolo, 1-2 cm. lato; lamellis adnaxis, crassis, subdistantibus, brunneo-ferrugineis, acie minute fimbriata; stipite æquali v. basi

leniter incrassato, angusto, fibrilloso, brunneolo, 2-4 cm. long.; sporis irregulariter oblongis, apice oblique apiculatis, grosse nodulosis, 15-17 \times 8-9; cystidiis nullis; basidiis clavatis latissimis, 70-80 \times 16-18, tetrasporis.

Hab. ad terram Leigh Down Bristol, Britannia (CEDR. BUCKNALL).

42. **Inocybe minuta** Karst, Acta Soc. pro Faun et Fl. Fenn. XXVII, 660
4 (1906) p. 3. — Pileo membranaceo, e convexo plano, sicco, glabro, levigato, haud rimoso, furruginascente pallido, circiter 5 mm. lato; stipite æquali, basi incrassato, subglabro, pallescenti, circ. 3 cm. longo et 3 mm. cr.; lamellis adnatis, subconfertis, ferruginascentibus; sporis subsphæroideis, levibus, hyalinis vel flavescenti-hyalinis (sub lente), 5 \times 4.

Hab. ad terram prope oppidum Ufa Rossia (O. LÖNNBOHM).

43. **Inocybe castanea** Peck, Rep. State Bot. 1903 (1904) p. 16, t. O, 661
fig. 1-8. — Pileo conico v. convexo, umbonato, rimoso fibrilloso, margine incurvato, atro castaneo-brunneo, 10-16 mm. lato; lamellis tenuibus, angustis, confertis, adnatis, initio albidis v. pallidis, maturis ferrugineo-brunneis; stipite æquali, cavo, glabro, apice leniter pruinoso v. farinoso, pileo pallidiori, 20-36 mm. longo, 2 mm. c. cr., basi quandoque tomento mycelioideo albicante; sporis polygoniis, 6-7,5 μ . cr.; cystidiis subfusiformibus, 40-50 μ . long.

Hab. ad terram muscosam in silvis abietinis, Lake Pleasant Americae bor. — *Inoc. umboninotæ* affinis.

44. **Inocybe muricellata** Bres. Ann. mycol. III (1905) pag. 160. — 662
Pileo carnosulo, e conico-campanulato expanso-umbonato, flavo-ochraceo, squamis squarrosis, concoloribus, eleganter obducto, 1-2 $\frac{1}{2}$ cm. lato; lamellis confertis, e flavo argillaceis, acie alba, subtiliter dentata, postice rotundato-adnatis, ventricosis; stipite farcto, basi marginato-bulbillosulo, stramineo, fibrilloso-villosulo, apice albo-furfuraceo, 1 $\frac{1}{2}$ -4 cm. longo, 2-4 mm. crasso; carne albo-straminea, inodora, sapore subpiperato; sporis ochraceis, subamygdaliformibus vel obverse subpiriformibus, levibus, 10-12 \times 5-6; basidiis clavatis, 32-40 \times 10-12; cystidiis ampulliformibus, apice muricellatis, 60-80 \times 14-16; cellulis aciei lamellarum clavatis, 30-40 \times 14-16.

Hab. locis glareosis sub Populo nigra « Desert » pr. Trento, vere. — E grege *Inocybes caesariatæ* et *Inoc. dulcamaræ*, quibus valde similis; distinguitur præsentia cystidiorum, sporis subpiriformibus et pileo evidentius squamoso.

45. **Inocybe hettematica** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 972, 663

Agaricus hettematicus Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1898) p. 11, tab. 240, fig. 177, *Naucoria hettematica* Britz. — Syll. XI, p. 59. — Pileo 1 cm. lato, convexo, vix umbonato, albido, squamulis fibrosis, flavis v. brunneo-rubidis patentibus, remotis prædito; stipite 3 cm. alt., 1 mm. cr., carneo, rubro-albido, farcto; lamellis confertis, griseo-rubidis, adnatis; sporis subellipsoideis, 8-10 \approx 4-6.

Hab. in silvis prope Teisendorf. — *Inoc. carptæ* affinis.

46. **Inocybe Sterlingii** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 664 p. 217. — Pileo carnosio, e convexo subplano, glabro et udo centro viscido, obscure fibrilloso in margine incurvo subappendiculato, centro brunneo, griseis v. undique argillaceo-coloratis, sapore farinaceo; lamellis tenuibus, confertis, adnexis, e pallido cinnamomeis; stipite æquali v. basi leniter incrassato, solido, floccoso-fibrilloso-albo, intus fulvo-rubro; sporis æqualibus, ellipsoideis, plerumque uninucleatis, 10-12 μ . long., 6-8 μ . latis.

Hab. ad terram sub Pinis, Trenton New Jersey Americæ bor. (E. B. STERLING). — Pileus 1,5-2,5 cm. latus; stipes 2,5-3,5 cm. longus, 2-4 mm. cr.

47. **Inocybe insuavis** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 973. — 665
Agaricus insuavis Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1999) p. 4, tab. 240, fig. 186. — Pileo adpresse fibroso, rubro-brunneo, non hygrophano, campanulato, 25 mm. lato; stipite 5 cm. alto, 5 mm. cr., farcto, supra albo v. albido, sæpe circulariter signato, infra rubro-brunneo, fibroso; lamellis albis v. albidis, suconfertis, 6 mm. latis, odore nullo; sporis flavo-brunneis, 8-10 \approx 4-6, irregularibus, subangulosis.

Hab. in silvis Baviaræ. — *Inocybe scabellæ*, sensu Cooke affinis.

48. **Inocybe debilipes** Karst., Icones Hymen. III, p. 3, tab. I, fig. 62. 666
— Pileo carnosio, tenui, e conico-convexo explanato, obtuse umbonato, fusco-pallido, ferruginascente, undique squamoso-lacerato, demum squamoso-deglubente et subrimoso, 1,5-2,5 cm. lat.; stipite solido æquali, flexuoso, pallescente, vulgo demum squamulis minutis, flocculosis vel fibrillis fuscescentibus, adpressis maculatis, apice subflocculoso, 4-5 cm. long., 1-2 mm. cr.; lamellis adnexis, confertis, subventricosis, ferrugineo-pallidis, acie fusco-crenulatis; basidiis clavatis, 20-35 \approx 6-9; sporis ovoideis, sæpe inæquilateris seu obliquis 1-guttatis, dilute flavidis, 7-9 \approx 5-6; cystidiis fusoides, 75-95 \approx 12-17.

Hab. in declivibus graminosis in silva frondosa pr. Mustiala Fennicæ. — Valde affinis *Inoc. scabellæ*.

49. **Inocybe Godeyi** Gillet — Syll. V, pag. 778. — var. **rufescens** 667
Cooke, Trans. Brit. Mycol. Soc. 1908, vol. III (1909) p. 110. —
— Primum pure alba, dein ad marginem pilei et in stipite rubido-
maculata.

Hab. ad terram, Edmond Castle prope Carlisle Britannia (Miss DECIMA GRAHAM).

50. **Inocybe geophylla** (Sow.) Quél. — Syll. V, p. 784. — var. **reflexa** 668
(Gillet) Boud., Icon. Myc. I, *Inocybe reflexa* Gillet, Champ. Fr.
Hyménomyc. tab. suppl. Liste, pag. 13. — Pileo convexo, pallide
flavo, papillato, centro saturatiore, regulariter fibrilloso; lamellis
flavo-ochraceis; stipite farcto, levi, sursum flavido; carne leviter
rufescente.

Hab. ad terram in Gallia boreali.

51. **Inocybe trivialis** Karst., Icones Hymenomyc. II, tab. V, fig. 2. 669
— Ut species habenda et ita vocanda *Inocybe deglubens* Fr. var.
trivialis Karst. Symb. ad Mycol. Fenn. IX (1882) p. 43 et Syll.
V, p. 770.

52. **Inocybe aureo-lamellata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 53. — Brit- 670
zelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 5 (*Clypeus*). — Pileo
25 mm. lato, convexo, parum et depresso convexo, fibroso, flavo-
aurato, flavo-brunneo, centro obscuriore; stipite albo, 35 mm. long.
supra 2 mm., basi 3 mm. cr., cubcavo; lamellis latis, subconfertis,
flavis, flavo-auratis, sordide auratis; sporis flavis v. flavo-auratis
obtusè angulatis, 10 × 8.

Hab. in silvis Algovicæ prope Hinterstein. — *Clitoc. auricomæ*
et *scabellæ* affinis.

53. **Inocybe tenui-marginata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 54. — 671
Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 4 (*Clypeus*). —
Pileo campanulato expanso, 35 mm. lato, flavo-rubro-brunneo, fla-
vo-brunneo, margine tenui, pellucido; stipite 7-5 mm. longo, 4
mm. cr., basi usque ad 8 mm. cr., sed ima basi sæpe tenuiore,
albido et parum rubro-fibrilloso; lamellis 5 mm. latis, conferto-
adnatis v. sinuato-adnatis, albis, melleis, flavo-brunneis cinereo-
tinctis; carne alba; sporis quadri-sexangulatis, 10-14 × 6.

Hab. in silvis Algovicæ et prope Augsburg in Bavaria. — *Ino-
cybæ scabellæ*, sensu Cooke, affinis.

54. **Inocybe oblectabilis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 54. — Britzel- 672
mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 3 (*Clypeus*). — Pileo

8 cm. lato, campanulato, dein expanso et late umbonato, flavo-aurato, sordide ochraceo-flavo et centro obscuriore, minute fibrilloso, vix longitudinaliter lacerato; stipite 75 mm. longo, 10 mm. cr., basi rotundato incrassato, albo, supra et centro rubescente, fibroso; carne alba v. albida, in stipite dein albo-flavo-brunneola, sericea, odore particulari nullo v. leniter terroso; lamellis subconfertis, albido-griseo-flavis v. griseo-brunneis, 12 mm. latis, liberis v. leniter adnatis, subsinuatis; massa sporarum brunnea, griseo-brunnea; sporis flavis, rotundato-angulatis, $10 \approx 6$.

Hab. in silvaticis Baviaræ. — *Inoc. prætervisæ* affinis.

55. **Inocybe specialis** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX p. 978. — 673

Agaricus specialis Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 5, tab. 244, fig. 206, *Naucoria specialis* Britz. — Syll. XI, p. 51. — Pileo campanulato, mox expanso, depresso umbonato, flavido v. flavo-ochraceo, centro flavo-brunneo 15 mm. lato; stipite basi attenuato, plerumque flexuoso, opaco, flavo-rubro, 6 cm. alto, 2 mm. cr., cavo; lamellis confertis v. subconfertis, fere liberis, flavo-albis, ochraceis, 4 mm. latis; carne flavida v. flavido-rubra, odore subterreo; sporis flavidis, in massa flavo-ochraceis v. brunneo-flavis, $8 \approx 5-6$, obtuse angulatis.

Hab. in silvis Salisburgiæ.

56. **Inocybe invenusta** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 973. 674

Agaricus invenustus Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 2, tab. 244, fig. 203, *Naucoria invenusta* Britz. — Syll. XI, p. 60. — Pileo flavo, rubro-brunneo, crasso, lanato-fibrilloso, convexo, umbonato v. non, 12 mm. lato; stipite 1,8 cm. alto, 1 mm. cr., flavo-melleo, flavo-rubro, farcto; lamellis 4 mm. lat., fere liberis, crassiusculis, pallide flavo-rubris; sporis flavo-brunneis, $8-10 \approx 6$, obtuse angulosis.

Hab. in silvaticis Baviaræ. — *Inoc. Gaillardii* affinis.

57. **Inocybe pseudomixtilis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 54. — Britz. 675

Agaricus pseudomixtilis Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 3 (*Clypeus*). — Pileo fibroso, ochraceo-flavo, flavo-aurato, centro flavo-brunneo; pileo 4 cm. lato, campanulato dein expanso et centro umbonato; stipite 5 cm. longo, 6 mm. cr., basi tuberiformi incrassato, albo, vix flavescenti; carne alba, odore et sapore nullo; lamellis confertis, albidis, griseolis, pallide griseo-brunneis, 6 mm. latis, subliberis, subsinuatis; massa sporarum flavo-rubro-brunnea, griseo-flava v. rubro-brunnea; sporis flavis, flavo-auratis, obtuse multi-angulatis, $10-12 \approx 7-8$.

- Hab.* in silvis prope Hindelang Algoviæ. — *Inoc. mixtili* affinis.
58. **Inocybe albido-lamellata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 53. — 676
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 2 (*Clypeus*). —
 Pileo fibroso, colore corii v. pallide brunneo, campanulato dein
 expanso umbonato, 60 mm. lato; stipite 10 cm. longo, 8 mm. cr.,
 farcto v. subcavo, supra albido, basi brunneolo, fibroso; lamellis
 confertis v. subconfertis, adnatis, subsinuatis, albis v. albidis, vix
 griseo-brunneolis, 7 mm. latis; massa sporarum pallide rubro-
 brunnea; sporis flavidis, subangulatis, $9 \approx 6$.
- Hab.* in turfosis Bavariæ. — *Inoc. castaneo-lamellatæ* affinis.
59. **Inocybe castaneo-lamellata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 53. — 677
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 2 (*Clypeus*). —
 Pileo crasse sed adpresse fibroso, vix squamoso, flavo-brunneo, sor-
 dide flavo-brunneo, convexo, campanulato, demum expanso umbo-
 nato v. non, 6 cm. lato; stipite 9 cm. longo, 8 mm. cr., attenuato
 v. incrassato, farcto v. subcavo, fibroso, brunneo, supra pallide
 brunneo; lamellis subconfertis, adnatis, subsinuatis, obscure rubro-
 brunneis in exemplaribus junioribus, dein castaneo-brunneis, 10
 mm. latis; carne albida, dein sordide brunneola, odore peculiari
 nullo; massa sporarum flavo-brunnea; sporis 7,5-9 \approx 5-6.
- Hab.* in turfosis Bavariæ. — *Cl. asterosporæ* affinis.
60. **Inocybe duella** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 53. — Britzelmayr, 678
 Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 1 (*Clypeus*). — Pileo 25 mm.
 lato, squamoso, pallide rubro-brunneo, e convexo campanulato, de-
 mum expanso, umbonato vel non; stipite 5 cm. longo, supra 3
 mm. basi 6 mm. cr., cavo, supra albo, basi rubro-brunneo; lamellis
 confertis v. subconfertis, adnatis, subemarginatis, lilacinis, 4 mm.
 latis; carne lilacina, pallide violacea; massa sporarum flavo-brun-
 nea; sporis flavis, rotundato-angulatis, $8 \approx 6$.
- Hab.* in silvis Algoviæ. — *Inocybe alienellæ* et *subornatæ*
 affinis.
61. **Inocybe subornata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 54. — Britzel- 679
 mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 1 (*Clypeus*). — Pileo
 3 cm. lato, convexo v. campanulato, demum expanso, umbonato
 vel non, fibroso, sed margine sparse squamoso, e flavo rubro-
 brunneo; stipite 4 cm. longo, 3 mm. cr., basi flavo-brunneo, squa-
 moso, supra e pallido albido, farcto v. cavo; lamellis confertis, ex
 adnexo adnatis, albidis, flavo-brunneis, 5 mm. latis; carne pallide
 albido-brunnea, supra in stipite subsericea; massa sporarum brun-
 nea; sporis rotundato-angulatis, flavis, $10 \approx 6$

Hab. ad truncos in silvaticis Salisburgiæ. — *Inoc. lanuginosæ* affinis.

HEBELOMA Fr. — Syll. V p. 791, IX p. 102, XI p. 54, XIV p. 134, XVI p. 91, XVII p. 66.

1. **Hebeloma odoratissimum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 55. — Britzelmayr, Revis. Hymen. III (1899) p. 5. — Pileo flavido dein e flavido-rubro-brunneo obscure rubro-brunneo, minute fibrilloso, demum superficie lacerato-squamuloso, 12 cm. lato, hemisphærico dein applanato, sæpe late umbonato; stipite 9 cm. long., 3-18 mm. cr., nunc æquali, nunc centro, nunc ima basi incrassato, farcto quandoque subcavo, albido, basi sordide flavo-rubro-brunneo v. rubro-brunneo, fibroso, ut pileo fragili; carne albida, alutacea, brunneola, basi rubro-brunnea, odore forti aromatico; lamellis 2,5 cm. latis, subremotis v. remotis, isabellinis, dein cinnamomeis, rubro-brunneis, æqualiter decurrentibus, irregulariter denticulatis v. incis, liberis, rotundatis v. parum adnatis dein sinuatis massa sporarum flavo-brunneola; sporis 15 \approx 7-8, flavo-auratis, sæpe guttulatis, ovoideis utrinque acutatis.

Hab. plerumque gregarium in silvis Bavariæ. — *Heb. testaceo* affine.

2. **Hebeloma exalbidum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 55. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 6. — Pileo 8 cm. lato, hemisphærico centro umbonato v. depresso, fibrilloso, albo, albido, centro flavido v. brunneolo; stipite supra albido basi brunneo-nigro 10 cm. long. 15 mm. cr., basi nunc attenuato, nunc incrassato, farcto v. irregulariter longitudinaliter excavato, albido-fulvo basi brunneo, odore nullo v. leniter raphani; lamellis 5 mm. latis, liberis, rotundatis, sinuato-adnatis, albidis, isabellinis, confertis; massa sporarum brunneo-flava; sporis pallide flavis, ovoideis, uno apice plerumque acutatis, 10-11 \approx 5-7.

Hab. in silvis Algoviæ et Bavariæ — *Heb. clavicipiti* affine. 682

3. **Hebeloma neurophyllum** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 370. Gregarium, 7-8 cm. altum; pileo 5-6 cm. lato; stipite 5-6 mm. cr.; pileo ochraceo-cremeo v. fulvo-ochraceo, leviter viscido; lamellis 8 mm. latis, pallide cinnamomeo-rufis, late sinuatis, adnatis, costatis; basidiis 4-sporis; sporis subfusoides, 12-15 \approx 7-8; stipite albo, fibroso-striato, cavo v. subfarcto.

Hab. ad terram in silvis Ithacæ N. Y. Amer. bor. (N. COIL). 683

4. **Hebeloma anthracophilum** Maire, Bull. Soc. Myc. Fr. XXIV (1908)

p. LVII, *Flammula carbonaria* Gillet, Champ. Fr. t. 364, non Fr. — Pileo campanulato v. hemisphærico expanso, plus minusve umbonato, glabro, viscido, fulvo, fibrillis innatis griseis, cinerescenti-pruinoso, disco fuscescente 4-5 rarius 7 cm. diam., margine primitus involuto, albo-tomentello, in adulto expanso, floccoso; stipite e farcto cavo, recto, cylindrico, albido fibrilloso-sericeo nec non squamulis concoloribus exasperato, 5-8 \times 0,5 rarius 1 cm.; cortina nulla; lamellis confertis, ex albido argillaceis, demum ferrugineo-fuscis, sinuato-adnatis v. uncinatis, ventricosis, acie albida vix denticulata; carne albida, non raphanioidora; sporis in charta ferrugineo-fuscis, pruniformibus, verruculosis, 10-11 \times 6; basidiis cylindræo-claviformibus, 4-rarius 2-sporis; cystidiis nullis.

Hab. ad terram deustam in Gallia (GILLET, MAIRE). — *Heb. crustuliniformi* proximum.

5. **Hebeloma angustifolium** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 55. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 6. — Pileo flavo-carneo v. isabellino margine pallidiore, hemisphærico, sæpe late umbonato, vix fibroso, 6 cm. lato; stipite 9 cm. long., 2,5 cm. cr., basi incrassato v. angustato, pileo concolori, basi brunneolo, farcto, raro subcavo; carne odore et sapore peculiari nullo, albida, basi in stipite brunnea; lamellis confertis, angustis, usque 2 mm. latis, e flavo-rubidis flavido-lilacinis et leniter purpuraceo coloratis; massa sporarum flavida v. carnea, flavo-rubro-brunnea; sporis uno apice v. utrinque breviter acutatis, v. elongatis, flavis, 8-10 \times 4-5.

Hab. gregarium in silvis Algoviaë et Bavariaë. — *Heb. crustuliniformi* affinis species.

6. **Hebeloma tumidulum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 55. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p 7. — Pileo subglutinoso, vix fibroso-squamoso, flavido, sordide alutaceo, expanso, campanulato, late umbonato, margine revoluto, 6 cm. lato; stipite 9 cm. long. supra 5 mm. cr., basi usque 12 mm. incrassato sed non subbulboso, tubuloso-cavo, parietibus 1-2 mm. cr., pileo concolori; lamellis subconfertis, rotundatis v. emarginato-adnatis, subfirmis, pallide griseis, alutaceis, rubro-brunneis, 10 mm. latis; carne flava v. flavo-rubro-brunnea; massa sporarum flavo-rubro-brunnea; sporis elongatis, flavis, apice non acutatis, 8-10 \times 4-5.

Hab. ad terram muscosam Bavariaë. — *Heb. longicaudo* affine. Inter gen. *Heb.* et *Flammula* videtur intermedium.

7. **Hebeloma lævatum** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 55. — Britzel-

mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 7. — Pileo opaco subsquamuloso, albido, flavido-ochraceo, convexo; margine varie incurvato, 6 cm. lato; stipite farcto, pileo concolori, 10 cm. long., 12 mm. cr., basi attenuato; lamellis 5 mm. latis, adnatis, albidis ochraceo-flavis; carne odore subgrato; massa sporarum sordide flava; sporis flavis elongatis, utrinque parum acutatis, 9-11 \times 5.

Hab. in silvis Baviariæ. — *Heb. diffracto* affine.

8. **Hebeloma præfinitum** (Britz) Sacc. — Syll. XI, p. 55. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 7. — Pileo albo, centro flavo, glutinoso, convexo, late umbonato, 6 cm. lato; stipite 8 cm. longo, 8 mm. lato, basi plerumque subincrassato, albo, intus spongioso, subfibroso; lamellis mollibus, confertis, sinuatis v. parum decurrentibus, albis, 8 mm. latis; carne albido-alutacea, basi in stipite obscuriore; odore et sapore speciali melleo; massa sporarum flavo-brunnea; sporis 6-8 \times 3-4, flavidis, elongatis.

Hab. in silvis Baviariæ.

9. **Hebeloma coprophilum** Rick, Broteria VI (1907) p. 79, tab. III, fig. 2. — Pileo expanso, carnosolento, glabro, fulvo-isabellino, firmo, sicco, 6 cm. diam., in sicco versus marginem rugosoplicato; stipite resistente, cartilagineo, angusto, striato, griseo-consperso, primum albo-farinoso, versus substratum albo-lanoso, 6 mm. cr.; lamellis adnatis, secedentibus, ventricosis, usque 6-8 mm. latis, didymis, confertis, acie albo-cremata, primo sordide cœruleis dein fulvis, in sicco flavescentibus, acie tandem atro-brunneis; sporis umbrinis, ovato-ellipsoideis, 13-15 \times 8-10, membrana solida.

Hab. in stercore vaccino, Rio Grande do Sul Baviariæ.

10. **Hebeloma sociale** Peck, Rep. State Bot. 1903, (1904) p. 15. — Pileo carnosolento sed tenui, convexo, dein plus minusve applanato, 16-30 mm. diam., glabro, udo leniter viscido, flavo-albido brunneo, carne concolori, sapore nauseoso; lamellis tenuibus, confertis, dein subrotundato-adnexis, initio albidis dein fluvidis, demum brunneo-ferrugineis; stipite brevi, fibroso v. floccoso-fibrilloso, anguste cavo, albo, 24-36 mm. longo, 3-6 mm. cr.; sporis brunneo-ferrugineis, ellipsoideis, 6,5-7,5 \times 3,7-5.

Hab. in herbis Menands Amer. bor. — Gregarium v. subcæspitosum. A cæteris speciebus congeneribus habitu et sporis minoribus facile dignoscendum.

FLAMMULA Fr. — Syll. V p. 809, IX p. 104, XI p. 56, XIV p. 136, XVI p. 94, XVII p. 68.

1. **Flammula betulina** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 690 p. 100. — Pileo carnosio, e convexo subplano, floccoso v. fibrilloso, rugoso, juveni viscido, senio subviscido, sæpe leniter margine appendiculato, fulvo, carne alba; lamellis tenuibus, latis, confertis, ventricosis, adnatis v. dente decurrentibus, ex albo cinnamomeo-brunneis; stipite carnosio, fragili, æquali, fibroso, farcto, apice striato-albido; sporis ellipsoideis, 6-8 \times 4-5.

Hab. ad ligna dejecta Betulæ, Stow Massachusetts, Amer. bor. — Pileus 5-12 cm. latus; stipes 5-7 cm. longus, 6-9 mm. cr.

2. **Flammula multifolia** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII (1905) 691 p. 79. — Pileo convexo, subumbonato, glabro v. obscure fibrilloso, fusco-flavo, quandoque margine pallidiore et centro obscuriore, margine incurvo, carneo, parum flavido-tincto; lamellis angustis, numerosis, confertis, postice rotundatis, adnexis, pileo concoloribus v. parum pallidioribus, acie vesiculis glanduliformibus flavis vel rubro-flavis crenulata; stipite æquali v. basi leniter incrassato, solido, floccoso, fibrilloso v. subglabro, flavo, quandoque excentrico; sporis subglobosis 4-5 μ . latis.

Hab. in ligno dejecto, St. Louis Mo., Amer. bor. (U. M. GLATFELTER). — Pileus 5-8 cm. latus; stipes 2,5-3,5 cm. longus, 2-5 mm. crasso.

3. **Flammula hanoiensis** Pat., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIII (1907) 692 p. 77. — Pileo carnosio, convexo, plano, orbiculari, 4-8 cm. diam., brunneo-rubescenti, parvis squamulis adpressis obscurioribus consperso; lamellis adnatis, flavo-ochraceis, inæqualibus; stipite fibrilloso, cylindræo, basim versus sensim incrassato, brunneo-flavido, diffracto, 8-10 cm. longo, 1 cm. cr.; sporis ochraceis, ovoideis, levibus, 6-8 \times 5.

Hab. gregaria ad terram herbosam Hanoi Indo-Cinæ (BERHARDT).

4. **Flammula expansa** Peck, N. York State Mus. Bull. (1907) n. 116, 693 p. 24. — Pileo tenui, late convexo v. subplano 2,5-7,5 cm. lato, glabro v. quandoque albo, centro adpresse squamuloso, subochraceo, carne alba, sapore dulci; lamellis tenuibus, angustis, confertis, flavis, laceratis brunnescentibus; stipite brevi, æquali, solido, extus brunneolo, intus flavido 2,5 cm. longo, 4-6 mm. cr.; sporis late ellipsoideis, 7,5 \times 6.

Hab. ad ramos dejectos Aceris rubri, Helderbergs Albany co. (S. H. BURNHAM) et East Schaghticoke Rensselaer co. Amer. bor.

5. **Flammula condensa** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 694

p. 217. — Pileo tenui, convexo v. subplano, plerumque irregulari, umbonato, viscido, flavo-brunneo, umbone rubro-brunneo v. castaneo, carne alba, sæpe flavo tincta; lamellis moderate latis, subdistantibus, adnatis v. leniter decurrentibus, sæpe rugose plicatis, e flavido brunneo-ferrugineis; stipite æquali, cavo, supra flavido, basi pallido v. brunneo; sporis ellipsoideis, 8-10 \times 4-5.

Hab. dense cæspitosa in silvis Coniferarum prope Washington D. C. Amer. bor. (F. J. BRAENDLE). — Pileus 2-3 cm. latus; stipes 2-4 cm. longus, 2-3,5 mm. cr.

6. **Flammula præcox** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXVI (1909) 995 p. 334. — Pileo carnosio, convexo, demum subplano, glabro, hygrophano, brunneo, deinde pallido-brunneo v. rufo-brunneo, aliquando viridi tincto, primo margine involuto, carne pallida; lamellis subconfertis, adnatis, aliquando adnaxis, pallido-ochraceis, demum brunneo-ochraceis, acie albidis, crenulatis v. erosis; stipite æquali v. sursum leviter attenuato, demum fistuloso, sericeo-fibrilloso, in juventute ad apicem leniter floccoso v. furfuraceo, velo candido evanescente, pallido, basi tomento molli candido; sporis subochraceis, ellipsoideis, 7-8 \times 4-5.

Hab. gregaria v. cæspitosa ad ligna dejecta, plerumque Tiliæ americanæ, Rockville Indiana Amer. bor. (G. T. HOVELL). — Pileus 2-3 cm. latus; stipes 2-4 cm. longus, 4-6 mm. crassus.

7. **Flammula pulchrifolia** Peck, New York State Mus. Bull. n. 122 696 (1908) p. 21 et p. 160. — Pileo carnosio-tenui, hemisphærico, deinde convexo, viscidulo, hygrophano, fibrilloso, subinde centro squamuloso, margine fibrilloso, roseo, subinde pallido; carne alba, amara; lamellis tenuibus, confertis, adnatis, subinde leviter sinuatis, albidis, mox nitide luteis v. fulvo-ochraceis; stipite æquali, farcto v. cavo, pallido, sæpe basi flavo, apice e velo fibrilloso; sporis in strato tenui fulvo-ochraceis, in strato crasso ochraceo-luteis, 7,5-8 \times 5-6.

Hab. ad lignum Tsugæ canadensis, Menands Albany co. Amer. bor. — Pileus 2,5-5 cm. latus; stipes 2,5-4 cm. longus, 3-4 mm. crassus.

8. **Flammula ferruginascens** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 57. — 697 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 8. — Pileo 30 mm. lato, convexo, late umbonato, sed etiam depresso, opaco, flavo-ochraceo, centro flavo-brunneo; stipite 25 mm. long. supra 4 mm. cr., basi angustato, brunneo-flavo, basi obscuriore, opaco, farcto; carne albida, tenaci, coriacea; lamellis subflavis, ex adnexo

adnatis, subrotundatis v. sinuatis, subconfertis v. confertis, 5 mm. latis; odore et sapore nullo; sporis elongatis, 6 \approx 2-3.

Hab. in silvaticis Baviaræ. — *Fl. scambæ* affinis.

9. **Flammula immutabilis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 57. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1899) pag. 8. — Pileo sordide flavo-rubro, campanulato, expanso, late umbonato, 30 mm. lato; stipite curvo, flavo, infra rubro-brunneo, albo-fibrilloso, 40 mm. long., 3 mm. cr. farcto; lamellis adnexis, parum decurrentibus, pallide flavo-rubidis, confertis, 4 mm. latis; massa sporarum flava; sporis 6-8 \approx 4, flavidis, elongatis.

Hab. ad truncos prope Oberstausen Algoviaræ. — *Fl. azymæ* affinis.

10. **Flammula astragalina** Fr. — Syll. V, p. 819. — var. **perelegans** Karst., Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. XXVII (1905) n. 4 p. 12. — A typo differt pileo squamis revolutis, fibrillosis obsesso.

Hab. ad parietes pineos fodinæ tectæ in horto Mustialensi Fenniaræ.

11. **Flammula scamba** (Fr.) Sacc. — Syll. VI, p. 828. — Huic referendum *Hebeloma subscambum* (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 55.

NAUCORIA Fr. — Syll. V p. 828, IX p. 109, XI p. 57, XIV p. 139, XVI p. 97, XVII p. 71.

1. **Naucoria sororia** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) p. 101. — Pileo carnosio, fragili, convexo, late umbonato, glabro, lacunoso, subviscido, fusco, udo zonula obscuriori marginato, æquali, margine undulato v. leniter lobato; carne firma humida, alba, sapore et odore farinaceo; lamellis angustis, confertis, adnatis, ex albo ætate v. arescendo obscurioribus; stipite æquali vel leniter bulboso, flexuoso, fragili, apice striato, farcto, pallide fusco, intus albo; sporis ellipsoideis, 10-12 \approx 6-8.

Hab. solitaria v. gregaria in herbis apricis, Falmouth Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS). — Pileus 5-10 cm. latus; stipes 4-12 cm. longus, 4-8 mm. cr. *Nauc. semiorbiculari* (Bull.) Fr. proxima.

2. **Naucoria chrysea** (Wettst.) Sacc. — Syll. XX, p. 173. — Wettstein, Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien, XIVC (1886) tab. II, fig. 5. — Pileo carnosio, convexo-glabro, margine subinvoluta, denique explanato-disciformi, nudo, glabro, hygrophano, griseo-flavo, margine pallidiore, dein flavo-lucenti, centro saturatiore, 2-4 cm. diam.; carne alba; stipite æqualiter cylindræo, 3-5 cm. long., 4-7 mm.

cr., albo, glabro, fistuloso v. spongioso-farcto; lamellis affixis vel liberis, 4 mm. lat., albis dein ob sporas pallide ferrugineis, acie tenuissime denticulatis; sporis globosis v. globoso-ovoideis, 5 μ . diam. vel 4-6 \approx 3-4, membrana crassa subferruginea; carne alba, inodora.

Hab. ad truncos putres in Horto bot. Vindobonensi. — *Nauc. hamadryadi* et *Nauc. micanti* affinis.

3. **Naucoria elata** Karst., Acta Soc. pro Faun. et Fl. fenn. XXVII, 703 n. 4 (1905) p. 3. — Pileo carnosulo, convexo-plano, obtuso v. depresso, glabro, ochraceo, ferruginascenti, 5 cm. circ. lato; stipite æquali, basi incrassato, flexuoso, umbrino-pallido, circ. 7 cm. longo; lamellis confertis, adnatis, cinnamomeo-ferrugineis; sporis ellipsoideis, 6 \approx 3.

Hab. in nemore ad lacum Baical Sibiriaë (O. LÖNNBOHM).

4. **Naucoria usambarensis** Eichelb., Verh. Naturw. Ver. Hamburg 704 3. Folge. XIV (1906) p. 72. — Pileo 4 cm. lato, margine parum undulato, brunneo, centro parum carnosulo, sub lente minute granuloso; carne hygrophana alba; stipite 5,5 cm. longo, 3 mm. cr., sericeo, fragili, basi bulboso usque ad 9 mm. cr.; lamellis pileo concoloribus sed pallidioribus, acie serratis; pulvere sporarum obscure brunneo-rubra; sporis ovoideis 8,6 \approx 5, parum angulatis.

Hab. ad terram, Amani Africaë trop. — Raro. *Nauc. pediadi* et *Nauc. Dusenii* affinis. — Auctor speciem in novum subgenus (*Naucoriopsis*) elevat.

5. **Naucoria paludosella** Atk., Journ. of Mycol. XII (1906) p. 193, 705 tab. 81; Hard Mushrooms p. 282, fig. 229. — Pileo udo viscido, e convexo explanato, ætate parum depresso, cretaceo, centro saturatiore, sæpius squamis adpressis cretaceo-brunneis obscurioribus consperso; lamellis ex umbrino brunneis, emarginatis, adnatis, quandoque dente decurrentibus, demum liberis; stipite pileo concolore sed pallidiore, cartilagineo, laxe flocculoso, demum cavo, basi bulboso et mycelio albido prædito; sporis e subovato subellipsoideis, subinæquilateris, levibus, 7-9 \approx 4-5, fusco-ferrugineis, sub microscopio sordide ochraceis; cystidiis sobventricosis, cylindratis.

Hab. ad Sphagna viva aliosque Muscos ad ligna putrida Cranberry Island, Ohio America bor. (W. A. KELLERMAN et HARD). — Totus fungus 6-8 cm. alt., pileus 2,5-3 cm. lat.; stipes 3-4 mm. cr.; velum floccosum mox evanidum.

6. **Naucoria vinicolor** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXVI (1909) 706 p. 334. — Pileo late convexo v. in centro depresso, glabro, sicco,

vinicolore, carne rufescente, lamellis subdistantibus, latis, adnexis, vinicoloribus; stipite æquali, fistuloso, fibrilloso, subbulboso, concolori; sporis ellipsoideis, utrinque obtusatis, levibus, 8-9 \times 5-6.

Hab. ad terram ad ligna emortua, Claremont, California Amer. bor. (C. F. BAKER). — Pileus 2-3 cm. latus; stipes 3-5 cm. longus, 3-4 mm. crassus. — Sect. *Gymnotæ* adscribenda species.

7. **Naucoria sphagnophila** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 139 (1910) 707 p. 45. — Pileo tenui, convexo v. subplano, minute tomentosulo, aliquando floccoso-squamuloso, 1,2-2,4 cm. lato, hygrophano, in juventute subincarnato, in maturitate griseo-ochraceo v. ferrugineo; lamellis tenuibus, angustis, subsinuatis, confertis, inæqualibus, acie erosis, flavidis, deinde ferrugineis; stipite æquali, flexuoso, 2,5-4,5 cm. long., 2-3 mm. cr., solido, deinde fistuloso, luteolo, ad apicem minute floccoso-tomentosulo, basi albido-tomentoso; sporis ellipsoideis, 8-9 \times 4-5.

Hab. gregaria inter Sphagna, Stow Massachusetts, Amer. bor. (S. DAVIS).

8. **Naucoria Musarum** Pat. et Demange in Bull. Soc. Mycol. Fr. (1910) 708 p. 41. — Solitaria v. fasciculata; pileo campanulato, convexo dein deflexo, carnosio, 1-3 cm. diam., centro umbonato, margine striolato, ochraceo-brunneo, squamulis albidis, distantibus, erectis consperso; carne parum crassa; lamellis adnatis, ochraceo-brunneis, inæqualibus, laxiusculis; stipite cylindræo, gracili, 2-6 cm. alt., 2-4 mm. cr., glabro, cavo, albo-rufescente; sporis ovoideis, levibus, majusculis, 15-20 \times 9-12, ochraceis.

Hab. ad caudices Musarum vivos, La Pho, Tonkin.

9. **Naucoria flava** Bres. Ann. mycol. III (1905) pag 162. — Pileo 709 carnosio, e convexo-subcampanulato expanso-umbonato, sicco, sericeo-subflocculoso, flavo, dein fulvo-maculato, 1 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ cm. lato; lamellis confertis, postice emarginatis vel sinuatis aut rotundatis et dente adnatis, flavis, fulvo-maculatis, demum fulvis; stipite solido, concolore, fibrilloso, apice pruinato, basi fusiformi subradiata, 2-4 cm. longo, apice 3-5 mm. basi usque ad 1 cm. crasso; carne flavida, molli, odore et sapore haud notabilibus; sporis ochraceis, laxè asperulis, subglobosis vel subovatis, 5-6 \times 3,5-4; basidiis clavatis, 23-25 \times 6-7.

Hab. locis herbicis silvaticis pr. Trento, autumnno seriori. — Colore nitidiore transit ad *Flammulas*.

10. **Naucoria lanata** Sacc. Ann. Mycol. (1910) p. 333. — Tota squa- 710 muloso-lanata, rubro-lateritia; pileo e conico mox expanso, carno-

sulo, floccoso-squamuloso, margine fimbriato; lamellis subconfertis, angustis, adnatis, facile secedentibus, e brunneo dein atro-castaneis, acie integra; stipite cylindrico, farcto, basi subincrassato-radicante, floccoso-lanato; sporis ovato-ellipsoideis, basi breve apiculatis, levibus, minutis, $5,5-6 \approx 4$, fuligineis, monoblastis; basidiis teretibus, clavatis, $15-16 \approx 5$.

Hab. in sabulosis, Ghinda al Dongollo (Hamasen) Erythrææ (HADR. FIORI). — Species indumento copioso rubro-lateritio etiam ab affinibus *N. Bowmanni* Berk. et *N. Cucumeris* B. et C. facile dignoscenda. Pileus 10-15 mm. lat.; stipes 3-4 cm. long., 2 mm. cr.; caro (in sicco) ochracea; pilei margo initio tam longe lanatus ut stipes fere anulatus videatur. Ad tribum *Lepidotæ* spectat.

11. **Naucoria arvalis** (Fr.) Quél. — Syll. V, p. 845. — var. **tuberi-** 711
gena Quél., Assoc. Avanc. Sc. XVIII (1889) tab. XV, fig. 10 (*Galeria*). — Pileo campanulato-convexo, 12 mm. lat., tenui, translucido, glabro, flavo, striolato; lamellis sinuato-adnatis, confertis, e cremeo argillaceis, acie puberula, pallidiore; sporis pruniformibus, ochraceis, 10-11 μ . longis; stipite gracili, pallide citrino, basi lanato, medulla pallidiore farcto, e sclerotio ovoideo, nigro, intus albo oriundo.

Hab. in arvis arenosis, Haute-Saône Galliæ. — *Nauc. arvalis* affinis.

12. **Naucoria breviata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 59. — Britzel- 712
mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 10. — Pileo 20 mm. lato, expanso, vix umbonato, flavido-rubro-brunneo, levi; stipite 20 mm. long., 2 mm. cr., farcto, griseo-flavo-rubro sed pileo pallidiori; lamellis confertis v. confertissimis, flavido-rubris, adnatis, nunc rotundatis, nunc sinuatis, 4 mm. latis; sporis pallide brunneis, subglobosis $6 \approx 4$, uno apice plerumque subacutatis.

Hab. in silvis Baviaræ. — *Nauc. tabacinæ* affinis.

13. **Naucoria inattenuata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 59. — Brit- 713
zelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1899) p. 10. — Pileo convexo plus minusve umbonato, opaco, carneo, 20 mm. lato; stipite 55 mm. long., supra 4 mm. cr. infra duplo crassiore, subcavo, fragili; lamellis emarginatis adnatis, fere decurrentibus, albo-flavidis, flavo-carneis, 3 mm. latis; massa sporarum flava; sporis $6-7 \approx 4$, elongatis.

Hab. in silvis Algoviarum. — *Nauc. amarescenti* affinis.

14. **Naucoria subtemulenta** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 59. — Brit- 714
zelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 11. — Fragilis; pileo

50 mm. lato, campanulato, dein expanso, applanato, umbonato v. non, flavo-rubro, centro flavo-brunneo, minute fibrilloso; stipite 70 mm. long., 3 mm. cr., cavo, sæpe basi inflato, non raro incurvato, flavo-rubro, basi rubro-brunneo; lamellis adnatis v. adnexis, confertis v. subconfertis, 8 mm. latis, flavis, flavo-ochraceis; carne concolori; massa sporarum flava vel cinnamomea; sporis flavis, elongatis, raro uno apice acutatis, 8-9 \approx 4-5.

Hab. in silvis Baviariæ. — *Nauc. temulentæ* affinis.

15. **Naucoria inserenda** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 59. — Britzel- 715
mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 10. — Pileo 20 mm. lato, expanso, subconvexo, umbonato, flavo-ochraceo, rubro-flavo; stipite 40 mm. alto, 3 mm. cr., sæpe incurvato, subcavo, albo, flavido, flavido-albo, subsericeo, supra fere pellucido, fragili; lamellis 5 mm. latis, adnatis, vix emarginatis, subconfertis, pallide flavo-rubris, ochraceis; massa sporarum flavo-brunnea; sporis flavis, elongatis, 9-11 \approx 4-6, uno apice plerumque acutatis.

Hab. in silvis Baviariæ. — *Nauc. limbata* affinis.

16. **Naucoria improspicua** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 59. — Brit- 716
zelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 8. — Pileo subglutinoso, levi, sordide rubro-flavo, centro brunneolo-rubro, conoideo v. campanulato, demum expanso et acute umbonato, 30 mm. lato; stipite rubro-brunneo, 40 mm. long., 3 mm. cr., cavo; lamellis confertissimis, sordide ochraceo-flavis, liberis, adnexis, rotundatis, 4 mm. latis; carne flavo-brunneo-rubra; massa sporarum flavo-brunnea, brunnea; sporis 6 \approx 3, pallide flavis, elongatis, sæpe uno apice subacutatis.

Hab. caespitosa in silvaticis Baviariæ. — *N. subglobosæ* affinis.

17. **Naucoria disclusa** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 59. — Britzel- 717
mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 9. — Pileo 20 mm. lato, hemisphærico, sæpe depresso umbonato, flavo-rubro, centro obscuriore, cute pilei carne rigidior; stipite 25 mm. long., 2 mm. cr., farcto v. subcavo, albido-flavo, basi flavido-rubro maculato; carne in stipite supra albida, fere pellucida, basi flavida; lamellis confertis, sordide flavescentibus, pallide griseo-aquosis, 3 mm. latis; massa sporarum flavo-brunnea; sporis elongatis, flavis, 6-8 \approx 4.

Hab. in arenosis Baviariæ. — *Nauc. anguinæ* affinis.

18. **Naucoria uncialis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 59. — Britzel- 718
mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 9. — Pileo 15 mm. lato, opaco, hemisphærico, demum applanato, carneo-flavo, rubescenti flavido albido, centro obscuriore; stipite 25 mm. long., 2 mm. cr.,

farcto, pileo concolori, basi piloso-strigoso; lamellis 4 mm. latis, adnatis, subsinuatis, subremotis, carneis, albido-rubescenti-flavidis; massa sporarum flava; sporis subglobosis, $8 \approx 6$, flavis.

Hab. ad truncos muscosos Salisburgiæ. — *Nauc. pusiolæ* affinis.

19. **Naucoria nimbifera** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 59. — Britzel- 719
mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 9. — Pileo 20 mm. lato, hemisphærico, campanulato, levi, flavo-rubro, centro obscuriore; stipite 45 mm. long., 3 mm. cr., cavo, flavo-rubro, rubro-brunneo, basi obscuriore; lamellis 4 mm. latis, liberis, adnatis, rotundatis, pallide flavis, trans pileum conspicuis; carne stipite concolori; massa sporarum flavo-rubra, flavido-rubro-brunnea; sporis 10-12 \approx 5-7, e granuloso asperulis, flavo-auratis, elongatis, uno apice v. utrinque acutatis.

Hab. in turfosis Algovix et Bavariæ. — *Nauc. nimbosæ* affinis.

20. **Naucoria confertifolia** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 59. — Brit- 720
zelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 8. — Pileo sordide rubro-flavo, hemisphærico v. campanulato, 18 mm. lato; stipite non fragili, sæpe basi radiciformi elongato et usque ad 45 mm. long., 3 mm. cr., subcavo, pallide et sordide flavo-rubro, supra pallidior, basi rubro-brunneo; lamellis confertis, flavo-carneis, rubro-flavis, ad marginem trans cutem conspicuis, 5 mm. latis, adnatis, subsinuatis; massa sporarum flavo-rubra; sporis 8 \approx 4, fere hyalinis, pallide flavidis, elongatis, obtusis.

Hab. in silvis Bavariæ. — *Nauc. subglobosæ* affinis.

21. **Naucoria tabacina** (DC.) Gill. — Syll. V, 845. — var. **bicolor** 721
Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) p. 347. — A typo differt pileo arescendo ochroleuco v. pallide cremeo-albo.

Hab. ad terram, Stow Massachusetts Amer. bor. (G. E. MORRIS et S. DAVIS).

BOLBITIUS Fr. — Syll. V p. 1073, IX p. 143, XI p. 74, XIV p. 156, XVI p. 127, XVII p. 74.

1. **Bolbitius gloiocyaneus** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 54. — 722
Pileo conico, 2-5 cm. lato, demum expanso et margine revoluto, rugoso, viscidissimo, multicolore, primum cœruleo-viridi, centro atro-brunneo, dein variante atro-viridi et cyaneo-viridi, demum totaliter pallide brunneo; sporis ochraceis, ellipsoideis, levibus, 8-10 \approx 5-6; stipite viscido.

Hab. ad ligna detrita, Storrs Conn. Amer. bor.

2. **Bolbitius variicolor** Atkinson, Mushrooms (1903) p. 164, fig. 158. 723

— Pileo juveni ex ovato conoideo, stipiti adpresso, quandoque inæquali, dein subconvexo, demum expanso subumbonato striato; superficie primum viscida, cuticula facile secedenti, initio obscuriore dein pallidiore umbone obscuriore; carne flava, dein olivaceo-fulginea; lamellis ad stipitem rotundatis, ex adnato adnexus, dein liberis, primum flavis dein ferrugineis; sporis ferrugineis, ellipsoideis, $10-15 \times 6-8$, levibus; stipite subcylindrico, supra angustato, flavo-sulphureo v. ochraceo, dein pallidiore et brunneolo, cavo, extus ex acie lamellarum fimbriata et stipiti plus minusve adpressa squamuloso; lamellis humiditate plus minusve mucilaginis.

Hab. in graminosis prope Ithaca N. Y. Amer. bor.

3. **Bolbitius umbonatus** Masee, Kew Bull. (1906) p. 46, fig. 12-13. 724

— Pileo tenuiter carnosomembranaceo, subpellucido, e conico campanulato, dein explanato, umbonato, profunde sulcato, glaberrimo, læte flavo-brunneo pallescente; lamellis adnexus, latis, subdistantibus, acie integris, ferrugineo-flavis; stipite sursum attenuato, albo, basi marginato-bulboso; sporis ellipsoideis, ochraceis, $10 \times 5-6$; basidiis spathulatis, $23-35 \times 10-12$.

Hab. gregarius in Horto bot. Kew Angliæ. — Species probabiliter in Britanniam importata.

4. **Bolbitius Birnbaumii** (Corda) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 151, 725

Agaricus Birnbaumii Corda Icon. III, p. 48, tab. VIII, fig. 122. — Fascicularis, aureus, copriniformis; pileo conico-campanulato, umbonato, membranaceo, tenui, squamulis furfuraceis sulphureis, bombycinis tecto, margine striato, sulcato, dein denticulato-inciso; lamellis polydymis, tenuibus, latiusculis, aureis, non diffluentibus, se decolorantibus, persistentibus; stipite longo, æquali, cylindrico, tenui, subcavo, aureo, nudo, velo fugacissimo, aureo; basidiis oblongis utrinque obtusis; sterigmatibus quaternis brevibus; sporis ovoideo-oblongis, utrinque acutiusculis, 1-guttatis, flavidis, mediocribus.

Hab. ad terram coriariam inter plantas Ananassæ in caldariis Pragæ (BIRNBAUM).

GALERA Fr. — Syll. V p. 860, IX p. 113, XI p. 60, XIV p. 141, XVI p. 103, XVII p. 75.

1. **Galera grisea** Earle, Estac. Agron. Cuba I (1906) p. 237, t. 36, 726

fig. 2. — Pileo subcarnoso, 2-4 cm. lato, breviter campanulato, e brunneo griseo-pallido vertice obscuriore, striato, glabro, demuni

reticulatim rimoso; lamellis adnexus, confertis, angustis, extremitate angusta et obtusa, primum albis demum cinnamomeo-ochraceis; sporis cinnamomeis, anguste ellipsoideis, $14-15 \approx 8-9$; stipite 6-10 cm. long., 2-4 mm. cr., supra tenuato, basi abrupte rugoso, juniore dense fibrilloso, dein basi fere glabro, albo v. pallido, tubuloso.

Hab. solitaria v. gregaria ad terram, Santjago de las Vegas in ins. Cuba.

2. **Galera cubensis** Earle, Estac. Agronom. Cuba I (1906) p. 237. — 727

Pileo tenui fragili, 2-3 cm. lato, campanulato, pallide cinnamomeo, leniter striato, glabro sed disco fibrillis minutis prædito; lamellis adnexus, confertis, angustis et ochraceis; sporis ellipsoideis $10 \approx 7$; stipite fragili, 7 cm. longo, 3 mm. cr., cylindrico, cavo, minute fibrilloso, albo.

Hab. solitaria v. gregaria ad terram M. Yunque Baracoa, in ins. Cuba. — *G. lateritiæ* et *G. simulanti* affinis sed differt sporis minoribus.

3. **Galera Kellermani** Peck, Journ. of Mycol. XII (1906); pag. 148; 728

Hard, Mushrooms p. 277, fig. 224-225. — Pileo tenuissimo subovato v. subconoideo, mox plus minusve applanato, 2-3 cm. lato, udo centro striatulo, sicco margine plus minusve persistenter striato et undulato, primum granuloso-farinoso dein denudato, sæpe sparse squamuloso et quandoque veli fragmentis margini adhærentibus, primum dilute brunneo, dein griseo-brunneo, centro parum obscuriore, sapore miti, odore levi ligni putrescentis; lamellis tenuibus, confertis adnatis, leniter cinnamomeo-brunneis, dein ætate obscurioribus; stipite angusto, æquali v. supra subconoideo 2,5-4 cm. long., 1-2 mm. cr., striato, minute furfuraceo v. farinoso, cavo, albo; sporis brunneo-ferrugineis in massa obscurioribus, ellipsoideis, $8-12 \approx 6-7$.

Hab. subcæspitosa in calidario Universitatis Columbus Ohio Amer. bor. (W. A. KELLERMANN).

4. **Galera simulans** Earle, Estac. Agron. Cuba I (1906) pag. 236, 729

tab. XXXVI, fig. 1. — Pileo tenui, fragili, 1-3 cm. lato, et campanulato applanato, ochraceo-pallido, profunde striato e primum disco obscuriore, fibrilloso sed demum glabro: lamellis leniter adnexus, confertis, angustis, albis ad ochraceum nutantibus; sporis ochraceis, anguste ellipsoideis, $14-15 \approx 10-12$; stipite 5-8 cm. longo, 1-2 mm. cr., supra parum tenuato, basi abrupto, bulboso, lanoso-pubescente, albo, cavo et fragili.

Hab. solitaria vel gregaria ad terram, Santjago de las Vegas in ins. Cuba. — *Gal. lateritiæ* affinis.

5. **Galera aquigena** (Britz.) Lapl. Dict. ic. p. 517, *Agaricus aquigenus* 730 Britz., Revis. Hymen. III (1899) p. 12, t. 262, f. 294 et t. 263, fig. 300. — Tota flavo-rubens; pileo 0,5-2 cm lato, hemisphærico, raro umbonato; stipite 2,5-9 cm. alto, 1-3 mm. cr., albo-fibrilloso, cavo; lamellis subremotis, 2-6 mm. latis, adnatis, subsinuatis; sporis flavis, $12 \approx 4-6$ subellipsoideis, utrinque v. uno apice acutatis.

Hab. in turfosis Baviariæ. — *G. aquatili* affinis.

6. **Galera Besseyi** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. 131 (1909) pag. 35, 731 tab. V, fig. 15-20. — Pileo tenui, ovato v. ovali, raro subgloboso, 5-12 mm. long., 4-10 mm. lat., obtuso, glabro, nunquam expanso, isabellino v. subochraceo, margine abrupte contracto et stipitem amplexante; lamellis tenuibus, confertis, ascendentibus, adnatis, ferrugineo-brunneis; stipite gracili, subflexuoso, 2,5-5 cm. long., 1-2 mm. cr., glabro, levi v. substriato, pileo concolore; sporis ellipsoideis, $14-16 \approx 10-12$.

Hab. solo sabuloso, Garden of the Gods, El Paso co. Col., Amer. bor. (C. E. BESSEY et E. A. BESSEY).

7. **Galera minima** Karst., Acta Soc. Fauna et Fl. fenn. XXVII, 4 732 (1905) p. 3. — Pileo membranaceo, e campanulato convexo, glabro, ochraceo, circiter 4 mm. lato; stipite filiformi, flexuoso, glabro, pallidiori, circiter 3 cm. longo et 3 mm. crasso; lamellis adfixis, subconfertis, pallido-ochraceis; sporis sphæroideo-ellipsoideis, eguttulatis, flavis (sub microsc.), $11-13 \approx 8$.

Hab. ad terram prope oppidum Ufa Rossia (O. LÖNNBOHM).

8. **Galera tenerella** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 369. — Gre- 733 garia, ochracea, 5-7 cm. alta; pileo 3-4 mm. alto et lato; stipite 1-1,5 mm. cr.; pileo campanulato, membranaceo, levi, leviter furfuraceo; lamellis subellipsoideis, angustatis, adnexis, margine albo et cystidiis capitatis ornato; basidiis bisporigeris, $28-30 \approx 10-12$, paraphysibus clavatis; sporis late ellipsoideis, levibus, flavidis, $14-16 \approx 8-10$; stipite pruinoso.

Hab. ad terram fimetosam in calidario, Ithaca, New York Amer. bor.

9. **Galera fracticeps** Pat. et Demange, Bull. Soc. Mycol. Fr. (1910) 734 p. 41. — Pileo campanulato, convexo, tenui, pruinoso, griseo vel flavido expallente, dein fusco, fragili, rimoso, longe striato, obtuse mamillato; stipite farcto, gracili, 4-6 cm. long., 1 mm. cr., glabro,

nitidulo, ochraceo-brunneo; lamellis liberis, ventricosis, rubiginosis; sporis ovoideis, majusculis, 15 \approx 9, levibus, ochraceis.

Hab. in herbosis, Hanoi, Tonkin. — Affinis *G. teneræ* sed sporæ multo majores.

10. **Galera griseo-isabellina** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 61. — 735

Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1909) p. 11. — Fragilis; pileo hemisphærico, depresse umbonato, isabellino, griseo-isabellino, 60 mm. lato, opaco, minute fibrilloso; stipite 50 mm. longo, 3 mm. cr., basi expanso. cavo, pileo concolori; lamellis confertis, ochraceo-flavis, flavo-auratis, flavo-cinnamomeis, 5 mm. latis, vix adnexis, fere liberis, rotundatis; massa sporarum flavo-rubra; sporis flavis, elongatis, uno latere sæpe obtusatis, 10-12 \approx 6-8.

Hab. in silvis Algoviaë. — *Gal. ravidæ* affinis.

TUBARIA W. Smith — Syll. V p. 872, IX p. 114, XI p. 61, XIV p. 143, XVI p. 105, XVII p. 76.

1. **Tubaria Eucalypti** Earle, Bull. of the New York Bot. Gard. (1904) 736

p. 300. — Pileo carnosio, 16-24 mm. lato, e late convexo expanso, ochraceo-brunneo, dein ætate centro pallidiore, sicco præcipue ad marginem primum minute tomentosulo, dein glabrato, margine æquali, subirregulari; lamellis leniter decurrentibus, parum confertis, latiusculis, planis, obscure cinnamomeis, acie alba; sporis ferrugineis, ellipsoideis, 6-7 \approx 3-4; stipite 2-4 cm. longo, 2-5 mm. cr., æquali v. supra parum expanso, sericeo, subtus fibrilloso, basi albo mycelioideo, pallide brunneo, cartilaginoso, cavo; carne tenui, alba, immutabili, sapore et odore grato.

Hab. ad fructus dejectos *Eucalypti*, Stanford Univ. California (C. F. BAKER).

2. **Tubaria stagnicola** (Britz.) Sacc. — Britzelmayr, Revis. Hymen. III 737

(1899) p. 12 (*Agar.*). — Syll. XI, p. 59 (*Naucoria*). — Pileo e campanulato hemisphærico, rubro-flavo et centro obscuriore, 2 cm. lato; stipite 10 cm. longo, 3 mm. cr., farcto v. cavo, supra albedo-flavo, basi brunneo-rubro, sæpe albedo-fibrilloso vel incurvato; lamellis adnatis, rotundatis v. emarginatis, subconfertis, flavido-griseo-rubris; massa sporarum rubro-brunnea v. brunnea; sporis flavis v. pallide flavo-brunneis, globoso-elongatis apiculatis, 12-16 \approx 6-8.

Hab. in turfosis Bavariaë. — *Tub. paludosa* affinis.

CREPIDOTUS Fr. — Syll. V pag. 876, IX p. 155, XI p. 62, XIV p. 144, XVI p. 108, XVII p. 76.

1. **Crepidotus lentinoides** Earle, Estac. Agron. Cuba I (1906) p. 236, 738 tab. 35. — Pileo tenui, firmo, distincte excentrico, 8-12 cm. diam., appanato, umbilicato, albo, lanoso, hygrophano, margine rotundato, erecto, dentato, non striato prædito; lamellis non anastomosantibus, margine lacinulatis, decurrentibus, confertis, subangustis, albis et ad colorem rubrum nutantibus; sporis albis, cylindraceutis 8 \times 6; stipite 1-2 cm. longo, 4-8 mm. cr., cylindrico, furfuraceovelutino, subgriseo, intus farcto et albo fibrisque vitreis duris prædito; odore grato, in sicco anisi simili.

Hab. gregarius v. cæspitosus ad truncos prope Santjago de las Vegas in ins. Cuba. — Nonnullis characteribus generi *Lentino* et *Pano* accedit.

2. **Crepidotus formosus** (Quélet.) Sacc. et Trav. — Syll XIX, p. 484. 739 — *Gyrophila formosa* Quélet, Ass. franç. Avanc. Sc. XXIV (1895) tab. VI, fig. 3. — Pileo convexo-rotundato, 5-12 cm. lato, incarnato-armeniaco, margine fortiter involuto, reticulato-ruguloso, cuticula crassa, gelatinosa, diaphana; stipite cylindrico, carnosofibroso, vix striato, dein cavo, ex albo incarnato; lamellis sinuatis, liberis, venosis, subincarnatis; sporis sphaericis 6-7 μ . diam., aculeolatis, ocellatis, albis, coacervatis dilute flavido-carneolis.

Hab. ad truncos putres in Gallia orientali.

3. **Crepidotus croceo-lamellatus** (Let.) Gillet, Champ., Fr. Hymén. 740 p. 557, tab. 377, *Agaricus croceo-lamellatus* Let. Annal. Sc. Nat. III (1835) p. 94. — Pileo carnosofibroso, dimidiato, versiformi, sæpius cochleato, postice elongato, sessili v. stipitato, pubescente, dein glabro, sordide flavido; lamellis numerosis, decurrentibus.

Hab. ad ligna pinea in Gallia bor.

4. **Crepidotus aurantiacus** Bres. Ann. Mycol. V (1907) pag. 238. — 741 Pileo carnosulo-submembranaceo, molli, dimidiato-sessili, reniformi vel flabellato, margine striato-sulcato, glabro, basi scabriusculo, 5-10 mm. lato, aurantiaco; lamellis distantibus, ventricosis, basi concurrentibus, concoloribus; stipite nullo vel tuberculiformi, 1-2 mm. longo crassoque; basidiis clavatis, 24-25 \times 7-8; sporis luteis, obovatis, laxè asperulis, 6-8 \times 4,5-5.

Hab. in stipitibus *Filicum* in insula Java (HEINRICHER).

5. **Crepidotus Berberidis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 64. — Britz. 742 zelmayer, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 12. — Pileo 2 cm. lato, albido-ochraceo-flavo, membranaceo, senio ad marginem; la-

mellis signato, minute fibroso, basi sparse piloso, ad marginem piloso-fibroso; lamellis confertis, albidis, isabellinis, rubidis, 5 mm. latis; carne inodora; massa sporarum flava; sporis breviter elongatis, 8-12 \approx 4-6, flavis, non acutatis.

Hab. ad ramos Berberidis et Alni in Algovia. — *Crep. inhonesto* affinis.

6. **Crepidotus sessilis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 64. — Britzel- 743
mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 12. — Pileo adnato, albo, vix fibroso, subopaco; lamellis confertis v. confertissimis, 3 mm. latis, ad basim pilei flavo-rubidis, rubidis, ad marginem pilei albis; massa sporarum flavo-rubro-brunneola; sporis breviter elongatis, 6 \approx 3, flavidis.

Hab. ad ramos putres in Bavaria. — *Crep. applanato* affinis.

7. **Crepidotus subscalaris** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 64. — Britzel- 744
mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 12. — Pileo 3 cm. lato, opaco, albido, flavescenti, fere papyraceo, sessili; lamellis confertis, 3 mm. latis, albidis, flavo-ochraceis, ad marginem pallidioribus, sæpius flavido-carneis; massa sporarum flavo-brunnea; sporis 5-6 \approx 2-3, elongatis.

Hab. ad ramos putres Coniferarum in Salisburgia et Algovia. — *Crep. scalaris* affinis.

CORTINARIUS Fr. — Syll. V p. 889, IX p. 117, XI p. 64, XIV p. 845, XVI p. 110, XVII p. 77.

I. *Phlegmacium*.

1. **Cortinarius speciosus** Earle, Bull. of the New York Bot. Gard. 745
(1904) p. 299. — Pileo 8 cm. c. diam., e convexo expanso, obtuso, pallide flavo, disco obscuriore ad cinnamomeum nutante, levi, viscido, margine æquali; lamellis sinuato-decurrentibus, confertis, distincte heterophyllis, subventricosis, primum sordide albis dein purpurascensibus, demum cinnamomeis; sporis cinnamomeis, irregulariter ellipsoideis, apice subacutis 8-9 \approx 6; margine bulbi fibrillis cortinæ rubro-brunneis prædito; stipite 5-6 cm. longo, 1-1,5 cm. cr., distincte et abrupte bulboso, bulbo 2,5-3,5 cm. cr., supra levi, infra fibrilloso, apice cremeo, basi rubro-brunneo, solido; carne albida, immutabili, sapore et odore grato.

Hab. inter folia quercina dejecta Stanford Univ. California 746
(C. F. BAKER).

2. **Cortinarius cæσιο-cyaneus** Britzelm, Revis. Hymenom. IV (1899) p. 2, tab. 414, fig. 339 et tab. 421, fig. 362. — Pileo hemisphærico dein convexo-expanso, 10 cm. lato, glutinoso, levi, vix fibrilloso; stipite farcto, 7 cm. alto, 2,5 cm. cr., basi incrassato-bulboso, albido griseo-cyaneo; anulo rubro-brunneo; lamellis 7 mm. latis, confertis v. subconfertis, dein cinnamomeo tinctis, sinuatis, adnatis; carne odore speciali nullo, pallide griseo-cyanea; sporis in massa flavo-ochraceis, 8-10 \times 4-5, flavis, subellipsoideis, levibus, breviter ellipsoideis, apice angustatis.

Hab. in silvis Salisburgiæ et Algoviæ. — *Cort. cærulescenti* affinis.

3. **Cortinarius fibrosipes** Britzelm., Revis. Hymenomyc. IV (1899) 747 p. 2, tab. 413, fig. 336. — Pileo glutinoso, subfibroso, aurantiaco, convexo, centro parum umbonato v. depresso; stipite farcto, fibroso, primum subviolaceo dein albido, flavo, 8 cm. alto, 2 cm. cr., basi incrassato; lamellis confertis, lilacinis, violaceis, flavo-rubidis, 8 mm. latis, rotundatis vel sinuatis ex adnato adnexis; carne albida v. flavida; sporis in massa flavo-rubro-brunneis, 8 \times 4, flavis, flavo-auratis, breviter ellipsoideis, vix acutatis.

Hab. in silvis Algoviæ et Baviariæ prope Immenstadt et Augsburg. — *Cort. glaucopodi* affinis.

4. **Cortinarius olivaceo-stramineus** Kaufman, Bull. Torr. Bot. Club, 748 XXXII (1905) p. 322 cum ic., Hard, Mushrooms p. 291; Journ. of Mycol. (1907) tab. 95. — Pileo 4-7 cm. lato, viscido et cuticula gelatinosa prædito, late convexo, leniter depresso, centro expanso, margine diu incurvato, pallide stramineo-flavo olivaceo tincto, demum leniter rufo tincto, levi v. sericeo-fibrilloso, disco sæpe squamulis minutis tecto; carne crassa margine paullo tenuiori, alba, demum fusco-flavida, mox molli et spongiosa; lamellis satis angustis, 7 mm. latis, sinuato-adnexis, primum albidis dein pallide cinnamomeis, confertis, acie serrulata pallida; stipite 6-8 cm. longo, 5-12 mm. cr., subbulboso, supra velum albo et pruinato, intus molli et spongioso dein subcavo; velo albo olivaceo tincto; sporis 10-12 \times 5,5-6,5 intus granulosi, sublevibus; odore grato.

Hab. in silvaticis prope Green-Tree Falls et Freeville N. Y. Amer. bor. (H. H. WHETZEL et J. M. VAN HOOK).

5. **Cortinarius aleuriosmus** Maire Bull. Soc. Mycol. Fr. (1910) p. 180, 749 t. VII, f. 4-5 et p. 181, f. 7. — Pileo e convexo expanso, crasso,

ex albido sordide ochroleuco, glabro, levi, pellicula secernibili viscosa, amara, margine incurvo, levi; stipite solido, albo, sicco, sericeo marginato-bulboso, 6-7 cm. alt., 3-4 cm. cr., cortice albo; lamellis tenuibus confertis subangulatis ex albido-cæsi ferrugineofuscis, acie crenata alba, adnatis, vix emarginatis; carne firma, alba, farinam olente, subamara; sporis fusco-ferrugineis, subamygdaliformibus, verrucosis, apice papillatis, basi apiculatis e latere subcompressis, 10-12,5 \times 7, e latere 6 μ . cr.; basidiis 4-sporis 38-42 \times 8; cystidiis nullis; lamellarum acie pilis brevibus fusoidis heteromorpha.

Hab. in silvis frondosis Galliae (Burgundiae?). — *Cort. glaucopodi* affinis.

6. **Cortinarius decoratus** Bataille, Bull. Soc. Myc. Fr. XXV (1909) 750 p. 80. — Pileo e convexo applanato, 5-9 cm. diam., viscido, glabro, sicco nitido, cupreo-rufo, margine primo incurvo et leviter violaceo-lilacino, dein concolore; lamellis adnatis, obsolete emarginatis, subconfertis, colore porri e viridi-glaucolivaceis, demum olivaceo-ferruginescentibus; stipite solido, firmo, cylindraco, 4-6 cm. alto, 1-1,5 cm. cr., fibrilloso, sicco, late violaceo-lilacino, dein roseo-lilacino aut roseo-cupreo, basi bulboso-marginato cortinaque dilute lilacina; carne compacta, e lilacino albida, subpallescenti; odore debili, dein subviroso; sapore amarescenti; sporis fusoido-amygdaliformibus, 10-12 \times 6-7, minute asperulis, ochraceo-fulvis.

Hab. in circulos inter muscos pascuorum umbrosorum, Jura Helvetiae, loco dicto Les Auges prope Damvant Helvetiae et in siliceo, frondoso nemore loco dicto « La Vèze » prope Saône, Doubs Galliae. — Medius inter *Cort. orichalceum* et *C. prasinum*.

7. **Cortinarius pelmatosporus** C. E. Martin — Syll. XIV, p. 145. — 751 Bull. Herb. Boiss., V (1905) p. 1189. — Sporibus maximis 18-20 \times 8-10 praecipue distinguitur, sed ex ipso auct. in litt. a *Cort. praestante* Cordier non satis differt.

8. **Cortinarius corrugatus** Peck — Syll. V, pag. 900. — var. **sub-** 752 **squamosus** Peck, Edible Fungi (1900) p. 161, tab. 58, fig. 11-15. — A typo differt pileo squamulis et maculis obscurioribus ornato.

Hab. ad terram in silvis Amer. bor.

9. **Cortinarius percognitus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 64. — Brit- 753 zelmayr, Revis. Hymen. IV (1899) p. 2. — Pileo convexo dein expanso et umbonato, usque ad 9 cm. lato, glutinoso, levi, flavo-brunneo, centro obscuriore; stipite farcto, 5 cm. longo, centro

usque 3 cm. incrassato pileo concolori; lamellis 12 mm. latis, subconfertis, emarginato-adnexis, sordide ochraceis; carne sordide albidoflava; massa sporarum rubro-brunnea; sporis citriformibus, asperulis, flavo-auratis, $14 \approx 8$.

Hab. in silvis prope Augsburg. Baviariæ. — *Cort. lato* affinis.

10. **Cortinarius disputabilis** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 64. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 1. — Magnitudine et forma variabilis; pileo usque ad 6 cm. lato, convexo, umbonato v. non, etiam campanulato, glutinoso, flavo-vitellino; stipite usque ad 10 cm. longo, 5-15 mm. cr., basi incrassato v. etiam attenuato, albo; lamellis usque ad 15 mm. latis, subconfertis, flavo-lilacinis, parum decurrentibus v. emarginato-adnatis; anulo flavo-rubro; carne alba; massa sporarum flavo-brunnea; sporis fere globosis, $8-9 \approx 6-7$, apiculatis, flavis, asperulis.

Hab. in silvis Salisburgiæ, Algoviæ, Baviariæ. — *Cortinario Riederi* affinis.

11. **Cortinarius largiusculus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 64. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 1. — Pileo usque ad 8 cm. lato, glutinoso, centro flavescenti, ad marginem revolutum, fibrilloso, cyaneo et violascente, convexo et late umbonato; stipite 10 cm. longo, supra 15 mm. basi usque ad 20 mm. cr., farcto, albido, pallide violaceo; anulo rubro-lateritio; carne albido-violacea, subtenaci, in stipite spongiosa; lamellis 10 mm. latis, brunneo-violaceis, laxis, emarginato-adnatis; massa sporarum flavo-rubro-brunnea; sporis flavis, granuloso-farctis, fere globosis, subapiculatis, $8-9 \approx 7-8$.

Hab. in silvis fagineis Salisburgiæ. — *Cort. largo* affinis.

12. **Cortinarius pertinens** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 64. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) pag. 1. — Pileo 11 cm. lato, convexo, centro subdepresso, glutinoso, flavo-vitellino, centro obscuriore, margine albido, pileo fere glabro, margine ex subincurvato revoluto; stipite 6 cm. longo 2 cm. cr., farcto, basi attenuato, albo; anulo et velo albis; lamellis 6 mm. latis, adnatis, sinuatis, confertis, pallide flavidis, isabellinis; carne alba, sapore grato; massa sporarum flavo-ochracea; sporis flavis, elongatis, utrinque acutatis, $8-9 \approx 3-4$.

Hab. in silvis Algoviæ. — *Cort. claricolori* affinis.

II. *Myxacium*.

13. **Cortinarius sterilis** Kauffman in Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII 757 (1905) p. 321 c. icone; Journ. of Mycol. 1907, p. 36, tab. 96. — Pileo 1,5-4,5 cm. lato, udo suborbiculari dein convexo-expanso, margine incurvo, e griseo-cinereo olivaceo-ferrugineo, æquali, levi, viscido, demum subumbonato; carne alba, molli tenui; lamellis latiusculis, 4-6 mm. latis, primum griseolis dein pallide cinnamomeis, postice rotundatis, emarginatis, non valde ventricosis, subconfertis, margine serrulatis et albis, cellulis sterilibus præditis; cortina alba v. sordida; stipite 4-8 cm. longo, 4-6 mm. cr., basi 10 mm., supra e clavato angustato, solido, spongioso, griseo-albo, apice pallide cyaneo, udo parum viscido, maculato, velo pileo concolori, apice intus pallide cyanescenti, basi albo; sporis 6-7 \approx 5-6,5, subsphæroideis, sublevibus.

Hab. ad terram inter Sphagna, prope Freeville, New York Amer. bor.

14. **Cortinarius cylindripes** Kauffman, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII 758 (1905) p. 321, cum ic.; Journ. of Mycol. 1907, tab. 98. — Pileo 3-7 cm. lato, udo valde glutinoso et nitido, primum lavandulaceo dein flavido et violaceo tincto, demum brunneo-ochraceo, primum obtuse orbiculari dein campanulato et expanso, margine incurvo et pellucido-striato; superficie levi, demum longitudinaliter rugosula; carne centro crassa aliaque tenui, violacea, mox fusco-alba; lamellis latiusculis, adnatis, emarginatis, antice non attenuatis, primum violaceis v. lavandulaceis, dein pallide cinnamomeis, non confertis, tenuibus, acie serrulatis et pallidioribus; stipite 8-10 cm. longo, 5-9 mm. cr., elastico, æquali, velo violaceo, glutinoso, maculas evanidas efformante tecto, apice levi v. fibrilloso striato, intus e violaceo fusco-albo, solido v. farcto, extus pallide azureo-cyaneo; sporis 12-15 \approx 6,5-8, leniter tuberculatis, basidiis 10 μ . c. longis.

Hab. ad terram sub Abietibus in Amer. bor. — Gregarius, raro cæspitosus.

15. **Cortinarius electrinus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 67. — Britzelmayr, Revis. Hymen. IV (1899) p. 4, *Dermocybe*. — Glutinosus; pileo succineo, centro flavo-brunneo, flavo-rubro-brunneo, 5 cm. lato, campanulato, dein expanso, pellucido; stipite 9 cm. longo,

8 mm. cr., subcavo v. farcto, flavo-brunneo albescenti, basi obscuriore; lamellis subconfertis, crassiusculis, cinnamomeis, late adnatis, subsinuatis; carne stipite concolori; massa sporarum rubro-brunneola, flavescenti; sporis flavo-auratis, globoso-oblongis, uno apice v. utrinque apiculatis, 12-14 \times 7.

Hab. in silvaticis Bavariæ. — *Cort. livido-ochraceo* affinis.

16. **Cortinarius politulus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 65. — Britzel- 760
mayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) pag. 4. — Pileo et stipite glutinosis; pileo 6 cm. lato, campanulato, dein expanso, convexo et umbonato, griseo-violaceo, cyaneo-griseo, centro flavescenti, minute fibrilloso; stipite 10 cm. long., supra 6 mm., basi 12 mm. cr. v. etiam attenuato, pileo e pallidiori albido, farcto; lamellis 8 mm. latis, confertis, cinnamomeis, rotundatis v. sinuato-adnatis; carne albida, pallide flavo-rubida; massa sporarum flavo-ochracea; sporis 8 \times 6, flavis, asperulis, fere globosis, breviter apiculatis.

Hab. in silvis Bavariæ. — *Cort. epipoleo* affinis.

17. **Cortinarius heliotropicus** Peck, Rep. State Bot. New York (1904) 761
p. 22, t. P, fig. 1-7. — Pileo tenui, late campanulato, convexo v. subplano, fibrilloso, viscido, violaceo-purpureo (ut flos Heliotropii) maculis flavido-albis tincto; carne alba, dulci v. demum subacri, odore subraphaneo; lamellis angustis, tenuibus, confertis, postice rotundatis, adnexis, concoloribus, demum cinnamomeis; stipite firmo, solido v. spongioso, basi subincrassato, sericeo-fibrilloso, viscido, albido purpureo-tincto, intus albo; sporis ellipsoideis, 10-12 \times 5-6.

Hab. in silvis, Smithtown Amer. bor. — Pileus 3-7 cm. lat.; stipes 4-7 cm. long., 5-8 mm. cr.

III. *Inoloma*.

18. **Cortinarius violascens** A. Blytt, Norg. Hymen. in Vid.-Selsk. 762
Skrift., n. 6 (1904) p. 73. — Pileo gilvo, nitido, convexo-plano, sine umbone, obscure atro-fibrilloso, 5 cm. lato; lamellis subdistantibus, adnatis, dente decurrentibus, primo albidis dein cinnamomeis, tactu violaceis; stipite 4 cm. longo, sursum attenuato, solido, niveo, tactu amœne violascenti, infra cortina ampla sericeo, supra glabro; sporis cinnamomeis.

Hab. in betuletis prope Kongsvold Norvegiæ.

19. **Cortinarius Braendlei** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII (1905) 763 p. 79. — Pileo carnosò, firmo, convexo, margine incurvato, velo sericeo, brunneo-lilacino, sæpe flavo-brunneo maculato, margine initio velo albo-griseo tecto; carne lilacina, præcipue in speciminibus juvenilibus, odore tenue raphani; lamellis angustis, confertis, postice leniter rotundatis, adnatis, margine erosis, e griseo lilacino-tinctis; stipite valido, solido, sericeo-fibrilloso, bulboso, albo v. albedo; sporis oblongo-ellipsoideis, obscure granulosis, $12-15 \times 7-8$.

Hab. inter folia dejecta in silvis, Washington DC., Amer. bor. (F. J. BRAENDLE). — Pileus 7-12 cm. latus; stipite 5-7 cm. longus, 10-15 mm. cr.

20. **Cortinarius cinereo-violaceus** Fries. — Syll. V, p. 925. — var. 764 **rubescens** Blytt, Vid.-Selsk. Skrift. n. 6 (1904) pag. 74. — Pileo 11 cm. lato, vinoso-rubescente; stipite bulboso, 7 cm. alt., 1,7 cm. cr., basi 3,5 cm.; lamellis griseo-brunneis, 1 cm. latis; sporis brunneo-rubiginosis.

Hab. in silvis Norvegiæ.

21. **Cortinarius sublanatus** (Sow.) Fr. — Syll. V, pag. 933. — var. 765 **argillaceus** Blytt, Vid.-Selsk. Skrift. n. 6 (1904) p. 75. — Dignoscitur imprimis pilei colore argillaceo.

Hab. in silvis Norvegiæ.

22. **Cortinarius opimatus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 66. — Britz. 766 zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 4. — Pileo 7 cm. lato, hemisphærico, margine profunde revoluto, flavo-aurato, flavo-melleo, depresso fibroso-squamoso; stipite 5 cm. longo, centro 20 mm. incrassato, albido-flavo, farcto; anulo flavido; lamellis 5 mm. latis, remotis, flavidis, rubido-flavis, flavido-griseo-brunneis, e rotundato-adnexo adnatis; sporis subglobosis, flavis, breviter apiculatis, 8×6 .

Hab. in silvis Salisburgiæ. — *Cort. opimo* affinis.

23. **Cortinarius collocandus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 65. — Britz. 767 zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) pag. 5. — Pileo 8 cm. lato, sicco, fibroso, campanulato, demum subconvexo vel late depresso, rubido-violaceo, dein e centro flavido-ochraceo; stipite farcto, 10 cm. longo, basi attenuato v. etiam usque ad 20 mm. incrassato, rubido-violaceo sed pileo pallidiore; lamellis 8 mm. latis, subremotis, rotundatis v. marginato-adnatis, violaceo-lilacinis; carne violacea, v. tantum basi in stipite albida v. flavida; massa sporarum flavo-rubra; sporis $8-9 \times 6-7$, flavo-auratis, breviter apiculatis quandoque asperulis.

Hab. in silvis Coniferarum Salisburgiæ, Algovia, Friburgiæ, Bavariæ. — *Cort. interspersello* affinis.

24. **Cortinarius albido-cyaneus** Britz. — Sacc. Syll. XI, pag. 65. — 768
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 4. — Pileo 12 cm. lato, convexo, cyanescenti v. cyaneo-violaceo, striato; stipite farcto 9 cm. longo, 3 cm. cr., albo et præcipue ad basim violaceo; velo albo; lamellis 7 mm. latis, confertis v. subconfertis, ex adnexo adnatis, pallide brunneolis, flavo-brunneis, flavo-griseis; massa sporarum flavo-brunnea; sporis rotundato-oblongis subapiculatis, 10-12 \approx 4-6.

Hab. in silvis Salisburgiæ et Bavariæ. — *Cort. argentato* affinis.

25. **Cortinarius fusco-violaceus** Britz. — Sacc. Syll. XI, pag. 65. — 769
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) pag. 5. — Pileo 10 cm. lato, convexo v. etiam subdepresso, pallide brunneo-lilacino v. brunneo-violaceo; stipite farcto, 11 cm. long., supra 20 mm., basi 35 mm. cr., albido-violaceo; anulo rubro-brunnescenti; lamellis 15 mm. latis, distincte rotundatis, subconfertis, brunneo-lilacinis v. brunneo-violaceis; carne pallide violacea; massa sporarum flavo-brunnea; sporis 9-12 \approx 4-6, flavis, subelongatis, utrinque acutatis.

Hab. in silvis Bavariæ. — *Cort. albo-violaceo* affinis.

IV. *Dermocybe*.

26. **Cortinarius validipes** Peck, New York State Mus. Bull. n. 116 770
 (1907) pag. 20. — Pileo carnosio, crasso, convexo dein subplano, 7,5-15 cm. lato, sicco, squamuloso v. floccoso-squamuloso, ochraceo; carne alba, in proximitate lamellarum flava, sapore dulci; lamellis tenuibus, angustis, confertis, adnatis v. dente decurrentibus, flavido-albis dein cinnamomeis; stipite valido, firmo, solido, fibroso, apice dente lamellarum decurrenti striato, subanulato, albo-flavescenti, intus albido, 10-12,5 cm. longo, 2,5-5 cm. cr.; sporis subellipsoideis, 7,5-10 \approx 5-6.

Hab. ad terram prope Coopers Plains Steuben co. Amer. bor.

27. **Cortinarius cæσιο-pallens** Karst., Acta Soc. pro Faun. et Fl. fenn. 771
 XXVII, 4 (1905) p. 4. — Pileo carnosio, tenui, convexo, obtuso, dein gibbo, glabro, stramineo-pallenti, unicolori, 2-3 cm. lato; stipite æquali, flexuoso, albo, e velo flocculoso-squamuloso, 7-9 cm.

longo, 5-9 mm. crasso; cortina sæpe in margine pilei adhærente; lamellis confertis, adnatis, cæsiis, subpallentibus; sporis ovoideis, $10 \approx 6$.

Hab. in silva acerosa montana Syriæ prope Mustiala Fennicæ.
— *Cort. albo-cyaneo* Fr. et *Cort. spilomeo* affinis.

28. **Cortinarius subinfucatus** Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV 772 (1899) pag. 7, tab. 352, fig. 67. — Pileo 6 cm. lato, convexo v. umbonato, minute fibrilloso-squamoso, flavo-rubido; stipite 13 cm. longo, supra 8 mm., infra 15 mm. cr., supra albido v. flavo-sulphureo, cum veli rudimentis rubro-brunneis; lamellis 8 mm. latis, cinnamomeis, subconfertis, rubro-flavidis v. brunneis, emarginato-adnatis; carne sordide flavo-rubida; sporis brunneolis, subglobo-sis, 6 μ . cr.

Hab. in silvis Coniferarum in alpinis Bavaricæ. — *Cort. infucato* affinis.

29. **Cortinarius evestigatus** Britzelm., Revis. Hymenomyc. IV (1899) 773 pag. 6, tab. 345, fig. 32. — Pileo campanulato, dein expanso et umbonato, centro quandoque leniter depresso, 6 cm. lato, margine revoluta, albo, albido v. pallide alutaceo opaco; stipite 8 cm. alto, medio usque ad 1,5 cm. cr., utrinque angustato, farcto, albido; anulo flavo-rubido, nitide cinnamomeo; lamellis remotiusculis, pallide flavis, cinnamomeis, 12 mm. latis, adnato-emarginatis; carne alba; sporis flavo-brunneis, 6-8 \approx 4, breviter ellipsoideis.

Hab. in silvis Coniferarum in Bavaria. — *Cort. decumbenti* affinis.

30. **Cortinarius rutilans** Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XXVI (1897) 774 p. 3, tab. IV, fig. 8 (extr.). — Pileo campanulato, 3-6 cm. lato, piloso-velutino, dein crispo, subaurantio, dein rufescente, fugaciter flammeo-tincto; carne tenui, fragili, junquillea, odore raphanaceo; lamellis adnatis, aurantiis, leviter rutilantibus, demum fulvo-croceis; stipite farcto, junquilleo-rutilante; cortina parce fibrillosa, aurorea; sporis pruniformibus, 11 μ . long., fulvis.

Hab. in silvis argillosis, Nivernais (Domina DAULNOY), Bourbonnais (BOURDOT). — Affinis *C. miltino* et *C. orellano*.

31. **Cortinarius rubripes** Peck, New York State Mus., Bull. n. 105 775 (1906) pag. 16. — Pileo tenui, late convexo dein subapplanato, quandoque etiam centro leniter depresso, raro leniter umbonato, 2,5-3,5 cm. lato, minute sericeo-fibrilloso, griseo-ferrugineo v. pallide alutaceo, carne albida; lamellis subdistantibus, emarginatis, dein violaceo-cinnamomeis; stipite basi expanso vel subbulboso,

cavo, vivide rubro, 2,5-3,5 cm. longo, 4,5-9 mm. cr.; sporis ellipsoideis, 7,5-10 \approx 4,5.

Hab. in silvaticis, Pittsford, Monroe co. Americæ bor. (F. S. BOUGHTON).

32. **Cortinarius versicolor** Blytt, Norg. Hymen. in Vid.-Selsk. Skrift., 776 n. 6 (1904) p. 77. — Pileo convexo, glabro, atro-fusco, margine olivascenti, carnosio, 15 mm. lato; lamellis adfixis, postice ventricosus, confertis; stipite 4 cm. longo, bulboso, solido, cæsius, apice basique virescenti, fibrilloso, carne subcærulescente.

Hab. locis graminosis prope Tijsnes Norvegiæ.

33. **Cortinarius submyrtilinus** Britz. - Sacc. Syll. XI, pag. 67. — 777 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) pag. 6. — Pileo 2,5 cm. lato, brunneolo, flavo-brunneo-ochraceo, convexo, vix umbo-nato; stipite farcto v. subcavo, 7 cm. long., supra 5 mm. infra 10 mm. cr., albido; lamellis 3 mm. latis, subconfertis, adnexus, lilacinis v. violaceis; carne albida, basi in stipite subviolacea; massa sporarum rubido-flava; sporis sphæroideis, 6 μ . diam., flavo-auratis, vix apiculatis.

Hab. ad terram muscosam in Bavaria. — *Cortin. myrtilino* affinis.

34. **Cortinarius millefoliatus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 67. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 7. — 778 Pileo hemisphærico 3,5 cm. lato, fibroso, flavo-stramineo, flavo-melleo, minute fibroso; stipite farcto, 4 cm. long., supra 8 mm. basi 12 mm. cr., demum attenuato, pileo concolori; lamellis 5 mm. latis, confertis v. subconfertis, e stramineo-melleo flavis, rotundato-adnexus; carne albida, sordide flavido-alba, subcarnea; massa sporarum brunneo-rubro-flava; sporis sphæroideis, 6 μ . diam., flavo-auratis.

Hab. in silvis Algovia. — *Cort. cinnamomeo* affinis.

V. *Telamonia*.

35. **Cortinarius inconsequens** Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV 779 (1899) p. 9, tab. 356, fig. 88. — Pileo 3 cm. lato, campanulato, demum expanso, indistincte fibroso, griseo-rubido, margine albido; stipite 9 cm. longo, 4 mm. cr., basi usque ad 10 mm. incrassato, albo-lilacino, sericeo, farcto; lamellis 5 mm. latis, marginatis, remotis, sæpe dentato-fimbriatis, griseo-brunneis v. obscure brunneis;

stipite et carne brunnea, ad marginem albida, odore et sapore nullo; sporis rubro-brunneis, breviter ellipsoideis, $14 \approx 7-8$.

Hab. in silvis Coniferarum Salisburgiæ.

36. **Cortinarius rubipes** Kauffm., VIII. Ann. Rep. Michig. Acad. of Sc. (1906) p. 32; Bot. Gazzette XLII (1906) p. 208; Journ. of Mycol. (1907) p. 38, tab. 100, fig. 2. — Pileo e conico expanso, vix umbonato, 5-11 cm. lato, aqueose cinnamomeo, sicco rufo-ochraceo, sericeo-fibrilloso, hygrophano, non viscoso; margine rectiusculo; lamellis subdistantibus obtusis, latiusculis, adnexas, 6-15 mm. latis, cinereo-purpureis dein cinnamomeis; stipite exanulato, cylindræo, deorsum bulboso-clavato, farcto, rubro, levi, bulbo atro-rubro; sporis levibus, cinnamomeis, $8-9 \approx 5$.

Hab. gregatim in silvis Michigan Amer. bor.

37. **Cortinarius Atkinsonianus** Kauffman, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII (1905) p. 324 cum icone; Journ. of Mycol. (1907) tab. 99; Hard, Mushrooms p. 302, fig. 244. — Pileo 8 cm. lato, expanso, e flavo-ceraceo v. flavo-brunneolo subochraceo et fulvo, viscido, levi, æquali, in sicco sæpe nitido; carne centro crassa, albo-cyanescente stipite concolori; lamellis subangustis, 6-8 mm., ex adnato leniter sinuatis, e purpureo flavis, dein cinnamomeis; stipite violaceo-cyaneo 8 cm. longo, 12-15 mm. cr., æquali v. supra leniter angustato, bulboso, 3 cm. cr. velo fibrilloso, pallide flavo, bulbum circumdante, solido, intus violaceo-cyaneo; sporis 13-15 $\approx 7-8,5$ tuberculosis.

Hab. in silvis, Enfield Gorge prope Ithaca N. Y. Amer. bor. 782

38. **Cortinarius Morrisii** Peck, Bull. Torr. Bot. Club. XXXII (1905) p. 79; Hard, Mushrooms p. 300, fig. 242. — Pileo carnosio, margine tenui et longe reflexo excepto, convexo, irregulari, hygrophano, ochraceo v. fusco-ochraceo, carne tenui, pileo concolori, odore tenui, raphani consimili; lamellis latis, subdistantibus, margine erosis v. inæqualibus, postice rotundatis, adnexas, initio pallide flavis, dein ætate obscurioribus; stipite subæquali, fibrilloso, solido, albido v. pallide flavo et apice sericeo, subtus pileo concolori et fibrilloso, irregulariter striato et subreticulato, velo duplici albido v. flavido-albo quandoque anulum imperfectum efformante; sporis fusco-ochraceis, subglobosis v. late ellipsoideis, uninucleatis, $8-10 \approx 6-7$.

Hab. in humidis umbrosis sub Abietibus, Ellis Mass. Amer. bor. (G. E. MORRIS). — Pileus 3-10 cm. latus; stipes 7-10 cm. longus, 1-2 cm. crassus.

39. **Cortinarius humidicola** Kauffman, Bull. Torr. Bot. Cl., XXXII 783

(1905) pag. 322, cum icone. — Pileo plerumque 6-7 cm. lato vel usque ad 16 cm., hemisphærico, dein convexo et expanso, margine diu incurvato, primum purpureo-violaceo centro umbrino, quandoque fulvo, in roseo-fulvum nutante; margine et pileo initio fibrilloso-sericeo, hygrophano; superficie punctata, primum æquali; carne lavandulacea sed mox sordide alba; lamellis latis, 2 cm., primum lavandulaceis mox e pallido brunneo-cinnamomeis, subdistantibus, crassis, dente emarginatis, primum rectis dein ventricosus; acie leniter serrulata concolori; stipite valido, firmo, 8-10 cm. longo v. usque ad 13 cm., 1-2 cm. crasso, plerumque supra incrassato, basi attenuato, sæpe curvulo, maturo pileo concolori, hygrophano, mox cavernoso; anulo facile secedenti; cortina violaceo-alba; sporis 7-9 \times 5-6, sublevibus; basidiis 40 μ . circ. long.

Hab. gregarius in abietinis, Freeville N. Y. Amer. bor.

40. **Cortinarius deceptivus** Kauffman, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII 784

(1905) p. 325, cum icone; Journ. of Mycol. (1907) tab. 100, fig. 1. — Pileo 1-7 cm. lato, e suborbiculari hemisphærico, demum convexo-campanulato, fulvo-lavandulaceo tincto, disco subalutaceo, primum minute brunneo-squamuloso, dein subglabro, parum hygrophano, demum ruguloso; carne hygrophana, pallida, primum sublavandulacea, demum in colorem suberinum nutante, centro crassiore, contextu spongioso; lamellis 3-5 mm. latis, crassis, moderate confertis, adnatis, emarginatis, ad marginem pilei attenuatis, primum lavandulaceis demum pallide castaneis; stipite primum subvalido, dein angusto, 3-6 cm. longo, clavato, solido, fibrillis e lavandulaceo albidis demum evanidis tecto; sporis 7-9,5 \times 6-7, e subsphæroideo late ellipsoideis, asperatis.

Hab. gregarius in silvis abietinis prope Ithaca New York Amer. bor.

41. **Cortinarius croceicolor** Kauffman, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII 785

(1905) p. 323, cum icone; Journ. of Mycol. (1907) tab. 93; Hard, Mushrooms, pag. 304. — Pileo 3-7 cm. lato, e convexo expanso, flavo-croceo, disco squamulis erectis copiosis, obscure brunneis prædito; superficie subvelutina, parum hygrophana, æquali; carne flavido-alba, marginem versus tenuata, leviter hygrophana, scissili; lamellis flavo-cremeis, subdistantibus, crassiusculis, emarginatis, latiusculis, 8-9 mm.; stipite 4-8 cm. longo, clavato-bulboso, supra 9-15 mm. cr., e flavo-cremeo croceo, supra velum pallidiore, solido, intus croceo, hygrophano, mox brunneo, mycelio flavidulo

terra adhærenti; sporis e subsphæroideo brevi ellipsoideis, 6,5-8 \approx 5,5-6,5, maturis echinulatis.

Hab. solitarius v. gregarius in silvis, Ithaca N. Y. Amer. bor.

42. **Cortinarius brunneus** (Pers.) Fr. — Syll. V, pag. 957. — var. 786
Clusii Bres. in Clus-Istvanffi Icon. fung. tab. 70; Sterb., Theatr. tab. 19, fig. H. — A typo (ex icone) differt stipite dimidio brevior et pileo magis depresso.

Hab. in silvis Hungariæ.

43. **Cortinarius assumptus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 68. — Britz. 787
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 9. — Pileo et stipite lilacinis, pallide violaceis, centro pilei flavido; stipite supra et infra albido; pileo et stipite fibrilloso, pileo 15 mm. lato, campanulato; stipite 4 cm. longo, supra 2 mm. infra 7 mm. cr., subtuberoso, farcto; lamellis 3 mm. latis, confertis, ex emarginato-adnexo adnatis, albido-griseis v. lilacinis; sporis rotundato-elongatis, flavis 10 \approx 4.

Hab. in silvis fagineis Salisburgiæ. — *Cort. iliopodio* affinis.

44. **Cortinarius præsignis** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 67. — Britz. 788
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 7. — Pileo non viscoso, fibroso, flavo-rubro-brunneo, 8 cm. lato, campanulato dein expanso; stipite farcto, fere 20 cm. longo, supra 10 mm. basi usque ad 20 mm. cr., albido, albido-fibrilloso; lamellis confertis, flavo-rubris v. flavo-rubro brunneis, adnatis, 12 mm. latis; carne sordide alba v. rubro-brunneo-flava; massa sporarum flavo-rubra; sporis flavo-auratis, rotundato-elongatis, subapiculatis, 11-12 \approx 6.

Hab. ad terram muscosam in silvis Baviariæ. — *Cort. macropodi* affinis.

45. **Cortinarius subcarnosus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 67. — Britz. 789
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) pag. 9. — Pileo 5 cm. lato, convexo, centro subdepresso, violaceo-brunneo, rubro-brunneo; stipite 4 cm. long., 7 mm. cr., albido rubro-brunneo, fibroso, cavo; lamellis 6 mm. latis, adnatis, subemarginatis, laxiusculis, rubro-brunneis, griseo-rubro-brunneis; massa sporarum flavo-brunnea; sporis 6 \approx 4.

Hab. in silvis frondosis Salisburgiæ.

46. **Cortinarius alutaceo-fulvus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 67; Britz. 790
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) pag. 9. — Pileo 10 cm. lato, convexo, late umbonato, minute fibrilloso, fere levi, brunneo, cinnamomeo-rubido v. isabellino-rubido-brunneo; stipite pallidiori præcipue ad basim, farcto 10 cm. long., supra 20 mm. cr., basi

crassiori, minute albo-fibrilloso, lamellis 12 mm. latis, subremotis, isabellinis v. rubro-brunneis, emarginato-adnatis; carne isabellina v. pallide flavido-rubro-brunnea; massa sporarum flavido-rubra, cinnamomeo-tincta; sporis flavis v. flavido-brunneis, subglobosis, apiculatis, 6-8 \approx 5-6.

Hab. in turfosis Algoviæ et Bavariæ.

47. **Cortinarius abiegnus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 67. — Britzel- 791
mayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 7. — Pileo 4 cm. lato, convexo subumbonato v. depresso, flavo-rubro, subopaco, levi; stipite 9 cm. long., supra 10 mm. basi 20 mm. cr., pallide flavo-rubido, fibrilloso-lanoso, farcto v. cavo; lamellis 8 mm. latis, emarginato-adnatis, subconfertis, cinnamomeo-rubidis vel fere rubro-brunneis; carne albida; massa sporarum flavo-rubra; sporis subglobosis, flavis, subapiculatis, 8 \approx 6-7.

Hab. in silvis Coniferarum Salisburgiæ et Bavariæ. — *Cort. licinipedi* affinis.

48. **Cortinarius inurbanus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 67. — Brit- 792
zelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 8. — Pileo 8 cm. lato, campanulato v. hemisphærico-convexo, fibroso, rubido-flavo; stipite farcto, dein subcavo, 12 cm. longo, supra 10 mm. basi 25 mm. cr., sordide albo-brunneolo, supra et infra pallidiori; lamellis 12 mm. latis, rotundatis raro sinuato-adnatis, rubro-brunneis, sæpe undulato-sinuatis, subconfertis; carne pallide albo-brunneola; massa sporarum flavo-brunnea; sporis flavis, auratis, asperulis, rotundato-elongatis, apiculatis, 10-12 \approx 6-7.

Hab. in silvis Bavariæ. — *Cort. hæmatocheli* affinis.

49. **Cortinarius fulvo-cinnamomeus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 67. — 793
Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 8. — Pileo 4 cm. lato, campanulato dein expanso, pallide rubro-lateritio rubido-cinnamomeo v. carneo, carne pallidior; stipite concolori, 8 cm. long., 6 mm. cr., basi vix incrassato, farcto, supra albido; lamellis concoloribus, 5 mm. latis, adnatis, subemarginatis, subremotis; sporis flavis, globoso-elongatis, 10 \approx 6, uno apice attenuatis.

Hab. in silvis fagineis Salisburgiæ.

50. **Cortinarius fagineti** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 67. — Britzel- 794
mayr, Revis. Hymen. IV (1899) p. 9. — Pileo 9 cm. lato, convexo, centro late depresso et tenuiter carnosio, flavo-brunneo, brunneo, vix fibroso, squamoso; stipite 11 cm. long., supra 15 mm. basi 30 mm. cr., fibroso, supra albido, basi albo-brunnescenti, cingula irregulariter attenuato brunneo; lamellis 20 mm. latis, emar-

ginato-adnatis, remotis, flavo-ochraceis, obscure flavo-ochraceis, brunneo-flavis; carne albo-brunnea; sporis flavo-brunneis asperulis, $10 \approx 8$.

Hab. in silvis fagineis Salisburgiæ. — *Cort. brunneo* affinis.

VI. *Hydrocybe*.

51. *Cortinarius ferrugineo-griseus* Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 139 795

(1910) p. 46, tab. Y, fig. 1-4, tab. Z, fig. 1-3. — Pileo convexo v. subplano, aliquando centro depresso, 3,5-10 cm. lat., margine recurvato, hygrophano, humiditate ferrugineo-brunneo, siccitate albido-griseo v. griseo, carne albida; lamellis subconfertis, adnaxis, 8-12 mm. lat., in juventute cinnamomeis v. argillaceis, maturitate brunneo-cinnamomeis; stipite æquali, basi abrupte bulboso, sericeo-fibrilloso, nitido, solido, 3,5-8,5 cm. long., 6-20 mm. cr., infra albido, supra violaceo v. omnino violaceo, aliquando colore pileo simili sed pallidiore, interne albido v. violaceo; sporis ellipsoideis, vulgo uninucleatis, $10-12 \approx 7-8$.

Hab. sub Pinis prope Natick Mass. Amer. boreal. (G. E. MORRIS). — *Cort. saturnino* proximus.

52. *Cortinarius acutoides* Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 139 (1910) 796

p. 46. — Pileo submembranaceo, conico v. subcampanulato, acuto v. acute umbonato, 8-16 mm. lat., hygrophano, primo pallido-castaneo, velo albo-floccoso, margine albido, siccitate albescente, sericeo-fibrilloso; lamellis angustis, ascendentibus, adnaxis, subdistantibus, flavido-cinnamomeis; stipite solido seu leviter cavo, 2,5-5 cm. long., 2-3 mm. cr., albo, deinde pileo concolore; sporis ellipsoideis, $8-10 \approx 6-7$.

Hab. locis humidis, Ellis Mass. Amer. bor. (E. B. BLACKFORD). — *Cort. acuto* proximus.

53. *Cortinarius aureolus* Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XXIV 797

(1895) p. 4, tab. VI, fig. 8 (extr.). — Pileo convexo, mamillato, 2-3 cm. lato, sericeo, ex ochraceo croceo; carne tenui, cremeo-ochracea, acidula; lamellis sinuatis, dein liberis, amethysteis dein rubiginosis; stipite gracili, tubuloso, cremeo, velo sericeo tecto, flavo-croceo; sporis amygdaloideis, 9-11 μ . long., aculeolatis, flavo-fulvis.

Hab. gregatim in silvis collinis, Jura Galliæ. — *Cortinario sanioso* et *Cort. helvelloidi* affinis.

54. *Cortinarius obtusus* Fr. — Syll. V, p. 981. — var. *gracilis* Qué- 798

let, Grevillea VIII (1879-1880) tab. 129, fig. 1. — A typo recedens tantum statura graciliore et ex auctore ipso nuperius (Flor. mycol. p. 134) a typo non sejungendus.

Hab. gregatim in silvis umbrosis, Jura Gallie.

55. **Cortinarius illepidus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 68. — Britzel- 799
mayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 10. — Pileo 8 cm. lato, convexo dein applanato, centro carnosio, flavo-rubro, centro brunneolo; stipite 7 cm. longo, supra 12 mm., infra 20 mm. cr., albedo v. pallide violaceo, farcto; lamellis 5 mm. latis, adnatis, confertis, obscure cinnamomeis; carne albida; massa sporarum flavo-brunnea; sporis flavis, rotundato-elongatis, apiculatis, $10 \approx 4$.

Hab. in silvis Salisburgiæ. — *Cort. cypriaco* affinis.

56. **Cortinarius subcandelaris** Britz. — Sacc. Syll. XI, pag. 68. — 800
Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. II (1899) p. 10. — Pileo aurantiaco, flavo-rubro-albido, minute fibrilloso, 6 cm. lato; stipite 5 cm. longo, 15 mm. cr., farcto, sæpe supra attenuato, basi incrassato, albo; lamellis confertis v. subconfertis, emarginatis v. rotundatis, subadnatis, plerumque adnexis, flavido-albis, ochraceis; carne alba; massa sporarum rubro-flava; sporis flavis, rotundato-elongatis, $5-6 \approx 3-4$.

Hab. in silvis Salisburgiæ et Bavariæ. — *Cortinario candelari* affinis

57. **Cortinarius Daulnoyæ** Quélet in Lucand, Champ. Fr. tab. 285. 801
(Diagnosis desideratur).

Hab. in Gallia.

PAXILLUS Fr. — Syll. V p. 983, IX p. 135, XIV p. 1135, XVI p. 111, XVII p. 81.

1. **Paxillus russuloides** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya IV 802
(1909) Pt. V, p. 299. — Pileo plano et obtuse umbonato v. infundibuliformi, viscido, 7-8,5 cm. diam.; cuticula purpurea v. lateritia separabili, interdum maculato; margine incurvo demum expanso, non striato; carne alba, crassa; stipite solido, rubro v. rubro-brunneo, minute squamuloso 3,5-4 cm. alto, 1-1,4 cm. basi cr.; lamellis subdistantibus, decurrentibus, angustis, cremeis demum brunneolis secedentibus, ut in *Paxillo involuto*, non fragilibus; sporis ochraceis, verrucosis, anguste ovoideis, obtuse apiculatis, $11-12 \approx 6-7$.

Hab. ad terram inter Strobilanthes pr. Hokgala Ceylon.

2. **Paxillus sulcatus** Patouill., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXV (1909) 803

pag. 7, tab. II, fig. 1. — Pileo carnosio, convexo-plano, brunneo, circiter 3 cm. diam., minute velutino; lamellis pure citrinis, distantibus, crassiusculis, inæqualibus, latis, triangularibus, longe decurrentibus; basidiis $30 \approx 10$; cystidiis cylindræis, luteis, $60-70 \approx 12-15$; sporis flavidis, cylindræo-fusiforibus, guttulatis, $10-12 \approx 4-5$; stipite farcto, tereti, flavo-brunneo, sursum sulcis numerosis profundis, longissimis notato, pulverulento, deorsum sensim inflatulo, hispidulo.

Hab. ad terram in Valle Da-Pounian, Annam (EBERHARDT). 804

3. **Paxillus miniatus** Rick, Broteria V (1906) p. 19. — Pileo primitus albo-pruinoso, dein glabro, miniato, splendente, versus marginem expallente, velo nullo, 8 cm. lato, 2-4 cm. cr.; margine depresso, incurvo, tenui; stipite robusto, versus pileum incrassato, albo-pruinoso, aut etiam rubescente, torto, 1 dm. longo, 1 cm. cr.; lamellis sordide albis, margine rubente, usque ad 3 mm. latis, inæqualibus, confertis, decurrentibus, subgelatinosis, facile a pileo separabilibus, carne pilei alba, solida; sporis 7-10 \approx 4-6, flavis, verrucosis, oblique ovoideis, pulchre apiculatis, membrana reticulata.

Hab. solitarius ad terram, Rio Grande do Sul Brasiliæ. — Habitus *Tricholomatis*.

4. **Paxillus corrugatus** Atkinson, Mushrooms (1903) p. 170, fig. 162. 805
Pileo laterali, reclinato, sessili, 2-5 cm. lato, versus matricem angustato, convexo dein expanso, margine involuto, e flavido stramineo-flavo ad basim rubescenti, levi v. tomentosulo; carne spongiosa, flava; lamellis flavo-aurantiacis, 2-3 mm. latis, non confertis, quandoque furcatis, tenuibus, obtusis, undulatis et crenulatis, udis ab hymenophoro facile secedentibus; sporis flavidulis, minutis, oblongis, late ellipsoideis, brevibus, quandoque subovoideis, $3 \approx 1,5-2$; basidiis minutissimis.

Hab. gregarius in ligno emortuo prope Ithaca N. York Amer. bor. — Odor etiam in sicco ingratus.

5. **Paxillus** (Lepista) **extenuatus** Fr. — Syll. V, p. 985. — var. **christianiensis** Blytt, Vid.-Selsk. Skrift. n. 6 (1904) p. 83. — A typo differt præsertim sporis globosis 6 μ . diam.; stipite basi bulboso, 6-7 cm. longo, 1,5-2 cm. cr.; pileo læte brunneo-griseo, 5-6 cm. lato; lamellis 3 mm. latis.

Hab. ad terram, pr. Christianiam in Norvegia.

6. **Paxillus** (Lepista) **intermedius** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. Skrift. (1904) n. 6, p. 83. — Pileo albido, disco brunneo, satis plano, interdum excentrico, subtiliter pubescente et adpresse

fusco-fibrilloso, nitido, margine fuscato-striato, primitus involuto; lamellis tenuibus, confertissimis, demum decurrentibus, aquose cinnamomeis v. ochraceis; stipite solido, adpresse fibrilloso, sursum subfarinoso; sporis sordide albidis.

Hab. prope Christianiam Norvegiæ.

GOMPHIDIUS Fr. — Syll. V p. 1137, XI p. 68, XIV p. 164, XVI p. 136, XVII p. 94.

1. **Gomphidius litigiosus** Britz — Sacc. Syll. XI, p. 68. — Britzel- 808
mayr, Revis. Hymenomyc. IV (1899) p. 11. — Pileo levi, subn-
tido, e griseo nigro-cyaneo v. nigro-violaceo, late conoideo et mar-
gine revoluto, 3 cm. lato; stipite 7 cm. longo, 7 mm. cr., basi
attenuato, rubro-flavido, farcto; lamellis remotis, rubido-flavis,
griseo-flavis; carne flavo-brunnea; massa sporarum griseo-brunnea;
sporis flavidis, elongatis, utrinque rotundatis, 18-20 \approx 6-8.

Hab. ad terram Bavarix. — *Gomph. roseo* affinis.

Sect. 4. Melanosporæ.

CLARKEINDA Ktze. (Syn. *Chitonia* Fr. (1836) non Moc. et Sessé (1824)
Cfr. Syll. V pag. 992; IX p. 136, X p. 9, XIV p. 149, XVI
p. 112. — Præter species sub nov. nom. (*Clarkeinda*) ll. cc. datas,
addatur: **Clarkeinda plana** (Clements, Syll. XIV p. 149) Sacc. et
Trott.

1. **Clarkeinda cellaris** Bres. Ann. mycol. III (1905) p. 162. Boudier, 809
Icon. Mycol. I (*Chitonia*). — Pileo carnosio, e convexo-pulvinateo,
explanato, glabro, levi, epidermide demum tessellato-lacera, sicco,
albo, dein subalutaceo, 6-9 cm. lato; lamellis ex albo roseis demum
fuscescentibus, postice rotundato-liberis, adpressatis, acie integra;
stipite solido, æquali, basi obovato-radicato, a pileo non discreto,
albo, fuscescente, fibrilloso-squamuloso, apice albo squamoso, gla-
brescente, 5-6 cm. longo, 1 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{4}$ cm. crasso; volva tenui, mem-
branacea, semilibera, lobata, fuscescente; carne alba, fracta ad api-
cem stipitis subfuscescente, compacta, odore nullo, sapore miti;
sporis fusco-carneis, ellipticis vel subglobosis, 8-11 \approx 6-7; basidiis
clavatis, 30 \approx 8-9.

Hab. in cellis vinariis in arena ibidem collecta « Trento », per
annum. — *Clarkeindæ Gennadii* (Chat. et Boud.) affinis, sed bene

distincta. In Syll. XIX pag. 303 paternitati nominis tribuimus: « Sacc. et Trav. » sed Bresadoliana paternitas est anterior.

CHITONIELLA Henn. — Syll. XIV p. 149.

1. **Chitoniella trachodes** (B. et Br.) Petch, Ann. R. Bot. Gard. Pe- 810
radeniya, v. IV, pt. VI (1909). Ita vocandes est *Agaricus trachodes*
Berk. — Syll. V, p. 996 — teste Petch l. c.

AGARICUS Linn. em. — Syll. V p. 996, IX p. 137, XI p. 69, XIV
p. 150, XVI p. 113, XVII p. 82.

1. **Agaricus subnitens** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXVI (1909) 811
pag. 335. — Pileo carnosio, late convexo v. in centro leviter de-
presso, dense fibrilloso, margine nitido cremeo v. alutaceo; lamellis
tenuibus, confertis, liberis, incarnatis demum atro-brunneis; stipite
æquali v. leviter infra incrassato, farcto v. fistuloso, supra albo
et fibrilloso, infra cremeo et nitido; anulo crasso, brunneo, mar-
gine albo, demum deciduo; sporis ellipsoideis, purpureo-brunneis,
6-8 × 4-5.

Hab. in quercetis, Claremont Calif. Amer. bor. (C. F. BA-
KER). — Pileus 4,5-9,5 cm latus; stipes 8,5-13 cm. longus, 1-1,5
mm. cr.

2. **Agaricus posadensis** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires, t. XIX 812
(1909) p. 268. — Solitarius; pileo plano-expanso non umbonato,
margine vix incurvo, estriio, subargenteo, minute adpresseque fi-
brilloso-squamuloso, margine angustissime appendiculato, 10-12 cm.
diam. 0,5-1 cm. alt.; carne a stipite discreta, subexsucca alba tenui,
2 mm. cr., fragrante; stipite a pileo eximie discreto facillimeque
secedente, farcto, albo-pruinuloso, cylindraceo, 10-15 cm. longo,
10-12 mm. diam., basi abrupte bulboso, 20-25 mm. diam. ad ter-
tium superum anulo tenacello integerrimo 3 cm. longo, plicato
albo, ad epiphyllum levi ad hypophyllum verruculoso ornato; la-
mellis angustis, 55 mm. long., 7-9 mm. latis, polymacriis, confer-
tissimis non succosis, antice acutatis postice subattenuato-rotunda-
tis a stipite remotis, acie integerrimis; sporis subfuligineis, vitro
non inspectis; odore saporeque intense funginis gratis.

Hab. frequens in pratis circa Posadas, Misiones Argentinae.

3. **Agaricus Merrillii** Copeland, Ann. Mycol. III (1905) p. 27 (*Psal-* 813
liota) et Bull. n. 28 Bureau Govern. Lab. Manila (1905) p. 144,
c. tabula. — Pileo magno, carnosulo, glabro vel squamuloso, primo
hemisphærico, apice truncato vel depresso, medio in depressione

interdum umbonulato, denique extenso, plano, marginem tenuem item planum, integrum vel inscissum, 1-2 mm. latum, velo ornatum proferente, ex albido brunneo, nitido, vetustate marcescente involuto; odore et sapore subnullis; lamellis circa 250, confertis, 5 mm. latis, ad marginem pilei subacutis, primo albidis, ad rupturam veli salmonicoloribus, postremo fusco-nigrescentibus; velo diu persistente; anulo propterea alto, utrinque albo, subtus floccoso, perlacerato, descendente; stipite sursum leniter attenuato, ad basim abrupte incrassato, farcto vel subcavo, intus extusque albido vel concolore fuscescente; sporis minutis $6 \times 3,5$, uninucleatis.

Hab. ad terram in arboreto Manila. — *Agarico platensi* Sacc. et Syd. (*A. lepiotoidi* Speg.) persimilis, differt statura grandiore, ambitu integro, anulo utrinque albo, præcipue pede abrupte incrassato. Colore glabritieque pilei insigniter variat.

4. **Agaricus phæoxanthus** Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. XXI (1905) p. 118. 814

— Pileo carnosio, plano-convexo, centro depresso, margine reflexo, albo-citrino rubido-tincto, margine æquali, centro parum floccoso-farinoso griseolo; carne firma, citrina, 12 mm. cr.; lamellis numerosis postice expansis antice attenuatis, umbrino-fuliginis marginem versus flavidis; sporis umbrinis, 6-8 \times 4-5 ovoideis 1- v. 2-guttulatis; stipite cylindrico, 2 cm. cr., æquali, ochraceo-albo, nitido, glabro, sub lente parum squamuloso, striato, regulariter striato, centro subcanaliculato, contextu duro, parum fibroso pileo concolori, basi bulboso radiciformi; velo tenuissimo, albido, basi arcte adpresso, velutino, supra libero anuliformi.

Hab. ad terram in Algeria, Africa bor. — Habitus *Agar. campestris*, etiam similis *Ag. arvensi*.

5. **Agaricus Pattersonæ** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 815

p. 347. — Pileo carnosio, firmo, convexo v. subplano, glabro vel minute sericeo, albo v. albido, sæpe squamulis brunneis signato; carne firma, alba, sapore fungino; lamellis confertis liberis, e cinnamomeo ætate nigro-brunneis v. nigris; stipite æquali supra leniter angustato, firmo, farcto, bulboso, albo v. albido, anulo albido, sæpe rupto et partim margini pilei adhærenti; sporis late ellipsoideis, 8-9 \times 5-6.

Hab. ad terram sub Pinis et Cupressis, Standford Univers. California Amer. bor. (Domina A. M. PATTERSON). — Pileus 6-14 cm. latus; stipes 7-12 cm. longus, 2-3 cm. crassus. *Agarico bulboso* affinis.

6. **Agaricus Boltoni** Copeland, Ann. mycol. III (1905) p. 27 et Bull. 816

n. 28 Bureau Govern. Lab. Manila, 1905, pag. 144, c. tabula. — Pileo 10-15 cm. lato, carnosus, primo globoso, dein cylindrico, conico, postremo plus minus plano, squamis brunneis apicem versus majoribus obtecto, disco fusco, fisso, plano vel umbonulato; carne alba, sapida, fere inodora; lamellis multis, confertis, liberis, 6 mm. latis, ex albido tarde fuscescentibus; stipite valido, 8-15 cm. alto, e farcto cavo, sublevi, basi globoso; anulo fixo. declinato, subintegro, persistente, amplo; sporis breviter appendiculatis, 8-9 \approx 5-6.

Hab. in pascuis apricis, vulgaris, Davao, Mindanao ins. Philipp. — Species insignis.

7. **Agaricus bivelatus** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXVI (1909) 817 p. 335. — Pileo carnosus, tenui, late convexo, radiatim fibrilloso, floccoso, cremeo incarnato leviter tincto, in centro fumoso-brunneo; lamellis tenuibus, confertis, liberis, incarnatis demum atro-brunneis; stipite æquali v. leviter bulboso, glabro, nitido, farcto v. fistuloso, cremeo, ad apicem floccis albis, anulo duplici angusto, demum evanescente; sporis subglobosis, 5-6 \approx 4-5.

Hab. in quercetis, Claremont Californiae Amer. bor. (C. F. BAKER). — Pileus 4-5 cm. latus; stipes 3,5-6 cm. longus, 8-11 mm. crassus.

8. **Agaricus abruptus** Peck, Mem. N. Y. St. Mus. n. 4, v. III (1900) 818 p. 163, tab. 59, fig. 814. *Ag. arvensis* Sch. var. *abruptus* Peck, N. Y. St. Mus. Rept. 46 (1893) p. 55, *Agar. abruptibulbus* Peck, Bull. N. York St. Mus. n. 94 (1905) p. 36. — Pileo initio ovato, dein convexo v. subplano, dein tenui et fragili, 5-10 cm. lato, levi v. leniter sericeo lucenti, albo, arescendo plerumque flavo, carne alba; lamellis angustis, confertis, tenuibus, liberis, initio albis vel albidis, mox rubris, demum brunneis v. nigro-brunneis; stipite longo, æquali v. sursum leniter attenuato, cavo, v. farcto, basi subbulboso, albo, anulo amplo sed variabili, molli, integro v. lacerato, tomentosus et flavido in parte superiore prædito, 7,5-12 cm. longo, 7,5-15 mm. cr.; sporis brunneis, ellipsoideis, 6-7,5 \approx 4,5.

Hab. ad terram in America bor.

9. **Agaricus manilensis** Copel, Ann. Myc. III (1905) p. 28; Dept. 819 Inter. Bur. et Hort. Lab. Manila, Bull. XXVIII, 1905. — Pileo carnosulo, convexo, levi, squamuloso, disco plano atro-brunneo, ad marginem squamulis parcius asperso ibique albescente; lamellis liberis, superne rotundatis roseis fuscescentibus; sporis ca. 7,5 \approx 4, obtusis; basidiis obliquis; stipite æquali vix solido, glabro, levi, 5 cm. alto, 2,5 mm. crasso; anulo fixo, integro, facie superiore convexa.

Hab. ad terram graminosam, Manila. — *A. hæmatospermo* Bull. et *A. dyspini* B. et Br. affinis, sed ab eis satis distinctus.

10. **Agaricus Dialerii** (Bres. et Torr.) Sacc. et Trott. *Psalliota Dialerii* Bres. et Torr., Broteria IV (1905) p. 217. — Pileo carnosio ex obovato-conico campanulato-expanso, subfuscescente, 5-6 cm. lato, glabro v. vix adpresse fibrilloso; lamellis confertis, postice liberis, anulato-conjunctis e roseo atro-purpureis; stipite inæquali, basi incrassato, fistuloso, 4-6 cm. longo, apice 3 mm. cr., basi 8 mm. cr.; anulo membranaceo persistente, mediano; sporis subglobosis v. ovoideis, 9-11 \times 7-9. 820

Hab. ad terram propter Caprorum habitationes (*palotas*) distr. Zumbo Mozambico (Pater DIALER). — Odor fortis carnis assatæ. 821

11. **Agaricus perfuscus** Copel., Ann. Myc. III (1905) p. 28. — Totus ubique brunneus fuscescens; odore nullo, sapore *Agarici campestris*; pileo carnosulo, mox expanso, 3-4 cm. lato, undulato, squamuloso, disco depressulo, margine valde sed fugaciter appendiculato; lamellis liberis proximis, utrinque obtusis, 4 mm. latis; sporis ellipticis, 6-6,5 \times 4,5, obscure 1-2-guttulatis; stipite valido, glabro, subcavo, æquali, 3-4 cm. alto; 3-4 mm. crasso; anulo supero, fugaci.

Hab. ad terram pinguem umbrosam, subgregarius, in horto botanico antiquo, Manila — *Ag. insinuato* Cooke et *Ag. hæmatospermo* Bull. similis.

12. **Agaricus fastigiatus** (Bres.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 1183. — *Psalliota fastigiata* Bres. in Torrend, Brotéria IX (1910) p. 84, fig. 1-3. — Pileo carnosio ex obovato campanulato expanso acute umbonato, glabro, e fulvo alutaceo, 3-6 cm. lato; lamellis liberis, confertis, evolutis fuscis; stipite cavo, glabro, longitudinaliter striato, 4-7 cm. longo, 4-8 mm. crasso, fuscidulo, basi bulboso; anulo infero, demum subdepresso; sporis oblongis, carneolis, 13-16 \times 7-9. 822

Hab. ad terram in insula Timor Oceaniæ. — Habitus fere *Inocybes fastigiatæ*!

13. **Agaricus segregatus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 70. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 12. — Pileo fibroso minute squamoso, opaco, sordide flavo-brunneo, griseo-flavo-brunneo, margine veli fragmentis cincto, 2,5 cm. lato, convexo, vix umbonato; stipite 4 cm. longo, 3 mm. cr., sæpe subincurvato, cavo, purpurascens, albo-griseo pulveraceo; carne albida et sanguineo-brunnea, sapore ingrato; lamellis liberis, rotundatis, 6 mm. latis, 823

confertis sanguineis dein rubro-brunneis; massa sporarum brunneo-nigrescenti; sporis rotundato-elongatis, $6 \approx 2-3$.

Hab. in silvis Salisburgiæ. — *Ag. montano* γ . *coriario* affinis.

14. **Agaricus eludens** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 139 (1910) p. 42, 824 tab. X, fig. 6-13. — Pileo tenui, ovato, late conico seu subcampanulato, aliquando late expanso, 2,5-10 cm. lato, prima ætate brunneo deinde albido, squamulis brunneis fibrillosis tecto, centro glabro, brunneo, margine initio lamellas excedente; carne alba, ubi vulnerata rufescente; lamellis tenuibus, confertis, angustis, liberis, albidis, mox incarnatis, deinde nigro-brunneis; stipite firmo, subæquali, aliquando basi incrassato sæpe leviter bulboso, 2,5-7 cm. longo, 4-8 mm. cr., fibroso, sericeo, albo, intus e cavo farcto; carne alba, ubi vulnerata sanguinea, deinde brunnea v. nigra, anulo crasso, persistenti, albo; sporis subglobosis v. ellipsoideis, $5-7 \approx 4-5$.

Hab. solitarius v. cæspitosus ad terram prope Trenton N. J.

— *Ag. placomyceti* et *approximanti* subaffinis.

15. **Agaricus argyrotectus** Copel., Ann. Myc. III (1905) pag. 28; 825 Dept. Intern. Bur. of Hort. Labor. Manila Bull. XXVIII. — Pileo 3-5 cm. lato, e conico convexo-plano, carnosulo, albido nitente, semper glabro; carne grisea immutabili, inodora, sapore *Agarici campestris*; lamellis liberis, griseo-nigrescentibus, 3 mm. latis, utrinque obtusis; stipite ægre a pileo secedente, tereti, vix deorsum incrassato, solido vel tenuiter canaliculato, 3-4 cm. alto, 4-8 mm. crasso; anulo membranaceo pendente, mox frustulatim evanescente; sporis $5,5-6 \approx 4-4,5$, eguttulatis.

Hab. in pascuis apricis sparsus, Davao, Mindanao ins. Phil. — Species *Ag. argenteo* Braendle et *Ag. argyropotamico* Speg. similis; pileo juventute conico, carne immutabili, disco item ambitu candido, sporis eguttulatis ab eis differens.

16. **Agaricus philippinensis** Berk. Enum. Fung. Philipp. in Journ. 826 of Bot. (1842) p. 144. — Pileo convexo, membranaceo, 2-3 cm. lato, croceo, verrucoso-squamoso sericeoque, margine appendiculato; lamellis fusco-purpureis; stipite æquali gracili, 2 mm. cr., croceo-tomentoso; sporis ellipsoideis, brunneo-purpureis.

Hab. ad terram in insul. Philippinis (CUMING). — Auctor *Psalliotæ* adscribit sed indicat affinitatem cum *Inoc. echinata*; an ergo potius hujus generis? Vix *Agaricus*!

17. **Agaricus approximans** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. 131 (1909) 827 pag. 33, tab. V, fig. 8-14. — Pileo tenui, 2,5-5 cm. lat., conico

v. campanulato, sæpe obtuse umbonato, squamuloso præter umbonem, sæpe radianti-rimoso, albido, squamulis brunnescentibus et umbone brunneo-nigro v. fusco, carne alba, immutabili, sapore dulci, grata; lamellis tenuibus confertis, liberis, albis deinde brunneis v. nigrescentibus; stipite æquali v. sursum attenuato, 2,5-4 cm. long., 4-6 mm. cr., farcto v. cavo, albido; anulo albo; sporis 5-6 \approx 3,5-4.

Hab. gregarius v. quandoque tantum geminus in fimetis pr. Trenton N. J., Amer. bor. (E. B. STERLING).

18. **Agaricus xanthodermus** Genev. — Syll. V, p. 1001. — var. **lepiotoides** Maire, Bull. Soc. Myc. Fr. XXIV (1908) pag. LVIII; *Agaricus cretaceus* Cooke Illustr. t. 542 (524), non Fries. — A typo differt pileo primitus albido griseo, dein squamis griseo-brunneis rimis albis interseptis, prædito.

Hab. ad terram prope Morlaix Galliæ.

19. **Agaricus chlamydopus** Peck, Bull. New York State Mus. n. 94 (1905) p. 36. — Ita vocandus *Ag. cothurnatus* Peck 1904, cfr. Syll. XVII, p. 85, non Fries. 829
20. **Agaricus halophilus** Peck, Bull. N. York St. Mus. n. 94 (1905) p. 36. — Ita dicendus *Agaricus maritimus* Peck 1899, cfr. Syll. XVI, p. 14, non Fries. — Sacc., Syll. V, p. 771 (*Inocybe*). 830
21. **Agaricus magniceps** Peck, Bull. N. York St. Mus. n. 94 (1905) p. 36. — Ita vocandus *Agar. magnificus* Peck 1899. — Sacc., Syll. XVI, p. 119 — non Fries (*Amanita*). 831
22. **Agaricus micromegethus** Peck, Bull. N. York St. Mus. n. 94 (1905) p. 36. — Ita vocandus *Agar. pusillus* Peck 1900, — Sacc. Syll. XVII, p. 85 — non Pers. (*Volvaria parvula*). 832
23. **Agaricus alphitochrous** (Berk. et Br.) Sac. et Trott. *Psalliota alphitochroa* (B. et Br.) Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya v. IV, Pt. II (1907) p. 54. — Ita vocanda est *Lepiota alphitochroa* Berk. et Br. teste Petch l. c. 833
24. **Agaricus pilosporus** Peck, Bull. N. York St. Mus. (1905) p. 36. — Ita vocandus *Agar. sphaerosporus* Peck (1904). — Sacc. Syll. XVII, p. 82 — non Krombh. (*Lepiota naucina*). 834
25. **Agaricus prærimosus** Peck, Bull. N. York St. Mus. (1905) n. 94, pag. 36. — Ita vocandus *Agar. tabularis* Peck 1898 (cfr. Sacc., Syll. XVII, p. 114) non Pers. (*Tricholoma grammopodium*) nec Fries (*Cortinarius tabularis*). 835

STROPHARIA Fr. — Syll. V p. 1012, IX p. 138, XI p. 70, XIV p. 151, XVI p. 119, XVII p. 85.

1. **Stropharia Hardii** Atk., Journ. of Mycol. XII (1906) pag. 194; 836
Hard, Mushrooms p. 321, fig. 261. — Pileo pallide ochraceo, e convexo explanato, centro crassiore, margine tenui, levi; carne flavida; lamellis subbrunneis e subelliptico subventricosis, late emarginatis, adnaxis; basidiis 4-sporis; sporis suboblongis, levibus 5-9 \approx 3-5 sub microscopio purpureo-brunneis; stipite pallide flavido, basi æquali, breviter radiciformi, supra et infra anulum transverse floccoso-squamoso; anulo membranaceo, non prominenti sed distincto, 2 cm. circ. ab apice remoto; cystidiis paucis, variabilibus.

Hab. in arvis Chillicothe, Ohio, Americæ bor. (M. E. HARD). — 837
Totus fungus 10 cm. altus; pileus 9 cm. lat.; stipes 1,5 cm. cr.

2. **Stropharia Schraderi** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII (1905) p. 80. — Pileo carnosio, firmo, e convexo subplano, sicco, fibrilloso, centro squamoso v. rimoso squamoso, initio pallido maturo rubiginoso-ochraceo; carne alba, sapore raphani; lamellis tenuibus, confertis, adnatis, ex albo brunneis; stipite brevi, solido, subæquali, albo, supra anulum farinoso, pileo concolori et supra squamoso, anulo parvo, lacerato, albo et sæpe evanescenti; sporis ellipsoideis, 7-8 \approx 4-5.

Hab. in herbidis sabulosis, Washington DC. Amer. bor. (F. F. SCHRADER). — Pileus 5-8 cm. latus; stipes 2-3 cm. longus, 8-12 mm. cr.

3. **Stropharia cubensis** Earle, Estacion Agron. Cuba, I (1906) p. 240, 838
tab. 40, fig. 1. — Pileo carnosio, 3-8 cm. diam., e convexo subplano, centro subumbonato, ochraceo-lilacino, disco primum obscuriore dein pallidiore, tenero, udo et juvenili viscoso, senio sicco et nitido, glabro non striato; lamellis adnaxis v. fere adnatis, confertis, angustis, medio ventricosis, primum griseo-pallidis dein brunneo-purpurascensibus; sporis magnis, ellipsoideis, crasse tunicatis, 13-15 \approx 9-10; velo valido persistenti anulum efformante a pileo sat distantem; stipite 6-10 cm. long., 4-10 mm. cr. basi plus minusve incrassato, sed supra tenuato, glabro, cavo et apice albo, basi rufo-cinerecente, tactu viridi-cyanescente; carne pilei firma alba in flavum vergente; sapore parum distincto sed ingrato.

Hab. solitaria v. subgregaria ad terram incultam Santjago de las Vegas et Candelaria in ins. Cuba.

4. **Stropharia drymonia** Morgan, Journ. of Mycol. XIV (1908) p. 72. 839

— Pileo carnosio, subgloboso, dein convexo, expanso et excavato v. subdepresso, 6-10 cm. diam.; carne crassa, compacta, alba; superficie levi et glabra, viscida e pallido ochracea; velo tenui et fragili, lacerato et subappendiculato; stipite elongato, supra conoideo, crasso, firmo, albo, glabro, 8-14 cm. longo, basi 6-10 mm. cr.; anulo fragili, deciduo; lamellis angustis, confertis, adnexas, primum albis dein griseo-brunneis; sporis brunneis, 5-6 \times 3-4.

Hab. in ligno putri in silvis, Preston O. Amer. bor.

5. **Stropharia micropoda** Morgan, Journ. of Mycol. XIV (1908) p. 73. 810

Pileo carnosio, subovoideo, subconvexo et expanso, obtuso, 4-7 cm. lato; carne crassa, firma, pallide flava, cuticula tenui, colore lilacino v. livido, stratu glutinoso crasso viridescenti tecto, velo lacerato, subappendiculato; stipite parvo, 3-4 cm. long., 4-7 mm. cr., solido, fibrilloso-squamoso, pallide flavo supra et intus, infra livido; anulo tenui in apice stipitis sito; lamellis latiusculis, 5-8 mm. confertis, arcuatis, emarginatis, primum pallide avellaneis dein lividis demum olivaceis; sporis in massa primum lividis, dein brunneo-olivaceis, oblongis, inæquilateralibus, 6-7 \times 3-4.

Hab. subcæspitosa ad ramos dejectos *Quercus*, *Hickoria* etc., Preston O. Amer. bor.

6. **Stropharia floccosa** Earle, Estacion Agron. Cuba I (1906) p. 241. 811

tab. 40, fig. 2. — Pileo tenui, 2-4 cm. lato, e convexo plano vel depresso, brunneo-ochraceo, ob pulverem sporarum brunneo-purpurascenti tincto, sicco dense lanoso-squamoso, non striato; lamellis adnatis v. fere adnatis, confertis, subangustis, superficie æquali unicolori dein brunneo-purpurascenti; sporis elliptico-ovoideis, 6-7 \times 4; velo valido, albido, anulum conspicuum 2 cm. a pileo circ. distantem sed demum subdeciduum efformante; stipite 4-6 cm. long., 2-4 mm. cr., cylindrico v. supra tenuato, dense villosio, albido cavo; carne pilei delicata, cinerea, sapore parum distincto, sed non grato.

Hab. cæspitosa v. gregaria ad terram Santjago de las Vegas in ins. Cuba.

7. **Stropharia sphagnicola** Maire Bull. Soc. mycol. Fr. (1910) p. 193. 812

tab. VI, f. 10-12. — Stipite fistuloso, subæquali, 2-5 cm. long., 2-4 mm. cr., albo, infra anulum superne album fugacem fibrilloso-sericeo et passim floccoso-squamuloso, supra pruinoso; pileo 1-2 cm. lat., sicco, glabro, opaco, submembranaceo e campanulato convexo, subobtusio, margine recto striatulo, umbrino-castaneo, sicco pallido, centro fulvo; lamellis subconfertis, latiusculis anguste ad-

natis, ex albido fusco-purpureis, acie albida subdenticulata; carne stipitis albida, pilei fulva; basidiis clavato-stipitatis, 4-sporis, 26-28 \approx 13-15; cystidiis 45-55 \approx 20-25; sporis coacervatis fusco-purpureis, levibus, oblongo-ellipsoideis, 10-11 \approx 4,5-5.

Hab. in paludosis inter Sphagna pr. Autun Galliæ. — *Str. hypsipodæ* proxima.

8. **Stropharia submerdaria** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 71. — Britz. 843
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 13. — Pileo 3 cm. lato, hemisphærico, umbonato v. depresso, opaco, flavo; stipite 6 cm. longo, 4 mm. cr., basi sæpe attenuato v. etiam incrassato, fibroso, albido, anuli residuis prædito; lamellis non confertis, 6 mm. latis, adnatis, emarginatis, flavo-brunneis, sæpe denticulatis; massa sporarum violaceo-nigra; sporis brunneolis dein violaceis, apice v. utrinque acutatis, 12-14 \approx 6-8.

Hab. in fimo pr. Augsburg Bavarie. — *Str. merdaricæ* affinis.

9. **Stropharia crassa** Rick, Broteria VI, (1907) p. 79, tab. I, fig. 4. 844
 — Fragilis; pileo sive albo, sive sordide rubro, fibrilloso, aquoso, sub cuticula griseo; lamellis sæpe conglutinatis; carne parum evoluta.

Hab. ad terram, Rio Grande do Sul Brasiliæ.

10. **Stropharia squarrosa** (Vahl) Morg. Journ. of Mycol. XIV (1908) 845
 p. 73. — Ita vocandus *Agaricus squarrosus* Vahl. Flor. Dan. 1191; *Agaricus depilatus* Pers. Synops. 1801; *Agar. Hornemanni* Fries, Obs. II (1818); *Stropharia depilata* (Pers.) Sacc. — Sacc. Syll. V, p. 1012 — teste Morgan l. c.
11. **Stropharia viridula** (Schæff.) Morg. Journ. of Mycol. XIV (1908) 846
 p. 74. — Ita vocandus *Agar. viridulus* Schæff. Icon. tab. I (1762) Index 1774; *Agar. æruginosus* Curt. Fl. Land. 1777, *Stropharia æruginosa* (Curt.) Quél. — Syll. V, p. 1013 — teste Morgan l. c.
12. **Stropharia distans** (Pers.) Morg. Journ. of Mycol. XIV (1908) 847
 p. 75. — Ita vocandus *Agaricus distans* Pers., Disp. meth. Fung. 1797; *Agar. squamosus* Pers., Synops. Fung. 1801, Fries Obs. Myc. II (1818), *Stropharia squamosa* (Fr.) Quél. — Syll. V, p. 1015 — observante Morgan l. c.
13. **Stropharia fœderata** (B. et M.) Morg. Journ. of Mycol. XIV 848
 (1908) pag. 70. — Ita vocandus *Agaricus fœderatus* B. et M. — Syll. V, p. 1003, teste Morgan l. c.
14. **Stropharia tuberculata** (Pat.) Morg. Journ. of Mycol. XIV (1908) 849
 p. 70. — Ita vocandum *Hypholoma tuberculatum* Patouill. Bull. Soc. Myc. Fr. 1899. — Syll. XVI, p. 124 — teste Morgan l. c.

15. **Stropharia epimyces** (Peck) Atkinson, *Plant World*, X (1907) n. 6, 850 p. 121, fig. 21-24. — Ita vocandus *Panæolus epimyces* Peck 1884. — Syll. V, p. 1121 — teste Peck.
16. **Stropharia Sullivantii** (Mont.) Morg. *Journ. of Mycol.* XIV (1908) 851 p. 69. — Ita vocanda *Psilocybe Sullivantii* (Mont.) Sacc. — Syll. V, p. 1047.

HYPHOLOMA Fr. — Syll. V p. 1027, IX p. 139, XI p. 71, XIV p. 152, XVI p. 121, XVII p. 88.

1. **Hypholoma rugocephalum** Atkins., *Mushrooms* (1903) p. 30, fig. 29; 852 Morgan, *Journ. of Mycol.* XIV (1908) p. 32. — Pileo carnosus, e convexo expanso, late umbonato; superficie glabra, radiatim rugulosa, viscidula, fulva; carne tenui, flavida; velo marginali, lacero; stipite basi bulboso, fistuloso, levi et glabro, pileo concolori, anulo tenui e residuis veli formato; lamellis latiusculis, adnatis, leniter sinuatis, 5-7 mm. latis, e sporis nigro-maculatis, acie tenuioribus; sporis purpureo-nigris, minute tuberculatis, utrinque acuminatis, 8-11 \approx 6-8; cystidiis cylindratis, apice parum expansis, hyalinis, tenuiter tunicatis, sæpe confertis.

Hab. gregarium in silvis prope New York, Ithaca Amer. bor. — Pileus 6-10 cm. latus; stipes 8-12 cm. longus.

2. **Hypholoma cærulescens** (Pat.) Sacc. et Trott. *Næmatoloma cærulescens* Pat., *Bull. Soc. Myc. Fr.* XXIII (1907) p. 78. — Stipite cylindrato, æquali, 8-12 cm. longo, 6-8 mm. cr., firmo, fibrilloso, viridi-stramineo, recto v. flexuoso; velo anuliformi, tenui, distante, brunneo-nigro; pileo globuloso dein expanso-convexo, 5-8 cm. diam., flavido-viridi, centro ochraceo-rubiginoso, squamulis minutis purpuraceis; carne alba, fracta cærulescente; cuticula difficile separabili; lamellis adnatis, adpressis, lilacino-nigrescentibus; sporis ovoideis, levibus, 13-16 \approx 10, fusco-nigris.

Hab. solitarium in herbosis Hanoi Indo-Chinæ (EBERHARDT). — Sapor dulcis, odor ingratus raphaninus. *Hyph. fasciculari* proximum, colore lamellarum, carne cærulescenti etc. mox dignoscitur.

3. **Hypholoma longipes** Karst. *Acta Soc. pro Faun. et Fl. fenn.* XXVII, 854 4 (1905) p. 12. — Admodum fragile; pileo carnosomembranaceo, convexo-explanato, sæpe disco nonnihil depresso, subumbonato, subhygrophano, primitus toto flavido, dein cinerescente v. aquose cinereo, disco flavido, siccitate vulgo medio rugoso et subinde albicante vinosoque, margine levi primaque ætate circa marginem sericello, 5-10 cm. lato; stipite æquali, basi incrassato, fistuloso,

curvato v. flexuoso, glabro, ferruginascenti, apice initio pallido nudoque, 18-20 cm. longo, circiter 5 mm. crasso; velo cito evanido; lamellis adnaxis, confertis, latiusculis, pallidis, dein cinerscentibus demumque fuscescentibus; sporis ovoideis v. ellipsoideis, ut plurimum 1-2-guttulatis, dilutis, $7-8 \approx 3-4$; cystidiis nullis.

Hab. ad parietes pineos fodinæ tectæ in horto Mustialensi Fennia.

4. **Hypholoma instratum** (Britz.) Lapl. Dict. icon. p. 173. *Agaricus instratus* Britzelmayr, Revis. Hymen. III (1899) p. 14, tab. 310, fig. 110. — Pileo hemisphærico demum expanso, 4,5 cm. lato, opaco, obscure purpureo-brunneo; stipite albo, sericeo, 7 cm. longo, 5 mm. cr., tubuloso, intus medulla aquosa farcto; lamellis non confertis, adnaxis, ventricosis, 10 mm. latis, rubro-brunneis, demum violaceo-brunneis; carne albida, dein uda brunnea; sporis brunneis, in massa violaceo-brunneis v. nigro-brunneis, rotundato-triangularibus, cuneatis, $8 \approx 4$.

Hab. ad truncos putres Populi prope Göggingen Bavariae. — *Hyph. populino* affinis species.

5. **Hypholoma echiniceps** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 371. — 856
Cæspitosum v. solitarium, 12-14 cm. altum, pileo 3-7 cm. lato; stipite 8-12 mm. cr.; pileo convexo, squamoso, ochraceo-brunneo; squamis fibrosis, acutis, densis et erectis, ad marginem pilei sæpe adpressis; lamellis 6-8 mm. latis, adnatis; basidiis $28-30 \approx 7$, tetrasporis; sporis subellipsoideis, inæquilateralibus, levibus, $7-9 \approx 3,5-5$; cystidiis cylindræis, 2, 4, 6 v. 8 in fasciculo, ad 30-40 μ . hymenium superantibus, 10-12 μ . cr.; stipite fibroso-carnoso, cavo; velo amplo, ad marginem pilei appendiculato.

Hab. ad terram in silvis Ithacæ N. Y., Crawfordsville Ind. et in cellario, Wooster Ohio; Amer. bor. — *Hyphol. pyrotricho* simile sed sporis minoribus, squamis ad centrum pileo densioribus.

6. **Hypholoma Boughtoni** Peck, New York St. Mus. Bull. n. 139 (1909) 857
pag. 23. — Pileo carnosio, excepto centro tenui, late convexo v. subhemisphærico, raro leviter umbonato, glabro v. leviter fibrilloso, sæpe concentricè et areolatim rimoso, pallide rubenti-brunneo v. griseo-brunneo; carne albida, sapore ingrato; lamellis inæqualibus, modice confertis, adnatis, purpureo-brunneis, brunneolis v. nigricantibus, obscurius punctatis, acie albidis; stipite æquali, flocoso-fibrilloso, sursum striato, cavo, albo v. albido; sporis late ellipsoideis, apiculatis, $10-12 \approx 7-8$ (in charta alba nigris).

Hab. ad terram in silvaticis et apricis prope Pittsfort et Me-

nands Amer. bor. — Pileus 2,5-7 cm. lat.; stipes 2,5-6 cm. long., 4-10 mm. cr. *Hyphol. velutino* subaffine.

7. **Hypholoma cæspitosum** (Earle) Morg., Journ. of Mycol XIV (1908) 858 p. 29, *Gymnochilus cæspitosus* Earle, Estac. Agronom. Cuba, I (1906) pag. 240, tab. 39. — Pileo carnosio, gracili, 3,5 cm. lato, convexo dein appianato, primum cinnamomeo demum pallide fulvo, disco saturatiore, glabro, hygrophano, striatulo; lamellis adnexis superficie æqualibus, primum sordide albis dein obscure fuscis; sporis ellipsoideis, $7 \approx 5$; velo albo evanido; stipite lato et valido, 6-12 cm. long., 4-6 mm. lato, cylindrico, lanosulo, albo, cavo; carne delicata, pallida, grata.

Hab. dense cæspitosum ad basim trunci, Santjago de las Vegas in ins. Cuba.

8. **Hypholoma marcescibile** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 71. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 14. — Pileo obtuso, subgloboso dein convexo-expanso, 2 cm. lato, margine veli residuis donato, e pallido griseo, albido colorato; stipite 8 cm. longo, supra 2 mm. basi quandoque usque ad 6 mm. incrassato, albo, sericeo, cavo; lamellis confertis, griseo-brunneis, griseo-violaceis, margine albo-pulveraceis; sporis globoso-elongatis, plerumque apiculatis, $14 \approx 6$.

Hab. in silvis prope Augsburg Bavarix. — *Hyph. piluliformi* affinis species.

9. **Hypholoma rigidipes** Peck, New York St. Mus. Bull. n. 139 (1909) 860 pag. 24. — Pileo carnosulo, convexo v. late convexo, 2,5-5 cm. diam., sicco, fibrilloso-squamuloso, umbrino, sæpe in centro rubescente; carne albida, sapore miti; lamellis angustis, confertis, adnexis leviter sinuatis, rufo-brunneis, deinde purpureo-atris v. nigrescentibus; stipite gracili, rigido, æquali, 5-10 cm. long., 4-6 mm. cr., cavo, fibrilloso-squamuloso, pileo colore simili; sporis subellipsoideis, apiculatis, $10-12 \approx 6-8$.

Hab. gregarium in herbidis, North River Waren co. Amer. bor. — *Hyph. lacrymabundo* proximum.

10. **Hypholoma campanulatum** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXVI 861 (1909) p. 336. — Pileo tenui, campanulato, sicco, subnitido, glabro, aliquando albi veli fragmentis leviter appendiculato, ochraceo; lamellis tenuibus, confertis, subliberis, pallido-brunneis, demum atro-brunneis, in acie albidis; stipite longo, æquali, glabro, fistuloso, albo v. cremeo, basi tomento molli albo; sporis oblongis v. ellipsoideis, atro-brunneis, $8-10 \approx 4-5$.

Hab. ad terram in silvaticis apricis, Claremont California Amer. bor. (C. F. BAKER). -- Pileus 3-4 cm. latus; stipes 8-13 cm. longus, 4-7 mm. cr.

11. **Hypholoma campestre** (Earle) Morgan, Journ. of Mycol. XIV 862 (1908) pag. 30, *Gymnochilus campestris* Earle, Estac. Agronom. Cuba I, Hongos Cubanos (1906) p. 238, tab. 38. -- Pileo carnosio, fragili, 2-5 cm. lato, campanulato dein applanato, e brunneo-griseo argillaceo, disco saturatiore, glabro et hygrophano, sicco reticulatum rimoso vix striato; lamellis adnexis v. subadnexis, confertis, angustis, primum unicoloribus et pileo obscurioribus, dein obscure fuscis; sporis ellipsoideis 8-10 \times 5-6; velo tenui filamentoso evanido; stipite fragili 4-6 cm. longo, 2-4 mm. cr., cylindrico, glabro sed apice striato et lanoso-pulveraceo, albo, cavo.

Hab. gregarium ad terram herbosam commune, prope Santjago de las Vegas in ins. Cuba. — Species edulis et grata — *Hyph. incerto* affine sed permultis characteribus diversum.

12. **Hypholoma hololanigerum** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 371. 863 Gregarium, 6-7 cm. altum, pileo 2-2,5 cm. lato; stipite 4-5 mm. crasso; pileo pallide brunneo, hygrophano, siccitate ochraceo-cremeo v. carneo-cremeo, non striato; lamellis purpureo-brunneis; stipite albo, leviter carneo; sporophoro toto squamulis longis, albidis oblecto; pileo ovato-convexo, perfragili; lamellis ellipsoideis, adnatis, margine albido; cystidiis ellipsoideis, ventricosis, 40-50 \times 12-15; sporis subellipsoideis, rubro-purpureis, levibus, 7-9 \times 3,5-4,5; stipite cavo, perfragili.

Hab. ad ligna putrida in silvis Ithacæ N. Y. Amer. bor.

13. **Hypholoma Roystoniæ** (Earle) Morgan, Journ. of Myc. XIV (1908) 864 pag. 28, *Gymnochilus Roystoniæ* Earle, Estac. Agronom. Cuba I (1906) p. 239, tab. 37, fig. 3. — Pileo carnosio, tenero, fragili, 1-3 cm. diam., convexo dein applanato, obtuso, pallido, subpurpurascenti sed arescendo albescenti, hygrophano, glabro, superficie inæquali, subreticulata et vix striata; lamellis confertis, adnexis, subangustis, superficie æquali, primum pallidis dein brunneo-purpurascensibus; sporis ellipsoideis 7-8 \times 4-5; velo tenuissimo albescente evanido; stipite brevi 2 cm. longo, 2 mm. cr., cylindrico, cavo, glabro, basi flocculoso, albo.

Hab. cæspitosum v. subcæspitosum ad truncos putres *Roystoniæ* (palmæ) prope Managna in ins. Cuba.

14. **Hypholoma Musæ** (Earle) Morg., Journ. of Mycol. XIV (1908) 865 p. 28, *Gymnochilus Musæ* Earle, Estac. Agronom. Cuba I (1906)

pag. 239, tab. 37, fig. 2. — Pileo tenui, fragili, aquoso, 1-3 cm. lato, e convexo applanato, ex ochraceo-pallido brunneo-purpureo, arescendo albescente v. pallescente, hygrophano, sericeo, vix striato; lamellis adnexas v. vix adnexas, confertis, angustis et primum albidis, dein brunneo-purpureis; sporis ellipsoideis, 6-8 \times 4-5; velo albido, tenuissimo, evanido; stipite fragili 3-6 cm. long., 2 mm. cr., cylindrico, glabro, apice leniter farinoso, basi flocculoso, albo, cavo.

Hab. cæspitosum v. subcæspitosum ad folia dejecta putrida *Musa* sp. Santjago de las Vegas in ins. Cuba.

15. **Hypholoma flocculosum** (Earle) Morg. Journ. of Mycol. XIV 866 (1908) pag. 65, *Gymnochilus flocculosus* Earle Hongos cubanos in Estac. Agronom. Cuba I (1906) p. 238, tab. 37, fig. 1. — Pileo carnoso, tenero, 2-4 cm. diam., convexo dein applanato, primum theobromino v. rubro-brunneo dein pallidiore, præcipue arescendo, parum hygrophano, primum areolis lanosis sparsis tecto dein fere glabro, non striato, margine senectute involuto; lamellis adnexas, confertis, angustis et primum pallidis, dein brunneo-purpurascens; sporis ellipsoideis, 7-9 \times 5-6, velo tenuissimo evanido; stipite brevi, duro, 2-4 cm. longo, 2-3 mm. cr., cylindrico, fibrilloso pulveraceo, superficie minute squamuloso, albo, cavo; carne odore et sapore grato fungino.

Hab. gregarium ad terram Santjago de las Vegas in ins. Cuba. — *H. campestri* affine.

16. **Hypholoma fragile** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. 131 (1909) p. 22, 867 tab. V, fig. 1-7. — Pileo tenui, fragili, 1,5-2 cm. diam., conico v. subcampanulato, maturitate convexo, obtuso v. subumbonato, primo floccoso-squamuloso et margine veli fragmentis leviter appendiculato, demum glabro, flavescente, griseo v. subochraceo, aliquando centro saturatiore; lamellis tenuibus, angustatis, confertis, adnatis, albidis, v. pallidis, demum purpureo-brunneis; stipite fragili, farcto v. cavo, 3-4 mm. cr., 3-5 cm. longo, glabro v. minute floccoso, albo; sporis 8-10 \times 4-5.

Hab. in ligno dejecto v. inter folia, Star Lake, St. Lawrence co. et prope Painter Post. Steuben Co.

17. **Hypholoma graminis** (Quélet.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 932, 868 *Dryophila graminis* Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XVI (1887) p. 6, tab. XXI fig. 3 (extr.) et l. c. (1886) p. 3 (extr.) sub *Dryoph. muricella* var. *graminis*. — Pileo convexo, dein depresso, 1-2 cm. lato, tenui, translucido, lubrico, sericeo, flavo dein fulvo, centro

brunneo-maculato; carne cremeo-jonquillea, dulci; stipite fibro-carnoso, anguste fistuloso, flexuoso, gracili, basi incrassato, fibrilloso-sericeo, cremeo-sulphureo, dein fulvo, basi albo-gossypino; cortina sericea, flava, fugacissima; sporis elliptico-pruniformibus, 7-9 μ . longis, guttulatis, flavo-fulvis.

Hab. gregatim in pratis humidis, paludibus ad radices Graminum, Caricum e Scirporum in agro Tridentino (BRESADOLA), Jura Galliæ (PELTEREAU).

18. **Hypholoma minutellum** v. Höhnelt, *Fragm. z. Mykol.*, III, Sitzb. 869 k. Ak. d. Wissensch. Wien Bd. CXVI, Abt. I, (1907) p. 98. — Pileo membranaceo, plano-convexo, exumbonato, 15 mm. lat., 3-4 mm. alt., flavo-brunneolo, centro pallidiore. margine albido, præter centrum diaphano-striato, squamulis, flocculosis, albidis, deciduis consperso, centro calvo, margine recto flocculoso, demum toto pileo nudato, griseo-brunneolo, rubescenti-tincto, atomato; stipite albo, diaphano, 1-2 cm. longo, 1,2-1,6 mm. cr., cylindrico, flexo, subfarinaceo, sursum striolato, basi incrassatulo et albo-piloso, cavo; lamellis remotiusculis, adnexas, ventricosis, segmentiformibus, dilute rubro-violaceis, dein griseo-violaceis, acie crenulatis; cystidiis brevibus, conico-ventricosis, 20-30 \times 12-16; sporis sordide violaceis, ellipsoideis, obtusis, inæquilateris, 6-7 \times 3-3,5.

Hab. gregatim ad caudices nudos v. muscosos Salicis et Populi Auen pr. Vindobonam. — Ob cystidia potius *Hypholomatis* spec. sed habitus *Psathyrae gyroflexæ*.

19. **Hypholoma appendiculatum** (Bull.) Quél. — *Syll.* V, p. 1039. — 870 var. **flocculosum** Boud. *Ic. mycol.* I, t. 137 (ser. I, p. 10). — A typo differt statura robustiore, pileo magis sulcato et floccis fasciculatis albis mox evanidis consperso.

Hab. in Gallia.

PSILOCYBE Fr. — *Syll.* V p. 1043, IX p. 140, XI p. 72, XIV p. 154, XVI p. 124, XVII p. 89.

1. **Psilocybe subagraria** Atkins., *Ann. Mycol.* VII (1909) p. 375. — 871 Pileo 3-5 cm. lato, convexo-expanso, sæpe subumbonato, sericeo, cinereo-avellaneo; lamellis subellipticis, adnexas, emarginatis, albidis, dein roseo-cinereis et tandem brunneis, leviter purpureo-tinctis; basidiis tetrasporigeris, 28-30 \times 7-8; sporis purpureo-brunneis, levibus, suboblongis v. subellipsoideis, leviter inæquilateralibus, 8-10 \times 4-5; cystidiis hyalinis, clavatis, 45-55 \times 12-15; stipite 4-5 mm.

cr., fibroso-striato, ad apicem fasciculis cellularum ornato, fistuloso, cortice subcartilagineo-carnoso, nitenti.

Hab. ad terram in silvis Ithacæ New York Amer. bor. (N. COIL, LAWRENCE, REDDICK WHETZEL). — Totus fungus 6-8 cm. altus.

2. **Psilocybe nigrella** Peck, New York St. Bull. n. 139 (1909) p. 28, 872 t. III, fig. 7-11. — Pileo tenui, late convexo v. subplano, 2,5-4 cm. diam., leviter umbonato, hygrophano, atro-brunneo, nitido, levi margineque madore obscure striato, siccitate umbrino; lamellis tenuibus, subconfertis, adnexis, atro-brunneis, acie albidis; stipite firmo, rigido, æquali, 3,5-7 cm. long., 2-4 mm. cr., medulla alba farcto, sericeo-fibrilloso, albido; sporis purpureo-brunneis v. sub-atris, ellipsoideis, 10-12 \times 6-8.

Hab. ad terram muscosam, Kerner, Albany co. Amer. bor.

3. **Psilocybe tibetensis** Masee, Kew Bull. n. 4 (1906) p. 93. — Pileo 873 submembranaceo, campanulato, dein expanso, glabro, udo viscidulo, griseo, centro brunneo v. rufescenti, margine primum involuto et albo-pruinato, 3-4 cm. lato; lamellis confertis, ventricosis, postice rotundato-adnexis, ex purpureo fuscescentibus; sporis ovatis, brunneis, 13 \times 5-6; stipite fistuloso, subæquali, concolori, glabrescenti, 2,5-3,5 cm. longo.

Hab. in sabulosis inter Phari et Shigatse, Tibet. — *Ps. cano-rubra* B. et Br. proxima.

4. **Psilocybe submaculata** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 375. 874 — Fasciculata, 2-3 cm. alta; pileo 4-10 mm. lato; convexo, primum margine incurvo, levi, hygrophano, pallide brunneo dein albido, maculis luteis ornato; lamellis adnatis, emarginatis, purpureo-brunneis; stipite albo, nitenti, fistuloso, apice leviter granuloso, ad basim mycelio ornato, 2-3 mm. cr.

Hab. ad ligna putrida in silvis Ithacæ New York Amer. bor. (LAWRENCE).

5. **Psilocybe californica** Earle, Bull. of the New York Bot. Gard. 875 (1904) p. 301. — Pileo e tenui-convexo expanso et subdepresso, 1,5-2,5 cm. lato, udo obscure brunneolo, in sicco pallido, levi v. disco parum sulcato, udo hygrophano, margine æquali; lamellis parum decurrentibus, subdistantibus, intervenosis, e pallido brunneo-fuscis; sporis fuscis, subpellucidis, ellipsoideis 6-7 \times 3-4; stipite 3-5 cm. longo, 2-3 mm. cr., æquali v. supra leniter expanso, levi, obscure brunneo, cartilagineo, cavo; carne tenui et aquosa, albida, immutabili, sapore et odore grato.

Hab. in herbidis, Stanford Univ. California (C. F. BAKER). —

Psil. fœnisecii proxima.

6. **Psilocybe agariella** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 374. — 876

Gregaria 4-6 cm. alta; pileo 1,5-2,5 cm. lato; stipite 3 mm. cr.; pileo pallide rufo-brunneo, hygrophano, siccitate subochraceo-cremeo v. caryophyllaceo-cremeo; lamellis adnatis, purpureo-brunneis, margine albidis; cystidiis lanceolatis 50-65 \times 12-15; basidiis tetrasporigeris; sporis purpureo-brunneis, levibus, subellipsoideis, 7-9 \times 4-5,5; stipite cavo, fragili.

Hab. ad terram in silvis Ithacæ N. Y. Amer. bor. (D. REDDICK et N. COIL).

7. **Psilocybe albo-brunnea** Lutz, Bull. Soc. Bot. Fr. LIV (1907) p. 191 877

cum icon. — Pileo juniore hemisphærico, albo, dein plano, brunneo, hygrophano, circa marginem albicante, usque ad 2 cm. lato; lamellis numerosis, primo cinnamomeo-brunneis dein obscurioribus, leviter sinuosis, attenuato-adnatis; stipite albido, æquali, tubuloso, 3 cm. longo, 2-3 mm. cr.; sporis fuscis, ovoideis v. paululum reniformibus, 4,5-6 μ .

Hab. in fructibus cariosis *Hyphænes* sp. Chinde Africa trop. lusitan. (LE TESTU et GATIN).

8. **Psilocybe Henningsii** Jungner, Zeitschr. f. Pflanzenkr. XVI (1906) 878

p. 131, tab. VII. — Pileo carnosulo, campanulato, dein convexo, obtuso, e cinereo fusco-brunneolo, pruinoso, ad marginem pallidiori, substriatulo, c. 10-18 mm. diam.; stipite fistuloso tereti, pallide cinereo dein fuscidulo, pruinoso, ad basim sæpe flexuoso, e sclerotio subgloboso v. subellipsoideo, rufo-brunneo c. 1-1,5 mm. diam.; lamellis late adnatis, inæquilongis, subconfertis, primo cinereis dein subatris; basidiis clavatis c. 25 \times 10, 2-4-sterigmatibus (3-4 \times 2) præditis; sporis ellipsoideo-fusoideis v. ovoideis, obtusis, rufo-brunneis, 10-13 \times 6-7, levibus.

Hab. prope Posen-West Germaniæ. — Sclerotia in foliis *Secalis cerealis* et *Tritici sativi*.

9. **Psilocybe Vanhoeffenii** P. Henn., Deutsche Südpolar-Exped. VIII 879

(1906) pag. 5 (extr.). — Pileo subcarnoso, campanulato-convexo, subruguloso, fusco-olivaceo; subglutinoso, 1-2 cm. diam., vertice subumbonato, obtuso, flavidulo, glabro, margine tenui, interdum undulato; stipite tereti, gracili, fistuloso, tenaci, corticato, levi, glabro, apice substriatulo, fuscidulo, basi incrassato, 5-8 cm. longo, 2-3 mm. cr.; lamellis subconfertis, adnato-subdecurrentibus, medio ventricosis, 3 mm. lat., brunneo-fuscis v. fusco-atris; basidiis cla-

vatis, intus granulosus, 15-22 \times 8-12; sporis ellipsoideis v. subovoideis, 2-pluri-guttulatis, 10-17 \times 7-9; episporio fusco-brunneo, levi.

Hab. ad terram in insula Nova-Amsterdam Oceani indici (Doct. VANHÖFFEN).

10. **Psilocybe Sellæ** Bresad. et Mattir., Annal. di Botan. VII (1908) 880 p. 145; Il Ruwenzori 1909; Fungi, pag. 22, tab. III, fig. 4. — Pileo submembranaceo, convexo, subhemisphærico, subpapillato, margine sulcato, 7-8 mm. lato, umbrino-fusco; lamellis concoloribus, postice plano-adnatis, triangulis, secedentibus; stipite fistuloso, glabro, concolore sed saturatiore, 2,5 cm. longo, 1 mm. cr.; sporis ovoideis, apice truncatis, sæpe uno latere depressis, rufocarneis, 13-15 \times 8-9,5.

Hab. inter Lobelias in silvis ad glaciem, Mobuku Africæ austr. supra 4000 m.

11. **Psilocybe parviducta** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 72. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 16. — Pileo 7 mm. lato, hemisphærico, centro acute umbonato, subopaco, rubro-brunneo; stipite pallide rubro-brunneo, 13 mm. long., 1 mm. cr.; lamellis adnatis, 3 mm. latis, confertis, brunneis, obscure brunneis; massa sporarum brunneo-nigra; sporis pallide violaceis, inæqualiter rotundatis, subconoideis, 8 \times 6.

Hab. in herbosis montanis Baviaræ. — *Psil. coprophilæ* affinis. 882

12. **Psilocybe subuda** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 72. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 15. — Pileo 25 mm. lato, hygrophano, campanulato, dein applanato, centro depresso umbonato, levi, opaco, sordide e flavo-rubro castaneo-brunneo, margine subpellucido; stipite 6 cm. longo, 2 mm. cr., farcto vel raro subcavo, supra albido basi rubro-brunneo, albo-fibrilloso; lamellis 4 mm. latis, confertissimis, obscure brunneo-rubris, adnatis, rotundatis v. sinuatis; massa sporarum brunneo-violacea; sporis globoso-elongatis, subapiculatis, violaceis, 8 \times 4.

Hab. in turfosis et herbosis montanis Algoviæ et Baviaræ. — *Psil. udæ* affinis.

13. **Psilocybe discordabilis** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 72. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 16. — Pileo 2 cm. lato, hemisphærico, sæpe umbonato, opaco, levi, brunneo-rubro, margine veli residuis circumdato; stipite 35 mm. longo, 3 mm. cr., farcto, fibrilloso, flavido-ochraceo, brunneolo; lamellis confertis, griseolis, flavo-rubris, griseo-brunneis, 3 mm. latis, adnatis; carne brunneola, basi in stipite nigrescente; massa sporarum vio-

laceo-brunnea; sporis lilacinis, rotundatis, uno latere subacutatis, $8 \approx 5-6$.

Hab. in herbosis montanis Algoviæ. — *Psilocybe discordanti* affinis.

14. **Psilocybe subcoprophila** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 72. — 884
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 16. — Pileo hemisphærico, parum et depresso umbonato, flavido, brunneolo, griseo- v. rubro-brunneo, 20 mm. lato; stipite recto vel curvulo, 4 cm. longo, 2 mm. cr., cavo, albido, flavo-brunneolo, basi plerumque obscuriore; lamellis remotis, griseo-rubro-brunneis late adnatis, 10 mm. latis, parum emarginatis; massa sporarum violaceo-brunneo-nigra; sporis violaceis globoso-elongatis uno apice rotundatis, altero subacutatis, $18-20 \approx 10-11$.

Hab. in fimo in Bavaria. — *Psil. coprophilæ* affinis.

15. **Psilocybe recognita** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 72. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 15. — 885
 Pileo subopaco, rubro-brunneo, 18 mm. lato, e late campanulato fere hemisphærico; stipite albido-rubro-brunneo, 5 cm. longo, 2 mm. cr.; lamellis subremotis, sordide rubro-brunneis, 4 mm. latis, adnatis, rotundatis; massa sporarum obscure brunnea v. nigro-brunnea; sporis brunneis, globoso-elongatis, utrinque attenuatis, $12 \approx 8-9$.

Hab. in arvis Baviaræ. — *Psil. atro-rufæ* affinis.

16. **Psilocybe rhombispora** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 72. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 16. — 886
 Pileo 3,5 cm. lato, hemisphærico, campanulato, convexo-applanato v. etiam centro infundibuliformi depresso, ex albido-rubro-flavo rubro-brunneo, hygrophano, vix nitido; stipite concolori sed supra pallidiori et albido-fibrilloso, 55 mm. long., 2 mm. cr., basi subincrassato, farcto v. cavo; lamellis 6 mm. latis, confertis v. subconfertis, pileo concoloribus, margine quandoque carneo, ex adnato decurrentibus; massa sporarum nigro-violacea; sporis rhomboideo-elongatis, pallide violaceis, $5-8 \approx 4-5$.

Hab. in turfosis Algoviæ et Baviaræ. — *Psil. coprophilæ* affinis.

17. **Psilocybe ammophila** (Mont.) Gill. — Syll. V, p. 1050. — var. 887
ecaudata Maire in Bull. Soc. bot. Fr. LVI (1909) [edit. 1911] p. CCLXXIX, tab. XX, f. 1-14. — A typo differt statura minore, nempe pilei diam., 1-2 cm. et stipite æquali nec radicato; sporis basi non incrassatis.

Hab. inter plantas Scirpi Holoschœni in limo sabuloso in montibus Matmata Tunisiæ. — Basidia breviter clavata, tetraspora,

22-25 \approx 11-12; sporæ ellipsoideæ, brunneæ, leves 11-15 \approx 6-7, poro apicali præditæ, basi hilo emergente destitutæ.

18. **Psilocybe conissans** (Peck) Peck, N. Y. State Mus. Bull. n. 122 888 (1908) p. 132. — Ita vocandus *Clitopilus conissans* Peck, N. Y. State Mus. Rpt. 41, p. 64, et Rpt. 42, p. 45. — Syll. IX, p. 86.

DECONICA W. Smith — Syll. V p. 1058, IX p. 141, XI p. 73, XVI p. 125.

1. **Deconica rhomboidosperma** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 368. 889 — Gregaria, 2-3 cm. alta; pileo 0,5-1 cm. lato; stipite 2 mm. crasso; pileo ovato-convexo, sicco, ad marginem leviter floccoso-appendiculato, ochraceo-pallido, luteo; lamellis castaneis, adnatis et decurrentibus, 2-3 mm. latis, margine dentatis; basidiis tetrasporis; sporis purpureo-brunneis, ovato-subrhomboideis, levibus, 5-7 \approx 4-5; stipite flexuoso, cavo, ad basim mycelio albo ornato.

Hab. ad folia et ligna putrida in silvis Ithacæ N. Y. Amer. bor. (JACKSON). — *Decon. nucisedæ* proxima.

PSATHYRA Fr. — Syll. V p. 1060, IX p. 142, XI p. 73, XIV p. 154, XVI p. 126, XVII p. 90.

1. **Psathyra vestita** Peck, New York State Mus. Bull. n. 105 (1906) 890 p. 28. — Pileo tenui, submembranaceo, ovato, conico v. subcampanulato, 9-10 mm. lato, obtuso, initio fibrillis albis floccosis tecto, plerumque rubescenti, dein pallido v. albido et sericeo fibrilloso, quandoque margine leniter striato; lamellis tenuibus, angustis, confertis, adnatis, initio albis, dein atro-brunneis; stipite æquali, cavo, flexuoso, floccoso, fibrilloso, dein sericeo fibrilloso, apice farinoso, striato, albo, 2,5-4,5 cm. longo, 2-3,5 mm. cr.; sporis purpureo-brunneis, ellipsoideis, 7,5-10 \approx 7-8

Hab. ad folia dejecta, North Elba Amer. bor.

2. **Psathyra multipedata** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII (1905) 891 p. 80. — Dense cæspitosa; pileo submembranaceo, conico v. hemisphærico, glabro, hygrophano, udo pallide-fulvo v. fusco, sicco cinereo, centro diutius humido quam margine; lamellis tenuibus, confertis, adnatis, e pallido v. griseo brunneis, margine albidis; stipite angusto, æquali, cavo, fragili, purpuraceo, dein levi v. sæpe basi fibrilloso, albo; sporis brunneis, ellipsoideis, 6-8 \approx 4-5.

Hab. in herbis St-Louis Mo. Amer. bor. (N. M. GLATFELTER). — Pileus 12-16 mm. latus; stipes 5-10 cm. longus; 2 mm. cr.

3. **Psathyra examinata** (Britz.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 527. — 892

Agar. examinatus Britzel. Revis. Hymen. III (1899) p. 17. — Sacc. Syll. XI, p. 73 (*Deconica*). — Pileo albido, griseolo, pallescente, 3 cm. lato, subconvexo, centro depresso umbonato; stipite albo, pellucido, 4 cm. longo, 2 mm. cr., cavo; lamellis remotis, griseo-rubris, adnatis, 4 mm. latis; massa sporarum violaceo-brunnea; sporis globoso-elongatis, subapiculatis, brunneis, 14-16 \times 6-8.

Hab. ad terram in hortis prope Augsburg Baviaræ. — *Psat. torpenti* affinis.

4. **Psathyra subobtusata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 74. — Britzel- 893
mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 17. — Pileo hemisphærico, sæpe depresso umbonato, opaco, hygrophano, rubro-brunneo, brunneo, nigro-brunneo, 30 mm. lato; stipite 7 cm. longo, 3 mm. cr., cavo, pellucido, albido, brunneo-rubido, basi radiciformi elongato; lamellis 6 mm. latis, griseis, rubro-brunneis, griseo-brunneis, liberis; carne in pileo nigro-brunnea, in stipite pallide rubro-brunnea; massa sporarum obscure rubro-brunnea; sporis 12-14 \times 8-10, globoso-elongatis, uno apice attenuatis, flavo-aurato-brunneis, vix pellucidis.

Hab. in turfosis Baviaræ. — *Psathyrae obtusatae* affinis.

5. **Psathyra persimplex** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 74. — Britzel- 894
mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 17. — Pileo flavo-brunneo, ex ochraceo-flavo griseolo-rubro-brunneo, flavido pallescenti, convexo, vix umbonato, 25 mm. lato; stipite ex albo rubro-brunneo levi, subpellucido, 25 mm. long., 3 mm. cr.; lamellis subconfertis, e griseo nigrescenti-rubro-brunneis; massa sporarum brunnea, brunneo-nigra; sporis brunneis, 10-12 \times 4-6.

Hab. in pascuis Salisburgiæ, Algovia et Baviaræ. — *Ps. obtusatae* affinis.

COPRINUS Pers. — Syll. V p. 1078, IX p. 144, XI p. 75, XIV p. 156, XVI p. 128, XVII p. 90 *).

1. **Coprinus giganteus** W. Rytz, Mitt. Naturforsch. Gesell. Bern (1910) 895
pag. 13 (extr.) cum tabula. — Plerumque solitarius (ut videtur); primo carnosus, clavatus; pileo e cylindrico expanso-campanulato, obtuso, centro glabro, stellato, pallide brunneo, ambitu albo, guttis hyalino-rufescentibus, roseo, mox in squamas latas, adpressas,

*) *Coprinus arenarius* Pat. — Syll. XIV, pag. 156 — ad genus proprium (*Xerocoprinus*) a cl. MAIRE (Bull. Soc. bot. Fr. 1906, p. CCXIV) erigitur.

fissas lacerato, margine revoluta, 12 cm. alto et lato; stipite 30-45 cm. alto, 2-3 cm. cr., solido, basi incrassato, superne paullo attenuato, albo, fibrillis tenuissimis, sparsis, mox nigrescentibus ornato; lamellis latiusculis, c. 1 cm. latis, adnexis, primo albis, dein purpurascens nigrisque, liquescentibus, acie roseis.

Hab. ad terram muscosam sub Abietibus, Gürmschisteges Kiental Helvetiæ.

2. **Coprinus floccoso-farinaceus** Britzelm., Revis. Hymenomyc. III 896 (1899) pag. 21, tab. 316, fig. 170. — Pileo campanulato, demum expanso et centro umbonato, 9 cm. lato, albo, floccoso-farinoso; stipite 12 cm. long., supra 7 mm. infra 12 mm. cr., floccoso-farinoso, cavo, albo; lamellis 8 mm. latis, ex adnato adnexis, subconfertis, griseo-nigris; sporis nigro-brunneis, in massa nigris, opacis, breviter ellipsoideis, 18×10 .

Hab. ad terram viarum prope Ausgburg Bavariæ. — *Copr. fimetario* sed præcipue *Copr. Britzelmayri* affinis.

3. **Coprinus viarum** Britzelm., Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 20, 897 tab. 313, fig. 149. — Pileo albido, brunneo-griseo, vestito, tomentoso, 6 cm. lato, conoideo dein expanso; stipite albo, albo-brunneo, 10-11 cm. alto, supra 3 mm. cr., basi dilatato fibrilloso; lamellis confertis, nigris, 2 mm. latis, adnexis, liberis; sporis in massa nigris, nigro-viridibus, opacis, $14-16 \times 10-12$, irregulariter citriforibus.

Hab. ad terram viarum Salisburgiæ. — *Copr. fimetario* affinis.

4. **Coprinus pseudoplicatus** Copeland, Ann. mycol. III (1905) p. 27. 898 Pileo tenui mox explanato, ca. 3 cm. lato, fugaciter squamuloso, propter tenuitatem nigrescente, per lamellas profunde scisso, margine cuspidato-dentato nec per acies lamellarum, nequaquam inter eas, fisso, disco brunneo subumbonato vel senectute concavo; lamellis circa 60, in collarium angustum adnatis, 3 mm. latis, nigris vel sporis dejectis, albescentibus; sporis magnis, $20-22 \times 11-12$, obtusis, deorsum crassioribus, nigris; basidiis 30 μ . altis, ad hymenium regulariter adspersis, intervallo 15-20 μ . separatis; stipite recto, æquali, cavo, ad 10 cm. alto, 1-4 mm. crasso, levi.

Hab. ad fimum equinum et folia putrida, Manila. — *C. plicatili* (Curt.) Fries et *C. sociato* Fries affinis. Ab eis magnitudine sporarum, lamellis haud remotis nec postice attenuatis et pileo primo floccosulo distinctus.

5. **Coprinus flavicomus** Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XXII (1893) 899 p. 3, tab. III, fig. 6 (extr.). — Pileo campanulato, 2-3 cm. lat.

e hyalino griseo, velo fugaci tenuissimo, flocculoso-pulvereo, ochraceo v. subflavo initio consperso; stipite fistuloso gracili, e hyalino albo; lamellis adnatis, angustis, hyalinis dein fusco-nigris; sporis pruniformi-polygoniis, 8 μ . longis, apice truncatis, fuscis.

Hab. in lignis putridis abietinis, Saintonge Galliæ (P. BRUNAUD). — Affinis *Copr. velato*.

6. **Coprinus Bonatii** Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XXVI (1897) 900 p. 4, tab. IV, fig. 11 (extr.). — Pileo ovoideo-campanulato, 2-3 cm. lat., membranaceo, deliquescente, striato, ex albo cinerescente æque ac velo flocculoso et deciduo; stipite tubuloso, leviter floccoso, basi bulbiloso et pilis albis hirto, ex sclerotio hypogæo, globoso-tuberculoso, nigro oriundo; lamellis adnatis, albis dein fuscis; sporis pruniformi-elongatis, 15-17 μ . long., nigris.

Hab. in solo humoso hortorum, plerumque stercorato, Haute-Saône Galliæ (G. BONATI). — Affinis *C. tuberoso*, cujus forte varietas.

7. **Coprinus Cheesmani** Th. Gibbs in Journ. Linn. Soc. XXXVIII 901 (1909) p. 413, t. 33. — Pileo tenerrimo aliquando ovato-campanulato, dein expanso, umbonato, demum sursum revolutum, plicato-sulcato et ad partem dorsalem lamellarum fisso, 20-23 mm. lat., pallide fulvo v. subrufo, disco obscuriore tandem depresso, pilis erectis, hyalinis non septatis vestito; lamellis griseo-nigricantibus, adnatis v. adnexis, angustis, 50-70 numero in pileis majoribus; stipite 4,5 cm. longo, circ. 1 mm. cr., fistuloso, flaccido, hyalino deorsum dense piloso, prope apicem glabro; sporis ellipsoideis, utrinque obtusis, fusco-purpureis, 12-16 \times 6-8.

Hab. in fimo Hippopotami pr. Victoria Falls Africae austr. — Affinis *Copr. radiato* sed omnibus partibus major.

8. **Coprinus revolutus** Copeland, Ann. mycol. III (1905) p. 26. — 902 Pileo tenui, e campanulato explanato, mox late revolutum, usque ad 2 cm. lato, disco plano fusco-granuloso, ambitu cæsi, subfurfuraceo, in lamellas sulcato; lamellis usque ad 70, stipitem subattingentibus, angustis, utrinque acutis, atris; sporis nigris, 11-13 \times 8, basi apiculatis; stipite candido, cavo, fragili, circiter 10 cm. alto, apice 1-1,5 mm. basim versus 2-5 mm. crasso, deorsum velutino.

Hab. in fimo, Manila. — *C. nebuloso* Zoll. affinis, sed stipite deorsum pubescente non bulboso distinctus. *C. Rostrupiano* Hansen similis, sed ob lamellas fissas diversus. Inter species affines lamellis confertioribus dignoscendus.

9. **Coprinus confertus** Copeland, Ann. mycol. III (1905) p. 25 et Bull. 903

n. 28 Bureau Govern. Lab. Manila (1905) p. 142, cum tabula. — Gregarius, cæspitosus, pro tempestatibus variabilissimus; pileo carnosus, conico, solo arido crassissimo, floccis gossypinis albidis, appressis dense obtecto, margine integro vel late fisso, sub Jove pluvio tenuiore, filis arachnoideis vestito, mox glabrescente, griseo-nigro, striato, disco fulvo-stramineo, margine mox lacerato; lamellis griseo-nigris, lanceolatis, liberis, approximatis, confertis; sporis ovatis, $14-16 \times 7,5-9$, apicibus truncatis, atris; stipite albo, glabro, cavo, solo arido brevi, turbinato, 2,5 cm. alto, 1,5 cm. lato, tempestate humida usque ad 16 cm. alto, 6-15 mm. crasso, æquali vel deorsum incrassato, basi æquali vel subbulboso, semper valde radicato.

Hab. in fimo equino, Manila. — A *Coprino picaceo* Fries, cui proximus, præcipue stipite basi valde radicato et substrato fimoso differt.

10. **Coprinus concolor** Copeland, Ann. mycol. III (1905) p. 26. — 904

Pileo conico, hiascente, ca. 2,5 cm. alto latoque, carnosulo, brunneo-fulvo, glabro, levissimo, non striato, margine lacerato-deliquescente, disco, concolore, umbonulato; lamellis liberis, confertis, obtusis, diu pallidis, acie fuscescentibus, 2 mm. latis; sporis fuscis, $8 \times 4-5$; cystidiis nullis stipite exannulato, cavo, levi, albido vel subfusco, usque ad 9 cm. alto, 5 mm. crasso, basi paulo incrassato.

Hab. ad terram in silvis, Todaya, Davao; alt. super mare 1000 m. — Odor nullus; sapor mitis. Ab indigenis (tribu Bagogo) sup. nomine « Libgus » comeditur.

11. **Coprinus rimosus** Copeland, Ann. mycol. III (1905) p. 26. — 905

Pileo tenui, cylindrico-campanulato vel conico, truncato, 1,5-2 cm. alto et lato, glabro, pseudo-plicato, sec. lamellas mox deorsum fisso, externe fulvo griseo, in rimis nigrescente, disco fulvo, plano vel depresso; lamellis liberis, modice remotis, stipitem versus excavatis, ad marginem obtusis, nigris pallescentibus cystidiis carentibus; sporis nigris, typicis subangularibus, $15 \times 13,5$, apicem versus crassissimis; stipite albo, glabro, æquali, cavo.

Hab. ad fimum equinum, Manila. — A *Coprino plicatili* Fries pileo non explanato, sporis crassioribus et substrato fimi distinguitur.

12. **Coprinus Bakeri** Copeland, Ann. mycol. II (1904) pag. 507. — 906

Pileo cylindrico-campanulato, mox inter lamellas fisso, primo dense tomentosofloccoso, glabrescente, disco cervino, marginem versus nigrescente, substriato; lamellis 6-10 mm. longis 1,5 mm. latis,

liberis v. subliberis, nigris; sporis nigris v. luce transmissa fuscis, ovatis, 11-13 \approx 7-8; stipite 3-4 cm. alto, 2-3 mm. cr., fibroso-farcto, basim versus leniter incrassato.

Hab. ad medullam *Yuccæ* sp. Claremont Californiae (C. F. BAKER).

13. **Coprinus volutus** Copeland, Ann. mycol. III (1905) pag. 26. — 907

Pileo tenui, glabro, mox explanato, demum revoluta val involuto, 1-1,5 cm. lato, griseo-nigrescente; disco ferrugineo, verrucoso, plano; lamellis liberis, confertis, nigris, primo utrinque obtusis, ab superficie nec a margine pilei mox fissis; sporis nigris, anguste ovatis, 12-13 \approx 6,5; stipite albo, glabro, cavo, sursum leniter attenuato, 4 cm. alto, 1-1,5 mm. crasso.

Hab. ad folia putrescentia, Manila. — A *Coprino deliquescenti*

Fries differt præcipue lamellis confertissimis, fere inter se junctis.

14. **Coprinus ater** Copeland, Ann. mycol. III (1905) p. 25. — Ino- 908

dorus, subsapidus; pileo obtuse conico, explanato, disco fulvo, ambitu primo atro-griseo mox peratro, squamulis vel granulis fuscis donato, glabrescente, ad 14 mm. lato; lamellis liberis, angustis, atris; sporis nigris, 15 \approx 9; stipite fistuloso, glabro, æquali vel sursum leviter attenuato, albo, usque ad 5 cm. alto, 1,5 mm. crasso, vulgo 2,5 cm. alto, 0,8 mm. crasso.

Hab. ad fimum equinum, Davao, Mindanao ins. Philipp.

15. **Coprinus Bryanti** Copeland, Ann. mycol. III (1905) pag. 26. — 909

Pileo ex albo brunneo-nigrescente, glabro, levi, campanulato, 6-8 mm. alto, 5 mm. lato, usque ad discum sulcato, carne ad discum griseum 1 mm. crassa, ambitu tenui, sapida, inodora; lamellis liberis, stipitem attingentibus, 1-1,5 mm. latis, fuscis, obtusis; stipite recto, albo, farcto, 2,5-3 cm. alto, 1,5 mm. crasso, æquali, glabro, sursum leniter striato, basi vix incrassato, filamentis albis 1,5 mm. longis circumdato; velo obsoleto; sporis levibus, ferrugineo-fuscis, 8 \approx 4,5, apice truncato hyalino.

Hab. ad truncum *Fici* spec. emortuæ, Insula Negros, ad ripam fluminis Gimogon. — Colore sporarum *Bolbitio* affinis, sed *Coprinus* verus. Formam minorem *Coprini* hujus legit auctor ad lignum putridum ad ripam fluminis Baroring insule Mindanao.

16. **Coprinus Coffeæ** Comes in Annuario R. Scuola sup. Agricolt. 910

Portici, Napoli (1880) p. 5 cum fig. (extr.). — Pusillus; pileo tennerrimo ex clavato campanulato, cinereo-tomentoso, mox hiascente, radiato-plicato, disco granulis umbrino-nigricantibus persistentibus consperso; stipite filiformi candido, sericeo, basi incrassata; lamellis

lamellisque paucis, nigricantibus, margine albidis; sporis... non descriptis.

Hab. in ollis pulvere decocta Coffeæ repletis, Neapoli, æstate 1880 (COMES). — Vix vel non diversus a *Copr. papillato* (Batsch) Fr.

17. **Coprinus ornatus** Copeland, Ann. mycol. III (1905) pag. 25. — 911

Inodorus, subsapidus; pileo e campanulato late conico, 12 mm. lato, obtuso, sulcato, ambitu glabro vel pulverulento, ex albido v. fulvo nigrescente, disco fulvo, granulis minutis fuscis læte asperso; lamellis 7 mm. longis, 1,2 mm. latis, anguste adnatis, cystidiis carentibus; sporis $10 \approx 7$, nigris; stipite recto, usque 2,5 cm. alto, 1 mm. crasso, æquali vel sursum leniter attenuato, subfarcto, glabro, albo vel hyalino, basi ferrugineo.

Hab. ad ligna varia terramque inter ea, vulgo solitarius, ad ripam fluminis Gimogon, Ins. Negros Philipp. — *Coprino Staudtii* P. Henn. affinis.

18. **Coprinus cordisporus** Gibbs, Yorkshire Naturlist (1908) p. 100, 912

W. G. Smith Brit. Basid. (1908) pag. 209. — Pileo cylindrico-ovato, dein expanso et sursum inflexo, tenuissimo, plicato-sulcato; margine crenato, pallido v. subochraceo, furfuraceo-papillato, medio fulvo; stipite filiformi glabro, excepta basi dense strigoso-squamulosa, albido-hyalina; lamellis liberis, subangustis; sporis cordiformibus, compressis.

Hab. in fimo equino, ovino, cuniculino in Anglia. — Totus fungus 2,5 cm. alt.; pileus 8 mm. lat.; stipes 6,8 mm. cr.

19. **Coprinus mutabilis** QuéL., Assoc. franç. Avanc. Sc. XXII (1893) 913

p. 3, t. III fig. 5 (extr.). — Pileo ovoideo-oblongo, 3-4 mm. lat., tenui, striato, breviter pilosello, crocato, dein cremeo-ochraceo, denique margaritaceo-griseo, subdiaphano; stipite tenui, fistuloso, 5-7 cm. longo, pubescenti-pruinoso, albo, dein glabro et diaphano; lamellis adnatis, linearibus, acie tantum nigris; sporis elongato-pruniformibus, 13-14 μ . long., nigris.

Hab. in herbis putrescentibus insiticius cum fimo equino, Saintorge Galliæ (P. BRUNAUD). — Affinis *C. diaphano*.

20. **Coprinus subterraneus** Roumeg., Revue Mycol. VIII (1886) p. 202. 914

tab. 60, fig. 3. — Pileo campanulato hemisphærico (numquam plane aperto) 0,5 cm. lat. et long., levi, griseo-brunneo; lamellis adnatis, griseis, demum nigricantibus, acie albis; stipite fistuloso, rigido, filiformi, pellucido, e loco valde elongato, 25-35 cm., basi non bulboso, sed e sacco 4-5 cm. longo, 2-3 cm. cr., albo, pel-

liculoso persistente oriundo; sporis navicularibus, brunneis, minimis, 3-4 μ . long. ($\frac{1}{300}$ mm. long.?).

Hab. in lapicidina cavernosa calcis phosphaticæ, Montcéré (Tarn) Galliæ (MARTY). — Teste auctore est forma e typo *Coprini velaris* fere absque dubio teratologica.

21. **Coprinus pseudo-nycthemerus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 77. — 915
 Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 21. — Pileo sulcato, flavo-griseo, griseo, centro flavido, hemisphærico, convexo, centro vix umbonato, 16 mm. lato; stipite 9 cm. long. 2 mm. cr., albido, basi leviter rubro-brunneo, cavo, ut pileo valde fragili; lamellis subconfertis, adnexus v. liberis; massa sporarum alba; sporis inæqualiter rotundatis, apiculatis, 14 \approx 10.

Hab. in silvis Baviaræ. — *Copr. nycthemero* affinis.

22. **Coprinus marculentus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 77. — Brit- 916
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 21. — Pileo albido-griseo, fibroso, 24 mm. lato, obtuso conoideo, dein expanso; stipite pellucido, albido, ut pileo fragili, 55 mm. longo, 1 mm. cr., cavo; lamellis subconfertis, nigris, adnexus v. liberis, 2 mm. latis; massa sporarum nigra; sporis fere elongato-sexangulatis v. subcitriformibus, brunneo-nigris, 10-12 \approx 8.

Hab. in fimo in Algovia. — *Copr. plicatili* affinis.

23. **Coprinus sigillatus** (Lév.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 415. 917
 — *Agaricus sigillatus* Lév., Mém. Soc. Linnéenne (1825) p. 197, pl. IX, fig. 2. — Pileo membranaceo, rufo, dense tenuiter striato, centro depresso non striato; stipite nudo, 50-70 mm. longo, gracili, fistuloso, albo, cum carne pilei contiguo; lamellis rufis, liberis, utrinque acutis.

Hab. in graminosis Galliæ.

24. **Coprinus cono-truncatus** Lév. Mém. Soc. Linnéenne (1825) p. 196, 918
 pl. IX, fig. 1. — Pileo griseo, membranaceo, striato, conico-truncato, vertice truncato non striato; stipite gracili fistuloso, albo, basi tomentoso, cum carne pilei continuo; lamellis griseis, utrinque acutis, liberis.

Hab. solitarius in graminosis Galliæ. — Totus 50 mm. alt.

25. **Coprinus lugubris** Risso, Fl. de Nice, tab. ad pag. 552-553. — 919
 Diagnosis nulla adest. Ex icone videtur *C. domestico* affinis.

Hab. in incultis agri Nicæensis.

26. **Coprinus petasiformis** (Corda) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 413. 920
 — *Agaricus petasiformis* Corda Anleit. tab. H, fig. 77²⁵⁻³² (sine diagnosi) Bischoff, Kryptog. fig. 3434. (ex opere Cordæ mutuata).

Hab. in Bohemia. — Verisimiliter est eadem species quam idem Corda in Sturm Deut. Krypt. Flora dedit ut *Agaricum micaceum* (= *Coprinus micaceus*).

27. **Coprinus miniato-floccosus** Pat. et Bres. Ita corrigendum nomen 921
(non « miniato-flexuosus ») in Syll. XVII, p. 91. Cfr. quoque Pat.
et De Mange in Bull. Soc. mycol. Fr. (1910) p. 42.

PANÆOLUS Fr. — Syll. V p. 1118, IX p. 147, XI p. 77, XIV
p. 161, XVI p. 134, XVII p. 93.

1. **Panæolus panaiensis** Copeland, Ann. mycol. III (1905) p. 27. — 922
Pileo humido, udo bibulo, sicco flocculoso, carnosio, conico, fulvo,
ad 7 cm. lato; velo fugacissimo; lamellis latis, annexis, cinereo-
nigricantibus; stipite æquali, solido, fragili, ad 12 cm. alto, 1 cm.
crasso; sporis ellipsoideis, 7,5-9 × 5,5-6,5, appendiculatis.

Hab. in fimo equino, Capiz, insula Panay.

2. **Panæolus exsignatus** (Britzelm.) Lapl. Dict. iconogr. p. 246, *Agaricus* 923
exsignatus Britzelm., Revis. Hymen. III (1899) p. 19, t. 327,
fig. 231, *Psathyra exsignata* (Britz.) Sacc. — Syll. XI, pag. 74.
— Pileo convexo, late umbonato, 5 cm. lato; pileo, stipite et carne
ex albido rubro-brunneis; stipite 13 cm. long., 5 mm. cr., basi in-
crassato et albo-fibrilloso, pulverulento; lamellis rotundatis vel
emarginato-adnatis, subconfertis, albidis, demum griseo-rubro-brun-
neis et maculis obscurioribus præditis; sporis 10-12 × 6-8, opacis,
brunneo-viridi-nigris, breviter ellipsoideis, utrinque indistincte ver-
ruciformi acutatis.

Hab. in silvis Algoviæ. — *Pan. cinctulo* affinis.

3. **Panæolus incanus** Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XXVI (1897) 924
p. 4, tab. IV, fig. 10 (extr.). — Pileo convexo dein applanato,
2-3 cm. lato, sericeo, micaceo, dein areolato-rimoso, albo, viridi-
v. purpureo-tincto; carne tenui, alba, dein rubescente; lamellis
sinuatis, ventricosis, albidis demum fusco-nigris; stipite gracili,
farinoso, albo; sporis citriformibus, 12-14 µ. long., fusco-nigris.

Hab. in cultis, Vosges, Lorraine. — Affinis *P. papilionaceo*.
Teste Quélet *Psilocybe agraria* Fr. Mon. II, p. 304 forte eadem
species est.

4. **Panæolus acidus** Sumstine, Torreyia V (1905) p. 34. — Pileo 1-3 925
cm. cr., e convexo expanso v. subplano, brevi, centro leniter car-
noso, margine tenuissimo, brunneo et flavido tincto; lamellis ad-
natis, 2-3 mm. latis, nigris, acie alba; stipite 8-10 cm. longo, an-

gusto, cavo, æquali, concolori, 2-3 mm. cr.; sporis nigris, late ovoideis, untrinque acutatis.

Hab. cæspitosus in cella vinaria ad capsam acetum continentem Amer. bor.

5. **Panæolus pseudopapilionaceus** Copeland, Ann. mycol. III (1905) 926 p. 27. — Pileo sicco, glabro, azono, carnosulo, hemisphærico, exumbonato, albido, 1,5-3 mm. lato; lamellis anguste annexis, acie concolore; stipite albido-nigrescente, firmo, diam. media altitudine 1,5-3 mm., sursum et deorsum crassescente, 6-10 cm. alto, apice albo-pulverulento; sporis 6,5-8 \approx 5-6.

Hab. ad terram fimetosam, Manila. — A *P. papilionaceo* Fries, cui habitu externo persimilis, differt stipite inæquali, lamellis minus annexis et præsertim sporis brevioribus.

6. **Panæolus semilanceatus** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. 131 (1909) 927 p. 37. — Pileo tenui, conico v. ovato, umbonato, 8-12 mm. long., 6-8 mm. lat., griseo-brunneo; lamellis ascendentibus maturitate atris; stipite gracili, 4-6 cm. long., 1-1,5 mm. cr., glabro, fistuloso, fusco; sporis ellipsoideis, compressis, magnitudine variabilibus, atris, 12-18 \approx 8-12.

Hab. ad terram, Dawson, America Britannica (E. B. STERLING).

7. **Panæolus obtusisporus** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 77. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 19. — Fragilis; pileo 25 mm. lato, opaco, flavo-brunneolo, ad marginem sulcato, campanulato, dein late convexo et umbonato; stipite pellucido, supra albido, basi brunneo-rubido, 4 cm. longo, 2 mm. cr., subcavo; lamellis subconfertis, brunneo-griseis, nigro-maculatis, 3 mm. latis; carne inodora et insipida; massa sporarum nigra; sporis brunneis, inæqualibus, globoso-elongatis, uno apice late obtusatis, 8 \approx 5.

Hab. in cultis Baviariæ. — *Pan. acuminato* affinis.

8. **Panæolus expromptus** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 77. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) pag. 18. — Pileo 32 mm. lato late et obtuse conoideo, vix fibroso, fere levi, brunneolo, dein flavido-pallescenti; stipite brunneo-violaceo, nigrescenti, supra albo-griseo tincto, rubro-lilacino-pallido, cavo, 6 cm. long., 5 mm. cr.; lamellis subremotis, griseo-nigris, obscure griseo-brunneis, annexis, rotundatis, 4 mm. latis; massa sporarum nigra; sporis opacis, nigro-brunneis, globosis, breviter apiculatis, 8-10 \approx 6.

Hab. in silvis prope Augsburg Baviariæ. — *Pan. papilionaceo* affinis.

9. **Panæolus cinereo-fuscus** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 77. — Brit- 930

zelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 18. — Pileo griseo-brunneo, convexo, centro plerumque depresso, 3 cm. lato; stipite supra purpureo-rubro, basi obscuriore et griseo-pulveraceo, 10 cm. longo, 2 mm. cr., cavo; carne supra in stipite flava, basi rubro-brunnea; lamellis 6 mm. latis, adnatis et subsinuatis, remotis, griseo-nigris, maculatis; massa sporarum nigra; sporis brunneo-nigris, opacis utrinque subapiculatis, $18 \approx 10$.

Hab. in silvis Salisburgiæ. — *Pan. papilionaceo* affinis.

ANELLARIA Karst. — Syll. V p. 1125, IX p. 148.

1. **Anellaria firmipes** Karst., Acta Soc. Fauna et Fl. fenn. XXVII, 931
IV (1905) p. 4. — Pileo carnosulo, convexo-campanulato, flavescenti, circiter 3 cm. lato; stipite æquali, flexuoso, pallido, annulo membranaceo, supero, basi bulbilloso, circ. 10 cm. albo, 5-10 mm. cr.; lamellis adfixis e pallido atris; sporis ellipsoideis, $16 \approx 8$.

Hab. ad terram, Listvinitchnoje in regione Baicalensi Sibiriae (O. LÖNNBOHM).

PSATHYRELLA Fr. — Syll. V p. 1126, IX p. 149, XI p. 77, XVI, p. 162, XVII p. 94.

1. **Psathyrella cæspitosa** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 932
p. 348. — Pileo tenui, convexo, subumbonato, margine striato v. sulcato, griseo-brunneo; carne grisea, sapore farinaceo; lamellis tenuibus, subdistantibus, adnatis, cinereis, dein nigris vel nigro-brunneis; stipite angusto, cavo, apice albo et farinoso, basi brunneo; sporis nigris, oblongis v. anguste ellipsoideis, $15-20 \approx 8-10$.

Hab. cæspitosa ad terram humosam, San José California (Miss A. M. PATTERSON). — Pileus 1,5-2,5 cm. latus; stipes 6-7 cm. longus, 2-3 mm. cr.

2. **Psathyrella betulina** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 933
p. 101. — Pileo tenui, submembranaceo, fragili, conico v. convexo, sæpe late umbonato, glabro, atomato, hygrophano, udo fusco vel obscure brunneo, sicco pallidiori; lamellis latis, adnatis, subdistantibus, e cinereo-nigris, margine albis; stipite fragili, æquali, cavo, glabro, lucenti, albo; sporis nigris, ellipsoideis, $8-10 \approx 5-6$.

Hab. ad ramos dejectos Betulæ albæ, Stow Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS). — Pileus 1,2-2,5 cm. latus; stipes 2,5-5 cm. longus, 1-2 mm. crassus.

3. **Psathyrella angusticeps** Peck, Bull. Torr. Bot. Cl., XXXIII (1906) 934
p. 217. — Pileo tenui, submembranaceo, conico v. subcampanulato,

subacuto, sæpe umbone parvo prominenti prædito, hygrophano, fragili, minute flocculoso, albido appendiculato, sæpe margine striato, griseo-brunneo, margine albido v. griseo; lamellis ascendentibus, tenuibus, fragilibus, moderate confertis, adnatis, pallide olivaceo-viridibus, dein obscurioribus demum nigris; stipite longo, angusto, fibroso, parum tenaci, cavo, recto v. subrecto, supra griseo, infra castaneo et ibique sæpe leniter incrassato; sporis late ellipsoideis, nigris, utrinque abrupte angustatis, 15-20 \approx 10-12.

Hab. gregaria in herbidis, Falmouth Massachusetts America bor. (S. DAVIS). — Pileus 1-2 cm. latus; stipes 5-9 cm. longus, 1 mm. c. cr.

4. **Psathyrella trepidula** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 78. — Britzel- 935
mayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 19. — Pileo sulcato, ut stipite fragili, griseo-flavo, centro rubro-brunneo, 12 mm. lato, ex obtuse conoideo fere hemisphærico; lamellis confertis, obscure brunneo-nigris, liberis, 3 mm. latis; massa sporarum nigra; sporis brunneo-nigris, opacis.

Hab. in silvis prope Augsburg in Bavaria. — *Psath. trepidæ* affinis.

5. **Psathyrella perscrutata** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 78. — Brit- 936
zelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 20. — Pileo griseo, papyraceo, margine fimbriato, convexo et centro umbonato; stipite 6 cm. longo, 2 mm. cr., cavo, supra pulveraceo, pallido, albo, flavido, basi rubro-brunneo; lamellis ex adnexo liberis, 3 mm. latis, flavo-griseis, griseis et obscurius maculatis; massa sporarum nigra; sporis citriformibus, brunneo-nigris, opacis, 14-18 \approx 8-10.

Hab. in herbidis prope Oberstausen in Bavaria. — *Ps. subtili* affinis.

6. **Psathyrella subligans** (Britz.) Sacc. — Syll. XI, p. 79. — Britzel- 937
mayr, Revis. Hymenom. III (1899) p. 20. — Pileo brunneo-griseo nigrescente, margine pallidiore, 17 mm. lato, obtuse conoideo, convexo; stipite 6 cm. longo, 3 mm. cr., supra albido basi obscuriore, nigrescenti-brunneo, farcto v. cavo; lamellis 3 mm. latis, confertis, obscure griseis, liberis; massa sporarum nigra; sporis opacis, brunneo-nigris, globosis, utrinque verruciformi-productis, 8-10 \approx 6.

Hab. in silvaticis pr. Augsburg Bavaricæ. — *Ps. pronæ* affinis.

7. **Psathyrella albido-cinerea** Britz. — Sacc. Syll. XI, pag. 79. — 938
Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. III (1899) p. 20. *Panæolus* Sacc. — Syll. XI, p. 77. — Pileo obtuse conoideo, albido, brunneolo-griseo, centro flavo-brunneo, 13 mm. lato; stipite pellucido, albo,

albido, cavo, ut pileo fragilissimo, 50 mm. longo, 2 mm. cr.; lamellis subremotis, griseis, rubido-griseis, ex adnato adnexis; massa sporarum nigra; sporis e hyalino obscure brunneis, globoso-elongatis, plerumque breviter apiculatis, $14 \approx 6-7$.

Hab. in campis Baviaræ. — *Psat. subtili* affinis.

8. **Psathyrella polaris** Rostr., Rep. second. Norweg. Arct. Exped. 939
Fram (1906) p. 4. — Pileo membranaceo, ovato-campanulato, 0,5 cm. lato, luteo-ochraceo, sulcato-striato; stipite albo, laxo, 1-2 cm. alto; sporis aterrimis, ellipsoideis, $8-9 \approx 5-6$.

Hab. in fimo Bovis moschati, Gaase Fjord in regione polari arctica.

9. **Psathyrella anguina** (Brig.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 533. 940
In agro Neapolitano. Est species omnino dubia.

MONTAGNITES Fr. — Syll. V p. 1140, XI, p. 79, XVI, p. 137, XVII p. 95.

1. **Montagnites Candollei** Fr. — Syll. V, p. 1140. — f. **isospora** Belli, 941
Ann. di Bot. vol. VI (1908) p. 526, tav. V (*M. radiosus* var. *isosporus*). — A typo videtur satis distincta sporis plerumque conformibus et paullo minoribus, mensura media $11 \approx 6$, rarius $14 \approx 8$, ovoideo-ellipsoideis, atro-fuligineis, ima basi subhyalinis; basidiis $23-25 \approx 10-12$, apice breviter 4-papillatis et tetrasporis.

Hab. in sabulosis prope Cagliari Sardinia (GENNARI, CAVARA, BELLI), ubi quoque adest *Gyrophragmium Delilei* (CAVARA). — Teste Hollós, Die Gasterom. Ungarn's, Leipzig. 1904, varia hujus generis species hucusque descriptæ essent meræ formæ unius, quam cl. Hollós nuncupat *Mont. radiosus* (Pallas) Hollós.

AGARICUS L. (sensu latissimo) — Syll. V, p. 1141. — Indicantur sequentes species perdubiæ, quarum icones memorantur in vol. XIX Syll. seu Index icon., p. 35-38:

Agaricus atro-sanguineus Cumino, **A. clavatus** Scop., **A. dentato-crenatus** Raddi, **A. dentatus** Raddi, **A. elegans** Raddi, **A. filiformis** Raddi, **A. flavescens** Scop., **A. floccosus** Valenti-Serini, **A. fusco-cano-tomentosus** Raddi, **A. fuscus** Raddi, **A. galeatus** Lév., **A. infumatus** Lév., **A. involucratus** Raddi, **A. Mila** Scop., **A. mirabilis** Lév., **A. monstrosus** Raddi, **A. nanus** Valenti-Serini, **A. niger** Raddi, **A. paradoxus** Sorokine, **A. peronatus** Valenti-Serini, **A. pezizoides** Cumino, **A. piloleus** Lév., **A. pilosus** Valenti-Serini, **A. pilosus** Raddi, **A. pubescens** Scop., **A. pygmæus** Raddi, **A. pyxidatus** Raddi,

A. radiformis Palis., **A. rapula** Valenti-Serini, **A. rhodoleucus** Lév.,
A. rubellus Raddi, **A. rubro-maculatus** Raddi, **A. rubro-striatus** Raddi,
A. subcrispus Raddi, **A. subsquamosus** Raddi, **A. tricolor** Cumino,
A. ulmarius Valenti-Serini, **A. umbraculum** Scop., **A. valens** Scop.

Fam. 2. Polyporaceæ FR.

BOLETUS Dill. — Syll. VI p. 2, IX p. 150, XI, p. 79, XIV p. 164,
 XVI p. 138, XVII p. 95.

1. **Boletus sudanicus** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. 942
 (1909) n. 2, pag. 87. — Pileo e convexo plano, centro depresso,
 luteo-fusco, sæpe diffracto, 40 cm. et ultra diam.; carne crassa al-
 bo-citrinula, mollissima, dulci, immutabili sed prope hymenium vix
 viridescenti; stipite sæpius excentrico, inferne inflato, levi v. mi-
 nute squamosulo, flavo-brunneo, apice citrino, 12-14 cm. alto,
 intus cancolori, sub ære brunnescenti; hymenio viride citrino, tu-
 bulis 15-20 mm. longis, margine centroque brevioribus, tactu brun-
 nescentibus; sporis ellipsoideis, flavo-citrinis, levibus, 8-9 \times 5.

Hab. ad terram arenosam locis umbrosis, Volto super., Ouban-
 gui medio et septentrion., Chari orient et centr, Congo, Senegal
 (LEPRIEUR) Sudan (SCHWEINFURTH). — Vulgo « Hegba mboddo »
 dictus; edulis.

2. **Boletus nobilis** Peck, 58 Rep. (1904) tab. 91 et N. York St. Mus. 943
 Bull. 94 (1905) p. 20 et p. 48, tab. 91, fig. 1-4. — Pileo firmo,
 convexo, 10-20 cm. lato, sicco, glabro, flavido-brunneo v. rubro-
 brunneo dein ochraceo v. rubro-ochraceo; carne alba, sapore dulci;
 tubulis primum albis et farctis, dein flavis v. pallide ochraceis,
 in massa plana dispositis, adnatis vel leniter depressis circa sti-
 pitem, ore parvo, rotundo; stipite æquali v. basi leniter crasso,
 solido, glabro, apice plerumque reticulato, albido v. pallido, 7,5-15
 cm. longo, 12-20 mm. cr.; sporis oblongo-fusoideis, 12-15 \times 5-5,5,
 flavidis.

Hab. in silvis prope Port Jefferson Amer. bor. — *Bol. eduli*
 et *B. affini* proximus.

3. **Boletus macrocephalus** Leuba, Champ. comest. p. 55, tab. XXXV. 944
 — Cespitosus, magnus; pileo convexo, compacto, suborbiculari;
 glabro, pallescenti-fulvo; poris minutis regularibus, luteis adnatis,
 brevissimis; carne alba firma, prope tubulos sub aëre cyanescente;

stipite centrali, carnosio, ventricosio, basi tuberoso; sporis ovoideis, pallide ochraceis.

Hab. in silvaticis muscosis Helvetiæ, rarus. — Pileus 13-16 cm. lat.; stipes basi 6 cm. diam. — Affinis *B. pachypodi* et *B. sphærocephalo*.

4. **Boletus tlemcenensis** R. Maire, Not. myc. in Ann. Myc. IV (1906) 945 p. 335; Bull. Soc. bot. de Fr. t. LIII (1906) p. CCXIV, tab. XL. — Pileo crasso, 8-12 cm. diam., sicco, levi, brunneo; stipite valido, subbulboso, e sulphureo ochraceo-brunneo, interdum ad basin rubro-tincto, granuloso-squamuloso; carne dulci, flavida, vulnerata primo immutata, tandem brunneo-purpurea; tubulis circa stipitem depressis, ex albido-griseo flavescentibus; poris minutis, rotundatis, ab initio citrinis, immutabilibus, tandem ochraceis; basidiis tetrasporis, capitatis, circa 40×12 ; sporis oblongo-fusiformibus, sub micr. dilute brunneolis, levibus, $16-24 \times 6-8$; cystidiis hyalinis, apice piliformi hymenium superantibus, $50-60 \times 8-10$.

Hab. in quercetis ex *Q. Subere* et *Q. lusitanica* consitis inter Tlemcen et Hafir Algeriæ. — *Boleto impolito* et *B. fragranti* affinis. — Edulis.

5. **Boletus Britzelmayri** Sacc. et Trott., *Bol. indecisus* Britz. (1891) — 946 Sacc. Syll. XI, p. 81. — Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. (1909) p. 207, non Peck (1888). — Pileo expanso, late umbonato, 10 cm. lato, glutinoso, e griseo griseo-brunneo, ad marginem pallidiore, isabellino-brunneo, sæpe submaculato; stipite 8 cm. long., 1,5 cm. cr., basi parum incrassato; pileo concolori, anulato, anulo e pallidiori albido; carne albida, flavida, grisea, brunneo-grisea, sapore non grato; tubulis usque ad 1 cm. long., emarginato-adnatis pileo concoloribus; poris latiusculis e rotundato elongatis, anguloso-rotundatis; massa sporarum brunnea; sporis globoso-elongatis, non guttulatis, $10-12 \times 4$.

Hab. in silvis prope Augsburg Baviariæ. — *Bol. fuligineo* affinis.

6. **Boletus Atkinsonianus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Ceratomyces Atkinsonianus* Murrill, North Amer. Fl. IX, pars 3, p. 144. — 947 Pileo e convexo fere plano, 9-14 cm. lat., 2,5 cm. cr., superficie levi, glabro, udo viscido, interdum rimoso-areolato alutaceo-fulvo, sæpe rubro-tincto, margine involuto 3 mm. extenso sterili, initio integro leviter pruinoso, contextu albo dein tactu pallide roseo; tubulis adnatis planis demum prope stipitem depressis, prima ætate stramineis et tactu immutabilibus, demum ob sporas olivaceis; ore minuto circulari, concolori, 4-5 in quoque mm., junioribus non far-

ctis, acie tenui integra; sporis fusoideis levibus, atro-olivaceis vel brunneis, 11-13 \approx 4-5; stipite sursum tenuato, basi subbulboso, glabro, levi, subconcolori, cartilagineo, apice flavido, solido, intus albo immutabili, 9-12 cm. long., 1-3 cm. cr.

Hab. in silvis deciduis ad terram, Pink Bed Walley, North Carolina Amer. bor. (MURRILL et HOUSE).

7. **Boletus Eastwoodiæ** (Murr.) Sacc. et Trott., *Suillellus Eastwoodiæ* 948

Murrill, North Am. Fl. IX, Pars 3, p. 152. — Solitarius; pileo crasso compacto hemisphærico, 10 cm. lat., superficie levi, glabro, nitido sed non viscido læte brunneo, margine integro leviter producto concolori; contextu firmo subalbo flavido-tincto, vulnerato cyanescente sed dein subalbo; tubulis adnatis ætate separabilibus 1 cm. long., concavo-planis, flavidis, ore minuto anguloso rubro; sporis oblongo-ellipsoideis levibus sub vitro pallide flavido-brunneis, 11-12,5 \approx 4-5; stipite medio valde inflato utrinque contracto, levissimo et glabro, concolori sed hinc inde roseo-tincto, basi flavido, solido, intus dilute flavido, 9 cm. long., medio 7 cm. cr.

Hab. ad terram prope S. Francisco Californiæ Amer. bor. (ALICE EASTWOOD).

8. **Boletus larignus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 81. — Britzelmayr, 949

Revis. Hymenomyc. (1909) pag. 207. — Pileo 9 cm. lato, hemisphærico v subconvexo et sæpe umbonato, pallide flavido et rubido; stipite anulato, anulo primum albido; stipite pileo concolori non foveolato; tubulis 4 mm. long., albidis, griseis, lilacino-griseis, parum decurrentibus; poris compositis, rotundato-angulatis, parietibus crassiusculis limitatis; carne alba, albida in stipite trita virescenti, odore distincto, sapore speciali nullo; massa sporarum rubido-brunnea; sporis globoso-elongatis, non guttulatis, 10-13 \approx 4.

Hab. in silvis laricinis prope Wöllenburg Baviariæ. — *B. laricino* affinis.

9. **Boletus Ridleyi** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 950

p. 207. — Pileo pulvinato, velutino, hinc inde lacunoso v. quasi alveolato, læte incarnato, sicco, 8-9 cm. lato; tubulis elongatis, adnatis, flavo-virentibus; poris angulatis v. elongato-hexagoniis, tubulis concoloribus; stipite farcto, peralto, sursum attenuato, alveolato, alveolis elongatis, pileo concolori, sursum flavicanti, 12-15 cm. longo, ad basim 3 cm. crasso; sporis fusoideis, olivaceis, 12-13 \approx 5; carne albida, spongiosa v. cavernosa, fracta subrubescenti.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Bol. subtomentoso* et *B. impolito* affinis.

10. **Boletus tomentipes** Earle, Bull. of the New York Bot. Gard. 951 (1904) p. 298. — Pileo carnosus, 3 cm. cr., 9-13 cm. diam., e convexo expanso, umbrino, sicco, primum minute velutino-tomentoso, dein glabrescente; hymenio ventricosus, profunde et late sinuato-depresso, sordide flavo, demum arescendo v. fracto, rubro-lateritio; poris parvis rotundatis, vix 1 mm. diam.; sporis brunneis, ellipsoideis, $14 \approx 7$; stipite exanulato 8-13 cm. long., 2,5-3,5 cr., cylindraceo, supra subglabrato, rubro-lateritio, subtus brunneo maculato, solido; carne albida vel brunneo-albido, fracta ad colorem cyaneum nutante.

Hab. inter folia quercina dejecta, Stanford Univ. California Amer. bor. (C. F. BAKER).

11. **Boletus albellus** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 952 p. 206. — Pileo pulvinate, carnosus, expanso-depresso v. undulato, sicco, glabro, albo, 8-10 cm. lato; tubulis albido-flavis, liberis; poris concoloribus, angulatis v. sinuato-oblongis, amplis; stipite farcto, subæquali v. leviter basi incrassato, concolori, undique reticulato, maculis flavescens variegato, 8-9 cm. longo, 2-3 cm. crasso; sporis fusiformibus, pallide, flavo-viridibus, uniguttulatis, $10-12 \approx 6-7$; carne albida, fracta sublutea, 1,5 cm. crassa.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY).

12. **Boletus tropicus** Rick, Broteria V (1906) pag. 223, VI (1907) 953 tab. VI, fig. 2. — Pileo crasso, hemisphærico, 10 cm. lato, 2 cm. crasso, depresso-undato, compacto, stramineo-fusco, squamulis adpressis ornato, rimoso-fisso, velutino; poris ochraceis, dein luteo-viridulis, elongato-irregularibus, obliquis, compositis, altitudine diversis, albo-irroratis v. fimbriatis; stipite 4 cm. alto, 2 cm. lato, versus pileum crassiore, flavescens, versus terram olivaceo-consperso, a tubulis libero, nullo modo reticulato v. striato; carne alba, firma, fracta parum rubescens; tubulis tactu non decoloratis; sporis flavidulis 7-8 μ . long., 6 μ . latis, vegetis apiculatis.

Hab. ad terram in Brasilia. — Est similis *Boleto eduli*, sed stipite non reticulato; etiam *Bol. subtomentosi* formam imitatur et forsitan identicus cum *Boleto radicante* Rostkovius.

13. **Boletus unicolor** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 954 p. 207. — Pileo pulvinate, levi, glabro, ochraceo, centro fuscidulo, margine primo involuto dein fisso, 9-10 cm. lato; tubulis ochraceo-virentibus, adnatis v. subdecurrentibus; poris angulatis amplis, ochraceo-rufescentibus; stipite solido, elato, deorsum attenuato, fibroso-striato, pileo concolori, 10-12 cm. longo, sursum 2,5 cm.

Nona nutante; ab B. unicolor. Frost!

crasso; sporis pallide ochraceis, oblongo-ellipsoideis, 11-12 \approx 5; carne persistenter alba, crassa compacta.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY).

14. **Boletus tristiculus** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 955

p. 206. — Pileo convexo-explanato, undulato, sicco, pulverulento, margine lobato, griseo-livido, 8-9 cm. lato; tubulis concoloribus, elongatis, circa stipitem profunde depressis; poris angulatis, amplis, griseo-rufescentibus; stipite solido, elongato, sursum attenuato, supra anulum obsoletum pallido reticulatoque, infra subsquamuloso, squamulis compressis, 8-9 cm. longo, 2-3 cm. crasso; sporis fusiformibus, pallidis, 8-9 \approx 4,5; carne compacta, albida, fracta subcinerescenti, 1,5 cm. crassa.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY).

15. **Boletus subpunctipes** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 956

(1907) p. 19. — Pileo carnosio, late convexo, 5-10 cm. lato, superficie sæpe inæquali, ætate molli, brunneo, in sicco rubro-brunneo; carne alba, lacerata lente brunnescente, sapore dulci; tubulis subplanis in massa, adnatis vel circa stipitem parum depressis, ore parvo, rotundo, albidis v. griseo-albidis, laceratis rubro-brunneis; stipite æquali v. subæquali, solido, apice leniter reticulato, minute maculato, quandoque apice obscure squamuloso, griseo v. pallido, 5-7,5 cm. longo, 8-12 mm. cr.; sporis ferrugineo-brunneis v. cinnamomeo-brunneis, oblongis v. fusoides, 10-12,5 \approx 5-6.

Hab. in sabulosis umbrosis Menands Albany co. Amer. bor.

16. **Boletus luteo-badius** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 80. — Britzel- 957

mayr, Revis. Hymenomyc. (1909) p. 205. — Pileo 8 cm. lato, hemisphærico, convexo et umbonato, flavo-brunneo, glutinoso, lucido-laccato; stipite 6 cm. long., usque ad 1,5 cm. cr., basi vix incrassato v. attenuato, anulato; supra anulum flavido, infra pallide flavo v. flavo punctis v. maculis obscurioribus v. brunneis signato, tubulis 1 cm. long., emarginato-adnatis, pallide griseis v. lilacino-brunneis; poris latis, rotundato-elongatis, parietibus crassiusculis præditis; laceratis primum brunneo-rubidis dein cyaneis v. violaceis; carne pallide flavida et rubido-brunnea, trita violascenti; massa sporarum brunnea; sporis globoso-elongatis, plerumque biguttulatis, 10-11 \approx 4.

Hab. in montanis Alpium Bavaricæ. — *Bol. luteo* affinis.

17. **Boletus exanulatus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 80. — Britzel- 958

mayr, Revis. Hymenomyc. (1909) p. 206. — Pileo hemisphærico usque ad 8 cm. lato, levi, ad marginem vix rugoso, flavo-ochraceo,

rubido-flavo; stipite usque ad 10 cm. long., in medio usque ad 20 mm. incrassato, supra et infra usque ad 15 mm. cr., pallide ochraceo, flavido albo, exanulato; carne flavida, odore et sapore subgrato; tubulis usque ad 10 mm. long., pallide flavis, emarginato-adnatis; poris minutis, rotundatis; sporis regulariter ellipsoideis, non guttulatis, $8 \approx 3-4$.

Hab. in silvis fagineis prope Augsburg Bavariae. — *Bol. subtomentoso* affinis.

18. **Boletus rubescens** Petch, Ann. R. Bot Gard. Peradeniya v. IV, 959 Pt. V (1909) pag. 300. — Pileo late convexo, mox undulato et margine repando, primum rubescenti v. flavo-brunneo, minute tomentoso, dein cuticula in areolas flavo-brunneas v. rufo-brunneas polygonias erumpente et tunc carnem pallide flavam crassam ostendente, sicco 6-15 cm. diam.; poris superficie primum pallide flava dein viridi-flava; poris angulatis, subaculeatis, 2-3 mm. latis, decurrentibus; stipite 3,5-5,5 cm. longo, 1,5-2,5 cm. crasso, basi attenuato, albo-griseo, minute tomentoso, non reticulato, solido, intus primum albo dein pallide flavo; sporis pallide olivaceo-brunneis, oblique ovatis, $6-7 \approx 4$.

Hab. ad terram in herbis prope Peradeniya, Ceylon.

19. **Boletus indecisus** Peck, ap. Hard Mushrooms p. 358, fig. 289, 960 non Britz. — Pileo 7-10 cm. lato, sicco, sublanuginoso, convexo, margine irregulari, quandoque undulato; carne albida immutabili, sapore grato dulci; hymenio plano firmo, griseo, dein carneo, lacerto brunnescenti; tubulis ore minute subrotundo; stipite superficie minute subfarinaceo, recto v. flexuoso, quandoque supra reticulato; sporis oblongis, brunneo-carneis, $12,5-15 \approx 4$.

Hab. ad terram in silvis Amer. bor. — *Bol. felleo* affinis, differt sapore grato et sporis brunneis. — Edulis.

20. **Boletus funerarius** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 961 p. 207. — Pileo carnosio, e subhemisphærico expanso v. depresso, subumbonato, sicco, velutino, atro-brunneo, interdum centro squamuloso, 8-10 cm. lato; tubulis stipiti adnatis, elongatis, fusciscentibus; poris magnis, elongato-hexagoniis, brunneis; stipite farcto, æquali, longitudinaliter fibroso-striato, brunneo, 5-6 cm. longo, 1-5 cm. crasso; sporis fusoides, leniter curvatis, olivaceo-griseis, $9-10 \approx 4-4,5$; carne compacta, alba, 2 cm. crassa.

Hab. ad terram Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Bol. chrysentero* proximus.

21. **Boletus extractus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 81. — Britzelm. 962

Revis. Hymenomyc. (1909) p. 206. — Pileo usque ad 7 cm. lato, hemisphærico, glutinoso, flavo-ochraceo, brunneo-flavo; stipite usque ad 6 cm. long., 1-2 cm. cr., albo-membranaceo anulato, sub anulo pileo concolori, supra pallide flavo; carne flavida, flava, basi in stipite rubida v. brunneolo-flava, odore et sapore tenui; tubulis usque ad 7 mm. longis, ex albido rubido-flavis, emarginato-adnatis, fere decurrentibus; poris parvis, compositis; massa sporarum griseo-flava; sporis globoso-elongatis, plerumque biguttulatis, 9-11 \times 3-3,5.

Hab. in silvis Algoviæ et prope Augsburg in Bavaria. — *Bol. flavido* affinis.

22. **Boletus subaureus** Peck, Edible Fungi (1900) p. 169, tab. LXI, 963 fig. 6-13. — Pileo late convexo v. subplano, glabro, viscido, pallide flavo, 5-9 cm. lato; carne pallide flava; tubulis in massa subplanis, adnatis v. leniter decurrentibus, e pallide flavo obscure ochraceis, ore parvo, subanguloso; stipite brevi, valido, æquali, firmo, glanduloso, flavo, 3,5-5,5 cm. long., 9-13 mm. cr.; sporis ferrugineo-brunneis, oblongis v. ellipsoideis, 7-10 \times 3,5.

Hab. in silvis Coniferarum in Amer. bor. — *Bol. americano* affinis.

23. **Boletus americanus** Peck in Atkinson, Mushrooms, pag. 178, 964 fig. 171; Hard, Mushrooms pag. 373, fig. 304; White, Hymen. Connecticut, tab. XXIX. — Pileo rotundato dein convexo, demum subexpanso et quandoque umbonato, molli, udo subviscido, flavo 2-7 cm. lato; strato glutinoso primum fibrillis immixto, margine copiosioribus et velo conjunctis; superficie nitida dein rubro-maculata v. punctata; tubulis subplanis latiusculis angulosis flavidis demum obscure ochraceis; stipite subæquali, flavo, dense brunneo-v. rufo-glanduloso-punctato, 3-6 cm. alto, 4-8 mm. cr.; anulo nullo.

Hab. in silvis et in herbosis Americæ bor. — A *Bol. flavido* vix diversus.

24. **Boletus Atkinsonii** Peck, N. York St. Mus. Bull. 94 (1905) p. 20, 965 t. R, f. 1-5. — Pileo carnosio, convexo v. subplano, sicco, brunneo-griseo v. flavo-brunneo, quandoque minute rimoso squamuloso, carne alba, sapore farinaceo, 7,5-10 cm. lato, striato; tubuloso, convexo, plano v. leniter concavo, adnato v. circum stipitem leniter depresso, 6-8 mm. longo, ore minuto, initio albido et farcto, dein aperto, flavo v. subochraceo; stipite robusto, 5-10 cm. longo, 12-24 mm. cr., æquali, una v. altera parte leniter attenuato,

solido, udo reticulato v. apice lineolis brunneis anastomosantibus prædito; sporis fusoides v. oblongis, 10-12,5 \times 3,5-5.

Hab. in silvis prope Port Jefferson, Amer. bor.

25. **Boletus altissimus** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 966 p. 205. — Pileo conico-convexo, dein pulvinato, glabro, ætate alveolato, rufo-brunneo, margine albido, 7-8 cm. lato; tubulis subliberis, elongatis, flavo-virentibus; poris magnis polygoniis v. flexuoso-oblongis, griseo-viridibus; stipite solido, æquali, basi incurvato, glabro, albo-brunneo, 24-28 cm. longo, 1 cm. crasso; anulo cortiniformi, supero; sporis fusiformibus, fuliginosis, 7-8 \times 4; carne compacta, albida, 1 cm. crassa, versus marginem tenuissimam.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Boleto bovino* proximus.

26. **Boletus discolor** (Quélet) Boud. Icon. mycol. I, *Dictyopus discolor* Quélet. Fl. mycol. p. 422 (1888). — Pileo convexo-plano, pruinoso, dein nudato, pallide flavo; stipite junquilleo, granulis rubro-aurantiacis punctato, basi velutino, brunneo; tubulis flavis; poris minutis, rubro-aurantiis, ad pilei marginem flavis.

Hab. in silvis sabulosis in Gallia centrali et boreali. — Ex ipso auctore potius subspecies *Bol. luridi*.

27. **Boletus alabamensis** (Murr.) Sacc. et Trott. *Ceratomyces alabamensis* Murr., North Amer. Fl. IX Prt. 3, p. 146. — Solitarius; pileo expanso plano, 7 cm. lat. superficie levi glabro flavido brunneo, cuticula partim separabili, margine tenui fertili subintegro contextu albo, rubro-tincto; tubulis adnatis decurrentibus initio flavidis ob sporas brunneo-tinctis, ore latiusculo irregulari anguloso; sporis oblongo-ellipsoideis, levibus, flavido-brunneis, 7-9 \times 3-4; stipite excentrico flexuoso sursum leviter tenuato, 7 cm. long., 1,3 cm. cr., concolori, glabro, sursum lineis brunneis reticulato.

Hab. ad terram, Auburn, Alabama Amer. bor. (UNDERWOOD et EARLE).

28. **Boletus pseudovolvatus** Leuba, Les Champ. p. 54. — Pileo hemisphærico, margine inflexo, superficie brunneo-castaneo, viscido, virgato; carne firma, inodora, alba immutabili, versus tubulos citrina, dulci; tubulis brevibus cylindricis, regularibus, citrinis, ætate brunneolis; stipite cylindræo, albo, punctato-scabro, firmo, basi incrassato et primitus volva pilei marginem attingente cincto; volva nunc evolvendo lacerata nunc anuliformi-secedente.

Hab. gregatim in abietinis Helvetiæ, rarus. — Cl. Quélet notat: an *B. flavi* forma?

29. **Boletus luteoporus** Bouchinot in Const. Suppl. Fl. Champ. et in 970
Barbier, Bull. Soc. Mycol. Fr. (1904) p. 91, t. 8. — Pileo rimoso-tes-
sellato, tomentoso, fusco, 6-12 cm. lato, sicco; carne molli, sicca,
acidula, colore purpurascenti et violaceo marmorata; tubulis, lon-
gis, angustis, profunde sinuatis, sordide flavis; poris sulphureis,
tactu lividescentibus; stipite fusoideo-radicante, tenuiter rimoso et
ubique flocculoso; sporis

Hab. in argillaceis inter Pteridem aquilinam in silva
Mirabeau, Côte-d'Or Galliæ. — Affinis *B. scabro*.

30. **Boletus flaviporus** Earle, Bull. of the New Y. Bot. Gard. (1904) 971
p. 297. — Pileo 6-9 cm. lato, subtenui, e convexo expanso, nitide
castaneo-brunneo, levi, viscido sed non glutinoso, hymenio plano,
circum stipitem profunde depresso sed 1 cm. circ. decurrente, pri-
mum nitido citrino-flavo, demum obscure flavido; poris angulosis,
parvis 1 mm., pariete tenui; sporis flavis, anguste ellipsoideis, circ.
15 \times 6; stipite exanulato, 6-9 cm. longo, 18 mm. cr., subæquali v.
leniter ventricosus, flavido et levi v. supra granulis glutinosis si-
gnato, infra tomentoso albido et lateritio maculato, solido; carne
ex albido brunnea, immutabili.

Hab. inter folia quercina dejecta, Standford Univ. California
(C. F. BAKER).

31. **Boletus macrosporus** Britzelm., Hymenom., tab. 589, fig. 83, non 972
Frost. — Pileo tomentoso, flavo-ochraceo, demum flavo-sulphu-
reo; stipite rubido-flavo, longe reticulato, reticulo rubro; strato
poroso intus saturate-flavo, extus flavo-rubro, tactu obscure viridi-
cyaneo; poris sat magnis, obtuse angulosis; carne ad basim stipitis
rubro-brunnea vel albido flavida, cyanescente; massa sporarum
viridi-brunnea; sporis flavis 18 \times 8-10.

Hab. in silvis prope Teisendorf Salisburgiæ. — *Bol. Satanas*
et *B. lupino* affinis.

32. **Boletus Cembræ** Studer, Beitr. Schweiz. Pilze b. Wallis, pag. 3, 973
tab. I (in Mitt. Naturforsch. Gesell. Bern, 1895). — Pileo sub-
carnoso, umbrino, ætate juniore glutinoso, senio sicco et subseri-
ceo; carne alba v. flavida, fracta immutata; stipite e tereti obcla-
vato, flavo-aurantio, maculis rufo-brunneis, irregularibus picto,
senio pallidiori et maculis saturatioribus; tubulis flavis v. flavo-
olivaceis; poris concoloribus inæqualiter angulosis; anulo nullo;
sporibus ellipsoideis, olivaceis, 1-2-guttulatis, 7,5 \times 3.

Hab. in silvis præsertim Pini Cembræ, Arvenwald supra
Plumatt Helvetiæ. — Habitus *B. scabrum* in memoriam revocat.

33. **Boletus griseo-roseus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Ceratomyces griseo-roseus* Murrill, North Amer. Fl. IX Part. 3, p. 139. — Pileo inæqualiter convexo, 7 cm. lat., superficie levi, udo subviscido, læte e griseo carneo, margine tenui integro fertili, contextu albo immutabili dulci; tubulis concoloribus subsinuatis fere flavis, ore minuto anguloso, acie tenui; sporis oblongo-ellipsoideis v. plerumque cylindraceis, apicibus rotundatis, levibus, flavido-brunneis, 11-13 \approx 2,5-3; stipite concolori sursum tenuato, subfibroso glabriusculo levi, cavo v. farcto, 7,5 cm. long., fere 2 cm. cr.
- Hab.* prope Mobile, Alabama Amer. bor. (C. F. BAKER).
34. **Boletus recedens** Britz. — Sacc. Syll. XI, pag. 80. — Britzelmayr, Revis. Hymen. (1909) p. 208. — Pileo conoideo et centro obtuso v. umbonato, 4 cm. lato, subglutinoso, flavo-ochraceo, rubro-flavo et margine albo-piloso; stipite 7 cm. longo, 1 cm. cr., supra attenuato basi incrassato pileo concolori; tubulis 1-2 mm. long.; stipite adnatis, flavo-brunneis v. melleo-brunneis; poris angulosis, intermixtis majoribus et minoribus; parietibus ceraceis; massa sporarum brunneola v. brunnea; sporis breviter ellipsoideis, non guttulatis, e hyalino flavis, 8 \approx 2-3; carne albido-flava, odore acuto.
- Hab.* plerumque gregarius in silvis prope Augsburg et Teisendorf Baviariæ.
35. **Boletus Morrisii** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXVI (1909) pag. 154. — Pileo carnosus, convexus, sicco, glabro, fumoso-brunneo, ambitu lutescente, margine tubulos excedente; carne flavida; tubulis primo brevissimis, minutis, aureis, deinde elongatis, convexis, circum stipitem depressis v. liberis, subrotundis, aurantiaco-brunneis; stipite æquali v. leniter basi incrassato, solido, punctis minutis rufescentibus asperato, extus lutescente, intus pallido vel colore rufo-brunneo tincto; sporis oblongo-fusoideis, olivaceis, 12-18 \approx 4-5.
- Hab.* in solo sabuloso in quercetis, Ellis Massachusetts Amer. bor. (G. E. MORRIS). — Pileus 2,5-8 cm. latus; stipes 5-8 cm. longus, 8-12 mm. crassus.
36. **Boletus aurantiacus** Jacobasch, Mitth. Thüring. Bot. Ver., N. F. XIX (1904) p. 24. — Pileo sicco, 3-7 cm. lato v. ultra, margine squamuloso, pallide flavo-aurantiaco, vetustate rubro-brunneo; tubulis læte atro-aurantiaco-flavis dein rubro-brunneis, late expansis, angulosis, contractis; sporis ex oblongo-ellipsoideo subfusoideis, rubro-brunneis, 9-13 \approx 4-5,5; stipite pallide aurantiaco-flavo, lacinia-

to-squamuloso, e basi bulbosa sursum attenuato, 5-10 cm. longo, 1,2-3 cm. cr.; carne viridi-flavo-aurantiaca dein rubro-brunneola.

Hab. in silvis prope Jena, Germania. — *Boleto eleganti et aurantiporo* proximus.

37. **Boletus subpallidus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Ceratomyces subpallidus* 978

Murrill, North Amer. Flor. IX, Part. III, p. 145. — Pileo hemisphærico parum expanso, 5 cm. lat., 2 cm. cr., superficie sicco, levi, glabro, avellaneo-isabellino, tactu subalutaceo, non albo punctato nec pellicula separabili prædito; margine integro fertili; tubulis leviter productis; contextu lacteo immutabili, ætate indurescente, spongioso-carnoso, tubulis intus flavis v. viridi-flavis hymenophorum æquantibus, adnatis planis, demum prope stipitem depressis, ore atro-melleo, ætate obscuriore, subanguloso, media magnitudine; sporis fusoides levibus sub vitro pallide ochraceis, 10-12 \times 4-5; stipite cylindrico æquali, basi curvo, albo, basim versus tenuiter sed distincte reticulato, leviter farinoso, solido, intus albo et immutabili, 5 cm. long., 1 cm. cr.

Hab. in silvaticis Pink Bed Walley, 1000 m. alt., North Carol. Amer. bor. (HAUSE et MURRILL).

38. **Boletus umbilicatus** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 979

p. 205. — Pileo convexo, profunde umbilicato, sicco, glabro, flavido-roseo, costis pallidis anastomosantibus eximie reticulato, margine albido, 4-6 cm. lato; tubulis elongatis, stipiti adnatis vel subdecurrentibus, flavo-virentibus; poris maximis, angulatis, virescentibus; stipite solido, sursum teviter incrassato, longitudinaliter striato, pileo concolori, 6-7 cm. longo, 1 cm. crasso, subinde flexuoso; sporis fusiformibus, viridi-flavescentibus, 8-9 \times 5; carne compacta, albida, 1,5 cm. crassa.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Bol. cæspitoso* proximus, differt tubulis longioribus, poris latioribus, angulosis.

39. **Boletus tunetanus** Patouill., Champ. Tunisie, p. 43, tab. V, fig. 1 980

(in Expl. scient. Tunisie). — Pileo carnoso, convexo, levi, glabro, viscidulo, pallide ochraceo, 4-5 cm. lato, margine concolori; tubulis aureis, labyrinthiformibus, radiantibus, mediis, marginem versus minoribus, 5-8 mm. long., longe lateque decurrentibus; cystidiis nullis; sporis ovato-fusoides, pluriguttulatis, ochraceis, 12-15 \times 5-6; stipite 10 cm. longo, 10-12 mm. cr., cylindræo-flexuoso, medio incrassato, deorsum regulariter attenuato, luteo, apice cristato-lamellato; carne alba, dein incarnata; stipite cavo; anulo nullo.

Hab. ad terram sub Quercubus, El-Fedja Tunisiæ.

B. pictilis
Bon

40. **Boletus pictilis** (Quél.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX p. 170. — 981

Ixocomus pictilis Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XXII (1893) pag. 4, tab. III, fig. 9 (extr.), *Ixocomus fusipes* Quél. Fl. mycol. p. 413, non Fries ex auctore. — Pileo eburneo-albo, dein margine subcitrino, 5 cm. lato; stipite albo, velo puberulo, maculato-subreticulato, guttulas resinosas fugaciter rubras, roseo-lilacinas demumque castaneas, æque ac hymenio, gerente; carne tenera, dulci nivea, sub cuticula rosea, prope hymenium stipitisque exteriorem partem citrina, demum lilacina; poris sinuatis; denticulatis, e flavido olivaceis; sporis oblongo-ovoideis, 10 μ . longis, flavo-fulvis.

Hab. in silvis acerosis in Vogesis et Alpibus.

41. **Boletus bicolor** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 982

p. 205. — Pileo pulvinate, dein plus minusve depresso-undulato, glabro, sicco, aurantiaco centro obscuriore, 5-6 cm. lato; tubulis stipiti adnatis v. subdecurrentibus, albidis, 3-4 mm. longis; poris elongato-hexagoniis, amplis, albidis; stipite farcto, solido, sursum incrassato, glabro, pileo concolori, 4-5 cm. longo, sursum 1 cm. crasso; sporis fusiformibus, albidis, flavo-tinctis, 7-8 \times 4; carne spongiosa, albida, 1-1,5 cm. crassa.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Bol. versipelli* affinis.

42. **Boletus flexipes** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 983

p. 208. — Pileo tenui e convexo plano, interdum centro depresso, glabro, castaneo, zona lata umbrina in medio pilei ornato, 4-5 cm. lato; tubulis in stipite subdecurrentibus, curtis, flavescentibus; poris rotundatis, minutissimis, aureis; stipite solido flexuoso, sursum attenuato, pallido v. tinctura leviter rubescente-flavida prædito, 6 cm. longo, 6-8 mm. lato; sporis oblongo-fusoideis, interdum curvulis, 7-9 \times 5, flavidis (?); carne 3-4 mm. crassa, compacta.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Boletus vaccino* affinis.

43. **Boletus pachycephalus** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew 984

(1909) p. 206. — Pileo pulvinate, velutino, brunneo, centro saturatiore, 5 cm. diam.; tubulis brevissimis; stipite adnatis v. decurrentibus, ex albo sublutescentibus; poris angulatis aut sinuoso-elongatis, mediocribus, roseo-rufescentibus; stipite solido, curto, basi incrassato, nigro-brunneo, glabro, 2-3 cm. longo, 1,5 cm. cr.; sporis ellipsoideis, flavo-viridibus, 8-9 \times 4; carne alba, immutabili, crassissima, compacta.

Hab. ad terram prope Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Bol. chry-sentero* affinis.

44. **Boletus punctipes** Peck, in N. York State Mus. Rep. 32 (1879) 985 *B granulata*
p. 32-33, Atkinson Mushrooms p. 179, fig. 172. — Pileo convexo, *Bull. VI, 5*
quandoque demum subplano, centro crassiore margine tenui, juveni
minute griseo-pulveraceo, 5-7 cm. lato; margine senio sæpe recur-
vato; pileo udo viscido, flavidulo; tubulis brevibus, brunneolis dein
ochraceis, punctato-glandulosis ore rotundatis; stipite longiusculo,
supra distincte tenuato, rhabarbarino et punctato-glanduloso, 5-8
cm. long., 6-10 mm. cr.; sporis ovoideo-oblongis, 8-10 \approx 4-5, flavidis.

Hab. in silvis New York St. et North Carolina Americæ bor.
— A *Bol. granulato* vix diversus stipite punctato-glanduloso.

45. **Boletus parvulus** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 986
p. 208. — Pileo hemisphærico-explanato, obtusissime umbonato,
margine integro undulato, minute squamuloso, pulchre flavo-fulve-
scenti, centro obscuriore, 5-6 cm. lato; tubulis in stipitem subde-
currentibus, curtis, cinerescentibus; poris minutissimis, rotundatis,
roseo-tinctis; stipite solido, sursum incrassato, glabro, pileo con-
colori, 4-5 cm. longo, supra 1-5 cm. crasso; sporis cymbiformibus,
vix carneo-tinctis, 7-8 \approx 5; carne spongiosa, 1,5 cm. cr., albida.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Bol. rufo-aureo*
proximus.

46. **Boletus rufo-aureus** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 987
p. 204. — Pileo globoso-pulvinato, quandoque subumbonato, car-
noso, glabro, rufo-aureo, centrum versus fuscescente, margine in-
voluto, levi, undulato v. lobato, 5 cm. lato; tubulis stipiti adnatis,
brevissimis, flavescentibus; poris minutissimis, rotundatis, aureo-ru-
fescentibus; stipite sursum incrassato, solido, pileo concolori, sub-
squamuloso v. maculis saturatoribus variegato, basi pallido, 7 cm.
longo, 2 cm. cr.; sporis cylindrico-fusiformibus, flavo-rubiginosis,
10 \approx 4,5; carne compacta, albida, 1,5 cm. cr.

Hab. ad terram prope Singapore Asiæ (RIDLEY). — *B. spadiceo*
proximus.

47. **Boletus Alwisii** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 988
pag. 205. — Pileo carnosus, compactus, pulvinatus, glabrus, flavus,
centro saturatiore, margine albido infracto, 3-4 cm. lato; tubulis
brevibus, stipiti adnatis, flavescentibus; poris parvis, subrotundis,
flavidis, tactu virescentibus; stipite solido, deorsum attenuato, pileo
concolori v. pallidiori, supra anulum reticulato, infra concentricè
squamuloso, 5-6 cm. longo, 0,5 cm. crasso; sporis oblongo-fusoi-

deis, subhyalinis, 6-7 \approx 4; carne albida, 0,5 cm. cr., versus marginem tenuissima.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Bol. luteo et flavo* affinis.

48. **Boletus Housei** (Murr.) Sacc. et Trott., *Ceratomyces Housei* Murrill, 989
North Amer. Fl. IX, Part. 3, pag. 145. — Pileo supra convexo, infra subplano, 3-4 cm. lat., 1 cm. cr., superficie levi, sicco, minute tomentoso, castaneo-rubro, subvelutino, margine supra concolore, tubulos leviter excedente, infra rubescente, contextu firmo, solido, albo, immutabili; tubulis decurrentibus numquam depressis, læte flavis, demum fusco-flavis non angulosis; acie tenui integra; sporis levibus oblongo-ellipsoideis, flavidis, 7-9 \approx 4-5, crasse hyalino-uninucleatis; stipite centrali cylindrico æquali, subglabro, flavo et supra distincte reticulato, infra atro-castaneo, basi sæpius flavo-punctato, intus solido et immutabili, 3-5 cm. long., 5-8 mm. cr.

Hab. in muscosis silvaticis, Pink Beds, North Carolina, Amer. bor. (H. D. HOUSE).

49. **Boletus longipes** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 990
p. 207. — Pileo convexo-plano, in exoletis centro plus minusve depresso, viscoso, glabro, griseo, centro saturatori, 3-4 cm. lato; tubulis elongatis, flavo-virentibus, liberis; poris angulatis, amplis, griseo-flavidis, marginibus flavis; stipite solido, elongato, subæquali v. basi subincrassato, flexuoso, glabro, pileo concolori, basi albo, 7-8 cm. longo, 2-3 mm. cr.; sporis flavo-brunneis, ellipsoideis, leniter curvatis 12 \approx 5; carne alba.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Bol. fuligineo* proximus.

50. **Boletus flavipes** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew (1909) 991
p. 208. — Pileo primo hemisphærico, dein modice explanato, margine non v. vix curvulo, dein gradatim expanso, levi, glabro, sordide castaneo, 3-4 cm. lato; tubulis stipiti adnatis, curtis; poris rotundatis, minutis, albis; stipite tereti, subflexuoso, farcto, ætate cavo, flavo, 4 cm. longo, 5-6 mm. crasso; sporis fusoides, subhyalinis, 6-7 \approx 3, 5; carne compacta, 1 mm. crassa, albida.

Hab. ad terram, Singapore Asiæ (RIDLEY). — *Bol. tenuipedi* affinis.

51. **Boletus rugosiceps** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 94 (1905) 992
p. 20, t. Q, fig. 6-10. — Pileo firmo, carnosio, convexo v. hemisphærico, dein late convexo, 2,5-7,5 cm. lato, sicco, ruguloso-foveolato, ochraceo, rubro- v. aurantiaco tincto, quandoque rimose

areolato, margine tenui supra hymenium breviter expanso; carne alba v. albida; tubulis primum farctis, circum stipitem depressis, ore flavido dein ætate obscuriori, minuto, rotundato; stipite firmo, 7,5-10 cm. longo, 12-16 mm. cr., subæquali, solido, longitudinaliter rugoso-sulcato, punctis brunneis v. flavidis donato, pallido, basi distincte angustato; sporis oblongo-fusoideis, 15-20 \times 5-6.

Hab. in nemoribus prope Port Jefferson Amer. bor. — *Bol. scabro* et *B. rubro-puncto* proximus sed distinctus.

52. **Boletus acidus** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 105 (1906) 993 p. 15, tab. *T*, fig. 1-6. — Pileo carnosio, 2,5-5 cm. lato, sat tenui firmo, convexo, udo glutinoso, albo-flavo, margine initio fragmentis albo-floccosis glutinosis appendiculato; carne albida, sapore acido et ingrato; tubulis brevibus, adnatis, hymenio initio concavo dein applanato, ore minuto, subrotundo, pallide flavo, demum obscuriore; stipite firmo, æquali vel sursum conico-angustato, subflexuoso, 3,5-8 cm. longo, 5-7 mm. cr., glandulis minutis brunneis v. brunneolis, subglutinoso, anulo evanescente prædito; sporis subferrugineis, oblongo-ellipsoideis, 6,5-9 \times 2,5-3,5.

Hab. in pinetis, Port Henry Americæ bor. — *Bol. punctipedi* et *B. americano* proximus.

53. **Boletus brasiliensis** Rick, in Ann. Mycol. III, pag. 235 (1905); 994 Broteria VI (1907), tab. IX, fig. 11. — Pileo hemisphærico, flavo, 1-2 cm. lato; stipite albo-melleo, sursum farinoso, 2 cm. long., $\frac{1}{2}$ cm. lato; poris inæqualibus, irregularibus, mediocribus, albomelleis vel viridulis, versus pedem depressis, margine sterili; sporis 7 \times 3 $\frac{1}{2}$, flavidulis, ovalibus vel ellipticis.

Hab. in prato Chacaræ Collegii St. Leopoldi Brasiliæ. — Prima generis species in Brasilia lecta. — *Bol. piperato* subaffinis, sed colore ubique intense flavo distincta.

54. **Boletus rubinellus** Peck, Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. I 995 (1887) p. 15, tab. II, fig. 20-22. — Pileo primum late conoideo v. subconvexo dein applanato, 2,5-5 cm. lato, subtomentoso, rubro, dein ætate pallidiore; tubulis convexis adnatis v. ad stipitem subdepressis, latiusculis, subrotundis, rubido-carneis dein sordide flavis; stipite æquali, 5 cm. long., 4-6 mm. cr., levi, flavo et rubido maculato; sporis oblongo-fusoideis, 9-12 \times 3,5-4.

Hab. in silvis, Gansevoort Amer. bor. — *Bol. rubino* et *Bol. piperato* affinis.

55. **Boletus grisellus** Peck, Edible Fungi (1900) pag. 169, tab. 52, 996 fig. 13-19. — Pileo convexo dein subplano, sicco, leniter piloso

squamuloso, albido v. griseo; 2,5-7,5 cm. lato, carne albida; tubulis adnatis v. leniter decurrentibus, griseis, dein ætate obscurioribus, ore latiusculo, anguloso; stipite æquali v. supra leniter angustato, solido, albido v. pallido, 2,5-5 cm. longo, 7-11 mm. cr.; sporis ferrugineo-brunneis, oblongis v. ellipsoideis, 7-10 \approx 3,5-5.

Hab. ad terram in Amer. bor. — *Bol. spectabili* et *Bol. Elbæ* affinis.

56. **Boletus Vanderbiltianus** Murrill in *Torreyia* VIII (1908) p. 215 997 et in *Mycol.* I, p. 146. (*Ceratomyces*). — Pileo parvo, subconico, conspicue atro-purpureo-squamuloso 1-2 cm. lat.; tubulis margine salmoneis dein incarnatis; poris angulosis, 1 mm. latis, prope stipitem 2 mm. longis, acie integra tenui; stipite curvo, cylindraco, delicate pruinoso, dein glabro, saturate salmoneo, ad carneum mutante, tactu obscuriore, sursum leviter glauco-pruinoso, minute purpureo-punctato, 2-3 cm. longo, 0,5-0,8 cm. cr.; sporis ochraceo-brunneis, oblongo-ellipsoideis, 9-12 \approx 2-3.

Hab. ad terram, Pink Bed Valley in Carolina sup. Amer. bor. — *Bol. conico* affinis sed differt sporis minoribus etc.

57. **Boletus nanus** Masee, *Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew* (1909) 998 pag. 208. — Pileo pulvinate, carnosio, interdum undulato, sicco, primitus levi dein centro rimoso-areolato, olivaceo-fusco, 1-1,5 cm. lato; tubulis subliberis, curtis, flavescentibus; poris angulosis, pro ratione magnis, flavo-virentibus; stipite solido, plus minusve flexuoso, æquali, luteo, apice roseo et furfuraceo, 4 cm. longo, 3-4 mm. crasso; sporis fusoides, flavido-albis, 6 \approx 3,5; carne compacta, albida, versus marginem tenuissima.

Hab. gregarius ad terram, Singapore Asiae (RIDLEY).

58. **Boletus lactescens** Jacobasch, *Abh. Botan. Ver. Prov. Brandenburg*, XXIV (1882) p. 156. — Pileo 2-12 cm. lato, initio hemisphærico, sæpe obtuse umbonato, deinde pulvinate, brunneo-melleo; stipite oblongo-ovoideo, dein æqualiter crasso, sulphureo-vitellino, demum rubiginoso-punctato; anulo rubiginoso, deciduo; carne lactescente, pilei superne albida, infra stipitisque sulphureo-vitellina; tubulis sinuato-adnatis, confluentibus, sulphureo-vitellinis; sporis ellipsoideis subreniformibus, flavido-rubiginosis.

Hab. in silvula prope Potsdam Germaniæ. — Nonnullis notis cum *Boleto luteo* et *Bol. granulato* convenit, sed imprimis lacte differt.

59. **Boletus tropicus** Rick, *Broteria* VI (1907) p. 81, tab. VI, fig. 2 1000 (sine diagnosi).

Hab. ad terram, Rio Grande do Sul Brasiliæ. — Ex icone nulla nota certa erui potest: est forma pileo stipiteque crassis, habitu quasi *Boleti edulis*.

60. **Boletus subluteus** Peck, 48 Rep. (1894) tab. 33, fig. 1-6; Farlow, 1001
Un. St. Dep. Agric. Div. veg. Path. Bull. 15 (1897) tab. 28; Hard,
Mushrooms, p. 368, fig. 297. — *Boleto luteo* affinis, a quo differt
stipite non glutinoso, supra et infra anulum punctato.

Hab. ad terram in Amer. bor. — Sec. Atkinson, Mushrooms
1903, p. 181 non satis differt a *Bol. luteo* Linn.

61. **Boletus mutabilis** Morg. — Syll. VI, p. 19. — var. **austro-ame-** 1002
ricanus Rick, Broteria V (1906) pag. 223 et VI (1907) tab. VI,
fig. 3. — Sporis ovoideis, fuliginosis, $10 \approx 8$; hymenio tomentoso;
poris angulosis, minoribus, ore flavo-cinnamomeo nec pure flavo,
tactu virescente, non cyanescente.

Hab. ad terram sabulosam, Rio Grande do Sul Brasiliæ.

62. **Boletus subtomentosus** L. — Syll. VI, p. 14. — var. **bulbosus** 1003
Martin, Bull. Soc. bot. Genève, XI (1904-1905) pag. 124. — Di-
gnoscitur stipite levi, 5 cm. longo, sursum 9 mm. cr., basi distin-
cte bulboso, bulbo 2 cm. long. et cr.

Hab. in silvis, Allinges pr. Genevam Helvetiæ. — var. **mar-**
ginalis Boud. Ic. mycol. I, t. 142 (ser. VI, pag. 3, n. 503). —
A typo differt statura graciliore, pileo æque punctato-tomentoso,
sed ad marginem zona tomentosa pallidiore prædito et stipite le-
viore, elatiore et vix punctato. — In silva Ecouen Galliæ. —
Var. **virescens** Bresad. in Clus.-Istvanffy p. 160, t. 69, f. inf. —
In Pannonia.

63. **Boletus sardous** Belli et Sacc. — Syll. XVII, p. 95. — in Atti 1004
R. Accad. Torino XLII (1907) tab. 1. — Teste cl. Maire in Bull.
Soc. bot. France (1909) p. LXII, hæc species collidit cum *Bol.*
corsico Roll. (1896), qui esset forma *Bol. impoliti* Fr.

64. **Boletus Dartmouthi** Mac Kay, Proc. and Trans. N. Scot. Inst. Sc. 1005
XI (1904).

Hab. ad terram in Nova Scotia Amer. bor. — Teste Murrill
(North Am. Flora, Fungi IX, p. 151) non satis differt a *Boleto*
lurido.

65. **Boletus Romagnolii** Maire, Bull. Soc. Myc. Fr. XX (1905) p. 165. 1006
— Ita vocandus *Baletus albidus* (Romagnoli) Maire — Syll. XVII,
p. 101 — quia *B. albidus* Roq. anterior.

66. **Boletus felleus** Bull. — Syll. VI, p. 43. — var. **gracilis** Bres., 1007

Clus.-Istvanffi Icon. fungor. tab. 59; Sterb. Theatr. tab. XV, fig. A. — Statura graciliore dignoscitur.

Hab. in Pannonia.

Boleti species omnino dubiæ nonnullæ restant, quarum citatio fit in Sylloge XIX, pag. 179. Ecce nomina: **Boletus bicolor** Raddi, **B. chalcedonicus** Lév., **B. hæmatopus** Lév., **B. maculatus** Raddi, **B. parvulus** (Paul.) Lév., **B. pellitus** (Paul.) Lév., **B. ruber** Raddi, **B. rubro-punctatus** Raddi, **B. simplex** Schæff., **B. striatus** Humb., **B. tergeminus** Schæff., **B. tomentosus** Raddi.

SUILLUS (Mich.) Karst — Syll. XIV p. 10, XVI p. 142, XVII p. 97.

1. **Suillus jamaicensis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Gyroporus jamaicensis* 1008 Murr., Mycologia II (1910) p. 305. — Pileo carnosio, parvo, convexo, circulari, 1,8 cm. diam., 5 mm. cr.; superficie umbrina, viscida, minute maculatim areolata, cute tenaci; contextu albo, immutabili, postice 1 mm. cr., sapore leniter mucilagineo; hymenio facile separabili, subplano, a stipite subremoto, tubulis albis immutabilibus, 3,5 mm. long. ore circulari, regulari, 4-5 in quoque mm., acie tenui, distincte denticulata; sporis elongatis, levibus, hyalinis, 10-12 \times 4-5; stipite centrali, albo, subglabro, levi, cylindrico, curvo, 3 cm. long., 3,5 mm. cr., basi leniter conoideo.

Hab. in herbidis montanis prope Troy Jamaicae (MURRILL et W. HARRIS).

2. **Suillus subalbellus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Gyroporus subalbellus* 1009 Murrill, North Amer. Fl. IX, part. 3, p. 134. — Pileo convexo crassiusculo 5 cm. lat., superficie sicco, initio tenuiter tomentoso dein glabro, levi, pallide isabellino, margine integro fertili, contextu spongioso-carnosio albo, immutabili, faciliter arescente, tubulis subliberis hymenophoro longioribus ore læte flavo immutabili; sporis ovoideis levibus, sub vitro hyalinis, 7 \times 4,5; stipite ventricosio crasso distorto, levi, pallide isabellino v. subalbo, cavo, 7 cm. long.

Hab. in sabulosis inter arbores varias, Ocean Springs Mississipi Amer. bor. (E. S. EARLE).

3. **Suillus Maxoni** (Murr.) Sacc. et Trott., *Ceratomyces Maxoni* Murrill, Mycologia I (1909) p. 219. — Pileo ambitu irregulariter circulari, convexo, leniter depresso, 7 cm. lato, 1-1,5 cm. cr.; superficie glabro levi, obscure brunneo, margine fere nigro, centro pallidiori sed maculis obscurioribus prædito, margine undulato, involuto; contextu carneo; hymenio fortiter concavo, cremeo-albo; tu-

bulis adnatis, subbrevis, parvis, angulosis, parietibus angustis, acie dein lacerato; sporis oblongo-ellipsoideis, levibus, hyalinis, 2-guttulatis, $9-11 \times 3-4$; stipite centrali crasso, basi angustato, 2,5 cm. long., supra 3 cm. cr., basi 1,5 cm., infra levi et glabro, supra distincte et crebre reticulato, carnosus, solido.

Hab. ad terram muscosam prope Coliblanco in editioribus Vulcani Turrialba, Costa Rica, Amer. centr. (W. R. MAXON).

STROBILOMYCES Berk. — Syll. VI p. 49, IX p. 159, XI p. 81, XVII p. 101.

1. **Strobilomyces annamiticus** Patouill., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXV 1011 (1909) p. 6, tab. I, fig. 1. — Pileo carnosus, 4-8 cm. lato, convexo dein explanato, primitus levi, dein tessellato, postremo squamis confertis, pyramidatis obsito, vivide carmineo, margine longe appendiculato; poris luteis, integris, simplicibus, e rotundato angulosis; cystidiis fusiformibus, subhyalinis, $70-100 \times 10-14$; basidiis clavatis, $45-60 \times 10-12$, tetrasporis; sporis elongato-ovoideis, longitudinaliter striatis, ochraceis, $12-10 \times 7-9$; stipite elongato, carnosofibroso, 8-12 mm. cr., bulboso, villosulo, sordide violaceo, farcto, intus carmineo.

Hab. in terra humosa in silvis in valle Da-Pounian, ad ripas Kam-ly etc. Annam (EBERHARDT). Totus fungus 8-10 cm. altus.

2. **Strobilomyces paradoxus** Masee, Bull. Miscell. Bot. Gard. Kew 1012 (1909) p. 209. — Pileo carnosulo, margine abrupte tenui, incurvo, primo hemisphærico, dein explanato, umbrino, dense irregulariterque verrucoso, ætate glabrescente, 6-7 cm. lato; tubulis curtissimis, stipiti adnatis; poris polygoniis seu alveolatis, brunneis; stipite farcto, subæquali, glabro, pileo concolori, 4-5 cm. longo, 5-6 mm. crasso; sporis oblongo-ovatis, basi oblique apiculatis, longitudinaliter striatis, flavo-brunneis, $9-11 \times 5$.

Hab. gregarius ad terram Singapore Asiæ (RIDLEY). — Species præclara inter gen. *Boletus* et *Strobilomyces* media.

BOLETINUS Kalch. — Syll. VI p. 51, IX p. 159, XIV p. 170, XVI p. 142 *).

1. **Boletinus glandulosus** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. 131 (1909) p. 34. 1013

*) De hoc gen. cfr. JACOBASCH (Mitth. Thür. Bot. Ver. N. F. Heft XVI, 1902, p. 19) qui contendit hoc genus a *Boleto* typico non satis differre.

Pileo carnosio, convexo deinde subplano, 3,5-7,5 cm. lat., viscido, subumbonato, subcastaneo v. brunneo; carne pallida; tubulis angulosis, adnatis leniter decurrentibus, brunneis deinde nigro-brunneis; dissepimentis ubique glanduloso-punctatis hinc inde elongatis, subirregularibus, nigrescentibus; stipite subæquali 2,5-5 cm. long., 8-12 mm. cr., viscido, solido, anulato, flavo-brunneo; sporis oblongis, 20-40 \times 4-5.

Hab. ad terram in New Brunswick Amer. bor. (G. U. HAY). 1014

2. **Boletinus Berkeleyi** Murrill, Mycologia I (1909) p. 6. — Ita vocandus *Boletus decipiens* B. et C. (1853) — Syll. VI, p. 20 — (non Schrad. (1794) = *Dædalea unicolor*).

GYRODON Opatow. — Syll. VI p. 51, IX p. 160, XI p. 81, XIV p. 170.

1. **Gyrodon Miramar** (Roll.) Sacc. et Trott., *Boletus Miramar* Roll. 1015
Bull. Soc. Mycol. Fr. (1904) p. 205, tab. X, f. 2. — Pileo carnosio pulvinato, hemisphærico, pellicula amœne rosea, viscida, separabili tecto, serius pallide flavente v. in fungo obsoleto brunnescente; tubulis brevissimis, valde decurrentibus, plicato-gyrosis, lamellarum instar radiatim dispositis; poris exiguis, luteis; carne flavida, inodora; sporis oblongis 9 \times 3, granulosi, pallide flavis; stipite crasso, contiguo, e pleno plus minusve cavo, concolori.

Hab. ad terram sub Pinis, Quercubus etc., Miramar in insulis Balearibus.

2. **Gyrodon immutabilis** (Britz.) Sacc. et Trott., *Boletus immutabilis* 1016
Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 80, Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. (1909) p. 207. — Pileo griseo-brunneo, nigro-brunneo, tomentoso, fere hemisphærico, 5 cm. lato; stipite 8 cm. long., centro usque ad 15 mm. cr., supra et infra subattenuato, flavo-sulphureo; tubulis usque ad 5 mm. long., flavo-sulphureis, subemarginatis vel rotundato-adnatis, parietibus concoloribus, vermiculato-gyrosis; carne scissili, etiam flavo-sulphurea, trita non rubescenti nec cyanescenti, odore ingrato nauseoso.

Hab. in silvis prope Augsburg Bavaricæ.

FISTULINA Bull. — Syll. VI p. 54, IX p. 160, XVI p. 143.

1. **Fistulina sarcoides** St. Amand, Flor. agenaise, Agen (1821) p. 547. 1017
— Stipite laterali; pileo carnosio, subdiaphano, superficie ruguloso, intense rubro, intus aspectu sanguinolento venis albo-rubellis per-

curso; tubulis pallide flavis, æqualibus, minutissimis, inter se contiguus sed non adhærentibus.

Hab. ad truncos in silvis pr. Agen Galliæ. — Ipse auctor scribit: nascitur ubi *Fist. hepatica*, cujus forte varietas. Substantia pilei carnem crudam omnino æmulatur.

PHYLLOPORUS Qué. Fl. Mycol. Fr. p. 409 (1888) (Etym. *phyllo* folium et *porus*, ob poros alveoliformes sepimentis subfoliaceis). Pileus stipesque carnosus, carne tenera colorata. Pori ex lamellis anastomosantibus formati, reticulati. Sporæ fusoideæ flavæ vel flavicantes. — Huc spectat *Phyllop. Pelletieri* (Lév.) Qué. l. c. (= *Flammula paradoxa* Kalchbr. — Syll. V, p. 810 = *Clitocybe Pelletieri* (Lév.) Gill. — Syll. V, p. 192).

1. **Phylloporus Rompelii** Pat. et Rick, Broteria VI (1907) pag. 81, 1018 tab. VI, fig. 1. — Pileo 1 dm. lato, carnosus, brunneo, glabriusculo; stipite 1-2 cm. lato, brunneo-tomentoso, versus pileum in flavum et rubrum abeunte, carnosus; poris flavis, magnis irregularibus v. subhexagonis, lamellatim ordinatis; carne flava, fracta sub aëre viridi-cærulescente; sporis ovalibus, flavis, uniguttulatis, $10 \approx 6-7$.

Hab. ad terram, Rio Grande do Sul Brasiliæ.

POLYPORUS (Mich.) Fr. — Syll. VI p. 55, IX p. 161, XI p. 82, XIV p. 171, XVI p. 142, XVII p. 101.

1. **Polyporus squamosus** Fr. — Syll. VI, p. 79. — var. **maximus** 1019 Pâque, Bull. Soc. R. Bot. de Belgique t. 46 (1909) p. 289. — A typo et var. *crassipede* et *levipede* differt: pileo basi fortiter depresso margine non crasso, $17-19 \approx 22-24$ cm.; poris longe decurrentibus; sporis ellipsoideis uno apice obtusis, altero acutatis, $19-22 \approx 9-11$; stipite 9 cm. longo.

Hab. ad caudices vetustos, prope Anvers Belgii (H. VAN DEN BROECK).

2. **Polyporus violaceus** Martin, Bull. Herb. Boiss. (1904) pag. 1290, 1020 *Boletus violaceus* Martin, Bull. Soc. bot. Genève VII, p. 192. — Syll. XIV, p. 167 — (ex errore sub nom. *B. violascens*). — Adde: basidiis brevibus, crassis; sporis subglobosis, fortiter tuberculatis, hinc irregulariter stellatis, $4 \approx 5$, hyalinis.

Hab. in silvis muscosis Pini silvestris, Yvre Helvetiæ. — Affinis *P. leucomelo* cujus forte habendus est - ex ipso auct. in litt. - ut pulchra varietas violascens. Quoad *Polyporum violaceum*

apud Hard, The Mushrooms, p. 391, fig. 322, sporis tereti-fusoides, 10-12 \times 4-5 pallide brunneis, est species omnino diversa.

3. **Polyporus violaceo-maculatus** Pat., Bull. Soc. Myc. France, XXIII 1021 (1907) p. 72. — Terrestrius; stipite centrali, carnoso; pileo orbiculari 13 cm. lato et ultra, plano, centro parum umbilicato, initio puberulo dein glabro, azono, griseo-brunneo, tenui, arescendo contracto; poris albis, tactu brunneo-violaceis, parvis, angulosis, sepiementis tenuibus, decurrentibus usque ad stipitis basim et ad marginem pilei; sporis hyalinis, ovoideis, levibus, 8-10 \times 6; stipite 5 cm. longo, 3 cm. cr., solido, albido-carnoso.

Hab. ad terram in silvis Indo-Chinæ (EBERHARDT). — Cum *Pol. poripede* comparabilis.

4. **Polyporus turbinatus** (Pat. et Hariot) Sacc. et Trott., *Leucoporus* 1022 *turbinatus* Pat. et Har., Bull. Soc. Myc. France, XXII (1906) p. 117. — Solitarius v. cæspitosus, carnoso-lentus; pileo orbiculari, profunde depresso, fusco-alutaceo, nonnullis squamulis adpressis brunneis, distantibus maculato, margine sinuoso repando, tenui, glabro, in stipitem subcentralem, cylindraceum vel compressum, concolorem sensim attenuato; contextu albo; poris angulosis, parum profundis, dissepimentis tenuibus, integris, carnosis, totam inferiorem partem fungi usque ad stipitis basim obtegentibus.

Hab. ins. Java (P. SERRE).

5. **Polyporus stillativus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 87. — Britzel- 1023 mayr, Revis. Hymenomyc. (1909) p. 210. — Pileo horizontaliter crasse stipitato, 14 cm. long., usque ad 9 cm. lato, piloso, basi flavido-brunneo, margine pallidiore; strato sporifero usque ad 3 mm. cr., albido, brunneo-flavido; poris minutis, rotundatis, lacrimantibus; carne brunneola indistincte fibrosa, odore acidulo, sub-suberoso basi firmiore; massa sporarum alba; sporis rotundato-elongatis, non guttulatis, 10-12 \times 2-3.

Hab. in ligno vetusto prope Teisendorf Baviaræ. — *Polyporo spongiæ* affinis.

6. **Polyporus conspicabilis** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 86. — Brit- 1024 zelmayr, Revis. Hymenomyc. (1909) pag. 208. — Pileo convexo centro sæpe depresso, 6,5 cm. lato, griseo, griseo-cyaneo, levi; stipite usque ad 9 cm. longo, supra 1,5 cm. cr., medio inflato, infra subattenuato, sordide griseo; carne alba, pallide griseo-violacea, odore grato; strato porifero decurrente, 2 mm. lato, albido; poris latiusculis, rotundatis, distortis; sporis angulosis, flavidis, 4-5 \times 2-3.

Hab. in silvaticis, Oberstaufer Baviaræ.

7. **Polyporus dapsilis** Britzelmayr, Hymenomyc. tab. 591, fig. 3; 1025
 Revis. Hymenomyc. (1909) p. 208. — Pileo 10 cm. lato, primum convexo expanso, dein applanato et centro depresso, levi, albo-alutaceo; stipite 7 cm. longo, supra 2 cm. cr., medio crassiore, basi distincte attenuato, albido, hinc inde brunneo-violaceo maculato, ima basi distincte violaceo-brunneo; carne molli, alba v. albido-flava; strato porifero albido, flavido, 1 mm. lato, decurrente; poris rotundato-angulatis parietibus denticulatis.

Hab. in silvis prope Augsburg Bavariae.

8. **Polyporus Clusianus** Britz. — Sacc. Syll. XI p. 87. — Britzel- 1026
 mayr, Revis. Hymenomyc. (1909) p. 209. — Pileo centro plerumque late depresso, usque ad 10 cm. lato, pallido v. obscuriore, etiam sordide ochraceo-flavo, squamulis rubro-brunneis depressis prædito; stipite usque ad 18 cm. longo, medio usque ad 4 cm. lato, supra attenuato dein expanso, basi subacutato, supra albido basi rubro-brunneolo dein nigricante; carne alba, albida, molli, subfragili, odore et sapore farinaceo; strato porifero albido, pallide flavo, quandoque angusto, vix 1 mm. lato, late decurrente; poris latiusculis, rotundato-elongatis parietibus crassis inflatis; massa sporarum alba; sporis plerumque regulariter subellipsoideis etiam plerumque apiculatis et biguttulatis, 14-16 \approx 4.

Hab. solitarius v. gregarius ad vias et in hortis Augsburg Bavariae. — Edulis.

9. **Polyporus formatus** Britzelmayr, Hymenom., tab. 592 fig. 5. — 1027
 Revis. Hymenomyc. (1909) p. 208. — Pileo 10 cm. lato, tomentoso, ad marginem fibroso, opaco, brunneo-rubro, brunneo-griseo, albicante; stipite 4 cm. long. 2 cm. cr., basi subangustato, supra albido, infra brunneolo, rubro-brunneo, basi obscuriore; carne alba, pallidissime violaceo-brunneola, basi in stipite griseo-nigricante, fragili; poris 1 mm. long., albis, albidis, dein sordide isabellinis decurrentibus; poris parvis, rotundato-angulatis; sporis angulatis, eguttulatis, hyalinis 6 \approx 4; odore et sapore subgrato.

Hab. in silvis prope Augsburg Bavariae.

10. **Polyporus punctiporus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 87. — Brit- 1028
 zelmayr, Revis. Hymenomyc. (1909) p. 209. — Pileo convexo centro depresso, ad marginem in exemplaribus vetustis sublaciniato, usque ad 10 cm. lato, flavo-brunneo, pallide brunneo, centro obscuriore, vix fibroso; stipite 7 cm. longo 3 cm. cr., albido, basi plerumque flavescente; strato porifero late decurrente, vix 1 mm. lato, supra albido, infra pallide brunneo v. albido; poris minutis-

simis, punctiformibus; odore tenui; carne molli; sporis rotundatis, vix apiculatis, non guttulatis, 4 μ diam.

Hab. ad terram in silvis prope Augsburg Baviaræ. — Habitus *Polypori flavescentis*.

11. **Polyporus latisporus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 86. — Britz. 1029
zelmayr, Revis. Hymenomyc. (1909) p. 210. — Pileo 9 cm. lato, convexo, centro depresso, flavido, ochraceo, squamulis fibrillosis obscurioribus, rubro-brunneis mox evanidis donato; stipite basi 4 mm. cr., supra incrassato 3 cm. longo, plerumque incurvato, supra flavido basi nigricante; carne albida, odore speciali nullo; stratu pororum late decurrente, usque ad 7 mm. lato; poris albis crassiusculis, subellipticis; sporis plerumque biguttulatis, 14 \times 4.

Hab. in ligno fagineo in Bavaria.

12. **Polyporus Queletianus** Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 490, *Polyp.* 1030
vernalis Quélet, Champ. Normandie (1879) tab. III fig. 13 (absque diagnosi) non Fr., *Leucoporus vernalis* Quél. Fl. Mycol, p. 403. — Pileo convexo, umbilicato, dein subcupulato, 2-3 cm. lat., pallide, griseo, setuloso-velutino, margine junquilleo; stipite gracili, flexuoso, velutino, pallide griseo, basi hirto; poris minutis, rotundis, fimbriatis, niveis, demum cremeo-junquilleis; sporis tereti-ellipsoideis, 6 μ . longis, guttulatis, hyalinis.

Hab. ad ramulos in silvis umbrosis Galliarum sept. — *Polyp. brumali* peraffinis.

13. **Polyporus Spissii** Eichelb., Verh. Naturv. Ver. Hamburg, 3 Flge. 1031
XIV (1906) p. 50. — Pileo campanulato, carnosolento, 1 cm. alto, basi 1,5 cm. lato, læte brunneo, centrum versus rufescente, expallente, nitente, tenuiter velutino, profunde umbilicato, prope marginem zonis concentricis pallidioribus et saturatoribus notato, sicco sulcis binis parallelis exarato; margine revoluto et albociliolato; stipite centrali, carneo, erecto, fragili, subflexuoso, anguste fistuloso, flavo-brunneo, fibrilloso, 9 cm. alt., 1-2 mm. cr., prope basim anuliformiter incrassato; tubulis rotundo-angulatis, sepimentis tenuibus, poris integris, senio acute dentatis, non decurrentibus, albis; sporis non visis.

Hab. ad truncos, Amani Africae occid. — Affinis dicitur *Polyporo agariceo* et *P. pratensi*. Describuntur chlamydosporæ in pileo (senio!) evolutæ, ellipsoideæ 19 \times 13, flavidæ, continuæ, aculeolatae. Cl. Auctor descriptionem longam et accuratam præbet, sed contra legem nullam diagnosim addit nec hujus nec ceterarum specierum sibi descriptarum!

14. **Polyporus arcularius** (Batsch) Fr. — Syll. VI, pag. 67. — var. 1032
arenosus Pat. Add. Cat. Tunis. (1909) pag. 9 (extr.). — A typo
differt radice prælonga, 7 cm., et a basi stipitis oblique descen-
dente.

Hab. in arena, Tiaret Tunisiae, 1000 m. alt., verisimiliter e frag-
mento ligni putrescente, infosso oriens.

15. **Polyporus umbilicatus** Jungh. Præm. Fl. cryptog. Javæ, p. 72 1033
(1838) non est, ut cl. Cooke opinabatur, idem ac *Polyp. arcularius*:
dignoscitur enim sporis cylindræco-curveis 6-7 \times 2,5-3 (non 7-9 \times
2,5-3) hymenii hyphis 2-3,5 μ . cr. (non una alterave 6 μ . cr.) etc.
16. **Polyporus Hookerianus** Sacc. et Trott. — Ita vocandus *Polyp.* 1034
umbilicatus Berk. — Syll. VI, pag. 68. — Qui, teste Bresad., est
diversus ab homonymo Junghunii.

17. **Polyporus velutipes** (Pat.) Sacc. et Trott., *Leucoporus velutipes* 1035
Patouill., Bull. Soc. Myc. de Fr. XXV (1909) p. 5 — Mesopus,
lentus; pileo 8-10 cm. diam. orbiculari, glabro, plano v. depresso,
superne viscoso, sordide flavo, tenui nec sulcato, levi, ambitu
recto, sinuoso; hymenio dilute flavo; poris mediis, angulosis, irre-
gularibus, plus minusve lamellulosis, contortisve radiantibus, dis-
sepimentis tenuibus, integris v. crispatis; tubulis 0,5 mm. longis;
stipite erecto, subcylindræco, flavo-brunneolo, 2 cm. longo, 6-8
mm. cr., undique pannoso-velutino, sursum poris decurrentibus
punctato, deorsum sensim incrassato, orbiculariter dilatato.

Hab. ad cortices putres in montibus Lang-Biang, Annam (EBER-
RHARDT).

18. **Polyporus prostratus** (Patouill.) Sacc. et Trott., *Leucoporus pro-* 1036
stratus Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIII (1907) pag. 73. —
Pileo tenui, coriaceo-membranaceo, ellipsoideo, plano 1-2 cm., longo
5-15 mm. lato, glabro, albido, margine tenui, recto et integro,
zonis concentricis concoloribus signato, postice attenuato in stipi-
tem erectum, compressum 2-4 mm. longum, glabrum, basi disco
orbiculari 4-8 mm. lato cinctum; poris albidis, brevibus, rotunda-
tis, marginem attingentibus, in stipitem non decurrentibus; trama
coriacea, alba.

Hab. ad ramos emortuos, Indo-China (EBERHARDT). — *Leucop.*
annulari affinis sed tenuior, minus carnosus et colore diverso.

19. **Polyporus trachypus** Rostk. in Sturm Deutschl. Fl. III, fasc. 27 1037
p. 27, t. XIV, non B. et Mont. — Syll. VI, p. 11 (Cfr. sp. seq.).
— Pileo carnosolento, centrali-stipitato, hemisphærico, subvillosa,
albido-brunneolo, 15 mm. lato, margine acuto albo; poris subro-

tundo-angulosis, albis, curtis, non decurrentibus; stipite cylindraceo, deorsum paullo incrassato, pubescente, 15-16 mm. alto, basi 6-7 mm. cr., griseo-albido.

Hab. in truncis putridis fagineis in silvis Germaniæ. Totus fungus 25 mm. alt., carne pilei alba, cæsa nigricante. *Polyporo brumali* certe affinis species.

20. **Polyporus aculeatus** Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 496. — Ita 1038 nunc vocatur *Polyp. trachypus* Berk. et Mont. (1856) — Syll. VI p. 72. — non Rostk. (1848).

21. **Polyporus dictyoporus** (Patouill.) Sacc. et Trott., *Leucoporus dic-* 1039 *tyoporus* Patouill. in Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIV (1908) p. 3. — Mesopus; pileo campanulato convexo, dein expanso, orbiculari, 8-12 mm. diam., centro obtuso v. vix depresso; glabro, rufo in sicco, tenui, undique æqualiter crasso, pellucido, subgelatinoso, margine nudo integro v. sinuato; poris concoloribus, minutissimis, nudo oculo non visibilibus, angulosis, reticulum tenuissimum referentibus, dissepimentis tenuibus, integerrimis; stipite gracili, glabro, cylindraceo, apice vix dilatato, fibroso, subopaco, rufulo, 10-12 mm. longo, 1-3 mm. cr.

Hab. ad truncos emortuos *Anonæ montanæ*, Ravine Soufflée Guadalupæ. (Duss).

22. **Polyporus Sapurema** A. Möller in Engler Pflanzenfam. I 1** 1040 p. 171-172 c. ic. — Pileo carnosio subinfundibuliformi, usque ad 20 cm. diam., albo-flavido, squamoso-fibrilloso; stipite centrali, pallido, squamoso, circ. 6 cm. longo, 3 cm. cr., ex sclerotio magno subrotundo, 30 cm. diam., 20 kg. ponderis, rugoso, subfragili, alutaceo oriente; poris oblongo-angulosis, albis, dein lacerato-dentatis.

Hab. in calidariis Horti berlinensis enatus ex Sclerotio in Blumenau Brasiliæ austr. lecto a cl. A. Möller et Berolinum misso.

23. **Polyporus montanus** (Quél.) Ferry, Rev. Mycol. XIX (1897) p. 144, 1041 t. 180, fig. 27, *Cerioporus montanus* Quél. Assoc. Franç. Avanc. (1887) p. 4, t. XXI f. 10 (extr.). — Pileo flabellato, ramoso, 30-50 cm. lat., undulato, lobato, sulcato, velutino, pallide fulvo; carne spongiosa, fragili, alba, amara; stipite brevi, spisso, villosa, albido; poris alveolaribus, 1-2 mm. diam., dein labyrinthiformibus et dentatis, tenuibus, sub vitro puberulis, albo-cremeis; sporis sphaericis 6-8 μ . diam. aculeolatis.

Hab. ad basim truncorum *Abietum* in silvis montanis Juræ, Pyrenæorum, Alpium maritimarum (BARLA). — Forte edulis.

24. **Polyporus Wrightii** Murrill, North Amer. Flora IX, Pt. I (1907) 1042 p. 61. — Pileo circulari, plano-convexo, umbilicato, 3-4 \approx 0,1 cm.; superficie delicate radiato-striata, glabra, arescendo isabellina; margine tenui, acuto, badio, irregulariter undulato v. lobato, parum incurvato, non ciliato; contextu membranaceo, pallido, suberoso, homoganeo, usque ad 0,5 mm. cr.; tubulis decurrentibus, in sicco umbrinis, 0,5-1 mm. long., 2-3 in 1 mm., ore irregulari, anguloso, situ variabili, acie tenui, integra, ætate denticulata; sporis levibus, hyalinis; stipite brevi, centrali, solido, ligneo, æquali v. basi parum incrassato, pulverulento, nigro, 5-7 mm. long., 2-3 mm. cr.

Hab. ad lignum emortuum in Cuba (CH. WRIGHT).

25. **Polyporus subelegans** Murrill, North Americ. Flora IX, Pt. I 1043 (1907) p. 62. — Pileo flabelliformi, convexo, basi distincte attenuato, 1-2 \approx 1,5-2,5 \approx 0,1 cm., superficie delicate radiato-striata, glabra, ex isabellino pallide umbrina in sicco; margine acuto, integro, ex undulato lobato, raro inflexo; contextu pallido, suberoso, 0,5 mm cr.; tubulis pallide umbrinis, 1 mm. longis, cylindraceis, ore statu iuvenili albo, regulariter circulari, minutissimo, 10 in 1 mm., acie crassa, integra; sporis levibus, hyalinis; stipite brevi, laterali, solido, ligneo, basi scutato, nigro, pruinoso, rugoso, 2-5 mm. long. 2-3 mm. cr.

Hab. ad ramos emortuos prope Mooretown Jamaicæ (F. S. EARLE).

26. **Polyporus præguttulatus** Murrill, Mycologia II (1910) p. 190. — 1044 Pileo subcirculari, supra convexo subtus fere plano, basi decurrente adnato et tunc sporophoro secto subtriangulari, 4 \approx 4,5 \approx 0,5-2,5 cm.; superficie levi, lateritia, griseo-tomentosa, sed hinc inde maculis sublevibus prædito; margine leniter involuto, abrupte acuto, concentricè striato, integro, cremeo; contextu pallido, molli-suberoso, homoganeo, postice 1 cm. cr.; tubulis stramineis, 3-4 mm. longis, ore e subcirculari anguloso, ad marginem latiore, 3 circ. in quoque mm., lucenti, straminea, acie tenui, integra; sporis levibus, ovoideis, hyalinis, 5-6 \approx 2-3; hyphis hyalinis; stipite obsoleto

Hab. ad truncos, Troy et Tyre Jamaicæ.

27. **Polyporus palensis** Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl., XXXIV (1907) 1045 p. 472. — Pileo flabelliformi, postice angustato, e breviter depresso infundibuliformi, 2-3 \approx 2-3 \approx 0,1 cm.; superficie ex albo fulva, minute radiato-striata, glabra; margine tenui ex integro undulato v.

lacerato, in sicco inflexo; contextu tenui, carnosio, albo, in sicco fragili; tubulis decurrentibus, usque ad 1 mm. long., intus albis v. leniter carneis, ore minuto ex albo fusco-fulvis, in sicco fragili, parum radiatim elongatis, $0,5 \approx 0,25$ mm., acie lacerato-dentata, dein fere irpiciformi; sporis oblongo-ellipsoideis, levibus hyalinis 3-4 \approx 5-6; hyphis levibus, hyalinis, 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis; stipite laterali, raro excentrico, brevi, basi angustato, albo, tereti, supra striato, 3 mm. long. 2 mm. cr.

Hab. in ramis emortuis prope Palo Leyte in Amer. Centrali (A. D. E. ELMER).

28. **Polyporus Cytisi** Britz., Hymenomyc., tab. 606, fig. 51; Revis. 1046 Hymen. (1909) pag. 212. — Horizontaliter adnatus, non v. vix stipitatus; pileo 5 cm. longo, 6 cm. lato, obscure brunneo, nigro-brunneo, margine flavo v. flavo-rubido, ligneo, intus brunneo-rubro; strato porifero flavo-brunneo, rubro-flavo, ad marginem externum flavo; poris parvis, angulosis, tenuiter tunicatis, brunneo-rubris, inferiori parte flavis.

Hab. ad truncos Cytisi Laburni, v. C. alpini prope Augsburg Bavarix.

29. **Polyporus cæσιο-coloratus** Britzelm. — Syll. XI, pag. 87. — 1047 Britzelmayr, Revis. Hymenom. (1909) p. 210. — Horizontaliter adnatus, brevissime stipitatus; pileo 3 cm. longo, 8 cm. lato, e minute tomentoso strigoso-piloso, basi brunneolo dein pallide griseo-cyanescente, plerumque albo-marginato; carne submolli, in pileo usque ad 4 mm. cr., centrum versus crassiore, ad marginem pilei tenuiore; tubulis usque ad 1 cm. long., albis, parietibus tritis griseo-cyanescentibus; poris minutis rotundatis; massa sporarum alba; sporis curvatis, subellipsoideis, angustis, hyalinis, 5-6 \approx 0,75-1.

Hab. ad truncos pineos et quercinos in Bavaria. — *Polyp. cæσιο* affinis.

30. **Polyporus rubro-maculatus** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 87. — 1048 Britzelmayr, Revis. Hymenom. (1909) p. 210. — Pileo plerumque horizontaliter adnato, raro substipitato, 5 cm. longo et usque ad 6 cm. lato, absque strato sporifero 2-3 mm. cr., minute piloso, vix zonato, albido, rubido et rubro-maculato; carne concolori, aquosa, fere suberosa; strato sporifero usque ad 7 mm. long., albo, rubescente; poris parvis, versiformibus, tunica tenui erosa præditi; massa sporarum alba; sporis nunc rectis nunc curvulis, 4-5 \approx 1-1,5.

Hab. in ligno pineo in silvis prope Augsburg Bavariæ. —
Polyp. ciliatulo affinis.

31. **Polyporus macrosporus** Britz. — Sacc. Syll. XI, pag. 87. — 1049

Britzelmayr, Revis. Hymenomyc. (1909) p. 211. — Pileo horizontaliter adnato, 5 cm. longo, 7 cm. lato, 2-3 mm. cr., membranaceo-carnoso, supra e rubido-flavo griseo, piloso, margine nigricante-zonato, imo margine sæpe albido-striato; strato sporigeno brevissimo vix 1 mm. crasso, basi pilei grisea brunneo-violaceo-grisea, ad marginem pallidiore v. albicante; poris minutissimis, rotundato-angulosis; pileis umbricatis; massa sporarum alba; sporis rotundato-elongatis, fere hyalinis, grosse uniguttulatis, $10 \approx 6-7$.

Hab. in ligno vetusto Bavariæ. — *Polyp. adusto* affinis.

32. **Polyporus linguiformis** Pat. in Journ. de Botanique (1890) p. 18. — 1050

Pileo glabro, carnoso, ascendente, rufo, lineis obscurioribus virgato, anguste linguiformi, 1 cm. lato, dein suborbiculari, 8-15 cm. diam., tenui, 4 mm. crasso, in stipitem attenuato; stipite elongato, 4-5 cm., 0,5-1 cm. cr., basi subinflato, albido, compresso, glabro; pilei margine integro, revoluto; hymenio infero, non decurrenti, concolore; poris minutis, laceratis, transverse positis, sepimentis tenuibus; tubulis curtis, 1 mm., obliquis, facile deterrentibus.

Hab. ad ligna emortua, M. Bavi Tonkin. — *Polyp. russicipiti* subsimilis.

33. **Polyporus fagicola** Murr., Torreyia VI (1906) p. 35. — North 1051

Americ. Fl. v. IX, Pt. I (1907) p. 55. — Pileo circulari e convexo applanato, umbilicato, 4-5 \approx 0,1-0,3 cm.; superficie levi, pallide avellanea, fibrillis innatis cespitosis ad centrum majoribus obscurioribusque quandoque radiatim dispositis et imbricatis ornata; margine acuto, parum incurvato, regulari, non ciliato; contextu tenui, fibroso, albo; tubulis albo-lacteis, decurrentibus, favoloideis, 1-2 in quoque mm., acie tenui, fimbriatula; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis, 3-4 \approx 6-7; stipite centrali, solido, crasso, subæquali, concolori, distincte hispido præcipue ad basim, 2 cm. longo, 1 cm. cr.

Hab. ad truncos decorticatos, Boarstone Mountain, Piscataquis County, Maine, Amer. bor. Mesop.

34. **Polyporus Gæthartii** Bres. Ann. Mycol. (1910) p. 588. — Pileo 1052

suberoso-lignoso, laterali, flabellato vel reniformi, glabro, subtuberculoso, plus minusve leviter sulcato-zonato, isabellino-umbrino, 7-15 cm. lato, 6-9 cm. longo, 1,5-2 cm. cr.; contextu flavo-ferrugineo, duro, interdum striis albis variegato, 10-12 mm. cr., ex

hyphis 1,5-4,5 μ . cr. conflato; stipite laterali, brevi, tortuoso, basi dilatata adnato, 5-12 mm. longo, 1,5-3 cm. lato, interdum obsoleto; tubulis umbrinis 0,5 cm. longis; poris umbrino-fuscidulis, planis $\frac{1}{7}$ mm. diam., subrotundis; hyphis hymenii, 2-3 μ . cr.; sporis... non inventis.

Hab. ad truncos in ins. Java (Junghuhn herb. 128, 129). — Affinis *Polyp. vallato* videtur; specimina omnia visa margine pileolis transverse positis prolifera.

35. **Polyporus bicolor** Jungh. — Syll. VI, p. 207 (*Fomes*). — Teste 1053
cl. Bresadola in Ann. Mycol. (1910) p. 586, huius speciei synonyma essent: *Polyporus anebus* Berk., *Polyp. pruinosus* Berk., *Polyp. vulneratus* Lév., *Polyp. anisopilus* Lév., *Fomes polytropus* B. et Br., *Polystictus subpictilis* P. Henn., *Hapalopilus subrubibus* Murr.

36. **Polyporus Sarrazini** Schulz. in Rev. Mycol. (1883) p. 257 et in 1054
Lucand, Champ. Fr. tab. 99. — Simplex v. subimbricatus, suberoso-stupposus, sessilis; pileo irregulari e resupinato reflexo, postice usque ad 9 mm. cr., 2-5 cm. lato, melleo-umbrino, radiatim hirsuto, zonato, intus concolore; tubulis medio 2-8 mm. longis, concoloribus; poris dilutioribus, primitus pruinosus, mediocribus, centro subinde amplioribus, demum versiformibus; sporis.... non visis.

Hab. ad ramos decorticatos putres quercinos, in silvis pr. Mohaco et Vinkovce Hungariæ (SCHULZER) et in Gallia (SARRAZIN, PAILLARD, LUCAND). — Teste Lucand l. c. forma *P. vulpini*. Species a Schulzer describitur pileo *cinnamomeo* qui e contra *melleus* pingitur a Lucand.

37. **Polyporus pennsylvanicus** Sumstine, Journ of Mycol. XIII (1907) 1055
p. 137. — Pileo orbiculari, integro, e convexo depresso, subumbilicato, 2-6 cm. lato, æquali, glabro, v. fibrillis innatis paucis tecto, pallide ochraceo, e castaneo isabellino, margine tenui, acuto, inflexo, ciliis paucis evanescentibus prædito; contextu albo, 1-10 mm. cr.; tubulis albis, inæqualiter polygoniis, 0,5-1 mm., circ. 2 in 1 mm., forma et situ variabilibus, dissepimentis tenuibus, acie demum serrulata v. fimbriata, decurrentibus; sporis latis, ellipsoideo-fusoideis, nucleatis, hyalinis; stipite centrali v. quandoque parum excentrico, 2-4 cm. longo, 2-10 mm. cr., pileo concolori v. paullo pallidiori, præcipue ad basim flavo-tomentoso, solido, intus albo, supra incrassato, ibique ex tubulis decurrentibus simulate lacero-reticulato.

Hab. in ramis dejectis, Fern Hollow Allegheny Co. Penns. Amer. bor. — Fungus udus odore subnitroso dignoscitur.

38. **Polyporus coracinus** Murr., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) 1056 p. 471. — Pileo e suborbiculari reniformi, basi tuberculiformi adhærente, tenui, carnosio-tenaci, conchato, 3-4 × 4-5 × 0,2 cm., superficie flavido-alba, minute tomentosa, dein glabra et nigra; margine tenui integro, concolori; contextu usque ad 1 mm. cr., homogeneo ex albo pallido sed cuticula nigrescente prædito; tubulis 1,5 mm. long., intus ex albo avellaneis, ore circulari, regulari, præditis, 4 in quoque mm., e pallido nigris, acie obtusa integra; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, 2,5-3,5 μ . cr., hyphis 3 μ . cr.; cystidiis obscure fulvis, brevibus, ventricosis, acuminatis, 10-25 μ ., sæpe ramosis v. cæspitosis.

Hab. in ramis emortuis prope Paulo Leyto, Amer. centr. (A. D. E. ELMER).

39. **Polyporus Underwoodii** Peck, New York State Mus. Bull. n. 105 1057 (1906) p. 27. — Pileo variabili, e convexo concavo, 12-25 cm. lato, 5 cm. circ. crasso; superficie obscure concentrice zonata, albo-lactea, pruinosa, arescendo cremea, centro depressa et avellanea; margine irregulariter undulato lobato, v. deflexo v. recurvo, tenuissimo, non ciliato; contextu albo, carnosio, tenaci, 2-5 mm. cr., tubulis albo-lacteis, 2-3 mm. long., 5-6 in quoque mm., cylindræis, acie tenui, ex integro lacerata; sporis ellipsoideis, hyalinis, æqualibus, 6-7 × 3; stipite brevi centrali, solido, ligneo, æquali v. basi angustato, levi, pruinoso, supra albo, infra fuligineo, 3 cm. longo, 2-3 cm. cr.

Hab. ad radices emortuas Betularum, Cornwall Co., Amer. bor. (L. M. UNDERWOOD). — *Polyporo fisso* Berk. proximus.

40. **Polyporus auriculiformis** Jungh. — Ita vocari debet *Poria auriculiformis* (Jungh.) Cooke — Syll. VI, p. 300. — teste cl. Bresadola in Ann. mycol. (1910) p. 586.

41. **Polyporus arculariformis** Murrill, Torreyia IV (1904) p. 151. 1059 North Amer. Fl. v. IX, Pt. I (1907) p. 59. — Pileo circulari, umbilicato, 0,6 0,8 × 0,05-0,1 cm., superficie regulariter concentrice rugosa, circum circa albida, centro depresso, ex isabellino avellaneo, parum imbricato-fibrilloso; margine tenui, acuto, mox deflexo, albido, ad isabellinum vergente, ciliis numerosis, acuminatis, longis, albis, ornato; contextu membranaceo, albo, vere opaco; tubulis 0,2-0,4 mm. long., 2-3 in 1 mm., radiatim elongatis decurrentibus, pallidis, acie tenui, irregulariter dentata et fimbriata;

sporis hyalinis, levibus, tenuiter tunicatis, 7-8 \times 2-2,5 cr., stipite centrali, farcto, equali, concolori, setulis acuminatis ætate caducis, basi dense tomentoso, 1,5-2 cm. long., 0,5-1 mm. cr.

Hab. ad ramos emortuos dejectos, Unaka Springs Tennessee Amer. bor.

42. **Polyporus Noackianus** (Pat.) Sacc. et Trott. — *Melanopus Noackianus* Pat., Ann. Mycol. V (1907) p. 365. — Pleuropus; pileo spathulato-curvato, antice rotundato, postice cuneato immarginato, glabro, levi vel striatulo, indurato, rigido, 3 cm. longo, 2 1/2 cm. lato, albido; contextu concolori crassiusculo, 4-6 mm. cr.; hymenio cinereo; tubulis longiusculis, cinereis; poris punctiformibus, integris; stipite brevi, albido, inferne atro.

Hab. ad ligna emortua, Cubatao, Prov. Sao Paulo, Brasil. — A *Polyp. Blanchetiano* differt colore albido et pileo crassiore, duriore, rigidiore.

43. **Polyporus stramineus** (Pat.) Sacc. et Trott. — *Spongipellis stramineus* Patouill., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIV (1908) pag. 166 cum icon. — Sessilis, solitarius, ungulatus, postice marginatus v. dimidiatus, 5-8 cm. diam. undique flavo-stramineus, mollis, spongiosus; pileo convexo adpresso strigoso-hymenio applanato, poris majusculis angulosis, minutissime dentatis, tubulis 5-15 mm. long.; sporis ovoideis, levibus, uniguttulatis, stramineis, 10 \times 6.

Hab. ad truncos in silvis humidis Novæ-Caledoniæ (LE RAT).

44. **Polyporus occidentalis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Spongipellis occ.* 1062 Murrill, North Amer. Fl. IX Pt. I (1907) p. 38. — Pileo crasso, dimidiato, sessili, subimbricato, supra convexo, 5-8 \times 7-10 \times 2-3; superficie conspicue hispido-tomentosa, spongiosa, azoma, levi vel subrugosa, ex albo cremea v. isabellina; margine crasso, obtuso, concolori, fertili; contextu molli, spongioso-fibroso, ex albo pallide flavido, 1-2 cm. cr.; tubulis longis tenuibusque, 1 cm. long., intus ex albido stramineis, in exemplaribus senioribus siccis fulvis, ore minuto, anguloso, 5 in 1 mm., acie tenui, ex albo cremea, fimbriato-dentata, dein lacerata, demum collabescente et fulvescente; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis, 6-7 \times 4-5; hyphis 6 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos Fagi prope Ithaca New York, Amer. bor. (K. M. WIEGAND).

45. **Polyporus luzonensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Spongipellis luzonensis* Murr., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) pag. 473. — Pileo tenui, tenaci, rigido, imbricato, lateraliter connato, sessili,

dimidiato, parum decurrente, conchato, 1-1,5 \times 1,5-2,5 \times 0,2-0,5 cm.; superficie azona, anoderma, fibrilloso-tomentosa, ex albo discolori, aquam absorbente; margine tenui, undulato, concolori, facile fissili, fertili, in sicco decurvo; contextu spongioso-fibroso ex albo pallide isabellino, 2 mm. c. cr.; tubulis ex albo decoloratis, tenacibus, elasticis, 2-3 mm. long., ore ex albo decolorata, irregulari præditis, 4-6 in quoque mm., sublucentibus, acie tenuissima, fimbriato-dentata; sporis globosis, levibus, hyalinis, 3-4 μ . cr.; hyphis hyalinis 5-6 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo Mt. Mariveles Luzon Ins. Philippin. Amer. centrali (A. D. E. ELMER).

46. **Polyporus luridescens** (Murr) Sacc. et Trott., *Spongipellis luri-* 1064
descens Murr., North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 39. — Pileo compresso-angulato, subimbricato, sessili, dimidiato, subtus appllanato, 3 \times 5 \times 1-2 cm.; superficie levi, spongioso-tomentosa, azona, anoderma, ex isabellino fulva v. fuliginea; margine sat crasso, obtuso v. acutato, integro, sterili, concolori; contextu molli, spongioso, ex albo decolorato, 3-5 mm. cr., 5-8 mm. longo, intus ex albo isabellino, ore ex anguloso circulari, dein postice sinuoso et subirpiciformi, 1-2 in quoque mm.; acie tenui, firma, suberosa, ex integro lacerata, dein ex isabellino fuliginea; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis, 3-4 \times 1-2; hyphis 3 μ . crassis, flavido-albis; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos vetustos prope Hall's Delight Jamaica, Amer. bor. (F. S. EARLE).

47. **Polyporus ambiens** (Karst.) Sacc. et Trotter, *Spongipellis am-* 1065
biens Karst., Travaux Soc. Imp. Russe Geogr. t. VIII (1905) p. 61. — Pileo suberoso, compacto, dimidiato, obovoideo, depressopulvinato, hirtulo, azono, pallescenti, margine obtusissimo, 10 cm. circ. lato, contextu albido; poris adnatis, variis, curtis, tenuibus angulatis, dein denticulatis, minutis v. mediis, flavescens.

Hab. ad corticem arborum frondosorum?, Yamorovka Transbaicaliæ. — *Polyporus* (*Spongipelli*) *boreali* (Wahl.) Fr. affinis.

48. **Polyporus sororius** Karst. ad int., Trav. Soc. Imp. Russe de 1066
Geogr. t. VIII (1905) p. 61, *Polyporellus caudicinus* (Scop.) Karst., subsp. *sororius* Karst. olim. — Pileo carnosolento, explanato, pallescenti, squamis innatis, maculas latas, centrifugas fulvescentes sistentibus, 10 cm. circ. lato; stipite subexcentrico, brevi, crasso, deorsum leviter attenuato, scabro, pallido, unicolori, apice e poris decurrentibus reticulato, 3 cm. circ. alto et 1 cm. crasso; poris

dein amplis, angulatis, pallidis, siccitate flavescens; sporis oblongatis, 1-2 guttulatis, 10-13 \approx 4-5.

Hab. ad truncos arborum frondosarum, Yamarovka Transbaikaliæ. — A *Polyp. sororio* pileo polito, maculoso, stipiteque unicolori dignoscitur.

49. **Polyporus caseosus** (Pat.) Sacc. et Trott., *Leptoporus caseosus* 1067
Pat. Ann. Mycol. V (1907) p. 365. — Pileo dimidiato-sessili, convexo, 10 cm. circiter lato, 7 cm. longo, 3 cm. crasso, albido lutescente, plicato-rugoso, villosulo, caseoso-molli, margine integro, tenui, acuto; hymenio albo, convexulo vel applanato; tubulis tenuibus, dentato-laceratis; poris minutis, angulosis; sporis hyalinis, ovoideis, levibus, 4-5 \approx 3-4; contextu albo.

Hab. ad truncos, Campinas, Prov. S. Paulo Brasiliæ — *Polyporo lacteo* affinis.

50. **Polyporus asperulus** (Pat.) Sacc. et Trott., *Leptoporus asperulus* 1068
Pat., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIII (1907) p. 82. — Pileo rigido, 2-8 cm. lato, suberoso, reniformi, applanato, concentricè sulcato, alutaceo-pallescente dein obscurato, tactu aspero, margine acuto, integro, intus albido; poris minutis, subrotundis, stipatis, dissepimentis tenuibus integris, alutaceo-fuscis.

Hab. in ligno emortuo, Sudan Africæ bor. (CHUDEAU). — *Polyporo anebo* proximus.

51. **Polyporus fragilis** Fr. — Syll. VI, p. 111, *Leptoporus fragilis* 1069
(Fr.) Pat. — var. **violascens** Patouill., Bull. Soc. Myc. Fr. XXV (1909) p. 5. — A typo differt colore contusione lilacino v. violaceo; sporis minoribus, 3-5 \approx 2.

Hab. ad truncos Dipterocarpi, in montibus Laing-Biang Annam Indo-Chinæ (EBERHARDT).

52. **Polyporus Spermolepidis** Pat. — Syll. XVI, p. 147, *Ungulina* 1070
Spermolepidis Pat. — var. **Pandani** Patouill., Bull. Soc. Myc. Fr. XXII (1906) p. 51. — A typo differt poris integris nec denticulatis, trama minus alba.

Hab. ad truncos Pandani in Polynesia (SEURAT). — Typus nascitur quoque in Spermolepide tannifera in Nova Caledonia (PATOILLARD).

53. **Polyporus subtestaceus** Bres. Ann. Myc. III (1905) p. 162. — 1071
Pileo caseoso-molli, subfibroso, in sicco subfriabili, pulvinato-subungulato, dimidiato-sessili, anodermeo, azono, ruguloso-subtomentoso, glabrescente, subtestaceo, 10-14 cm. lato, 8-10 cm. antice producto, margine crasso, convexo; tubulis carnosis, flavido-rubescen-

tibus, usque ad 2 cm. longis; poris mediocribus, subrotundis, angulatis, elongatis vel etiam sinuatis, acie fimbriatis, e flavo rubescentibus, exsiccatis fusco-lateritiis, $\frac{1}{3}$ -1 mm. latis; carne caseoso-fibrosa, pallide testacea, azona, inodora, sapore amariusculo; sporis obovatis, hyalinis, nucleo stramineo-flavo, $6\frac{1}{2}$ -9 \approx 5-6; hyphis contextus tubulorum 3-5 μ . crassis; hyphis contextus pilei 4-6 μ ., sub micr. hyalinis.

Hab. ad truncos Fagi, Prencow Hungariæ, autumnò (KMET).

— *Polyporo croceo* Pers. affinis, a quo contextu molliori, colore pallidiori et sporis majoribus præcipue distinguitur.

54. **Polyporus rudis** (Pat.) Sacc. et Trott., *Xanthochrous rudis* Pat., 1072
Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII (1907) p. 83. — Pileo lignoso, durissimo, sessili, pulvinate-angulato, obtuse marginato, 5-12 cm. lato, 6-8 longo, 8 cr., strato annoso marginali latissimo, tactu velutino, cinnamoneo, strato hornotino atro valde rimoso-partito; contextu fibroso-radiante, concentrice-zonato, ferrugineo, crassissimo; poris minutis, fusco-cinnamoneis, dissepimentis obtusis, integris; tubulis brevibus, stratosi; sporis ovoideis, levibus, 5 \approx 4; cystidiis paucis, spiniformibus, fuscis, 15-20 \approx 5.

Hab. ad basim truncorum, Sudan Africæ bor. (CHUDEAU).

55. **Polyporus Ludovicianus** (Pat.) Sacc. et Trott., *Xanthochrous Lu-* 1073
dovicianus Patouill., Bull. Soc. Myc. de Fr. XXIV (1908) p. 6.
— Pileo 20 cm. longo, 15 cm. lato, 15 mm. cr., applanato, undulato, grosse radiato-rugoso, velutino scruposo, postice cuneato substipitato, tactu molli, pure ferrugineo, antice recto, margine sinuoso, tenui, contextu ferrugineo, sericeo; tubulis concoloribus, mollibus, postice decurrentibus, poris rotundis, minutis, laceratis, usque ad marginem productis, primitus albo-irroratis dein fusco-ferrugineis; cystidiis nullis; sporis copiosissimis, levibus, ovoideis 6 \approx 3,5, ferrugineis.

Hab. ad truncos emortuos, Louisiane Americæ (LANGLOIS).

56. **Polyporus fusco-velutinus** (Pat.) Sacc. et Trott., *Xanthochrous* 1074
fusco-velutinus Patouill., Bull. Soc. Myc. de Fr. XXIV (1908)
p. 6. — Pileo sessili, postice cuneato, applanato, rigidulo, circiter 10 cm. longo, obscure zonato, brunneolo, pilis raris ferrugineis vestito, margine, recto, acuto, integro; contextu firmo, grosse radiato, circiter 12 mm. cr.; tubulis rigidis ferruginosis; poris angulosis, minutis, integris, usque ad marginem productis; cystidiis nullis; sporis luteo-ferrugineis, ovato-globosis, levibus, 7 \approx 5.

Hab. ad truncos quercinos, Louisiane (LANGLOIS).

57. **Polyporus Rickii** (Pat.) Sacc. et Trott., *Xanthochrous Rickii* Pat. 1075
 touill., Bull. Soc. Myc. de Fr. XXIV (1908) p. 6. — Pileo sessili, dimidiato, unguato, 15 cm. lato, 3 cm. longo, convexo, fusco-brunneo, ruditer hispido, margine obtuso, fulvo, pubescente; hymenio plano-concavo, albido, fusco-maculato, poris tenuibus, angulosis, integris v. laceratis; tubulis 8-10 mm. longis, rufulis, fragilibus (in sicco), non stratosis; sporis flavis, ovoideis, levibus, $6 \approx 4$, cystidiis rufis, acutis $20-25 \approx 8$; contextu fusco-brunneo, radiato, dense circulariter zonato, friabili, ex hyphis 5-6 μ . cr. formato, nonnullis conidiferis, conidiis globosis v. fusoideis, luteo-fuscis, breviter catenulatis, 10-12 μ . diam.

Hab. ad truncos in Brasilia (RICK). — *Polyporo hispido* proximus et forsan *Ptychogaster cubensis* Pat. huc ducendus.

58. **Polyporus radiato-velutinus** (Pat.) Sacc. et Trott., *Xanthochrous radiato-velutinus* Pat., Ann. Mycol. V (1907) p. 365. — Imbricatus, dimidiato-sessilis; pileo convexo, 8 cm. lato, 6 cm. longo, 3-4 mm. crasso, postice, obscure rufo, antice flavido, longitudinaliter radiato-cristato, undique velutino, margine inflexo, acuto; contextu ferrugineo, fibroso; tubulis aureis; hymenio rufo-flavo vibranti; poris angulosis, minutis, dissepimentis acutis, integris; sporis levibus, ovoideis, flavis, $6 \approx 5$; hyphis subhymenialibus flavis 5 μ . crassis; cystidiis raris, acutis, crasse tunicatis inferne inflato-globosis, $15-20 \approx 6-8$ vel elongatis $50 \approx 6-9$, rufis.

Hab. ad truncos Campinas, Prov. S. Paulo, Brasiliæ. — *Polyporo radiato* affinis costulis cristatis regularibus dignoscendus.

59. **Polyporus Noacki** (Pat.) Sacc. et Trott., *Xanthochrous Noacki* Pat., Ann. Mycol. (1907) pag. 365. — Pileo sessili, unguato, 25 cm. lato, 10 cm. longo, 6 cm. crasso, brunneo, scabriusculo-glabrescenti, lignoso, concentrice sulcato, sulcis magnis, distantibus; contextu ferruginoso; tubulis longissimis, stratosis; margine obtuso, velutino, rubiginoso; hymenio rufo-umbrino, plano-convexo; poris minutis, integris, dissepimentis crassis; sporis fulvis, ovoideis, levibus, $6 \approx 4$; cystidis nullis.

Hab. ad truncos Araraquara, Prov. S. Paulo Brasiliæ. — *Polyporo inflexibili*, *P. seni* et *P. holosclero* affinis, pileo maximo, unguato, glabro etc. dignoscendus.

60. **Polyporus Friesii** Bres., Ann. Mycol. (1905) p. 163, *Fomes fulvus* Fries, non Scop., sec. Bresad. — Pileo suberoso-lignoso, e tuberculoso convexo, interdum triquetro, sæpe postice resupinato-producto et scalari-imbricato, dimidiato-sessili, hirto-villoso, ætate

denudato, pallide vel luride fulvo, 5-10 cm. lato, contextu fibroso-radiante, duro, fulvo-ferrugineo, interdum zonato; tubulis e luride flavis subconcoloribus, 1-3 cm. longis, nunquam stratosi; poris mediocribus, rotundatis vel oblongis, demum laceris; tubulis concoloribus, $\frac{1}{2}$ -1 mm. latis; sporis ochraceis, ellipticis, 7-9 \times 4-5; hyphis contextus pororum 3-6 μ . crassis.

Hab. ad truncos præcipue *Quercus* et *Populi* in *Silva nigra* (Dr. PFEIFFER). — Species hæc e grege *Polypori hispidi, cuticularis* etc., prope quos in systemate locanda; a *Fomite fulvo* Scop. vero prorsus diversa.

61. **Polyporus polychromus** Copeland, Ann. Mycol., II (1904) p. 507). 1079

— Solitarius vel superimpositus; pileo lateraliter fixo, reniformi 4 cm. longo, 6 cm. lato, suberoso, extus azono, pulvinato; pellicula tenui, secedente, ad marginem citrinum obtusum deficiente; contextu apud stratum tubuliferum saturate fusco, sursum usque ad stratulum subcuticularem flavo-pallescenti, obscure concentricozonato; poris irregularibus, inæqualibus, apud basim minutis, ad 8 mm. altis, intus cinereo-fuscis, ore viridulo-albis; sporis 10 \times 7, obovatis, subfuscis.

Hab. ad truncos emortuos *Quercus lobatae*, prope *Staford Univers. Californiæ*.

62. **Polyporus Eichelbaumii** P. Henn. in Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 1080

p. 109. — Pileo subcarnoso-lento, deinde subcoriaceo, conchiformi-flabellato, sessili v. breviter discoideo-stipitato, convexo, ad marginem venoso-striatulo, rufo-brunneo, dein p. p. gilvescente, 5-12 cm. lato, 4-6 cm. longo, 2,5-3 mm. crasso, margine tenui, sicco, involuto, contextu pallide alutaceo, hymenio subferrugineo; tubulis 1-1,5 mm. longis, poris minutis rotundatis, obtusis; sporis subglobosis v. ovoideis, 4-5 \times 3-4, hyalino-flavidulis.

Hab. ad truncos, *Amani Usambara Africae*. — *Polyp. vibecino* Fr. affinis, sed forsitan ad gen. *Polystictus* potius adscribenda species.

63. **Polyporus amarus** Hedgcock, Mycologia II (1910) p. 155. — 1081

Pileo primum carnosio spongioso, dein vetustate indurato et sublapideo, ungulato, sæpe spurie stipitato, majusculo, 5-11 \times 10-20 \times 6-12 cm., initio superficie pubescente demum rimoso, juniore fulvo dein castaneo sæpe brunneo-tincto, margine obtuso, sæpius saturatius limbato, nonnunquam leviter sulcato, contextu ex flavo-cremeo subcastaneo extus frequenter obscuriore; sapore amaro, sæpius basi resinoso, *Polypori officinalis* ad instar, 4-8 cm. cr.; tubu-

lis non stratosis, cylindricis, 0,5-3 cm. longis, marginem versus brevioribus, intus brunneis, ore circularibus v. subirregularibus, 1-3 in quoque mm., flavis v. flavo-viridulis, tactu v. senio brunnescentibus, demum laceratis; sporis ovoideis, levibus, nucleatis, 5-8 \approx 3-4, hyalinis v. brunneolis; cystidiis nullis.

Hab. in silvis Californiæ ad truncos Libocedri decurrentis, cui noxius.

64. **Polyporus Clemensiæ** (Murr.) Sacc. et Trott., *Inonotus Clemensiæ* 1082
Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 401. — Late imbricatus, obscure fulvo-brunneus; pileo sessili, dimidiato, conchato, rigido, fragili in sicco, 5-7 \approx 10-15 \approx 1-1,5 cm.; superficie molli, anoderma, azonata, breviter tomentosa, leniter radiato-rugosa; margine tenui, fertili, irregulariter inciso v. undulato; contextu spongioso-fibroso, homoganeo, 1 cm. circ. cr.; tubulis 5 mm. long., ore angulari, 2-3 in 1 mm., acie tenui, integra; sporis ellipsoideis, levibus, pallide fulvis, 6-9 \approx 5-6; hyphis crassis ferrugineis, cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo prope Campo Keithley Mindanao Ins. Philippin. Amer. Centr. (MARY S. CLEMENS).

65. **Polyporus Wilsonii** (Murrill) Sacc. et Trott., *Inonotus Wilsonii* 1083
Murr. Bull. Torr. Bot. Cl. XXXI (1904) p. 598, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 89. — Pileo dimidiato, applanato, sessili, 2-3 \approx 4-6 \approx 0,5 cm.; superficie anoderma, velutino-tomentosa, fulva, sulcis brevibus concentricis signata; margine tenui, integro, concolori, sulcato, in sicco deflexo; contextu molli, crasso, homoganeo, ferrugineo-fulvo, 1-3 mm. cr., stratu tenui, nigro a tubulis separato; hymenio ferrugineo, lucenti; tubulis 1-2 mm. long., 8-9 in 1 mm., intus isabellinis, ore polygonali, regulari, acie tenui, integra; sporis lenticularibus, levibus, pallide ferrugineis, 3-4 μ . diam., e latere 1-1,5 μ . cr.

Hab. ad truncos dejectos, Honduras, Amer. centr.

66. **Polyporus texanus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Inonotus texanus* 1084
Murrill, Bull. Torr. Bot. Club XXXI (1904) pag. 597 et North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 88. — Pileo unguolato, vertice adhærente, 3 \approx 5 \approx 2-4 cm.; superficie e griseo isabellina fuliginea, minute tomentosa, concentrice et radiatim rimosa; partibus separatis imbricato; margine e crasso obtuso, pallido; contextu suberoso, anguste concentricæ zonato, e fulvo umbrino, iridescenti, 1 cm. cr. in exemplaribus juvenilibus, tenui quandoque in senilibus; tubulis 1-3 cm. long., 2-3 in 1 mm., e fulvo fusco-castaneis, ore

polygonali e pallido fulvo, ætate obscuriori, acie tenui, integra; sporis ovoideis, levibus, atro-brunneis, 1-2 guttulis, 8-10 μ . cr.

Hab. ad truncos vivos languentes, Austin Texas Amer. bor.

67. **Polyporus pusillus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Inonotus pusillus* 1085

Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXI (1904) p. 599, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 87. — Pileo sessili, convexo, flabelliformi, basi e conoideo angustato ex lenticellis erumpente, 2 \times 2 \times 0,5-1 cm.; superficie e ferrugineo fulva, sericeo-striato, subzonato, nitido; margine pallido, acuto, distincte depresso; contextu tenui, fibroso, ferrugineo; tubulis umbrinis, latis, 2-4 in 1 mm., polygoniis, dein irregularibus, contextum longitudine valde excedentibus, ore albido-pulveraceo, septis tenuibus, integris; sporis parvis, ovoideis 5 \times 3,5, pallide ferrugineis, numerosis; hyphis concoloribus.

Hab. ad ramos emortuos Jacquiniæ, Manzanillo, Mexico.

68. **Polyporus pertenuis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Inonotus pertenuis* 1086

Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 87. — Pileo vere tenui, parum flexibili, fragili, sessili, dense imbricato, decurrente, lateraliter connato, concavo, 2-3 \times 4-6 \times 0,1-0,2 cm.; superficie striata, hispido-squamulosa, anoderma, spurie zonata, fulva; margine tenui, lobato, fimbriato, in sicco fortiter incurvato; contextu fulvo, suberoso, 1 mm. cr. v. minus; tubulis e ferrugineo fulvis, 1-1,5 mm. long., ore e circulari anguloso, minuto præditis, 5-6 in quoque mm., acie tenui, ex integro lacerata, fragili, e ferrugineo atro-fulva; sporis ovoideis, levibus, pallide ferrugineis, 5 \times 4.

Hab. ad ligna dejecta, El Yunque, Cuba (L. M. UNDERWOOD et F. S. EARLE).

69. **Polyporus juniperinus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Inonotus juniperinus* 1087

Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) pag. 88. — Pileo firmo, suberoso, sessili angusto, adhærente, flabelliformi, supra concavo, infra convexo, 6 \times 5 \times 1 cm.; superficie glabra, rugosula, ad marginem subzonata, fulvo-ferruginea, leviter nigromaculata; margine tenui, late sterili, glabro ex integro suberoso, fragili, in sicco atro; contextu carnosoviscoso, in sicco fragili, sublucenti, e pallide ferrugineo umbrino-fulvo, 5-7 mm. cr., tubulis brevibus, fragilibus, intus fulvis, 1-2 mm. long., ad marginem punctiformibus, ore angulari, 4 in 1 mm., nitidis, e castaneo nigris, acie tenui, ex integro fimbriato-dentata; sporis globosis, levibus, atro-brunneis, 3,5-5 μ . cr.; hyphis ferrugineis 3 μ . cr.

Hab. ad radices Juniperi in Texas Amer. bor. (W. H. LONG IR.).

70. **Polyporus jamaicensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Inonotus jamaicensis* Murr., Bull. Torr. Bot. Club XXXI (1904) p. 597 et North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 88. — Pileo e dimidiato triquetro, convexo, sessili, basi lata adhærente, simplici v. complicato, $2 \approx 3 \approx 1-1,5$ cm., superficie incrustata, minute rugosa, postice cinerea, ad marginem zonis atro-brunneis v. nigris signata; margine regulari, distincte obtuso; contextu fibroso, fulvo, paucis mm. cr.; tubulis 1 cm. long., 4 in quoque mm., confluendo latioribus, fulvis, e polygonio irregularibus, acie tenui, integra; sporis ovoideis, levibus, distincte ferrugineis, 1-2-guttulatis, numerosis, $5-7 \mu$. crassis.

Hab. ad ramos emortuos, Mabess River, Jamaica Amer. bor.

71. **Polyporus fulvo-melleus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Inonotus fulvo-melleus* Murr., North Amer. Fl. IX, Pt. II (1908) p. 87. — Pileo subirregulari e dimidiato subcirculari, compresso-ungulato, $3-5 \approx 5-10 \approx 1-3$ cm., superficie inæquali, e ferrugineo fulva, leniter spurie zonato, rugoso-hirsuto v. pilis fulvis ramosis velutino; margine plerumque crasso, undulato, olivaceo-luteo, hispido; contextu radiato-fibroso, luteo, nitido, 3-7 mm. cr.; tubulis angustis, 3-10 mm. long., intus atro-melleis, 4-5 in quoque mm., ore circulari regulari, statu juvenili pulvere flavida, nitida tecto, acie tenui, integra, e flavo-melleo melleo-fulva; sporis ovoideis, tunica tenui præditis, pallide ferrugineis, $8 \approx 6$; hyphis concoloribus; spinulis atro rubro-brunneis, angustis, conoideis, apice incurvatis, basi 10μ . cr., 60μ . long. v. minus.

Hab. ad ligna emortua prope Blue Mountain Peak, Jamaica, Amer. bor. (E. M. UNDERWOOD).

72. **Polyporus Elmerianus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Inonotus Elmerianus* Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) p. 471. — Pileo subimbricato, sessili, dimidiato, conchato, tenui, leniter flexibili, $3 \approx 4-5 \approx 0,1-0,3$ cm.; superficie e minute tomentosa subglabra, postice v. partim spongioso-tomentoso, æquali, leniter zonato, e ferrugineo-fulvo, dein fuligineo; margine tenui, undulato, ferrugineo; contextu ferrugineo, supra suberoso infra fibroso, usque ad 1 mm. cr.; tubulis brevibus, intus fulvis $0,5-1,5$ mm. long., ore minutissimo, regulari e circulari angulari præditis, 9-11 in quoque mm., e fulvo umbrinis, ruptis badiis, initio mycelio e flavo-luteo farctis, acie tenui, integra; sporis subglobosis, levibus, pallide ferrugineis, numerosis, 2μ . cr.; hyphis pallide ferrugineis $3-4 \mu$. cr., cystidiis nullis.

Hab. in lignis emortuis Mt. Mariveles, Luzon Ins. Philipp. Amer. centr. (A. D. E. ELMER).

73. **Polyporus corrosus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Inonotus corrosus* 1091 = *Polyp.*
Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXI (1904) p. 598, North Amer. *capucinus Murrill*
Fl. v. XI, Pt. II (1908) p. 89. — Pileo concavo, adnato-amplectente, simplici v. pluribus imbricatis, 3 ≈ 5 ≈ 1-4 cm.; superficie e ferrugineo fulva, ætate sulcata et corrosa; margine integro, obtuso, tomentoso, flavo-melleo; contextu crasso, spongioso, fibroso, ferrugineo, insectis corroso post maturitatem; tubulis brevibus, in quoque stratu 1 mm. long., 8 in quoque mm., fulvis, subcylindræis, acie integra, ex obtuso acuta; sporis lenticularibus, levibus, pallide ferrugineis, 4 µ. diam., 1 µ. cr.; hyphis pulchre ferrugineis. VI, 191

Hab. ad truncos dejectos, Hope Gardens, Jamaica, Southern Florida, Bahamas, Cuba, Jamaica.

74. **Polyporus amplectens** (Murrill) Sacc. et Trott., *Inonotus amplectens* 1092
Murr., Bull. Torr. Bot. Club XXXI (1904) p. 600 et North Amer. Fl. IX, Pt. II (1908) pag. 89. — Pileo hemisphærico, adnato-amplectente, subtus concavo, 1-3 cm. diam., 1-2 cm. cr.; superficie molli, velutina, obscure flavo-aurantiaca; margine initio obtuso, integro, flavo-stramineo, dein tenui, undulato v. dentato, deflexo et concolori; contextu molli, spongioso-fibroso, ferrugineo; hymenio initio flavo-melleo, dein umbrino; tubulis 2-4 mm. long., 2-4 in 1 mm., confluendo latioribus, intus umbrinis, ore initio membrana flavida clauso, subcirculari, regulari, integro, dein lato, irregulari, grosse dentato in laciniis irpiciformes concentricè diviso; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis, 1-2-guttulatis, 4-6 µ. long.

Hab. in ramis vivis *Asiminae*, Ocmulgee River, Georgia Amer. bor.

75. **Polyporus irpicoides** (Karst.) Sacc. et Trott., *Bjerkandera irpicoides* 1093
Karst., Acta Soc. pro Faun. et Fl. fenn XXVII (1906) p. 5. — Pallidus; pileo dimidiato, basi attenuato, subtriquetro, carnosofibroso, molli sat tenui, convexo-plano, glabro, anodermeo, superficie radiatim fibrilloso, margine acuto, inflexo, tenui, circiter 5 cm. lato; poris longis, magnitudine et forma valde variis, laceris, dentatis, tenuibus, mollibus.

Hab. in ligno Pini (ut videtur) prope Fagervik Fenniae (EDV. HISINGER).

76. **Polyporus altocedronensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Spongiporus altocedronensis* 1094
Murrill, North Amer. Fl. IX Pt. I (1907) pag. 30.

— Pileo carnosio et spongioso, late adhærente, decurrente, subimbricato, 0,5-1 \times 1,5-3 \times 0,5-1 cm.; superficie alba, azona, levi, villosa; margine crasso, late sterili, contextu albo, distincte carnosio et spongioso, radiato-fibroso, fibrillis paucis saturatoribus et firmiter, 3-8 mm. cr.; tubulis brevibus, amplis, ex albo pallide rubro-brunneis, 1 mm. circ. longis, 1-2 in quoque mm.; ore omnino irregulari, angulosis, acie tenui, inæquali, dentata; sporis globosis, levibus, hyalinis, 4-4,5 μ . cr.; hyphis 3-4 μ . crassis.

Hab. ad lignum putre prope Alto Cedro, Cuba, Amer. bor. (L. M. UNDERWOOD et F. S. EARLE).

77. **Polyporus subterraneus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Rigidiporus subterraneus* Murr. North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 46. — Pileo tenui, coriaceo, sicco rigido, inflexo, dimidiato, basi angusta adhærente, applanato, 1-3 \times 1,5-5 \times 0,1-0,2 cm.; superficie levi, nitida, glabra, conspicue zonata, radiato-rugosa, e lateritio fulva, lineis isabellinis signata, *Sterei* spec. simulante; margine tenui, levi, cremeo, subtus late sterili, in sicco acute inflexo; contextu tenuissimo, albo, fibroso; tubulis minutis, 0,5-1,5 mm. long., intus ex albo pallidis, ore æquali, regulari, anguloso, inconspicuo præditis, 6-7 in quoque mm., acie tenui, integra, ex albido-pruinoso ochracea v. pallide carnea; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad ramos emortuos, El Yunque, Cuba (L. M. UNDERWOOD et F. S. EARLE).

78. **Polyporus subrubidus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Hapalopilus subrubidus* Murr., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) p. 470. — Pileo imbricato, umbonato-sessili v. basi angusta adhærente, dimidiato v. flabelliformi, conchato, tenui, leniter flexibili, 3-4 \times 4-6 \times 0,1-0,3 cm.; superficie glabra, leniter zonata, fulva; margine tenui, recto, integro v. leniter undulato, fracto rubro-brunneo; contextu ferrugineo, subfibroso, tenaci, 1-2 mm. cr.; tubulis brevibus, intus obscure lilacinis, 1 mm. long., ore minuto, leniter anguloso, regulari præditis, 7-8 in quoque mm., acie tenui, integra ex obscure carneo fulva; sporis globosis, levibus, hyalinis, 3-4 μ . cr.; hyphis 2-3 μ ., pallide ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo, Mt. Mariveles, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (A. D. E. ELMER).

79. **Polyporus Ramosii** (Murr.) Sacc. et Trott., *Hapalopilus Ramosii* Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 400. — Pileo pro situ distorto; pileis junioribus imbricatim orientibus ex utraque pagina individuorum seniorum; sessili, dimidiato, suberoso, po-

stice incrassato, dein margine tenui, supra convexo v. applanato 2-3 \times 4-5 \times 0,5-1 cm.; superficie anoderma, subinæquali, azonata, minute hirto-tomentosa, fulva; margine acuto subintegro, concolori v. subpallidiori, sterili; contextu fulvo, homoganeo, 2-4 mm. cr.; tubulis griseis, intus umbrinis, 2-4 mm. long., 7 in 1 mm., ore minuto, subangulari, regulari, lucenti, ex obscure fulvo secundum lucis directionem badio, acie tenui, firma, integra; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, 3-4 μ . diam., hyphis ferrugineis, 3 μ . cr.; cystidiis angustis, flavis, acuminatis, basi angustis, 15-25 \times 5-6.

Hab. in ligno emortuo Calophylli inophylli prope Bobosobo Luzon Ins. Philippin. Amer. Centr. (M. RAMOS).

80. **Polyporus tropicalis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Abortiporus tropicalis* 1098
Murrill, Mycologia II (1910) p. 185. — Pileo distorto, e spatulato reniformi, lateraliter stipitato, tenaci, flexibili, dein arescendo fere rigido, 1-2 \times 2,5-3 \times 0,2-0,4 cm.; superficie spongiosa, minute tomentosa, inæquali, plana v. depressa, roseo-ochracea, anoderma; margine albo, dein arescendo rubro-brunneo, ex undulato lobato sterili; contextu albo, duplici, strato prope tubulos firmiore; tubulis brevibus intus albis, ore minuto, oculo inermi inconspicuo, sublucenti, albo, acie firma, ex obtuso subacuta, integra; sporis globosis, levibus, tenuiter tunicatis, hyalinis copiosis, 4,5-6 μ .; stipite adscendenti, ad pileum expanso, basi quandoque ramoso, irregulari, cremeo, superficie pilei conformi, subtus angustato, 3 cm. circ. longo, 5-10 mm. cr.

Hab. ad ramos emortuos Hope, Gardens in Jamaica.

81. **Polyporus unguiformis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Tyromyces unguiformis* 1099
Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 406. — Pileo compresso-ungulato, infra plano, postice crassiore, 5 \times 8 \times 1-3 cm.; superficie anoderma, azonata, parum tuberculosa, subglabra, albo-lactea, opaca; margine abrupte acuto, anguste sterili, concolori, integro; contextu albo, in sicco fragili, homoganeo, 5-8 mm. cr.; tubulis albis v. intus flavidis, postice 1 cm. long., marginem versus sensim brevioribus, angustis, ore circulari, regulari præditis, 4 in quoque mm., acie crassa, integra; sporis levibus, ovoideis, hyalinis, 3 \times 2; hyphis hyalinis 3 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo, Balabac Isl. Ins. Philippin. Amer. Centr. (L. MANGUBAT).

82. **Polyporus subpendulus** (Atkins.) Sacc. et Trott., *Tyromyces subpendulus* 1100
Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 61. — Albus, breviter stipitatus, sæpe pendulus; pileo ungulato-subapplanato, fi-

broso-carnoso, sicco firmo, interdum confluyente, 4-10 mm. lato, 3-5 mm. longo, 3-5 mm. crasso, convexo, glabro sed radiatim rugoso, sæpe rugis leniter sordide luteis, margine obtuso; trama radiatim fibrosa, fragili, 0,5-2 mm. crassa, ad marginem tenuiori; stipite brevi subcylindrico, in vertice pilei expanso, membrana mycelii ad substratum circumdato; poris 2 mm. longis, minutis, 8-10 in quoque mm., cylindrico-sublabyrinthiformibus, pallide luteis, margine hymenophori sterili; dissepimentis tenuibus; margine obtuso, integro v. leviter dentato; sporis albidis, hyalinis, glabris, ellipsoideis, rectis v. leviter curvulis, 4-5 \times 2.

Hab. ad ramulos emortuos *Tsugae canadensis*, Ithaca N. Y. Amer. bor.

83. **Polyporus subchioneus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Tyromyces subchioneus* 1101
Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 406. — Pileo sessili, dimidiato, applanato, e carnosio-tenaci fragili 2 \times 4 \times 0,2 cm.; superficie levi, glabra, griseo-isabellina, arescendo rugosa; margine integro, tenui, sterili et abrupte deflexo; contextu albo, homoganeo, fragili, 1 mm. cr. in sicco; tubulis a colore contextu distinctis, intus obscure flavido-griseis, 1 mm. long., ore subcirculari, regulari, griseo, lucenti, 5-6 in quoque mm., acie integra, primum crassa dein maturitate tenuiori; sporis oblongis, ellipsoideis, levibus, hyalinis, 5-6 \times 2; hyphis hyalinis, 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo, Mt. Apo, Mindanao Ins. Philippin, Amer. centr. (E. B. COPELAND).

84. **Polyporus Merrittii** (Murr.) Sacc. et Trott., *Tyromyces Merrittii* 1102
Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) pag. 406. — Pileo multiplici-imbricato, lobis paucis confertim in basim stipitiformem conjunctis, quoque lobo flabelliformi, basi cuneato 7-9 \times 7-9- \times 0,5 cm., superficie radiato-rugosa et prominenti-rugosa, sordide alba, opaca, minute tomentosa; margine irregulari, varie lobato, crassiusculo, fertili, leniter deflexo; contextu fibroso-carnoso, arescendo, fragili, albo-lacteo, 2 mm. cr.; tubulis 3 mm. long., angustis, intus albescentibus, ore albo-griseo, nitido, regulari, tenuiter tunicato præditis, 3 in quoque mm., acie firma integra; sporis ovoideis curvatis, levibus, hyalinis, 5-6 \times 3; hyphis fragilibus, hyalinis, 4-5 μ .; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emorto Mt. Maquiling, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (H. M. CURRAN et M. L. MERRITT).

85. **Polyporus fumidiceps** (Atk.) Sacc. et Trott., *Tyromyces fumidiceps* 1103

Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 61. — Pileo sessili, carnosio, molli, anodermeo, leviter tomentoso v. glabro, dimidiato, imbricato, sæpe confluyente, fuligineo, 2-7 cm. lato, 1-3 cm. longo, 0,5-1 cm. crasso; trama alba; poris, albidis, minutis, 5-6 in quoque mm.; dissepimentis tenuibus; sporis minutis, ovato-subglobosis, hyalinis, sæpe 1-guttulatis, 2-2,5 μ .

Hab. ad ligna putrida in silvis, Ithaca N. York Americæ bor.

Polyp. chionco affinis, differt pileo obscuriore sporisque globosis.

86. **Polyporus Elmeri** (Murr.) Sacc. et Trott, *Tyromyces Elmeri* Murr., 1104

Bull. Torr. Bot. Club. XXXIV (1907) p. 475. — Pileo carnosio, in sicco rigido et fragili, dimidiato, sessili, subimbricato, 2-3 \approx 3-4 \approx 0,2-0,3 cm.; superficie rugosa minute tuberculoso-foveolata, glabra, ex albo isabellina; margine subcrasso, integro, concolori; contextu albo, carnosio-tenaci, 1 mm. cr.; tubulis intus ex albo isabellinis, 2 mm. long, ore leniter anguloso, minuto, regulari præditi, 6-7 in quoque mm., pruinosis, lucentibus, demum avellaneis, acie tenui integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, 3-4 μ . cr.; hyphis hyalinis, 4-5 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo, Mt. Mariveles, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (A. P. E. ELMER).

87. **Polyporus cæsiusimulans** (Atk.) Sacc. et Trott, *Tyromyces cæsiusimulans* 1105

Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) pag. 61. — Pileo tenui, dimidiato, applanato, 2,5 cm. lato, 1 cm. longo, 3-4 mm. crasso, albo, sæpe tactu cærulescente, minute tomentoso, ad marginem subglabro, fragilissimo; margine acuto, sicco fortiter incurvato; trama alba, 1,1,5 mm. crassa; poris 3-6 in quoque mm., 2-3 mm. longis, rotundis, v. subsinuosis; dissepimentis tenuibus, dentato-laceratis, fragilissimis; sporis minutis, hyalinis, globosis, glabris, minute pedicellatis, 3-4 μ . cr.

Hab. ad ligna putrida in nemoribus, Ithaca N. Y. Americæ bor. — *Polyp. cæsius* affinis, differt sporis globosis pedicellatis.

88. **Polyporus Palmarum** (Murr.) Sacc. et Trott.; *Tyromyces Palmarum* 1106

Murr., North Amer. Flora IX Pt. I (1907) p. 32. — Pileo effuso, tenui, applanato, sessili, dimidiato, subtus concavo, arescendo incurvato, e carnosio-viscoso rigido, 6-10 \approx 10-20 \approx 0,5-0,8 cm.; superficie glabra, sublevi, leviter rugosa v. tuberculata, ex albo-cremea; margine tenui, ex undulato lobato, fertili, concolori; contextu albo, e carnosio-fibroso rigido et arescendo subfragili, 3-5 mm. crasso; tubulis 2-4 mm. longis, ex albo intus flavidis, ore lucenti, anguloso, regulari præditi, 3 in quoque mm., ex albo pallide fla-

vidis et dein avellaneis, acie tenui, integra; sporis globosis, levibus, hyalinis 3 μ . cr. hyphis 5 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos *Oreodoxæ* regiæ in El Yunque, Cuba Amer. bor. (L. M. UNDERWOOD et F. S. EARLE).

89. **Polyporus Calkinsii** (Murr.) Sacc. et Trott., *Tyromyces Calkinsii* 1107 Murr., North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 32. — Pileo sessili, subimbricato, dimidiato, supra convexo, subtus concavo, vegeto caseoso, rigido in sicco, 3-5 \times 6-8 \times 1,5-2 cm.; superficie levi, glabra, azona, ex albo cremea v. ochraceo-fulva; margine tenui v. crasso, integro v. undulato, facile lacerato, fertili; contextu albo, homoganeo, e carneo subfriabili, firmo, 5-10 mm. cr.; tubulis tenuibus, intus ex albo ochraceis, contextum longitudine æquantibus, ore regulari, anguloso præditis, 3-4 in quoque mm. firmis, ex albo flavidis, demum avellaneis, acie tenui, ex integro denticulata; sporis globosis, levibus, hyalinis, 5 μ . cr.; hyphis 7 μ . cr., cystidiis nullis.

Hab. ad truncos emortuos in Florida Americ. bor. (W. W. CALKINS).

90. **Polyporus nivosellus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Tyromyces nivosellus* 1108 Murr., North Americ. Fl. 9, Pt. I (1907) p. 32. — Pileo simplici, imbricato, sessili, dimidiato, e semicampanulato angulato, postice crasso, supra convexo, infra concavo, 3-5 \times 6-9 \times 2-4 cm.; superficie levi, glabra, azona, alba v. pallide flavida; margine crasso, plerumque obtuso, integro v. undulato, concolori in sicco obscuriori; contextu carnos-viscoso, rigido, sed arescendo parum friabili, albo-lacteo, 0,5-2,5 cm. cr.; tubulis longis et angustis, 1 cm. circ., intus ex albo pallide flavidis, ore regulari, angulato præditis, 3 in quoque mm., ex albo isabellinis v. umbrinis, acie firma, tenui, integra; sporis ellipsoides, levibus, hyalinis, 6 \times 3,5.

Hab. ad truncos *Palmarum* in El Yunque, Cuba Amer. bor. (L. M. UNDERWOOD et F. S. EARLE).

91. **Polyporus Smallii** (Murrill) Sacc. et Trott., *Tyromyces Smallii* 1109 Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) pag. 32. — Pileo compresso-angulato, umbonato, late sessili, dimidiato, carnos-viscoso, difficiliter arescente, 5-7 \times 6-10 \times 2-5 cm.; superficie levi, glabra, azona, ex albo cremea, e sordide badia arescendo nigrescenti; contextu carnos-viscoso, zonato, aquoso, udo et flexibili etiam in exemplaribus siccis, e pallide albo sordide avellaneo, carneo colore suffuso, 0,5-2,5 mm. cr.; tubulis 5-8 mm. longis, 3 in quoque mm., dein parietibus laceratis, satis amplis et irregularibus, pro parte

collapsis, subfragilibus, atro-badiis in exemplaribus siccis, acie tenui, lacerata, fimbriata; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad truncos Pini prope Cutler Point, Florida Amer. bor. (J. K. SMALL et J. J. CARTER).

92. **Polyporus tiliophilus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Tyromyces tiliophilus* 1110

Murr., North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 33. — Pileo lato, supra convexo, infra concavo, juveni caseoso, sicco firmo et fragili, basi attenuata adhærente, e dimidiato flabelliformi, $8 \approx 2 \approx 12-1,5$ cm., superficie radiato-rugosa, subplicata, tuberculosa, subglabra, ex albo ochracea, pallide lateritio maculata; margine crasso, fertili, concolori, undulato; contextu homogæneo, albo, e caseoso fragili, 1 cm. c. cr.; tubulis 1 cm. circ. longis, ex albo pallide flavidis, in sicco fragilibus, demum collabescentibus et mollibus, ore minuto, subcirculari, ex albo cremeo, dein parum decolorato præditis, 5 in quoque mm., acie tenui, fragili, fimbriato-dentata.

Hab. in *Tilia americana* prope Ottawa Canada Amer. bor. (J. MACOUN).

93. **Polyporus Ellisianus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Tyromyces Ellisia-* 1111

nus Murr., North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 34. — Pileo effuso-reflexo, lateraliter connato, imbricato, e carnos-viscoso rigido, parte reflexa dimidiata v. lateraliter elongata, $1-2 \approx 2-5 \approx 0,5-1,5$ cm., superficie inæquali, e pulverulento glabra v. parum scabra, ex albo isabellina, zonis angustis testaceis prædita quandoque etiam azona; margine acuto v. obtusulo, arescendo inflexo, albo, integro, v. undulato; contextu sat crasso, firmo et arescendo subfragili, albo, 5 mm. c. cr.; tubulis ex albo pallidis v. intus pallide lateritiis, 3-5 mm. longis, angustis, ore e circulari subangulosa, subæquali præditis, 5 in quoque mm., acie tenui, ex albo isabellina v. pallide lateritia, integra v. denticulata; sporis globosis, levibus, hyalinis, 4 μ . cr.; hyphis 8 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos Pini emortuos prope Newfield New Jersey, Amer. (J. B. ELLIS).

94. **Polyporus cinchonensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Tyromyces cin-* 1112

chonensis Murrill, Mycologia II (1910) p. 192. — Pileo imbricato, flabelliformi, basi angusta inserto, supra convexo, subtus concavo, leniter flexibili, dein arescendo rigido et fragili, $2,5 \approx 2,5 \approx 0,2-0,3$ cm.; superficie albo-lactea, dein colori avellaneo v. pallide ardesiaco signata, glaberrima, radiato-rugosa; margine tenui, undulato v. eroso, arescendo deflexo, concolori; contextu albo, tenui, fibroso, pro genere sat tenaci; tubulis albis, longis, 2 mm., ore angulari,

regulari, albo, cinereo-tincto, lucenti præditis, 5-6 in quoque mm., acie tenui, dein leniter lacerato-dentata; sporis cylindræis, dein curvulis, levibus, hyalinis, 4 × 1,5-2,5.

Hab. ad truncos Coniferarum prope Cinchona, Jamaica.

95. **Polyporus Rickianus** Sacc. et Trav., Syll. fung. XX p. 491, *Polyporus farinosus* Rick, Broteria VI (1907) pag. 85 ex errore *cartilagenosus*, tab. IV fig. 4. — Pileo carnosissimo, tuberculato-difformi, castaneo, fere verniceo, margine flavescente, glabro, rugoso, tuberculoso; poris albis, parvis, rotundis; contextu pallido; odore forti farinaceo. 1113

Hab. ad truncos, Rio Grande do Sul Brasiliæ. — Forsan identicus cum *P. flavescens* v. *P. portentoso*.

96. **Polyporus cartilagenosus** Rick, Broteria VI (1907) tab. III fig. 3, ms. — Pileo compacto, irregulari, roseo, sericeo, cartilagenoso, margine obtusissimo; hymenio roseo; poris minimis; carne albo-grisea, dissecta egregie zonata, exsiccando nigrescente. 1114

Hab. ad truncos, Rio Grande do Sul Brasiliæ.

97. **Polyporus cæsius** (Schrad.) Fr. — Syll. VI, p. 113. — Teste Mc Ginty in Lloyd Mycol. Notes, n. 33 (1909) p. 436, hæc species mox distinguitur sporis *cyaneis* nec albo-hyalinis hinc auctor genere distinguit et nuncupavit *Cyanosporus cæsius* (Schrad.) Mc Ginty. 1115

98. **Polyporus Chuling** Shirai, Bot. Mag. Tokyo, XIX (1905) p. 91, tab. IV. — Diagnosis desideratur. 1116

Hab. in Japonia.

VOLVOPOLYPORUS Mc Ginty, in Lloyd Mycolog. Notes n. 33 (1909) pag. 444. — Tubuli in stratum porosum, facile ab hymenophoro separabiles; stipes centralis; totus fungus primitus quidem in volva inclusus; volva persistente cum basi stipitis connata.

1. **Volvopolyporus peronatus** (Schulz.) Mc Ginty l. c., fig. 255. — Species nobis omnino ignota et in operibus Schulz. non reperta, probabiliter paradoxa. 1117

CRYPTOPORUS (Peck) Shear — Syll. XVII p. 125. — *Fomes spec.* Syll. VI p. 165.

1. **Cryptoporus volvatus** (Peck) Shear — Syll. XVII, p. 125, *Ungulina volvata* (Peck) Pat. — var. **pleurostoma** Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII (1907) p. 74, cum icone. — A typo differt forma ap- 1118

planata nec globulosa, et membrana inferiore lateraliter et postice aperta.

Hab. ad truncos Pini Tædæ, Indo-China (EBERHARDT); typus quoque in Mexico (BONANSEA).

FOMES Fr. — Syll. VI p. 150, IX p. 173, XI p. 88, XIV p. 180, XVI p. 151, XVII p. 116.

1. **Fomes pachyphœus** Patouill. in Bres. Bull. Soc. Myc. Fr. (1890) 1119 p. 41 — var. **stipitatus** Bres. Ann. Mycol. V (1907) pag. 238 — A typo differt stipite curto, laterali, perpendiculari.

Hab. ad truncos in insula Java.

2. **Fomes luzonensis** Murr., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) 1120 = Polyporus (Labeja) Berk VI, 5247 p. 476. — Pileo dimidiato, umbonato-affixo, compresso-ungulato, supra convexo, infra plano v. leniter concavo, 4 × 6-8 × 1-2 cm; superficie zonata, sulcata, glabra, corneo-incrustata, fusco-brunnea, in partibus tenuioribus pallide isabellina, expansa; margine acuto, anguste sterili, pallido, undulato, rigido; contextu tenui, 1-2 mm., pallide isabellino, subsuberoso; tubulis distincte stratosi, intus isabellinis, 2-3 mm. long. in quoque strato, ore regulari, rotundo præditis, 5 in quoque mm., ex albo isabellinis, opacis, acie tenui, firma, tenaci, obtusa, integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, 5 μ cr.; hyphis hyalinis 4 μ cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos dejectos, Lamao River, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (R. S. WILLIAMS).

3. **Fomes philippinensis** Murr., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIV (1907) 1121 p. 477. — Pileo dimidiato, sessili, unguato, supra applanato, infra plano v. convexo, 5-10 × 10-15 × 1-2,5 cm.; superficie tenuiter corneo-incrustata, radiato-rugosa, glabra, parum zonata, breviter sulcata, dein leviter rimosa, e pallide isabellina fusco-umbrina; margine sterili, pallido, glabro, zonato, crassiusculo, integro, demum parum truncato et sulcato; contextu suberoso, tenaci, isabellino, zonato, 5-10 mm. cr.; tubulis plus minusve distincte stratosi, 2-3 mm. long. in quoque strato, intus isabellinis, ore pallido, regulari, rotundo præditis, 5 in quoque mm., acie crassa, obtusa, integra; sporis ovoideis, levibus, hyalinis, 5 × 4; hyphis hyalinis, 3-4 μ cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncum emortuum, Lamao River, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (R. S. WILLIAMS).

4. **Fomes pseudo-conchatus** P. Henn., in Voeltzkow, Reise Ostafrika 1122 III (1908) p. 23. — Pileo suberoso-fomentario, crasso, pulvinate,

rotundato v. hemisphærico, concentricè sulcato v. zonato, tomentoso, ferrugineo v. fulvo, 8-13 cm. lato, 4-5 cm. crasso, margine obtusiusculo integro v. subrepando, acutiusculo, obscuriori; contextu ochraceo-ferrugineo, stratoso, suberoso-floccoso, molli, crasso; hymenio subplano fusco-ferrugineo, tubulis ferrugineis, c. 2 mm. long., poris minutis; rotundatis, c. 100 μ . diam. concoloribus; sporis subglobosis vel subellipsoideis, hyalino-subflavescentibus, 2,5-3 \times 2-2,5.

Hab. ad ramos arborum, Comoren Africæ. — *Fomiti conchato* proximus sed pileo et sporis diversus.

5. **Fomes Rechingeri** Bresad. in Bot. Zool. Ergeb. Samoa etc. in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien, LXXXV (1910) pag. 2 (extr.). — 1123
Pileo dimidiato-sessili, pulvinato, lignoso-suberoso, luride rhabarbarino, pubescente, postice scrobiculato, sulco marginali notato, ceterum levi, 9 cm. long., 3 cm. cr., margine obtuso; contextu fulvo; tubulis subconcoloribus, stratosis; poris luride flavidis, dein fusco-olivaceis, angulatis, 250 μ . latis, commixtis longioribus sinuatis; hyphis subhymenialibus et pilei 2-4 μ . cr., raro una alterave ad 6 μ . cr.; setulis fulvis 20-30 \times 6; sporis non inventis.

Hab. ad truncos in insula Buka prope Jeta (K. et L. RECHINGER).

6. **Fomes latissimus** Bres. Ann. Mycol. VIII (1910) p. 588. — Pileo 1124
latissimo, 20-36 cm. lato, 12-24 cm. longo, explanato, glabro, tuberculoso, concentricè sulcato, incrustato, cute fuscidula, 1 mm. cr., margine obtuso, sæpe reflexo, postice interdum decurrente; contextu suberoso-lignoso, pallide alutaceo, ex hyphis 1,5-3,5 μ . cr.; tubulis stratosis, concoloribus; poris minutis, $\frac{1}{7}$ - $\frac{1}{6}$ mm., dissepimentis crassis, stramineis; sporis hyalinis, obovatis, 6-8 \times 3,5-5; basidiis clavatis, 18-20 \times 4-5; cystidiis fusoido-ventricosis, 24-30 \times 10-12; hyphis hymenii 1,5-3 cr.

Hab. ad truncos in insula Java. — Medius inter *Fomitem hippopodem* et *F. hornodermum*. — *Fom. ligneus* Murrill huc spectat, teste Bresad., non vero homonymus Berkeleyi.

7. **Fomes subferreus** Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) 1125
p. 97. — Pileo e suberoso lignoso, concavo v. applanato, imbricato, plerumque longitudinaliter effuso, 3-9 \times 5-15 \times 1-2 cm.; superficie velutina, rugoso-striata, sulcatula, nigra, leniter purpureo suffusa, dein glabra et grisea; margine subobtusulo, pallido, pustulis purpureo-nigris signato; contextu coriaceo, isabellino, 0,5-1 cm. cr.; tubulis inæqualiter stratosis, 2-3 mm. long. in quoque strato,

lucenti-albidis, in stratis senioribus dilutioribus, ore circulari præditi, 5 in quoque mm., acie obtusa, lucenti, ex albo lactea v. avellanea v. isabellina; sporis globosis, levibus hyalinis, 3 μ . long.; hyphis hyalinis, 4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad ligna dejecta prope Herradura Cuba, Honduras Costa Rica, Amer. centr. (F. S. EARLE et M. A. MURRILL).

8. **Fomes surinamensis** Bres., Ann. mycol. (1910) pag. 588. — Pileo 1126 unguato, dense concentrice zonato, subsulcato, postice decurrente, glabro, incrustato, cute nigra, sublucida (in vetustis), 1,5 mm. cr., 7 cm. v. ultra lato, 4 cm. alto; substantia lignosa, fulva, 2-3 mm. tantum cr. ex hyphis 2-2,5 μ . cr.; tubulis stratosi, stratis vix visibilibus, fulvis; poris fuscidulis; parvis, subrotundis, $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{6}$ mm. diam., dissepimentis crassis; sporis stramineis, raris visis, 4-5 \times 4; hyphis hymenii 2-3,5 μ . cr.

Hab. ad ligna in Surinam seu Guyana Amer. merid. — *Fomiti roburneo* proximus.

9. **Fomes subresinosus** Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) 1127 p. 410. — Pileo semicampanulato, umbone elongato adhærenti, subtus concavo, lignoso, 6 \times 8 \times 1 cm.; superficie glabra, parum resinosa, leniter incrustata, in sicco rugosa, leniter sulcata, zonis conspicuis latis brunneis lucenti-nigris; margine crasso, abrupte acuto et deflexo, integro v. undulato, concolori; contextu albo, in sicco leniter pallido, lignoso-fibroso, 3-5 mm. cr.; tubulis 5-8 mm. long., angustis, intus in sicco brunneo-carneis, ore circulari et initio albido præditi, dein angulosi et concoloribus, 3-4 in quoque mm., acie primum crassa, dein tenui et lacerata; sporis globosis v. subglobosis, levibus, hyalinis, 3-4 μ . diam.; hyphis hyalinis, cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr.

10. **Fomes subendothejus** Bres., Ann. mycol. (1910) p. 589. — Pileo 1128 pulvinate, fasciis paucis, latis, prominentibus prædito, stratis annuis luteolis et subvelutinis v. pruinatis, vetustis glabris nigricantibus et cute diffracta, 12-14 cm. lato, 7-8 cm. longo, margine valde obtuso, toruloso; contextu lignoso-fibroso, luteo, fulvo, ex hyphis 2-5 μ . cr.; tubulis concoloribus; poris fusco-umbrinis, irregularibus, angulatis, $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam. v. oblongis et $\frac{1}{2}$ -1 mm. latis; sporis globosis, luteis, 5-6 μ . diam.; hyphis hymenii 1,5-3,5 μ . crassis.

Hab. ad truncos, in insula Curaçao Amer. centr. — Affinis *Fomiti endothejo*.

11. **Fomes subungulatus** Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) 1129

pag. 410. — Pileo sessili, dimidiato, late inserto, ibique zonula nigrescenti prædito, rigido, supra convexo, subtus concavo, $6 \approx 8 \approx 1-2$ cm.; superficie sulcata, glabra, anoderma, leniter tuberculosa, isabellina, leniter rubescenti maculata; margine obtuso, crasso, integro; contextu crasso, 5-8 mm., isabellino, zonato, molli-suberoso; tubulis intus albidis, angustis 3-5 mm. long., non distincte stratosi; ore parvo, ex albo isabellino, circulari præditis, 5 in quoque mm., acie crassa, obtusa, integra; sporis ovoideis, levibus, hyalinis, $5 \approx 3,5$; hyphis hyalinis, 5-6 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos Pini insularis prope Baguio, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (E. D. MERRILL).

12. **Fomes microcystideus** (Har. et Pat) Sacc. et Trott., *Phellinus* 1130

microcystideus Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. (1909) n. 2, p. 90. — Sessilis, dimidiatus, unguiformis; pileo 12 cm. lato, 8 cm. longo, 6 cm. postice crasso, durissimo, supra convexo, concentricè sulcato, infra plano-convexo, obscure fulvo, crusta tenui rigida, gilvo-nigricanti, postice rimosa albido-pruinosa tecto; margine patenti obtuso, fulvo, minute velutino; poris totam inferiorem partem occupantibus, minutis, rotundis, stipatis, dissepimentis integris, obtusis; tubulis fulvis substratosi 25 mm. postice longis; contextu durissimo, fulvo, radianti; cystidiis rubiginosis, lageniformibus, 8-12 μ . long.; conidiis sporiformibus albis, ovoideis, levibus, $6 \approx 4$, intus guttulatis, in crusta juniore pilei copiose conspersis.

Hab. ad truncos, Oubangui, Congo Africae trop.

13. **Fomes stabulorum** (Pat.) Sacc. et Trott., *Phellinus stabulorum* 1131

Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII (1907) p. 74. — Pileo sessili, pulvinate, dimidiato, duro, rubro-ferrugineo, 3-5 cm. lato, 1-2 cm. longo, nec zonato nec sulcato, supra tomento copioso flocculis strigoso-hispidis adpressis consperso, demum nudato et nigricante; trama fulvo-aurata, dura, radiata, homogenea, 5 mm. cr.; margine recto, acuto, lobato v. integro; tubulis fulvis, facile deterisilibus, 0,5-1 mm. longis; poris rotundatis v. elongatis et sinuosis, sepimentis crassis fulvis separatis; cystidiis rubris, acutis 18-25 \approx 6.

Hab. gregarius in palis ligneis, Moï Dangkia, Indo-Chinae (E. BERHARDT).

14. **Fomes cinchonensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus cin-* 1132

chonensis Murrill, Mycologia II (1910) p. 195 — Pileo ligneo, triquetro, crasso, postice late inserto, convexo, 5-7 \approx 8-12 \approx 7-10

cm., superficie corneo-incrustata, glabra, levi, obscure zonata, leniter sulcata, ex umbrino badia; margine obtuso, ferrugineo, leniter undulato, sterili; contextu parum duro, fulvo, in stratis recentioribus zonato, 0,5-2 cm. cr.; tubulis indistincte stratosi, initio avellaneis, dein avellaneo-umbrinis, parum longis et angustis, ore minuto, initio farcto, circulari præditis, 5 in quoque mm., avellaneo-umbrinis, acie obtusa integra; sporis subglobosis, levibus, pallide ferrugineis, uniguttulatis, 4 μ . cr.; hyphis ferrugineis, 3-4 μ . cr.; cystidiis ferrugineo-fulvis, acuminatis, ventricosis, angustis, 20 μ . circ. longis, basi 5-7 μ . cr.

Hab. in ligno emortuo prope Cinchona, Jamaica.

15. **Fomes hydrophilus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus hydrophilus* Murrill, Mycologia II (1910) pag. 195. — Pileo parvo, ligneo, undulato, plerumque lateraliter inserto, 2-3 \times 2-4,5 \times 2-3,5 cm.; superficie inæquali, rugosa, sæpe sulcata, e badio castanea, lineis fulgineis donata, e minute tomentoso subglabra, corneo-incrustata; margine subobtusum, melleo, integro; contextu usque ad 1 cm. cr., subligneo, ex obscure ferrugineo fulvo; hymenio lucido, e latere viso, melleo, perpendiculariter olivaceo-umbrino; tubulis indistincte stratosi, fulvis, griseo-tinctis, 2-3 mm. long. in quoque strato, ore circulari præditis, 4-5 in quoque mm., acie obtusa, integra; sporis subglobosis, levibus, fulvis, uniguttulatis, numerosis, crasse tunicatis, 3-5 \times 4,5 μ .; hyphis ferrugineis, fulvis, 4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo Morce's Gap, Jamaica.

16. **Fomes lamaoënsis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus lamaoënsis* Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) p. 479. — Pileo dimidiato, sessili, tenui, subimbricato, applanato, 2 \times 4 \times 0,3-0,7 cm.; superficie minute tomentosa, zonata, leniter sulcata, corneo-incrustata, castaneo-fulva; margine crasso, obtuso, sterili, ferrugineo, integro; contextu e luteo ferrugineo, firmo, ligneo, homoganeo, 3-5 mm. cr.; tubulis 2 mm. long., intus fumoso-avellaneis, ore circulari, regulari, minuto præditis, 6 in quoque mm., opacis, obscure fumosis, acie tenui, integra; sporis e globoso ovoideis, levibus, hyalinis, 3,5-5 μ . long.; hyphis ferrugineis 4 μ . cr.; cystidiis angustis, acuminatis, 15-40 μ ., obscure fulvis.

Hab. in ligno dejecto, Lamao River, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (R. P. WILLIAMS).

17. **Fomes Merrillii** (Murr.) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus Merrillii* Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) pag. 479. — Pileo

sessili unguato, infra plano, $4 \approx 6 \approx 3,5$ cm.; superficie minute tomentosa, profunde sulcata, anoderma v. leniter incrustata, firma fulva, dein aëri exposita nigrescente in stratis senioribus; margine fulvo, sterili, minute, tomentoso, obtuso, undulato; contextu obscure fulvo, firmo, corneo, 3-6 mm. cr.; tubulis indistincte stratis, intus fulvis, 2-4 mm. long. in quoque strato, ore fulvo, subcirculari, regulari præditis, 4 in quoque mm., acie crassa, integra; sporis ferrugineo-fulvis, numerosis, subglobosis, levibus, 3-4 μ .; hyphis concoloribus, 4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ramis dejectis, Culion Ins. Philippin. Amer. centr.

18. **Fomes subextensus** (Murrill) Sacc. et Trott. / *Pyropolyporus sub-* 1136

extensus Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) pag. 413. — Pileo lato, lignoso, sessili dimidiato, applanato, subtus leniter convexo, $7-8 \approx 10-12 \approx 1$ cm.; superficie rugosa, leniter sulcata, glabra, leniter incrustata, opaco-brunnea; margine leniter lobato, obtuso, fulvo, sterili; contextu ferrugineo, multizonato, ligneo, fere 1 cm. cr.; tubulis brevibus, 1-2 mm. long. in quoque strato, in stratis senioribus fulvis, in recentioribus griseo-fuscis, ore minuto, fulvo, circulari, crasse tunicato præditis, 7-8 in quoque mm., acie crassa, integra; hyphis ferrugineis, 3-4 μ . crassis; cystidiis ampulliformibus vel irregularibus, acuminatis, fulvis, copiosis, 15-30 \approx 8-10.

Hab. in ligno emortuo, Camp. Keithley, Mindanao Ins. Philippin. Amer. centr.

19. **Fomes tenuissimus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus tenuis-* 1137

simus Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) pag. 413. — Pileo tenui, ligneo, rigido, dimidiato, supra convexo, subtus concavo, postice decurrenti, $1-1,5 \approx 4-5 \approx 0,1-0,2$ cm.; superficie rugosa, e spongioso-tomentoso subglabra, nec sulcata nec zonata, e fulvo fuliginea, ad marginem magis crassa et spongiosa ibique fulvo colorata, minute tomentosa, subcrassa, undulata; contextu fulvo, tenui, molliter suberoso; tubulis stratificatis, 0,5 mm. vel ultra longis in quoque strato, intus cinereo-fuscis, ore initio albo-farcto, minuto circulari, regulari præditis, 6 in quoque mm., primum avellaneis, dein obscurioribus, acie crassa, integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, copiosis, 3-4 μ .; hyphis melleis, 2-3 μ cr.; cystidiis fulvis, cuspidatis, paucis, 15-20 \approx 5-7.

Hab. in ligno emortuo, Davao Mindanao Ins. Philippin. Amer. centr. (E. B. COPELAND).

Polyp.
Gorthalsii
VI, 185

20. **Fomes tricolor** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus tricolor* 1138

Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 413. — Pileo expanso, applanato, tenui, rigido, ligneo, 15 \approx 25 \approx 1-2 cm.; superficie rigida, rugoso-tuberculosa, irregulariter sulcata, leniter incrustata, glabra, ex obscure brunnea leniter nigra, in exemplaribus siccis rimosa; margine tenui, obtuso, rubro, subintegro; contextu ligneo, rubro-lateritio, albo interrupte medullosa, 5-8 mm. cr.; tubulis 4-5 mm. long. in quoque strato, in stratis senioribus rubro-lateritiis, in recentioribus rubro-flavidis et albo-lineatis, ore minuto, regulari, circulari, lucenti, melleo præditis, 4 in quoque mm., acie crassiuscula, integra; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, albo-fumoso-brunneis, tunica subtenui, 5-6 μ . cr.; hyphis melleis 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo prope Santa Maria Mavita, Luzon Ins. Philippin. Amer centr. (H. M. CURRAN).

21. **Fomes troyanus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus troyanus* 1139

Murrill, Mycologia II (1910) p. 196. — Pileo ligneo, subcorneo, unguato, raro compresso-ungulato, infra plerumque plano, nunc vertici nunc lateraliter sessili, 5-8 \approx 8-11 \approx 3-5 cm.; superficie sæpe concentricè sulcata, exemplaribus senioribus rimosula e badio subnigra, glabra, initio æquali; margine subobtusum, integro v. leniter undulatum, ferrugineo, sterili, subvelutino; contextu ligneo, duro, usque ad 1 cm. cr., fulvo, lineis dendroideis nigricantibus subcorneis penetrato; tubulis mox distincte stratosi, avellaneo-umbrinis in quoque strato 3 mm. cir. longis, ore minuto, circulari, fulvo, initio subcastaneo præditis, cir. 8 in quoque mm., acie obtusa, integra; sporis globosis, levibus, pallide flavis, 3-4 μ . diam.; hyphis pallide flavis; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo, Troy et Tyre, Jamaica.

22. **Fomes Williamsii** (Murr.) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus Williamsii* 1140

Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) pag. 479. — Pileo unguato, sessili, dimidiato, supra plano, infra convexo, firmo, corneo et fragili, 5-8 \approx 8-15 \approx 1-2 cm. superficie e minute tomentoso glabra, ex obscure fulva nigra, corneo-incrustata, profunde et rugose sulcata, parum tuberculosa, ætate leniter rupta; margine isabellino, sterili, obtuso, integro v. undulato; contextu 8-10 mm. cr., ferrugineo, solido, radiato, striato, medulla alba dendritica prædita; tubulis distincte stratosi, 2-3 mm. long. in quoque strato, intus ex umbrino avellaneis, ore circulari, avellaneo, opacis, regularibus, 5 in quoque mm., acie crassa, obtusa, integra; sporis

(= *Trametes*
campanulata Murr.
XXI, 340)

40

subglobosis, levibus, hyalinis, 3-5 μ . cr.; cystidiis obscure fulvis, ventricosis, acuminatis, 15-30 μ . long.

Hab. ad truncos emortuos prope Lamao River, Luzon Insul. Philippin. Amer. centr. (R. S. WILLIAMS).

23. **Fomes texanus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus texanus* 1141

Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 104. — Pileo lignoso, unguato, late adhærente, subtus applanato, 3 \times 5 \times 4 cm.; superficie tomentosa. levi, mellea, dein grisea v. nigra, glabra et postice subrimosa; margine obtuso rotundato, melleo, tomentoso, levi; contextu ligneo, distincte zonato, 2,5 cm. cr., e melleo atro-luteo, splendore sericeo; tubulis æqualiter stratosi, nec septis separatis, 5 mm. long. in quoque strato, concoloribus, extus lucentibus, ore circulari præditis, 4-5 in quoque mm., acie obtusa, integra, e melleo fulva; sporis globosis, levibus, hyalinis, 3-4 μ . long.; cystidiis nullis.

Hab. in trunco Juniperi in Texas, America boreal. (W. H. LONG JR.).

24. **Fomes pectinatus** (Klotzsch) Cooke — Syll. VI, p. 193 — var. 1142

Jasmini (Quélet) Sacc. et Trav., Syll. XIX, p. 716, *Phellinus Jasmini* Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XX (1891) p. 6, tab. III, fig. 33 (extr.). — Pileo conchoidi, 1-3 cm. lato, flexuoso, undato-lobato, plicis concentricis, imbricatis piloso-fimbriatis prædito, brunneo-rubiginoso, dein fusco; carne tenui, 1-3 mm., floccoso-subsuberosa, dein dura, fulvo-brunnea; tubulis curtis, 1-2 mm., angustis, sæpe stratosi, poris rotundis, minutis, 200 μ . diam., pruinosis, e fulvo cinnamoneis; sporis ovoideis, 5-6 μ . long., stramineis.

Hab. ad truncos Jasmini fruticantis, Nizza (BARLA). — Forte huc spectat *Polyp. pullus* Berk. et Mont.

25. **Fomes subpectinatus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus sub-* 1143

pectinatus Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 109. — Pileo ligneo, tenui, concavo, e dimidiato flabelliformi, imbricato, lateraliter connato, distincte decurrente et postice effuso, 2-4 \times 4-8 \times 0,3-0,5 cm.; superficie conspicue tomentosa, pluries sulcatula, dein longitudinaliter rugosa, castaneo-brunnea, crusta tenui nigra subtus tomento; margine subacuto, sterili, tomentoso, ferrugineo, ex undulato lobato; contextu tenui, e ferrugineo fulvo, 1-2 mm. crassis; tubulis indistincte stratosi, 1-2 mm. long. in quoque strato, intus fulvis, ore circulari, minutissimo præditis, 9-10 in quoque mm., acie tenui, integra, lucenti, e brunneo mel-

lea, ferruginea; sporis globosis, levibus, pallide brunneis, 2 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad lignum emortuum, Ciego de Avila, Cuba, Mexico, Jamaica, Amer. bor. (F. S. EARLE et W. A. MURRILL).

26. **Fomes sublinteus** (Murrill) Sacc. et Trott. *Pyropolyporus sublinteus* 1144

Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) pag. 110. — Pileo e suberoso molli-lignoso, dimidiato, applanato, 6-8 \approx 7-10 \approx 1-2 cm.; superficie e minute tomentoso glabra, tenuiter incrustata, levi, e pallide badio fere nigra; margine tenui, raro lobata, tomentosa, ferruginea; contextu suberoso, zonatulo, melleo, 3-10 μ . cr.; tubulis distincte stratosi, laminis a contextu separatis, 2-6 mm. long. in quoque strato, intus umbrinis, ore subcirculari præditis, 7 in quoque mm., acie tenui, integra, dein umbrina; sporis globosis, levibus, brunneis, 5 μ . cr.; hyphis 8 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad lignum dejectum Prosopodis sp., Topolobampo Mexico, Amer. bor. (LULU STANLEY et IDA SCULLY).

27. **Fomes roseo-cinereus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus roseo-cinereus* 1145

Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 104. — Pileo lignoso, duro, ex applanato compresso-ungulato, distincte verticaliter inserto, 5-8 \approx 7-14 \approx 2-4 cm.; superficie tomentosa, dein glabra, corneo-incrustata, pluries zonato-sulcata, e fulvo rubro-brunnea; margine acuto, undulato, ferrugineo, tomentoso; contextu ligneo, tenui, pallide fulvo, 1-2 mm. cr.; tubulis indistincte stratosi, 1-2 mm. long. in quoque strato, intus fulvis, ore circulari, minuto præditis, 5-6 in quoque mm., acie obtusa, integra, e roseo-cinerea brunneo-grisea; sporis e globoso ovoideis, levibus, hyalinis, 5-6 \approx 3-4; hyphis brunneis, 8 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo in Alto Cedro, Cuba et Costa Rica (F. S. EARLE et W. A. MURRILL).

28. **Fomes Robinsoniæ** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus Robinsoniæ* 1146

Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 108. — Pileo ligneo, dimidiato, ex applanato compresso-ungulato, 5-7 \approx 7-10 \approx 1,5-3 cm., superficie velutina, leniter incrustata, pluries sulcata, rubra, tuberculosa, e ferrugineo fulva, dein corrosa et obscuriori; margine obtuso, velutino, ferrugineo, sterili; contextu ligneo, fulvo, 3-5 mm. cr.; tubulis inæqualiter stratosi, 3-5 mm. long. in quoque strato, intus umbrinis, ore circulari, minuto præditis, 4-5 in quoque mm., acie obtusa, integra, castaneo-brunnea, lucenti; sporis globosis, levibus, hyalinis, 4 μ . cr.; hyphis brunneis, 5 μ . long.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno dejecto, Monkey Hill., Jamaica, Amer. centr.
(Miss W. J. ROBINSON).

29. **Fomes pseudosenex** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus pseu-* 1147
dosenex Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. II (1908) p. 107. —
Pileo duro, ligneo, dimidiato, applanato, plerumque subtus concavo,
12-20 \times 15-30 \times 2-3 cm.; superficie glabra, corneo-incrustata, sub-
lucenti, pluries sulcatula, e castaneo brunnea fere nigra; margine
tenui, subobtusato, ex undulato lobato, ferrugineo; contextu ligneo,
ferrugineo, 3-5 mm. crasso; tubulis æqualiter stratosi, contextu
lamelliformi separatis, 2-3 mm. longis in quoque strato, intus ful-
vis, ore circulari, minuto præditis, 6 in quoque mm., acie obtusa,
integra, dein atro-fulva; sporis globosis, levibus, fulvis, numero-
sis, 4-5 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos dejectos, Nicaragua, Mexico, Amer. centr. (C.
L. SMITH).

30. **Fomes grenadensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus gre-* 1148
nadensis (Murrill) North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 107.
— Pileo ligneo, duro, applanato v. compresso-ungulato, e fere
circulari dimidiato, anguste adhærente et postice multo crassiore,
5-12 \times 7-15 \times 1,5-4 cm.; superficie rubra, rugosa, dense sulcata,
tomentosa, corneo-incrustata, e fulvo atro-castaneo-brunnea vel
nigra; margine obtusato, rotundato in plantis juvenilibus, tomentoso,
fulvo, satis tenui in exemplaribus majoribus; contextu ligneo,
duro, fulvo, leniter lucenti, regulariter zonato, 5-7 mm. cr.; tu-
bulis æqualibus et distincte stratosi, stratis a contextu tenuiter
divisis, 1-1,5 mm. long. in quoque strato, fulvis, mycelio albido
fartis, ore circulari, minuto præditis, 5 in quoque mm., acie
tenui, integra, e fulvo fuliginea; sporis globosis, levibus, pallide
flavido-brunneis, 3-4 μ . cr.; hyphis concoloribus, 3-5 μ . cr.; spi-
nulis absentibus.

Hab. ad lignum emortuum in montibus Annandale Grenada,
Amer. centr. (W. E. BROADWAY).

31. **Fomes dependens** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus depen-* 1149
dens Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 106. —
Pileo duro, ligneo, unguato, attenuato et postice verticaliter ad-
hærente, 3-5 \times 4-8 \times 4-8 cm., superficie nigra, rubra et rimoso,
corneo-incrustata, pluries sulcatula; margine abrupte acutato, raro
rotundato, velutino, ferrugineo, undulato; contextu duro, ligneo,
fulvo, tenui et inconspicuo; tubulis indistincte stratosi, 2-3 mm.
long. in quoque strato, intus ferrugineis, dein in stratis seniori-

bus atro-fulvis, ore circulari, minuto præditis, 5-6 in quoque mm., acie obtusa, integra, e fulvo castaneo-brunnea, lucenti; sporis globosis, levibus, brunneis, 3 μ . cr.; hyphis 3 μ . crassis; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos induratos dejectos, Alto Cedro Cuba, Bahamas, Amer. centr. (L. M. UNDERWOOD et F. S. EARLE).

32. **Fomes Bakeri** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus Bakeri* 1150

Fomes robustus Murrill

Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 104. — Pileo igneo, e compresso-ungulato applanato, dimidiato, parum decurrente, 4-10 \times 8-20 \times 3-5 cm.; superficie levi, anoderma, dein glabra, profunde bis ter sulcata, ex isabellino grisea v. umbrina; margine lato rotundato, ferrugineo, minute tomentoso, levi; contextu ligneo, atro-luteo, sublucenti, 1,5-2 cm. cr.; tubulis distincte stratosi, 5-7 mm. long. in quoque strato, intus ex avellaneo fulvis, ore circulari præditis, 4 in quoque mm., acie obtusa, integra, e flavo fuliginea; sporis globosis, levibus, hyalinis, 5 μ . cr.

Hab. ad truncos Betulae prope St. Croix Falls, Wisconsin, Amer. bor. (C. F. BAKER).

33. **Fomes Cedrelæ** (Murrill) Sacc. et Trott., *Pyropolyporus Cedrelæ* 1151

Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 105. — Pileo ligneo, duro, compresso-ungulato, late adhærente, supra plano, 7-12 \times 8-25 \times 3-7 cm.; superficie tomentosa, fortiter sulcata, fulva, dein rubra, demum rimosa et nigra; margine obtuso, e ferrugineo fulvo, tomentoso, levi; contextu e suberoso lignoso, 5-10 mm. cr., fulvo; tubulis æqualiter stratosi 2-3 mm. long. in quoque strato, intus fulvis, ore circulari, oculo inermi invisibili præditis, 5-6 in quoque mm., acie obtusa, integra, e ferrugineo fulva; sporis globosis, levibus, aureo-brunneis, 5-6 μ . cr., hyphis concoloribus.

Hab. in trunco vivo Cedrelæ odoratae, Bluefields Jamaica, Amer. centr. (F. S. EARLE).

34. **Fomes Dialerii** Bres. et Torr., Broteria IV (1905) pag. 218. — 1152

Sessilis; pileo durissimo; suberoso-lignoso, pulvinato, hemisphærico, vel unguiformi, 9-11 cm. long., 5-6 cm. lat. et 5-6 cm. ad partem substrato affixam alto, atro, glabro, subrugoso; cute irregulariter disrumpente; margine zona alba cincto; contextu ferrugineo; tubulis stratosi, in strato hornotino a 3-4 ad 7-10 mm. long., ferrugineis, poris mediocribus $\frac{1}{3}$ mm., oculo inermi bene visibilibus, brunneo-ferrugineis; sporis subglobosis, 5-6 \times 4,5-5, ochraceis; hyphis contextus tubulorum 2- $\frac{1}{2}$ -3 μ . cr.

Hab. ad arbores Merurú Mozambici (L. G. DIALER).

F. robustus Kst.
f. pinuum Bres.
 IX, 173

B5. Fomes Hartigi (Allesch.) Sacc. et Trav. Syll. XIX pag. 712; 1153

Polyporus Hartigii All., Prillieux, Malad. plant. agric. I, p. 332, fig. 142-144; Tubeuf Pflanzenkrankh. pag. 463; *Polyporus fulvus* Hart. non Auct.; *Polyporus igniarius* var. *Pinuum* Bres. — Pileo duro, lignoso, subhemisphærico, sessili, adnato, superficie brunneo-flavida, breviter et ruditer pilosa, dein grisea, glabra et concentrice sulcata; carne fulva; tubulis cylindraceis; poris subrotundis, exiguis, initio cinnamomeo-cinctis; sporis hyalinis.

Hab. in truncis corticatis Coniferarum variarum (nec arborum frondosarum) in Gallia, Germania, Italia.

36. Fomes obesus (Pat.) Sacc. et Trott., *Ungulina obesa* Patouill., 1154

Bull. Soc. Mycol. Fr. XXII (1906) p. 50. — Pileo suberoso-indurato, crasso (10 cm.), pulvinato, 15 cm. lato, margine tumido obtusissimo, cuticula tenella, levi, nitidula, glabra, sordide fusca tecto, contextu radiante, compacto, crebro zonato, zonis strictis concoloribus, non floccoso nec stuppeo, ligneo-albido; tubulis minutis, brevibus, rigidis, concoloribus; poris minutis, punctiformibus, fuscescentibus, dissepimentis integris.

Hab. ad caudices Cocos nuciferae, Apataki Polynesiae (SEURAT).

5003-6 hyl. m. p. 2. 1. 1.
37. Fomes torulosus (Pers.) Lloyd, Mycol. Notes; Polyporoid Issue 1155

n. 3, Aug. 1910, pag. 48; *Polyporus torulosus* Pers. Mycol. Eur. II, pag. 79. Huc spectat, teste Lloyd l. c. *Fomes fusco-purpureus* Boud. — Syll. VI, p. 184. — Sporæ globosæ hyalinæ, 4 μ . diam. In *Fomite rubriporo* Quél. auctor ipsissimus (Cfr. Lloyd l. c.) indicat sporas ovoideas 5 μ . long. pallide fulvas; an diversa species? — *Fomes torulosus* nuper lectus est quoque in Amer. boreali ad truncos vivos quercinos pr. New Orleans (C. W. EDGERTON).

*hypo 3-5 cruce pilosa
 lacc. nigro-fulva*
 3-5 pallide
 purpurea
 3-5
38. Fomes roseo-albus (Jungh.) Bresad. Ann. mycol. (1910) p. 587. 1156

— Ita vocanda *Poria roseo-alba* Jungh. — Syll. VI, p. 306 — cujus synonyma videntur, teste Bres. l. c. *Fomes monstruosus* Fr., *Fomes caliginosus* Berk. et *Coriopsis Copelandii* Murrill.

GANODERMA Karst. Rev. Mycol. (1881) p. 17 (Etym. *ganos* splendor et *derma* pellis), *Fomes* Fr. Sect. *Ganoderma* Sacc., Syll. VI p. 156, IX p. 176, XI p. 89, XIV p. 183, XVI p. 153, XVII pag. 122. — Pileus suberosus, typice incrustato-laccatus; sporæ oblongo-ellipsoideæ v. sphæroideæ, ferrugineæ v. brunneæ, sæpius asperulæ. Basidia subglobosa, 4-sterigmatica. — Subgen. *Amauro-*

derma Patouill. distinguitur pileo superficie opaco, non nitente, et sporis typice sphaeroideis, dilutius coloratis. Cetera *Fomitis*.

1. **Ganoderma Elmeri** (Murr.) Sacc. et Trott., *Elfvigia Elmeri* Murr., 1157
Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) p. 476. — Pileo lato, compresso-ungulato, supra convexo infra leniter concavo, sessili, dimidiato, firmo, 20 \approx 25-35 \approx 4-7 cm.; superficie glabra, profunde sulcata, tuberculosa, corneo-incrustata, ætate et arescendo leniter rimosa, brunnea, griseo tincta; margine crasso, obtuso, ferrugineo, integro; contextu e ferrugineo fulvo, subsuberoso, subfirmo, 1-2 cm. cr.; tubulis distincte stratosi, in quoque strato 1-2 mm. long., intus fulvis, ore circulari, regulari præditis, 5 in quoque mm., acie subcrassa, integra; sporis ferrugineis, globosis, levibus, 5-6 μ . cr.; hyphis ferrugineis 3-4 μ . cr.; cystidiis ventricosis, fulvis, acuminatis, copiosis, 15-40 μ . long.

Hab. in ligno emortuo, Mt. Mariveles, Luzon, Ins. Philippin., Amer. centrali (A. D. E. ELMER).

2. **Ganoderma bavianum** Pat. Journ. de Bot. (1890) p. 19. — Pileo 1158
reniformi nigro, glabro, rugoso, dein rivuloso-radiato, concentricè sulcato, parum crasso, 6-8 cm. lato, 4-5 cm. longo, pleuropode; margine incurvo dein distento, hymenio brunneo-virenti, dein rufo; poris minutis initio viridulo-incrustatis, dein nudis angulosis, sepimentis tenuibus; tubulis 4-5 mm. longis; sporis globulosis, tenuiter asperulis, 5-6 μ . diam., brunneis; stipite laterali, glabro, opaco, fistuloso, 15-20 cm. longo, radicanti; contextu brunneo-flavido, opaco; crusta crassa, non lucenti.

Hab. ad caudices vetustos in valle Lankok, Tonkin. — Forma **mesopoda** Pat. l. c. — Pileo circulari integro v. undulato, centro depresso, superficie nigro, glabro, rivuloso, concentricè sulcato 15-25 cm. diam.; stipite centrali, 15-20 cm. longo, 1 cm. cr., æquali v. gibberoso, radicanti. — Cum typo.

3. **Ganoderma incrustatum** (Fr.) Bres. — Syll. VI, pag. 150 (*Fomes*), 1159
var. **bilobum** Bres. in Bot.-zool. Ergeb. Samoa etc. in Denkschr. K. Akad. Wissensch. Wien, LXXXV (1910) p. 2 (extr.). — Pileo suberoso-sublignoso, orbiculari, postice fisso et bilobo, ex plano ad insertionem stipitis depresso, e luteo sanguineo-nigro, laccato, nitido, laxè et leviter concentricè sulcato-zonato, 12 cm. lato, margine valde obtuso, horizontali, 1 cm. lat. et minutissime sulcato-zonato; contextu umbrino-badio, stipite e vertice pilei inter lobos descendente, obliquo, nigro, laccato-nitido, depresso, 6 cm. longo, 3 cm. cr.; tubulis pallide umbrinis, 1 cm. long.; poris rotundatis

200 μ . diam., fusco-umbrinis; sporis obovatis, demum apice truncatis, fulvellis, levibus, 10-12 \times 7-8; hyphis hymenii 2-3,5, pilei 3-6 μ . cr.

Hab. ad truncos in insula Bougainville (K. et L. RECHINGER).

4. **Ganoderma subincrustatum** Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II 1160 (1908) p. 122. — Pileo suberoso, e circulari flabellato, supra plano, 4-8 \times 6-8 \times 1-2 cm.; superficie glabra, breviter sulcata, leniter zonata, laccata, lucida, e flavido rubra badia v. obscure brunnea; margine cremeo, sterili, minute tomentoso, ex obtuso subacuto, ex undulato lobato; contextu e spongioso molli-suberoso, leniter zonato, homoganeo, isabellino, ad tubos obscuriori, dein fulvo, 1 cm. cr.; tubulis annuis, 3-5 mm. long., intus avellaneis, ore e circulari leniter angulari, albido-farcto præditis, 4 in quoque mm., acie obtusa, integra, straminea dein tenuiore et pallide avellanea; sporis ellipsoideis, obscure brunneis, 8 \times 4; hyphis brunneis, 5 μ . cr.; stipite e centrali laterali, cylindrico, subæquali, 1-5 cm. longo, 1-2 cm. cr., pileo contextu et superficie simili, sed colore fere nigro.

Hab. ad ramos, Hope Gardens Jamaica, Amer. centr. (F. S. EARLE).

5. **Ganoderma subfornicatum** Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II 1161 (1908) p. 121. — Pileo fere circulari, rigido, utrinque subplano, 8 \times 9-11 \times 2-3 cm.; superficie glabra, inæquali, pluries concentricè sulcata, minute zonata, radiato-rugosa, obscure badio-brunnea, laccata, lucenti; margine truncato, concolori, postice libero; contextu tenui, radiis corneis prædito, zonulato, fulvo, 5-10 mm. cr.; tubulis perennibus, longis et angustis, 1 cm. long. in quoque strato, fusco-fuligineis ore circulari præditis, 4 in quoque mm., initio farctis, acie ex obtuso acuta, integra, fuliginea; sporis globosis, levibus, brunneis, 4 μ . cr.; hyphis 5 μ . cr.; stipite sublaterali, umbonato, basi scutato, compresso, 3-7 \times 1,5-2,5 cm., ad pileum expanso, concolori et superficie et contextu æquali.

Hab. in ligno emortuo, British Honduras, Amer. centr. (MORTON E. PECK).

6. **Ganoderma Sequoiæ** Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) 1162 pag. 119. — Pileo molli, viscoso, dimidiato, compresso-ungulato, subimbricato, supra convexo, infra concavo, 8 \times 14 \times 5 cm.; superficie dein glabra, laccata, tenui incrustata, inæquali, undulata, ad marginem concentricè sulcata, e badio lucente subnigra; margine ochraceo, levi, undulato, subacuto; contextu suberoso, homoganeo,

supra cremeo, prope tubulos fulvo, postice 2 cm. cr.; tubulis indistincte stratosis, 5-20 mm. long, intus e griseo-fuscis fulvis, ore e circulari anguloso, latiusculo, irregulari præditis, 1-2 in quoque mm., acie tenui, integra, e cremeo umbrina, contusa, castanea.

Hab. ad truncos Sequoiæ, Sequoia canon California, Amer. bor. (ALICE EASTWOOD).

7. **Ganoderma pulverulentum** Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II, 1163 (1908) p. 121. — Pileo rigido, suberoso, e dimidiato flabellato, applanato, subimbricato, plerumque lato, 10-20 \times 15-30 \times 2-5 cm.; superficie glabra, laccata, lucida, e lateritio badia, dein fusco-brunnea prædito, late sulcato, azono, inæquali, quandoque prolifero; margine cremeo, pulverulento, subacuto, raro rotundato, levi, ex undulato lobato; contextu coriaceo, zonato, supra ex isabellino umbrino, infra ex obscure fulvo badio, 5-10 mm. cr.; tubulis perennibus, 5-10 mm. long. in quoque strato, intus avellaneis, ore angulari præditis, 4 in quoque mm., citrino-melleis, dein obscurioribus, contusis umbrinis, initio pulvere albo-cremea tectis, digitis facile removenda, acie acuta, integra; sporis ovoideis, brunneis, 9 \times 5; hyphis 4 μ . cr.; stipite brevi, obsoleto, subcylindrico, ex excentrico laterali, 2-3 \times 2-3 cm., supra incrassato; superficie laccata, glabra, e badio fere nigra, pileo obscuriori, contextu suberoso, obscure fulvo.

Hab. in trunco sicco Hippomanes Mancinellæ, Grenada Indiæ occident., Amer. centr. (W. E. BROADWAY).

8. **Ganoderma prælongum** Murrill, North Amer. Fl. v. IX (1908) 1164 pag. 121. — Pileo suberoso, ex orbiculari flabellato, supra plano, infra e convexo plano, initio prominenti umbonato, 4-6 \times 5-8 \times 1,5-3 cm.; superficie glabra, dein rugosa et sulcatula, laccata, lucenti, e castaneo badia; margine ochraceo, tenui, sterili, quandoque prolifero, contextu suberoso, homoganeo, isabellino lineis fulvis pr. tubulos signato, 1-2 cm. cr.; tubulis annuis 1 cm. long., intus umbrinis, ore angulari præditis, 3-4 in quoque mm., acie tenui, inæquali, ex albo avellanea, dein contusa umbrina; sporis ovoideis, obscure brunneis, 8 \times 5; hyphis subhyalinis 4 μ . cr.; stipite laterali, ascendenti, cylindræo, supra incrassato, 10-15 \times 1-2 cm.; grabro, laccato, e castaneo fere nigro, contextu pileo simili exceptis lineis mycelicis albidis in centro.

Hab. in ligno emortuo, Alto Cedro Cuba, Amer. cent. (F. S. EARLE et W. MURRILL).

9. **Ganoderma personatum** Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II 1165

(1908) p. 121. — Plerumque congregatum; pileo rigido, suberoso, flabellato, tenui, infra concavo, postice prominenti-umbonato, 5-9 \times 4-8 \times 0,5-1 cm.; superficie dein glabra, laccata, sublucenti, leniter incrustata, 2-3 breviter sulcata, crebro zonata, zonis albo et badio conspicue signatis; margine subobtusato, postice libero, ex undulato lobato, e lucenti lateritio badio distincte circinem efformans circum hymenium; contextu molli-suberoso, multizonato, avellaneo, ad tubos fulvo, 3-5 mm. cr.; tubulis indistincte stratosi, 3-5 mm. long. in quoque strato, intus avellaneis, dein griseis in stratis senioribus, a mycelio albido divisus, ore ex circulari leniter anguloso, initio albido-farcto, regulari præditis, 3-4 in quoque mm., acie e fere alba griseo-avellanea, dein umbrina; sporis ovoideis, brunneis, 8 \times 6; hyphis brunneis, 5 μ . cr.; stipite tuberculiformi, umbonato, distincte ramoso, pileo obscuriori, 0,5-1 \times 0,5-1,5 cm.

Hab. in trunco *Mangiferae*, Santjago de las Vegas, Cuba, Amer. centr. (F. S. EARLE).

10. **Ganoderma oregonense** Murrill, North Amer. Fl. v. IX Pt. II 1166 (1908) pag. 119; Atkinson, Botan. Gaz. XLVI (1908) pag. 329, tab. 19 fig. 4. — Pileo reniformi, suberoso, rigido, supra convexo, infra plano, 10 \times 17 \times 5 cm.; superficie glabra, tenui incrustata, levi, laccata, lucenti, e badio nigra, ad marginem distincte excavata; margine cremeo, rotundato, levi, integro, minute tomentoso; contextu suberoso, ex albo parum decolorato, homoganeo, ad stipitem lineis mycelicis albis prædito, 2-3,5 cm. cr.; tubulis annuis, 1 cm. long., intus avellaneis, ore e circulari anguloso præditis, 3 in quoque mm., acie tenui, integra, ex albo avellanea; stipite laterali, crasso, brevi, subcylindrico, 2-4 cm. long., 3-6 cm. cr., ad pileum expanso, pileo simili colore, superficie et contextu.

Hab. in trunco *Abietis sitchensis* prope Seaside Oregon, Amer. bor.

11. **Ganoderma nevadense** Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II 1167 (1908) pag. 119. — Pileo molli-suberoso, lato, tenui, applanato, dimidiato, 15-20 \times 30-40 \times 3-5 cm.; superficie e badio nigra, sublucenti, laccata, leniter incrustata, crustis dein erumpentibus et caducis, et membranam albam nitidulam relinquentibus; margine fere albo, tenui, contextu molli, homoganeo, ex albo stramineo, prope tubulos sulfulvo, 1-2,5 cm. cr.; tubulis perennibus, 5-15 mm. long. in quoque strato, intus fulvis, ore e circulari angulari præditis, 2 in quoque mm., acie tenui, dein lacerata, ex albo fulva.

Hab. ad truncos emortuos, Marlette Lake, Nevada, Amer. bor.
(C. F. BAKER).

12. **Ganoderma argillaceum** Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II 1168
(1908) p. 123. — Pileo suberoso, e dimidiato circulari, supra plano, infra plerumque convexo, 5-10 \times 8-12 \times 2-4 cm.; superficie glabra, leviter rugosa, laccata, non lucenti, ex avellaneo obscure castanea; margine cremeo, lato, e subobtusum acuto, recto, integro; contextu molli, concentricè zonato, supra isabellino, infra fulvo, 5-10 mm. cr.; tubulis annuis, 5-10 mm. long., intus avellaneis, ore angulari præditis, 3-4 in quoque mm., acie tenui, subintegra, ex albo avellaneis, contusis rubro-brunneis; sporis ovoideis, obscure brunneis, 12 \times 7; hyphis 4 μ . crassis; stipite e centrali laterali, brevi, sæpe subnullo, levi, glabro, laccato, lucenti, e badio nigro, 1-2 \times 1 cm., contextu suberoso vel pileo simili.

Hab. ad truncos emortuos Mangiferae, Santjago de las Vegas, Cuba. (F. S. EARLE).

13. **Ganoderma nitidum** Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) 1169
p. 123. — Pileo suberoso, lignoso, dimidiato v. fere circulari applanato, raro angulato vel dein columnari, supra convexo, infra parum concavo, 6-10 \times 8-16 \times 1,5-7 cm.; superficie glabra, valde sulcata, laccata, lucenti, e badio brunneo-nigra, floccosa, resinam abunde secernente; margine ochraceo, subobtusum, ex undulato lobato, ultima zona annua circinem latum lucentem circa hymenium efficiente; contextu tenui, molliusculo, badio, homoganeo, 1-3 mm. cr.; tubulis stratosi, longis et angustis, 1,5-2,5 cm. intus ex umbrino fuligineis, ore e circulari leviter anguloso, initio mycelio albido farctis, acie ex obtuso tenui et inæquali, ex albo umbrina.

Hab. ad truncos emortuos, Rio Esperanza, Puerto Sierra, Honduras, Amer. centr. (P. WILSON).

14. **Ganoderma tuberosum** Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II 1170
(1908) p. 123. — Pileo rigido, e dimidiato reniformi applanato, 7-15 \times 12-30 \times 2-4 cm.; superficie glabra, laccata, lucente, pluries anguste sulcata, radiato-rugosa, distincte tuberculosa, præcipue in exemplaribus majoribus, plerumque postice umbonata, dein e badio obscure brunnea; margine e cremeo fulvo, glabro, parum undulato, demum subobtusum truncato; contextu molli-suberoso, supra isabellino, infra fulvo, dein castaneo, homoganeo, 5-10 mm. cr.; tubulis perennibus, indistincte stratosi, 1-2,5 cm. longis, intus avellaneis, dein paullo obscurioribus, ore circulari præditis, 4 in

quoque mm., acie obtusa, cremea, demum tenui et obscuriori; sporis ovoideis, obscure brunneis, 8×6 ; hyphis obscure brunneis, 6 μ . crassis.

Hab. in ligno emortuo, Honduras Britan., Amer. centr. (MORTON E. PECK).

15. **Ganoderma comorense** (P. Henn.) Sacc. et Trott., *Fomes comorensis* P. Henn. in Voeltzkow, Reise Ostafrika III (1908) p. 24, tab. II, fig. 11. — Pileo suberoso-lignoso, flabelliformi, sessili v. discoideo-stipitato, radiato-striato, concentrice zonato, castaneo; margine subacuto, flavido, 4-7 cm. lato, 3-4 cm. longo; stipite brevi discoideo, ferrugineo-pruinoso v. subtomentoso; hymenio pallido, contextu ferrugineo, suberoso-fibroso, 2-3 mm. crasso, tubulis ferrugineis 2-7 mm. longis; poris minutis punctiformibus rotundatis, acie integris, pallidis; sporis subglobosis v. ellipsoideis, hyalino-subflavidulis, 1-guttulatis, $3,5-4 \times 3-3,5$, levibus.

Hab. ad truncos, Moheli, Miremani, Comoren Africae. — A *F. australi* et *F. amboinensi* sporis minoribus præcipue diversum.

16. **Ganoderma Williamsianum** Murr., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIV 1172 (1907) p. 478. — Pileo sessili, dimidiato, compresso-ungulato vel applanato, supra plerumque convexo, infra plano v. concavo, subimbricato, rigido, $3-4 \times 5-6 \times 1-2$ cm.; superficie leviter sulcata, leniter zonata, radiato-rugosa, avellanea, initio zonis obscuris angustis, dein ex vernice ochraceo-pulverulentis, demum glabris, laccatis, fulvis v. nigris; margine maturo conchato, flavo-brunneo, laccato, integro, sterili; contextu castaneo-colorato, spongioso, molli, 3-6 mm. cr.; tubulis non stratosi, angustis, intus murino-umbrinis, hymenio ex albo ochraceo v. melleo, ore e circulari leniter anguloso, regulari præditis, 5 in quoque mm., acie initio obtusa et integra, mox tenui; sporis late ovoideis, truncatis, obscure brunneis, rugoso-echinulatis, crasse tunicatis, $12-14 \times 8-9$; hyphis concoloribus 5-6 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo, Lamao River, Luzon, Ins. Philippin. Amer. centr. (R. S. WILLIAMS).

17. **Ganoderma subtornatum** Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 1173 (1907) pag. 477. — Pileo sessili, breviter stipitato, flabelliformi, basi angusta, applanato, infra leniter concavo, firmo et rigido, $6-11 \times 6-12 \times 1$ cm.; superficie leniter incrustata, nigro-lucenti, glabra, sulcata, radiato-rugosa; margine truncato, leniter sulcato, sterili, integro; contextu 2-4 mm. cr., suberoso, supra albo, infra castaneo; tubulis non stratosi, angustis, 5-8 mm. long., intus

avellaneo-umbrinis, ore regulari, rotundo præditis, 5 in quoque mm., fumoso-fuligineis, acie obtusa, integra; sporis ovoideis, pallide brunneis, minute asperulis, $9 \approx 6-7$; hyphis obscure brunneis, 5-6 μ . cr.; cystidiis nullis; stipite laterali, compresso, 0,2 cm. longo, 1,5-2 cm. cr., pileo simili.

Hab. ad truncos dejectos in Ins. Philippin. Amer. centr.

18. **Ganoderma subperforatum** Atkinson, Botan. Gazette, XLVI (1908) 1174 p. 337, tab. XIX, fig. 5. — Pileo stipitato, mediocri; stipite laterali; pileo suberoso-lignoso simplici v. lobato, e subcirculari reniformi, convexo, laccato, rubro-castaneo, late sulcato; sporis ovato-cuneatis, brunneis, tunica tenui, minute foveolato-lineatis, $8-12 \approx 5-8$.

Hab. in ligno quercino mortuo, Chillicothe Ohio, Amer. bor.

19. **Ganoderma Silveiræ** Torrend, Broteria, Ser. Bot. VIII (1909) 1175 p. 132, tab. X, fig. 2, tab. XI, fig. 1. — Solitarium durissimum, pileo unguato, conchato, superne atro, glabro, subrugoso, concentricè et inæquali distantia zonato; cute irregulariter disrupta; speciminis visi pileo 25-27 cm. longo, 23-27 cm. lato, ad partem substrato affixam, 13-15 cm. alto; contextu brunneo-nigrescenti; hymenio concavo; poris minutis, angulatis, brunneis; tubulis prælongis, postice ad partem trunco affixam 4-5 cm. longis; in strato anni recentioris 3-4 mm. longis, brunneo-flavescentibus; sporis ochraceis, plerumque ellipsoideis, $7-9 \approx 5-6$ v. ovoideis $10-12 \approx 7-8$; hyphis contextus tubulosi 3-4 μ . cr.

Hab. ad truncum Lauri, in insula Madeira. (P. MANUEL DE SILVEIRA). — *Gan. multiplicato* Mont. affine.

20. **Ganoderma rivulosum** Pat. et Har., Bull. Soc. Myc. Fr. XXII, 1176 (1906) p. 119, cum icone. — Stipitatum; stipite laterali, 2-3 cm. longo, 1 cm. cr., simplici v. ramoso, sanguineo-rufo, laccato, cylindræo v. compresso; pileo plus minusve imbricato, tenui, applanato-arcuato, nitide brunneo-sanguineo, dense radiatim rivuloso, sulcis strictis numerosissimis parum profundis notato, margine acuto, patente, ochraceo v. albido; contextu tenui, 1 mm. vix cr., pallide fusco; tubulis 6 mm. circiter longis, fuscis; poris minutis, rotundatis v. unguatis, acie integra; hymenio concavo, fuscello v. dilute flavo; sporis ovoideis, levibus, fuscis, $12 \approx 8$.

Hab. ad truncos, quisquiliæ et lapides incrustans, in. ins. Java (P. SERRE) — Habitu *Gan. lucido* valde simile, differt superficie rivulosa, radiatim et dense lineata, pileo tenuissimo, trama valde tenui et pallidiori, sporis levibus.

21. **Ganoderma lucidum** (Leys.) Karst. — Syll. VI, p. 157 (*Fomes*) 1177

var. **resinosum** Pat., Rick Broteria VI (1907) p. 86, tab. IX, fig. 1. — Mollius quam typus, crassius, castaneo-brunneum, fere sessile.

Hab. ad truncos locis humidis suffocatis, Rio Grande do Sul in Brasilia et in India or. Formis intermediis ad *G. Curtisii* transit — Var. **Nicotianæ** (Ingl.) Sacc. et Trav., Syll. XIX p. 714, Inglese, Parass. Polyp. luc. in Nicotiana, Sansepolcro (1901) cum 1 tab. — Cæspitosum, sessile, unguatum, rufo-castaneum, nitens copioso mycelio basim matricis obvolvente præditum. — Ad basim caulis *Nicotianæ Tabaci* (Kentucky), quam vexat, Monterchi, Arezzo Etruriæ. Situs ad plantam herbaceam singularis.

22. **Ganoderma oroleucum** Pat. et Har., Bull. Soc. Mycol. de Fr. 1178 XXII (1906) p. 118. — Sessile, solitarium v. parce imbricatum, subdimidiatum, 6-15 cm. latum, convexo-applanatum, concentricè zonatum v. sulcatum, radiato-plicatum, nitidulum, rufo-castaneum, postice obscurius, antice pallidius, margine integro, albo; pileo castaneo, firmo, 1-2 cm. cr.; tubulis 6-10 mm. long., pallidioribus; sporis ovoideis, castaneis, majoribus, 16-18 \times 12, grosse verrucosis; poris minutis, rotundis, denticulatis, rufescentibus, substantia resinacea flavida sæpe obductis et tunc integris; hymenio applanato-convexo.

Hab. ad truncos in ins. Java (P. SERRE). — *Gan. lucido* f. *sessili* et *G. australi* affine; margine albo, sporis majoribus verrucosis et pororum margine denticulato distincta.

23. **Ganoderma flexipes** Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII (1907) p. 75, 1179 cum icon. — Pileo orbiculari, convexo, glabro, parvo, 10-15 mm. diam., parum crasso, 5-8 mm., concentricè sulcato, fulvo v. rubro nigriscente, nitide laccato, dorso inserto et postice marginato; hymenio plano, albo dein fulvo; poris parvis, rotundatis, septis integris et crassis; tubulis brevibus, fulvo-brunneis; sporis levibus, ovoideis, parum coloratis, 8-10 \times 4-5; stipite gracili 2-5 mm. cr., flexuoso, cylindræo v. noduloso, nitide castaneo-brunneo, glabro, valde elongato, 8-25 cm., basi processu radiciformi toruloso, fulvo v. ochraceo terminato; trama tenui, floccosa, albida, ferruginea.

Hab. ad truncos vetustos, Indo-China (EBERHARDT). — A *Gan. nutante* (Fr.) tubulis brevioribus, sporis levibus et dilutius coloratis facile dignoscitur.

24. **Ganoderma Currani** Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) 1180 p. 411. — Pileo suberoso, rigido, reniformi, supra convexo, subtus concavo, postice leniter depresso, ligno stipite longo adhærenti, 3-4 \times 5-6 \times 0,5 cm.; superficie glabra, laccata, lucenti, rubro-brun-

nea, breviter concentrice sulcata, radiato-rugosa; margine crasso, undulato, concolori; contextu fulvo, subereo, 1-2 mm. cr.; tubulis angustis, 3-4 mm. long. in parte pilei crassiore, griseo-fuscis, ore demum concolori, e circulari anguloso præditis, 4-5 in quoque mm.; sporis ovoideis, distincte asperulis, obscure fulvis, copiosis, 8-10 \times 6-7; stipite erecto, sublateraliter inserto, subcylindrico, parum irregulari, æquali, laccato, glabro, incrustato, 15-20 cm. longo, 5-10 mm. crasso.

Hab. in ligno emortuo prope Lamao, Luzon Ins. Philippin., Amer. centr. (H. M. CURRAN).

25. **Ganoderma Barretii** Torrend, Broteria, Ser. Bot. VIII (1909) 1181 p. 133, tab. X, fig. 1. — Dimidiatum, sessile, sæpe imbricatum; pileo expanso, cuneiformi, gibboso, primitus atro-laccato, in vetustis specimibus nigerrimo, 10-25 cm. longo, 8-10 cm., antice lato, 5-7 cm. postice alto; hymenio albo; poris mediocribus, 0,5 mm., oculo inermi bene visibilibus; tubulis non stratosi, 2-3 mm. longis, brunneis; contextu pilei intus primum fusco, mollissimo, ad rupturam laxè floccoso, ad modum *G. australis*, demum durissimo, lignoso; sporis oblongis, 8-9 \times 5-7, levibus, ochraceis; hyphis tubulorum pallido-ochraceis, 3-4 μ . cr.

Hab. ad truncum Platani, in Ins. Madeira (C. DE MENEZES et J. BARRETO).

26. **Ganoderma balabacense** Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV 1182 (1908) p. 410. — Pileo e tuberculo basilari ascendente, e flabelliformi subcirculari, postice v. centro depresso, subtus concavo, 15 \times 15 \times 2 cm.; superficie glabra, leniter incrustata, postice brunneo-opaca, laccata, antice lucenti et obscure rubro-brunnea, rugosa et rugoso-tuberculosa, sulcata; margine abrupte acuto, flavido, sterili, integro; contextu supra ferrugineo, subtus fulvo, lignoso-fibroso, 1 cm. cr.; tubulis cinereo-fuscis, angustis, 1 cm. longis, ore circulari, regulari, initio albo, maturitate concolori præditis, 3-4 in quoque mm., acie crassa, integra; sporis ovoideis, minute asperulatis, pallide brunneis, 8-9 \times 4-5; hyphis ferrugineo-fulvis; cystidiis nullis.

Hab. in ins. Balabac Ins. Philippin. Amer. centr. (L. MANGUBAT).

27. **Ganoderma Alluaudi** Pat. et Har., Bull. Soc. Myc. de Fr. XXII 1183 (1906) p. 117. — Stipitatum; stipite erecto, subcylindræo, æquali, inferne plus minusve ramoso, 12-15 cm. longo, 10-15 mm. cr., brunneo-atro, pruinoso, non laccato, intus lignoso, pallide fulvo,

centro canaliculato; pileo laterali, reniformi, convexo-plano, prope marginem abrupte inflexo, 8-10 cm. lato, 2-3 cm. crasso, opaco, rufo-brunneo, pruinuloso, dense concentrice sulcato, margine acuto, repando, contextu pallide fusco, tenui, vix 1-2 mm. cr.; tubulis longissimis, rigidis, fulvis; hymenio subplano v. concaviusculo, usque ad marginem extenso, fulvo; poris mediis, angulatis dissepimentis tenuibus, integris; sporis ovoideis, verruculosis, fulvis, 12-14 \times 8-10.

Hab. ad truncos, Nairobi-Kikuyn, Africæ or. (ALLUAUD). — *Ganod. lucido* affine a quo præcipuè differt colore dilutiori, sporis majoribus, trama tenuissima et poris elongatis, angulatis.

28. **Ganoderma lipsiense** (Batsch) Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) 1184 p. 89. — Ita vocandus est *Boletus lipsiensis* Batsch (= *B. applanatus* Pers., *Pol. leucophæus* Mont., *Pol. megaloma* Lév., *Fomes applanatus* (Pers.) Fr. — Syll. VI, p. 176).

29. **Ganoderma lobatum** (Schw.) Atkins. Ann., Mycol. VI (1908) 1185 p. 190. — Ita vocandus est *Polyporus lobatus* Schw. (= *Fomes reniformis* (Morg.) Sacc., Syll. VI p. 187).

30. **Ganoderma subrenatum** (Murrill) Sacc. et Trott., *Amauroderma* 1186 *subrenatum* Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 117. — Pileo laterali, reniformi, supra convexo, infra concavo, are-scendo rigido, 2 \times 3 \times 0,2 cm.; superficie glabra, rugosa, subzonata, abrupte brevi concentrice sulcata, ex avellaneo umbrina, postice depressa; margine minute tomentoso, zonato, pallido, sat crasso; contextu albo, tenui, fibroso, 1 mm. crasso; tubulis non stratosi, pallide isabellinis in sicco, 1-1,5 mm. long., ore e circulari hexagonali, regulari præditis, 4-5 in quoque mm., acie crassa, integra, pallide avellanea; stipite longo, angusto, basi parum flexuoso, supra erecto, cylindrico, æquali, lateraliter inserto, simplici, umbrino, opaco, firmo et intus albido, 10 cm. longo, 2 mm. crasso.

Hab. ad terram, Honduras britann., America bor. (MORION E. PECK).

31. **Ganoderma flaviporum** (Murrill) Sacc et Trott., *Amauroderma* 1187 *flaviporum* Murrill, North. Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 116. — Pileo duro, rigido, circulari, centro depresso, subtus concavo, 8-12 \times 8-12 \times 1 cm.; superficie opaca, velutina, umbrina, zonis numerosis badio-nigris signata, radiato-rugosa, non sulcata; margine pallidiore, veluino, subzonato, deflexo, minus in sicco, acuto, ex undulato lobato; contextu albo, suberoso, homoganeo, 5 mm. cr.; hymenio adnato; tubulis pallide avellaneis, non stratosi, 2-4

mm. long., ore angulari præditis, 4-5 in quoque mm., initio farctis, acie tenui, integra, initio flava, in sicco cremeo-mellea; sporis ovoideis, truncatis, flavido-brunneis, grosse echinulatis, 6-7 \approx 4-5; stipite crasso, centrali, parum compresso, æquali v. sursum expanso, erecto, opaco, corneo-incrustato, velutino, atro melleo-flavo, intus albo et suberoso, 6-8 cm. long. 1,5-2 cm. cr.

Hab in trunco Melicocccæ bijugæ, Hope mine, Jamaica, Amer. centr. (F. S. EARLE).

32. **Ganoderma avellaneum** (Murrill) Sacc. et Trott., *Amauroderma* 1188

avellaneum (Murrill) North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 116.

— Pileo ligneo, crassiusculo, flabelliformi, lateraliter adhærente, 6 \approx 6 \approx 1 cm., superficie e pulveraceo glabra, rugosa, dein colliculosa, sulcatula, leniter incrustata, opaca, avellanea, zonulis rubro-brunneis signata; margine pallido, acuto, lobato, pulveraceo; contextu suberoso, radiis corneis prædito, arescendo pallide isabellino, 3-4 mm. cr.; hymenio libero; tubulis longis et angustis, non stratosis, postice 1 cm. long., antice brevioribus, intus albis, ore circulari præditis, 4 in quoque mm., acie obtusa, integra, alba; stipite longo, adscendente, subcylindrico, ramulis brevibus abortivis prædito, angusto, laterali, umbrino, opaco, corneo-incrustato, firmo, intus fere albo, 15 cm. longo, 1 cm. cr.

Hab. in ligno dejecto in Nicaragua, Amer. bor. (C. L. SMITH).

33. **Ganoderma Ramosii** (Murr.) Sacc. et Trott., *Amauroderma Ra-* 1189

mosii Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) pag. 408. —

Pileo rotundo-reniformi, hilo profunde inciso, rigido, suberoso, leniter convexo, 3 \approx 4 \approx 0,5 cm.; superficie leniter incrustata, opaca, glabra, leniter sulcato-zonata, obscure grisea v. nigrescenti, arescendo rugosa; margine crasso, oblique truncato, delicate picto, undulato; contextu postice 1-2 mm., antice tenui, albido, spongioso-fibroso; tubulis 4-5 mm. long., angustis, avellaneis, ore concolori v. obscuriori, regulari, circulari præditis, 5 in quoque mm., acie crassa, integra; sporis subglobosis, minute asperulatis, leniter flavido-brunneis, 8-10 μ .; stipite laterali suberecto, curvo et parum compresso, corticato, glabro, pileo pallidiori, ligneo, infra radicato et ramoso, 7 \approx 0,4 cm.

Hab. in radicibus emortuis prope Bosoboso, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (M. RAMOS).

34. **Ganoderma Elmerianum** (Murr.) Sacc. et Trott., *Amauroderma* 1190

Elmerianum Murr., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIV (1907) p. 475.

Pileo stipitato, umbonato-affixo, e subcirculari reniformi, supra

plerumque convexo, subtus plano v. leniter concavo, duro, rigido, 3 \approx 4-7 \approx 0,5-1 cm.; superficie leniter incrustata, minute pubescenti, conspicue radiato-rugosa, sæpe sulcata, lineis avellaneis angustis et zonis latis fuligineis v. nigris signata; margine crasso, truncato, zonato, gibbosulo v. rugoso, concolori; contextu avellaneo, subsuberoso, homoganeo, 2-4 mm. cr.; tubulis 3-7 mm. long., angustis, intus avellaneis, ore regulari, circulari, constricto præditis, 5-6 in quoque mm., ex albido fumoso nigris, contusis rubro-brunneis, acie crassa, obtusa integra; sporis subglobosis, pallide brunneis, minute echinulatis crasse tunicatis, 5-6 μ . cr.; hyphis subhyalinis 3-5 μ . cr.; cystidiis nullis; stipite lateraliter adhærenti, ascendenti, cylindræo, subæquali, 3-12 cm. longo, 0,7-1,3 cm. cr., pileo superficie et substantia valde simili.

Hab. in ligno emortuo prope Palo Leyte, Mariveles, Luzon in Ins. Philippin. Amer. centr. (A. D. E. ELMER).

35. **Ganoderma Clemensæ** (Murr.) Sacc. et Trott., *Amauroderma Clemensæ*, 1191
Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 408. — Pileo tenui, tenaci flexibili, e flabelliformi subcirculari, conchato, postice profunde depresso, 5 \approx 6 \approx 0,2-0,3 cm.; superficie glabra, sublevi, multizonata, minute radiato-rugosa in sicco, postice brunnea, antice avellanea, zonis obscurioribus; margine integro v. ex integro undulato, arescendo nigrescente et inflexo; contextu spongioso fibroso, pallide isabellino, 0,5-1,5 mm. cr.; tubulis 1,5-2,5 mm. long., intus pallidioribus, ore avellaneo, compresso umbrino regulari, lucenti præditis, 4-5 in quoque mm., acie tenui, integra, suberosa; sporis e subgloboso ovoideis, levibus, e flavido brunneis, copiosis, 5-7 μ . diam.; stipite laterali, curvo, cylindrico, subæquali, basi leniter expanso sursum parum compresso, contextu et superficie pileo consimili sed uniformiter brunneolo et parum lignoso, 8 \approx 0,6-0,7 cm.

Hab. in radicibus emortuis prope Camp Keithley Mindanao, Ins. Philippin. Amer. cetr. (MARY S. CLEMENS).

36. **Ganoderma Brittonii** (Murr.) Sacc. et Trott., *Amauroderma Brittonii* 1192
Murrill, Mycologia, II (1910) p. 193. — Pileo circulari, subplano, udo parum molli, dein arescendo rigido et fragili, 30 cm. c. lato; superficie inæquali, quandoque sulcata, e castaneo fuliginea, pelliculosa, pruinosa, opaca, dein arescendo distincte rugosa; contextu arescendo spongioso, avellaneo, homoganeo, utrinque strato obscuro tenui 2 mm. c. cr. limitato; hymenio initio griseo, dein arescendo brunnescenti; tubulis minutis, irregularibus, brevibus,

usque ad 5 mm. long., contextu obscurioribus, arescendo obscure fumosis, ore subangulari, initio farcto præditis, 2-3 in quoque mm., acie tenui, integra, rigida; sporis subglobosis, leniter fuscis, asperulis, 7-8 μ . cr.; stipite subcylindrico, brevi, centrali utrinque subincrassato, pileo validiori et rigidiori, incrustato, avellaneo, pruinoso, glabro, inæquali, 10 cm. longo, 6 cm. cr. v. ultra.

Hab. in trunco putri prope Bachelor's Hall, Parish of Saint Thomas, Jamaica (N. L. BRITTON).

37. **Ganoderma bataanense** (Murr.) Sacc. et Trott., *Amauroderma ba-* 1193
taanense Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 407. — Pileo circulari, subplano, rigido, suberoso, 5 \times 5 \times 0,5 cm; superficie arescendo concentrice et radiatim rugosa, sulcata, minute zonata, opaca, ex avellaneo griseo-brunnea, margine pallidiori, leniter incrustata, glabra; margine undulato, truncato; contextu albo v. subalbo, centro 3 mm. cr., margine tenui, homoganeo, firmo; tubulis fusco-brunneis intus et extus, 2-3 mm. long., ore latiusculo et maturitate anguloso præditis, 3 in quoque mm., acie tenui, firma, integro; sporis globosis, obscure brunneis, crasse tunicatis, leniter asperulis, copiosis, 12-14 μ . diam.; stipite centrali, subcylindraco, supra expanso, infra angustato et radicato, corticato, isabellino, ligneo, 6 \times 0,6 cm.

Hab. in radicibus emortuis, Lamao Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (H. M. CURRAN).

38. **Ganoderma asperulatum** (Murr.) Sacc. et Trott., *Amauroderma* 1194
asperulatum Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 407. — Pileo e reniformi subcirculari, crasso, suberoso, rigido, convexo-concavo, 5 cm. diam., 1,5 cm. cr.; superficie glabra, avellanea, duabus v. tribus zonis obscure brunneis prædita, leniter incrustato, non laccato nec lucenti, arescendo rugoso; margine crasso, undulato, sulcato; contextu tenui, 1-2 mm., albo, spongioso-fibroso, homoganeo; tubulis longis et angustis, 1-1,5 cm.; brunneis, ore angulari præditis, 3 in quoque mm., acie tenui, integra; sporis copiosis, ovoideis, obscure flavo-brunneis, circ. 18 \times 12, verrucis magnis præditis; stipite ascendenti, lateraliter inserto, cylindraco, æquali, supra leniter expanso, superficie pileo consimili, substantia tenaciori, 5 cm. longo, 6-7 mm. cr.

Hab. ad terram prope truncum ? *Parkia* sp. emortuae, Lamao, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (E. B. COPELAND).

39. **Ganoderma tropicum** (Jungh.) Bresad. Ann. Mycol. (1910) p. 586. 1195
— Ita vocandus *Polyp. tropicus* Jungh. — Syll. VI, p. 183 (*Fo-*

mes). — Sporæ fusciculæ, obovato-truncatæ, episporio asperulo, 10-12 \approx 7-9.

POLYSTICTUS Fr. — Syll. VI p. 208, IX p. 181, XI p. 90, XIV p. 185, XVI p. 254, XVII p. 126.

- P. conimicus*
Pat. VI, 210
1. **Polystictus callisteus** Syd. Deutsche Zentral-Afrika Exped. (1907-8) 1196
Bd. II, p. 94. — Mesopus; pileo coriaceo-papyraceo, orbiculari, subtenui, 4-7 cm. diam., medio ad stipitis insertionem infundibuliformi, superne fusco-brunneo v. badio, obscurius marginato, dense concentrice zonato, velutino, margine integro; stipite centrali, tereti, 1,5-2,5 cm. longo, 1,5 \approx 2,5 mm. cr. infra levi, basim versus albo-floccoso, ima basi leviter dilatato, fulvo-luteo; poris minimis, luteis, rotundis; sporis ovato-ellipsoideis, hyalinis, 4-7 \approx 4-5.

Hab. ad ramos in silvis Beni Africæ centr. — *Polysticto xanthopodi* affinis, imprimis pileo velutino dignoscendus.

- Polyp.
lobatus Fr.
VI, 248.*
2. **Polystictus alutaceo-villosus** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII 1197
(1905) p. 121. — Pileo coriaceo-rigido, apode v. postice discoideo-substipitato, flabellato v. subreniformi, convexo-explanato, medio depresso, obsolete zonato, radiatim substriato, velutino, ruguloso-verruculoso, alutaceo, 8-15 cm. lato, 5-10 cm. longo, usque ad 5 mm. cr., margine tenui, rigido, integro v. inciso-repando; contextu spongioso pallide alutaceo, 1-2 mm. cr.; hymenio plano, pallide ferrugineo, sericeo, nitenti; poris rotundato-angustatis, 0,4-0,5 mm. diam., acie rigidis integris v. subdenticulatis; sporis globosis 3-4 μ . cr.; hyalinis, levibus.

Hab. ad truncos, Bipindi Kamerun Africæ (ZENKER).

3. **Polystictus flabelliformis** (Kl.) Sacc. — Syll. VI p. 216. — *Micro-* 1198
porus flabelliformis (Klotz.) Pat., var. **crenato-lobatus** Pat., Bull. Soc. Mycol. de Fr. XXIV (1908) p. 4. — Pileo profunde in 3-4 lobos conoideos margine crenulatos diviso; stipite 3-5 cm. longo.

Hab. ad truncos emortuos, Nova Caledonia (M. LE RAT).

4. **Polystictus mollis** (Pat.) Sacc. et Trott., *Microporus mollis* Patouill., 1199
Bull. Soc. Mycol. de Fr. XXV (1909) p. 4. — Pleuropus; pileo semiorbiculari, 8 cm. lato, crenato-lobato, glabro, azono, antice membranaceo, tenui, albido, postice crassiusculo, carnosocoriaceo, flavo-rubro, cuneato, in stipitem definite lateralem, grabrum, cylindraceum, 15 mm. long., 8 mm. cr., fuscum, crustula glabra, opaca tectum, basi orbiculariter dilatatum attenuato; poris albis, rotundis, minutissimis, non decurrentibus.

Hab. ad basim truncorum in silvis Djirin Annam (EBERHARDT).

5. **Polystictus subdealbatus** (Murr.) Sacc. et Trott., } *Microporellus sub-* 1200

dealbatus Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) p. 471. — Pileo tenui, tenaci, flexibili, flabelliformi in basim stipiteformem compressam sensim attenuato, $4 \times 3 \times 0,1$ cm.; superficie zonata, e fibrilloso glabra, aspectu resinoso, pallide flavida v. leniter rubro-brunnea; margine tenui, sterili, lacerato, inæquali; contextu tenui, albo, fibroso, flexibili; tubulis brevibus, decurrentibus, intus albis, ore parvo, lucenti, irregulari, angulato, ex albo flavidulo præditis, 5 in singulo mm., acie acuta, inæquali, lacerato-dentata, mox irpiciformi; sporis ovoideis, levibus, hyalinis, 3-4 μ . cr., hyphis hyalinis, 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (E. D. MERRILL).

6. **Polystictus decurrens** Lloyd, Mycol. Not., Polyp. Issue n. 1 (1908) 1201

pag. 12, fig. 206. — Pileo depresso, zonato, glabro, tenui, pallide cinnamomeo; stipite gracili; poris longis decurrentibus, angustis, regularibus; sporis ellipsoideis 8×4 , hyalinis, levibus guttulatis.

Hab. ad truncos, Ellis Massachusset Amer. bor. (S. E. MORRIS) — Imprimis poris longe decurrentibus distincta specie. Affinis *Polysticto cinnamomeo*.

7. **Polystictus Holstii** P. Henn. — Syll. XIV p. 185. — var. **viridis** 1202

Eichelb., Verh. Naturw. Ver. Hamburg, 3 Fge. XIV (1906) p. 53. — Pileo centro olivaceo-virente; hymenio a stipite acute distincto; stipite basi scutiformi prædito.

Hab. ad truncos, Bomole Amani Africæ orient. — *P. sacro proximus*, sed differt pileo non radiatim striato et diverse colorato.

8. **Polystictus perennis** (L.) Fr. — Syll. VI, p. 210 — var. **simillimus** 1203

Lloyd, Mycol. Not., Polyp. Issue, n. 1 (1908) pag. 8. — A typo differt statura minori et graciliori, poris minus decurrentibus.

Hab. in silvaticis Europæ et Americæ. — Var. **prolifer** Lloyd, Mycol. Not., Polyp. Issue, n. 1 (1908) pag. 8, fig. 202. — Pileo margine pileolos plures generans; sporis 9×6 ; contextu pilei magis flexibili et colore lætiore quam in *Polysticto perenni*. — In silvaticis, Cleveland Ohio Amer. bor. (M. BUBNA). — Evidenter forma teratologica.

9. **Polystictus focicola** (Berk. et Curt.) Sacc. et Trott., *Polyporus* 1204

focicola Berk. et Curt., Cub. Fung. in Journ. Linn. Soc. (1868) p. 305, non *Polyporus parvulus* Kl. teste Murrill, N. Am. Polyp.

= Polyp. elongata
Berk. VI, 231

= P. incoscriptus Fr.
VI, 215

p. 92 et Lloyd. Polyp. Issue (1908) p. 8, fig. 203. — A *Polysticto perenni* differt pileo paullo tenuiori; tubulis latioribus usque ad 1 mm. (non 0,5 mm.) sat profundis; sporis 10×5 (Lloyd) v. $6 \times 3,5$ (Murrill), pallide flavis.

Hab. ad terram ustam, Connecticut usque ad Alabama, America bor.

10. **Polystictus latipileus** Sacc. Myc. Cong. novi, Ann. Myc. v. IV 1205 (1906) p. 73. — Pileo coriaceo-papyraceo, infundibuliformi, 10-12 cm. lato, levi, glabro, nitidulo, zonato, fulvo-badio; poris minimis, subrotundis, pallidis; stipite subcentrali cylindraceo, gracili, 5-6 cm. longo, 2 mm. cr., ochraceo-melleo, nitido, basi breviter incrassato-peltato.

Hab. ad ligna in districtu Aequatoris Congo belg. Afric. trop. (G. GENTIL). — Medius fere inter *Polystictum passerinum* et *P. xanthopodem*, a primo dignoscitur pileo duplo triplove latiore et integro nec initio fisso, ab altero stipite multoties longiore graciliore nec flavo-stramineo.

11. **Polystictus obesus** Lloyd, Mycolog. Not., Polyp. Issue, n. 1 (1908) 1206 p. 11. — Pileo crasso, obeso, quoad colorem et characteres *Polysticto perenni* simili sed non zonato et superficie inæquali, squamulis erectis prædito.

Hab. ad truncos in Canada Amer. bor. (JOHN DEARNESS). — Verisimiliter *Pol. cinnamomeo* jam relata species.

12. **Polystictus pseudoperennis** Lloyd, Synops. of the sect. Microp. 1207 Tabac. and Funal. (1910) p. 52-53 fig. 339, *Polyst. Holstii* Henn. e. p. (in herb. Berol.). — Dignoscitur pileo dense et adpresse velutino, pallido, zonis concentricis, undulatis, angustis distincte notato; poris minutis, cinereis; stipite glabro.

Hab. in Africa tropicali (HOLST). — Habitus fere *Polysticti perennis* jam vetusti.

13. **Polystictus turbo** P. Henn., in Voeltzkow, Reise Ostafrika, III 1208 (1908) p. 22, tab. II, fig. 10. — Pileo coriaceo, turbinato, mesopode, convexo-plano, medio umbilicato, radiatim striato sulcatoque, concentricè zonato, atro-castaneo, 1-1,5 cm. diam.; margine tenui crenatulo; stipite brevi, tereti, cinereo-isabellino, squamosulo, 2-3 mm. longo, 1 mm. cr.; contextu ferrugineo; tubulis decurrentibus, 1-3 mm. longis, fusco-ferrugineis, acie denticulatis; sporis ellipsoideis, 1-2-guttulatis, hyalino-fuscidulis, $6-9 \times 4-5$.

Hab. in ramis, Fénériver Magadaskar. — *Pol. parvulo* affinis.

14. **Polystictus radiato-scruposus** P. Henning, Fungi Amaz. IV in 1209 Hedw. 44 (1905) p. 59. — Pileo coriaceo rigido, flabellato, pleuropode, radiato-ruguloso v. sulcato, fusco-castaneo ad marginem sæpe pallido, inciso-undulato, obtuso, 3-4 cm. lato longoque, stipite laterali, tereti v. subcompresso, lignoso, atro-fusco, 1-1,5 cm. longo, 3 mm. cr., basi subdiscoideo; hymenio pallide fuscidulo, poris rotundato-angulatis, minutis, pallidis.

Hab. ad truncos putres, Rio Madeine, Marmellos, Amer. austr. *P. dilatatus Berk.*

15. **Polystictus Ridleyi** Masee, Kew Bull. n. 7 (1906) pag. 256. — 1210 VI, 217
Pileo (pluribus sæpe confluentibus), infundibuliformi, radiatim striatulo, concentrice plurizonato, tenuissimo, coriaceo-lento, flexili, pallide incarnato-griseo, 5-8 cm. diam.; hymenio plano e poris brevissimis, ore rotundato, 300 μ . diam., dissepimentis tenuibus, albo-flavescentibus composito; basidiis et sporis non visis.

Hab. in ligno emortuo, Ayer Kerok Malacca Asiæ. (RIDLEY).

16. **Polystictus Patouillardi** Rick, Broteria VI (1907) p. 89 tab. IV 1211 fig. 3. — Pileo stupposo, imbricato-effuso, superius castaneo flavescente, radiato-rugoso, tomentosus, margine crasso, læte flavo, intus obscure zonato, 5 cm. long., 1 dm. lato, 2 cm. cr.; poris flavo-olivaceis, parvis, angulatis, micantibus, farctis, contextu flavo, dein ferrugineo; sporis fere ellipsoideis, curvulis, $4 \approx 2,5$; sterigmatibus longiusculis.

Hab. ad truncos, Rio Grande do Sul Brasilæ. — *P. radiato* affinis sed colore hymenii et pilei diversus. An huc *P. chrysites* Berk. ducendus?

17. **Polystictus umbrinellus** Bres., Ann. Mycol. V (1907) p. 239. — 1212
Dimidiato-sessilis vel effuso-reflexus, sæpe vertici papilla stipitiformi affixus; pileo tenui, fibroso-coriaceo, dimidiato-effuso v. cucullato aut subconchiformi, glabro, ruguloso-lacunoso, umbrinello vel luride cervino, margine undulato-lobato, 1-3 cm. lato, 7-15 mm. producto; tubulis pallidis, 2 mm. longis; poris parvis, subrotundatis; sporis non visis.

Hab. ad truncos vel ramos in insula Java (HEINRICHER).

18. **Polystictus obovatus** (Jungh.) Bresad. Annal. Mycol. (1910) 1213 p. 585. — Ita vocandus *Polyporus obovatus* Jungh. — Syll. VI, p. 90. — Hujus, teste Bres., essent synonyma: *Polyp. lacer* Jungh., *Polyp. Adami* Berk. et *Polyp. rasipes* Berk.

19. **Polystictus villosus** Masee, Kew Bull. n. 4 (1906), pag. 93. — 1214
Pileo semiorbiculari, convexo-applanato, sessili, villosus, pallido, zonis discoloribus variegato, margine albicanti, 3-5 cm. lato; tu-

bulis rufescenti-ochraceis, curtis; poris concoloribus, rotundatis, minutissimis; sporis obovatis, hyalinis, basi truncatis, 7-8 \times 5.

Hab. ad ramos emortuos in India or., Asia (BUTLER). — Affinis *Polyp. Feei* Fr. a quo differt pileo piloso, tubulis brevioribus, poris minoribus.

Polyporus
Sallabuf VI, 77

20. **Polystictus benquetensis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Coltricia ben-* 1215

guetensis Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 391. — Pileo e flabellato reniformi postice plerumque umbonato, utrinque leniter convexo, suberoso, rigido, 3-4 \times 4-5 \times 0,5-0,8 cm.; superficie anoderma, subglabra, inæquali, non sulcata nec zonata, postice fulva antice ferruginea; margine late sterili, subcrasso, obtuso, ferrugineo, contextu ferrugineo, suberoso, zonato, homogneo, 5 mm. cr.; tubulis 1-2 mm. long., intus pallidis, ore cinereo-fusco, lucenti, regulari angulari præditis, 5 in quoque mm., acie tenui, subintegra; hyphis ferrugineis 2-3 μ . cr.; cystidiis paucis, acuminatis, angustis, curvis v. sinuosis, basi bulbosis, obscure fulvis, 25-40 \times 7-10.

Hab. ad truncos Pini insularis, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (E. D. MERRILL).

21. **Polystictus subporiæformis** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII 1216

(1905) p. 121. — Pileo subresupinato, longitudinaliter decurrente, margine utrinque striiformiter libero, tenui coriaceo, sulcato-zonato, subcinereo-gilvescente, c. 20 cm. longo, 2-3 mm. lato, hymenio resupinato-adnato, alutaceo-sericeo, 3-4 cm. lato, poris rotundato-vel oblongo-angulatis, 0,3-0,7 mm. diam., acie integris; sporis ellipsoideis, utrinque obtusiusculis, longitudinaliter hyalino-sulcatis, flavidulo-fuscidulis, 7-8,5 \times 4-5; contextu fibroso, alutaceo.

Hab. ad lignum putre, Bipindi Kamerun, Africæ (ZENKER).

Polys. hypothecinus
Illk. VI, 263

22. **Polystictus Cryptomeriæ** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) 1217

p. 160. — Pileo tenui, coriaceo, subresupinato, effuso v. centro affixo, umbilicato, rotundato, plano, albido v. cinereo-hirsuto, sericeo, obsolete zonato, c. 3-5 cm. diam.; hymenio albido, plano; poris brevibus, rotundato-angulosis 300-400 μ . diam.; sporis globosis, flavidulis, verrucosis, 5,5-6,5 μ . diam.

Hab. in trunco *Cryptomeriæ japonicæ*, Boshu Japoniæ (IKENO).

23. **Polystictus alabamensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus alaba-* 1218

mensis Murr., North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 19. — Pileo tenui, dense imbricato, sicco rigido, sessili, dimidiato, supra convexo, infra concavo, 2 \times 3-4 \times 0,1-0,2 cm.; superficie hirto-tomen-

tosa, isabellina, opaca, ad marginem zonis depressis 1-3 concentricis subglabris, ex avellaneo-fuligineis prædita, margine tenui, sterili, pallido, subplicato, integro vel undulato; contextu tenui, albo, fibroso; tubulis punctiformibus usque ad 1 mm. longis, intus e pallido albidis, ore angulari, mox irregulari præditis, 3-5 in quoque mm., acie tenui, integra, ex albo avellanea, quandoque in exemplaribus siccis umbrina; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad ligna emortua prope Auburn, Alabama, Amer. bor. (F. S. EARLE et C. F. BAKER).

24. **Polystictus concentricus** (Murrill) Sacc. et Trott, *Coriolus concentricus* Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) pag. 23. — Pileo tenui, firmo, sed parum flexibili, flabelliformi, concavo, postice depresso, basi angustata adhærente, $4 \times 6 \approx 0,2-0,4$ cm.; superficie glabra, indistincte zonata, sublucida, ex albo pallide isabellina, postice lateritia, zonis pallide lateritiis; margine tenui, lobato, concolori, glabro; contextu albo, fibroso, 1 mm. cr.; tubulis minutis, 2-3 mm. long., intus albis, ore regulari, angulari præditis, 3 in quoque mm., acie tenui firma, denticulata, ex albo pallide isabellina in exemplaribus siccis; sporis globosis, levibus, hyalinis, 3 μ . cr.; hyphis 5 μ . cr.

Hab. in ligno dejecto prope London Ontario, Amer. bor. (J. DEARNESS).

25. **Polystictus pallido-fulvellus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus pallidofulvellus* Murrill, North Amer. Fl. v. IX Pt. I (1907) p. 20; *Polyporus pallidocervinus* Mont., Cuba, p. 397, non Schw. (1832); *Polystictus pallidocervinus* (Schw.) Sacc. Syll. VI p. 120. — Pileo imbricato, sessili, decurrente, dimidiato, conchato, tenui, coriaceo, flexibili, 1-1,5 cm. alt., 2-3 cm. lat., 2 mm. cr., superficie isabellino, v. pallide fulvo, leviter virgato, fibris striatis, delicate tomentoso, azono; margine tenui, subintegro, sicco incurvato; contextu suberoso-fibroso, firmo, pallido, vix 1 mm. cr.; tubulis brevissimis, vix 1 mm., ore anguloso irregulari, flaccidis, 2-4 in quoque mm., acie tenui, dentato-lacerata et albido fulva; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad ligna putrescentia in insula Cuba.

26. **Polystictus Decorsei** (Har. et Pat.) Sacc. et Trott., *Coriolus Decorsei* Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. (1909) n. 2, p. 89. — Subsessilis, suborbicularis, postice infra adnatus v. dimidiatus, conchiformis, rigidus, 4-6 cm. latus, 3-4 mm. cr.; pileo supra appanato v. leniter depresso, minute velutino, lutescenti, zonis brunneis concentricis notato, margine plus vel minus ob-

1221 *Trametes*
angulata v.
zones Virginiae
VI, 199.

tuso, recto; hymenio convexo, ochraceo, poris rotundatis, dissepimentis integris, crassiusculis, tubulis brevibus; contextu floccoso concolori.

Hab. ad ligna, Baguirmi et ad Lacum Fittri, Congo Africae trop. — *C. lutescenti* affinis.

27. **Polystictus occidentalis** Kl. — Syll. VI p. 274 — var. **dædaliformis** Eichelb., Verh. Naturw. Ver. Hamburg, 3 Fge. XIV (1906) p. 54. — Hymenio omnino labyrintho, marginem versus tamen regulariter poroso. 1222

Hab. ad truncos, Bomole, Amani Afric. orient., promiscue cum typo.

28. **Polystictus delectans** (Murrill) Sacc. et Trott, *Coriolus delectans* 1223
Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. I (1907) pag. 20. — Pileo confluenti-effuso, subimbricato, late reflexo et expanso, e dimidiato reniformi, supra appanato v. convexo, infra concavo, tenui-molli et viscoso, flexibili, 2-4 × 3-6 × 0,1 cm.; superficie villosa-tomentosa, æqualiter albo-lactea, sulcis paucis concentricis indistinctis profunditate et latitudine variabilibus exarata; margine tenui, flaccido, integro v. undulato, raro lobato; contextu albo, molli, viscoso, usque ad 1 mm. cr.; tubulis punctiformibus, albis, usque ad 1 mm. long., ore anguloso-irregulari, 4-5 in 1 mm., mox lacerato, sed non irpiciformi, acie tenui, flaccida, lacerato-dentata, alba, in exemplaribus siccis straminea; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad truncos dejectos prope Alto Cedro, Cuba (F. S. EARLE et W. A. MURRILL).

29. **Polystictus effusus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Coriolus effusus* Murrill, Mycologia II (1910) p. 186. — Pileo tenui, flexibili, late confluenti, effuso, breviter reflexo, parte reflexa convexa, lateraliter elongata, ad 3-7 mm. producto; superficie minute tomentosa, alba v. pallide flava, præcipue ad marginem late sterili sulcatula, albo-lactea, undulata; contextu tenui, albo, membranaceo; hymenio irregulari sed variabili, albo v. leniter flavido; tubulis vere brevibus, ore circulari v. valde radiatim elongata, acie tenui, dein lacerato-dentata v. subirpiciformi; sporis levibus, hyalinis. 1224

Hab. ad lignum emortuum prope Chester Vale et Cockpit Country, Jamaica.

30. **Polystictus fulvo-umbrinus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Coriolus fulvo-umbrinus* 1225
Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) pag. 24. — Pileo lateraliter connato, semicampanulato, umbonato, tenui, subflexibili, 2 × 2-3 × 0,1 cm., confluendo magis expanso; superficie

strigoso-tomentosa, multizonata, subradiato-rugosa, inæquali, lateritio-fulva, zonis paullo obscurioribus; margine et parte juniore ex albo avellanea, hirsuta, zonata, sublobata, quandoque prolifera; contextu tenui, membranaceo, pallido; tubulis punctiformibus, intus albis, ore lato, hexagonali, irregulari præditis, 2-3 in quoque mm., acie ex integro lacerato-dentata, dentibus distincte spinulosis, ex albo umbrinis; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad lignum vetustum prope Havana, Cuba (F. S. EARLE).

31. **Polystictus hexagoniformis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus hexagoniformis* Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. 1 (1907) p. 20. 1226
 — Pileo resupinato, effuso, anguste reflexo, albo, leviter, stramineo in exemplaribus siccis, 0,3 × 2-4 × 0,1-0,2 cm.; superficie molli, fere glabra, azonata; margine tenui, irregulari, lobato, quandoque inflexo; contextu tenui, albo, fibroso; tubulis latis, brevibus, 1 mm. cir. profundis, ore hexagonali, omnino regulari, 1 mm. diam., acie tenui, integra v. minute dentata; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad ramos emortuos Pini prope Auburn, Alabama Amer. bor. (F. S. EARLE).

32. **Polystictus Hollickii** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus Hollickii* Murrill, Mycologia, II (1910) p. 187. 1227
 — Pileo imbricato, substipitato, disco scutelliformi v. tuberculo adnato, flabelliformi, e flexibili subrigido, pro genere sat crasso, 4-6 × 5-7 × 0,5 cm.; superficie leniter radiato-rugosa, multizonata, breviter concentricè sulcata, opaca, glabra, ex ochroleuco v. ochraceo pallida et pallide-avellaneo zonata; margine subacuto, integro, fertili concolori; contextu albo-lacteo, molli, suberoso, homoganeo, 2 mm. circ. cr.; tubulis intus et extus stramineis, dein arescendo isabellinis, 2-3 mm. long., suberosis, rigidis, ore regulari, subcirculari, lucenti præditis, 4-5 in quoque mm., acie tenui, integra; sporis hyalinis.

Hab. ad truncos, Union Hill prope Moneague, Jamaica.

33. **Polystictus hondurensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus hondurensis* Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. I (1907) p. 22. 1228
 — Pileo tenui, subflexibili, concavo-reniformi, sessili, 7 × 9 × 0,2-0,3 cm.; superficie radiato-rugosa, glabra, sublucida, ex albo pallide cinerea, lineis concentricis angustis, obscurioribus prædita; margine tenui, albo, lobato, in sicco inflexo; contextu tenui, albo, fibroso, usque ad 1 mm. cr.; tubulis 2-3 mm. long., minutis, intus ex albo pallide isabellinis, ore minuto, angulari, regulari, lucido prædita, 7-8 in quoque mm., acie tenui, dentata, ex albo obscure isabellina, fulva in exemplaribus siccis; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad lignum dejectum prope Punta Gorda, Honduras britann. Amer. bor. (MORT. E. PECK).

34. **Polystictus Lloydii** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus Lloydii* Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) pag. 23. — Pileo tenui, lateraliter connato, rigido, viscoso, e cuneato flabelliformi, applanato, subsessili, 2-3 \approx 3-4 \approx 0,2-0,4 cm.; superficie ex albo isabellina, scabra, subrugosa, zonis angustis, indistinctis, pallide-lateritiis signata; margine tenui, fertili, irregulari, lobato; contextu fibroso-molli albo, 1,5-2 mm. cr.; tubulis 1-1,5 mm. long., intus albis ore angulari, sublucido præditis, 4 in quoque mm., acie tenui, firma, dentata, ex albo isabellina; sporis globosis, levibus, hyalinis, 2 μ . diam.; hyphis 5 μ . cr.

Hab. ad lignum dejectum, Ohio, America boreal. (C. G. LLOYD).

35. **Polystictus ochrotinctellus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus ochrotinctellus* Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) pag. 22. — Pileo subimbricato, dimidiato vel flabelliformi, applanato vel concavo, e sessili, substipitato, rigido, plus minusve fragili, 2-6 \approx 3-9 \approx 0,2-0,5 cm.; superficie glabra, levi, sublucenti, ochroleuca zonis ochraceis donata; margine subtili chartaceo, fragili, distincte incurvato, integro vel undulato, raro lobato; contextu albolacteo, carnosoviscoso, subfriabili, 1-3 mm. cr.; tubulis 1-3 mm. long., minutis, intus ex albo ochroleucis, ore regulari, anguloso præditis, 4-5 in quoque mm., acie tenui, integra, ex albo ochracea v. isabellina; sporis globosis, levibus, hyalinis, 3 μ . cr.; hyphis 5 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos quercinos dejectos prope Biloxi, Mississippi, Amer. bor. (ESTH. S. EARLE).

36. **Polystictus parthenius** (Har. et Pat.) Sacc. et Trott., *Coriolus parthenius* Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. (1909) n. 2, p. 89. — Sessilis, subdimidiatus, conchiformis, 1-2 cm. diam., 1-2 mm. cr.; pileo coriaceo, applanato, albo, nitenti, minutissime velutino, longitudinaliter radiato-plicatulo, concentricè sulcatulo; hymenio albido-ochraceo; poris minutis, angulatis, integris, posticis laceratulis; tubulis albidis; contextu floccoso, candido.

Hab. ad ligna, Gabon, Dahomey, Dar Banda Africae trop. — *C. virgineo* valde affinis.

37. **Polystictus pertenuis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus pertenuis* Murrill, Mycologia, II (1910) pag. 187. — Pileo tenui, coriaceo, flexili, dimidiato, subplano, subsessili, 2-5 \approx 3 \approx 0,1-0,2 cm.; super-

ficie leniter concentrice sulcata, glabra, straminea; margine tenui, integro, sterili, cremeo; contextu albo, fibroso, membranaceo, hymenio ochraceo e latere viso, perpendiculariter subfulvo; tubulis punctiformibus, 1 mm. non attingentibus, ore regulari, anguloso, circ. 5 in quoque mm., acie tenui, integra; sporis levibus, hyalinis.

Hab. in ligno emortuo prope Chester Vale, Jamaica.

38. **Polystictus scutatus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus scutatus* 1233
Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 25. — Pileo scutato-concavo, centro adfixo, tenui subflexibili, coriaceo, 5-7 cm. lato, 1-2 mm. cr.; superficie villosa-tomentosa, ex isabellino atropurpurea v. nigra, lineis angustis concentricis signata; margine tenui, sterili, pallido, integro v. undulato, sicco inflexo; contextu tenui, carnosofibroso usque ad 1 mm. cr.; tubulis brevibus, albis, usque ad 1 mm. long., ore circulari præditis; 5 in quoque mm., acie satis crassa, firma, integra, ex albo decolorata, contusa purpureo-maculata; sporis ovoideis, levibus, hyalinis, $4 \approx 3$; hyphis 4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo in Mexico, Amer. bor. (C. L. SMITH).

39. **Polystictus subchartaceus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus sub-* 1234
chartaceus Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 24. — Pileo crasso, imbricato, sessili, dimidiato, concavo, rigido, glutinoso, 3-5 \approx 5-8 \approx 0,5-1,5 cm.; superficie sublevi, minute hirto-tomentosa, avellanea, indistincte multizonata; margine cremeo, villosa, tenui, sterili, dein contuso nigro; contextu albo, radiatim fibroso, zonato, firmo, 2-3 mm. cr.; tubulis minutis, 3-6 mm. longis, intus albis, ore e circulari angulari, sed mox irregulari præditis, 2-3 in quoque mm., acie initio crassa, integra, dein tenui, demum lacerato-dentata, ex albo avellanea, lucenti; sporis levibus, ovoideis, hyalinis, 5 μ . crassis; hyphis 6 μ . long.

Hab. in Populo tremuloide in La Plata Mountains, Colorado, Amer. bor. (BAKER, EARLE et TRACY).

40. **Polystictus sublilacinus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus sublila-* 1235
cinus Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. I (1907) pag. 25. — Pileo imbricato-confluente, cupuliformi, sessili, 0,5-1 cm. lato, usque ad 1 mm. cr., superficie dense villosa-tomentosa, parum distincte zonata, ex albo decolorata; margine tenui, concolori, in sicco inflexo, subundulato; contextu tenui, albo, membranaceo, subrigido; tubulis punctiformibus, usque ad 1 mm. long., ore ex anguloso irregulari, pilei proportionem majusculo, præditis, 3-5 in

quoque mm, acie pallide lilacina, e decolorato subavellanea, crassiuscula integra; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad cortices in Florida, Amer. bor. (C. G. LLOYD).

41. **Polystictus subectypus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus subectypus* Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. I (1907) p. 22. — Pileo imbricato, sessili, flabelliformi, sat tenui, e flexibili rigidiusculo, 4-7 \approx 6-10 \approx 0,2-0,4 cm.; superficie levi, glabra, ex albo pallida, dein fulvescenti, indistincte et concentrice sulcata, sublucida, minute multizonata; margine tenui, ex undulato lobato, in sicco quandoque inflexo; contextu albo, molliusculo, 2-3 mm. cr.; tubulis 1 mm. circ. longis, intus albis, ore lucenti, e circulari anguloso præditis, 6 in quoque mm., acie tenui, denticulata, alba, pallide ochracea in exemplaribus siccis, initio firma, dein flaccida et ætate collabescente; sporis ovoideis, levibus, hyalinis, angustis, 5-6 \approx 3-4; hyphis 3 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo in Florida, Amer. bor. (E. A. RAU).

42. **Polystictus substipitatus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus substipitatus* Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. I (1907) p. 22. — Pileo flabelliformi, stipite tuberculiformi prædito, applanato, tenui, flexibili, 4 \approx 5-7 \approx 0,2-0,3 cm.; superficie albo-lactea, opaca, glabra, præcipue postice subinæquali, antice zonulata; margine acuto, concolori, integro vel lobulato; contextu tenui, molli, subspongioso, albo-lacteo, 1 mm. cr.; tubulis 1-1,5 mm. longis, intus albis, firmis et elasticis, lucentibus, ore e circulari anguloso, regulari præditis, 7-8 in quoque mm., acie tenui, integra, alba, dein denticulata, in exemplaribus siccis pallide flavida; sporis globosis, levibus, hyalinis, 3-5 μ . cr.; hyphis 4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos prope Port Antonio, Jamaica, Amer. centr. (F. S. EARLE).

43. **Polystictus Chudæi** (Pat.) Sacc. et Trott., *Coriolus Chudæi* Patouill., Bull. Soc. Myc. Fr. t. XXIII (1907) p. 83. — Pileo dimidiato-sessili, postice decurrenti, convexo, semiorbiculari, 3-5 cm. longo 7-15 cm. lato, pallide fusco, strigoso-hirsuto, præcipue versus marginem brunneo-zonato, contextu tenui, coriaceo, fulvo; poris profundis, stipatis, angulosis, plumbeis, minutis, ore integro, acuto.

Hab. in ligno putri, Sudan Africae bor. (CHUDEAU).

44. **Polystictus Clemensiae** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus Clemensiae* Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 394. — Pileo subtenui, rigido, reniformi, conchato, basi substipitiformi compressa

Polyp. p. laccosus Jungk. VI, 250

vermicipes Berk. VI, 219

adhærenti $6 \approx 8 \approx 0,3$ cm., basi $2 \approx 2 \approx 0,3$ cm.; superficie glabra, zonata, radiatim griseo-sulcata, zonis angustis nitidulis; margine crassiusculo, fertili, rubro-brunneo in sicco subintegro; contextu albo-lacteo, fibroso, 1-1 mm. cr.; tubulis pallide ochraceis in sicco, 2 mm. long., ore concolori, e circulari anguloso præditis, in quoque mm. 4-5, acie firma, crassiuscula, integra; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, 3-4 μ . cr.; hyphis hyalinis, 3-4 μ . crassis; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo prope Champ Keithley, Lake Lamao, Mindanao, Ins. Philippin. Amer. centr. (MARY S. CLEMENS).

45. **Polystictus cuneatiformis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus cuneatiformis* Murr. Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIV (1907) p. 467. — Pileo flabelliformi, basi cuneato, tenui, sicco, flexibili, conchato, postice depresso, $2-3 \approx 3-4 \approx 0,1$ cm.; superficie glabra, zonata, levi, alba, zonis pallide avellaneis prædita, sæpe postice avellaneis; margine tenui, integro, in sicco leniter deflexo; contextu tenui, albo, fibroso, usque ad 1 mm. cr.; tubulis brevibus, albo-flavidis, 1 mm. long., ore minuto, e rotundo anguloso, regulari præditis, 6 in quoque mm., acie tenui, integra, ex albo pallide flavida; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis, $5-6 \approx 2,5-3$; hyphis hyalinis 3,5-5 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo, Lamao River, Luzon, Ins. Philippin. Amer. centr.

46. **Polystictus Currani** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus Currani* Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 395. — Pileo flabelliformi, tenui, parum flexibili, supra fere plano, subtus leniter concavo, tuberculo brevi pileo consimili affixo, $3-5 \approx 4-6 \approx 0,1-0,3$ cm.; superficie ex isabellino brunneola, glabra, nitida, multi-zonata, inter sulcos concentricos levi; margine acuto, integro v. undulato, pallido, zonula extima angusta, sterili; contextu ex albo pallido, homoganeo, molliusculo, 1-1,5 mm. cr.; tubulis ex albo pallide flavis, 1-2 mm. long., ore lucenti, circulari, regulari præditis, 5-6 in quoque mm., acie firma, integra, obtusa.

Hab. in ligno emortuo, Luzon, Ins. Philippin. Amer. centr.

47. **Polystictus perpusillus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus perpusillus* Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) pag. 396. — Pileo parvo, irregulari, lateraliter confluenti, dimidiato, late inserto, $0,5-1 \approx 1,5 \approx 0,2-0,3$ cm.; superficie albo-lactea, azona, glabra, non polita; margine concolori, integro, sterili, crassiusculo; contextu albo-lacteo, molliusculo, fibroso, 1 mm. crasso; tubulis ex albo fla-

vidulis, leniter tunicatis, 1 mm. longis v. ultra, ore lucenti, albescenti, regulari, anguloso præditis, 6 in quoque mm., acie tenui, dentata v. fimbriata.

Hab. in ligno emortuo prope Camp Keithley, Mindanao, Ins. Philippin. (MARY S. CLEMENS).

48. **Polystictus rubritinctus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus rubritinctus* Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) pag. 396. — 1243
Pileo parvo, leniter flexibili, ex obovato flabelliformi, postice plus minusve cuneato, utrinque applanato, demum lateraliter confluenti, 1,5-2 \approx 1,5-2,5 \approx 0,1-0,3 cm.; superficie minute zonata, levi, glabra, opaca, ochraceo-fulva rubro-brunneo maculata; margine abrupte acuto, fertili, concolori, integro, in sicco leniter inflexo; contextu pallido, suberoso-fibroso, 1 mm. v. minus crasso; tubulis pallidis, 2 mm. long., ore lucenti, ex ochraceo discolori, regulari, anguloso præditis, 4-5 in quoque mm., acie suberosa, tenui integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, 2,5-3 μ . diam.; hyphis hyalinis 3 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo, Mt. Halcon, Mindoro, Ins. Philippin. Amer. centr. (E. D. MURRILL).

49. **Polystictus subverniceps** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolus subverniceps* Murrill, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 397. — 1244
Pileo flabelliformi v. reniformi, subimbricato, postice incrassato, margine tenui et flexibili, anguste adhærente, parum irregulari et plicato, 2-4 \approx 4-7 \approx 0,1-0,6 cm.; superficie lucenti, glabra, multizonata, rubro-brunnea, nonnullis zonis isabellina, demum radiato-striata; margine tenui, subpallido, late sterili, inciso vel irregulari; contextu albo-lacteo, tenaci, 1-5 mm. cr.; tubulis brevibus, ex albo pallide flavidis, firmis, 1 mm. vix longis, ore lucenti, subcirculari, regulari præditis, 4-5 in quoque mm., acie subtenui, integra.

Hab. in ligno Cassiæ emortuæ, Rizal Province Luzon, Ins. Philippin. Amer. centr. (U. RAMOS).

50. **Polystictus velutinus** (Pers.) Fr. — Syll. VII, p. 258 — var. 1245
sulcatus Karst, *Coriolus sulcatus* Karst. ad int., Trav. Soc. Imper. Russede Geogr. VIII (1905) p. 61. — Pileo suberoso-coriaceo, utrinque plano, pallescenti, tomentello, profunde concentricè sulcato, subinde demum cinerescenti; poris rotundis, minutis, integris, pallescentibus.

Hab. ad corticem Populi prope Yamarooka Transbaicaliæ. — var. **nigrescens** Karst., Acta Soc. pro Fann. et Fl. fenn. XXVII,

4, (1905) pag. 5. (*Coriolus*). — Pileo suberoso-coriaceo, utrinque plano, strigoso-villosulo, sulcis concentricis zonato, nigrescenti, circ. 15 cm. lato; poris rotundis, obtusis, minutis æqualibus, albidis. — Ad truncos, Listvinitchnoje in regione Baicalensi Sibiriaë. (L. LÖNNBOHM).

51. **Polystictus barbatus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Cycloporellus barbatus* Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) p. 397. — 1246
Pileo reniformi, conchato, tenui, flexibili, demum imbricato, umbone brevi, adhærente, 3-4 \times 5-6 \times 0,05-0,1 cm.; superficie multizonata, breviter concentricè sulcata, e brunneolo obscure rubro-brunnea, pilis 2 mm. longis vel ultra, nigro-brunneis, adpressis; margine tenui, pallido, integro, anguste sterili; contextu tenui, fibroso, stratis corneis nigricantibus prædito; tubulis vix 1 mm. long., intus obscure fulvis, pruinosis, ore regulari, anguloso, lucenti, obscure brunneo præditis, 6-7 in quoque mm., acie integra, dein tenui; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, 2-3 μ . diam.; hyphis e melleo obscure fulvis, 3-5 μ . cr.; cystidiis nigro-brunneis, opacis, angustis, apice hyalinis, regularibus, subcopiosis, 15-25 \times 4.

Hab. in ligno emortuo, Zambales Prov. Luzon, Ins. Philippin. (H. M. CURRAN et M. L. MERRILL).

52. **Polystictus Bouei** (Pat.) Sacc., *Funalia Bouei* Pat., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIII (1907) p. 81. — 1247
Pileo dimidiato-sessili, confluenso usque ad 10-20 cm. long., coriaceo-molli, flexili, tenui, albo, undique fibris spongioso-sericeis, versus marginem strigulosus lacerato; ambitu acuto, tenui, inflexo; contextu concolori; poris mediis, angulosis, mollibus, ochraceis, dissepimentis acutis, integris; tubulis profundis, 2-3 mm. long.

Hab. in ligno emortuo, Guinea Africaë trop. (BOUÉ). — Intermedius inter *Funalia* et *Coriolus*.

53. **Polystictus philippinensis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Funalia philippinensis* Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) p. 469. — 1248
Pileo sessili, dimidiato, subimbricato, supra applanato, infra leniter convexo, 5-10 \times 10-15 \times 1-2 cm.; superficie ad marginem leniter zonata, obscure fulva, aculeis rigidis, ramosis, acutis v. obtusis, concoloribus signata, ætate evanescentibus; margine ochraceo, sterili, acuto, undulato; contextu ferrugineo, tenui, subsuberoso, 2-3 mm. cr.; tubulis 5-10 mm. long., intus ferrugineo-fulvis, ore e rotundato hexagonali, regulari, 1 mm. c. diam., acie tenui, firma, integra, initio alba dein obscure umbrina; sporis

*Dactylia
imponens* G.
f. hametridis
VI, 376

ovoideis, levibus, hyalinis 4,5-3,5; hyphis pallide ferrugineis, 2-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad ligna emortua, Lamao Riv., Ins. Philippin. Amer. centr. — Sec. Murrill l. c. ad *Funariam* Patouill. spectat etiam *Trametes versatilis* Berk.

54. **Polystictus mimicus** (Karst.) Sacc. et Trott., *Pycnoporus mimicus* Karst., Trav. Soc. Imper. Russe de Geogr. t. VIII (1905) p. 62. — Pileo coriaceo-suberoso, dimidiato, planiusculo, ruguloso, obsolete zonato, intus roseo, superficie pallidiori, non difformi v. imbricato, 6-12 cm. lato; poris rotundis, integris, minutis v. minimis, roseis. 1249

Hab. ad lignum vetustum (Pini?), prope Yamorovka Transbaicaliæ. — Ad *Polyst. cinnabarinum* (Jacq.) Fr. proxime accedit; colore vero cum *Fomite roseo* (Alb. et Schw.) convenit.

55. **Polystictus bataanensis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Corioloopsis bataanensis* Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) p. 393. — Pileo tenui, molli, leniter flexibili, subfragili, e dimidiato flabelliformi, interdum confluendo lateraliter extenso, anguste adhærenti, conchato, 3-4 \times 3-10 \times 0,3-0,5 cm.; superficie spongioso-tomentosa, anoderma, inæquali, sulcata, subzonata, e fulvo isabellina v. fuliginea; margine subtenui, undulato, isabellino; contextu 2-4 mm. cr., bistratoso, supra molli et obscure fulvo, prope tubulos duro et ochraceo, tubulis 1-2 mm. long., intus fulvis, ore lucenti, ex isabellino badio, distincte anguloso præditis, 3-4 in 1 mm., acie tenui, integra; sporis levibus, ovoideis, hyalinis, parum abundantibus, 5 \times 4; hyphis subhyalinis, fragilissimis; cystidiis nullis. 1250

Hab. in ligno emortuo, Mt. Mariveles, Luzon Ins. Philippin. Amer. centr. (E. B. COPELAND).

- Polyst. roseo-*
Alb. Engl. VI, 302
56. **Polystictus Copelandi** (Murr.) Sacc. et Trott., *Corioloopsis Copelandi* Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) p. 392. — Pileo subimbricato, dimidiato, sessili, lateraliter confluyente, leniter flexibili, conchato, 3-4 \times 5-6 \times 0,3-0,5 cm.; superficie glabra, tenuiter incrustata, brevissime sulcata, leniter in sicco radiato-rugosa, opaca, obscure brunnea v. nigra; margine crassiusculo, sterili, integro; contextu suberoso, obscure fulvo, 1-2 mm. cr.; tubulis 3-4 mm. longis, intus obscure brunneis, hymenio sordide brunneo, subnigrescenti, in sicco fragili, ore minuto leniter tunicato, anguloso præditis, 6-7 in quoque mm., acie ex integro leniter fimbriata. 1251

Hab. in ligno emortuo in Ins. Philippin. Amer. centr. (E. B. COPELAND).

57. **Polystictus fulvo-cinereus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Corioloopsis* 1252

fulvo-cinerea Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 76.

— Pileo coriaceo, e flexibili rigido, sessili, dimidiato, imbricato, lateraliter connato, distincte decurrenti, plerumque concavo, 2-4 \times 3-8 \times 0,2-0,4 cm.; superficie spurie zonata, concentrice striata v. sulcata, inæquali, distincte plicata, ex isabellino fulva v. cinerea, tomentosa, dein scabra; margine tenui, ex undulato lobato, tomentoso, ex isabellino fulvo; contextu membranaceo, fibroso, pallide umbrino, dein ætate obscuriori, 1-2 mm. cr.; tubulis brevibus, 1-2 mm. longis, intus e cinereo avellaneis, ore minuto, regulari, e circulari anguloso præditis, 3-4 in quoque mm., dein elongatis et irregularibus in exemplaribus majoribus, e murino umbrinis, acie tenui, firma, integra; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad ligna emortua, prope Santa Clara Cuba, Jamaica, Hispaniola, St. Croix, Barbados (F. S. EARLE et W. A. MURRILL).

58. **Polystictus nigro-cinereus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Corioloopsis* 1253

nigro-cinereus Murrill, North Americ. Fl., v. IX, Pt. II (1908)

pag. 77. — Pileo disco scutato vel parvo tuberculo adhærente, e dimidiato circulari, subimbricato, tenui, coriaceo, 2,3 \times 3-5 \times 0,2-0,5 cm.; superficie hispida, tomentosa, zonata, concentrice striata, e fuligineo nigra; margine pallido, tenui, integro vel undulato, velutino; contextu membranaceo, fibroso, ex umbrino fuligineo, 1-2 mm. cr.; tubulis brevibus, 1-2 mm. long., intus albedo-calceis, ore e circulari anguloso, dein plus minusve irregulari et inæquali præditis, 3 circ. in quoque mm., acie ex avellaneo cinerea, firma, subintegra, sat tenui; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad ligna vetusta in El Yungue, Cuba (L. M. UNDERWOOD et F. S. EARLE).

59. **Polystictus subglabrescens** (Murrill) Sacc. et Trott., *Corioloopsis* 1254

subglabrescens Murr., North Fl., Amer. v. IX, Pt. II (1908) p. 77.

— Pileo parum e flexibili rigido, quandoque diu reviviscenti, e dimidiato reniformi, anguste adhærente, decurrente, plerumque applanato, 4-6 \times 7-12 \times 0,4-1 cm.; superficie tomentosa, sulcata, ex umbrino badia v. nigrescenti, dein glabra et badio-nigra; margine pallido, integro, acuto; contextu tenui, suberoso, purpureo-umbrino, 2-3 mm. cr., dein supra indurato et nigro-incrustato; tubulis griseo-umbrinis, præsertim postice distincte stratosi, 2-4 mm. long., ore circulari, minuto regulari præditis, 5-6 in quoque mm., acie crassa, integra, firma, ex avellaneo isabellina pallide umbrina; sporis levibus, hyalinis.

Hab. in trunco emortuo, Pine Hill Cuba, Amer. bor. (L. M. UNDERWOOD et S. F. EARLE).

60. **Polystictus Taylori** (Murrill) Sacc. et Trott., *Corioloopsis Taylori* 1255
Murr. North Amer. Fl. v. IX, Pt. II (1908) p. 76. — Pileo suberoso, rigido, subimbricato, sessili, dimidiato, concavo, 3-5 × 4-7 × 0,5-1,5 cm.; superficie zonata, e rugoso hispida, scabra, dein aculeata, parum sulcata, minute radiato-striata, zonis marginalibus subnitidis et castaneis prædita, dein opaca et isabellino-fulva, vel tota multizonata et subnitida; margine tenui, pallido, tomentoso, integro v. undulato; contextu isabellino, disticte zonato, fere ligneo, 0,3-1 cm. cr.; tubulis angustis, 2-4 mm. long., circularibus, intus umbrinis, ore circulari, regulari, minuto præditis, 5-7 in quoque mm., e griseo-umbrino fuligineis, acie integra, dein satis tenui, sed firma et æquali; sporis levibus, hyalinis.

Hab. ad truncos emortuos prope Santjago Cuba, Porto Rico, St. John, Amer. bor. (NORM. TAYLOR).

- Hypox flavus*
Fl. VI, 486
61. **Polystictus melleo-flavus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Corioloopsis melleo-flava* Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) p. 393. — Pileo tenui, coriaceo, flexibili, late effuso, anguste adhærenti, e dimidiato subcirculari, 2-3 cm. longo, 1 mm. cr., confluendo plus minusve expanso; superficie dense tomentosa, sæpe anguste concentricè sulcata, melleo-flava, postice leniter brunnea; margine undulato v. irregulariter inciso v. lobato, tenui, sterili, pallido; contextu melleo-flavo, membranaceo; tubulis 1 vix mm. long., intus subalbis, ore pallide melleo, irregulari præditis, 2 circ. in quoque mm., acie incisa et plus minusve elongata, subirpiciformi.

Hab. in ligno emortuo, prope Zamboanga Mindanao, Ins. Philippin. Amer. centr. (H. N. WHITFORT et W. J. HUTCHINSON).

62. **Polystictus subcrocatus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Corioloopsis subcrocata* Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) p. 394. — Pileo coriaceo, membranaceo, flaccido, elastico, effuso-reflexo; parte reflexa dimidiata, applanata, 1-2 cm. longa, 1 mm. cr.; superficie pallide isabellina, subglabra, leniter zonata; margine tenui, concolori, integro, sterili; contextu pallide isabellino, molli, tenui; tubulis vix 1 mm. long., contextu pallidiori, ore regulari, subcirculari, lucenti præditis, 3 in quoque mm., acie firma, suberosa, integra.

Hab. ad truncos et ramos emortuos, Mt. Mariveles, Luzon ins. Philippin. Amer. centr. (E. D. MURRILL).

63. **Polystictus cubensis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Earliella cubensis* 1258

Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII (1904) p. 478. — Annuus, reviviscens, semiresupinatus, lateraliter expansus, conchato-imbri-catus, 3-6 \times 5-15 \times 0,2-0,5 cm.; superficie leniter incrustata, glabra, rugosa, zonata, postice obscure rubro-brunnea, zona albida marginali 3-12 mm. lata prædita; margine tumido, demum tenui, unduluto v. lobato, fertili; contextu albo, coriaceo, concentricè zonato; tubulis 2-3 mm. long., 2-4 in quoque mm., intus albis, ore profunde rubro-carneo, ad album nitante, dissepimentis primum crassis demum tenuibus et irregularibus; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis, 5-6 \times 3-4, cystidiis nullis.

Hab. in silvis humidis, Cuba, Jamaica, Mexico, Nicaragua.

PORIA Fr. — Syll. VI p. 292, IX p. 189, XI p. 93, XIV p. 188. XVI p. 159, XVII p. 131. *)

1. **Poria calcea** (Fr.) Bres., Fungi gall. in Ann. Mycol. VI (1908) 1259 p. 41. — *Polyporus vulgaris* β *calceus* Fr. Syst. Myc. I, p. 381; *Polyporus calceus* Schw. Syn. Am. n. 129? = *P. amaniensis* Henn., XXI, 325

Hab. ad truncos *Abietis pectinatæ* et ad ligna putrida *Alni* in Vogesis. — Sporæ hyalinæ, cylindræo-curvulæ 3-4 \times 1 $\frac{1}{2}$; basidia clavata 6-9 \times 4-5 μ .; hyphæ contextus pororum 2-3 μ . crassæ. — Species hæc quoad formam juxta ætatem præcipue variat. Diagnosis friesiana l. c. specimina juniora sistit; in bene evolutis tubuli usque ad 5 mm. longi et sæpe bulloso congesti. — *Poria lenis* Karst. cujus exemplaria originalia vidi mihi videtur forma huius speciei ad quam etiam *Polyporus bullosus* Weinm. vix dubiæ est ducendus (BRESADOLA, l. c.).

2. **Poria amaniensis** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) p. 199. 1260 *P. calcea*

— Membranacea, angulato-rotundata, dein confluens, ambitu cretaceo-byssino; poris rotundato angulatis planis, pallidis v. flavidulis, c. 200 μ diam.; sporis subglobosis, hyalinis 2,5-3 μ . diam. XXI, 325

Hab. ad cortices, Amani Usambara Africae. — *Poricæ reticulatæ* similis sed sporis satis diversa.

3. **Poria mucida** Pers. — Syll. VI p. 294. — var. **irpicoides** Jaap, 1261 Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. n. 4 (1908) p. 45. — Poris pro loco valde obliquis et laceratis vel regularibus rectisque, albis.

*) *Phylloporia parasitica* Murr. n. gen. et sp., Torreya (1904) p. 141, in foliis vivis *Bignoniæ*, Columbia, omittitur ab ipso Murr. in North Amer. Flora, Crypt., vol. IX part II.

Hab. in trunco putri humi dejecto prostrato quercino pr. Triglitz in Prignitz, Brandenburg. — Teste auctore forma sensim transit in *Irpicem deformem* et *I. paradoxum* sed typice videtur *Poria*.

4. ***Poria pseudosinuosa*** P. Henn., in Voeltzkow, *Reise Ostafrika* III 1262 (1908) p. 20, tab. II, fig. 9. — Late effusa, membranaceo-crustacea, ambitu albido-byssina; contextu albido-cinereo, tenui; hymenio cinereo-avellaneo; poris angulato-rotundatis, circ. 0,5-1 mm. diam. v. varie laceratis, sublamelloso-dentatis, cinereo-avellaneis, 1-2 mm. longis; sporis ellipsoideis, hyalinis, 6-7 \approx 5, levibus.

Hab. in cortice arborum in silvis Madagascar. — *P. sinuosæ* affinis sed colore et sporis distincta.

5. ***Poria crustacea*** (Jungh.) Bresad. *Ann. Mycol.* VIII (1910) p. 587. 1263 — Ita dicenda *Laschia crustacea* Jungh. — *Syll.* V p. 652 (*Hymenogramme*) his notis dignoscenda: poris tenuibus, sæpe obliquis, membranaceis non gelatinosis, nec cartilagineis; poris ex hyphis 2-4 μ . cr. contextis; cystidiis tunicatis 20-30 \approx 6-9, basi levibus, 4 μ . cr.; sporis (?) 4 \approx 3.

6. ***Poria chlorina*** Masee, *Kew Bull.*, n. 4 (1906) p. 93. — Latissime 1264 effusa, chlorina v. flavo-viridis, margine albido, subfimbriato, demum evanescenti; subiculo tenui, submembranaceo; poris majusculis, subangulatis, ore primo integro demum lacerato; sporis ovatis, hyalinis, 6 \approx 3-3,5.

Hab. in ligno emortuo in ins. Christmas Australiæ. — *Por. vaporariæ* Fr. proxima, a qua differt colore et pororum structura.

7. ***Poria Eichelbaumii*** P. Henn., *Engl. Jahrb.* XXXVIII (1905) 1265 p. 109. — Innato-crustacea, longe effusa, ambitu late byssino-albido, hymenio albido-fuscidulo; poris primo rotundato-angulatis, acie subintegra, albida, 0,5-0,8 mm. diam., dein oblonge laceratis; basidiis clavatis; sporis oblonge ellipsoideis, utrinque rotundatis, 10-13 \approx 5-6, hyalinis, levibus.

Hab. in ramis putridis, Amani Usambara, Africa. — *P. radulæ* Pers. proxima sed characteribus sporarum diversa.

8. ***Poria Voeltzkowii*** P. Henn. in Voeltzk., *Reise in Ostafrika* III 1266 (1908) p. 19. — Crustacea, longe effusa, contextu isabellino, c. 1 mm. crasso, margine sterili subcretaceo, angusto, interdum rimoso; hymenio subfumoso, poris curtis, rotundato-angulatis, 0,4-0,5 mm. diam., acie pallescente, rigidis, vix dentatis; sporis subglobosis v. ellipsoideis, hyalinis, 3-3,5 \approx 3.

Poria pseudosinuosa
VI, 355

Poria Eichelbaumii
Scoparia Fr.
VI, 355

Hab. ad ramos emortuos, Andranohinaly Madagascar — *P. supinæ* proxima.

9. ***Poria gilvescens*** Bres., Fung. gall. in Ann. Mycol. v. VI (1908) 1267 p. 40. *Poria sanguinolenta* Bres. Hymen. Hung. Km. p. 19, non Alb. et Schw., nec Bres. Fungi pol., p. 79. — Effusa, sanguinolenta, primitus alba, dein carnea, demum gilvescens, margine tomentoso, persistenter albo; subiculo vix manifesto; tubulis 1-4 mm. longis, mollibus, subcarnosis, ex hyphis 3 μ . circ. crassis, lutescentibus compositis; poris subrotundis, apice demum fimbriatis, sæpe obliquis, mediis, variantibus; sporis hyalinis, cylindraceuto-curvulis, $4\frac{1}{2}$ -5 \approx 2; basidiis clavatis, 12-16 \approx 4; hyphis subhymenialibus byalinis, $2\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ μ . crassis.

Hab. ad truncos Fagi et ad trabes quercinas in Vogesis. — *Poria sanguinolenta* Alb. et Schw. vix dubie species est collectiva ad quam æquo jure species omnes sanguinolentæ duci possunt. Ipse in Fungi polon. l. c. ad speciem in truncis abiegnis obviam, ex eo præcipue quod Alb. et Schw. primo truncos abietinos citant, eam limitavi, sed Clar. Prof. v. Höhnel in « Fragmente zur Mykologie » III, p. 11, e contra genuinam *Por. sanguinolentam* Alb. et Schw. in mea *Poria terrestri* Hymen. Hung. Km., p. 19 videt. Ego vero ei assentiri nequeo, nam *Poria terrestri* mea e loco natali, sæpe in suffocatis (fodina metallica) et e notis vegetativis cum diagnosi et figura *Poricæ terrestri* Pers. in Icon. pict., p. 35, tab. XIV, f. 1 optime convenit, ita ut si revera species nostra cum *Poria sanguinolenta* Alb. et Schw. est identica, tunc ista delenda et cum *Poria terrestri*, saltem sensu personiano, ceu synonyma jungenda esset. — Quoad modum vero crescendi a laudato Prof. v. Höhnel exhibitum observo quod idem quoque est apud *Poria sanguinolenta* prouti a nobis limitata fuit. (BRESADOLA, l. c.).

10. ***Poria cinereo-umbrina*** P. Henn. in Voeltzkow, Reise Ostafrika 1268 III (1908) p. 19, tab. II, fig. 8. — Longe effusa, sublignosa, contextu tenuissimo, ferrugineo, margine sterili angusto, tenui, ferrugineo; hymenio cinereo-umbrino, subsericeo; poris 2-3 mm. longis, minutis, rotundatis, æqualibus, acie integris; sporis ellipsoideis, fuscidulis, 3-3,5 \approx 3.

Hab. in ligno, Comoren Africæ. — *P. ferruginosæ* affinis.

11. ***Poria usambarensis*** P. Henn. in Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 1269 p. 108. — Resupinata, innata, primo rotundata, subiculo pallidioris subradiato, dein confluens, oblonge effusa, ferrugineo-cinna-

Poria ferruginea
(Sohn)
VI, 327

momea, contextu ferrugineo; poris rotundatis v. oblongis, sublacerato-variiformibus; setulis cinnamoneis, subulatis, 20-40 \approx 5-6, obtusis; sporis ellipsoideis, 5-6 \approx 3-3,5, hyalino-fuscidulis.

Hab. ad ramos dejectos, Amani Usambara, Africæ bor. — *Por. ferruginosæ* Schw. proxima sed setulis, sporis etc. bene distincta.

12. *Poria subobliqua* P. Henn. in Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 1270 p. 108. — Resupinato-innata, longe effusa, subiculo tenui pallidiori, coriacea, c. 1 mm. cr., fusco-ferruginea; poris rotundato-v. oblongo-angulatis v. laceratis, acie pallide fimbriatis; sporis ellipsoideis, 5-6 \approx 4-5, brunneis, levibus.

Hab. ad ramos dejectos, Amani Usambara Africæ. — *Poriæ obliquæ* Pers. proxima.

13. *Poria avellanea* Bres. in v. Höhnel, Ergebn. Bot. Exp. Südbras. 1271 1901 Denk. K. Akad. der Wissen. Wien, Bd. LXXXIII (1907) Extr. p. 14. — Late effusa, in sicco pallide alutacea vel lignicolor, margine similari; subiculo membranaceo, facile secedenti; tubulis obliquis (saltem in specimibus visis), 3-4 mm. longis; poris irregularibus, oblongis, mediis; basidiis clavatis, 15-18 \approx 3-4; sporis hyalinis, subglobosis, 1-guttulatis, 3 \approx 2,5-3; hyphis contextus tubulorum crasse tunicatis, 1,5-2 μ . cr.

Hab. in ligno putri, Bertiaga prope Santos Brasiliæ.

14. *Poria ferrugineo-velutina* P. Henn. Fungi Amaz. IV, in Hedw. 1272 44 (1905) p. 59. — Resupinato-effusa, crassa, rigida, margine repando, obtuso, ferruginea, velutino-setulosa, setulis subulatis, brunneis, simplicibus, usque ad 30 μ . long., 3-3,5 μ . cr.; poris punctiformibus, rotundatis, acie obtusis; contextu ferrugineo, sublignoso, circ. 1-2 mm. crasso.

Hab. ad ramos corticatos, Rio Jurná, Jurná-Miry, Brasilia.

15. *Poria Friesiana* Bres. Fung. Gall., Ann. Myc. v. VI (1908) p. 40. 1273 — *Polyporus contiguus* Fr. pr. p. non Pers., *Polyporus igniarius* var. *resupinatus* Aut. plur. — Late effusa; subiculo plus minusve manifesto, interdum obsoleto, ex hyphis 2-2 $\frac{1}{2}$ μ . crassis conflato, cinnamoneo vel cinnamoneo-umbrino; tubulis concoloribus, usque ad 7 mm. longis, contextu ex hyphis tenuibus, flavis, 2-4 $\frac{1}{2}$ μ ., commixtis cum aliis 3-4 μ . crassis, fulvis et crasse tunicatis; poris parvis, generatim obliquis, 4 circiter per 1 mm., concoloribus, demum canescentibus; sporis hyalinis vel rarius luteolis, e latere subcompressis, 6 $\frac{1}{2}$ -9 \approx 5 $\frac{1}{2}$ -7; setulis rarissimis, tenuibus, flavis, demum septatis, 35-50 \approx 6.

Hab. ad truncos stantes Salicis, Coryli et Fagi in Gal-

lia. — Perennans, stratosa, unicolor, in Salice cinnamomeo-umbrina, in Corylo et Fago nitide cinnamomea. — Species hæc mihi jam ex Italia, Gallia, Germania, Hungaria et Suecia cognita pro var. resupinata *Fomitis igniarii* Fr. habui sed omnibus inspectis eam specificè distinctam censeo sc. habitu constanter resupinato, etiamsi ad truncos stantes obvia, colore vividiore, sporis aliquantulo majoribus et setulis vix ab hyphis mollioribus diversis, nisi basi ventricosa præditis. In *Fomite igniario* Fr. color obscurior, receptaculum numquam basi resupinato-productum, sporæ magis depressæ et setulæ, tamen rarissimæ, parvæ, fulvæ uti in *Fom. fulvo* Scop. (BRESADOLA, l. c.).

16. **Poria floridana** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporella floridana* 1274
Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 14. — Late effusa, rigida, inseparabilis, 4-7 mm. crassa; margine determinato, angusto, initio ferrugineo, dein nigrescenti, contextu fere inconspicuo, brunneo; hymenio fere plano, distincte stratoso; tubulis 1,5-3 mm. longis in quoque strato, fulvis et intus albido-farctis, ore angulari præditis, 5-6 in quoque mm., umbrino-griseis, acie tenui, integra v. subinæquali; sporis globosis, levibus, ferrugineis, numerosis, 3-4 μ . longis; hyphis ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos dejectos in Florida Americæ borealis (W. W. CALKINS).

17. **Poria Langloisiana** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporella Lan-* 1275
gloisiana Murr., North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 13. — Effusa, inseparabilis, subellipsoidea, dein irregularis, rigida, 2-5 mm. cr.; margine tenui, adnato, irregulari, angusto, ferrugineo-fulvo; contextu tenui, fulvo; hymenio subinæquali, distincte stratoso; tubulis 2-3 mm. long. in quoque strato, fulvis et intus parce albido-farctis, ore circulari, regulari, initio ferrugineo, dein fulvo-ferrugineo, lucem refringenti præditis, 6 in quoque mm., acie mox crassa, integra; sporis subglobosis, levibus, ferrugineis, numerosis, 3,5-4,5 μ . cr.; hyphis ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos dejectos, prope St. Martinsville, Louisiana Amer. bor. (A. B. LANGLOIS).

18. **Poria Johnsoniana** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporella John-* 1276
soniana Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 13. — Effusa, inseparabilis, e suborbiculari irregulari, rigida, 5 mm. cr. v. ultra; margine tenui, flavo, ambitu anguste sterili, undulato, fere glabro; contextu distincto, 2-3 mm. cr., fulvo, suberoso; hymenio inæquali, stratoso; tubulis longitudine variabilibus, 1-4

mm. long. in quoque strato, intus avellaneo-umbrinis, in stratis senioribus fulvis, ore angulari præditis, 5-6 in quoque mm., acie tenui, integra v. minute dentata, initio flava, dein lutea, demum umbrina; sporis globosis, levibus, brunneis, 3-4 μ . cr.; hyphis ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos putrescentes, Ann Arbor Michigan, Amer. bor. (L. N. JOHNSON).

19. **Poria melleopora** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporella melleopora* Murrill North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 13. — Effusa, inseparabilis, irregularis, rigida, 3-5 mm. crassa; margine tenui, undulato, parum elevato, minute tomentoso, flavo; contextu inconspicuo, fulvo; hymenio inæquali, mox distincte stratoso; tubulis 2-4 mm. long. in quoque strato, intus fulvis, ore circulari, fere regulari præditis, 5-6 in quoque mm., initio e flavo melleis, dein umbrinis, acie crassa, integra; sporis globosis, tenuiter tunicatis, levibus, pallide ferrugineis, numerosis, 3-4 μ . diam.; hyphis ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos emortuos Salicis prope New Orleans, Louisiana, Amer. bor. (A. B. LANGLOIS).

20. **Poria Demetronis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporella Demetronis* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 12. — Effusa, inseparabilis; margine determinato, undulato, libero, minute tomentoso, ferrugineo; contextu mox crasso, suberoso-fibroso, ferrugineo; hymenio fere plano, distincte 2-3-stratoso, 4-7 mm. cr., initio fulvo, dein castaneo-fuligineo; tubulis 2-4 mm. long. in quoque strato, albido-farctis, stratis senioribus isabellinis, recentioribus intus avellaneis, ore minuto, circulari præditis, 6-7 in quoque mm., acie mox crassa, integra; sporis subglobosis, levibus, brunneis, 3-4 μ . long.; hyphis ferrugineis; cystidiis fulvis, cuspidatis, ventricosis, 10-20 \times 5-7.

Hab. ad lignum emortuum dejectum, in Missouri Amer. bor. (H. U. DEMETRIO).

21. **Poria altocedronensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporella altocedronensis* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 12. — Late effusa, 1-2 cm. cr., inseparabilis; margine tomentoso, ferrugineo, irregulari, dein pallide purpureo; contextu tenui, fulvo, ferrugineo; hymenio convexo, levi distincte stratoso, sublucido, initio e ferrugineo fulvo dein fumoso vel atro-avellaneo; tubulis 2-3 mm. long. in quoque strato, dein fulvis, initio albido-farctis et avellaneis, ore minuto, punctiformi præditis, 6 in quoque mm.,

acie integra crassa; sporis globosis, levibus, brunneis, 5-6 μ . long., hyphis ferrugineis, 3-4 μ . cr.; cystidiis paucis, fulvis, conoideis, subventricosis, 15-25 μ . long.

Hab. ad truncos emortuos prope Alto Cedro, Cuba. (F. S. EARLE et W. A. MURRILL).

22. **Poria betulina** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporella betulina* 1280
Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 12. — Late effusa, inseparabilis, rigida, margine irregulari, initio minute tomentoso et fulvo, dein glabro, demum levi, brunneo v. nigro; contextu tenui, suberoso, fulvo; hymenio distincte et pluries stratoso, 1-3 cm. cr., plano vel parum convexo, umbrino, initio colorem mutanti et refringenti, dein castaneo; tubulis angustis, 2-3 mm. long. in quoque strato, partim mycelio albido farctis, ore subcirculari præditis, 5-6 in quoque mm., acie crassa, obtusa, integra; sporis ovoideis, levibus, fulvis, 4-5 μ . long.; hyphis fulvis, 3-4 μ . cr.; cystidiis fulvis, acuminatis, ventricosis, 10-30 μ . long.

Hab. ad truncos Betulæ in Boarstone Mountain, Piscataquis County, Maine, Amer. bor. (W. A. MURRILL).

23. **Poria Earleæ** (Murrill) Sacc. et Trotter, *Fomitoporia Earleæ* 1281
Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) pag. 9. — Effusa, subcircularis v. elongata et irregularis, inseparabilis, rigida, 4-8 mm. cr.; margine tenui, adnato, angusto, sterili, irregulari, e flavo ferrugineo; contextu tenui, e ferrugineo fulvo; hymenio convexo, plano v. undulato, luce refringenti e flavo-ferrugineo isabellino dein pallide-umbrino, indistincte stratoso; tubulis intus fulvis, mycelio pallide flavido farctis, quoque strato 2-3 μ . longis, ore subcirculari præditis, 5-6 in quoque mm., acie subincrassata, integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, copiosis, 5-6 μ . cr.; hyphis ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. in ramis quercinis dejectis, prope Biloxi Mississippi, Amer. bor. (E. S. EARLE).

24. **Poria prunicola** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia prunicola* 1282
Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. I (1907) p. 9. — Late effusa, plura metra demum extensa, inseparabili, rigida, 3-6 mm. cr.; margine tenui, adnato, determinato, raro secedenti, subglabro, sterili, e luteo fulvo, integro v. undulato; contextu conspicuo, fulvo; hymenio æquali v. undulato, e ferrugineo atro-fulvo, dein albo-fulvo, dein albo-cinereo, demum vetustate umbrino-nigro; tubulis indistincte stratosi, albo-farctis, intus atro-fulvis, quoque strato 1-2 mm. longis, plerumque obliquis, ore circulari, minuto, puncti-

formi præditis, 6-7 in quoque mm., acie crassa, integra; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, 3,5-4,5 μ . diam.; hyphis ferrugineis, 3 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos dejectos Pruni pensylvanicæ prope Camp Sunday, Medford, Piscataquis County, Maine, America bor. (W. A. MURRILL).

25. **Poria tsugina** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia tsugina* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) pag. 9. — Late effusa, irregularis, adnata, denique secedens, rigida, solidiuscula, 5-10 mm. cr.; margine tenui, adnato, irregulari, ambitu anguste sterili, fulvo-ferrugineo, minute tomentoso; contextu vere conspicuo, ferrugineo, piloso; hymenio plano v. concavo, subinæquali, e ferrugineo subfuliginoso, pruina grisea suffuso; tubulis indistincte stratosi, quoque strato 2-4 mm. longis, parce albido-farctis, intus ferrugineis, ore circulari præditis, 4-5 in quoque mm., acie crassa, integra; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, 6-8 μ . diam.; hyphis ferrugineis, 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis. 1283

Hab. ad truncos emortuos Tsugæ, prope Hebron, New Hampshire, Amer. bor. (PERCY WILSON).

26. **Poria Maxoni** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia Maxoni* Murrill, North Amer. Fl., IX, Pt. I (1907) p. 11. — Effusa, inseparabilis, angusta, rigida, lignea, 5-8 cm. long., 5 mm. cr., plerumque in rimis corticalibus sita; margine tenui, adnato, irregulari, late sterili, minute tomentoso, ferrugineo; contextu conspicuo, fulvo; hymenio distincte sed inæqualiter stratoso, lucenti, secundum lucis colorem mutante ex isabellino-avellaneo umbrino; tubulis 1-2 mm. long. in quoque strato, albido-farctis, intus avellaneo-isabellinis, ore e subcirculari subangulari, regulari præditis, 6 in quoque mm., acie crassiuscula, firma, integra; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, numerosis, 5-6 μ . diam.; hyphis ferrugineis 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis. 1284

Hab. ad truncos prope Sancto Domingo de Van Maseo, Costa Rica Amer. centr. (W. R. MAXON).

27. **Poria jamaicensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia jamaicensis* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 11. — Effusa, ellipsoidea, dein secedens, rigida, 5 mm. cr.; margine tenui, adnato, ambitu anguste sterili, ex isabellino fulvo, fere glabro, subintegro; contextu inconspicuo, fulvo; hymenio convexo, æquali, ex isabellino umbrino, distincte 3-4 stratoso, stratis septo tenui fulvo separatis; tubulis in quoque strato 2 mm. long., al-

bido-farctis, intus avellaneo-umbrinis, ore circulari, irregulari præditis, 5-7 in quoque mm., acie tenui, undulata; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, copiosis, 7 μ . cr.; hyphis distincte ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. ad ramos emortuos prope Castleton, Jamaica, America centr. (F. S. EARLE).

28. **Poria flavomarginata** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia flavo-marginata* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 11. — Effusa, rigida, perennis, 5-7 \approx 10 \approx 0,3 cm.; margine tenui, flavo, dein nigro, demum separabili; contextu tenui, fulvo; tubulis distincte 2-3-stratosi, rigidis, regularibus, fere circularibus, quoque strato 1,5 mm. long., 7-8 in 1 mm., intus et extus umbrinis, stratis senioribus flavis, ore integro, mox pariete incrassato, lucenti, dein fuligineo; sporis levibus, globosis, hyalinis, tenuiter tunicatis, numerosis, 3-4 μ . cr.; hyphis ferrugineis; cystidiis paucis, ferrugineis, conoideis, acuminatis, 18 \approx 5.

Hab. ad truncos prope Alto Cedro, Cuba (F. S. EARLE et W. A. MURRILL).

29. **Poria ohiensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia ohiensis* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 11. — Late effusa, separabilis, irregularis, e coriaceo rigida, 5-10 mm. cr.; margine tenui, lato, adnato, indefinito, minute tomentoso, fulvo; contextu tenuissimo, fulvo, plano, æquali, sublucido, e fulvo subfuliginoso; hymenio plus minusve distincte 2-3-stratoso, stratis lamina tenui fulva distinctis; tubulis 2-4 cm. long. in quoque strato, intus umbrinis, nec albido-farctis, ore obliquo, subcirculari, acie mox crassa, integra, initio fulva, dein brunneola; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, 4 μ . cr.; hyphis pallide-ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos fabrefactos in Ohio, America boreal. (C. G. LLOYD).

30. **Poria obliquiformis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia obliquiformis* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) pag. 9. — Late effusa, inseparabilis, irregularis, rigida, spissa, 5-15 mm. crassa; margine tenui, adnato, angusto, ferrugineo-fulvo, minute tomentoso, subundulato; contextu inconspicuo, ferrugineo; hymenio convexo, undulato, e fulvo avellaneo, indistincte, stratoso; tubulis obliquis, quoque strato 2-4 mm. long., ferrugineo-fulvis quandoque intus albido-farctis, ore obliquo, subcirculari præditis; 4 in quoque mm., acie crassiuscula, integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, 6 μ . long.; hyphis ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos fabrefactos prope Cincinnati, Ohio Amer. bor.
(A. P. MORGAN).

31. **Poria cubensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia cubensis* 1289
Murrill, North Amer. Fl., v. IX Pt. I (1907) pag. 8. — Effusa, irregularis, inseparabilis, rigida, 1-2,5 cm. crassa; margine obtuso, elevato, substerili, glabro v. tomentosulo, undulato, cinereo-albido, dein nigrescente; contextu conspicuo, umbrino, suberoso; hymenio inæquali, colliculoso, plus minusve convexo, initio cinereo-albido, vetusto decolorato, distincte pluries stratoso; tubulis albido-farctis, in stratis senioribus umbrinis, in junioribus avellaneo-griseis, quoque strato 3 mm. circiter longo, ore circulari præditis, 4 in quoque mm., acie obtusa, rigida, integra; sporis globosis, ovoideis, levibus, hyalinis, 4-5 μ . long.; hyphis subhyalinis v. pallide brunneis, 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad caudices vetustos, prope Ciego de Avila, Cuba (EARLE et MURRILL).

32. **Poria dryophila** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia dryophila* 1290
Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) pag. 8. — Effusa, inseparabilis, rigida, irregulariter ellipsoidea, 2-4 cm. cr.; margine obtuso dein elevato, determinato, ferrugineo, levi, denique nigrescenti et rimoso; contextu ligneo, conspicuo, fulvo; hymenio plano v. convexo, sublevi, e ferrugineo griseo-umbrino; tubulis distincte et pluries stratosi, in quoque strato 4-8 mm. long., intus fulvis, in recentioribus stratis pallidioribus, ore subcirculari præditis, 6 in quoque mm., acie tenuiter incrassata, integra v. dentata; sporis sphaeroideis, levibus, crasse tunicatis, hyalinis, 7 μ diam.; hyphis ferrugineis, 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos vivos quercinos prope Back Bay, Mississippi, Amer. bor. (E. E. EARLE).

- 33 **Poria Langloisii** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia Langloisii* 1291
Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 9. — Effusa, irregularis, inseparabilis, rigida, 0,5-2 cm. cr.; margine tenui, adnato, subbyssosideo, sterili, luteo; contextu inconspicuo, fulvo; hymenio e plano convexo, plerumque inæquali, distincte pluries stratoso, poris initio luteis, dein fulvis, denique umbrinis et pruina fumosa textis; tubulis in quoque strato 2-3 mm. long., intus avellaneis et albido-farctis; stratis zona tenui, mycelica ferruginea divisis, ore anguloso præditis, 6 in quoque mm., acie tenui, integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, 5-6 μ . long.; hyphis luteolis; cystidiis nullis.

Hab. ad ligno dejecto prope St. Martinsville, Luisiana, Amer. bor. (A. B. LANGLOIS).

34. **Poria Lloydii** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia Lloydii* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 10. — Effusa, ellipsoidea v. irregularis, inseparabilis, rigida, ætate indurescens, in sicco rimosa, 5-8 mm. cr.; margine tenui, adnato, irregulari, sterili, angusto, ferrugineo, fere glabro; contextu inconspicuo, fulvo; hymenio subinæquali subconvexo, e ferrugineo fuligineo, opaco, distincte 2-4-stratoso; tubulis 2-4 mm. longis in quoque strato, intus umbrinis, ore angulari v. irregulari præditis, 5-6 in quoque mm., acie tenui, integra v. denticulata; sporis globosis, levibus, hyalinis, 5-6 μ . cr.; hyphis ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. in trunco Sassafras emortuo in Ohio, America bor. (C. G. LLOYD).

35. **Poria pereffusa** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia pereffusa* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) pag. 10. — Late effusa, immersa, rigida, perennis, 5-7 mm. crassa, sæpe inferiorem partem ramorum omnino tegens; margine angusto, fulvo, puberulo, dein tumido, subinflexo, demum glabro nigrescente; contextu fulvo, tenuissimo, in exemplaribus senioribus indistincto; tubulis regularibus, brunneis et lucentibus, 6-8 in quoque mm., pluries stratosis, stratis distinctis et 2 mm. circ. cr., ore subcirculari, plerumque obliquo, dein pallide cinereo, acie crassa, integra; sporis levibus, globosis, hyalinis, 4-5 μ . diam.; cystidiis 15-20 \approx 5.

Hab. ad truncos quercinos dejectos prope Ohio Pyle, Pennsylvania, Amer. bor. (W. A. MURRILL).

36. **Poria cinchonensis** (Murrill) Sacc. et Trott. — *Fomitoporia cinchonensis* Murrill, North Amer. Fl., IX, Pt. I (1907) p. 10. — Late effusa, irregularis, inseparabilis, rigida, medio duriuscula, 3-6 mm. cr.; margine tenui, adnato, determinato, lobato, ambitu omnino anguste sterili, initio flavo-luteo, dein brunneo-nigro; contextu conspicuo, ex atro-fulvo lateritio; hymenio convexo, subæquali, juniore melleo dein griseo-umbrino, indistincte 2-3-stratoso; tubulis angustis, albido-farctis, intus avellaneis, 1-2 mm. long. in quoque strato, ore punctiformi, circulari præditis, 5-6 in quoque mm., acie crassa, integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, 2-3 μ . diam.; hyphis ferrugineis; cystidiis atro-fulvis, cuspidatis, basi ventricosis, 12-18 \approx 3-5.

Hab. ad ligna dejecta prope Cinchona, Jamaica, Amer. centr. (F. S. EARLE).

37. **Poria undulata** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia undulata* 1295
Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 10. — Effusa, inseparabilis, irregularis, rigida, lignea, 2-5 mm. cr.; margine tenui, adnato, undulato, ambitu anguste sterili, e flavo ferrugineo, tomentoso; contextu conspicuo, ferrugineo-fulvo; hymenio undulato, plano v. concavo, avellaneo, quandoque ad marginem cinereo, 2-3-stratoso; tubulis obliquis, 1-1,5 mm. long. in quoque strato, albido-farctis, intus ex avellaneo umbrinis, ore angulari præditis, 3-4 in quoque mm., acie tenui, firma, integra, pallide carnea; sporis ovoideis, levibus, hyalinis, $5 \approx 4$; hyphis luteis 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos prope Punta Gorda, Honduras britannica, Amer. bor. (MORTON E. PECK).

38. **Poria laminata** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fomitoporia laminata* 1296
Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 11. — Late effusa, inseparabilis, oblongo-ellipsoidea v. irregularis, rigida, 0,5-1 mm. cr.; margine tenui, adnato, subintegro e ferrugineo fulvo, minute tomentoso, angusto; contextu tenui, inconspicuo, fulvo; hymenio æquali, convexo, lucido, distincte pluries stratoso, quoque strato ex lineis fulvis, angustis, regularibus distincto; tubulis 2-3 mm. long., plerumque obliquis, albido-farctis, intus griseo-umbrinis, ore subcirculari præditis, 5 in quoque mm., acie crassa, intacta, e ferrugineo fulva, dein ex avellaneo umbrina; sporis globosis, levibus, hyalinis, 5 μ . cr.; hyphis ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos Alni prope «Camp Sunday» Piscataquis County, Maine, Amer bor. (W. A. MURRILL).

39. **Poria Ludoviciana** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fuscoporella Ludoviciana* 1297
Murrill, North Amer. Flora, v. IX, Pt. I (1907) p. 6. — Late effusa, inseparabilis, irregularis, rigida, lignea, 1 mm. cr.; margine tenui, adnato, quandoque depresso, fertili, ferrugineo, undulato v. lobato; contextu inconspicuo e ferrugineo fulvo; hymenio plano, e ferrugineo griseo-umbrino; tubulis cylindræis, obliquis, strato 1 mm. c. crasso, intus umbrinis, 5 in quoque mm., ore regulari, acie tenui, rigida, integra, ob tubulos obliquos inæquali; sporis globosis, levibus, ferrugineis, copiosis, 4-5 μ . diam.; hyphis ferrugineis 4 μ . cr.; cystidiis copiosis, atro-fulvis, ventricosis, acuminatis, 10-15 \approx 6.

Hab. in ramis quercinis prope St. Martinsville, Louisiana, Amer. bor. (A. B. LANGLOIS).

40. **Poria castletonensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fuscoporella castle-* 1298

tonensis Murrill, Mycologia II (1910) p. 184. — Effusa, inseparabilis, irregularis, rigida, suberosa, 1-2 mm. cr.; margine tenui, adnato, irregulari, fertili, ferrugineo; contextu conspicuo, e ferrugineo fulvo; hymenio subinæquali, e pallide ferrugineo umbrino; tubulis griseo-umbrinis, brevibus, 1 mm. circ. long., circ. 7 in quoque mm., ore regulari, acie tenui, integra rigida; sporis ellipsoideis, levibus, pallide ferrugineis, 4-5 \times 2-3; cystidiis angustis, brevibus, acutis, ferrugineis, fulvis, copiosis, 20 μ . long. basi 4-5 μ . cr.; hyphis ferrugineis.

Hab. in ligno emortuo, Castleton Gardens, Jamaica.

41. **Poria coruscans** (Murrill) Sacc. et Trotter, *Fuscoporella coruscans* Murr. North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 7. — Effusa, rigida, annualis, 2-4 \times 5-8 \times 0,1-0,3 cm.; margine tenui, ferrugineo, dein nigricanti, denique crassiusculo atque elevato; contextu tenui, ferrugineo; hymenio levi, lucido pro luce e fulvo avellaneo, in sicco rimoso; tubulis obliquis, cylindraceutis, regularibus, rigidis, crassiuscule tunicatis, integris v. dentatis, 0,1-0,3 mm. long., 6 in quoque mm., intus ferrugineis, extus sub vitro carneis; sporis levibus, subglobosis, pallide ferrugineis, numerosis, 4-5 μ . diam.; hyphis pallide ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. in ligno dejecto prope Alto Cedro, Cuba. (EARLE et MURRILL).

42. **Poria costaricensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fuscoporella costaricensis* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) pag. 7. — Orbicularis dein irregularis, effusa, inseparabilis, rigida, fragilis, 1-2 mm. crassa; margine tenui, adnato, integro v. undulato, zona angusta, sterili, initio ferrugineo, fere glabro, denique nigrescente; contextu inconspicuo, e ferrugineo fulvo; hymenio fere plano, initio ferrugineo, dein umbrino, denique castaneo et rimoso; tubulis brevissimis, 1-2 mm. longis, intus umbrinis, ore punctiformi, regulari, subcirculari præditis 5-6, in quoque mm., acie tenui, rigida, integra; sporis subglobosis, levibus, ferrugineis, 5-6 μ .; hyphis pallide-ferrugineis, 3-4 μ . long.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos dejectos prope Santo Domingo de San Mateo, Costa Rica Amer. centr. (W. R. MAXON).

43. **Poria mexicana** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fuscoporella mexicana* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 7. — Irregulariter effusa, inseparabilis, e coriaceo rigida, 1 mm. crassa; margine irregulari, tenui, adnato, anguste sterili, ferrugineo; contextu inconspicuo, e ferrugineo fulvo; hymenio plano, initio ferrugineo

dein fuligineo rimoso; tubulis intus fulvis, ore regulari, e subcirculari anguloso, 5-6 in 1 mm., acie crassa integra; sporis subglobosis, levibus, ferrugineis, copiosis, 3-4 μ . cr.; hyphis ferrugineis; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emorto in Mexico, Amer. bor. (CH. L. SMITH).

44. **Poria Shaferi** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fuscoporella Shaferi* Murrill, North Amer. Fl. v. IX, Pt. I (1907) p. 7. — Late effusa, demum secedens, irregularis, e suberoso lignosa, in sicco rigida, 1 mm. cr.; margine ex undulato irregulari, tenui, adnato, ferrugineo, late sterili, demum rubescenti-brunneo; contextu conspicuo e ferrugineo fulvo; hymenio plano, æquali, griseo-umbrino, initio ferrugineo; tubulis brevibus, intus fulvis, obliquis, ore irregulari, parce excavato præditis, 6 in quoque mm., acie subtenui, inæquali, quandoque dentata, sub vitro carnea; sporis subglobosis, levibus, ferrugineis, numerosis, 3-4 μ . diam.; hyphis ferrugineis, 2-3 μ . cr.; cystidiis nullis. 1302

Hab. ad truncos decorticatos, Fergus Mountain, Moussemet, Amer. bor. (J. A. SHAFER).

45. **Poria juniperina** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fuscoporia juniperina* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) p. 4. — Effusa, inseparabilis, irregularis v. oblongo-ellipsoidea, e coriaceo rigida, 1,5 mm. cr.; margine tenui, adnato, late sterili, ferrugineo, irregulari, fere glabro; contextu inconspicuo, ferrugineo; hymenio nitidulo, demum opaco, e ferrugineo umbrino, planiusculo, demum rimoso; tubulis pallide umbrinis, ore regulari, circulari, minuto præditis, 7 in quoque mm., acie crassiuscula integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, numerosis, 5-6 μ . diam.; hyphis ferrugineo-fulvis, 3-4 cr.; cystidiis paucis, fulvis, acuminatis, basi ventricosis, 15-25 μ . 1303

Hab. ad truncos dejectos Juniperi virginianæ prope St. Martinsville, Louisiana, Amer. bor. (A. B. LANGLOIS).

46. **Poria nicaraguensis** (Murrill) Sacc. et Trott., *Fuscoporia nicaraguensis* Murrill, North Amer. Fl., v. IX, Pt. I (1907) pag. 6. — Late effusa, irregularis, inseparabilis, e coriaceo rigida, 2,5-4 mm. cr., margine adnato, satis incrassato, plus minusve determinato, lobato, tomentoso, ferrugineo, angusto, sterili, demum glabro et purpureo-brunneo; contextu conspicuo, ferrugineo, 1 mm. cr. v. ultra; hymenio glaberrimo, ex umbrino fumoso initio ferrugineo; tubulis intus umbrinis, albido-farctis, 1-2 mm. long., ore minuto, regulari, circulari præditis, 8-9 in quoque mm., acie crassiuscula, 1304

integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, 3 μ . cr., hyphis distincte ferrugineis; cystidiis numerosis, conoideis, acuminatis, ferrugineis, initio ventricosis, 25-35 \times 4-5.

Hab. ad truncos dejectos decorticatos prope Castillo, Nicaragua, Amer. bor. (CH. L. SMITH).

TRAMETES Fr. — Syll. VI p. 334, IX p. 194, XI p. 96, XIV p. 192 et 1136, XVI p. 163, XVII p. 136.

1. **Trametes albida** Lév. in Zollinger, *Plantae javanicæ* n. 2089, Bresadola, *Ann. Mycol.* V (1907) p. 239. — Pileo dimidiato, suberoso, sub lente puberulo, glabrescente, cinereo-alutaceo vel fumoso-pallido, hic illic ruguloso, 10-12 cm. lato, 7-8 cm. antice producto; tubulis pallidis, usque ad 1 cm. longis; poris concoloribus, demum luride alutaceis, minimis, $\frac{1}{5}$ mm. circiter, rotundatis vel oblongis; substantia suberoso-fibrosa, alba; sporis hyalinis, obovatis, 3 $\frac{1}{2}$ -4 \times 2 $\frac{1}{2}$ -3; hyphis contextus pororum 3-6 μ . crassis. 1305

Hab. ad truncus in ins. Java. — Hujus speciei diagnosis mihi ignota ideoque eam ad specimen exhibitum confeci (BRESADOLA l. c.).

2. **Trametes Merisma** Peck, *New York St. Mus. Bull.* 139 (1909) p. 31. — Pileo coriaceo, 2,5-7 cm. lato, fibroso, lento, vulgo in pileolos paucos profunde diviso, aspero-tuberculoso, colliculoso vel leviter prolifero, subfuscescente, albo vel albido, carne candida, margine obtuso, infra sterili; poris minutis, 0,3-0,5 mm. latis, a centro ad marginem fatiscentibus, albis, dissepimentis obtusis; stipe brevi v. nullo. 1306

Hab. ad truncos dejectos *Fagi grandifoliæ*, Fine St. Lawrence co. Amer. bor. — Contextus ut in *Polysticto* sed pororum characteribus vere *Trametes*.

3. **Trametes submurina** Murrill, *North Amer. Flora*, IX, Pt. I (1907) pag. 43. — Pileo late effuso, reflexo, imbricato, sessili, dimidiato, lateraliter connato, 1-2,5 \times 3-5 \times 0,5-1,5 cm.; superficie aspera, inæquali, anoderma, minute tomentosa, murina, quandoque fere alba; margine satis crasso, undulato, pallido; contextu albo, zonato, fibroso-suberoso, firmo, 5-8 mm. cr.; tubulis 1-2 mm. long., intus ex albo pallide flavidis, ore circulari, omnino regulari præditis, 4-5 in quoque mm., acie crassiuscula, integra, dein tenuiore et denticulata, ex albo decolorata; sporis levibus, hyalinis. 1307

Hab. ad ramos vetustos prope Hope Gardens, Jamaica, Amer. centr. (F. S. EARLE).

4. **Trametes robiniophila** Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) 1308
p. 42. — Pileo plus minusve imbricato, dimidiato, sessili, supra convexo, infra plano v. concavo, quandoque undulato, 6-8 \times 10-15 \times 2-4 cm.; superficie albo-lactea, azona, anoderma, minute pubescenti, dein glabra, inæquali, demum pallide flavida v. decolorata; margine crasso, plerumque obtuso, concolori, integro; contextu albo, molliusculo, succoso, odore fungino distincto, plerumque ab insectis excavato; tubulis angustis, 3-4 mm. long., opacis, intus ex albido decoloratis, ore minuto, e circulari subanguloso, acie crassa, integra, dein satis tenui, e sordide alba umbrina v. fuliginosa in exemplaribus siccis, trita isabellina; sporis globosis, ovoideis, levibus, hyalinis, 6-8 μ . cr.

Hab. ad truncos vivos Robinæ Pseudacaciæ prope Falls Church, Virginia, Amer. bor. (W. A. MURRILL).

5. **Trametes subacuta** Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 1309
p. 474. — Pileo lato, sicco, firmo, leniter flexibile, reniformi, sessili, applanato, 10-12 \times 20 \times 1-2 cm.; superficie anguste zonata, minute pubescente, dein postice glabra, tuberculosa, murina, supra avellanea v. umbrina; margine ochraceo, tenui, integro, fertili; contextu subsuberoso, parum molli, albo, 5-7 mm. cr.; tubulis 5 mm. long., intus ex albo pallidis, firmis, tenacibus, ore lucenti, regulari, rotundo præditis, 2-3 in quoque mm. ex albo pallide isabellinis, acie subtenui, integra; sporis e subgloboso ovoideis, levibus, hyalinis, 4-5 μ . long., hyphis hyalinis, 3-5 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ramis emortuis dejectis, Lamao River Luzon ins. Philippin. Amer. centr. (R. S. WILLIAMS).

6. **Trametes luzonensis** Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 1310
p. 474. — Pileo parvo, leteraliter connato, dimidiato, sessili, raro amplexicauli, conchato, 1-2 \times 1,5-3 \times 0,2-0,4 cm.; superficie æquali, anoderma, e minute tomentosa subglabra, ex albo pallide avellanea medulla nulla; margine acuto, integro, in sicco deflexo; contextu molliusculo, albo, 1-2 mm. cr.; tubulis intus albis, 1-2 mm. long., tenacibus, ore regulari, minuto, circulari præditis, 6 in quoque mm., acie ex albo leniter decolorata, parum crassa, integra; sporis levibus, hyalinis.

Hab. in ramis emortuis Mt. Mariveles Luzon ins. Philippin. in Amer. centrali (A. D. E. ELMER).

7. **Trametes lamaënsis** Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 1311
p. 474. — Pileo subcirculari, anguste adhærenti, utrinque convexo,

(= *Fomes Williamsii* Murr. XX, 289)

3-4 \times 3-4 \times 1 cm.; superficie minute pubescenti, anoderma, leniter zonata v. demum sulcata, alba v. pallide isabellina; margine crassiusculo, sterili, concolori, integro; contextu albo, subzonato, subsuberoso, 7 mm. cr.; tubulis firmis, tenacibus, pallidis, 2-3 mm. long., ore parum irregulari, e rotundato anguloso sublucenti, ex albo isabellino, præditis, 2-3 in quoque mm., acie crassiuscula, integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, 5-6 μ . cr.; hyphis hyalinis, 4-5 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ramis siccis dejectis, Lamao Riv., Luzon ins. Philippin. Amer. centr. (R. S. WILLIAMS).

8. **Trametes jamaicensis** Murrill, Mycologia II (1910) pag. 191. — 1312

Pileo lateraliter connato, effuso-reflexo, parte reflexa secta triangulari, supra convexo subtus concavo, suberoso, rigido, 1-1,5 \times 2-5 \times 0,5-0,8 cm.; superficie subinæquali, tomentosula, dein subglabra, ex albido decolorata, opaca, anoderma, azonata; margine subobtusa, integro, fertili, concolori; contextu homoganeo, molli-suberoso, albo, 2-3 mm. cr.; tubulis 2-5 mm. long., sat angustis, intus albis, 4 c. in quoque mm., ore subanguloso, lucenti, acie tenui, integra, rigida, ex albo leniter decolorata; sporis hyalinis; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo prope Blue Hole, Jamaica.

9. **Trametes cæspitosa** Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 1313

pag. 473. — Pileo dense imbricato, dimidiato, conchato, lateraliter connato, 1-2 \times 2-3,5 \times 0,2-0,3 cm.; superficie e pulveraceo subglabra, æquali, leniter subzonata, pallide avellanea, colore purpurascenti suffusa; margine subtenui, concolori, undulato, subdeflexo; contextu albo, fibroso, rigido, tenaci, 1-2 mm. cr.; tubulis ex albo pallidis, 1-1,5 mm. long., ore regulari, minuto, circulari, ex albo pallido, subcarneo præditis, 7-8 in quoque mm., acie subcrassa, firma tenaci, integra; sporis levibus, hyalinis ovoideis, numerosis, 7-7,5 \times 5-6; hyphis hyalinis, 5-6 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo Mt. Mariveles, Luzon ins. Philippin. Amer. centr. (A. D. E. ELMER).

10. **Trametes conglobata** Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) 1314

p. 405. — Pileo e lobis confertis imbricatis formato, rotundato, 4 \times 7 \times 5 cm.; lobis rigidis, supra convexis, infra planis, dimidiatis, 1-2 \times 1-4 \times 0,5-2 cm.; superficie inæquali opaca, sordide alba, subglabra, anoderma, azona; margine obtuso, undulato, concolori; contextu albo v. pallido, multizonato, 0,4-1,5 cm. cr.; tubulis 1 mm. circ. long., sordide albis, tenui-tunicatis, ore anguloso, parum irregulari præditis, 5-6 in quoque mm., acie integra v. un-

dulata; sporis ex ovoideo subglobosis, levibus, hyalinis 3-4 μ . long.; hyphis hyalinis 3 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo prope Camp Keithley, Mindanao ins. Philippin. Amer. centr. (MARY S. CLEMENS).

11. **Trametes decussata** Patouill. Bull. Soc. Myc. Fr. XXII (1906) 1315
pag. 49. — Pileo horizontali, 20 cm. lato, 15 cm. alto, suberoso, appanato, semi-orbiculari, concentrice sulcato, floccoso-levigato, sordide albo, antice plus minus umbrino, postice ochraceo, radiatim rugoso-tuberculoso, ad basim pulvinate, azono, grosse superficialiter reticulato-poroso, scutello lato semi-orbiculari inferne decurrenti adfixo, contextu floccoso, albo v. pallide ochraceo; poris subexiguis, nudo oculo vix conspicuis, angulato-rotundatis, æqualibus, alutaceis; dissepimentis integris, tenuibus, obtusis, postice longe decurrentibus.

Hab. ad truncos *Cocos nucifera*, Hao Polynesia (SEURAT).
— *Tram. Marchionica* Mont. affinis.

12. **Trametes glabra** (Lév.) Bresadola, Ann. Mycol. V (1907) p. 239, 1316
Hexagonia glabra Lév., Champ. Mus., p. 143. — Syll. VI, p. 364.
— *Sistotrema ochroleucum* Lév., l. c. p. 145!

Hab. ad truncos, Bombay Indiae. — Species hæc nullo modo ad *Hexagoniam* duci potest, sed hymenio multiformi *Trameti trabeæ*, *Dædaleæ quercinae*, *Lenziti tricolori* etc. similis, eam namque hymenio lamellato, poroso, poroso-dentato, poroso-lamellato etc. vidimus (BRESADOLA l. c.).

13. **Trametes insularis** Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) 1317
pag. 405. — Pileo sessili, dimidiato, imbricato, irregulari, postice incrassato, decurrenti, 2-4 \times 3-7 \times 1-1,5 cm.; superficie rugosa, anoderma, glabra, postice nigra, antice pallide rubro-brunnea; margine obtuso sterili, ochraceo, integro; contextu ex albo pallido, lignoso, zonato, 1,5-3 mm. cr.; tubulis postice 1 cm. long., marginem versus gradatim brevioribus, sectione subtriangularibus, contextu concoloribus, ore griseo-isabellino, subcirculari, præditis, 3 in quoque mm., acie crassa, firma, integra dein maturitate tenuiori; sporis subglobosis, levibus, hyalinis, 4-5 μ . long.; hyphis hyalinis, 3-4 μ .; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos *Pini insularis*, Benguet Prov. Luzon, ins. Philippin. Amer. centr. (E. D. MERRILL).

14. **Trametes Williamsi** Murr., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 1318
p. 475. — Pileo sessili, dimidiato, subimbricato, quandoque lateraliter connato, appanato, postice crassiori, 4-5 \times 4-7 \times 1 cm.; su-

perficie e minute tomentosa subglabra, leniter zonata, isabellina v. avellanea, sæpe partim murina, anoderna, leniter tuberculosa; margine crasso, sterili, integro, facile fissili; contextu suberoso, tenaci, subzonato, albo, 5-7 mm. cr.; tubulis pallidis, 5 mm. longis, tenacibus, firmis, ore circulari, regulari, pallido præditis, 2-3 in quoque mm., acie crassa, obtusa, integra; sporis globosis, levibus, hyalinis, 4-5 μ . cr.; hyphis hyalinis, 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos emortuos Pinorum, Santa Cruz, in sinu Davao, Mindanao, ins. Philippin. Amer. centr. (R. S. WILLIAMS).

15. **Trametes cyclophæa** Patouill., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXII (1906) 1319 p. 195. — Sessilis, dimidiata, semiorbicularis, 5 cm. lata, 6 mm. cr., supra plana, postice decurrens, tactu velutina sed oculo inermi glabra, plicato-rugulosa, concentrice sulcata, ochracea, zonis circularibus brunneis 4 mm. latis signata; margine recto, integro, obtuse rotundato; hymenio plano, ochraceo, partem totam inferiorem sæpe decurrentem obtegente, zona marginali sterili concolori circumdato; poris parvis, rotundatis v. angulosis, septis integris, crassis, acie obtusa; tubulis brevibus; trama sericea, zonata, ligneo-pallida.

Hab. ad truncos arborum gummiferarum, Oasis Sahariana Africae bor. (Mission GAUTIER). — *Polyst. lutescenti* et *Lenziti appllanatae* proxima.

16. **Trametes lignea** Murrill, North Amer. Flora, IX, Pt. I (1907) 1320 p. 44. — Pileo ungulato, dimidiato, sessili, lateraliter parce connato, subdecurrenti, 3 \times 6 \approx 3 cm.; superficie levi, anoderma, azona, glabra, ex albo isabellina; margine crasso, obtuso, integro, concolori; contextu homoganeo, ligneo, albo 2,5 cm. cr.; tubulis 5 mm. long., intus albis, ore anguloso, irregulari præditis, circiter 3 in quoque mm., acie sat tenui, integra, ex albo parum decolorata; sporis levibus, hyalinis.

Hab. in ligno emortuo Nicaragua Amer. centr. (E. L. SMITH). 1321

17. **Trametes subnivosa** Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 43. — Pileo imbricato, sessili, dimidiato, lateraliter connato, in sicco rigido, 3-5 \times 6-8 \approx 1 cm.; superficie e tomentosulo glabra, levi, anoderma, opaca, ex albo sordide alba, azona; margine tenui, irregulari, undulata, sterili, pallida; contextu zonato, e albo decolorato, fibroso-suberoso, firmo, 4-7 mm. cr.; tubulis 2-4 mm. long., intus albis, ore regulari, fere æquali præditis, 6 in quoque mm.,

acie tenui, subintegra, ex albo isabellina v. avellanea, lucenti, dein umbrina; sporis levibus, hyalinis.

Hab. in ligno emortuo dejecto in Louisiana, Amer. bor. (A. B. LANGLOIS).

18. **Trametes nigrescens** Bres. Ann. Mycol. III (1905) pag. 163. — 1322

Resupinato-effusa, superne margine crasso, pileiformi, 1 $\frac{1}{2}$ -4 cm. lato, 4-10 mm. crasso, glabro, ruguloso, fusco, zona alutacea vel rufo-carnea, dein unicolori cincto prædita; tubulis 4-6 mm. longis, pallido-alutaceis; poris angulatis, primitus albis, dein alutaceis, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mm. latis; contextu pilei lignicolori; sporis hyalinis, oblongis, uno latere subcompressis, 12-13 \times 4-5; hyphis contextus tubulorum 2 μ . crassis.

Hab. ad ramos Alni viridis in regione alpina Tiroliaë per annum. — Modo crescendi ad *Trametem scæpium* Berk. accedit, affinitate vero magis ad *Trametem stereoidem* Fr., ab utraque tamen bene distincta.

19. **Trametes atra** Patouill., Bull. Soc. Myc. France, XXII (1906) 1323

p. 49. — Pileo sessili, dimidiato, conchiformi, postice scutato-decurrenti, 6 cm. lato, 5 cm. longo, radiatim plicato-rugoso, glabro, vage concentricè sulcato, undique crustula rigida tenui atra vel atro-sanguinea tecto, margine acuto, integro, patenti; contextu tenui 2-3 mm. cr., lignoso-fibroso, pallido, ex hyphis tenacibus, 3-5 μ . cr. formato; tubulis brevibus, 1-2 mm., concoloribus, dissepimentis crassiusculis, rigidis, integris; poris minutissimis nudo oculo non visibilibus, zona marginali sterili nulla; hymenio pallide fusco.

Hab. ad truncos in insula Tahiti Polynesiaë (SEURAT).

20. **Trametes ochroleuca** (Berk.) Bres. in litt. ad Torr. — Syll. VI, 1324

145 *Polyp. ochroleucus* var. *lusitanica* Torrend in Bull. Soc. Port. Sc. Nat. IV (1910) p. 35. — A typo differt colore albo-flavido, nec nigricante et poris fere *Fomititis scutellati*.

Hab. in trunco vetusto et carioso Robiniaë Pseudacaciaë, Quinta Grande de Bellas Lusitaniaë.

21. **Trametes Sequojaë** Copeland, Ann. mycol. II (1904) p. 507. — 1325

Varia; nunc pusilla, sparsa, nunc pileis confluentibus, nunc late et indeterminate effusa, interdum pileo uno alterum subtegente; fere tota resupinata, suberosa, semper glabra, plus minus arcte adnata, cinereo-fusca; poris albidis, subrotundatis, inaequalibus, diametro vulgo vix 1 mm. æquantibus, ad 8 mm. altis v. in pileo obliquo altioribus.

Hab. ad lignum ustum Sequojæ sempervirentis, Woodside in California. — *Tram. affini* similis.

22. **Trametes nitidula** Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII (1907) p. 82. 1326 *Trametes pa*
 — Pileo dimidiato-sessili, 5-8 cm. lato, 4-5 cm. longo, suberoso-
 rigido, applanato, glaberrimo, subnitente, pallide fusco-ochraceo, *lucida*
 concentricè sulcato, contextu concolori, poris rotundis, minutis, sa-
 turatioribus, dissepimentis obtusis, integris. *VI, 343*

Hab. in ligno emortuo, Sudan Africæ bor. (CHUDEAU).

23. **Trametes subscutellata** Murrill, Mycologia II (1910) p. 191. — 1327
 Pileo e molli rigido, supra convexo infra concavo, verticaliter in-
 serto, circulari, 1 cm. lato, 2 mm. cr.; superficie sublevi, pellicula
 tenui prædita, ochracea, vertice e latericio castanea; margine sub-
 obtuso v. acuto, deflexo, albo, integro; contextu albo, firmo, fi-
 broso, homogæneo; tubulis 1 mm. long., intus et extus stramineis,
 4-5 in quoque mm., cre circulari-subanguloso, lucenti, acie obtusa
 integra; sporis hyalinis; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo inter Moneague et Union Hill, Jamaica.

24. **Trametes ostreiformis** (Berk.) Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, 1328
 XXXIV (1907) p. 474. — Ita vocandus est *Polyporus ostreæfor-*
mis Berk. — Syll. VI, p. 110 — teste Murrill.

25. **Trametes cuneata** (Murrill) Sacc. et Trott., *Coriolellus cuneatus* 1329
 Murrill North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 28. — Pileo tenui,
 carnosò, flexibili, e cuneato dimidiato, imbricato, distincte effuso,
 0,5-1,5 \approx 1,5-3 \approx 0,2-0,4 cm.; superficie valde villosa, postice stri-
 gosa, azona v. subzonata, ex albo isabellina; margine tenui tomen-
 toso; contextu ex albo pallide flavo, carnosò et fibroso-spongioso,
 1-3 mm. cr.; tubulis brevibus, ex albo decoloratis, variabilibus,
 usque ad 1 mm. long., ore ex anguloso irregulari præditis, 1-3 in
 quoque mm., acie tenui, carnosà, dentato-lacerata, dentibus de-
 mum oblitteratis; sporis globosis, levibus, hyalinis, 3-5 μ . cr.; hy-
 phis hyalinis, 3,5 μ . cr.

Hab. in cortice Sequojæ giganteæ in Columbia britannica
 Amer. bor. (JOHN MACOUN).

26. **Trametes Kusanoi** (Murrill) Sacc. et Trott, *Coriolellus Kusanoi* 1330
 Murrill, Mycologia I (1909) pag. 165. — Pileo parvo, dimidiato,
 sessili, lateraliter connato, late adhærenti, leniter decurrenti, 1,3-2
 cm. lato, 3-5 cm. longo, 0,2-0,5 cm. alto; superficie pallide isa-
 bellina, hinc inde brunneo-decolorata, glabra, minute sulcato zo-
 nata; margine tenui, acuto, integro, concolori, rigido, arescendo,
 non inflexo; contextu albo, tenuissimo, flexibili; tubulis intus con-

coloribus, postice c. 3 mm. long., ore parum obscuriore, anguloso, lato, radiatim elongato, c. 2 mm. long., 1 mm. latis, acie crassiuscula, rigida, integra; sporis hyalinis; hyphis hyalinis, 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in trunco *Cryptomeriæ japonica* emortuo prope Soma, Tokyo Japoniæ (S. KUSANO).

HEXAGONIA Fr. — Syll. VI p. 356, IX p. 198, XI p. 97, XIV p. 194, XVI p. 166, XVII p. 138 *).

1. **Hexagonia phæopora** Pat, Bull. Soc. Myc. France XXIII, (1907) 1331 p. 74. — Pileo sessili, dimidiato, semiorbiculari, 6-12 cm. diam., coriaceo, tenui, 1 mm. cr., margine recto, acuto et integro, antice albido, postice parum rubescente, zonis confertis, brunneis v. fulvis, distinctis signato, glaberrimo, ruguloso-radiato; hymenio obscure brunneo; alveolis angulosis, minutis, $\frac{1}{3}$ mm., parum profundis, intus concoloribus et glabris, sepimentibus obtusis integris; trama albida.

Hab ad ramos emortuos, Indo-Chinæ (EBERHARDT). — *Hex. tenui* et *H. polygrammæ* affinis.

2. **Hexagonia Pobeguini** Hariot, Bull. Soc. Myc. Fr. VIII (1892) 1332 p. 28. — Lloyd Synops. of Gen. *Hexagona* (1910) p. 17, fig. 295; Patouillard, Essais taxon. Hyménomyc. p. 90, fig. a-b. — Pileo dimidiato subreniformi, 8 cm. lato, suberoso margine acutiusculo, paullulum sinuato, postice 3 cm. cr., sulcatulo, zonato, zonis crebris discoloribus, albis, umbrinis et puberulis, aliis griseo-pallidis et nitentibus, radiatim scruposo; hymenio ferrugineo; carne crassiori rufo-lutescente, poris hexagonis v. polygonis 7-10 mm. latis, dissepimentis crassioribus, acie obtusa integerrima, intus (sub lente) pilosulis. (= *Hexagonia Stuhlmanni* Hung. XXI, 347)

Hab. ad truncos, Congo Africae trop. (POBEGUIN). — Adest in Museo Britannico sub nomine *Hex. Welwitschii*; adest quoque in Mus. Parisiensi, teste Lloyd l. c.

3. **Hexagonia Seurati** Pat., Bull. Soc. Myc. de France, XXII (1906) 1333 p. 48, tab. I. — Pileo pulvinateo, 6 cm. diam., sessili, postice decurrenti, antice producto, glabro v. tactu velutino, pallide alutaceo, margine rotundato obtusissimo, nec zonato nec sulcato; hy-

*) Cfr. LLOYD, Synopsis of the gen. *Hexagona*, Cincinnati, 1910, ubi complures species photographice expressæ habentur.

menio undique marginato; alveolis concoloribus, magnis, superficialibus, intus glabris, dissepimentis obtusis, integris; contextu suberoso, pallido, zonato, leviter ponderoso.

Hab. ad truncos arborum in ins. Rikitea Polynesiae (SEURAT).

4. **Hexagonia Stuhlmanni** Henn. in Engl. Pflanzenfam. I, 1** p. 184, 1334 *Hexag.*
f. 98, A-B. — Pileo suberoso, hemisphærico, initio molliter pilosulo, ochraceo, demum glabrescente, dense concentricè sulcato, zonis clarioribus sericeo-nitentibus, 5-11 cm. lato, 5-6 cm. longo, 1-2 cm. crasso; poris rotundato-hexagonis, 4-10 mm. latis, cinnamomeis, intus brunneo-setosis. = *Trametes Stuhlmanni* Hong, XI, 97. *Pobuquinii Harist, XXI, 346*

Hab. ad truncos in Africa orientali.

5. **Hexagonia niam-niamensis** Henn. in Engler Pflanzenfam. I, 1**, 1335 *Hexag.*
p. 184. — Pileo hemisphærico, tuberoso-ligneo, firmo, subreniformi, nitente, levigato, lignicolore, concentricè sulcato-zonato, margine acuto; poris rotundato-hexagonis, intus griseo-roseo pruinosis, obtusis, 1 cm. longis, 2-5 mm. latis. = *obovata Pat.*

Hab. ad caudices arborum in Africa centrali.

6. **Hexagonia resinosa** (Murr.) Lloyd, Synops. gen. Hexag. (1910) 1336
p. 17, fig. 294, *Favolus resinosus* Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) p. 398. — Pileo sessili, dimidiato, applanato, rigido, basi lata adhærente, 6 \approx 10 \approx 1-2 cm.; superficie anoderma, glabra, opaca, e brunneo nigra, plus minusve resinosa, prolifera, dein ætate incrustata; margine abrupte acuto, isabellino-carneo, undulato v. crasse inciso; contextu e suberoso indurato, brunneo-rubro, 2-3 mm. cr.; tubulis 1 cm. long., latis, intus brunneolis, ore ochraceo, subhexagonali, rigido, 1-2 mm. diam., margine radiatim elongato usque ad 4 mm., acie crassiuscula, integra; sporis e subgloboso ovoideis, levibus, hyalinis, 4-6 μ . long.; hyphis hyalinis, 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo, Rizal Prov. Luzon ins. Philippin. Amer. centr. (M. RAMOS).

7. **Hexagonia bicolor** Mc Alp. Proc. Linn. Soc. New S. Wales (1904) 1337
p. 123. — Pileo dimidiato, 3 cm. cr., solitario, ligneo, e flavido brunneo, senio fumoso v. fusco, glabro, zonis binis flava nigraque notato; poris rotundo-polygoniis, ad marginem curtis, postice longioribus, decurrentibus, cremeis, latiusculis, 2-3 mm.; sporis ellipsoideis, hyalinis, apiculatis, 12-16 \approx 7-8.

Hab. in ligno putri Eucalypti Woollsiannæ, Restdown N. S. W. Australiæ.

8. **Hexagonia Fioriana** Sacc. in Ann. mycol. (1910) p. 334. — Pileo 1338

effuso-reflexo e basi lata interdum decurrente, flabellato, coriaceo-membranaceo, rigido, applanato, glaberrimo, distincte radiatim sulcato et concentricè leviterque zonato, griseo-fusco subunicolori, extrorsum saturatiore, margine acutissimo exquisite et varie inciso-crenato; hymenio pallide alutaceo, alveolis æqualibus, e rotundo subhexagoniis, 0,7-1 mm. diam.

Hab. ad truncos putrescentes, Ghinda Baresa, alt. 900 m. (Hamasen) Erythræa, 27. 1. 1909. — Pilei solitarii v. 3-4 confluentes v. superimpositi, 2,5-4 cm. lat., 1,5-2 cm. alt., 1-1,5 mm. vix crassi, alveoli vix 1 mm. profundi; substantia pallide alutacea. — Affinis *Hexagoniæ polygrammæ* Mont., *H. Dybowskii* Pat. et imprimis *H. rigidæ* B. et Br., a qua postrema recedit margine distincte inciso-crenato, pilei superficie radiatim sulcata et alveolis majoribus. A Berkeleyo (Berk. et Br., List Brisb. Fungi, II, pag. 62, tab. XII, fig. 7 et 9) delineatur *H. rigidæ* forma alveolis majoribus et pilei margine eroso quæ ad nostram magis accedit.

9. **Hexagonia subtenuis** Berk. in Cooke, Austral. Fungi, p. 165 (ut 1339 var. *H. tenuis*), tab. IX, fig. 61; Lloyd, Synops. of the Gen. *Hexagona* (1910) p. 26. — Ab *H. tenui* differt alveolis subduplo latioribus, usque 2 mm. (Cooke), ferrugineis et tenuissime pubescentibus.

Hab. ad ramos, Queensland Australiæ (in Herb. Kewensi).

10. **Hexagonia bipindiensis** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 1340 p. 122, Lloyd Synops. of the gen. *Hexagona* (1910) p. 36, f. 327-328. — Pileo coriaceo, reniformi v. flabelliformi, convexo, brevissime discoideo-stipitato, lateritio-pubescenti, tessellato-verrucoso, opaco, 2,5-8 cm. diam., margine tenui, integro v. subrepando; hymenio pallido-lateritio gilvescente; poris rotundato-polyhedricis, c. 1,5-2 mm. diam., pallide pruinosis, acie rigida crenulata v. subdenticulata; sporis subglobosis v. ovoideis, hyalino-flavidulis, levibus, 3,5-4 ≈ 3-3,5. = *Hexag. variabilis* Lloyd)

Hab. ad ramos in silvis Bipindi, Kamerun Africæ (ZENKER). — *Hex. atrosanguineæ* P. Henn. affinis. — Teste Lloyd l. c. idem forte est, ac species cl. Henningsii, *Favolus velutinus* in herb. Patouillard.

11. **Hexagonia Boueana** Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII (1907) p. 80. 1341 — Pileo tenui, dimidiato, 3 cm. c. lato, postice decurrente papyraceo-flexibili, obscure brunneo, eleganter rufo-zonato, leniter rivuloso, minute velutino, margine integro, patenti, acuto, contextu

Favolus crenulatus, Lloyd
VI, 400

tenui, fusco; alveolis hexagonis, 1 mm. latis, mediis, superficialibus, intus setulosis, fuscis dein cinereis, ore integro.

Hab. ad ramos emortuos in Guinea Africæ trop. (BOUÉ). — *Hex. variegatæ* proxima differt statura minori, pileo tenuiori, alveolis majoribus.

12. **Hexagonia subrigida** (Murr.) Sacc. et Trott., *Favolus subrigidus* 1342

Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) pag. 398. — Pileo sessili, dimidiato, tenui, tenaci, leniter flexibili, 2-3 \approx 3-4 \approx 0,2-0,3 cm.; superficie minute tomentosa vel glabra, zonata, postice rubro-brunnea, antice isabellina, radiatim rugosa; margine tenui, late sterili, in sicco rubro-brunneo, subintegro; contextu pallide isabellino, spongioso-fibroso, 1-2 mm. cr.; tubulis regularibus hexagoniis, antice brevibus, postice 1 mm. long., albis, 2 in quoque mm., acie rigida, integra, primum crassa, dein ætate tenuiori.

Hab. in ligno emortuo, Tayabas Prov. Luzon Amer. centr. (H. M. CURRAN).

13. **Hexagonia elegans** Lloyd, Synops. of the Gen. *Hexagona* (1910) 1343

p. 9, fig. 284. — E rubescenti brunneo-nigricans, fibris appressis rigidis vestita et zonata; poris mediis glaucis, 5-6 in 1 cm., 6-8 mm. profundis.

Hab. loco non indicato. Extat exemplar in Mus. parisiensi. — Ab *Hex. aculeata* vere distincta.

14. **Hexagonia Henschallii** Lloyd, Synops. of the Gen. *Hexagona* 1344

(1910) p. 11, fig. 286. — Pileo tenui distincte zonato, rubescenti-brunneo, zonis nunc levibus nunc fibrillis paucis liberis præditis; poris latis, satis profundis, glaucis, sepimentis et forma subinde subirpicoidea.

Hab. in ins. Java; exemplar unicum in Museo Kewensi sub nomine *Hex. Henschallii* Berk., sed inedita. — Ab *Hex. apiaria* bene distincta.

15. **Hexagonia mirabilis** Lloyd, Synops. of the Gen. *Hexagona* (1910) 1345

p. 37, fig. 329. — Pileo albo, levi, tenui, crusta tenui tecto; contextu nullo; poris crustæ adnatis, 1-2 mm. profundis, rotundis v. hexagonalibus, albis, in singulo centim. 10-12.

Hab. in Samoa. — Viva est pure alba. Species ut videtur omnino distincta.

16. **Hexagonia nigro-cincta** Pat., Bull. Soc. Myc. de Fr. XXII (1906) 1346

p. 48, tab. II. — Pileo sessili, dimidiato, postice scutello suborbiculari decurrente, limbo crustaceo, fragili, atro, cincto adfixo, conchiformi, rigido, albido, glabro, nitido, sulcis numerosis antice

crebris exarato, margine fuscescente sinuato-plicato, contextu suberoso pallide ligneo; hymenio concavo, lignicolori, alveolis angulosis, plus minus concentricè dispositis vel transverse elongatis, intus albis, superficialibus, glaberrimis, ad marginem scutellumque deficientibus, dissepimentis crassis, integris, obtusis.

Hab. ad truncos, ins. Rikitea Polynesiæ (SEURAT).

DÆDALEA Pers. — Syll. IV p. 370, IX p. 199, XI p. 100, XVI p. 167, XVII p. 139.

1. **Dædalea isabellina** Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) 1347

p. 414. — Pileo tenui, suberoso, parum flexibili, sessili, dimidiato, supra applanato, subtus convexo, postice incrassato, 5 × 9 × 0,5-1,5 cm.; superficie glabra, antice minute multizonata, postice rugosa et verrucosa, parum radiato-rugosa, isabellina; margine tenui, undulato, subconcolori; contextu homogæneo, suberoso, isabellino, 1-2 mm. cr.; hymenio irregulari, postice poroso-dædaloide, ad marginem lamellato, foveolis subinde furcatis v. nonnullis acie crassioribus v. clausis; foveolis plerumque radiatis, 1-1,5 mm. latis, postice 1,3 cm. profundis, marginem versus sensim angustatis, acie integra v. undulata, nonnullis lacunculatis v. depresse dentatis; sporis ovoideis, levibus, hyalinis, copiosis, 5-6 × 3-4; hyphis leniter flavidis 3-4 μ. cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo prope Sablam, Luzon ins. Philippin. Amer. centr. (A. D. E. ELMER).

2. **Dædalea Kusanoi** Murrill, Mycologia I (1909) pag. 169. — Pileo 1348

sessili, dimidiato, supra applanato v. leniter convexo, subtus plano v. convexo, subimbricato, leniter decurrenti, 3-4 cm. lato, 5-6 cm. longo, 1,5-2 cm. alto; superficie leniter sulcato, subglabro, pallide isabellino; margine integro v. undulato, acuto, rigido, arescendo non inflexo, concolori; contextu albo v. subalbo, suberoso, homogæneo, 3-5 mm. crasso; tubulis labyrinthoideis, pallide isabellinis, postice c. 1 cm. long., sulcis 0,5-2 cm. long., 1-2 mm. latis, acie crassa, obtusa, integra, subinæquali; sporis e subgloboso ovoideis, levibus, hyalinis; hyphis hyalinis 4-6 μ. cr.; cystidiis nullis.

Hab. in trunco emortuo in Horto bot. Tokyo Jap. (S. KUSANO). 1349

3. **Dædalea juniperina** (Murrill) P. Syd. in Just's Bot. Jahrsb. (1905)

p. 281, Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. II (1908) p. 125, Agaricus juniperinus Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXII (1905) pag. 85. — Suberosa, sessilis, basi lata sæpe decurrenti adnata, e pilei imbricatis interdum lateraliter connatis, unguatis formata,

*Dædal.
isabellina VI, 370*

*Dædal.
juniperina
forma
VI, 370*

2-5 cm. long., 2-7 cm. lat., 1,5-3 cm. cr.; superficie irregulari, anodermea, tomentella, flavido-alba, demum cinerea, margine fertili, concolori, obtusiusculo; contextu subereo, albo, concentricè fasciato, 0,5-1 cm. cr.; alveolis latis labyrinthis, sæpius radiatim elongatis, 0,5-2 cm. long., 1-3 mm. lat., albidis, acie obtusa, sæpe in lacinias irpiciformes lacerata; sporis ovoideis, levibus, hyalinis, 5-6 \approx 3-4; hyphis 5-7 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. ad truncos ramosque putres Cædrelæ sp. (*Red Cedar*), Missouri et Kansas Amer. bor.

4. **Dædalea cinerea** Fr. — Syll. VI, p. 372. — var. **trametea** (Quélet) 1350
Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 540. — *Lenzites* Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XXX (1901) p. 496, tab. III, fig. 9. — Pileo dimidiato, 5-7 cm. lato, convexo, velutino, cinereo, margine albedo; carne alba, tenaci, zonis subcyaneis percursa; tubulis inæqualibus, albidis; poris polygoniis, 1-2 mm. lat., apice angulosis dein denticulato-fimbriatis, albis, dein griseis; sporis tereti-ellipsoideis, hyalinis.

Hab. ad caudices Populi, Lorraine (BESCH.).

5. **Dædalea subconfragosa** Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV 1351 *Dædal. Bull. Torr. Bot. Club, XXXV, 1351*
(1908) p. 415. — Pileo sessili, reniformi, tenui, flexibili, conchato, 6 \approx 11 \approx 0,3 cm.; superficie glabra, minute multizonata, pallide lignicolori; margine acuto, fertili concolori, integro v. undulato; contextu ochraceo, suberoso, vix 1 mm. cr.; tubulis intus et extus pallide lignicoloribus, 2-3 mm. long., tenacibus, ore radiatim elongato, latitudine variabili, 1-6 \approx 0,5-1 mm. acie tenui, undulata vel irregulariter dentata; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis, 5-6 \approx 3-4; hyphis hyalinis, 3-4 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in ligno emortuo Rizal Prov. Luzon ins. Philippin. Amer. centr. (F. W. FOXWORTHY).

6. **Dædalea suberosa** Masee, Kew Bull. (1906) n. 4 p. 94. — Pileo 1352
suberoso, dimidiato, suborbiculari, sessili, tenui, margine acuto interdum lobato, ochraceo, zonis concoloribus, glabriusculo, 4-6 cm. lato; poris in sinulos subcontortos v. lamellosos labyrinthiformes abeuntibus, acie obtusa; sporis ovatis, hyalinis, 5-6 \approx 3.

Hab. ad ligna in India austr. Asiæ (BUTLER). — *Dæd. tenui* Berk. proxima; a qua differt pileo glabriusculo, colori pallide ochraceo, sepimentis crassioribus et margine obtusioribus.

7. **Dædalea mutabilis** Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XXIV (1895) 1353
pag. 6, tab. VI, fig. 12. — Pileo sessili, conchoidi, 5-7 cm. lato, tenuiter flocculoso, dein levigato, fulvo, plus minus ochraceo vel

griseo-tincto, margine tenuato et fimbriatulo; carne tenui et levi, ochraceo-fulva, basi subcrocea; odore grato; poris minutis, 0,5 mm. diam., rotundis v. sinuosis, tenuibus, pruinosis, albo-cremeis, demum labyrinthoideis et in lamellas dichotomas concolores laceratis; sporis elliptico-elongatis, 10 μ . longis, hyalinis.

Hab. imbricata et sæpe prolifera ad caudices Carpini, Quercus, Populi in Gallia boreali. -- Hymenium senio lenzitoideum.

8. **Dædalea ? effusa** Speg., Anal. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) 1354

p. 274. — Latissime effusa, fere matrici innata, quandoque submembranacea arctissime adnata, in superficie glabra, hispidula vel reticulata, quandoque sub nodulis v. protuberantiis matricis abrupte pileifera; pileis a substrato parum distinctis, immarginatis, abrupte truncato-hymeniiferis plus minusve confluentibus v. imbricatis; lamellis postice reticulato-connexis, crassiusculis, obtusis, dissepimentis pro ratione tenuibus, intus extusque albis; sporis subnavicularibus, 6-7 \approx 3-4, grosse 1-guttulatis, hyalinis.

Hab. ad caudices vivos vetustos et cariosos Cordylines dracænoidis in horto municipii La Plata Argentinae. — Species abnormis, matricis ita adpressa et similis ut perdifficile perspicienda.

9. **Dædalea sulphurea** Quélet, Assoc. franç. Avanc. Sc. XXII (1893) 1355

pag. 4, tab. III, fig. 10 (extr.). — Pileo nullo; hymenio effuso, mycelio araneoso citrino cincto, 1-2 cm. lato, ex alveolis 1 mm. lat. et lamellulis dentatis, sinuosis, tomentosus, flavis formato; sporis pruniformi-fusoideis, 10-12 μ . long., hyalinis, subcitrinis; conidiis sphaericis, spinulosis, sulphureis, 10 μ . diam., in mycelio inpersis.

Hab. in interiore caudicum in humum fere mutatorum, præsertim Salicis, Pruni spinosæ etc. Jura Galliae. — *Poria* (Irpici) *chrysolomæ* et *Sistotremati foliicolæ* Lib. (in herb.) peraffinis.

10. **Dædalea polymorpha** Schulzer v. Müggenb., Œsterr. Bot. Ztschr. 1356

(1880) p. 144, tab. II. — Suberoso-coriacea, ex albido erubescens, radicata, radice præmorsa, lutea, sursum involuta, tomento rudi nigro-fusco; versiformis quod non a provecta ætate dependet; aut tuberiformis, undique porosa; aut pileata, pileis dimidiatis flabelliformibus, simplicibus aut pluribus connatis, hymenio anguste labyrinthiformi; interdum etiam difformis ramulos et stipulas incrustans.

Hab. ad terram et juxta truncos in Austria. — Fere absque du-

*Poria
Cordylinae
VI, 328*

bio est status evolutus *Ceriomyces terrestris* Schulz., Syll. VI, p. 386, ideoque non diversa a *Polyporo bienni* v. *sericello*.

11. **Dædalea Æsculi** (Schw.) Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. II 1357 (1908) p. 126. — Ita, teste Murrill, vocandus est *Boletus Æsculi-flavæ* Schw. Schr. Nat. Ges. Leipz. I, p. 96 (1822) seu *Polyporus Æsculi* (Schw.) Fr. — Syll. VI, pag. 118. — Secundum ipsum MURRILL l. c. huc spectarent: *Trametes incana* Berk.; *T. Berkeleyi* Cooke in Sacc. Syll. IX, p. 194; *Trametes lactea* Fr.; *Dædalea ambigua* Berk.; *Dædalea glaberrima* B. et Curt.; ? *Dædalea pallido-flava* Berk. Non negarem has species inter se valde affines esse posse; sed cur eas potius ut varietates non distinguit cl. MURRILL, qui auctor est tot specierum novarum?

BRESADOLIA Speg. — Syll. VI p. 388, XVII p. 140.

1. **Bresadolia caucasica** Schestunoff in P. Magnus, Hedw. vol. L (1910) 1358 p. 100, tab. II. — Pileo stipitato, excentrico, subreniformi, 50 cm. lato, 40 cm. longo, 12 cm. cr., supra excavato, margine tenuato, recto, sicco incurvo; trama carneo-coriacea, alba, sicca flavescens et odore Clavariarum prædita, cute in vivo rubiginosa, mucida, fusco-purpureo-squamulosa, centro ochracea, margine citrina; stipe excentrico, subcoriaceo, cum pileo homogæneo, solido 10 cm. long., 8 cm. cr., atro-fusco, subvelutino; hymenio poroso, irregulariter stratoso; poris acie erosis, ore oblongo, subradiantibus, 12 mm. profundis, 4 mm. long., 2 mm. lat., in sectione cereis vel griseo-ochraceis, inferne citrino-ochraceis; sporis cylindræo oblongis, 10-12 \approx 3-4 (propriis?).

Hab. ad radices Fagi in Caucaso boreali, unica vice. — Ut de binis anterioribus speciebus in Syll. observavi, etiam hæc verisimiliter est forma teratologica *Polypori* sp.

CERIOMYCES Corda — Syll. VI p. 385, IX p. 201, XIV p. 194, XVI p. 169, XVII p. 140.

1. **Ceriomyces pusillus** Sacc. Ann. Mycol. III (1908) p. 563, t. XXIV, 1359 fig. 1. — Globoso-clavatus, apice rotundatus, 8-10 mm. altus, subcoriaceus, sordide flavicans, intus albidus cavusque; capitulo 3 mm. diam. ob denticulos inæqualiter tereti-clavulatos, obtusos, creberrimos rugoso-asperato; gasterosporis fusoideis utrinque acutis, rectis 4 \approx 1,7, hyalinis, in substantia denticulorum nidulantibus; basidiis bacillaribus dense fasciculatis, 25-30 \approx 3, hyalinis.

Hab. ad truncos dejectos, in rimis corticis et lichenibus adnatis, Syll. fung. XXI (VII-1911)

in silvis Lyndonville N. Y 1908 (FAIRMAN). — Verisimiliter *Polyporeæ* v. *Hydnaceæ* cujusdam status gasterosporus.

2. **Ceratomyces ? pulchellus** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires, t. XIX 1360 (1909) p. 274. — Mycelio sulphureo (an heterogeneo?) grumose sparso; pileis e grumis mycelialibus hinc inde abrupte exsurgentibus, sæpius 3-5-cæspitosis, erectis, utrinque attenuatis breviterque pedicellatis apice acutis v. obtusis, 15-25 mm. long., 5-8 mm. cr., coriaceis, intus extusque albis, faretis; poris mediocribus v. denticulis lamellosis gyrosis, ubique (apice et ima basi exceptis) glabris, obsoletissime carneis vestitis; sporis subglobosis, 7-8 μ . diam., v. obsolete angulosis, crassiuscule tunicatis, hyalinis, lenissime subroseis.

Hab. ad radices languentes *Persicæ* vulgaris in hortis prope Quilmes Argentinae.

3. **Ceratomyces terrestris** Schulz. — Syll. VI, p. 386. — var. **clavulatus** (Boud.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 258. — *Ptychogaster* Boudier, Icon. mycol. III (Diagnosis adhuc desideratur).

CYCLOMYCES Kunze et Fr. — Syll. VI p. 389, XIV p. 195.

1. **Cyclomyces maderensis** Torrend, Brotéria, Ser. Bot. VIII (1909) 1362 p. 136, tab. XI, fig. 2 a. — Resupinatus, coriaceus, orbiculari-oblongatus, coriaceus, 8-12 cm. long., 6-7 cm. latus; lamellis concentricis, primitus numerosis, et sæpe inter se lateraliter unitis, et tunc hymenium in cellulas subquadratas 2-6 mm. lat. dividitibus, demum saltem in centro plus minusve liberis; pileo sessili, resupinato, ad substratum parte centrali adhærente, suberoso-coriaceo, pileo zonis concentricis lamellis respondentibus prædito; margine brevi, sublaccato; sporis hyalinis, sphaeroideis v. subovoideis, 4-5 \times 4, 1-ocellatis.

Hab. ad ramum emortuum *Viburni Tini* prope Funchal in ins. Madera (P. M. DA SILVEIRO).

FAVOLUS Fr. — Syll. VI p. 390, IX p. 202, XI p. 101, XIV p. 195, XVI p. 169, XVII p. 141. — *Hexagonia* Pollini, *Hexagona* Murrill, non Fr. nec auctorum.

1. **Favolus Eberhardti** Pat., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIII (1907) p. 77. 1363 — Pileo coriaceo, sessili, tenui, plano, postice attenuato, antice rotundato, nec zonato nec sulcato, rugoso-radiato, velutino-hispido, glabrescenti, albo dein rubescenti, margine acuto recto, integro v. inciso; poris albis, usque ad marginem approximatis, angulosis,

magnis 3-4 mm., 5-6 mm. profundis, septis tenuissimis, acutis, integris v. rarius denticulatis, parietibus prominentiis, albidis instructis, minutis et copiosis; trama coriacea, concolori.

Hab. in terra ad caudices, silva Djirin Indo-Chinæ (EBERHARDT). — Fungus 5-8 cm. diam., quandoque confluens.

2. **Favolus argentinensis** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 1364 (1909) p. 270. — Pileo hemisphærico 7 cm. diam., excentrice leniter depresso margine breviter involuto, integro, glabro, levi, carnosio, subtestaceo irregulariter grosseque maculis subpurpureis, squamas simulantibus, picto; stipite e centro lateraliter producto obclavato 5 cm. long., 1-2 cm. cr. ex albedo subpurpurascens; carne alba crassa compacta non coriacea, ubique continua, immutabili; hymenio e poris angulosis majusculis 5 mm. long., 1-2 mm. diam., ore denticulatis, dissepimentis crassiusculis, constituto, candido per stipitem decurrenti-extenuato; basidiis clavulatis, $30 \times 10-12$; sporis subcylindræis basi angulato-inæquilateralibus, $16-20 \times 6-8$, minute guttulatis, levibus, hyalinis.

Hab. ad rhizomata languida Cynaræ Cardunculi in pratis circa La Plata Argentinæ.

3. **Favolus subcaperatus** (Murr.) Sacc. et Trav., *Hexagonia subcaperata* 1365 Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 50. — Pileo flabelliformi, convexo, dein parum attenuato depresso, $4-6 \times 5-8 \times 0,3-0,5$ cm.; superficie distincte tomentosa, pallide ochracea, latiuscula maculata; margine abrupte acuto, integro, distincte brunneo et arescendo fortiter inflexo; contextu albo, tenui, opaco; tubulis decurrentibus, vegetis albis, in sicco decoloratis, 3-4 mm. long., ore lato et anguloso, $1-1,5 \times 2-2,5$ demum distincte radiatim confluentibus, arescendo contortis, acie tenui, lacerato-fimbriato; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis; stipite laterali, subtus subconoideo, in exemplaribus siccis pileo dilutiori, tomentosulo, 1 cm. long., 5 mm. cr., supra umbilicato, tantum infra scutato.

Hab. ad truncos emortuos prope Port Antonio, Jamaica Amer. centr. (F. S. EARLE).

4. **Favolus pseudoprinceps** (Murr.) Sacc. et Trott., *Hexagona pseudo-princeps* 1366 Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) pag. 49. — Pileo reniformi, convexo, dein depresso, $3,5 \times 4,5 \times 0,5-1$ cm.; superficie glabra, delicate radiato-striata, in sicco decolorata; margine crasso, integro, arescendo fortiter inflexo; contextu carnosoviscoso, albo, opaco; tubulis decurrentibus, albis, in sicco decoloratis, 3-6 mm. long., 4-6-angulatis, ore 1×2 mm., quandoque

ætate confluentibus, acie tenui, integra v. denticulata; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis; stipite excentrico v. laterali, concolori, glabro v. hispidulo, 5 mm. long., 7 mm. cr.

Hab. in ligno emortuo prope Carmelita, Porto Rico, Amer. bor. (F. S. EARLE).

5. **Favolus luzonensis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Hexagona luzonensis* 1367
Murrill, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) p. 401. — Pileo flabelliformi, postice angustato, $3 \approx 4 \approx 0,2-0,3$ cm.; superficie isabellina, dein arescendo griseo-tincta, glabra, radiato-striata, ad marginem tessellata, integra, opaca, arescendo inflexa; contextu molli, ex albo isabellino, postice 1 mm. cr., ad marginem tenui, subfragili; tubulis latis, decurrentibus, ex albo decoloratis, 1-2 mm. long., ore $1-2 \approx 1$ mm. acie tenui, subfimbriata; stipite laterali, brevi, crasso, albo, glabro, $5 \approx 5$ mm.

Hab. in ligno emortuo Bataon Prov. Luzon ins. Philippin. Amer. centr. (H. M. CURRAN).

6. **Favolus reniformis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Hexagona reniformis* 1368
Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 50. — Pileo reniformi, parum convexo, $2-4 \approx 2-4,5 \approx 0,2-0,4$ cm.; superficie dense tomentosa, ad marginem tessellata, pallida, arescendo flavo-brunnea; margine undulato, crassiusculo, integro; contextu carnosoviscoso, albo, parte membranacea translucenti; tubulis non decurrentibus, albis, dein arescendo flavido-brunneis, 1-2 mm. long., 4-6-angulatis, ore $1,5 \approx 2-2,5$ mm. acie integra; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis; stipite laterali, æquali, concolori v. clariori, tomentoso, 0,5-1 cm. longo, 2,5-5 mm. cr., supra non umbilicato.

Hab. ad ligna emortua, dejecta in Florida Amer. bor. (J. K. SMALL et P. WILSON).

7. **Favolus pertenuis** (Murr.) Sacc. et Trott., *Hexagona pertenuis* Murrill, Bull. Torr. Bot. Club. XXXV (1908) p. 401. — Pileo flabelliformi, postice cuneato, $2-3 \approx 1,5-2,5 \approx 0,05$ cm.; superficie alba, glabra, minute radiato-striata, margine tenui tessellato, translucido, undulato, raro dentato, ætate laciniato; contextu tenui, albo, parum elastico in sicco, sed facile fisso; tubulis decurrentibus, albis, dein ochraceis, brevibus, ore $0,5 \approx 0,25$ mm., acie tenui, leniter fimbriata; stipite brevi, 3 mm. longo, 1-7 mm. cr., laterali, cylindraceo, concolori supra umbilicato.

Hab. in ligno emortuo Mt. Malaraya, Luzon ins. Philippin. Amer. centr. (H. M. CURRAN et M. L. MERRILL).

8. **Favolus Maxoni** (Murr.) Sacc. et Trott., *Hexagona Maxoni* Murrill, 1370

North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 49. — Pileo irregulariter reniformi, applanato, 1-2 \approx 1,5-3 \approx 0,1 cm.; superficie glabra, tessellata, in sicco straminea; margine tenui, denticulato, ex undulato lobato; contextu carnos-viscoso, membranaceo, albo, opaco; tubulis breviter decurrentibus, pileo obscurioribus, carneis, 0,5-1,5 mm. long., 4-6-angulatis, ore 1,5 \approx 2,3 mm., ad marginem angustioribus, acie tenui, integra v. undulata; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis; stipite laterali, conoideo, concolori, glabro, 2-3 mm. longo, 1-2 mm. cr., supra non umbilicato.

Hab. ad ramos putres prope Secanquin, Guatemala (W. R. MAXON et R. H. HOY).

9. **Favolus subpurpurascens** (Murr.) Sacc. et Trott., *Hexagona subpurpurascens* Murrill, North Amer. Fl. IX, Pt. I (1907) p. 51. — 1371
Pileo subcirculari, convexo, centro depresso, 1-1,5 \approx 1-1,5 \approx 0,1-0,2 cm.; superficie rubro-brunnea areolis purpureis prædita, e subpruinoso glabra; margine tenui, integro, in sicco fortiter inflexo; contextu carnos-viscoso, membranaceo, albo, opaco; tubulis decurrentibus, albis, 1-1,5 mm. long., 4-6-angulatis, ore 1 \approx 1,5 mm. lata, acie tenui, integra; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis; stipite excentrico, parum conoideo, albo, 0,5-1 cm. longo, 1,5 mm. cr.

Hab. ad ramos emortuos prope Mooretown, Jamaica (Amer. bor. (F. S. EARLE)).

10. **Favolus auriculatus** (Pat.) Sacc. et Trott, *Pseudofavolus auriculatus* Patouill., Bull. Soc. Mycol. de Fr., XXIV (1908) pag. 4. — 1372
Pileo tenui e carnos-lento rigido, suborbiculari, lutescente, glabro, obsolete plicato-radiato (in sicco), azono, postice gibbo, lateraliter adfixo; margine recto, tenui, acuto, integro v. profunde lobato, luteo-fusco; stipite brevissimo, concolori, cylindraceo, basi orbiculariter peltato; subtus concavo, poris grandiusculis, brevibus, angulatis, fuscis, dissepimentis tenuibus, minute dentatis; basidiis clavatis; cystidiis nullis; contextu albido.

Hab. ad ramos emortuos Louisianæ (LANGLOIS).

11. **Favolus europæus** Fr. — Syll. VI, p. 392. — var. **infundibuliformis** Martin in Bull. Soc. bot. Genève (1904-1905) p. 126. — 1373
Pileo infundibuliformi.

Hab. ad ramos in Helvetia.

12. **Favolus spathulatus** (Jungh.) Bresad. in Ann. mycol. (1910) p. 587. 1374
— Ita dicenda *Laschia spathulata* Jungh. — Syll. V, p. 653 (*Hymenogramma*) cujus esset, teste Bresad., forma major *Favolus molluccensis* Mont.

LASCHIA Fr. — Syll. VI p. 404, IX p. 204, XI p. 103, XIV, p. 196, XVI p. 170, XVII p. 144.

1. **Laschia Eberhardti** Patouill., Bull. Soc. Mycol. Fr., XXV (1909) 1375 p. 8. — Pileo sessili, 3 cm. lato, pendulo, auriformi, gelatinosomolli, glabro, pallide aeruginoso, pellucido; contextu hyalino; hymenio concolori, poroso, ex 6-8 lamellis radiantibus, crassis, obtusis, ramosis, venoso-connexis formato; basidiis clavatis, 26-30 \times 6-8; cystidiis numerosis, subcylindræis, crasse tunicatis, 30-45 \times 12-15.

Hab. in frustulis Monocotyledonum, in silva Djirin, Annam (EBERHARDT).

2. **Laschia bispora** (Holt.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 1050. — 1376 *Favolaschia bispora* Holtermann, Mykol. Untersuch. pag. 105, tab. XI, fig. 5 (sine diagnosi). — Sessilis, ambitu subcirculari, applanata, gelatinosa, levis, uno latere fissa, alveolis amplis, subsuperficialibus; basidiis bisporis paliformibus, sterigmatibus brevibus; sporis ovoideis, 3-3,6 \times 1,5-2.

Hab. ad ramos in insula Java.

3. **Laschia javanica** (Holt.) Sacc. et Trott, *Favolaschia javanica* Holtermann, Mykol. Unters. pag. 106. — 1377 Pileo niveo, gelatinoso excentrice vel lateraliter breviter stipitato, ambitu subcirculari, glabro, margine primitus revoluta; hymenio reticulato, alveolis amplis continuis, polygoniis, subsuperficialibus; basidiis tetrasporis, brevibus; sporis ellipsoideo-globosis.

Hab. ad ligna putrescentia prope Buitenzorg Javæ.

4. **Laschia Holtermannii** (Henn.) Sacc. et Trott., *Favolaschia Holtermannii* Henn. ap. Holterm. Mykol. Unters. p. 106, t. XII a-c, 1378 *Favolus Holtermannii* (Henn.) Sacc. et Syd. XVI, pag. 170. — Pileo niveo, gelatinoso, excentrice brevissime stipitato, 2 cm. dm., orbiculari, levi, margine non revoluta, alveolis ampliusculis, transparentibus, subsuperficialibus, inter se distinctis; basidiis crassiusculis, tetrasporis; sporis subglobosis.

Hab. ad lignum vetustum, ad ramos putres prope Buitenzorg Javæ. — A *L. javanica* differt stipite breviora, alveolis distinctis et magis transparentibus.

5. **Laschia cucullata** (Jungh.) Bres. Ann. mycol. (1910) p. 587, *Merulius cucullatus* Jungh. Præm. fl. crypt. Jav. (1838) pag. 76. — 1379 Tremellosa, cinereo-gilva, pileis levibus, rotundatis, lateraliter affixis, junioribus cucullatis, dein dilatato-deflexis, plicis majoribus longitudinalibus subparallelis, minoribus intermediis venoso-anasto-

mosantibus, reticulatis; sporis hyalinis, subglobosis, vaculeolatis, 4-4,5 \times 3-3,5; basidiis clavatis, 22-24 \times 4-5, hyphis subhymenialibus, 1-1,5 μ . cr.

Hab. in trunco putrido in silvis Montis Patuha Javæ.

6. **Laschia candida** A. L. Smith in Gibbs, Contr. Fl. Fiji in Journ. 1380
Linn. Soc. (1909) p. 198, fig. 2 (p. 212). — Pileo reniformi, tenui, pellucido, plano, tremelloideo-gelatinoso, subfavoso-reticulato, lateraliter adnato, circ. 1-1,5 cm. lato; hymenio alveolis inæqualibus in series subradiantes dispositis; basidiis apice 2-sterigmaticis; sporis minutis subglobosis, hyalinis, 4-5 μ . diam.; cystidiis asperulis granula crystallina sparsa gerentibus, 30 μ . longis, supra insertionem 10 μ . latis.

Hab. ad ramos emortuos in silvis Nadasivatu 900 m. alt. ins. Fiji Ocean. Pacif.

7. **Laschia coccinea** W. G. Smith, Journ. of Botany (1875) p. 99, 1381
tab. 162, fig. 9-13 (Ex lapsu calami in Syll. VI, p. 509 sub nom. *Laschiæ gelatinosæ*). — Tota vivide cinnabarina; pileo membranaceo, bullato, gelatinoso; stipite laterali, gelatinoso, minute strigoso; poris amplis hexagonalibus, sepimentis gelatinosis.

Hab. in trunco *Encephalarti* sp. in calidario Mr BULL, in Chelsea Angliæ, ann. 1873. — A *Laschia Thwaitesii* pileo multo magis regulari recedit.

8. **Laschia crenulata** A. L. Smith in Gibbs Contr. Fl. Fiji in Journ. 1382
Linn. Soc. (1909) p. 198, fig. 1 (p. 212). — Pileis confertis, reniformibus, cartilagineo-gelatinosis, margine crenulatis, hyalinis, levibus, lateraliter adnatis, circ. 1-1,5 cm. latis; poris in series subregulares dispositis; basidiis apice 4-sterigmaticis; cystidiis nullis; sporis globosis, hyalinis, 5 μ . diam.

Hab. ad ramos emortuos in silvis Nadarivatu 900 m. alt. ins. Fiji Oceani Pacif.

9. **Laschia Cagnii** (Matt.) Sacc. et Trott., *Favolaschia Cagnii* Matti- 1383
rolo, Annali di Botan. VII (1908) p. 145; Il Ruvenzori (1909): Fungi p. 20, tab. III, fig. 5. — Pileo gelatinoso, membranaceo, verticaliter affixo, subreniformi vel suborbiculari, badio, superne levissime undulato, in sicco subpruinoso, verrucoso-tessellato, 3-4 usque ad 10 mm. et ultra diam.; margine repando crenato; stipite tereti, laterali v. sublaterali, 1 cm. et ultra long., alveolis hexagoniis v. rotundato-hexagoniis, 1-2 mm.; basidiis bisporis, clavatis, 20-30 \times 12; sporis ovatis, ellipsoideis, 7-9 \times 4-5.

Hab. in ramis emortuis in silvis inter Bihunga (1920 m.) et Nakitara (2652 m.) Africae austr. Julio 1906.

10. **Laschia Zenkerii** (P. Henn.) Sacc. et Trott., *Favolaschia Zenkeri* 1384
P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) p. 122. — Pileo gelatinoso-membranaceo, reniformi, convexo-plano, tessellato, levi, glabro, 3-7 mm. diam. pallide flavido, margine tenui, integro vel crenulato; stipite æquali, tereti, levi, glabro, flavidulo, 0,5-1,3 cm. longo, 0,5-0,8 mm. cr.; poris rotundato-pentagonis usque ad 1 mm. diam., flavidulis, acie integris; basidiis clavatis, 15-20 \times 4-5; sporis subglobosis, hyalino-flavidulis, 1-guttulatis, 4-5 μ . cr.

Hab. in ligno prope Bipindi, Kamerun Africae (ZENKER).

11. **Laschia gemma** v. Höhn., in *Ergeb. Bot. Exp. Südbras.* (1901) 1385
Eumyc. et Myx. in Denk. k. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. LXXXIII
(1907) Extr. p. 11. — Subrotunda, gregaria, resupinata, tenuiter et brevissime postice stipitata, alba, $\frac{1}{4}$ -1 mm. lata, membranacea, 3-9 poris angulosis c. 200 μ . diam., prædito; dissepimentis margine incrassatis; hymenio subconvexo, extus cellulis crebris, hyalinis, rotundatis v. ovoideis, 10-16 μ . latis, prædito; cystidiis nullis; sporis non visis.

Hab. ad ramos putres, Barra Mansa, Sao Paulo Brasiliæ. — *L. saccharinæ* proxima.

MERULIUS Hall. — Syll. VI p. 411, IX p. 205, XI p. 104, XIV p. 200, XVI p. 172, XVII p. 145.

1. **Merulius chlorinus** Patouill., *Bull. Soc. Mycol. de Fr.*, XXIV 1386
(1908) p. 5. — Adnatus, inseparabilis, totus resupinatus, orbicularis dein sinuosus, citrinus, virescens demum umbrino-olivaceus, 1-5 cm. latus; ambitu gossypino, albo, late expanso; poris angulosis, 300 \times 120, compositis, dissepimentis obtusis, crassis, subgelatinosis; sporis hyalinis, ovoideo-globosis, 3-4 \times 2,5-3.

Hab. in hymenio Polypori sp. vetusti, in Nova Caledonia (M. LE RAT).

2. **Merulius Pruni** Peck, *New York State Mus. Bull. n. 105* (1906) 1387
pag. 25. — Effusus, tenuis, a matrice separabilis, mollis, margine definito, albido v. pallido, subbyssino; hymenio plicato, poros angulosos v. irregulares formante, dissepimentis dentatis v. quandoque irpiciformibus, hymenio vegeto avellaneo, sicco obscuriore v. subcervino.

Hab. ad corticem Pruni pennsylvanicæ, Horicon Amer. bor. — Sterilis observatus.

3. **Merulius Pinorum** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 105 — Britzelm., 1388
Revis. Hymenomyc. (1909) p. 212. — Pileo mollis, plicis elongato-
rotundatis, villosis, erosis, stratu plicarum albido-rubro-flavo, pal-
lide rubido et rubro-cinnabarino tincto, margine reflexo-pileato
angusto, albo-piloso, ambitu etiam albo-piloso; sporis elongato-ro-
tundatis, breviter apiculatis, flavidis, 6-7 \times 4.

Hab. ad truncos Pinorum prope Augsburg Baviariæ. — *Mer. mollusco* affinis.

4. **Merulius Ulmi** Peck, New York State Mus. Bull. n. 105 (1906) 1389
pag. 26. — Effusus, tenuis, firmus, suborbicularis confluendo plus
minusve expansus, margine libero et subreflexo, pubescens, quan-
doque concentrice sulcatus, albus; hymenio initio albo v. albido
dein pallide cervino; poris orbicularibus v. oblongis, parvis, di-
stincte et amœne concentrice dispositis; sporis non visis.

Hab. ad ramos emortuos Ulmi americanæ, Vaugtins, Wa-
shington co. Americæ bor. (S. H. BURNHAM).

5. **Merulius domesticus** Falk., Ztschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh. 1390
LV (1907) et in A. Möller, Hausschwamm-Forsch. I (1907) p. 33
et 87 (sine diagnosi).

Hab. ad ligna fabrefacta et trabes, quos maxime vexat et de-
struit, in Germania alibique.

6. **Merulius silvester** Falck., Ztschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh. 1391
LV (1907) et in A. Möller, Hausschwamm-Forsch. I (1907) p. 33
et 81 (sine diagnosi).

Hab. ad ligna silvestria, quæ destruit in Germania etc. — A
M. domestico videtur differre temperiei gradibus diversis in quibus
uterque viget et moritur.

7. **Merulius sclerotiorum** A. Möller, Hausschwamm-Forsch. I (1907) 1392
p. 92 (sine diagnosi).

Hab. ad trabes quos tantum vexat in Germania etc. — Vide-
tur dignosci posse præsentia sclerotiorum seminis Sinapeos magni-
tudine quæ mycelio adhærenti ramoso innascuntur.

8. **Merulius albus** Raddi, Specie nuove pag. 351, tab. IV, fig. 13. 1393

Hab. ad radices Quercus Cerris pr. Trespiano. — Infun-
dibuliformis albus, extus cinereo-venosus, venis decurrentibus, sti-
pitate gracili cavo. Est species dubia, excludenda, verisimiliter ad
Craterellum spectans.

THELEPORUS Fr. — Syll. VI p. 421.

1. **Theleporus griseus** Rick, Broteria V (1906) pag. 15. — Effusus, 1394

resupinatus, membranaceus, griseo-pruinatus, tactu fuscescens, margine albo-lanoso; papillis rotundis v. ovalibus, depressis, centro hyalino-vitreo, nudo oculo vix conspicuo, inter se bene separatis; basidiis clavato-rectangularibus, circa 20 μ . longis, 5 μ . latis; sporis rotundis v. polygonalibus, coloratis, circ. 3-6 μ . diam.; sterigmatibus quaternis, usque ad 3 μ . longis.

Hab. ad truncum putrem, versus terram spectans, Rio Grande do Sul Brasiliæ.

SOLENIA Hoffm. — Syll. VI p. 424, IX p. 208, XI p. 106, XIV p. 201, XVI p. 172, XVII p. 146.

1. **Solenia nivea** Quéf. in Assoc. franç. Avanc. Sc. XXIV (1895) p. 6, 1395 t, VI, f. 15 (extr.). — Mycelio tenuissimo, hyalino; receptaculis tubulosis, 0,5-0,8 mm. alt., cylindræis, membranaceis, pruinoso-pubescentibus, niveis, oblique suspensis, teneris, facile evanidis; sporis ovoideo-sphæricis, 5-6 μ . diam., ocellatis, hyalinis.

Hab. in cortice putrescente Abietis in Jura helvetico. — Minutie et situ a *S. candida* differt. *Solenia Malbranchei*, ita e lapsu calami vocata ad t. III, fig. 30, Patouill. Hymen. d'Europ. — Syll. XX, p. 803 — est *Cyphella Malbranchei* Pat. — Syll. VI, p. 676.

2. **Solenia verticalis** Hoffm. Veget. Hercyn. subterr. (1811) p. 26, 1396 t. XV. — Elongato-teres, subobconica, verticalis, parallele disposita, glabra, candida orificio subcontracto-truncato, connivente; substantia tenuissima, sicca fragili, sed persistente.

Hab. in lignis corticibusque, putridis in Hercyniæ subterraneis. — Nudis oculis fere punctiformis. Valde affinis, nisi eadem ac *Solenia fasciculata* Pers. (1822).

3. **Solenia gracilis** Copeland, Ann. mycol., II (1904) pag. 508. — 1397 Sparsa; cupulis primo urceolatis, brevissime stipitatis, demum cylindræis, denique late sessilibus, sursum attenuatis, oribus incrassatis, integris, glabris, stramineis nitentibus, vel candidis et deorsum fuscescentibus, 0,5 mm. altis; sporis globosis, 7,5-8 μ . dm.

Hab. ad lignum putridum Alni, Seratoga Californiæ.

4. **Solenia pallido-cinerescens** P. Henn., in Voeltzkow Reise Ostafrika III (1908) p. 18, tab. II, fig. 4. — Gregaria v. sparsa, sessilis, subclavato-cylindræa, obliqua vel cupulata, albo-cinerescens v. fuscidula c. 200-300 \times 180-200, levis; sporis ellipsoideis, hyalinis, granulosis, 5,5-6 \times 4-4,5.

Hab. in ramis decorticatis, Fénérive Madagascar. — *Sol. fasciculatæ* et *S. candidæ* proxima, sed colore et sporis diversa.

5. **Solenia villosa** Fr. — Syll. VI, p. 425. — var. **subochracea** Speg., 1399 Ann. Mus. Nac. Buenos Aires t. XVII (1908) p. 115. — Cupulis subcylindræis, confertis, minutis albescentibus puberulis, pilis mollibus, cylindræis, 30-40 \times 4-5, simplicibus 2-3-septatis, levibus subhyalinis; basidiis clavulatis, 20 \times 5, sterigmate unico tenui elongatulo 10 \times 1 monosporo coronatis; sporis ex ellipsoideo subovatis utrinque obtusiusculis, 6 \times 3-4, levibus grosse 1-guttulatis e hyalino subchlorinis.

Hab. ad ramos emortuos putres Ilicis paraguayensis in silvis circa San Pedro Reip. Argentinae. — Var. **eximia**, inter *S. villosam* et *S. ochraceam* media. Cum var. *subochracea*.

Fam. 3. Hydnaceæ *)

HYDNUM L. — Syll. VI p. 430, IX p. 208, XI p. 106, XIV p. 201 XVI p. 174, XVII p. 147.

1. **Hydnum violaceum** Thore ap. Persoon, Traité Champ. (1818) p. 249, 1400 *Sarcodon violaceum* Quélet in Assoc. franç. Sc. XXII (1893) pag. 5 tab. III fig. 12 (extr.). — Pileo convexo, dein applanato, 5-6 cm. lato, pubescente, rugoso, violaceo-albo-marginato, dein cinereo-brunneo, plus minus zonato; carne tenera, fragili, violacea, sapida et grate olente; stipite crasso; deorsum tenuato concolore; aculeis confertis, longiusculis, 1 cm., amœne violaceis, apice albis; sporis sphaericis, 4-5 μ . diam., verruculosus, albis.

Hab. sub Pinis, Landes et Fontainebleau Galliae (THORE, domina DAULNOY). — Ab. *H. violascente* Alb. et Schw. parum distinctum.

2. **Hydnum putidum** Atkinson, Mushrooms, p. 199 tab. 79 fig. 199. 1401 — Pileo primum umbilicato v. depresso, dein depresso v. infundibuliformi, irregulari, excentrico, margine repando et quandoque

*) Conferenda: H. J. BANKER, *A contribution to a revision of the North American Hydnaceæ* (Mem. Torr. bot. Cl.) New York, 1906.

lobato et lobis revolutis; superficie primum tomentosa v. pubescente dein levi, concentrice zonata, primum albida dein cremea demum brunnea et quondoque centro nigro-brunnea; margine subcrasso, subacuto v. obtusiusculo; carne supra spongiosa infra dura, coriacea; spinis primum albis v. cremeis dein salmoneis v. e griseo griseo-brunneis, decurrentibus; sporis albis, globosis, echinulatis 3-4 μ . diam.; stipite valido irregulari; fungi udi odore peculiari grato sed arescentis nullo.

Hab. ad terram, Blowing Rock N. C., Amer. bor. — Fungus 8-12 cm. altus, pileo 8-12 cm. lato, stipite 2-4 cm. cr.

3. **Hydnum reticulatum** (Banker) Sacc. et Trott., *Sarcodon reticulatus* 1402
Banker, Mem. Torr. Bot. Club XIII (1906) p. 139. — Majusculum, alutaceum v. sublateritium; pileo plano subirregulari, 7-15 cm. lat., subconfluens; margine tenui incurvo, subrepando, sterili, superficie tomentosa demum levigata v. centro squamulosa marginem versus fulvescente albaque; substantia carnosae, subfragili, albida; stipite curto obconico, solido, 2-4 cm. long., 1-3 cm. cr., sabulo profunde infosso, glabro, concolore; aculeis teretibus, tenuibus acutis, basi sectione subtrigonis, basi coalescentibus, intus obscuris, extus ex albo cinereis, subdecurrentibus, 2-6 mm. long., 0,25-0,35 mm. cr., in quoque mm. 3-4; sporis ex albo flaveolis subglobosis, tuberculatis, 3-3,5 μ . diam., sapore dulci, odore subnullo.

Hab. ad terram sabulosam in pinetis, New Jersey, Amer. bor. (Copp) — *Hydno levigato* et *H. fragili* subaffine. Aculei conjunctim facile secedunt et tunc quasi reticulum in pileo relinquunt.

4. **Hydnum Underwoodii** (Banker) Sacc. et Trott., *Sarcodon Underwoodii* 1403
Banker, Mem. Torr. Bot. Club III (1906) p. 147. — Terrestre, mesopus, minutum v. mediocre; pileo subplano, depresso, irregulari, 7-10 cm. lato; margine tenui inflexo, fertili, superficie squamuloso-floccosa, subzonata, pallide brunnea, squamulis saturatioribus, margine griseo-brunneo; substantia carnosae, albida sicca vix 1 mm. cr., dura, atra; stipite irregulari, basi abrupte tenuato et radicante, subconcolore, sursum rugoso-squamuloso et spinuloso; aculeis minutis, teretibus, acutis, decurrentibus, pallide cinereis, siccis brunnescentibus, 2-3 mm. long., 0,5 mm. cr., siccis subcapillaribus, 4-6 in quoque mm.; sporis globosis, tuberculatis, 5-6 μ . diam., atris; sapore amaro.

Hab. ad terram in silvis, Connecticut (Underwood), New Jersey (Ellis) Amer. bor. — *Hydno imbricato* et *H. fennico* affine.

5. **Hydnum Blackfordiæ** Peck, Bull. Torr. Bot. Club XXXIII (1906) 1404 p. 218. — Pileo carnosio, convexo, glabro, griseo v. griseo-viridi, carne albida rubro maculata, aëre lente brunnescenti; aculeis subulatis, 2-5 mm. longis, ætate vel arescendo e flavido-griseo brunneis; stipite æquali v. subtus subangustato, solido v. farcto, in sicco cavo, glabro, pileo concolori; sporis brunneis, subglobosis, verrucosis, 8-10 μ . latis.
Hab. ad terram muscosam in silvis, Ellis Massachusetts, Amer. bor. (E. B. BLACKFORD). — Pilei 2,5-6 cm. lati; stipes 2,5-4 cm. longus, 3-4 mm. cr.
6. **Hydnum lateritium** Masee, Kew Bull. n. 7 (1906) pag. 256. — 1405 Pileo tenui, subinfundibuliformi, sericeo, azono, lateritio, 1-2 cm. lato; aculeis sparsis, acutiusculis, apice quondaque subinciso, e lateritio-fusco expallentibus; stipite pileo concolori, glaberrimo, 1 cm. longo; sporis subglobosis, hyalinis, glabris, 3,5-4 μ . diam.
Hab. ad terram humosam, Aburi Gold Coast, Guinea Africae occ. (JOHNSON). — *Hyd. tomentosum* Fr. proximum.
7. **Hydnum sulcatipes** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 1406 p. 101. — Pileo carnosio sed tenui, convexo v. subplano, glabro; aculeis angustis, subulatis, sæpe basi compressis et quondaque confluentibus, præcipue ad marginem pilei, albidis, 2 mm. circ. long.; stipite angusto, æquali, sulcato, apice quondaque furcato; sporis subglobosis v. late ellipsoideis, 7-8 μ . long. et fere æque cr.
Hab. in silvis, Blue Mounds, Wisconsin (J. J. NEUMAN). — Pileus 2-3 cm. latus; stipes 2-3 cm. long., 3-4 mm. cr.
8. **Hydnum jonides** Pass. in N. Giorn. bot. ital. (1872) pag. 157. — 1407 Cfr. Saccardo, Not. myc. VI, Ann. Myc. v. III (1905) p. 506. — Pileo carnosio, tenui pallide terreo, levi v. tandem vix flocculoso, explanato; stipite levi superne aculeis abortivis punctato, basi attenuato, concolori, aculeis brevibus primo concoloribus, dein ferrugineo-fuscescentibus; carne molli, valde friabili, fracta et secta eximie violacea!, sapore et odore debilibus, gratis (Pass.); sporis globosis, breve tenuiter spinulosis, 3-3,2 μ . diam., hyalinis (Sacc.).
Hab. in castaneto, Collecchio (Parma) Italiae bor.
9. **Hydnum crocidens** Cooke — Syll. IX, p. 209. — var. **subexcentricum** Patouill. Bull. Soc. Mycol. de Fr. XXIV (1908) pag. 8. — Differt pileo excentrico, postice depresso v. inciso ibique aculeis carente; cystidiis nullis, basidiis tetrasporis; sporis ut in typo.
Hab. ad terram, Pic Malaoni Novæ Caledoniæ (M. LE RAT).
10. **Hydnum decolorosum** Britz., Syll. XI p. 100; Britzelmayr, Re- 1409

vis. Hymen. (1909) q. 213. — Pileo 7,5 cm. lato, convexo, depresso, centro plus vel minus incarnato, griseo lilacino, pallide griseo-violaceo, piloso, margine subtus sterili, albo; stipite 5 cm. longo usque ad 2 cm. cr., basi nunc incrassato nunc attenuato, supra griseo basi brunneo-rubido, trito basi in stipite ad colorem viridi-cyaneum nutante, sapore ingrato; massa sporarum alba; sporis angulosis, 3-4 μ . diam., guttulatis v. non.

Hab. in silvis Coniferarum Bavarix. — *Hydno amico* affine.

11. **Hydnum macrosporum** Britz. — Sacc. Syll. XI, pag. 109; Britzelmayr, Revis. Hymen. (1909) p. 213. — Pileo 9 cm. lato, irregulariter umbonato, convexo, albo-piloso, dein pro parte flavido ex centro sordide flavo-brunneo; stipite 4 cm. et ultra longo, 1 cm. cr., supra et infra crassiore, cyaneo; hymenio decurrente, nigro cyaneo, dein ad marginem rubro-brunneo, carneo v. albido; carne odore anisi v. amygdalino, in pileo albida, dein in stipite basim versus nigro-cyanea, transverse zonata; sporis flavis, angulosis, 8 \times 4.

Hab. in silvis Ostrachtals Bavarix. — *Hydn. suaveolenti* affinis species.

12. **Hydnum sparso-aculeatum** Britz. — Sacc. Syll. XI, pag. 109; Britzelmayr, Revis. Hymen. (1909) p. 212. — Pileo 7 cm. lato, convexo, centro depresso, umbonato, brunneo, margine revoluta flavo-ochraceo dein albido; stipite 4 cm. long. 2 cm. cir. cr., basi plerumque attenuato, fibroso, supra ex albido pallide brunneo-flavo, basi rubro-brunneo v. e brunneo nigricante; hymenio fere albo; aculeis inter se remotis, subdecurrentibus, carne molli, alba, sapore grato; sporis angulosis, flavidis, 4-5, \approx 3.

Hab. in silvis Bavarix. — *Hydn. subsquamoso* affine.

13. **Hydnum tuberculosum** Britz. — Sacc. Syll. XI pag. 109; Britzelmayr, Revis. Hymen. (1909) p. 203. — Pileo 6 cm. lato, convexo simpliciter v. pluries umbonato, ex albido-carneo flavido-rubro; deorsum in tuberculum 3 cm. cr. stipitifforme terra infossum desinente; aculeis brevibus, crassis, albidis; carne odore farinaceo, supra in pileo et stipite alba, dein basi albido-v. rubro-brunnea; sporis flavis, angulosis, 6-8 \times 4-5.

Hab. in silvis prope Teisendorf Bavarix. — *Hydn. compacto* affinis species.

14. **Hydnum auratile** Britz. — Syll. XI, p. 110; Britzelmayr, Rev. Hymen. (1909) p. 214. — Pileo 2,5 cm. lato, irregulariter de-

presso ibique sæpe tuberculis erectis asperato, flavo, flavo-rubro, ad marginem albo; superficie pilei fibroso-piloso; aculeis rubro-cyaneis, late decurrentibus basi rubro-brunneis, sæpe longissimis, incurvatis; stipite 6,5 cm. longo, 0,5 cm. cr., supra expanso, basi irregulariter noduloso-incrassato, brunneo; carne rubro-cynea, in stipitis basi brunnea, suberoso-fibrosa, odore acuto farinaceo; massa sporarum griseo-brunneola; sporis subangulosis, plerumque uniguttulatis, 5-6 \approx 3-4.

Hab. in silvis Baviaræ — *Hydno aurantiaco* affine.

15. **Hydnum fragrans** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 109; Britzelmayr, 1414

Revis. Hymen. (1909) pag. 214. — Pileo sæpe irregulariter convexo, simpliciter v. pluries umbonato, plano v. profunde depresso, e fibroso foveolato-fibroso, nitido, vix sericeo, flavo, flavo-aurato v. rubro-flavo, usque ad 4 cm. lato, nunc solitario nunc gregario et subimbricato; stipite 2 cm. longo usque ad 7 mm. cr., basi attenuato, v. etiam bulboso-incrassato, pileo concolori; aculeis primum verrucosis dein brevibus sed acutiusculis, flavo-rubris late decurrentibus ibique obscurioribus; carne odore farinaceo, supra flavo-rubra, carneo-rubido-flava, basi e brunneo nigro-brunnea; massa sporarum brunnea; sporis angulosis, flavis 6 \approx 4.

Hab. in silvis prope Teisendorf Baviaræ. — *Hydn. aurantiaco* affinis species.

16. **Hydnum inodorum** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 109; Britzelmayr, 1415

Revis. Hymen. (1909) p. 214. — Pileo 4 cm. lato, convexo, centro plerumque depresso, umbonato, minute tomentoso, flavo ad marginem albicante; pileis sæpe concrenentibus; stipite cm. 9 longo usque ad 2 cm. cr., basi nunc angustato, nunc expanso, recto v. curvo, flavo; margine pilei subtus sterili, aculeis decurrentibus, brevibus, crassis, albidis, in maculis brunneo v. griseo-lateritiis; carne odore nullo, supra albido-lateritia, basi in stipite e lateritio rubro-brunnea; sporis flavis, 6-7 \approx 4-5.

Hab. in silvis Baviaræ — *Hydno aurantiaco* affine.

17. **Hydnum inæquale** Britzelmayr, Hymenomyc. tab. 671 fig. 24 e 1416

et tab. 684 fig. 50; Revis. Hymen. (1909) pag. 213. — Pileo 8 cm. lato, convexo, centro depresso et pluries umbonato, margine undulato, sulcatulo, rubro-brunneo, sæpe zona obscuriori albo-marginata prædito; margine subtus sterili, aculeis rubro-brunneis ad stipitem carneis; carne odore farinaceo, in pileo carnea, basi rubro-brunnea et nigro-brunnea; stipite 8 cm. longo, 2 cm. cr. supra sed plerumque ad basim attenuato, carneo, v. rubro-brunneo

ad marginem crassiori; massa sporarum brunnea; sporis angulosis, flavo-brunneis, $6 \approx 3-4$, plerumque uniguttulatis.

Hab. in silvis prope Augsburg Bavariæ. — *Hydno fusipedi* affinis species.

18. **Hydnum occultum** Britz. — Syll. XI p. 110; Britzelmayr, Re- 1417
vis Hymen. (1909) pag. 215. — Pileo 7 cm. lato, convexo, ex-
panso, centro depresso et plerumque colliculoso, crasse fibroso,
strigoso; margine undulato, piloso, albo; stipite 8 cm. longo, 1
cm. cr., incurvato, basi nunc incrassato nunc attenuato, indistincte
zonato, inodoro; aculeis longis, tenuibus, albis v. albidis, subdecur-
rentibus; massa sporarum alba; sporis rotundato-angulosis, ple-
rumque uniguttulatis, $3-4 \mu$. diam.

Hab. ad terram herbosam v. muscosam in Bavaria.

19. **Hydnum sanguineo-fulvum** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 109; Britz- 1418
zelmayr, Revis. Hymen. (1909) p. 214. — Pileo 6 cm. lato, cen-
tro rubro-sanguineo, marginem versus fulvescente ibique albo-pi-
loso, sæpe convexo-umbonato, v. etiam depresso, fibroso-sulcato;
stipite 4 cm. longo, 2 mm. usque ad 2 cm. cr., sordide violaceo,
rubro-brunneo, nigricante; aculeis late decurrentibus brevissimis
subtus pileo albido-pruinosis, dein basi e rubido nigro-brunneis;
carne suberosa, odore farinaceo, supra carneo-colorata, dein basi
e rubro-brunnea v. nigro-rubro-brunnea; massa sporarum brunnea,
rubida, v. violaceo-brunnea, griseo-rubro-brunnea; sporis angulo-
sis flavidis v. flavis plerumque uniguttulatis, $6-7 \approx 4$.

Hab. gregaria et sæpe cæspitosa in silvis Bavariæ. — *Hydno ferrugineo* affinis species.

20. **Hydnum fuligineum** Britz. — Sacc. Syll. XI p. 109; Britzelmayr 1419
Revis. Hymen. 1909, p. 216. — Pileo solitario 4 cm lato sed
plerumque cæspitoso; pileis infra in stipitem vix distinguibilem
1 cm. cr. congestis; pileo superficie plus v. minus sparse nodulosa,
ambitu plerumque convexo v. etiam depresso, brunneolo v. brun-
neo, margine albido, crassissimo, lobato; aculeis albidis, rubro-
brunneis, longe decurrentibus; carne suberosa, odore farinaceo,
brunnea, leniter zonata; massa sporarum brunnea, sporis angulo-
sis, $6-8 \approx 4-5$.

Hab. in silvis prope Teisendorf Bavariæ. — *Hydno velutino* affinis species.

21. **Hydnum testaceo-fulvum** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 109; Britz- 1420
zelmayr, Revis. Hymen. (1909) p. 215. — Pileo 6 cm. lato con-
vexo centro depresso, sæpe varie nodoso, crebre tomentoso-piloso,

lateritio v. flavo-rubro, margine albido, fere sericeo, demum fibroso et subfoveolato; stipite usque ad 1,5 cm. longo, 1 cm. cr., basi incrassato v. attenuato, flavido-rubro-brunneo; aculeis decurrentibus, ad marginem pilei albidio, dein basi carneis et rubro-brunneis; hymenio albido-nitido; carne suberoso-lignea, sordide rubro-brunnea, odore peculiari nullo; massa sporarum brunnea; sporis globoso-angulosis, flavidis v. flavis; sæpe uniguttulatis, 5 × 4.

Hab. in silvis prope Teisendorf, Bavariæ. — *Hydno velutino* affinis species.

22. **Hydnum ferrugineo-album** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 109; Britz 1421
zelmayr, Revis. Hymen. (1909) p. 215. — Pileo 8 cm. lato irregulariter effuso, centro irregulariter depresso, rubro-brunneo, rubro-ferrugineo, margine albido, sulcato, foveolato-fibroso; hymenio decurrente, rubro-brunneo; aculeis demum confluentibus; stipite 2 cm. longo, basi 0,5 cm. cr. supra incrassato; carne suberosa, odore farinaceo, obscure rubro-brunnea, subzonata; sporis flavo-brunneis, 4-6 μ . diam., globoso-angulosis.

Hab. in silvis prope Teisendorf, Bavariæ. — *Hydno scrobiculato* affine.

23. **Hydnum radiato-rugosum** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 110; Britz 1422
zelmayr, Revis. Hymen. (1909) p. 215. — Pileo 5 cm. lato, radiatim rugoso-zonato, centro sæpe umbonato, flavido-rubro-brunneo v. rubro-brunneo, margine albo; stipite concolori, 2 cm. longo, 5 mm. cr. supra late expanso; aculeis subdecurrentibus brunneis albidio-tinctis; carne rubro-brunnea, fibrosa, odore farinaceo; sporis subellipsoideis, 6 × 4, non angulosis.

Hab. solitarium v. gregarium v. etiam cæspitosum et sumbricatum, in silvis prope Teisendorf Bavariæ. — *Hydno zonato* affine.

24. **Hydnum fulvo-cæruleum** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 109; Britz 1423
zelmayr, Revis. Hymen. (1909) p. 213. — Pileo et stipite congestis, conoideis, pileo irregulari convexo, subtuberoideo, ex albidocyanescente obscure cyaneo, e lanuginoso-piloso, strigoso-fibroso, centro demum sæpe flavescenti v. rubro-brunneo; stipite basi attenuato, quandoque basi incrassato, e rubro-brunneo nigricante; aculeis ad marginem albidis, ceterum cyanescentibus, rubro-brunneis griseo-tinctis, decurrentibus; carne suberosa odore farinaceo, zonata, supra cyanescenti, basi e flavo rubra v. rubro-v. nigro-brunnea; massa sporarum brunnea, vel griseo-brunnea; sporis flavis, brunneo-flavis, angulosis, 5-6 × 4-5.

Hab. in silvis prope Teisendorf Bavarisë.

25. **Hydnum Ballouii** (H. J. Banker), *Steccherinum Ballouii* How. J. 1424
Banker, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXVI (1909) p. 341, tab. XXIV.
— Pileo e campanulato subdimidiato, plus minusve imbricato, sessili, in substrato verticali decurrente, vel in substrato horizontali pendulo, facile secedente, 1-4 cm. longo, 1-5 cm. lato, sæpe lateraliter confluenti et 10 cm. longo; superficie sulcato-zonata, radiatim subrugosa, subscrobiculata, subinde partibus junioribus vel magis suffocatis velutina (sæpe in partibus vetustis lichenifera), vivo atro-olivaceo-brunneo, sicco griseo-brunneo, margine dilutiore obtuso, lobulato; substantia tenui 1-2 mm. cr. bi-stratosa, strato superiori duriore, fragili et atro-brunneo, inferiore laxiore læte brunneo; hymenio colliculoso, subfarinaceo, aureo-flavo senio carneo-fulvo; aculeis variis e tereti difformibus confluentibus subpapillatis, obtusulis, 1-5 mm. long., 0,5-1 mm. cr., inæqualiter dispositis; sporis hyalinis elliptico-subglobosis, 7-7,2 \approx 5,5-6,5; sapore e dulci amarulo.

Hab. in trunco vivo *Chamæcyparis thyoidis*, Forked River, Ocean County, New Jersey, Amer. bor. (W. H. BALLOU).

26. **Hydnum adustum** (Banker) Sacc. et Trott. — *Steccherinum* 1425
adustum Banker, Mem. Torr. Bot. Club XII (1906), p. 133. — Pileatum, stipitatum v. sessile, rarius resupinatum, sæpe deforme; pileo dimidiato reniformi-flabellato, subinde subinfundibuliformi; superficie radiato-fibrosa, obsolete zonata, minute pubescente, alba brunneolo-zonata, demum subcarnea (sicca) 0,5-4 cm. lat., margine tenui, acuto, sicco crispato-fimbriato, substerili; substantia firma, fibrosa alba, sicca, fragili, tenui, vix 1 mm. crassa; stipite tenui plus minus difformi, excentrico, laterali v. nullo, solido, velutino, basi dilatato; aculeis tenuibus, confertis, flexuosis subteretibus v. compressis, subinde furcatis, pubescentibus, usque ad 2 mm. longis, in quoque mm. 5-7, albis, dein subcarneis v. subochraceis, non nigricantibus; sporis ovoideis, levibus, intus granulosis, albis, 2,5 \approx 1,5.

Hab. ad ramos dejectos putres in silvis, New York (LOBENSTINE), New Jersey (ELLIS) in Amer. bor. — *Hydno adusto* affine.

27. **Hydnum Morgani** (Banker) Sacc. et Trott., *Steccherinum Morgani* 1426
Banker, Mem. Torr. Bot. Club, XII (1906) p. 127. — Pileatum, sessile, gregarium, subimbricatum, non confluens; pileo dimidiato-subflabellato, horizontali, tenui, 2 mm. cr., marginem versus tenuato, centro incrassato, usque ad 5 mm., 3,5-6 cm. lato, 3,5-4

cm. long.; superficie radiatim tomentosa, centro inæquali, prope marginem sulcato-zonata, pallide fulva, margine glabro, inæquali, recto, tenui, læte fulvo; aculeis brevibus, rectis, compressis, furcatis v. fimbriatis ex umbrino fulvis, 1 cm. longis, marginem versus brevioribus, 0,17-0,20 mm. cr., in quoque mm. 3-4.

Hab. ad truncos, Ohio Amer. bor. (MORGAN). — Affine *Hydno glabrescenti*.

28. **Hydnum complicatum** (Banker) Sacc. et Trott., *Hydnellum com-* 1427

plicatum Banker, Mem. Torr. Bot. Club, XII (1906) p. 161. — Terrestre, mesopus, complicatum; pileo expanso, convexo, centro depresso, lobato, tenui, rigido, 4-7 cm. lat., superficie subinæquali, puberula, e carneo umbrino-purpurea, margine tenui, sterili; substantia e compacto subspongiosa, pallide badia; stipite pileique parte infer. lignescente subzonatis, rubescentibus; stipite curto deformi basi subbulbosa, 2-3 cm. long., 1 cm. long., aculeis brevibus, teretibus, decurrentibus, carneis, vix 3 mm. long.; sporis subglobosis v. ovoideis, minute tuberculatis, fuscis, 4,5 \approx 3,5.

Hab. ad terram, New York, Amer. boreal. (VAN HOOK) — *Hydno floriformi* affine.

29. **Hydnum Earlianum** (Bank.) Sacc. et Trott., *Hydnellum Earlianum* 1428

Banker, Mem. Torr. Bot. Club. XII (1906), p. 161. — Terrestre pleuropus v. submesopus, minutum, pileo expanso, convexo-depresso e rotundo reniformi dimidiatove, 3-5 cm. lat., superficie inæquali, subcolliculosa, e puberulo glabrescente, lateritio-brunnea, margine nigricante, subzonata, margine tenui incurvato, substerili, repandulo; stipite tenui inclinato, basi spongioso-bulboso, lateritio, puberulo, solido, 1-2 cm. longo, 3-4 mm. cr.; substantia fibroso-pannosa, supra lateritia deorsum obscuriore; aculeis teretibus rubro-umbrinis, nigricantibus, decurrentibus, 2 mm. long., 0,15-0,20 mm. cr., circ. 3 in quoque mm.; sporis subglobosis, tuberculatis, 3,5-4 μ . diam., coloratis.

Hab. ad terram in silvis Carolina inf. et Georgia (RAVENEL, UNDERWOOD). — *H. ferrugineo* subaffine.

30. **Hydnum Nuttallii** (Banker) Sacc. et Trott., *Hydnellum Nuttallii* 1429

Banker, Mem. Torr. Bot. Club, XII (1906) p. 155. — Terrestre, mesopus; pileo obconico e depresso infundibuliformi, subrotundo, marginem versus attenuato, 4-6 cm. lat. vix 1 cm. cr., superficie subæquali, radiatim subrugosa, griseo-umbrina, margine acuto, grosse plicato, inflexo; substantia superne spongioso-tomentosa, centro firmiore, umbrina; stipite centrali, extus spongioso-tomen-

tosus, 4 cm. longo, 0,5 cm. cr., basi bulboso; aculeis capillaribus subdecurrentibus ex umbrino nigricantibus, 7 mm. long., 0,15-0,25 mm. cr., in quoque mm. 2; sporis subglobosis, subtuberculatis, brunneis, 4-5 μ . diam.

Hab. ad terram in silvis, New York (PECK), Virginia occid. (NUTTALL), Carolina sup. (ATKINSON) in Amer. bor. — *Hydno velutino* proximum.

31. **Hydnum Ellisianum** (Banker) Sacc. et Trott., *Phellodon Ellisianus* Banker, Mem. Torr. Bot. Club, XII (1906) p. 174. — Terrestre, mesopus, gregarium, subconfluens, minutum; pileo subrotundo, ex umbilicato infundibuliformi, 0,7-1,5 cm. lat., superficie subplana, radiatim fibroso-striata, subzonata, subglabra, e murino fusca, zona marginali alba prædita, margine tenui, levi, sterili, albido; substantia fibrosa subcompacta, tenui; stipite angusto, centrali, tereti, deorsum, tenuato, basi bulboso, tomentoso, supra cinereo, deorsum murino, 4-7 mm. longo, 1-2 mm. cr.; aculeis brevibus, crassiusculis, subdecurrentibus, cinereis, 1 mm. long., 0,12 mm. cr., 3-4 in quoque mm.; sporis globosis, echinulatis, albis, 3,5 μ . lat.

Hab. ad terram in silvis, New Jersey, Amer. bor. (ELLIS). — Proximum *H. delicato*.

32. **Hydnum spongiosum** Rick, Broteria V (1906) p. 14. — Pileo lateraliter ad basim truncorum vivorum juniorum nascente mesopodis ad instar, apode, tomentoso-spongioso, 4 cm. cr., 1 dm. lato, in sicco fere membranaceo et collabescente e pallido olivascente, aquam avidè absorbente, turgido; margine obtuso, albo, sterili; dentibus candidis, teretibus, acutis, regularibus, ceræeis, hispidulis, 1 cm. longis, versus marginem brevioribus, decurrentibus; sporis ovalibus, 7,5 \approx 5, valde exasperatis, albis.

Hab. ad terram, truncos complectens, sed potius epiphyta quam parasita, Rio Grande do Sul Brasiliæ.

33. **Hydnum Kauffmani** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) pag. 348. — Pileo dimidiato, sessili, convexo v. subplano, molli sed tenaci v. coriaceo, fibris fasciculatis longiusculis adpressis strigoso, æquali, subochraceo, carne albida, radiatim fibrosa; aculeis subcylindræeis v. subulatis, 2-3 mm. long., sæpe inter se cohærentibus et cæspites subgelatinosos efformantibus, acutis, albo-cremeis, dein arescendo obscurioribus, interdum præcipue ad marginem flavo-maculatis; sporis hyalinis, ellipsoideis, 4-5 \approx 2-3.

Hab. in ligno gossypino dejecto, Marquette Michigan, Amer.

bor. (C. H. KAUFFMAN). — Pileus 6 cm. c. latus; stipes 4 cm. longus.

34. **Hydnum piperatum** (Banker) Sacc. et Trott., *Leaia piperata* Bank. 1433

Mem. Torr. Bot. Club, XII (1906) p. 175. — Sessile, subdimidiatum v. flabellatum, cæspitoso-subimbricatum, confluens, 8-10 cm. lat.; pileis ascendentibus, singulis 0,5-4 cm. latis, 1-3 cm. long., vix 0,5 cm. cr., subiculi processibus corpus fungi formantibus, iterato ramosis sursum crasse hirto-tomentosis, fibrosis flexibilibus, umbrinis; pilei margine fimbriato; aculeis teretibus, tenuibus, vix 3 mm. long., 0,14-0,18 mm. cr., in quoque mm. 2-3, umbrino-fuscis; sporis ovoideo-ellipsoideis, hyalinis, 1-pluri-guttulatis, minute papillosis, 4,5-5 \approx 3,5-4; basidiis clavatis 4-sporis, sterigmatibus 3-3,5 μ . longis; sapore acri piperino, odore subnullo.

Hab. in truncis putrescentibus in silvis udis, New-York (ELLIS, BANKER) Nebraska (WEBBER), Iowa (HOLWAY) in Amer. bor. — *Hydno cirrato* et *H. strigoso* videtur affine. — Ad gen. *Leaiam* Bank. pertineret quoque *Hydnum stratosum* Berk.

35. **Hydnum fimbriatum** (Banker) Sacc. et Trott., *Hericium fimbriatum* Banker, Mem. Torr. Bot. Club, XII (1906) p. 122. 1434

Re-supinatum, irregulariter effusum, 5-7 cm. lat., carnosum, obsolete tuberculatum, 1-15 mm. cr., ex albido rubens, in sicco ochraceo-isabellinum; margine pallidiore, subindeterminato vel partim flabellato-fimbriato, trunco obsolete ramoso-anastomico, ramulis ultimis spiculiformibus fimbriatis, 1 mm. long.; aculeis pendulis in parte infer. fungi et sub tuberculis, teretibus v. compressis, apice fimbriatis, 3-10 mm. long., 0,2-1,5 mm. cr.; sporis oblongis, curvulis, 1-guttulatis, 4-4,5 \approx 2-2,5, subhyalinis.

Hab. ad caudices emortuos arboris indet., inter corticem et lignum oriens, in Pennsylvania, Amer. bor. (BANKER).

36. **Hydnum myriopodum** A. Blytt, Norges Hymen. in Vid.-Selsk. 1435

Skr. 1904, n. 6. p. 131. — Pileis numerosis, dense innatis et in placentam magnam, coriaceam, ferrugineam, dentato-colliculosam, concrenentibus, margine canescente, villosa; aculeis albo-canescensibus; stipite brevi, atro-cinereo.

Hab. in betuletis, Os Norvegiæ.

37. **Hydnum suberoso-coriaceum** Britz. — Syll. XI p. 110; Britzel- 1436

mayr, Revis. Hymen. 1909 p. 216. — Pileo non stipitato, latera-liter adnato, usque ad 6 cm. longo, fibroso et canaliculato, rubro-brunneo zonulis, obscurioribus indistinctis, brunneis vel brunneo-violaceis prædito; carne suberosa, rubro-brunnea vel subpurpureo-

brunnea, subzonata, odore et sapore levi farinaceo; sporis angulosis, flavis, $6 \approx 4$.

Hab. ad radices arborum in silvis Hindelang Bavarix. — *Hyd. hirto* affinis species.

38. **Hydnum griseo-fuscescens** Reichardt, Novara-Exp. Fung. p. 137, 1437 tab. XXI, fig. 1. — Apus; pileis imbricatis, carnosolentis, tenacibus, planis, dense villosis, zonatis, 6-7 cm. latis, 1 mm. cr., e griseo fuscescentibus, margine integro, acuto, reflexo; aculeis confertissimis, subuliformibus, pallescentibus; sporis fuscis, levibus, ellipsoideis, $5,5 \mu$. long.

Hab. ad caudices putres Eucalypti, pr. Sydney Australix. — Affine *H. orbiculato* et *H. pectinato*.

39. **Hydnum solenioides** Karst., Acta Soc. pro Faun. et Fl. fenn. 1438 XXVII, 4 (1905) p. 5. — Cervino-pallidum; subiculo effuso, indeterminato, furfuraceo-crustoso, tenuissimo; aculeis confertiusculis, brevibus, variis, teretibus, acutis, hinc inde confluentibus.

Hab. ad corticem Betulæ prope Mustiala Fennix.

40. **Hydnum Henningsianum** W. Herter in Kryptogamenfl. Brandenb. 1439 VI, 1, p. 178 (1910) — Pileo membranaceo, margine fimbriato, non secedente, late effuso; aculeis 0,3-0,4 mm. long., crebris, æqualibus, cylindræis, obtusis, initio albis, dein flavidis; basidiis 10-15 ≈ 3 ; sporis globosis, hyalinis, 1-guttulatis, 2-3 μ . diam.

Hab. ad ramos fagineos, Bellernegarten Berolini (HENNING). Affine *Hydno mucido*.

41. **Hydnum Eichelbaumii** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 1440 p. 108. — Resupinato-effusum, tenuiter membranaceum, dein rimosum, olivaceo-ferrugineum; aculeis subulatis c. 300-400 ≈ 60 -100 fuscis; basidiis clavatis, sporis ovoideis vel subellipsoideis, rufo-brunneis v. fuscis, 5-8 ≈ 4 -5, levibus.

Hab. in ramis decorticatis, Amani Usambara Africæ.

42. **Hydnum chariense** (Har. et Pat.) Sacc. et Trott., *Mycoleptodon* 1441 *chariensis* Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Biol. Nat. (1909) n. 2, p. 90. — Omnino resupinatum, secernibile, albidum, 4-5 cm. latum, indeterminatum; aculeis simplicibus, gracilibus, 1 mm. c. longis, strictis.

Hab. ad truncos, Snoussi Congo Africæ trop. — *M. læticolori* affine. — Ad gen. *Mycoleptodon* spectant quoque affines species: *Hydn. læticolor* et *H. pudorinum* (= *H. dichroum* Pers.).

43. **Hydnum fenerivense** P. Henn. in Voeltzkow Reise Ostafrika III 1442 (1908) p. 19, tab. II, fig. 6. — Membranaceo-effusum, tenue, mar-

gine albido-byssino; aculeis subulatis, rigidis, rectis vix fasciculatis, obtusiusculis v. acutis, 2,5-3,5 mm. longis, 0,3-0,4 mm. c. latis, flavo-brunneis; sporis subglobosis, hyalinis, 1-guttulatis, 4-5 μ .

Hab. ad corticem arborum, Fénérive, Madagascar. — *H. alutaceo* affine.

44. **Hydnum Kusanoi** (P. Henn. et Shir.) P. Henn., Engl. Bot. Jahrb. 1443 XXXVII (1905) p. 160. — Ita potius vocandus *Irpeex Kusoni* P. Henn. et Shir., Syll. XVI, p. 178, teste ipso auctore.

Hydni species sequentes, in Syll. XIX p. 904-905 memoratæ, tam ambiguae sunt ut potius prætereundæ: **Hydnum agaricinum** Hoffm. — **H. cæspitosum** Valenti-Serini — **H. minimum** Bolt. — **H. multicomum** (Paul.) — **H. roseum** Raddi — **H. undulatum** Valenti-Serini — **H. venosum** (Humb.) — **H. zonulatum** Valenti-Serini.

PSEUDOHYDNUM Rick, Ann. Mycol. (1904) p. 409 (Etym, *pseudos* falsus et *Hydnum*. Non = *Pseudohydnum* Karst. (1868) quod = *Tremellodon*. — A typo *Hydni* differt contextu gelatinoso et aculeis a trama separabilibus et deterrentibus. A *Tremellodonte* recedit fructificatione homobasidiali nec heterobasidiali.

1. **Pseudohydnum guepinioides** Rick l. c. — Gregarium, cæspitosum, 1444 multilobatum, ex pileis imbricatis, flabelliformibus formatum, infundibuliforme, hyalino-badium usque ad cervinum, glabriusculum, tomento albido tectum; margine involuto, denticulato v. fisso; cæspitibus usque ad 10 cm. latis, cum stipite 10 cm. altis; toto fungo cartilagineo-gelatinoso; lobis singulis usque ad 5 cm. latis ex communi trunco ramosis; stipite usque ad 8 cm. alto, 1 cm. cr., in humo profunde abscondito, tomento albo consperso versus terram, versus pileum rugoso, crasso, rigido, dentibus carneis, teretibus, ad basim confluentibus, apice-denticulato-incisis, in stipitem decurrentibus, usque ad 2 mm. altis, versus stipitem minus densis, a trama pilei crassa facile separabilibus; basidiis Hydni, clavatis non septatis, 4 sterigm. instructis; sporis coloratis, brunneis, subrotundis v. polygoniis 5 μ . diam., in sicco valde verrucosis.

Hab. ad terram in silvis primitivis « Sao Migueldos dois irmaos » in Brasilia.

HYDNOCHÆTE Bres. — Syll. XIV p. 211.

1. **Hydnochæte ferruginea** Rick, in Ann. Mycol. III (1905) p. 235. 1445 Resupinata, tenuis, margine byssino, ferruginea, papyraceo-mollis,

arcte adnata, dentibus $\frac{1}{2}$ mm. altis, subulatis, valde acutis, versus substratum multo crassioribus, laxiuscule sparsis, ferrugineis, setulis lividioribus amœne conspersis; basidiis clavatis minutis, 4 sterigmata gerentibus; sporis sphaericis, verrucosis, ferrugineis, 3-4 μ . diam.

Hab. in ligno corticato versus terram, in Brasilia. — Ab *Hydnochaete badia* Bres. plane distincta.

IRPEX Fr. — Syll. VI p. 482, IX p. 213, XI p. 110, XIV p. 205, XVI p. 178, XVII p. 153.

1. **Irpex albo-fuscus** (Pat.) Sacc. et Trott., *Coriolus (Irpex) albo-fuscus* 1446
Bedelia thecoides
Ann. VI, 379.
 Patouill., Bull. Soc. Myc. de Fr., XXIII (1907) pag. 81. — Pileo coriaceo, 3-5 cm. lato, solitario v. imbricato, tenui, reniformi, scutatim adfixo, pallide cervino, sulcatulo-zonato, margine recto, integro, acuto; hymenio concolori, aculeis rigidis, brevibus, distantibus, circulatim dispositis, venoso-connexis obsito.

Hab. in ligno emortuo, Guinea Africæ trop. (BOUÉ). — *Polysticto albo-cervino* proximus, differt præcipue forma hymenii.

2. **Irpex destruens** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya IV, Pt. V, 1447
 (1909) p. 300. — Resupinatus in plagas latas effusus, dein pileos horizontales tam ad marginem quam in centro plagarum proferens; parte resupinata indefinita v. margine lato, albo sterili cincta; pileis elongatis v. orbicularibus v. flabelliformibus, tota basi adnatis v. infra contractis confluentibus v. solitariis sæpe imbricatis usque ad 2 cm. latis; hymenio pallide ochraceo ex dentibus 4 mm. longis triangulari-compressis formato; sporis non visis.

Hab. parasitice ad truncos Theæ sp. lignum flavum reddens, Uda Pussellawa, Ceylon. — Initio albus et mollis dein coriaceus, pallide ochraceus, rubido-tinctus, late ochraceo-zonatus, minute tomentosus et radiatim rugulosus, intus albus, margine in sicco curvato.

3. **Irpex Galzini** Bres., Fungi gall., Ann. Mycol., VI, (1908) p. 42. 1448
 — Late effusus, crustaceo-adnatus, albidus, mox stramineus et in vetustis fuscescens, ambitu pruinoso-subfimbriato; e poroso-dædaloido dentatus, dentibus bene distinctis, usque ad 4 mm. longis, spathulatis vel subulatis, rarius apice fimbriatis; sporis hyalinis, cylindræis, curvulis, $4\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$ \approx 1 - $1\frac{1}{2}$; basidiis clavatis, 12-15 \approx $3\frac{1}{2}$ -4; hyphis subhymenialibus tenuibus; hyphis contextus tenacibus, crasse tunicatis, $2\frac{1}{2}$ -3 μ . cr.

Hab. ad truncos Juniperi, Aveyron Galliaë. — Legit cl. GALZIN cui jure meritoque dicata species. Genesi *Irpici obliquo* proximus, a quo notis micrologicis præcipue distinguitur.

4. **Irpex holoporus** (Pers.) Sacc. et Trav., Syll. XIX p. 981, *Polyporus holoporus* Persoon, Mycol. europ. I, p. 107, tab. VI, fig. 3-4. 1449
— Pallens effusus, subiculo vix ullo, tubulis depressis, parallelis, apice incis, inæqualiter prominulis, laminosis.

Hab. ad ligna subcariosa in Germania, raro. — Ex tubulis decumbentibus glabris fere solis constitutus. — Habitus *Irpicis* potius quam *Poricæ*.

5. **Irpex subcoriaceus** (Murrill) Sacc. et Trott., *Cerrenella subcoriacea* 1450
Murrill, North Amer. Fl., IX, Pt. II (1908) p. 74. — Pileo coriaceo, satis flexibili, effuso-reflexo, parte reflexa dimidiata, imbricata, distincte lateraliter connata, 1-2 \approx 2-5 \approx 0,3-0,7 cm.; superficie parum zonata, minute tomentosa vel glabra, atro-castanea; margine ex integro lobato, badio, tomentoso, tenui; contextu tenui, usque ad 1 mm. cr., castaneo, molli-fibroso; tubulis reviviscentibus, 2-4 cm. long., castaneo-umbrinis, intus pulveraceis, hymenio irregulari, dædaleo-irpiciformi, lacunis 1-2 in quoque 1 mm., acie tenui, firma, glutinosa, e castaneo atro-fuliginea, mox in dentes plus minus lamelliformes fissa.

Hab. ad ramos emortuos in Nicaragua (B. SHIMEK).

6. **Irpex japonicus** (Murr.) Sacc. et Trott., *Irpiciporus japonicus* Murrill, 1451
Mycologia, I (1909) p. 166, Nohara in Bot. Magaz. Tokyo, XXIV (1910) p. (10) fig. b et p. (6) f. 1. — Pileo sessili, dimidiato, conchato, imbricato, postice contextu, plerumque sterili, contiguo, 0,3-0,7 \approx 0,7-1 \approx 0,1-0,3 cm.; superficie leniter zonato, glabro, subar-genteo, in sicco pallide isabellino; margine tenui, undulato, are-scendo leniter inflexo, sub lente ochraceo; contextu albo, membranaceo; tubulis latis, irregularibus, angulosis, ætate irpiciformibus, pileo concoloribus, 1-3 in 1 mm., postice 3 mm. long., antice brevioribus, acie acuta dentata; sporis hyalinis, hyphis hyalinis, 3-4 μ .; cystidiis nullis.

Hab. in Quercu emortua prope Tokyo Japoniæ (S. KUSANO et S. NOHARA).

7. **Irpex Noharæ** (Murr.) Sacc. et Trott., *Irpiciporus Noharæ* Murrill, 1452
Mycologia, I (1909) p. 166, Nohara in Bot. Mag. Tokyo, XXIV (1910) p. (10) fig. c et p. (8) fig. 1-2. — Pileo semiresupinato, parte resupinata subcirculari, reflexa dimidiata, tenui, conchata, imbricata, 1-1,5 \approx 1,5-4 \approx 0,1-0,2 cm.; superficie zonato-sulcata, hirsuto-tomen-

tosa, avellaneo-isabellina, pallide fulvo-maculata, margine undulato, tenui concolori tomentoso, arescendo inflexo; contextu albo, tenui, flexibili; tubulis latis et irregularibus, brevibus, statu juvenili dein irpiciformibus albis v. pallide isabellinis 1-2 mm. long., 1-2 in mm., acie acuta, irregulari, cristata et dentata; sporis et hyphis hyalinis; cystidiis nullis.

Hab. in trunco Hibisci syriaci emortuo prope Kōnodai Japoniæ (S. NOHARA).

8. **Irpex Tanakæ** (Murr.) Sacc. et Trott., *Irpiciporus Tanakæ* Murrill, 1453 *Mycologia*, I (1909) p. 167, Nohara in *Bot. Mag. Tokyo*, XXIV (1910) p. (10) f. *a* et p. (6) f. 1. — Pileo sessili, conchato, imbricato, postice decurrenti, 1 ≈ 1-2 ≈ 1-0,3 cm.; superficie candida, glabra, sublevi, azona, opaca; margine tenui, integro, concolori, leniter striato, arescendo fortiter inflexo; contextu albo, membranaceo; tubulis latis, irregularibus, plus minusve radiatim confluentibus, pallide isabellinis, 1-2 mm. diam., postice 2 mm. c. long., acie decurrenti, longiorum dissepimentis irregulariter dentatis, acutis; sporis elongatis, levibus, hyalinis; hyphis hyalinis, 2-3 μ . cr.; cystidiis nullis.

Hab. in trunco *Cryptomeriæ* emortuæ, Mt. Takao Japoniæ (CH. TAMAKA).

9. **Irpex Mikhnoi** (Karst.) Sacc. et Trott., *Xylodon Mikhnoi* Karst., 1454 *Trav. Soc. Imper. Russe de Geogr.*, t. VIII (1905) pag. 62. — Effusus, marginatus, secedens, membranaceus, glabrescens, palle-scens; dentibus setiformibus, incis, inæqualibus, compressis, basi vulgo connexis, siccitate flavescentibus.

Hab. ad corticem *Betulæ levis*, prope Yamarovka Transbaicaliæ.

10. **Irpex lepidocarpus** (Karst.) Sacc. et Trott., *Xylodon lepidocarpus* 1455 Karst., *Trav. Soc. Imper. Russe de Geogr.* t. VIII (1905) p. 62. — Effusus, dein margine anguste reflexus, secedens, submembranaceus, tenuissimus, villosulus, cinereo-albus v. hyalino-incanus; dentibus setiformibus, compressis, incis, inæqualibus, flaccidis, seriatis, basi connatis.

Hab. ad corticem *Pini*, prope Yamarovka Transbaicaliæ.

11. **Irpex pellicula** (Jungh.) Bres. *Ann. mycol.* (1910) pag. 586. Ita 1456 vocanda est, teste Bres. l. c., *Poria pellicula* Jungh. — *Syll.* VI, p. 333 — et his notis dignoscenda: Pileo effuso, breviterque reflexo, tomentoso, spongioso-molli, extus intusque albo, leviter sulcato-zonato, 5-6 cm. lato, 2 cm. reflexo; dentibus spathulatis, basi

poroso-sinuosa suffultis, primitus alutaceis, dein fuscis ex hyphis hyalinis 3-7 μ . cr., apice liberis, obtusis, fuscidulis conflatis.

Hab. ad ramulos in insula Java (JUNGHUN) et Timor (TORREND). — Basidia et sporæ nulla in exempl. Jungh. et Torrend a cl. Bresadola observatis.

GRANDINIA Fr. — Syll. VI pag. 500, IX p. 215, XI p. 113, XIV p. 207, XVI p. 180, XVII p. 154.

1. **Grandinia rosea** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) p. 108. 1457
— Longe effusa, membranaceo-crustacea rosea, margine subradiato-striata, granulis subhemisphæricis c. 180-200 μ . diam.; basidiis clavatis 14-18 \times 3,5-5; sporis subglobosis v. ovoideis, intus granulatis, hyalino-roseolis, 1-guttulatis, 4-5 \times 4.

Hab. ad cortices arborum, Amani Usambara Africæ.

2. **Grandinia sulphureo-ochracea** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) p. 108. 1458
— Crustaceo-effusa, usque ad 1,5 mm. crassa, sulphurea dein subochracea, ambitu nuda, dein rimoso; granulis subhemisphæricis c. 200 \times 140-180; basidiis clavatis; sporis ovoideis v. ellipsoideis, hyalinis, subfuscidulis, 4-5 \times 4.

Hab. in ligno vetusto, Amani Usambara Africæ.

ODONTIA Pers. — Syll. VI p. 506, IX p. 216, XI p. 113, XIV p. 208, XVI p. 180, XVII p. 156.

1. **Odontia calcata** Britzelmayr, Material. Hymenomyc. (1897) p. 14, 1459
tab. 696, fig. 104. — Alba, albo-calcea, non flavida, opaca, subimmarginata; dentibus inæqualiter distantibus, apice parum incisus; sporis hyalinis, uniguttulatis, 6 \times 3.

Hab. ad caudices arborum vetustarum prope Oberstaufen.

2. **Odontia palumbina** v. Höhn., in Ergeb. Bot. Exp. Südbras. 1901, 1460
Eumyc. et Myx. Denk. k. Ak. d. Wiss. Wien Bd. LXXXIII (1907) Extr. p. 10, tab. I, fig. 2. — Subiculo membranaceo, levi, ex griseo-ardesiaco subviolascens; aculeis subcrebris, obliquis, cylindræis, sæpe subtruncatis, obtusis, 300-350 μ . long., basi pallide rubro-brunneis apice pallidioribus, ibique uno v. pluribus ciliis tenuiter tunicatis, breviter septatis, usque ad 70 \times 7 donatis; cystidiis numerosis, asperulis, acutis, crasse tunicatis conoideo-fusoides, sæpe immersis, superioribus late emergentibus, etiam in subiculo adstantibus, 40 \times 8; sporis minutis, hyalinis, ovoideis, 1-1,5 \times 1.

Hab. ad truncum putrem Sao Paulo, Santos Raiz da Serra
Brasiliæ.

3. *Odontia cristulata* Fr. — Syll. VI, pag. 506. — var. **tropicalis** 1461
Speg., Ann. Mus. Nac. Buenos Aires t. XVII (1908) p. 115. —
A typo differt statura minori, verrucis minoribus et ambitu angu-
ste albescente.

Hab. ad ramulos decorticatos putres Ilicis paraguayensis
in dumetis circa S. Pedro Rep. Argentinæ.

Fam. 4. *Thelephoraceæ* PERS. *)

1. *Eu-Thelephoreæ*

Cl. v. HÖHNEL et LITSCHAUER (in Wiesner Festschr. Wien 1907)
exhibent conspectum analyticum generum *Thelephoracearum europæa-
rum* (resp. *Corticacearum*) quem libenter offerimus:

I. Sterigmata inflata v. globoso-conica

A Glæocystidia nulla

B Glæocystidia adsunt

→ *Tulasnella* Schröt.

→ *Glæotulasnella* v. H. et L.

II. Sterigmata subulata.

A Contextus stratum medium compactum; sporæ hyalinæ; fungus sæpe pilea-
tus, secedens.

1. Hymenium cystidiis et setulis carens.

Stereum Fries

2. Hymenium cystidiis præditum.

Lloydiella Bres.

3. Hymenium setulis præditum,

Hymenochæte Lév.

B Contextus laxus; fungus sæpius resupinatus.

a) *Sporæ hyalinæ.*

α Hymenium superficie non flocculoso-spinulosum.

1. Cystidia et glæocystidia nulla.

Fungus initio scutellatus v. disciformis.

Cytdia Quéf.

Fungus semper effusus.

*) De hac familia perdifficili multa scripserunt cl. ab. BRESADOLA et BOUR-
DOT, v. HÖHNEL et V. LITSCHAUER et præter species novas, quas attulimus, sy-
nonyma plurima emendaverunt. — Ex quibus nonnulla attulimus; cetera in
operibus citatorum auctorum quærat studiosus.

Fungus initio endophleus; basidia e fundo orientia,
non parallele stipata.

Vuilleminia Maire

Fungus epiphleus; basidia parallela.

Contextus hyphæ disjecte ramosæ apicibus cuspidatis.

Asterostromella v. H. et L.

Contextus normalis.

Corticium Pers.

2. Glæocystidia adsunt.

Glæocystidium Karst.

3. Glæocystidia et cystidia fusioidea emergentia (Peniophoræ) adsunt.

Glæopeniophora v. H. et L.

4. Cystidia Peniophoracea tantum.

Cystidia singula.

Peniophora Cooke

Cystidia in fasciculos juncta

Scopuloides Masee

5. Pseudophyses aut dendrophyses adsunt v. ambæ simul.

Aleurodiscus Rab.

β Hymenium superficie flocculoso-spinulosum.

1. Spinuli hymenii ex dendrophysibus fasciculatis constantes.

Dentrothele v. H. et L.

2. Spinuli hymenii ex hyphis parallele fasciculatis constantes.

Epithele Pat.

b) Sporæ coloratæ.

1. Sporæ leves.

α Cystidia nulla.

Sporæ viridi-olivaceæ; fungus gelatinosus.

Aldrigea Masee

Sporæ e flavo brunneæ.

Coniophora Fr.

β Cystidia adsunt.

Sporæ e flavo brunneæ.

Coniophorella Karst.

Sporæ violaceæ.

Hypochnella Schöt.

2. Sporæ asperulæ v. spinulosæ.

α Cystidia adsunt.

Tomentellina v. H. et L.

β Cystidia nulla.

Tomentella Pers.

CRATERELLUS Fr. — Syll. VI p. 514, IX p. 218, XIV p. 212,
XVI p. 181, XVII p. 160.

1. **Craterellus Pogonati** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 1462
p. 218. — Pileo membranaceo, sessili v. stipitato, irregulari, 2-4
mm. lato, minute tomentoso, albo; hymenio æquali, pallide cre-
meo-flavo; stipite nullo v. laterali v. excentrico, angusto tomen-
tosulo v. sæpe glabro ob hymenium decurrens.

Hab. ad terram inter Pogonatum alpinum, South Wind-
sor, Connecticut Amer. bor. (C. C. HAMMER).

2. **Craterellus verrucosus** Masee, Kew Bull. n. 7 (1906) p. 256. — 1463

Pileo membranaceo, infundibuliformi, deorsum in basim stipitifor-
mem producto, fuligineo, dense verrucoso, 3-4 cm. lato, 5-7 cm.
alto; hymenio infero venoso-corrugato, livido; sporis subglobosis,
hyalinis, glabris, $8 \approx 6-7$.

Hab. gregarius ad terram prope Penang Hill Asiæ (RIDLEY).
— Habitus *Crat. cornucopioidis* Pers. sed complurimis characteri-
bus satis diversus.

3. **Cratarellus nucleatus** Schröder E. A., Centralbl. f. d. ges. Forst- 1464
wesen, XXXIV (1908) pag. 396, 1 fig. — Ab affini *Cr. clavato*
differt hymenio brunneo, pileo minori et numquam infundibu-
liformi.

Hab. ad terram in silvaticis siccioribus in Germania. — Amat
loca sicca nec uda ut *Cr. clavatus*.

4. **Craterellus clavatus** (Pers.) Fr. — Syll. VI, pag. 519. — Teste 1465
Jacobasch (Mitth. Thür. bot. Ver. N. F., Heft XIII-XIV (1899)
p. 123) hæc species gen. *Cantharello* est vere adscribenda.

THELEPHORA Ehr. — Syll. VI p. 521, IX p. 220, XI p. 115, XIV
p. 212, XVI, p. 182, XVII p. 160.

1. **Thelephora diamesa** Ricker, A List Philipp. Fungi, in Philipp. 1466
Journ. of Science, I, Suppl. IV (1906) p. 284. — Pileo infundi-
buliformi, glabro, coriaceo, margine lobato, 2-4 cm. lat., ad me-
diam v. tertiam partem satis abrupte in stipitem cavum, 2,5 cm.
longum, tenuato, vegeto flavo-citrino, sicco incarnato; hymenio
glabro, levi, vegeto aurantiaco, sicco fulvescente; sporis globosis,
hyalinis, 2,5-3 μ . diam.

Hab. ad terram udam in silvis Lamao prov. Bataan Luzon
ins. Philipp. (MERRILL).

2. **Thelephora Höhneliana** Bres. in v. Höhnel, Ergebn. bot. Exp. Süd- 1467
bras. 1901, Eumyc. et Myx., in Denk. k. Ak. d. Wiss. Wien Bd.
LXXXIII (1907) pag. 10. — Late effusa, densissime cæspitosa,
parva vix 3 mm. alta, a basi ramosissima, fusco-subpurpurea ra-
mis subcompressis, glabris, dichotome divisis, apice subfimbriato,
albo; sporis globosis, luteo-fuscis, asperulis 8-9 μ . diam. vel $9 \approx 8$,
hyphis contextus ramorum 3-4 μ . cr.

Hab. ad corticem arboris cujusdam prope Sao Paulo Brasiliæ.

3. **Thelephora pulvinulata** Speg, An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 1468
(1909) p. 276. — Cæspitibus quandoque subglobosis quandoque e
latere compressis sublinearibus, 1-5 cm. long., 1-2 cm. lat., 1,5 cm.
alt., e laminulis subflabelliformibus tenuibus apice crebre laciniato-

fimbriatis constipatis anastomosantibusque efformatis; sporis ellipsoideo-ovatis, leniter inæquilateralibus, 4-5 \approx 2-3, levibus, hyalinis.

Hab. ad truncos ramosque putrescentes in silvis secus Rio Caramillo, Salto, Argentina.

4. **Thelephora Serrei** Pat. et Har., Bull. Soc. Myc. de Fr., XXII 1469 (1906) p. 116. — Terrestris; alba, e mycelio candido floccoso terram conglobante orta, erecta, densissime gregaria, plus minus conata, stipiti cylindræo glabro; rigido, in laminas cuneiformes, erectas apice plus minus incisas sæpe confluentes, molem spongiformem efformantes, abeunti; hymenio cystidiato amphigeno, e basidiis minutis unicellularibus tetrasporis formato; sporis hyalinis, ovoideis, levibus, 4 \approx 3; trama homogœnea dura ex hyphis gracilibus circiter 3 μ . cr., dense approximatis, longissimis.

Hab. ad terram in ins. Java (P. SERRE).

5. **Thelephora spadicea** Bres. in v. Höhnelt, Ergeb. bot. Exp. Südbras. 1901 Eumyc. et Myx. in Denk. k. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. LXXXIII (1907) p. 9. — Cæspitosa, e basi ramosissima, rarius trunco gracili, 5-12 mm. longo, 1 mm. crasso, prædita, spadiceofusca, 6-8 cm. alta; ramis verticillatim repetito-ramosis, teretibus e farcto subcavis, apice acuminatis, ruguloso-scabris; sporis globosis, luteo-fuscis, scabriusculis, 6-8 μ diam.; hyphis contextus fulvis, 2 $\frac{1}{2}$ -3 μ . cr.

Hab. ad radices in aqua immersas prope Sao Paulo Brasiliæ. — Habitus *Lachnocladii* sed sporis coloratis ad *Thelephoras* du-cenda.

6. **Thelephora tuberosa** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires, t. XIX 1471 (1909) p. 276. — Pileis obconoideo-infundibuliformibus 30-60 mm. diam. et alt., tenacibus rigidis 2-4 mm. cr., superne fuligineis v. atro-fuscis obsolete concentricè zonatis, hinc inde irregulariter scrupulosis sæpeque plagulis velutinis vel hirsutis ornatis, margine sensim attenuatis, rectis, erosulo-repandis, pallidioribus, inferne (hymenio) levissimis vel leniter undulatis, primo albis vel subcæsiis serius pallide ochroleucis; stipitibus breviusculis crassis, 15-40 mm. long., 5-15 mm. cr., apice linea callosa sinuosa abrupte ab hymenio limitatis, subteretibus rectis v. flexuosis ubique glabris v. deorsum subsquarruloso-velutinis, sordide fusco-fuligineis e tubere irregulariter ex ovato subgloboso 40-60 mm. diam., sordide atro, undulato-subnodoso fultis; carne pilei et stipitis alba compacta fibrosa, tuberis subsuberosa friabili etiam alba; sporis non visis.

Hab. in humo et terra ad cavitates truncorum cariosorum in

silvis prope Frauán, Misiones Argentinae. — Species eximia *Thelephora caperata* Fr. cognata, sclerotio tuberiformi distincta ac mox dignoscenda.

7. *Thelephora uliginosa* Boud. Bull. Soc. Mycol. XXI (1905) p. 71, 1472 pl. III, fig. 3. — Pileo applanato, sessili vel breviter stipitato, plano v. subrevoluto, supra hirsuto-squamuloso, squamis pilis aggregatis cinereo-fulventibus formatis, margine subnudo, paululum lobato, vix fimbriato; hymenio levi, cinereo-purpurascete, parce longitudinaliter impresso; carne concolore; sporis irregulariter rotundatis 7-10 μ . cr., pallide fuligineo-purpureis, verrucosis, verrucis curtis, crassis acutiusculis.

Hab. ad humum in turfosis Java Galliae (HETIER). — *Th. laciniata* proxima; 2-4 cm. lata, caespitosa, sessilis, pileolis imbricatis cinereo-fuliginosis, squamulis praedita.

8. *Thelephora viridula* Bres., Ann. Mycol. V (1907) p. 240. — Vi. 1473 *viridula*, caespitem 2 cm. altum, latumque efformans, coriaceo-mollis, erecta, basi connata vix stipitata; ramis complanatis, parum ramosis, pruinatis, apice dilatato-subfimbriatis; basidiis clavatis, 25-30 \times 8-9; sporis regularibus, uno latere saepe depressis, fuscidulis, levibus, 8-10 \times 7-8; hyphis subhymenialibus, 3-4 raro 5 μ . crassis.

Hab. ad terram in insula Java (HEINRICHER). — Forma ad *Thelephoram diffusam* Fr. accedit.

9. *Thelephora scabra* Berk. et Curt., Fungi in Un. St. Expl. Exped. 1474 (1838-1842) p. 200, t. unica, f. 6. — Albida, 3 cm. alta; pileo anguste flabellato-diviso, furcato-lobato, granulato-scabro; hymenio striato, glabro.

Hab. ad terram Ovolau insul. Fiji. — Affinis *Th. Schweinitzii* Peck sed pileo granulato-scabro dignoscitur.

10. *Thelephora penicillata* (Pers.) Fries. Ita vocanda *Thelephora spiculosa* 1475 Fr. — Syll. VI, pag. 539 — quia hac est posterior. — Sec. v. Höhnel et Litschauer huc ducendæ essent species: *Thelephora spiculosa* Fr., *Th. mollissima* Pers., *Th. crustacea* Sch., *T. umbrina* Pers., *Merisma cristatum* Pers. et var. *fuscum* Alb. et Schw., *Th. cristata* Fr., *Sebacinia laciniata* [Bull.] Bres., *Thelephora sebacea* Pers. et *Sebacinia incrustans* Tul.

11. *Thelephora truncata* (Corda) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 946. 1476 *Merisma truncatum* Corda Icon. fung. V, p. 82, t. X, f. 78. — Affinis, ut videtur, *Thelephora palmata*; basidiis brevissimis, truncatis, apice sterigmata quaterna filiformia, longa gerentibus; sporidiis

ovoideis, 8 μ . long., episporio crasso, flavo, verruculis obtusis, hyalinis consperso.

Hab. in silvis in Bohemia. — Species imperfecte cognita.

WIESNERINA v. Höhn., in *Ergeb. Bot. Exp. Südbras.* 1901, *Eumyc. et Myx.*, Denk. k. Ak. d. Wiss. Wien Bd. LXXXIII (1907) p. 7, tab. I, fig. 1 (Etym. a cl. botanico vindobonensi prof. J. WIESNER). — Hemisphærica, superficialis, basi attenuata insidens. Hymenium superum. Eubasidia 2-4 sterigmatibus prædita. Cystidia numerosa e fungi basi orientia, alte emergentia, prælonga, lanceolata, asperula, fungillum setosum reddentia. Sporæ hyalinæ, leves, uniloculares. — Pro familia perexiguum genus.

1. **Wiesnerina horrida** v. Höhn. l. c. p. 7, tab. I, fig. 1. — Regulariter gregaria, superficialis, hemisphærica, alba, subtus in basim 35 μ . longam, 70 μ . latam attenuata, 200 μ . alta, 320 μ . lata; contextu basilari tenui, minute cellulari; hymenio superiori, subhemisphærico; eubasidiis 2-4 subinde 4-5 sterigmatibus tenuibus acutis præditis; cystidiis numerosis lanceolatis v. cylindræis, asperulis deorsum attenuatis, sublevibus, 170 \approx 17, longioribus e fungi basi orientibus; sporis ellipsoideis, basi acutato-apiculatis, tenuibus, 7-8 \approx 3-3,5, hyalinis, levibus.

Hab. in foliis siccis arboris cujusdam, Sao Paulo in silvis prope Alto da Serra Brasiliæ.

BRESADOLINA Brinkmann, *Ann. Mycol.* VII (1909) p. 289 (Etym. a cl. mycologo italico Ab. JAC. BRESADOLA). — Receptaculum subcarnosum v. coriaceum rectum, infundibuliforme v. subturbinatum, medio stipitatum. Hymenium inferum, planum v. tenuiter costatum; sporæ et cystidia hyalina et levia. Fungus terrestris. Huc spectat: *Bresadolina pallida* (Pers.) Brinkm. l. c. (= *Thelephora pallida* Pers., *Syll.* VI, pag. 527) et forte quoque *Thel Sowerbei*, *Th. multizonata*, *Th. tuberosa*, *Th. undulata*.

CLADODERRIS Pers. — *Syll.* VI p. 547, IX p. 222, XVI p. 185, XVII p. 163.

1. **Cladoderris funalis** P. Henn., *Engl. Jahrb.* XXXVIII (1905) p. 120. 1478 — Pileo sublateraliter stipitato subflabellato, lobato-fisso, in ramulos palmatifidos, anastomosantes partito, superne subfunali-fibroso, cinereo-alutaceo, margine fimbriato-lobato, c. 3-6 cm. dm.; stipite plus minusve incrassato, subcompresso, striato ruguloso, *Syll. fung.* XXI (VII-1911)

cinereo, basi sæpe bulboso, sublignoso, usque ad 3,5 cm. longo, 1 mm. crasso; hymenio cinereo alutaceo pruinoso, costis obtusis radiato-ramosis, palmatifidis, decurrentibus; sporis ellipsoideis, levibus, hyalinis, 6-8 \times 5,5-6.

Hab. ad terram, Victoria, Kamerun Africae (WINKLER).

2. **Cladoderris Roccati** Mattiolo, *Annali di Botan.* VII (1908) p. 144, 1479
Il Ruwenzori (1909) *Fungi* p. 14, tab. II, fig. 1-6. — Hymenio avellaneo-umbrino, stipitem versus nigrescente, costis ramoso-dendroideis, numerosissimis, ubique verrucosis minutis (0,5-1 mm) irregulariter diffusis, conicis v. teretiusculis instructo; atque ut in Auricularineis perennantibus, ex stratis suprapositis, non bene sejunctis, constituto, strato exteriori basidiophoro, 50 μ . alt.; sterigmatibus quatuor; cystidiis claviformibus apiculatis, membranis validissimis, splendentibus; sporis minutis, ovatis, 5-6 \times 3-4.

Hab. in silvis Nakitavæ ad 2652 m. c., vallis Mobuku Africae austr. — Superficies superior velutina, ad marginem avellaneo-umbrina, basim versus fere atro-purpurea, costis alato-fimbriatis notata.

STEREUM Pers. — *Syll.* VI pag. 551, IX p. 222, XI p. 119, XIV p. 215, XVI p. 186, XVII p. 163.

1. **Stereum aratum** Pat., *Bull. Soc. Myc. Fr.* XXIII (1907) p. 72. — 1480
 Pileo sessili, dimidiato, rigido, 10 cm. longo, 15 cm. lato, applanato, semiorbiculari, ochraceo-rubro, minute villosa, demum glabra, sulcis numerosis signato, confertis, antice angustis postice latioribus; margine recto, tenui, integro v. inciso lobato; superficie hymeniali plana, concentricè sulcata, cinerea; trama 2 mm. cr., brunneo-rubra, rigida, fragili, stratosà, crusta tenui, tecta, nigra et fragili extus superficialiter velutina.

Hab. in ligno emortuo, Indo-China (EBERHARDT). — *Ster. subpileato* Bk. affine.

2. **Stereum campaniforme** Patouill., *Bull. Soc. Myc. Fr.*, XXIV (1908) 1481
 p. 165. — Sessile, pendulum, solitarium v. confluens, 2-4 cm. lat., 15-20 mm. long., coriaceo-rigidum, campaniforme, pannosum, obsolete zonatum, rufo-olivaceum; hymenio glabrato, atro-cinereo; contextu albido.

Hab. ad truncos, Nova Caledonia (LE RAT). — *Ster. Leichkardtiano* Lév., cui proximum, hymenio pallide flavo nec nigro-cinereo, parum decurrenti et conchato distinctum.

3. **Stereum luzoniense** Ricker, *A List Philipp. Fungi in Philipp.* 1482

Journ. of Science, I, Suppl. IV (1906) pag. 283. — Subresupinatum, effusum v. elongatum et confluens; pileo suborbiculari, membranaceo-coriaceo, strigoso-hirsuto, fusco leviter zonato, 0,5-1 cm. lato; hymenio glabro, levi, cinereo; sporis globosis, hyalinis, 2,8-3,5 μ . diam.

Hab. ad truncos prostratos in M. Mariveles ad 1400 m. alt, Luzon Philipp. (MERRILL). — Videtur ex diagnosi *St. hirsuto* affine sed sporis globosis differt.

4. **Stereum papyraceum** Masee, Kew. Bull. n. 4 (1906) pag. 94. — 1483
Pileo papyraceo, sessili, convexo-plano, triquetro, postice angustato, obscure brunneo, obsolete zonato, setoso-hirto, margine acuto patente; hymenio nudo, levi, glabro, cinereo-livido, purpurascenti; sporis ellipsoideis, hyalinis, basi apiculatis, 6-7 \times 4-5.

Hab. in ligno emortuo, Kasia Hills prope Wajhain, Assam Asiæ (BUTLER).

5. **Stereum purpureum** Pers. — Syll. VI, p. 563. — var. **intricatis-** 1484
simum Karst, Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. XXVII, 4 (1905) p. 13. — Pileis effuso-reflexis, dense imbricatis, concretescentibus, azonis, villosa-tomentosis, albidis, circ. 1 cm. latis, cæspites circ. 10 cm. latis, formantibus; hymenio nudo, levi, glabro, purpurascenti badio.

Hab. in trunco prope Kuopio Fennicæ (O. LÖNNBOHM).

6. **Stereum nigrum** Britz. — Syll. XI, p. 122. — Britzelmayr, Re- 1485
vis. Hymenomyc. (1909) pag. 218. — Pileis imbricatis, superficie brunneo-nigris vel nigris, sublevibus, irregulariter undulatis, ad marginem irregulariter concentricè sulcatis; hymenio pruinoso, undulato, verrucoso, carneo, lilacino v. brunneo-lilacino; carne suberoso-lignosa, sordide brunneo-flava, brunnea, non zonata irregulariter lacunosa; massa sporarum alba; sporis 6-7 \times 3, breviter ellipsoideis, rectis v. curvulis, non guttulatis.

Hab. ad truncos pineos prope Augsburg Bavaricæ. — *Ster. rugoso* et *frustuloso* affinis species.

7. **Stereum venosulum** P. Henn., in Voeltzkow, Reise Ostafrika, III 1486
(1908) p. 18, tab. II, fig. 2. — Subresupinatum, effusum, membranaceo-coriaceum, margine liberum, tenue, recurvatum, subzonatum, albidum, sericeo-pilosum, c. 1-2 mm. latum; hymenio flavo-brunneo, subradiato-venosulo, pruinoso; basidiis clavatis; sporis subglobosis v. ellipsoideis, hyalinis, levibus, 6-10 \times 6-8.

Hab. in ramis corticatis, Fénérive Madagascar.

8. **Stereum Warneckeanum** P. Henn., Engl. Jahrb., XXXVIII (1905) 1487

pag. 120. — Pileo coriaceo, mesopode, cyathiformi v. pleuropode flabelliformi, brunneo v. castaneo, sericeo, zonato, radiatim striato, margine tenui, rigido, crenulato, 1-3 cm. diam.; stipite subteretico-compresso, sulcato, cinereo v. fuscidulo, pruinoso, 1-2 cm. longo, 1-2 mm. cr., basi bulboso usque ad 5 mm. incrassato, radicatoque; hymenio subcinereo, radiato-striatulo, pruinoso; sporis ellipsoideis v. subglobosis, 1-guttulatis, hyalinis, 4-5 \times 3,5-4.

Hab. in terra lutosa inter Graminaceas putridas, Lome Togo Africæ (WARNECKE).

9. **Stereum consobrinum** (Karst.) Sacc. et Trott., *Xerocarpus conso-* 1488
brinus Karst., Acta Soc. pro Faun. et Fl. Fenn. XXVII, 4 (1905)
pag. 6. — Late effusum, arcte adnatum, subcoriaceum; pileo sat
tenui, contiguo, nudo, glabro, ambitu similari, alutaceo-pallido,
trito gilvo-pallescente; sporis non visis.

Hab. in ligno Pini, Särkjärvi in ditione Mustialensi Fennicæ.
Xer. alneo (Fr.) sat similis species.

10. **Stereum acerinum** Pers. — Syll. VI, pag. 587. — *Aleurodiscus* 1489
acerinus (Pers.) v. Höhn. et Litsch. Stzb. k. Ak. d. Wiss. Wien
CXVI, Abt. I (1907) pag. 804. — var. **longisporum** v. Höhn. et
Litsch. l. c. p. 805, tab. II, fig. 4, *Cortic. calceum* var. *lacteum*
Thümen, Myc. univ. 807. — A typo differt sporis longioribus et
angustioribus, 12-17 \times 4-6.

Hab. in cortice arborum variarum, Sommerset-East, Promont.
Bonæ spei Africæ austr.

11. **Stereum hepaticum** Fr. Epicr. p. 550, *Thelephora hepatica* Fr., 1490
Syst. Mycol. I, p. 439, *Auricularia levis* Sow. Col. Fig. Engl.
Fungi tab. 388, f. 2. — Subimbricatum, azonum, utrinque leve,
glaberrimum, obscure rufescens.

Hab. ad truncos in Anglia. Colore et habitu proprio omnino
gaudet (Fr. l. c.) sed species prorsus dubia et a mycologis Bri-
tanniæ non recognita.

LLOYDIELLA Bresadola. — Syll. XVI p. 1117.

1. **Lloydia papyracea** (Jungh.) Bresad. Ann. mycol. (1910) p. 588. 1491
Ita vocanda *Thelephora papyracea* Jungh. — Syll. VI, p. 543. —
Cystidia 90-120 \times 7-12; hyphæ hymenii 2-6 μ . cr.

HYMENOCHÆTE Lév. — Syll. VI pag. 588, IX p. 227, XI p. 122,
XIV p. 217, XVI p. 188, XVII p. 166.

1. **Hymenochæte cinnabarina** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 1492

p. 120. — Resupinato-effusa, membranacea, cinnabarina dein fuscidula, margine pallido, hymenio subruguloso, velutino-setuloso; setulis subulatis, flavidulis usque ad 150 μ . longis, 4-5 μ . cr., hyphis septatis ramosis, flavo-brunneis, 4-5 μ . cr.; sporis ellipsoideis v. ovoideis, hyalinis, 4,5-5,5 \times 2,5-3.

Hab. ad cortices putres, Bipindi, Kamerun Africae (ZENKER).

2. **Hymenochæte kwangensis** P. Henn. in Fl. du Bas- et Moy.-Congo. 1493 *Hym.*
Ann. Mus. du Congo, II, fasc. II (1907) pag. 97. — Resupinata, *villosa* (Bres.)
rotundata, marginata v. effusa, subviolaceo-tabacina, velutina, mar- *Bres., 600*
gine pallidiori; hymenio levi dein rimoso, setulis densis, lanceo-
latis, ferrugineo-violascentibus, apice obtusiusculis, subhyalinis, in-
tus granulatis, 60-80 \times 10-12; basidiis clavatis, subviolaceis, 4-5 μ .
cr.; sporis subglobosis, subviolaceis, 4-5 μ .

Hab. ad cortices arborum, Kisantu, Congo Africae, majo 1906
(VANDERYST).

3. **Hymenochæte villosa** (Lév.) Bresad. Ann. mycol. p. 588. — Ita 1494
vocandum *Stereum villosum* Lév. — Syll. VI, p. 561. — Setulæ
fulvæ, 29-45 \times 4-7, hyphæ contextus 2,5-4, raro -5 μ . cr.
4. **Hymenochæte nigricans** (Lév.) Patouill., Bull. Soc. Myc. Fr., XXIII 1495
(1907) p. 75. — Ita vocanda *Thelephora nigricans* Lév., seu *Ste-*
reum nigricans Sacc. — Syll. VI, p. 561.

ASTEROSTROMA Masee — Syll. IX p. 236, XI p. 128, XIV p. 223,
XVI p. 193. *asterostrom*

1. **Asterostroma cellare** P. Henn., Verh. Bot. Ver. Prov. Brandb., 1496 *tomato-*
4 (1908) p. 135. — Pulvinatum v. effusum, crustiforme, pannoso- *sum (Schw.)*
coriaceum, griseum, flavum v. ferrugineo-brunneum, siccum valde *Bres.*
fragile; cystidiis copiosis 3-6-radiato-stellatis, radiis subulatis, raro
furcatis, 10-60 \times 2-3,5, flavo-brunneis; sporis ellipsoideis e hyalino
flavidis, 5-6 \times 3-4, levibus.

Hab. ad ligna putrescentia in cellis vinariis et latrinis Berolini.

2. **Asterostroma andinum** Pat. — Citatum in Syll. XIX, p. 128, adest 1497
jam descriptum in Syll. XI, p. 128.

CORTICIUM Fr. — Syll. VI pag. 603, IX p. 230, XI p. 124, XIV
p. 219, XVI p. 189, XVII, p. 168.

1. **Corticium Bresadolæ** Sacc. et Trott., *Corticium viride* Bres. (non 1498
Preuss) apud v. Höhn. in Œst. bot. Zeitsch., n. 12 (1904) et v. Höhn.
et Litschauer Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien CXVI (1907) p. 836,
vix *Chloridium viride* Link. — Effusum, tenuissimum, araneosum,

immarginatum, omnino superficiale et secedens, sulphureum; hymenio minute granuloso; basidiis fasciculatis, 10-15 \times 4-5, sterigmatibus 4, subulatis, 3-4 μ . longis; sporis late ellipsoideis, basi breviter lateraliter apiculatis, 5-6 \times 3-3,5, hyalinis, minute granuloso-farctis; hyphis hyalinis, parce nodoso-fibulatis, laxe intertextis, vix anastomosantibus, 4-6 μ . cr.

Hab. ad corticem dejectum salicinum in Austria inf.

2. **Corticium Coronilla** v. Höhn., Ann. Mycol. IV (1916) p. 291. — 1499

Tenuissimum, late effusum, marginem versus sensim evanescens, pulveraceo-araneosum, candidum, demum flavescens; hyphis tenuibus remote septato-fibulatis, 3-5 raro 7 μ . cr., hymenio non clauso; basidiis clavatis 4-5 μ . cr., sterigmatibus plerumque 6-8 rectis, subulatis, 2-3 μ . long., stellatim dispositis, acrogenis; sporis ellipsoideis, leviter inæquilateris, brevissime basi apiculatis, plerumque 4-5 \times 2, intus granulosis, hyalinis.

Hab. ad caudices putrescentes Pini nigricantis, Wiener Wald pr. Mödling Germaniæ. — In hymenio rarius occurrunt basidia altera prælonga, 100-110 \times 2, sursum transverse 6-8-septata et totidem sporas 4 \times 1,5 unifariam gerentia.

3. **Corticium octosporum** Schroet. in Sched., ap. v. Höhn. in Ann. 1500

Mycol. IV (1906) pag. 292. — Effusum, tenuissimum ex hyphis laxis, araneosis, albis formatum; hyphis parce ramosis anastomosantibusque, hyalinis parce nodulos fibulatos 6-8 μ . cr., gerentibus; hyphis subhymenialibus gracilibus, 4-5 μ . cr., lateraliter fasciculato-ramosis; hymenio non clauso; basidiis initio globosis, dein clavatis, 5-6 μ . cr., apice 6-8 sterigmatibus brevibus subulatis coronatis; sporis ellipsoideis deorsum acutatis, 4 \times 2-2,5, hyalinis, levibus, farctis.

Hab. in caule emortuo Cirsii arvensis prope Rastatt Germaniæ (SCHROETER).

4. **Corticium Trabuti** Pat. Add. Cat. Champ, Tunis. in C. R. du Congrès de Soc. Savant., 1908, p. 246 (1909). — 1501

Omnino resupinatum, 10 cm. long, 2-3 cm. lat., albido-ochraceo-carneolum, ceraceum, glabrum, adhærens, non rimosum, ambitu fimbriatum; contextu tenui, lacunoso, ex hyphis cylindræis 3-4 μ . cr., formato; basidiis clavatis, tetrasporis, 30 \times 6-8; cystidiis nullis; sporis ovoideo-subglobosis, rectis, 5-6 \times 3-4.

Hab. ad ramulos corticatos emortuos Rosæ, Alger (TRABUT). — Affine *C. levi* sed a matrice non secedens et diverse coloratum.

5. **Corticium albidum** Boud. Ic. mycol., I, t. 173 (Ser. VI, pag. 7, 1502

n. 521). — Albidum, aut albido cinereum, primo rotundatum, tuberculatum, dein expansum, lobatum, sat spissum, 3-5 cm. lat. et ultra, superficie tuberculosa ad marginem subradiante, siccitate rimosa, carne lutescente; basidiis clavatis 40-45 \times 11-13, tetrasporis; sporis ovoideis, albis, intus granulosis aut nebulosis, 9-12 \times 7-9.

Hab. in ramis emortuis Ulmi, Montmorency Gallia. — Colore, crassitie, superficie tuberculosa, sporisque ab affinibus dignoscitur, teste auctore.

6. **Corticium albo-cremeum** v. Höhn. et Litschr, *Æsterr. Cortic. in* 1503
Wiesn.-Festschr. (1907) p. 61. — Effusum, ex albo leniter flavo-cremeum, tenue, substrato fortiter adhærens; margine farinaceo, curvulo v. subæquali; hymenio clauso, levi, vivo craceo, sicco non rimoso; basidiis e cylindræo clavatis 5-7 μ . latis; sterigmatibus 4, subulatis, vix curvatis, 5-7 μ . long.; sporis late ovoideis vel subglobosis, basi acutiusculis 7-19 \times 5-6,5, hyalinis; tunica tenui, levi, 1- v. pluriguttulatis; contextu subhymeniali crystallis oxalati calcici farcto; hyphis irregularibus 8-12 μ . cr., breviter articulatis, articulis doliiformibus, leniter tunicatis, levibus, subflavidis, ad septa fibulato-nodulosis.

Hab. in ligno abietino putri prope Neuweg Wiener Wald Austria inf.

7. **Corticium anthracophilum** Bourdot, *Rev. scient. Bourbonn. et du* 1504
Centre, t. XXIII (1910) p. 7. — Effusum, adnatum, subincructans, craceo-membranaceum; margine albo, farinoso v. pubescentifibrilloso, fugaci; hymenio pallido, flavido v. subincarnato, dein crasso, duro, glebuloso v. areolato, rimoso, isabellino v. sublivescenti et pruinoso; sporis hyalinis oblongis v. oblongo-ellipsoideis, quandoque parum lateraliter depressis, non v. uniguttulatis, 6-9 \times 4-5; basidiis 30-45 \times 4,7; hyphis subhymenialibus parietibus tenuibus, 2,5-3 μ . cr., septato-nodulosis, basilaribus crasse tunicatis, rigidis, subarticulatis 3-5 μ . cr., remotius fibulato-nodulosis.

Hab. ad ligna varia combusta, Aveyron, Tarn Gallia. — *C. læto* et *hypnophilo* affinis species.

8. **Corticium Bresadolæ** Bourdot, *Rev. scient. Bourbonn. et du Cen-* 1505
tre, t. XXIII (1910) p. 6. — Late effusum, molli-membranaceum, subcarnosum, crassum separabile; subiculo fibrilloso vel pannoso, zona marginali plus minusve lata, alba; hymenio continuo v. interrupto, pulverulento, albo-cremeo, dein plus minusve carneo; sporis subsphæroideis, basi mucronulatis, 1-guttulatis, 5-7-10 \times 5-7(-9), copiosis, basidiis 18-24 \times 5-7, sterigmatibus 2-4, rectis, 4-5

μ . longis præditis; hyphis subhymenialibus parum distinctis, contextum spongiosam efficientibus, basilaribus distinctis, parietibus tenuibus præditis, nodulis fibulatis copiosis præditis, 1,5-5 μ . cr.

Hab. ad truncos Ulmi nec non Populi, Allier Aveyron Gallia. — *Corticium molli* Karst.! (non Fries), proximum.

9. **Corticium byssinellum** Bourdot, Rev. Scient. du Bourbonn. et du Centre t. XXIII (1910) p. 11. — Arachnoideo-membranaceum, tenuissimum, vix adnatum, album farinaceum; margine minute arachnoideo fibris rhizoideis prædito; sporis hyalinis, oblongis vel subcylindricis, 3-4 \times 1,5-2; basidiis 8-13 \times 3-4,5, sterigmatibus 4 rectis, 1,5-3 μ . long. præditis; hyphis tenuiter tunicatis, regularibus, laxè contextis, 2-3 μ ., fibulato-nodulosis, regularibus, hinc inde ad nodulos usque ad 5-7 μ . inflatis.

Hab. ad terram muscosam v. ad folia dejecta, Allier Aveyron Gallia. — Affine *C. byssino* Karst. et *C. centrifugo* Lév. sed distinctum.

10. **Corticium cæσιο-cinereum** v. Höhn. et Litsch., Stzb. k. Ak. d. Wiss. Wien LXVII, Abt. I (1908) p. 1116, fig. 9. — Effusum; vivum carnosum-ceraceum, sicco collabescens, farinaceum, e granuloso tenui-membranaceum, non arachnoideum, margine conformi, substrato arcte adhærens e griseo-cyaneo flavo-griseum; hymenio clauso, levi, non rimoso; basidiis paucis subclavatis plurimis ampulliformibus, 8-10 μ . cr.; sterigmatibus 2-4 tenui-cylindræis, rectis, 5-10 μ . long.; sporis globosis, basi distincte apiculatis e granuloso guttulatis, 6-8 μ . diam.; tunica tenui, hyalina, levi; hyphis levibus, indistinctis, conglutinatis.

Hab. in ligno putri, Lengerich, Westfalia, Germania (W. BRINKMANN).

11. **Corticium tomentosum-marginatum** Britzelmayer, Material. Hymen. (1895) p. 16, tab. 713, fig. 17 et 57. — Primitus ceraceum fere pellucidum, verruculosum, griseo-albidum albo-isabellino maculatum, margine albo-fibrilloso; sporis flavidis, massa sporarum pallide albo-isabellina, 10 \times 6-8.

Hab. ad lignum putre Bavariae. — *Cort. levi* affine.

12. **Corticium angulatum** Britzelmayer, Material. Hymenomyc. (1897) p. 16, tab. 719, fig. 91. — Tenue sed sat rigidum; hymenio albo, superficie lacerata, rubro, in numerosas areolas angulosas elevato, margine nullo; sporis 10-12 \times 8-9.

Hab. ad corticem arborum frondosarum prope Kaufbeuren. — *Cort. polygonio* affine.

13. **Corticium latum** Britzelmayr, Material. (1897) p. 15, Hymenomyc. 1510
tab. 717, fig. 76. — Papyraceo-membranaceum subtenue, opacum, albidum v. fere grisæo-album, hinc inde flavo-brunneo-maculatum, varie bullato-verruculosum et undulatum, margine vix fibrilloso; massa sporarum alba; sporis elongatis $8 \approx 3-3,5$, subcurvulis.

Hab. ad ligna pinea inter Hohenschwangau et Neuschwanstein, Germania. — *Cort. giganeteo* affinis species.

14. **Corticium cebennense** Bourdot, Rev. scient. du Bourbonn. et du 1511
Centre t. XXIII (1910) p. 7. — Effusum, membranaceo-pelliculosum, molle, laxè adhærens; subiculo tenui, pubescenti v. levigato; margine angusto, regulari, pubescenti, raro fibrilloso-radiato; hymenio levi et glabro, albo, dein lacteo, sicco rimoso; sporis hyalinis, cylindræis parum arcuatis, $6-9 \approx 2-2,7$, plerumque utrinque uniguttulatis; basidiis $20-34 \approx 4-5$, sterigmatibus 2-4 filiformibus, subrectis, 4-8 μ . long. præditis; hyphis hyalinis, parietibus tenuibus 2,5-4,5-6, fibulato-nodulosis, tramam laxam regularem efficientibus, basilaribus strata subparallela efformantibus.

Hab. in ligno Pini, Causse noir, Aveyron Gallia. — *Cort. subsulphureo* Karst. affine.

15. **Corticium commixtum** v. Höhn. et Litsch., Sitzb. k. Ak. d. Wiss. 1512
Wien CXVI, I (1907) p. 821, fig. 9. — Irregulariter effusum; plagas e tenui membranaceas sæpe crustaceas, obsolete limitatas, quandoque etiam ad marginem sensim attenuatas, substrato fortiter adhærentes albo-flavidas efformans; contextu crystallis oxalati calcici farcto; hymenio laxo, levi, ætate parum rimoso, plerumque pulveraceo; basidiis clavatis, fertilibus 6-8 μ ., sterilibus angustioribus; sterigmatibus plerumque 2, raro 3, crasse subulatis quandoque cylindræis, parum incurvatis, $10-12 \approx 2,5$; sporis cylindræis basi subapiculatis, 8-10 $\approx 4-6$, hyalinis, tenuter tunicatis, levibus, uni- v. parce guttulatis; hyphis indistinctis.

Hab. ad corticem Quercus in Austria, Germania.

16. **Corticium cremeo-album** v. Höhn. et Litsch., Œst. Cortic. Wie- 1513
sner-Festschrift (1907) p. 63. — Effusum tenuiter membranaceum 60-80 μ . cr., substrato fortiter adhærens, plagas ex albo subcremeo-flavas efformans; margine farinaceo, dein sensim attenuato v. subæquali, non fibroso; hymenio clauso; levi, vivo subceraceo, sicco non rimoso; basidiis clavatis 6-9 μ . latis; sterigmatibus 4 subulatis, curvulis 7-9 μ . long.; sporis subcylindræis, utrinque late rotundatis, basim versus parum attenuatis ibique minute lateraliter apiculatis, $10-14 \approx 5,5-6,5$, sæpe uni- v. parce guttulatis;

tunica tenui, levi, hyalina; hyphis irregularibus, tenuiter tunicatis, levibus, hyalinis, 4-6 μ . cr., parce fibulato-nodulosis.

Hab. in ligno putri Coniferarum prope Pressbaum in Wiener Wald Austriæ inf. — *Cort. albo-cremeo* et *Glæocyst. prætermisso* affine sed characteribus microscopicis diversum.

17. **Corticium decipiens** v. Höhn. et Litsch. Sitzb. k. Ak. d. Wiss. 1514
Wien, CXII, Abt. I (1908) p. 1116. — Effusum, tenue, e granuloso tenui-membranaceum, substrato laxè adhærens, margine æquali v. farinaceo præditum, demum sensim attenuatum, album; hymenio fere clauso, levi, parum rimoso; basidiis inflatis, clavatis, 12-14 \times 4-6; sporis ovoideis v. ellipsoideis, uno latere applanatis, apiculatis, 5-7 \times 2-3; tunica tenui, levi, hyalina, contextu homogeneo; hyphis subregularibus, laxis, levibus, tenuiter tunicatis, hyalinis, 2-4 μ . cr.

Hab. in ligno putri, Wienerwald Austriæ inferioris.

18. **Corticium Eichelbaumii** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 1515
p. 106. — Resupinato-crustaceum, roseum v. incarnatum, membranaceum, subiculo nullo; hymenio levi, glabro; basidiis clavatis; sporis ovoideis v. ellipsoideis, intus granulosus, flavo-fuscidulis, 5-6 \times 3,5-4.

Hab. ad cortices, Amani, Usambara Africae. — *Corticium roseo* affine.

19. **Corticium expallens** Bres., Fungi gall. in Ann. Myc. v. VI (1908) 1516
p. 43. — Late effusum, arcte adnatum, membranaceum, carneum vel hyalino-glaucum, expallens, albidum v. ochroleucum, margine pubescente, dilute violaceo vel purpureo-vinoso, dilutius colorato, sed demum concolori; hymenio subgranuloso haud rimoso; sporis hyalinis, oblongis, apiculo depressis, 6-8 \times 2 $\frac{1}{2}$ -3; basidiis 30-45 \times 5-7; hyphis conglutinatis, vix distinctis, basi 2 $\frac{1}{2}$ -3 μ . cr.

Hab. ad truncos Salicis albæ, St. Priest, Allier Galliæ. — *Corticium jonidi* proximum.

20. **Corticium filicinum** Bourdot, Rev. scient. du Bourbonn. et du 1517
Centre t. XXIII (1910) p. 10. — Effusum, tenuissimum, ceraceo-pelliculosum, arcte adnatum, album; hymenio continuo, in partibus incrassatis crebro rimoso, margine distincte limitato v. anguste pruinoso; sporis hyalinis, anguste oblongis, basi leniter angustatis, sæpe e latere depressis, 6-7-9 \times 3-(4); basidiis 12-15 \times 4-6; hyphis indistinctis.

Hab. ad rachidem Filicum: Pteridis aquilinæ etc., Allier Aveyron, Tarn Galliæ.

*Spores deland
non incarnate
fauces*

21. **Corticium filium** Bres., Fungi gall. in Ann. Myc. VI (1908) p. 43. 1518

— Effusum, membranaceum, laxe adhærens, subtus fibrillosum, luteum, in sicco subaurantiacum; hymenio in vegeto interdum venoso-subreticulato, in sicco levi; sporis flavidulis, obovatis $5-7 \approx 3 \frac{1}{2}-4$; basidiis clavatis, $18-24 \approx 5-6$; hyphis generatim $3-4 \frac{1}{2} \mu$. crassis, sed hinc inde inflatis ad 9μ .

Hab. ad muscos, amenta Castaneæ et frustula varia, Allier in Gallia. — Habitu et colore *Corticio hypnophilo* Karsten simillimum, sed notis micrologicis admodum diversum et insuper potius *Corticio molli* Fr. affinitate proximum.

22. **Corticium flavescens** Bres., Ann. mycol. III (1905) p. 163. — 1519

Late effusum, ceraceo-membranaceum, ex albo flavescens, margine pruinatum, album, persistens; hymenio levi, late diffracto, sporis hyalinis, obovatis, $7-9 \approx 4-5$; basidiis clavatis, $30-35 \approx 7-8$; hyphis subhymenialibus 3μ ., basalibus $4-6 \mu$. crassis.

Hab. ad corticem et ligna Pini silvestris, Lengerich Westfalix (BRINKMANN). — *Corticio alutaceo* proximum, a quo præcipue sporis obovatis non sphericis distinctum.

23. **Corticium Galzini** Boudot, Rev. scient. du Bourbon. et du Centre 1520

t. XXIII (1910) p. 9. — Effusum, tenui-membranaceum, laxe adnatum, album, farinaceum, subiculo tenui, fibrilloso-arachnoideo, margine plus minusve distincto; sporis anguste oblongis, basi attenuatis, latere vix depressis, $4-4,5 \approx 1,25-1,5$; basidiis anguste claviformibus, $11-14 \approx 2,5-3$, sterigmatibus $2-4$ angustis, rectis, præditis; hyphis parietibus tenuibus, noduloso-fibulatis, $2-3 \mu$., tramam laxam regularem efformantibus.

Hab. in ligno Pini, Mas de Tronques prope Millau, Aveyron Gallix. — *C. centrifugo* affine.

24. **Corticium geochroum** Pat., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIII (1907) 1021

p. 71. — Resupinatum, late effusum, $6-8$ cm. long., $2-3$ cm. latum, margine elevatum, sordide ochraceum plus minusve albo-cretaceo-pulverulentum, granulis confertis rotundatis parvis tectum; trama rigida, alba, stratosata, supra saturatius colorata; basidiis cylindraceis $25-30 \mu$. long., stipatis; cystidiis nullis.

Hab. ad cortices emortuos, Yut Indo-Chinæ (EBERHARDT).

25. **Corticium grammicum** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 1522

p. 106. — Resupinato-effusum, membranaceum, subiculo albo subbyssino; hymenio pallido v. flavidulo, reticulato-venosulo v. subradiato-striatulo; hyphis hyalinis $1,5-2 \mu$. cr.; sporis ellipsoideis, $2,5-3 \approx 2$.

Hab. in ligno carioso Amani, Usambara Africæ.

- 26 **Corticium incrustans** v. Höhnelt et Litsch., Z. Kennt. d. Corti- 1523
 cien, Sitzb. k. Wissensch. Wien, Bd. CLXV, Abt. I (1906) p. 1607.
 — Effusum, tenue, incrustans, ex albo rubidum, in marginem bre-
 vissime fibrillosum v. subfarinaceum sensim productum; hymenio
 clauso, vivo ceraceo, glabro, sicco non rimoso; basidiis e cylindra-
 ceo subclavatis, $20 \approx 4-5$; sterigmatibus 4, subulatis, subcurvulis,
 $2-3 \mu$. long.; sporis elongato-ellipsoideis, uno latere planiusculis,
 plerumque subcurvatis, $5-6 \approx 1,5-2$, hyalinis, levibus; contextu æ-
 quali; hyphis hyalinis, tenuiter tunicatis, levibus, $4-5 \mu$. cr. nodu-
 loso-fibulatis.

Hab. in ligno putri ? populino, prope Jajce, Bosnia.

27. **Corticium juncicola** Bourdot, Rev. scient. du Bourbonn. et du 1524
 Centre t. XXIII (1910) p. 9. -- Effusum, membranaceum, tenue,
 separabile, album, leve, margine distincto, in sicco sæpe relaxato;
 sporis hyalinis, oblongis subclaviformibus, basi acutis, quandoque
 parum arcuatis, $8-14 \approx 4-6$; basidiis subclaviformibus v. subfusifor-
 mibus, $15-24 \approx 8-10$, 2 raro 5 sterigmatibus rectis, $4 \approx 1,5$, præditis,
 in stratu hypharum parallelarum laxè distributis; hyphis cohæ-
 rentibus, parum distinctis, $3-5 \mu$. crassis; parietibus tenuibus
 præditis.

Hab. in foliis siccis Junci effusi, Mus de Barthe, Aveyron
 Galliæ. — *C. auroræ* Bk. proximum.

28. **Corticium lembosporum** Bourdot, Rev. scient. Bourbonn. et du 1525
 Centre t. XXIII (1910) p. 8. — Anguste et irregulariter effusum,
 tenui-membranaceum, laxè adnatum, albo-cremeum; margine pu-
 bescenti v. pruinoso-subfibrilloso, plus minusve expanso; hymenio
 continuo, levi; sporis hyalinis amygdaliformibus incurvatis v. sub-
 navicularibus, 1-guttulatis, $7-9 \approx 3-4$; basidiis $14-18 \approx 5-8$, sterig-
 matibus 2-4 subcylindricis præditis; hyphis parietibus tenuibus, $2-5$
 μ . cr., parum regularibus, nodulis destitutis.

Hab. ad truncum Aceris campestris, Saint-Vernin, Ave-
 yron Galliæ. — *C. centrifugo* et *udicolæ* affine.

29. **Corticium lilascens** Bourdot, Rev. scient. du Bourbonn. et du 1526
 Centre t. XXIII (1910) p. 11. — In plagulas confluentes irregu-
 lariter effusum, ceraceum, adnatum; margine pruinoso v. conformi;
 hymenio levi, parum pruinoso, non rimoso, isabellino dein are-
 scendo lilacino; sporis hyalinis, oblongo-ellipsoideis, utrinque gut-
 tulatis, $4-4,5 \approx 2-2,5$; basidiis anguste claviformibus, $18-21 \approx 4$; hy-
 phis cohærentibus indistinctis.

Hab. in trunco putri Pruni Cerasi, Château-Charles, Allier Galliæ. — *Cort. deflectenti* Karst. affine.

30. **Corticium macrosporum** Bres., Fungi gall. in Ann. Myc. VI (1908) 1527 pag 43, *Corticium acerinum* Pers. var. *macrospora* Bres., Fung. pol., p. 96. — Effusum, plagulis plus minusve elongatis, adnatum, ceraceum, albidum, ambitu similari; hymenio sub lente pruinato mox minute rimoso; sporis hyalinis, oblongis, 15-20 \times 6-9; basidiis clavatis, 4-sterigmaticis, 60-100 \times 8-12; hyphis contextus 3-4 μ . crassis, sæpe hymenium percurrentibus et emergentibus, apice bivel trifurcato (an paraphyses?).

Hab. ad ramos Pruni spinosæ in Allier Gallia. — Observantur quoque in hymenio, rarissime tamen, cellulæ basidiiformes, supra hymenium usque ad 45 μ . emergentes, quæ vix ceu cystidia considerari possunt quia nimium meteorica et quia a basidiis tantum longitudine diversa et valde probabiliter basidia sunt degenerata. E notis omnibus fungus noster species authonoma videtur, ideoque a *Corticio acerino* Pers. seorsim hic eam proponimus (Bresadola l. c.).

31. **Corticium minutissimum** v. Höhn. et Litsch., Æst. Corticieen in 1528 Wiesner-Festschr. (1907) p. 65. — Parvum, rotundato-elongatum vel irregulare 2,5 \times 1,5 mm. tenue, substrato fortiter adhærens; margine æquali, acuto; hymenio clauso, levi, pallide griseo-flavo, leviter viridi-tincto; basidiis clavatis 8-12 μ . lat.; sterigmatibus plerumque 2, raro 1 v. 3 (numquam 4 visis), cylindræis v. acute conoideis, rectis, raro curvulis, 8-12 \times 2-4; sporis ex ovoideo sphæroideis 10-16 \times 8-12; membrana tenui, hyalina, levi; contextu æquali v. minute granuloso; hyphis indistinctis, irregularibus, 3-5 μ . cr., tenuiter tunicatis, hyalinis et levibus.

Hab. ad cortices arborum Aceris, Ulmi etc., Prater prope Wien Austriæ. — Oxalato calcico parum incrustatum.

32. **Corticium niveo-cremeum** v. Höhn. et Litsch, Sitzb. k. Ak. d. 1529 Wiss. Wien, CXVII, Abt. I (1908) p. 1117. — Effusum, tenue, e granuloso tenui-membranaceum, substrato arcte adhærens, margine conformi, ex albo cremeo-flavum; hymenio clauso, levi, distincte rimoso; basidiis clavatis, 6-8 μ . cr.; sterigmatibus 4, raro 6, subulatis, rectis, 4-6 μ . long.; sporis elongato-ellipsoideis, uno latere applanatis, basi oblique apiculatis, hyalinis, tenuiter tunicatis, levibus, contentu homogeneo, 7-8 \times 3-4; hyphis irregularibus, tenuiter tunicatis, levibus, noduloso-fibulatis, 4-5 μ . cr.

Hab. in ligno fagineo putri, prope Unter-Tullnerbach, Wienerwald Austriæ inf.

33. **Corticium roseo-cremeum** Bres. in Ann. Mycol. III (1905) p. 163. 1530

— Late effusum, tenue, ceraceo-membranaceum, ex albo cremeum, maculis roseis vel roseo-lilacinis, demum evanidis, margine albo-pruinato, mox similari; hymenio levi, sub lente puberulo, haud rimoso; sporis hyalinis, oblongis, 9-13 \approx 4-5; basidiis clavatis, 24-26 \approx 6-7; hyphis contextus conglutinatis, 2 $\frac{1}{4}$ ·4 μ . crassis.

Hab. ad ramos arborum frondosarum, Lengerich Westfaliæ (BRINKMANN).

34. **Corticium subcoronatum** v. Höhn. et Litsch, Sitzb. k. d. Wiss. 1531

Wien, CXVI, I (1907) p. 822. — Effusum, tenue, mucedineum, e floccoso tenui-membranaceum, margine æquali vel sensim attenuato, laxe flocculoso, sordide albido-flavum, a substrato facile secedens; hyphis rectangule ramosis, distincte anastomosantibus, subtenui-tunicatis, levibus, hyalinis, v. subflavidis, crebre fibulato-nodulosis; hyphis subhymenialibus 4-6 μ . cr., basalibus 10 μ . cr.; hymenio non clauso; basidiis e clavato subcylindræis, 16-18 \approx 6-8, sterigmatibus 4-6, subulatis, rectis vel curvulis, 4-5 μ . long. præditis; sporis partim late ellipsoideis v. subcylindricis, uno latere applanatis, sæpe basi acuminatis, partim amygdaliformibus v. ventricoso-fusoideis, hyalinis, tenuiter tunicatis, levibus, 5-7 μ . long., 2,5-3,5 μ . latis; contentu homogeneo v. uni-pluriguttulato.

Hab. in ligno v. cortice et in Polyporo putri, Germania, Austria.

35. **Corticium submutabile** v. Höhn. et Litsch., Sitzb k. Ak. d. Wiss. 1532

Wien, CXVI, I (1907) p. 822. — Late irregulariter effusum, tenuissimum, e sordide albo-flavescens, plagulas undulatas efformans; margine æquali v. sensim attenuato; hymenio non clauso, laxo; basidiis crasse clavatis, 10-16 \approx 4-6, sterigmatibus 4, subulatis rectis 1,5-2 μ . long. præditis; sporis late ellipsoideis v. ovoideis, uno latere plerumque applanatis, quandoque fere globosis, basi acutatis 2,3-5 \approx 2-2,5; tunica hyalina, tenui, asperula fere aculeolata; sporis semper uniguttulatis; hyphis valde irregularibus, hyalinis, tenuibus, 2 μ . cr.; contextu crystallis farcto.

Hab. ad folia Palmæ in horto bot. berlinensi (P. HENNINGS).

36. **Corticium subtestaceum** Bourdot, Rev. scient. du Bourbonn. et 1533

du Centre t. XXIII (1910) p. 10. — Effusum, tenue, arcte adnatum, ceraceo-crustaceum, sub lente reticulato-perforatum isabellinum, testaceum roseum vel lilacinum demum undique rimosum;

margine pruinoso, dein conformi; sporis hyalinis, oblongis, e latere depressis v. cylindrico-arcuatis, 7-9 \times 3-4, in sicco 5-7 \times 2,5-3; basidiis 15-20 \times 5-6, sterigmatibus 2-4 præditis; hyphis subhymenialibus, 2-3 μ ., parum distinctis, basilaribus irregularibus, fibulato-nodulosis, parietibus subtenuibus, 2-6 μ ., tramam spongiosam efficientibus.

Hab. in arboribus variis, Allier, Aveyron Galliæ. — *C. incrustanti* v. H. et L. et *C. niveo-cremeo* H. et L. proximum.

37. **Corticium sulphurellum** v. Höhn. et Litsch. *Æst. Cortic. in Wiesner-Festschr.* (1907) p. 66. — Expansum, tenuissimum, substrato fortiter adhærens, margine æquali v. sensim attenuato prædito e flavo-sulphureo virescenti; hymenio levi, clauso, basidiis clavatis, 5-7 μ . latis; sterigmatibus 4, subulatis, rectis, 4-5 μ . long.; sporis globosis, hyalinis, tenuiter tunicatis, levibus 3-4 μ . diam., uniguttulatis; hyphis indistinctis, irregularibus, tenui-tunicatis, hyalinis 3-5 μ . cr., fibulato-nodulosis.

Hab. ad ligna putrida arborum frondosarum, Austria infer.

38. **Corticium tulasnelloideum** v. Höhn. et Litsch., *Sitzsb. k. Ak. d. Wiss. Wien, CXVII* (1908) Ab. I, p. 1118, fig. 10. — Effusum, tenuissimum, fere arachnoideum, e farinoso tenuissime membranaceum, substrato arcte adhærens, margine conformi vel sensim attenuato præditum, e murino plumbeum; hymenio levi, clauso; basidiis late clavatis, 6-7 μ . lat.; sterigmatibus 4, subulatis, rectis, 7-9 μ . long.; sporis ex ovoideo globosis, uno latere applanatis, basi et lateraliter apiculatis, tunica hyalina, tenui, ex asperulo subaculeolata præditis, 3,5-6 \times 3-4,5; hyphis indistinctis, conglutinatis, hyalinis.

Hab. in cortice Alni et Fagi, Lengerich, Westfalia Germaniæ (BRINKMANN)..

39. **Corticium udicola** Bourdot, *Rev. scient. Bourbonn. et du Centre* t. XXIII (1910) p. 8. — Anguste et irregulariter effusum, tenue, initio poroso-reticulatum, dein laxè pelliculosum, laxè adhærens, album dein cremeum, margine similari, vix farinaceum v. fibrillosum; sporis hyalinis, cylindræo-incurvatis, basi apiculo laterali præditis, 7-9 \times 3-4, plasmate granuloso præditis, quandoque uniguttulatis; basidiis clavatis 15-22 \times 6-7, sterigmatibus 2-4 crassis, fere cylindricis dein conoideis et parum arcuatis 4-6 \times 2-2,5 præditis; hyphis parietibus plus minusve tenuibus, 1,5-2,4 μ ., nodulis sparsis tramam distinctam plus minusve compactam efficientibus.

Hab. ad ramos putres, Tarn Galliæ. — *C. centrifugo* Lév. proxi-

mum, sed differt forma sporarum, trama minus regulari et compactiore.

40. **Corticium Henningsii** W. Herter in Kryptogamenfl. Brandenb., 1537 VI, 1 (1910) p. 90. — Ochraceo-flavum v. brunneolum, farinoso-arachnoideum, aliquot cm. extensum; basidiis 20-25 \times 5-7; sterigmatibus 4, subulatis, rectis, 4-6 μ . longis; sporis globosis v. globoso-ellipsoideis, 3-4,4 μ . long.; hyphis hyalinis, levibus, 4-6-fibulato-nodosis; basidiophoris usque 12 μ . cr.

Hab. in ramis fagineis in silva Bredower, Brandenburg (HENNING).S).

41. **Corticium Lindavianum** W. Herter in Kryptogamenfl. Brandenb. 1538 VI, 1 (1910) pag. 99. — Membranaceum, subcarnosum, suborbiculare, usque ad 1 cm. lat., flavo-brunneum, siccum rugatum; basidiis 3-4 μ . crassis; sporis e cylindraco ellipsoideis, 3-5 \times 2, hyalinis.

Hab. ad ramos fagineos (?) in silva Bredower Brandenburg (LINDAU).

42. **Corticium Wettsteinii** (Bres.) Sacc. et Trott, *Cytidia Wettsteinii* 1539 Bres. in Höhnel, Ergeb. Bot. Exp. Südbras. 1901, Eumyc. et Myx. Denk. k. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. LXXXIII (1907) Extr. p. 6. — Cupuliforme v. demum pendulo-campanulatum, centro affixum, carnosogelatinosum, gregarium, sæpe confluens, pallidum, extus pruinatum, 1-2 mm. latum; basidiis clavatis, 4-sporis, 25-30 \times 6-8; sporis hyalinis, oblongis, 9-11 \times 6-8, hyphis subhymenialibus, 2-3,5 μ . cr.

Hab. ad culmos Bambusæ prope Sao Paulo Brasiliæ. — Habitus *Cyphellæ*, sed substantia carnosogelatinosa diversa.

43. **Corticium pezizoides** Pat. — Syll. XI, p. 124. — Huc ducenda 1540 *Cytidia pezizoides* Pat. citata in Syll. XIX, p. 528.

44. **Corticium ? villosum** (Bonord.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 434. 1541 — *Trabecularia villosa* Bonorden Bot. Ztg. (1857) p. 241, t. IV, fig. B. — Subcartilagineo-gelatinosum, lateraliter adnatum, primum obovatum, ore angustato dein urceoliformi apertum, extus albo-villosum, intus flavido-carneum; hymenio sub lente poroso-reticulato, plicis microscopicis trabeculis connexis (?); sporis subcylindricis, curvatis, hyalinis (ex icone oblongis rectis!).

Hab. ad truncos putres muscosos in Germania. — Stirps vere dubia.

45. **Corticium helveticum** (Pers.) v. Höhn. et Litsch. Sitzb. k. Ak. 1542 d. Wiss. Wien, CXVII, I (1908) p. 1089; *Corticium tomentelloides*

v. Höhn. et Litsch. l. c. CXVI, I (1907) p. 824. — Ita vocanda *Grandinia helvetica* (Pers.) Fr. — Syll. VI, p. 502.

46. **Corticium inæquale** (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trott., *Glæo-* 1543
cystidium inæquale v. Höhn. et Litsch., Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, CXVI, I (1907) p. 826; *Corticium (Glæocystidium) prætermis-*
sum Karst. var. *Bourdotii* Bres. Ann. Myc. VI (1908) p. 44, sec. von Höhn. et Litsch., Stzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, CXXII, I (1908) pag. 1087. — Effusum, tenue, arcte adnatum, margine conformi v. parum farinaceo, ex albo stramineum; hymenio clauso, levi, non rimoso; basidiis clavatis 20-25 \times 5-7, sterigmatibus 4 subulatis, rectis 4-6 μ . long. præditis; sporis cylindræis, late ellipsoideis vel globosis, 5-8 \times 3,5-6, hyalinis, tenuiter tunicatis, levibus, contentu homogeneo vel guttula magna prædito; glæocystidiis immersis v. hymenio duplo longioribus et ex eo emergentibus, irregularibus v. cylindræis, apice rotundatis, 80-120 \times 6-8; hyphis irregularibus hyalinis, levibus, tenuiter tunicatis, 3-4 μ . cr., verrucis fibuliformibus præditis.

Hab. ad corticem et lignum Pini silvestris, Germania et Austria.

47. **Corticium prætermisum** Karst. — Syll. IX, p. 240. — (*Penio-* 1544
phora). — var. **Bourdotii** Bres., Fungi gall. in Ann. Myc. VI (1908) pag. 44. — Effusum, arcte adnatum, e pruinoso membranaceum, margine pruinoso dein similari, ex albo stramineum; hymenio, levi, in vetustis late rimoso; sporis hyalinis, oblongis, 6-9 \times 4-5; basidiis in fungo bene evoluto 40-50 \times 7-9; glæocystidiis cylindræis, raro subfusoides, immersis, 50-130 \times 6-12; paraphysibus (?) hyphiformibus, parum emergentibus, 3-4 μ . crassis; hyphis contextus conglutinatis, 3-4 μ . crassis.

Hab. ad ramos Fraxini et Quercus, Allier Galliæ. — Varietas hæc exacte media inter *Corticium prætermisum* Karsten et *Corticium stramineum* Bres., a quibus præcipue sporis dimensione et hyphis paraphysiformibus distinguitur. Etiam in hoc, prouti in *Corticio Brinkmanni*, *Cort. macrosporo* etc. adsunt hyphæ contextus quæ prolongantur et inter basidia ascendunt et supra hymenium paululum emergunt, prorsus formam primam conservantes, vacuæ, apice convexo vel breviter ramoso, haud incrassato, paraphyses Ascomycetum simulantes (Bresadola l. c.). Sec. von Höhnel et Litschauer 1908 hæc species non differt a *Glæocystidio inæquali* v. Höhn. et Litsch.

48. **Corticium clavuligerum** (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trott., *Glæo-* 1545
Syll. fung. XXI (VIII-1911)

cystidium clavuligerum v. Höhnel et Litschauer, Z. Kennt. d. Corticieen, Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. CXV, Abt. I (1906) p. 1603, f. 8. — Expansum, tenuissimum, margine æquali, e luride albo flavidum; hymenio fere clauso; basidiis clavatis 4-5 μ . latis; sterigmatibus 4, subulatis, rectis, 3-4 μ . long.; sporis globosis v. subglobosis, 4-5 \approx 4, hyalinis, levibus, tenuiter tunicatis, guttula margine plerumque præditis; glæocystidiis copiosis, plus minusve clavulatis, 10-30 \approx 8-14, tenuiter tunicatis, levibus, granuloso-farctis; hyphis indistinctis, irregularibus 3-4 μ . cr.; hyalinis, levibus, tenuiter tunicatis, fibulato-nodosis.

Hab. in ramis putrescentibus Populi tremulæ prope Weidlingau Wienerwald, Austria inf.

49. **Corticium coroniferum** (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trott., *Glæo-* 1546
cystidium coroniferum v. Höhn. et Litsch. Stzb. k. Akad. d. Wissensch. Wien, CXVI, I (1907) p. 825. — Effusum, ad marginem sensim attenuatum, e granuloso-farinaceo tenui-membranaceum, primum album, demum flavidulem, e substrato facile secedente; hymenio laxo, non clauso; basidiis clavatis 4-5 μ . lat., 4-8 v. plerumque 6-sterigmatibus circinnantibus e recto curvulis subulatis 4-8 μ . long., præditis; sporis elongato-ellipsoideis vel curvulis, quandoque amygdaliformibus, subtus acutatis, 4-5 \approx 1,5-2,5; contentu homogeneo; glæocystidiis plerumque paucis, cylindræis, apicem versus parum attenuatis, levibus 60-100 \approx 6-8; hyphis 4-7 μ . cr., tenui-tunicatis, verrucis fibuliformibus præditis.

Hab. in ligno putri et in cortice putri Abietis pectinatæ, prope Pressbaum in Wienerwald Austriæ.

50. **Corticium oleosum** (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trav. XIX, p. 437, 1547
Glæocystidium oleosum von Höhn. et Litsch. Stzb. Akad. d. Wiss. Wien CXVI, I (1907) p. 827, f. 12 et CXVII (1908) pag. 1091. Sec. v. Höhn. et Litsch. Ita vocanda est *Gonatobotrys pallidula* Bres. — Syll. XVIII, p. 539, observante v. Höhnel.

51. **Corticium trigonospermum** Bres. Ann. Mycol. III (1905) p. 163. 1548
— Effusum, gossypino-submembranaceum, album demum pallidum v. subcremeum, margine fimbriato; hymenio scabro, subgranuloso, haud rimoso; sporis hyalinis, triangularibus, lateribus depresso-sinuatis, 4-5 μ . diam.; basidiis clavatis, 16-20 \approx 5-6; hyphis contextus laxè congestis, fibulato-nodosis, 2 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$ μ . crassis.

Hab. ad ramos arborum frondosarum, Lengerich Westfaliæ (BRINKMANN). — Habitus *Corticii arachnoidei*, *C. centrifugi* etc., a quibus præcipue sporis triangularibus bene distinctum.

52. **Corticium Weisseanum** (Henn.) W. Herter in Kryptogamenfl. 1549

Brandenb. VI, 1 (1910) p. 100. — Arachnoideo-membranaceum, album, muscos obtegens; hyphis laxè intertextis, hyalinis, ramosis, ramulis laxis clavulatis, 15-22 \times 4-6, vertice in 2, rarius 4-sterigmata incurvata abeuntibus; sporis globosis v. subglobosis, hyalinis 4-5 μ . diam., membrana levi v. minutissime punctata.

Hab. in cæspitibus *Leucobryi vulgaris* in silvis acerosis, inter Nahmitz et Lehnin pr. Potsdam Germaniæ (WEISSE). — Inter hyphas occurrunt copiosa conidia (?) 7-10 μ . diam., umbrino-brunnea, aculeata, verisimiliter heterogenea.

53. **Corticium subacerinum** (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trav. — 1550

Syll. XIX, p. 438. — *Aleurodiscus subacerinus* v. Höhn. et Litsch., Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien CXVI (1907) p. 807, tab. II extr., fig. 5, *Cortic. acerinum* b *quercinum* W. Brinkm. Westf. Pilze, non Pers. — Irregulariter effusum, tenuiter membranaceum, distincte marginatum, arcte adhærens, candidum; hymenio glabro; basidiis clavatis 7-9 μ . cr., 4-sterigmaticis, sterigmatibus subulatis, 10-12 \times 1,5; sporis cylindræis basi oblique apiculatis, 10-14 \times 5-6, hyalinis levibus, guttulato-farctis; dendrophysibus sursum dendroideo-ramosis.

Hab. ad corticem vetustum *Salicis* et *Alni*, Lengerich Westfaliæ (BRINKMANN).

54. **Corticium apricans** (Bourd.) Sacc. et Trott., *Aleurodiscus apricans* 1551

Bourdot, Rev. scient. Bourbonn. et du Centre tab. XXIII (1910) p. 5. — Expansum, rotundatum, 2-3 mm., dein confluens, ceraceo-crustaceum adnatum sub lente pruinose, avellaneum v. isabellinum, zona marginali nulla v. tantum pruinosa; hymenio fertili; basidiis aliis clavatis 30-65 \times 8-13, 2-4-sterigmatis subulatis arcuatis præditis, aliis sterilibus obovatis, 15-18 \times 4-12 in trama varie positis et varie conformatis; aliis sterilibus angustissimis apice cuspidatis v. non; sporis ellipsoideis 12-15 \times 8-12, levibus v. obscure verruculosis; hyphis parietibus tenuibus præditis, 3-4 μ . cr., irregularibus, crebre septatis, non nodosis; hyphis mycelio similibus.

Hab. in *Calluna vulgaris*, Bouisson prope Saint-Sernin, Aveyron Galliæ. — *Aleur. aurantio* (Pers.) et *A. cerussato* (Bres.) proximum.

55. **Corticium spinulosum** (P. Henn.) Sacc. et Trott., *Aleurodiscus* 1552

? *spinulosus* P. Henn., Engl. Jahrb. XXVIII (1905) p. 107. — Resupinatum, medio affixum, rotundatum v. late effusum, membranaceo-ceraceum, margine involutum; hymenio pallido v. flavi-

dulo-aurantio, levi dein rimoso; hyphis varie crassis, hyalinis, fasciculatis v. sparse spinulosis, 60-100 \times 14-20, apice sterigmatibus 2 curvatis, 15 \times 4 præditis; sporis subglobosis v. ovoideis, 1-guttulatis, hyalinis, 4-6 μ . cr.

Hab. in ramis siccis, Amani, Usambara Africæ. — Præclara species forsan ad nov. gen. adscribenda (Henn.). — Teste cl. v. Höhnel, Fragm. Myk. VII, p. 6, huc spectat *Psilopezia mirabilis* B. et C. — Syll. VIII, p. 153 — nec non *Corticium* (*Aleurod.*) *usambarensis* Henn. — Syll. XVII, p. 168.

56. **Corticium papillosum** (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trott., *Den-* 1553
drothele papillosa v. Höhn. et Litsch. l. c., p. 820, fig. 8. — Irregulariter effusum; e tenui-membranaceo crustaceum, distincte marginatum, substrato fortiter adhærens, ex albido griseo-violaceum; hymenio clauso, epapillato, demum sæpe rimoso, ex basidiis et dendrophysibus efformato; basidiis clavatis 6-7 μ . cr., sterigmatibus 2 crasse subulatis, 8-9 \times 2 præditis; sporis ex ovoideo globosis, 9-11 \times 8-10 hyalinis, tenui-tunicatis, levibus, minute granuloso-farctis, dendrophysibus tenuibus, partim brevibus inter basidia sitis partim in processus subaculeiformes, 30-50 \times 10-15, super hymenium eminentes productis; hyphis indistinctis.

Hab. ad corticem arborum, Prater prope Wien Austriæ.

PUNCTULARIA Pat. — Syll. XIV p. 223.

1. **Punctularia tuberculosa** Pat. — Syll. XIV, p. 223. — Huc, teste 1554
C. Torrend, Bull. Soc. port. Sc. nat. IV (1910) p. 9, spectat, ut status gasterosporus, *Reticularia venulosa* B. et Curt., Sacc. Syll. VII, p. 419 (*R. venosa*).

HYMENOCHÆTE Lév. — Syll. VI p. 588, VI p. 588, IX p. 227, XI p. 122, XIV p. 217, XVI p. 188, XVII p. 166.

1. **Hymenochæte Pini** (Pat.) Sacc. et Trott., *Veluticeps Pini* Pat., Bull. 1555
Soc. Myc. Fr. XXII (1907) pag. 72. — Sessilis, dimidiata, postice decurrens, imbricata, sinuoso-undulata, margine confluens; pileo tenui, rigido, brunneo-nigro, margine albido, sulcato, 8-10 cm. lato, 1-2 cm. longo, grosse velutino; hymenio albido, processibus copiosis, confertis, conoideis, concoloribus, 120-150 μ . long., 40-60 μ . cr., hyphis stipatis apice obtusis tecto; basidiis cylindræis, valde elongatis, 2-4 sterigmatibus præditis; trama 1 mm. crassa, brunnea.

Hab. ad truncos Pinorum, in regione montana Indo-Chinae (EBERHARDT). — *Hymenoch.* (Vel.) *Berkeleyi* affinis.

LLOYDIELLA Bresad. — Syll. XVI, p. 116. — Ad hoc genus essent quoque referendæ: **Lloyd. Phylacteris** (Bull.) Bresad. in Maire, Bull. Soc. bot. Fr., LIII (1906) pag. CCIX = *Thel. Phylacteris* Bull. = *Th. biennis* Fr. — Syll. VI, p. 537. — **Lloyd. subpileata** (B. et C.) v. Höhn. et Litsch. = *Stereum subpileatum* B. et C. — Syll. VI, p. 585 — a quo non differrent *Lloydiella insignis* Bres. et (*Hymenochæte tijbodensis* Henn. = *Stereum rimosum* V, 268)

PENIOPHORA Cooke — Syll. VI p. 640, IX p. 237, XI p. 128, XIV p. 223, XVI p. 193, XVII p. 175.

1. **Peniophora amaniensis** P. Henn., Engl. Bot. Jahrb. XXXVII 1556 (1905) p. 107. — Resupinato-effusa, membranacea, usque ad 15 cm. diam., margine albido byssino; hymenio cinereo-sublilacino, pruinoso-subvelutino, dein rimoso; cystidiis subulatis, obtusis v. subacutiusculis, superne granulato-verrucosis, flavidulis, inferne substipitatis, levibus, 60-180 × 15-30; basidiis clavatis; sporis subglobo-bosis, 1-guttulatis, flavidulo-subincarnatis, levibus, 5-6 μ. diam.

Hab. ad cortices arborum, Amani, Usambara Africae.

2. **Peniophora chordalis** v. Höhn. et Litsch., Z. Kennt. d. Cortic., 1557 Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. CXV, Abt. I (1906) p. 1598, fig. 4. — Effusa, tenuissima, subcircularis, sensim in marginem producta; hymenio aperto, vivo velutino, griseo-cinerecenti, filis dense arachnoideis albis usque ad 30 μ. cr., tecto; basidiis clavatis, 6-8 μ. cr.; sterigmatibus 4, brevibus, acuminatis; sporis 5-6 × 3-4, ellipsoideis, uno latere plus minusve applanatis, hyalinis, levibus, 1- v. 2-guttulatis; cystidiis cylindraceutis, apice parum expansis, tunica tenui, hyalinis levibusque, 35-55 × 6-8; hyphis indistinctis, hyalinis, 2-4 μ. cr., tunica tenui præditis.

Hab. in cortice ? Pini, prope Auspang Austriae inf.

3. **Peniophora coccinea** v. Höhn. et Litsch., Oest. Cortic. in Wiesner- 1558 Festschr. (1907) p. 72. — Indefinita, parva, tenui, e farinoso tenui-membranacea, ad marginem sensim attenuata, pallide coccinea, lignum et corticem purpurea efficiente, primum sub peridermio dein e rimis corticis erumpente; mycelio in cortice et ligno late expanso, hyalino v. roseo, tenuissimo et indistincto; hymenio clauso, primum rubido dein rubro-griseo; basidiis angustis, inflatis, subphialiformibus, 14 × 3,5-5; sterigmatibus 2 (usque ad 4?), subula-

tis, rectis, 2 μ . long.; cystidiis longis et anguste conoideis, obtusiusculis, tenui-tunicatis, levibus, hyalinis, 8-17 \approx 3-5; sporis cylindræis v. plerumque conoideis, hyalinis, tenui-tunicatis, levibus, 3-5 \approx 1-1,5, utrinque obtusiusculis; contentu homogeneo; hyphis indistinctis, e hyalino roseolis, levibus, 2-3 μ . cr.

Hab. ad truncos Fagi silvaticæ; Kubany Böhmerwald Bohemiæ.

4. **Peniophora corsica** v. Höhnel et Litsch. Z. Kenntn. d. Corticieen, 1559 Sitzb. k. Ak. d. Wiss., Wien, Bd. CXV, Abt. I (1906) p. 1601, fig. 7. — Extensa, adpressa, tenui, coriacea 0,20-0,25 mm. cr., margine distincte, pallidiori hinc inde elevata, subtus brunneo-pilosa; hymenio avellaneo, parum striato, levi, sicco, vix rimoso; cystidiis numerosis, confertis, hyalinis, 35-55 \approx 8-12; clavatis, basi pedunculiformi-attenuatis, supra inflatis et verrucoso-incrustatis; hyphis irregularibus 3-4 μ . cr., noduloso-fibulatis; basidiis et sporis non visis.

Hab. in ramis emortuis Pistaciæ Lentisci, Giunchetto in Corsica (R. MAIRE).

5. **Peniophora crystallina** v. Höhn. et Litsch., Stzb. k. Bk. d. Wiss. 1560 Wien, CXVI, I (1907) p. 828, fig. 13. — Effusa, primum tenuissima, quandoque fere pruinosa, viva subhyalina, diaphana, sicca e sordido albo-grisea, demum crassiori, flavo-cremea, distincte rimosa; margine homogeneo vel sensim attenuato; hymenio levi, hinc inde papillosulo; basidiis clavatis 3-4 μ . cr.; sterigmatibus 4, subulatis, rectis, 3-5 μ . longis; sporis late ellipsoideis v. cylindræis, uno latere parum applanatis, subtus semper acutatis, 3-5 \approx 1,5-2; tunica hyalina, tenui, levi; contentu plerumque homogeneo; cystidiis copiosis, hinc inde aggregatis, acuminatis, tunica incrassata, aspera, incrustata, 20-45 \approx 5-9; hyphis conglutinatis, indistinctis.

Hab. ad lignum putre Fagi, Alni etc., Germania et Austria.

6. **Peniophora detritica** Bourdot, Rev. scient. du Bourbonn. et du 1561 Centre t. XXIII (1910) p. 13. — Effusa, interrupta, membranacea, floccosa, tenuissima, laxè adnata, alba; hymenio non continuo, sub lente reticulato-arachnoideo, maturo papillis grandinioideis ornato, margine conformi; sporis hyalinis subsphæroideis, basi apiculo præditis, 4,5-6 \approx 4-4,75, plerumque 1-guttulatis; basidiis 12-15-24 \approx 4-4,5, 2-4 sterigmatibus, 3-4 μ . longis præditis; cystidiis tenui-tunicatis, longe clavatis, obtusis, levibus, 75-100 μ . long.,

4-4,5 μ . cr., apice 7-8 μ ., 45-76 μ ., prominentibus; hyphis tenuitunicatis, septato-nodulosis, 2-4 μ ., tramam laxam efficientibus.

Hab. ad terram humosam, Allier, Aveyron, Tarn Galliæ. — *P. sublevi* (Bres.) v. H. et L. affinis.

7. **Peniophora ericina** Bourdot, Rev. scient. du Bourbonn. et du Centre XXIII (1910) p. 12. — Effusa, parum expansa, membranacea, subadhærens; subiculo albo, fibrilloso-sericeo; hymenio ceraceo, primum cremeo, vivide ochraceo, demum isabellino-fulvo, margine clariore, in sicco indurato et fere corneo, non rimoso sed sæpe irregulariter lacerato; margine albo, pubescenti v. fibrilloso-radiato demum contracto et quandoque separato; sporis oblongis subcylindræis, lateraliter parum depressis, sæpe uniguttulatis, 4,5-5-6,5 \times 2,75-3; basidiis 24-36 \times 3-5, sterigmatibus 2-4 rectis præditis; cystidiis fusiformibus tenuiter tunicatis, 40-60 \times 4-5, 15-30 μ . emergentibus, levibus v. raro apice asperulatis, inæqualiter distributis; hyphis subhymenialibus tenui-tunicatis, 2-4 μ ., erectis, arcte coalitis, basilaribus tenui-tunicatis, 4-6 μ ., tramam distinctam formantibus, nodulis fibulatis destitutis.

Hab. ad terram humosam, Ericas et Cistos quoque invadens, Saint Sernin, Bouisson etc., Aveyron Galliæ. — *Pen. levi* Burt. affinis.

8. **Peniophora fimbriata** Ranojevic, Ann. Mycol. VIII (1910) p. 375. — Applanata effusa, irregularis, hinc inde costis radiciformibus percursa, flavida dein carneo-brunnea, floccis flavidis cincta, ad 2,5 cm. lat. et 0,25 mm. cr., confluens; hymenio ceraceo ob cystidia exerta albida ruguloso, sicco plus minus late rimoso; basidiis cylindræis, apice rotundatis, 3-6 μ . lat., tetrasterigmaticis; sporis ellipsoideis, ovoideis v. reniformibus, 3,5-6 \times 1,5-3,5; cystidiis crebris, crasse tunicatis, asperulis, hyalinis v. dilute flavidis, 65-114 \times 7,5-15,5, partis emergentis tractu 68 μ . longo, sensim attenuato.

Hab. in ramis putrescentibus decorticatis Carpini Betuli et Tiliæ argenteæ prope Belgrad Serbiæ. — *Odont. fimbriatæ* in memoriam revocans.

9. **Peniophora sphærospora** v. Höhnelt et Litschauer, Z. Kennt. d. Corticieen, Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien Bd. CXV, Abt. I (1906) pag. 1600, fig. 5. — Expansa, pagina inferiore fortiter adpressa, tenui, 0.15-0,30 mm. cr., indistincte marginata, plagas albas in terra nuda efformante; hymenio clauso, levi, vivo ceraceo, sicco lacerato; basidiis clavatis, 25-35 \times 6-8, sterigmatibus 4, subuliformibus, rectis, longissimis; cystidiis numerosis, cylindræis, supra

angustatis, obtusis, tenui-tunicatis, $35-85 \times 5-8$; sporis globosis, $4-7 \mu$. cr., plerumque apiculatis, guttula magna præditis, tunica tenuissima, hyalina, levi; hyphis levibus, tenui-tunicatis, parum nodulosis, distincte anastomosantibus, nodoso-fibulatis, $4-5 \mu$. cr.

Hab. ad terram nudam, Pfalzberg prope Pressbaum in Austria inferiore.

10. **Peniophora subavellanea** P. Henn., in Voelzkow Reise Ostafrika 1565 III (1908) p. 17, tab. II, fig. 3. — Late effusa, tenuissima, emarginata, hymenio subavellaneo v. cinerescente, pruinoso, sparse verrucoso; cystidiis conoideis, hyalinis, obtusiusculis, $20 \times 5-6$; basidiis clavatis, sporis subglobosis, hyalinis, $4-6 \mu$. diam.

Hab. in ligno decorticato, Fénérive, Madagascar.

11. **Peniophora subcremea** von Höhnel et Litschauer, Z. Kennt. d. 1566 Corticieen, Sitzb. k. Akad. Wiss. Wien, Bd. CXV, Abt. I (1906) p. 1600, fig. 6. Syn. *Corticium lacteum* Rabenh. Wint., nec Fries, Fungi europ. n. 3230. — Expansa, tenui, ex albo flavida v. flavo-cremea, substrato fortiter adhærens; margine æquali, parum farinacea; hymenio clauso, glabro, vivo ochraceo, sicco non rimoso; basidiis e cylindræo clavatis, $3-4 \mu$. cr.; sterigmatibus 4, subulatis, rectis, $2-3 \mu$. long.; sporis cylindræis, $4-6 \times 1,5-2$, hyalinis, levibus; contentu æquali; cystidiis discretis, cylindræis, supra parum angustatis, obtusis, tenui-tunicatis, levibus, apice flavo-farctis, $4-6 \mu$. cr. usque ad 20μ . elevatis; hyphis hyalinis, levibus, $1,5-2 \mu$. cr., crasse tunicatis, rigidiusculis.

Hab. ad lignum Pini prope Mustiala Fennicæ (P. A. KARSTEN).

12. **Peniophora subglebulosa** v. Hohn. et Litsch., Sitzb. k. Akad. d. 1567 Wiss. Wien, CXVI, I (1907) p. 823, fig. 10. — Effusa, tenuissima, tenui-membranacea, subglebulosa, substrato fortiter adhærens, margine farinæo, sensim attenuata, e sordide alba pallide ochracea; hymenio laxo, sub lente velutino; basidiis cum sterigmatibus non visis; sporis ovoideis, tenui-tunicatis, hyalinis, levibus, $2-4 \times 1,5-2$, uniguttulatis; cystidiis globulosis apice obtusis sed non late rotundatis, basi plerumque inflatis et radiciformi ramosis, crasse tunicatis, parum incrustatis, granulosis, asperulis, $80-120 \times 10-14$; hyphis indistinctis, irregulariter ramosis, tenuiter tunicatis, hyalinis, $2-3 \mu$. cr.

Hab. ad truncos Ericæ arboreæ, Bastia Corsicæ (von HÖHNEL).

13. **Peniophora vermifera** Bourdot, Rev. scient. du Bourbonn. et du 1568 Centre t. XXIII (1910) p. 11. — Maculiformis, tenuis, arcte ad-

nata, subleprosa, sub lente breviter setulosa, albida, flavida v. alutacea; hymenio in sicco minute rimoso, margine conformi; sporis hyalinis, claviformi-fusoideis, apice obtusis v. plerumque utrinque acutatis, pluriguttulatis, arcuatis vel flexuoso-vermiformibus, 18-26 \approx 4-6; basidiis obovatis claviformibus, 18-28 \approx 6-9, sterigmatibus 4 arcuatis præditis; cystidiis numerosis, conoideis, 50-70 μ . emergentibus, crasse tunicatis, canaliculo angusto apice parum dilatato, plus minusve asperulis, 80-120 \approx 9-12, basi usque ad 22 μ . crassis, ibique pluri-radiculosis; hyphis indistinctis, basilaribus et myceliaribus tenuiter tunicatis, 2-2,5 μ ., sæpe crystallis oxalati calcici incrustatis.

Hab. ad ramos dejectos *Ericæ* arboreæ et *Callunæ* vulgaris, Aveyron Galliæ. — *Pen. subglebulosæ* v. H. et L. affinis sed sporis omnino diversa.

14. **Peniophora Chrysanthemi** (Plowr.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, 1569 pag. 282. — *Corticium Chrysanthemi* Plowr. Trans. Brit. Mycol. Soc. II (1904-1905) p. 91, tab. 6. — Albo-calcea, effusa, incrustans, indeterminata, ob matricem inæqualem irregularis; basidiis apice tunicatis, 10-15 \approx 5-6, sterigmata quaterna, raro bina, breviter ferentibus; cystidiis numerosis fusoideis, 18-25 \approx 4-5, supra fungi superficiem 10-15 μ . exertis, apice capitellatis; sporis ovoideis, crasse 1-guttulatis, 5-8 \approx 3-5, levibus, hyalinis.

Hab. ad basim caulium *Chrysanthemi* indicis culti, cui mortem attulit, King's Lynn Britannicæ.

15. **Peniophora mimica** Karst. Act. Soc. pro Fauna et Fl. Fenn., XXVII 1570 (1905) p. 5 (extr.) et apud v. Höhn. et Litsch. Sitzb. k. Akad. Wiss. Wien, CXV (1906) pag. 1563. — Primitus suborbicularis, dein confluens, adnata, tenuis, initio ambitu tenuiter albo-fimbriatula, raro fibrillosa v. filamentosa; hymenio subgrumoso, continuo, inæquali v. rugoso, pruina tenui consperso, alutaceo-pallido; basidiis clavatis 6-7 μ . lat., sterigmatibus 4 præditis 4-5 μ . long.; sporis late ellipsoideis, levibus, hyalinis, 4-5 \approx 2-3; cystidiis cylindraceis v. conoideo-elongatis, obtusis asperis, brevibus, crassiusculis, 60 \approx 10-15; hyphis hyalinis, levibus, 3-5 μ . cr.

Hab. ad lignum et corticem arborum frondosarum in regione Mustialensi Fennicæ. — *Cort. confluenti* Fr. nec non *Cort. rudi* Karst. similis.

16. **Peniophora coccinea** (Jungh.) Bresad., Ann. mycol. (1910) p. 588. 1571 — Ita nuncupanda *Thelephora coccinea* Jungh. — Syll. VI p. 546. — Cystidia hyalina, furfuraceo-tunicata, fusoideo-ventricosa, 40-

- 50 × 9-10; contextus hyphæ conglutinatæ, 2-4 μ . cr. Basidia et sporæ non visæ.
17. **Peniophora velutina** (DC.) Cke — Syll. VI, p. 644 — Synonyma 1572
sunt: *Corticium Eichlerianum* Bres. — Syll. XVII, p. 173 — *Corticium decolorans* Karst. — Syll. VI, p. 615 — *Xerocarpus alneus* Karst. quod *Peniophora Karstenii* Masee — Syll. IX, p. 238.
18. **Peniophora crocea** (Karst.) v. Höhn. et Litsch., Sitzb. k. Akad. 1573
d. Wiss. Wien, CXV (1906) pag. 1598. Ita vocanda *Coniophora crocea* Karst. — Syll. VI, p. 651 — a qua non differret *Corticium læticolor* Karst. — Syll. VI, p. 636.
19. **Peniophora fuispora** (Schroet.) v. Höhn. et Litsch., Ann. Myc. 1574
col. IV (1906) pag. 289. — Ita vocandus *Hypochnus fuisporus* Schroet. — Syll. VI, p. 654 — sec. auct. citatos.
20. **Peniophora Ægerita** (Hoffm.) v. Höhn. et Litsch., Stzb. k. Ak. 1575
d. Wiss. Wien, CXVI, I (1907) pag. 814 (= *Peniophora candida* Lyman, Science N. S. XXV (1907) pag. 290). — Ita vocandum *Sclerotium Ægerita* Hoffm. seu *Ægerita candida* Pers. — Syll. IV, p. 661 et XIV p. 1174.
21. **Peniophora carneola** (Bres.) v. Höhn. et Litsch., Æst. Cortic. in 1576
Wiesner-Festschr. (1907) p. 70 = *Glæocystid. argillaceum* (Bres.) von Höhn. et Litsch. — Ita vocanda *Kneiffia carneola* Bres. — Syll. XVII, p. 178.
22. **Peniophora Lycii** (Pers.) v. Höhn. et Litsch., Æst. Cortic. in Wies- 1577
ner-Festschr. (1907) p. 73. — Ita vocandum *Corticium Lycii* (Pers.) Cooke — Syll. XI, p. 127 — a quo non differunt, testibus von Höhn. et Litsch. *Peniophora cæsia* Bres., *Corticium ramosissimum* Pass., *C. Bupleuri* R., *Thelephora Friesii* Grog.
23. **Peniophora chætophora** (v. Höhn.) v. Höhn. et Litsch., Æster. 1578
Cortic. in Wiesner-Festschr. (1907) p. 71. — Ita vocandus *Hypochnus chætophorus* v. Höhn. — Syll. XVII, p. 186.
24. **Peniophora Molleriana** (Bres.) Sacc. — Syll. XI, p. 128. — Sy- 1579
nonyma esset *Peniophora Roumeguèri* Bres., sec. von Höhn. et Litsch. (1908).
25. **Peniophora inconspicua** (B. et C.) Masee, Journ. Linn. Soc. XXV 1580
(1889) pag. 149, tab. 44, fig. 14. — Ita vocandum est *Corticium inconspicuum* B. et C. — Syll. VI, p. 615.
26. **Peniophora ochroleuca** (Bres.) v. Höhn. et Litsch. Stzb. k. Ak. 1581
d. Wiss. Wien, CXVII, I (1908) p. 1107, fig. 6. — Ita vocanda esset *Coniophora ochroleuca* Bres. — Syll. XVI, p. 196 — testibus auct. cit.

27. **Peniophora sublevis** (Bres.) v. Höhn. et Litsch., Sitzb. k. Ak. d. 1582
Wiss. Wien, CXII, I (1908) pag. 1088, fig. 2. — Ita vocandum
Corticium subleve Bres. — Syll. XVII, p. 171 — testibus cit. auct.
28. **Peniophora radicata** (P. Henn.) v. Höhn. et Litsch. l. c. p. 1092. 1583
Ita vocandum *Corticium radicatum* P. Henn. — Syll. XIV, p. 222
— a quo non differret *Peniophora unicolor* Peck — Syll. IX,
p. 239 — testibus auct. cit.
29. **Peniophora subtilis** (Schr.) v. Höhn. et Litsch., Ann. Myc. IV 1584
(1906) p. 290, Stzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, CXVI, I (1907) p. 99. —
Ita vocandus *Hypochnus subtilis* Schröt. — Syll. VI, p. 657.
30. **Peniophora sanguinea** (Fries) v. Höhn. et Litsch., Œster. Cortic. 1585
in Wiesner-Festschr. (1907) p. 74. — Ita vocandum est *Corticium*
sanguineum Fries — Syll. VI, p. 612 — a quo non differret *C.*
glabrum B. et C. testibus auct. cit.
31. **Peniophora sordidella** v. Höhn. et Litsch. nom. nov., Z. Kennt. 1586
d. Corticieen, Stzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. CXV, Abt. I (1906)
pag. 1605. — Ita vocandus *Hypochnus sordidus* Schr. (1888) —
Syll. VI, pag. 657 — non *Corticium sordidum* Karsten (1882)
= *Peniophora sordida* (Brinkm.).
32. **Peniophora sulphurina** (Karst.) von Höhn. u. Litschauer, B. z. 1587
Kennt. d. Cortic., Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien Bd. CXV Abt. I
(1906) p. 1573. — Ita vocandus *Hypochnus sulphurinus* (Karst.)
Sacc. — Syll. IX, p. 243 — testibus auct. cit.
33. **Peniophora byssoidea** (Pers.) von Höhn. et Litsch., Synonyma 1588
essent sec. v. Höhn. et Litsch. (1908): *Corticium lacunosum* Berk.
et Broome — Syll. VI, pag. 660 (sub *Hypochnus*) — *Corticium*
byssoideum Fries — Syll. VI, p. 652 — *Coniophorella byssoidea*
(Pers.) Bres. — Syll. XVII, p. 183 — *Hypochnus strigosus* Wallr.
β *filamentosus* Wallr. — Syll. VI, p. 660 — *Diplonema sordescens*
Karst. — Syll. IX, p. 240 — *Tomentella obducens* Karst. — Syll.
IX, p. 240 — *Hypochnus Muscorum* Schroet. — Syll. VI, p. 655
Hypoch. setosus Schr. — Syll. VI, p. 658 — *Kneiffia tomentella*
Bres. — Syll. XVII, p. 176. — Sed de rectitudine horum syno-
nymorum claros auctores præcitatos sponsores facimus. Qui et non
paucas species alias Karstenii, Patouillardii, Schröterii etc., uti sy-
nonymicas, suppresserunt, de quibus conferantur dissertationes
Höhnelianæ.

CONIOPHORA DC. — Syll. VI p. 646, IX p. 241, XI p. 129, XIV
p. 224, XVI p. 195, XVII p. 182.

1. **Coniophora janthinospora** (Patouill.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, 1589 p. 393 — *Gyrophana janthinospora* Patouillard Champ. Tunisie p. 53. tab. IV, fig. 1. — Tenuis, resupinato-effusa, a matrice separabilis, floccosa, pallide purpurea, dein membranaceo-mollis, centro subcinnamomeo, margine violaceo; hymenio plicato-reticulato; sporis ellipsoideis, 6-8 \times 4, levibus, violaceis.
Hab. ad ligna putrida *Quercus Suberis*, El-Fedja Tunisiæ.
2. **Peniophora argentinensis** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 1590 (1909) p. 278. — Latissime effusa, ubique arcte matrici adnata, tenuis, levis opaca, fere pulverulenta, hymenii superficie ex hyphis dense intertextis tenuibus 4 μ . cr., fulvellis efformata; cystidiis sublageniformibus, 50 \times 15, obtusiusculis, hyalinis; basidiis clavulatis 20-25 \times 5-6 apice sterigmatibus 2-3 arcuatis concoloribus; sporis 7-8 \times 5-6, levibus, intus minute pluriguttulatis.
Hab. ad ramos emortuos *Salicis* cujusdam in uliginosis Isla Santjago prope La Plata Argentinae.
3. **Coniophora Bourdotii** Bres., Fungi gall, Ann. Myc. v. VI (1908) 1591 p. 45. — Effusa, membranacea, luride argillacea, margine albido, fimbriato; hymenio in sicco levi; sporis olivaceis, subfusoides, hilo depressis, 15-19 \times 5 $\frac{1}{2}$ -7; basidiis cylindraneo-subclavatis, 45-60 \times 7-10, sterigmatibus 4, paraphysibus filiformibus, parum v. non emergentibus, interdum furcatis 2-3 μ . crassis; contextu subhymeniali pseudoparenchymatico ex cellulis usque ad 15 μ . crassis, contextu basali ex hyphis cum substrato parallelis, 4-12 μ . cr., septatis, haud nodosis conflato.
Hab. ad ligna *Platani*, Heuillers, Côte d'Or Galliae. — *Coniophoræ laxæ* proxima, a qua et proximis præcipue sporis fusoides distincta.
4. **Coniophora Petersii** (Berk. et Curt.) v. Höhn. et Litsch. (1908). — 1592 Ita vocandum *Corticium Petersii* Berk. et Curt. — Syll. VI, p. 618.
5. **Coniophora hanoiensis** Pat., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIII (1907) 1593 p. 76. — Late effusa, 20 cm. longa et ultra, 8-10 cm. lata, matrici adhærens et inseparabilis, centro brunneo-nigrescens, ad marginem brunneo-fulva v. castanea, levis v. tuberculosa; margine sinuato-adhærente, concolori v. albido, vix sericeo; trama sicca, dura, grumosa, tenui $\frac{2}{3}$ mm. cr., brunnea, ex hyphis stipatis, cylindracois, brunneis, constituta; cystidiis nullis; sporis fulvo-brunneis, ovoideis, levibus, 10 \times 5.
Hab. in ligno putri, Hanoi Indo-Chinæ (EBERHARDT). — *Con. puteanæ* proxima.

6. **Coniophora olivacea** Masee, Journ. Linn. Soc. XXV (1889) p. 129, 1594
tab. 46, fig. 12, Brit. Fung. Fl. I, p. 94, fig. 1-3. — Citata in
Syll. XIX, p. 393, adest jam descripta in Syll. VI, p. 649.

HYPOCHNUS Fr. — Syll. VI p. 653, IX p. 242, XI p. 130, XIV
p. 225, XVI p. 196, 1117, XIV p. 184. — Testibus v. Höhnel et
Litschauer complures species, nisi omnes, huic generi relatæ ad
Tomentellam, *Peniophoram*, *Corticium* etc. referri debent.

1. **Hypochnus sphærosporus** R. Maire, Bull. trim. Soc. Myc. de Fr., 1595
XXI (1905) p. 164. — Effusus, tenuissimus ex arachnoideo tenui
membranaceus, substrato laxè adnatus, margine conformi v. sen-
sim attenuato v. fibroso præditus, albo-niveus, dein centro flavi-
dulo; hymenio non clauso, e farinaceo granuloso; basidiis piri-
formibus v. clavatis, 8-12 \approx 4-5; sterigmatis 4, subulatis, rectis,
3-5 μ . long.; sporis globosis v. globoso-angulosis, crasse verruco-
sis, hyalinis, uniguttulatis, 2-3 μ . diam., 3 \approx 2-2,5; hyphis subre-
gularibus, tenuissime tunicatis, levibus, hyalinis, 2-4 μ . cr., nodu-
loso-fibulatis; hyphis basilaribus partim in fasciculum venoso-ramo-
sum coalitis; hyphis partim crystallis oxalati calcici præditis, con-
textu etiam crystallis acicularibus v. fusoideis farcto.

Hab. ad terram nudam et in ligno putri, Nancy Galliæ (MAIRE)
prope Pressbaum Austriæ inf. (v. HÖHNEL).

2. **Hypochnus araneosus** (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trott., *Tomen-* 1596
tella araneosa v. Höhn. et Litsch., Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien,
CXVI, I (1907) p. 83, fig. 14. — Effusa, tenuissima, plagas ara-
neoso-granulosas albas margine sensim attenuatas efformans; hy-
phis laxè contextis, irregulariter ramosis, hyalinis, tenui-tunicatis,
ad septa parum constrictis ibique interdum inflatis; sæpe nodoso-
fibulatis; hyphis incrustatis, subhymenialibus 3-5 μ . cr., basilari-
bus 6-8 μ .; hymenio non clauso; basidiis clavatis, 5-7 μ . cr.; ste-
rigmatibus 4, subulatis, rectis vel curvulis, 4-6 μ . long.; sporis
hyalinis, late ellipsoideis, raro sphæroideis, 4-6 \approx 3-4, semper uni-
guttulatis; tunica tenui, distincte aculeata.

Hab. in ligno putri prope Pressbaum Austriæ inf.

3. **Hypochnus flavo-aurantius** Traverso in Saccardo, Ann. Mycol. VI 1597
(1908) pag. 553. — Late effusus, plagas usque ad 8-10 cm. latas
efformans, citrino-sulphureus v. aurantiacus, margine araneoso,
albicante, contextu furfuraceo-fragili, hymenio irregulariter rugo-
so, colliculoso, puberulo, concolori; hyphis cylindræis, ramosis
parce v. vix septatis, densiuscule intertextis, citrinis, 5-6 μ . diam.;

basidiis cylindraceo-clavatis, apice truncatis, varie guttulatis, intus citrino-flavis 40-45 \approx 10-12; sterigmatibus 4 longiusculis, acicularibus; sporis initio globosis dein late ellipsoideis, hyalinis v. dilute sulphureis, levibus, 7-9 \approx 5-7.

Hab. ad terram arenaceam in calidariis Horti botanici Patavini, ubi vere 1908 legerunt ANDR. PIGAL et PHIL. ZANETTI. — Species perpulchra ab *Hyp. albo-stramineo* et *Hyp. concolori*, cui, ut videtur magis affinis, facile dignoscenda. An cum plantis exoticis in Hortum patavinum importata?

4. **Hypochnus puniceus** (A. et S.) Fr. — Syll. VI, p. 661. — *H. 1598
geophilus Sacc., Ann. Mycol. II (1908) p. 558. — Terricola, sordide sanguineus, subpulverulento-granulosus; basidiis cylindraceis, apice rotundatis, 2-sporis (ut videtur); sporis globosis 6-8 μ . diam., e hyalino rubentibus, muriculatis.

Hab. supra terram udam prope Parisios, 1907 (P. HARIOT).

5. **Hypochnus flaccidus** Britzelmayr, Material. Hymenomyc. (1897) 1599 p. 18, tab. 720, fig. 112. — Pulveraceo-floccosus æque ac margine; hymenio ex albo flavido-melleo; opaco; sporis fusoides, rectis, hyalinis, 6 \approx 2-2,5.

Hab. ad corticem Pini prope Günzach Germaniæ.

6. **Hypochnus Solani** Prill. et Del. — Syll. XI, pag. 130. — Huc 1600
ducendum est *Corticium vagum* B. et C. var. *Solani* Burt., Güssow H. T. in Zeitsch. Pflanzenk. (1906) p. 135, t. VIII et aliorum. Quod hæc species metagenetice pertineat ad *Rhizoctoniam Solani* Kühn demonstravit cl. D. R. Laubert in Bot. Centralbl. CII (1906) p. 525-526. Etiam affinis *Rhizoctonia violacea* Tul. ad *Hypochni* sp., non vero ad *Leptosphaeriam circinantem* pertinet, eodem auct. recte observante.

7. **Hypochnus Theæ** Bernard, Bull. Dept. Agric. Indes Neerland. VI 1601 (1907) pag. 24, t. II. — Tenuis, rubido-albicans, effusus vel per ramos tænias ramoso-anastomosantes formans, hymenio tenuiter pulverulento; hyphis hyalinis, septatis et dichotomicè ramosis 4-6 μ . diam.; basidiis elongatis, 20-25 \approx 6-8; sterigmatibus acicularibus quaternis 6-8 μ . long.; sporis hyalinis, levibus, 7-9 \approx 5-7.

Hab. in ramulis foliisque adhuc vivis, præcipue in hypophyllo, Theæ assamicæ in Java. — Obturat stomata, hinc folia decidunt.

8. **Hypochnus fuciformis** (Berk.) Mc. Alp. Ann. Mycol. IV (1906) 1602 p. 549, tab. VIII-IX, *Isaria fuciformis* Berk. — Syll. IV, p. 595 *Is. graminiperda* Berk. et Müll. sec. Mc. Alp. l. c., *Epithele fu-*

ciformis (Berk.) v. Höhn. et Syd. Ann. Mycol. IV (1906) p. 551. — Synnematibus gracilibus filiformibus, rubro-corallinis, carnosulis, basi strato effuso gelatinoso præditis matricique adhærentibus, initio simplicibus dein ramulosis, ramis apice acutiusculis, c. 1 cm. long., ex hyphis dense fasciculatis ramosis septatis, 2-3,5 μ . cr., constantibus; basidiis e strato gelatinoso, rarius e synnematibus, orientibus, subclavatis, intus granulosis, 20 \approx 6-7, apice sterigmata 4 filiformia gerentibus; sporis obovatis, levibus, basi apiculatis, hyalinis, leviter asymmetricis, intus granulosis, 9-11 \approx 4-5.

Hab. ad culmos graminum caulesque Medicaginis, Silybi etc. Victoriae, Queenslandiae, Australiae merid. pluribus locis.

9. **Hypochnus Langloisii** Patouill., Bull. Soc. Mycol. de Fr., XXIV 1603 (1909) p. 3. — Subiculo indeterminate effuso, tenuissimo, flocculoso, in vivo candido, in sicco subalutaceo; cystidiis luteo-aurantiacis, numerosis, sparsis aut fasciculatis, cylindræis, obtusis, molibus, sæpe incrustatis, transverse pluri-septatis, 50-100 \approx 8-12; basidiis sporisque non visis.

Hab. in ligno putri, Saint-Martinville Louisianae (LANGLOIS).

10. **Hypochnus Theobromæ** F. C. v. Faber in Arbeit. K. Biol. Anst. 1604 Berlin, VII (1909) pag. 227. — Superficialis, rami-follicola, albo-flavidus; hyphis sæpe fasciculatis, contextum formantibus, usque 15 μ . cr, hypharum ramulis ex fasciculis emergentibus tenuioribus, sursum clavatis basidiaque formantibus; basidiis non raro fasciculatis, 18 μ . longis, apice sterigmaticis; sporis globosis, hyalinis, 4-5 μ . diam.

Hab. in ramis foliisque Theobromæ Cacao, Camerun Africae trop. (BOSSE). — Species verisimiliter non damnosa.

11. **Hypochnus Sasakii** Shirai, Bot. Mag. Tokyo, XX (1906) p. 319 1605 (japonice).

Hab. in foliis Cinnamomi Camphoræ in Japonia.

TOMENTELLA Schröt. — *Thelephora* Syll. ex p., VI p. 547, XI p. 117.

— Characteres *Hypochni* sed sporæ coloratæ, plerumque fuscæ v. brunneæ.

1. **Tomentella glandulifera** von Höhn. et Litsch., Ann. Mycol. IV 1606 (1906) p. 290. — Effusa, araneosa, ex hyphis laxis ferrugineo-fulvis formata; hyphis basalibus parce regulariter ramosis et anastomosantibus, flavidulis, frequenter fibulato-septatis, 3-6 μ . cr.; hyphis subhymenialibus tenuibus, fasciculis glandularum cyaneo-

nigricantium onustis; hymenio non clauso; basidiis clavatis, 5-6 μ . cr.; sterigmatibus 4 subsubulatis, curvis, 2-3 μ . cr.; sporis subglobosis, subinde subangulosis, 6-8,5 \approx 5-7,5, flavis, crassiuscule aculeolatis.

Hab. in ramis pineis pr. Falckenberg, Germania (SCHRÖTER).
— *Hyp. rubiginoso* Bres. affinis.

2. **Tomentella asterigma** R. Maire, Not. myc., Ann. Myc. IV (1906) 1607 p. 335. — Tenuis, resupinata, arachnoidea, albida vel albido-cinerea, ambitu indeterminato; trama ex hyphis laxiusculis, prostratis, levibus, dilutissime flavidis, fibulato-nodosis, 2,5-3,5 μ . diam.; hyphis fertilibus erectis, ramosis, intricatis, hyalinis, levibus, 2,5-4 μ . diam., fibulato-nodosis; cystidiis nullis; basidiis 4-sporis, rarius 2-6-sporis, cylindraceutis, 25-40 \approx 5-7; sporis sessilibus, globoso-angulatis, echinulatis, sub micr. dilute olivaceis, 6-8 \approx 5-6, rarius usque ad 12 \approx 8.

Hab. in subere putri Quercus Suberis in silvis inter Tlemcen et Hafir Algeriæ. — Cfr. n. 1620.

3. **Tomentella aurantiaca** Patouill., Bull. Soc. Mycol. Fr., XXIV 1608 (1908) p. 3. — Obscure aurantiaca, irregulariter effusa, arachnoideo-membranacea, glabra; hyphis sub lente fuscis, septato-nodosis, 2-3 μ . crassis; basidiis clavatis, sparsis; sporis angulato-globosis, fuscis, 5-8 μ . cr.

Hab. in cortice arborum, Guadalupa (Duss).

4. **Tomentella brasiliensis** Rick, Broteria V (1906) p. 224. — Resu- 1609 pinata tenuis, hyalino-vitrea, sicca albida, pauca cm. extensa, glabra v. minutissime granulosa, ceraceo-gelatinosa; basidiis clavatis, usque ad 40 μ . longis, 15 μ . latis; cystidiis similibus, sterigmatibus 4; sporis sphaeroideis, grosse reticulatis et echinulatis, olivaceis, 15 μ . diam.

Hab. in ligno vetusto in Brasilia.

5. **Tomentella flavo-virens** v. Höhn. et Litsch., Sitzb. k. Ak. d. Wis- 1610 sensch. Wien, CXVI, I (1907) p. 831. — Effusa, byssino-membranacea, substrato laxè adnata, flavo-viridis; hymenio non clauso; basidiis elongato-clavatis, semper copiose guttulatis 5-7 μ . latis; sterigmatibus plerumque 4, subulatis, rectis v. curvulis, 4-5 μ . longis; sporis angulosis, globosis v. subglobosis, 6-10 \approx 5-8, grosse verrucosis, sordide flavo-viridibus, semper uniguttulatis; hyphis subirregularibus, levibus, tenui-tunicatis, septatis, 2-4 μ . cr.; hyphis subhymenialibus fere hyalinis, basilaribus flavo-viridibus, in fasciculos anastomotice conjunctis.

Hab. ad terram nudam Braunlage Harz Germania (LINDAU). —
Tom. atro-virentis et *T. caeruleæ* affinis sed satis diversa.

6. **Tomentella macrospora** v. Höhnel et Litsch., Z. Kennt. d. Corti- 1611
cien, Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. CXV, Ab. I (1906) p. 1602.
Syn. *Zygodesmus fuscus* Corda f. *geogena* Sacc., Myc. ven. n. 1593.
— Expansa, ex byssino membranacea, ad terram nudas plagas
æqualiter marginatas brunneo-nigras efformante; hymenio levi,
non clauso; basidiis flavo-brunneis, clavatis, 8-12 μ . latis; sporis
quandoque æqualiter globoideis 10-16 μ . diam., quandoque ellipsoi-
deis v. uno latere applanatis, 10-12 \times 7-9, tunica obscure brunnea,
solida, longe aculeata et guttula magna præditis; hyphis irregula-
ribus, brunneis, parum crasse tunicatis, levibus, septatis, 3-5 μ .
crassis.

Hab. ad terram nudam in Montello Treviso Italiæ (P. A.
SACCARDO).

7. **Tomentella nigra** v. Höhn. et Litsch. Æest. Cortic. in Wiesner- 1612
Festschr. (1907) p. 78. — Effusa, nigro-violacea byssina, margine
conformi, plagas non radiatas formans, hymenio hinc inde evo-
luto ex albido griseo, tenui-membranaceo, farinoso; basidiis clava-
tis v. irregulariter clavatis 40-50 \times 12, contentu copioso, nitido;
sterigmatibus 4, subulatis, 8-9 \times 2; sporis globosis v. subglobosis,
e verrucoso-breviter aculeatis, diu hyalinis, demum cyaneis 10.5
 μ . diam., sæpe uniguttulatis; hyphis basalibus parum ramosis cya-
neis 2-3 μ . cr., tunica subcrassiuscula præditis, levibus, parce se-
ptatis.

Hab. ad terram humosam, Mödlinger Klauser, Austria inf.

8. **Tomentella papillata** v. Höhn. et Litsch., Stzb. k. Ak. d. Wiss. 1613
Wien, CXVII, Abt. I (1908) p. 1118, *Hypochnus Jaapii* Bres. in
litt. — Effusa, viva carnosâ, sicca crasse membranacea, demum
e substrato secedens, margine plerumque indistincte limitato, fi-
broso-floccoso; hymenio crebre verrucoso, fere clauso, ferrugineo-
brunneo margine pallidiore; basidiis cylindræis 5-7 μ . crassis; ste-
rigmatibus 4, brevissimis; sporis globoso-angulatis v. ellipsoideis
v. irregulariter angulatis; flavo-brunneis, tenui-tunicatis, longe
hyalino-aculeolatis, guttula magna præditis, 8-10 μ . diam. v. 8-
11 \times 7-10; hyphis irregulariter ramosis, tenui-tunicatis, levibus,
sparse verrucoso-fibulatis; hyphis subhymenialibus fere hyalinis
3-4 μ . cr. basilaribus brunneolis, usque ad 6 μ . cr.

Hab. in ligno putri Lengerich, Westfalia, Germania (W. BRINK-
MANN).

9. **Tomentella rhodophæa** v. Höhn. et Litschr., Sitzb. k. Ak. d. Wissensch. Wien, CXVI, I (1907) p. 831. — Effusa, e byssino tenui-membranacea, hymenio non clauso, sublevi, brunneo-griseo; margine pallide roseo, fortiter fibroso-radiato, quandoque arachnoideo, demum hinc inde a substrato soluto; basidiis crasse clavatis 7-10 μ . cr., sterigmatibus 2-4 præditis; sterigmatibus subulatis, brevibus, rectis v. curvulis, 2-3 μ . longis; sporis angulosis, globosis, 6-8 μ . diam., olivaceo-brunneis, breviter hyalino-aculeolatis, semper uniguttulatis; hyphis subhymenialibus hyalinis, tenui-tunicatis basilaribus firmioribus, pallide griseo-brunneis; levibus 4-6 μ . cr., ramosis, copiose noduloso-fibulatis.

Hab. ad lignum populinum putre prope Pressbaum Austriae inferioris.

10. **Tomentella tabacina** (Bres.) Sacc. et Trott. *Hypochnus tabacinus* 1615 Bras., in Brinkmann, Westfäl. Pilze (1906) n. 108 (cum diagnosi). — Late effusus, tomentosus-submembranaceus, ambitu subradiato v. similari, tabacino-fulvellus v. cervinus; hymenio sublevi, concolore; sporis subglobosis fusco-luteis, subglobosis, aculeatis, 8-9 μ . diam. (cum aculeis); basidiis clavatis 30-35 \approx 8-9; sterigmatibus 6 μ . long.; hyphis subhymenialibus irregularibus 3-6 μ . cr., basalibus 4-6 μ . cr.

Hab. ad corticem Quercus, Lengerich Westfaliae.

11. **Tomentella ferruginosa** (v. Höhn et Litsch.) Sacc. et Trott., *Tomentellina ferruginosa* v. Höhn. et Litschauer, Z. Kenntn. d. Corticieen, Sitzb. k. Ak. d. Wissensch. Wien, Bd. CXV, Abt. I (1906) p. 1604, fig. 9. — Effusa byssino-membranacea, e flavo-rubro obscure brunnea, substrato adpressa, facile secedens; margine primumque pallidiore, ceterum æquali v. parum fibroso-radiato; hymenio non clauso, velutino, æquali; basidiis clavatis 20-25 \approx 6-8; sterigmatibus 4, subulatis, rectis v. curvulis, 4-8 μ . long.; sporis e globoso angulatis, 6-9 μ . diam., uniguttulatis; tunica flavo-brunnea, leviter et obtuse conoideo-aculeata; cystidiis numerosis, solitariis v. cæspitosis; cylindrico-elongatis, sursum parum dilatatis, obtusis, septatis, brunneis, crasse tunicatis, levibus, 120-200 \approx 5-8; hyphis irregularibus, pallido-flavis, flavo-brunneis, tenuiter tunicatis, levibus 3-7 μ . cr., septatis.

Hab. in trunco abietino putri prope Heizawinkel Wienerwald Austriae inf. — *Tomentellæ ferruginæ* (Pers.) Schr. proxima sed ex analysi microscopica diversa. Genus *Tomentellina* v. Höhn. et Litsch. a *Tomentella* dignoscitur cystidiorum presentia.

12. **Tomentella subfusca** (Pers.) v. Höhn. et Litsch. (1908) p. 1113. 1617
Ita vocandus *Hypochnus subfuscus* Karst.
13. **Tomentella rubiginosa** (Bres.) R. Maire, Not. myc., Ann. Myc. 1618
IV (1906) p. 335. — Ita vocandus *Hypochnus rubiginosus* Bres. —
Syll. XIV, p. 228.
14. **Tomentella elæodes** (Bres.) v. Höhn. et Litsch., Stzb. k. Ak. d. 1619
Wiss. Wien, CXVI, I (1907) p. 840. — Ita vocandus *Hypochnus*
elæodes Bres. — Syll. XIV, p. 227.
15. **Tomentella cinerescens** (Karst.) v. Höhn. u. Litsch., Beitr. Z. 1620
Kennt. d. Corticieen, Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. CXV,
Abt. I (1906) p. 1570; *Hypochnus capnoides* Bres. — Syll. XIV
p. 225 — *Tomentella asterigma* R. Maire Ann. mycol. (1906) p. 335.
— Ita vocandus *Hypochnus cinerescens* Karst. — Syll. IX, p. 244.
Occurrit quoque in Austria et Africa boreali.

EXOBASIDIUM Wor. — Syll. VI p. 654, IX p. 244, XI p. 130, XIV
p. 229, XVI p. 198, XVII p. 190.

1. **Exobasidium Cinnamomi** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya 1621
IV (1909) Pt. V p. 301. — Excrescentias ad 8 cm. long. et 1
cm. cr., efficiens; excrescentiis leniter lateraliter applanatis inter-
dum longitudinaliter rugosis in sectione quadratis v. triangulari-
bus, hinc inde ramoso-corniculatis, inæqualibus, parenchymaticis,
pallide brunneis, dein albo-pruinosis, lineariter secus ramos dispo-
sitis v. cæspitosis, ad 15 cm. diam.; basidiis ovoideis et apice ro-
tundatis v. cylindraneo-truncatis, tetrasporis, $25 \approx 13$; sporis ovoi-
deis, minute spinulosis, $5-6 \approx 3-4$, albis.

Hab. in ramis Cinnamomi zeylanici et C. Cassiæ, Pe-
radeniya Ceylon.

2. **Exobasidium zeylanicum** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya 1622
IV (1909) Pt. V p. 301. — Gallis sphæroideis ad 3,5 cm. diam.,
hypophyllis, basi coarctata adhærentibus, mollibus, constanter albis
v. viridulo-albis, dein albo-pruinosis; sporis cylindricis, rectis cur-
vulisve, $10-15 \approx 2-3,5$, albis.

Hab. in pagina inferiore foliorum Rhododendri arborei,
Hakgala Ceylon. — A ceteris speciebus rhododendricolis colore
gallarum et sporarum dimensionibus distincta.

3. **Exobasidium javanicum** Racinborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 1623
p. 368. — Stratu hymeniali compacto usque ad 60 μ . crasso, subglu-
tinoso, incolore; basidiis primum cylindracois, $40-65 \approx 5$, tetraspo-
ris; sporis hyalinis uniseptatis, $17-20 \approx 3-4$, mox deciduis et basidiis

postea novo plasmate fartis et forsan novas sporas efformantibus, subcurvulis.

Hab. plerumque ad apicem ramulorum nec non in petiolis et nervis primariis foliorum *Symploci spicati* var. subsessilis in regione alpina M. Gedeh in ins. Java. — Hypertrophias conspicuas efficit.

4. **Exobasidium *Symploci-japonicæ*** Kusano et Tokubuch., *Botan. Mag.* 1624 Tokyo XXI (1907) p. 138 cum icone. (japonice).

Hab. in *Symploco japonica* in Japonia. — Ex icone basidia tereti-clavulata, subtortuosa, apice obtusa et 4-sterigmatica; sporæ oblongæ, curvulæ, basi lateraliter apiculatæ, hyalinæ.

5. **Exobasidium *Oxycocci*** Rostrup E., in *Shear Cranberry Diseas.* p. 35, 1625 t. 7, fig. C-D. — Cecidogenum, nunc in foliis normalibus maculas v. pustulas subrotundas sanguineas generans, nunc folia summa ramulorum hypertrophyca et bullosa reddens et mutans in capitulum amplum amœne purpureum; basidiis clavato-elongatis, emergentibus, plerumque tetrasporis; sterigmatibus brevibus, gracilibus; sporis fusoides leniter curvis, $14 \approx 3,5$.

Hab. in foliis ramulisque vivis *Vaccinii Oxycocci*, Brewster et Pleasant Lake Mass. Amer. bor.

6. **Exobasidium affine** Raciborski, *Bull. Ac. Sc. Cracovie* (1909) p. 367. 1626 — Basidiis cylindræis $70-150 \approx 5-10$, hyalinis, rectis v. curvulis, 2 sterigmatibus præditis; sterigmatibus longe acutatis $6-8 \mu$. long., basi $2-3 \mu$. cr.; sporidiolis asymmetricis uno latere convexis altero subapplanatis, $19-23 \approx 3$.

Hab. in foliis bullatis hypertrophicis et in ramulis incrassatis, *Vaccinii retusi*, *V. varingæfolii*, *V. Teysmanniani*, in ins. Java. — Ab *Ex. Vaccinii* differt basidiis longioribus, 2 sterigmatibus præditis.

7. **Exobasidium *Vaccinii-uliginosi*** Boudier, *Bull. Soc. Bot. de Fr.* 1627 XLI (1894) p. CCXLIV; Briosi e Cavara, *Funghi parass. n.* 261; *Exob. Vaccinii* Eriksson, *Fungi paras. Scandin.* 286 a. — Sporibus $25-27$ (quandoque etiam $30-32$) $\approx 8-12$; basidiis sterigmatibus binis præditis.

Hab. in *Vaccinio uliginoso* nec non in *Vacc. Myrtillo* et *Vite-Idæa* in Gallia, Helvetia et Suecia. — Cladomanias efformat, ramulos et folia hypertrophica reddit. Præcipue magnitudine sporarum dignoscendum.

8. **Exobasidium *Karstenii*** Sacc. et Trott., *Exobasidium *Andromedæ** 1628 Karst. in *Thüm. Mycoth. univ. n.* 1110 (1878); Hattsv. II, p. 153

non Peck 26 Rep. (1874). — Longe lateque effusum, vulgo ambiens, tenue, excarne, hymenio purpurascenti.

Hab. in foliis ramulisque *Andromedæ polifoliæ* et *Arctostaphyli officinalis*, in Rossia, Fennia et Scandinavia. — Forma **Uvæ-Ursi** R. Maire, Bull. Soc. Bot. de Fr., LIV (1907) p. CLVIII; Jaap, Fungi sel. exs. n. 35c (sub *E. Vaccinii-uliginosi*): sporis 7-10 \times 3-4; basidiis 2-4 sterigmatibus præditis. — In *Arctostaphylo Uvæ-Ursi* in Gallia merid.: cladomanias efficiens; ramulis plus minusve hypertrophicis, foliis purpureo-fuscis. — Forma **Vaccinii-Myrtilli** R. Maire l. c. (= ? *Exob. Myrtilli* (Thüm.) Karst. Hattsvampar II (1882) p. 152, *Exob. Vaccinii* var. *Myrtilli* Thuem. Herb. myc. oec. n. 93; *Exob. Vaccinii-uliginosi* Auct. p.p., non Boud.): sporis 10 \times 3, basidiis tetrasporis. — In *Vaccinio Myrtillo* in Gallia alibique.

PROTOCOLONOSPORA Atk. et Edgert., Journ. of Mycol. XIII (1907) p. 186, Science N. S. XXVI, p. 386 (Etym. ex sporis in coronam dispositis). — Stroma pseudoparenchymaticum ex 2-3 stratis cellularum constitutum; ramuli mycelici ultimi basidia efformantibus; sporæ sessiles, hyalinæ, incoloræ, continuæ, leves, plures (plerumque 4-8), ex germinatione sporidiola conformia efformantes. Conidia conformia in conidiophoris brevibus basidiis intermixtis efformata.

1. **Protocoronospora nigricans** Atk. et Edgert, l. c. — Plagulis angustis in leguminibus, foliis caulibusque, 2-5 mm. long., 1-2 mm. latis, primum albidis v. purpureo cinctis, dein nigricantibus; stromate subepidermico e cellulis 6-9 μ . diam., constituto; basidiis e clavato subcylindræis 20-30 \times 6-8, 4-8-sporis; sporis sessilibus et basidiis sporas novas continuo gignentibus; sporis in massa roseolis, ex oblongo ellipsoideis, granulosis, rectis vel curvulis, 12-20 \times 3-3,5. 1629

Hab. parasitice in *Vicia sativa* culta, Cornell Amer. bor.

CYPHELLA Fr. — Syll. VI pag. 667, IX p. 245, XI p. 132, XIV p. 231, XVI p. 200, XVII p. 191.

1. **Cyphella gigas** Patouill., Bull. Soc. Mycol. de Fr., XXV (1909) pag. 4, tab. I, fig. 3. — Cupula coriaceo-elastica, sessili, pendula, cylindræa, sursum rotundata plicataque, deorsum integra, late aperta, 25 mm. longa, 12 mm. diam., extus pruinosa, pulchre flavo-aurantiaca, intus concolori, levi; contextu albido, tenaci, 0,5 1630

mm. cr., ex hyphis hyalinis 4-8 μ . cr., ramosis, septatis composito; basidiis sporisque non visis.

Hab. ad ramos emortuos in montibus Lang-Biang, Annam Indiæ or. (EBERHARDT).

2. **Cyphella grandis** Pat., in Lloyd Mycol. Notes n. 21 (1906) p. 258, 1631 fig. 97. — Sparsa v. cæspitosa, majuscula, 7-25 mm. longa, 4-7 mm. lata, digitaliformis v. cornucopiæformis, interdum uno latere magis producta, lateraliter stipite cylindræo, 3-6 mm. longo, 1-2 mm. cr., adfixa, pendula, margine acuto, integro, repandulo, aperta, glabra, membranacea, candida in vivo dein albido-lutescens, intus extusque levissima, ex hyphis cylindræis 8-15 μ . cr., tenuiter tunicatis composita.

Hab. ad corticem arborum in ins. Samoa Polynesia.

3. **Cyphella Cheesmani** Masee in Cheesman Mycolog. South Afric., 1632 Journ. Linn. Soc. XXXVIII (1909) p. 411. — Membranacea, sessilis, cupularis, demum explanata, extus villosa, nivea, 1 mm. diam.; hymenio leviter plicato; basidiis clavatis; apice sterigmatibus 4; sporis ovoideis, tenuiter asperulis, hyalinis, 12-15 \times 7-8.

Hab. in ramis decorticatis pr. Victoria Falls Africae austr.

4. **Cyphella albo-carnea** Quélet, Bull. Soc. Bot. Fr. (1878) tab. III, 1633 fig. 13; Boudier Icones myc. I. — Cupula membranacea, urceolata 1-2 mm. lata, albo-nivea, lanata; hymenio roseo-incarnato; sporis pruniformibus elongatis, 10 μ . long., minute aculeolatis.

Hab. gregatim in ramis siccis Populi Tremulae, Jura Galliae.

5. **Cyphella cirrato-pilosa** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 1634 p. 107. — Cupulata, sessilis, 0,3-0,4 mm. diam., cervina, margine involuto, extus pilis cirratis fuscis, 80-120 \times 4-5, superne granulato-papillatis vestita; hymenio glabro, e cinereo fuscidulo; sporis subglobosis, hyalinis, levibus 4-6 μ ., 1-guttulatis.

Hab. ad ramos, Amani, Usambara Africae.

6. **Cyphella levipila** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) 1635 p. 277. — Cupulis udis patellari-apertis, 300-700 μ . diam., hymenium ochroleucum leve ostendentibus, siccis globoso-contractis, brevissime crassiusculeque pedicellatis, pilis cylindræis sæpius 2-cellularibus simplicibus 100-250 \times 5-8, fulvellis apice undulatis pallidioribus vestitis; basidiis clavulatis 22-24 \times 5-6 hyalinis; sporis utrinque subacutiusculis 4-5 \times 2,5-3 plus minusve inaequilateralibus, sæpius grosse 1-guttulatis, hyalinis.

Hab. ad folia vetusta emortua Tillandsiæ Lorentzianæ in hortis, La Plata Argentina.

7. **Cyphella microthele** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 1636 (1909) p. 277. — Cupulis innato-superficialibus, udis patellaribus, 200-400 μ . diam, siccis subgloboso-contractis, laxè crispuleque villosis, sordide submelleis, pilis hyalinis vel pallide carneis 50-150 μ . long., basi tenuibus, 2,5-3 μ . cr., levibus sursum sensim tenuiterque incrassatulis, 5-6 μ . cr., atque asperulis apice subacutiuscule rotundatis vestitis; basidiis clavulatis, 15-18 \times 6-7, hyalinis; sporis subglobosis v. vix obovatis, 5-6 \times 5 levibus, chlorinis.

Hab. ad folia arida Chloridis distichophyllæ in pratis prope Paraná Entre Rios Argentinae.

8. **Cyphella (?) Pandani** Pat., Bull. Soc. Mycol. France, XXII (1906) 1637 pag. 47. — Sparsa v. dense gregaria, minuta, vix 0,5 mm. lata, alba, carnosio-indurata, sessilis, lentiformis, infra convexa, supra centro depressa, crasse obtuseque marginata, dein applanata, pilis cystidiformibus hyalinis, lanceolatis, crasse tunicatis, distantibus, rigidis 30 \times 6 circ. cr., marginalibus ornata; hymenio ex basidiis capitatis, simplicibus, 15-20 \times 6 formato; sporis non visis.

Hab. ad ramulos dejectos Pandani, ins. Rikitea Polynesiae (SEURAT).

AURICULARIOPSIS R. Maire, Recherches cytol. et taxon. sur les Basidiom. (1902) p. 102 (Etym. *Auricularia*, cujus analogum genus). — Pileus cupulatus, subsessilis; hymenium gelatinosum, madore tremellaceum. Basidia clavulata, 4-sterigmatica, non septata ut in *Cyphella*.

1. **Auriculariopsis flocculenta** (Fr.) Sacc. et Trott., *Corticium flocculentum* Fr., *Auriculariopsis ampla* (Lév.) R. Maire l. c., tab. III *Cyphella ampla* Lév. — Syll. VI, p. 667. — *C. flocculenta* (Fr.) Bresad. — Syll. XVII, p. 191. — *Auricularia Leveillei* Quéll., *Hirneola Leveillei* Forq. Champ. Supér. p. 109, icon.

DISCOCYPHELLA P. Henn. — Syll. XVI, p. 202.

1. **Discocyphella bambusicola** v. Höhn., in Ergeb. Bot. Exp. Südbras. (1901) Eumyc. et Myx. in Denk. k. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. LXXXIII 1639 (1907) Extr. p. 7. — Pileo applanato, centro stipitato, medio distincte umbilicato, pallido, tenui, molli, orbiculari, 1,5-7 mm. lato, levi, supra cellulis brevibus, levibus, rubro-brunneis, rotundatis, ovoideis, oblique piriformibus v. breviter conoideis, parum emergentibus, 12 \times 8 tecto; hymenio inferiori, levi 3-4 rugis brevibus radiantibus decurrentibus praedito; margine pilei et stipite pilis

numerosis capitatis tectis; basidiis brevibus et latis, sterigmatibus 3-4 praeditis; cystidiis numerosis, magnis, $28 \approx 4-5$, levibus, 1-2-ocularibus, tunica tenui regulari praeditis, parum emergentibus; sporis hyalinis ex elongato fusoides, basi v. utrinque acutatis, tenui-tunicatis, $7-12 \approx 2,5-3,5$; stipite basi nigro, supra pallido in pileum conoideum attenuato, 2-7 mm. longo, 140-200 μ . cr., pilis capitatis tecto.

Hab. ad culmos Bambusae, Sao Paulo pr. S. Cruz Brasiliae.

PHÆOCYPHELLA Pat., Bull. Soc. myc. Fr., IX (1893) p. 125, Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) p. 278 (Etym. *phaeos* obscurus et *Cyphella*). — Cupulae sessiles v. pedicellatae, ceraceo-carnosulae, cupulatae v. urceolatae; hymenio levi glabro. Sporae continuae, fuligineae, globosae v. ovoideae.

1. **Phæocyphella sphaerospora** Speg., l. c. — Cupulis solitariis v. laxe 1640 pauci-gregariis, ore terram spectantibus, e latere breviter pedicellatis v. sessilibus, primo subgloboso-hemisphaericis, dein applanato-expansis, 1-5 mm. diam. tenuibus teneris, pilis minutis verrucosis acutis $25-75 \approx 5$, adpersis; basidiis clavulatis, $25 \approx 9$, sterigmatibus 4, brevibus, acutis; sporis eguttulatis 8-10 diam., levibus, an minutissime papillulosis.

Hab. ad cortices truncorum inter muscos et hepaticas in silvula Santa Catalina pr. Buenos Aires Argentinae. — Cum *Phaeosolenia platensi* Speg. non comparanda!

2. *Hymenolichenes* Matt.

CHLOROCYPHELLA Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) p. 279 (Etym. ex thallo cinereo-viridulo). — Cupulae hemisphaericae ceraceo-coriacellae laxae gregariae, thallo crustaceo maculiformi, e gonidiis globosis constituto, insidentes; hymenio levi. Sporae anguste lineares, unciniformes, pluriseptatae, hyalinae.

Genus *Hymenolichenibus* certe adscribendum, teste Auctore.

1. **Chlorocyphella subtropica** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 1641 t. XIX (1909) p. 279. — Thallo superficiali, pulverulento-suberustaceo, tenui orbiculari 4-10 mm. diam, subcinerescente v. obsolete olivascente; cupulis saepius subcircinantibus sessilibus v. pedicellatis, subdimidiatis, in vivo mollibus in siccis subcorneis, glabris levibus albidis vel roseo-subcinereis, hymenio obscuriore; strato proliferis e sterigmatibus filiformibus $50 \approx 1$, dense constipatis sub-

coalescentibusque fumosis apice subincrassatulis efformato; sporis sæpius uncinato-incurvis rarius sigmoideis, tenuibus 40-60 \times 2-4, levibus, sæpius 3-5-septatis, ad septa non constrictis; gonidiis globosis 10 μ . diam., dense constipatis laxè coalescentibus tenuiter tunicatis, intus dense minuteque granulosis.

Hab. ad folia viva *Æchmææ polystachyæ* in silvis prope Formosa, nec non ad ramulos arbustorum et folia coriacea arbusculorum in silvis Salta et Misiones Argentinae.

Fam. 5. Clavariaceæ Corda

SPARASSIS Fr. — Syll. VI p. 690, XIV p. 235.

1. **Sparassis foliacea** (St. Amand) Fr. Hym. eur. p. 666 (absque diagnosi). — Syll. VI, p. 691 (id.). — *Clavaria foliacea* St. Amand, Fl. agenaise, Agen (1821) p. 541, t. II. — Magna, coriacea, pluries divisa; divisionibus compressis, foliiformibus, apicem versus latoribus, periphericis longioribus, laciniatis, centralibus brevioribus et tantum apice crenulatis, omnibus imbricatis et capitulum compactum subcompressum formantibus, rubescentibus, albidotinctis. 1642

Hab. ad caudices annosos, semidecompositos in silva de la Garde prope Agen Galliae. — Tota 10-12 cm. alta, 14 cm. diam.

CLAVARIA Vaill. — Syll. VI p. 692, IX p. 247, XI p. 134, XIV p. 236, XVI p. 203, XVII p. 193.

1. **Clavaria lentofragilis** Atkins, Ann. Mycol. VI (1908) p. 57. — 1643
Cæspitosa 15 cm. alta, 12 cm. lata; trunco 2-4 cm. alto, 2-3 cm. crasso, repetitive furcato-ramosissimo; ramis crassis, lentis; ramulis teretibus, fragilibus, apicibus brevibus, conicis; trunco cinereo; ramis albidis, apicibus brunneo-cinereis; sporis hyalinis, obovato-subglobosis, asperulatis, 4-6 μ . diam.

Hab. ad ligna putrida, Smithton L. Isl. N. Y. Amer. bor.

2. **Clavaria holorubella** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) pag. 57. — 1644
Cæspitosa, fragilis, 18 cm. alta, 12 cm. lata, tota rubella v. rubro-brunnea; carne rubra; trunco crasso, 3 cm. cr., radicante, repetitive ramoso; ramulis stipitatis; sporis pallide luteis, suboblongis, levibus, 11-13 \times 3-4,5.

Hab. ad terram, Chillicothe Ohio, America bor.

3. **Clavaria acris** Peck 54 Rep. (1900) p. 155, tab. XI, fig. 37-39. — 1645
Trunco brevi, e basi ramoso; ramis repetito- et subpalmato-ramu-
losis, sæpe compressis, firmis, fartis, rubido-incarnatis, intus albis,
apice acutis albidis v. concoloribus, axillis sæpe rotundatis; sapore
acri; mycelio albo; sporis late ellipsoideis, pallide ochraceis, 6-
7,5 \times 4-5.

Hab. ad ligna putrida Coniferarum, Floodwood Amer. bor.
— Tota 4-7 cm. alta et totidem crassa.

4. **Clavaria conjuncta** Peck, New York State Mus. Bull. n. 105 (1906) 1646
p. 42, tab. 102, fig. 1-3. — Stipitibus basi congregatis, et cæspites
7,5-12 cm. latos efformantibus, fragilibus, solidis, glabris albis v.
albidis supra in ramulos erectos copiosos sparsos solidos, albidos
v. rufulos divisis; ramulis ultimis apice in denticulos binos vel
plures obtusulos rubescentes subinde flavo-tinctos terminatis; carne
alba, sapore dulci; sporis sordide flavis, coacervatis dense subo-
chraceis, oblongis, 10-12 \times 3,5-5.

Hab. ad terram, Bolton Landing, Warren Co. Amer. bor. —
Clavariæ flavæ et *C. botryoidi* affinis. — Edulis.

5. **Clavaria botryoides** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 94 (1905) 1647
p. 21 et p. 49, tab. 93, fig. 5-7. — Stipite gracili, brevi, e basi
in ramos repetite et irregulariter divisos partito; ramulis ultimis
brevibus, confertis, subtruncatis in duos v. plures dentes obtusos
divisis, initio apice rubris v. cinnamomeis, dein decoloratis; stipite
et ramis solidis, carne alba, sapore dulci; sporis subellipsoideis v.
oblongis, brunneo-ferrugineis v. subcinnamomeis, 7,5-10 \times 3,5-5.

Hab. ad terram in silvis prope Port Jefferson Americæ bor. —
Totus fungus 5-10 cm, alt., 3-7,5 cm. latus.

6. **Clavaria versatilis** (Quél.) Sacc. et Trott., *Ramaria versatilis* Quél. 1648
Assoc. franc. Avanc. Sc. XXII (1893) p. 6 (extr.). — Ramosissi-
ma 5-9 cm. alta, basi alba, violaceo-lilacina, dein griseo-ochracea
v. fuscescens; ramis subdivisis, apice bi-trifurcatis stramineis vel
rufulis; carne spissa 2-3 cm. cr., alba, amarula; sporis ovoideo-
oblongis, 8-10 μ . longis, basi acutatis, granulosis, hyalinis, dein di-
lute roseolo-flavidis.

Hab. in silvis Galliae merid. (Provence, Pyrénées, Cevennes).
— Ad *Cl. rufo-violaceam* et *Cl. fennicam* valde accedens.

7. **Clavaria spiculisperma** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 368. 1649
— Cinereo-brunnea ad basim alba, 6-8 cm. alta; stipite 5 cm.
alto, 0,8-1 cm. cr.; ramis subdichotomo-dentatis, subpyxidatis;

sporis lateritiis, obovatis, spinulosis, 11-13 \times 6,5-7,5, spinulis 2 μ . longis.

Hab. ad terram in silvis, Chapel Hill N. C., Amer. bor. (W. C. COKER).

8. **Clavaria flavo-brunnescens** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 367. 1650
— E basi repetite ramosissima, 5-7 cm. alta, 4-6 cm. lata, flava, basi alba, tactu brunnescente, trunco brevi v. nullo; ramis primariis 4-8 mm. cr., apicibus minute dentatis; sporis flavis, subellipsoideis, minute asperulis.

Hab. in silvis Chapel Hill N. C., Amer. bor.

9. **Clavaria pruinella** Cesati in Rabenh. Fungi eur. exsicc. Cent. V 1651
(1861) n. 14. — Ochrospora, terrestris, inter folia conglobata assurgens, fibrillis radicalibus numerosis, candidis, sarmentis, leguminibus, foliis, terræque adhærens.

Hab. in silvis Italiæ boreal. — Elegantula species *Clavaria strictæ* proxima, sed terrestris non truncigena.

10. **Clavaria kisantuensis** Sacc. Myc. cong. novi, in Ann. Myc. IV (1906) 1652
p. 73. — Tota fusco-ochracea, 5-6 cm. alta, sicca ceraceo-fragilis; trunco tenui brevissimo e basi arrecto-ramoso, ramis cylindræis 1-1,5 mm. cr., prælongis, in sicco longitudinaliter sulcatis, glabris, ob sporas ochraceo-pulverulentis, sursum parce arrecto-ramulosis, ramulis ultimis acuminatis, furcatis, concoloribus; sporis sphericis, basi minute apiculatis, 5-6 μ . diam., ochraceis.

Hab. ad ramos dejectos putres, Kisantu Congo belg. 1900 (J. GILLET). — Affinis, ut videtur, *Clav. Nymanianæ* sed non lilacina et *Clav. flaccidæ* sed truncus subnullus, rami longiores, et sporæ globosæ. Ob sporas ochraceas spectat ad gen. *Clavariellam* Karst.

11. **Clavaria fragrantissima** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 57. — 1653
Cæspite pallide ochraceo-luteo, repetite furcato-ramosissimo, leviter suaveolenti; ramis bi-tri-conico-dentatis; sporis subellipsoideis, levibus, pallide luteis, 4-5,5 \times 2,5-3.

Hab. ad terram in silvis Ithacæ N. Y. Americæ bor.

12. **Clavaria testaceo-flava** Bres. — Syll, VI, p. 701. — var. **testaceo-** 1654
viridis Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 58. — Cæspite 4-5 cm. alto, 3-4 cm. lato; truncis brevibus, 1-2 cm. altis, 4-5 mm. crassis, ad basim conjunctis, sursum abrupte ramosis; ramulis brevibus substipitatis, sursum subdilatis et pluridentatis; apicibus minutis, conicis; truncis et ramis pallide brunneo-cinereis, apicibus viridibus; sporis oblongis, verrucosis, 10-12 \times 4.

Hab. ad terram in silvis, Blue Ridge Mts. N. C. — *Clav. testaceo-flavæ* Bres. affinis sed colore apicum præcipue diversa.

13. **Clavaria ochraceo-virens** Junghuhn in Linnæa, V (1830) p. 407, 1655
t. VII, f. 3. — Gregaria, 2-3 cm. alta, ochracea, sursum virens, ramosissima, ramis e trunco brevissimo albo-villoso divisis, confertissimis, plano-compressis, superne in ramulos obtusos breves digitatos approximatos divisis; sporis ochraceis.

Hab. in pineto Hercyniæ inf. pr. Möllendorf. — Odor non gratus; sapor acriculus. A *Clav. abietina* diversa. Teste Fries. — cfr. Syll. VI, p. 705 — est forte forma recedens *Cl. apiculatæ*.

14. **Clavaria flavula** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 56. — Cæ- 1656
spitosa, repetitive furcato-ramosissima ex subiculo lento oriens; ramis flexuosis et ramulis minutis, acutis; sporis pallide flavis, oblongis, levibus v. leviter verrucosis, 9-12 \times 3-3,5.

Hab. ad folia in nemoribus Ithacæ N. Y. Americæ bor.

15. **Clavaria gigaspora** Cotton, Naturalist (1907) p. 101, Trans. Brit. 1657
Mycol. Soc. III (1907) pag. 33. — Ramosa, cæspitosa sed basi distincta, quandoque solitaria, grisea, flavido-maculata, parva 3 cm. c. alta, carne tenaci ramulis irregularibus quandoque subpalmatis; ramulis erectis, interdum furcatis, sæpe rugosis, solidis, teretibus v. compressis, ramulis ultimis attenuatis, apice obtusis; stipite vix distincto, 1 cm. circ. longo; structura intus in sectione transversa non pseudoparenchymatica sed ex hyphis dense confertis 4-4,5 μ . cr., constante, sicca dura; basidiis 60-70 \times 15, contentu granuloso, sterigmatibus 4, validis, 8-10 μ . long. præditis; sporis hyalinis, levibus, late ellipsoideis, guttulis dein granulosis, leniter obliquis, 12-16 \times 8 v. 10-20 \times 7-9, odore et sapore nullo.

Hab. ad terram muscosam in Britannia (CROSSLAND).

16. **Clavaria cristata** Pers. — Syll. VI, p. 695. — var. **curta** Jungh. 1658
Linnæa V (1830) p. 407, tab. VII, fig. 2 b. — Cæspitosa, 3-4 cm. alta, irregularis, alba, ramis concretis seu confertis, superne dilatatis, setaceo-fimbriatis.

Hab. in silvis Germaniæ, Polytrichum investiens, hinc potius *Thelephoræ* sp. — var. **flexuosa** Jungh., Linnæa V (1830) pag. 407, tab. VII, fig. 2 a: solitaria 10-12 cm. alta, gracilis, subincarnata, subramosa, ramis paucis, elongatis, flexuosis, acutis, ex sporis albo-pruinosis. — Inter muscos in silvis Germaniæ.

17. **Clavaria nodulosperma** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 368. 1659
— Stipitata, alba, mollis, flexibilis, ramosissima, 3-4 cm. alta, 2-3 cm. lata, ramis omnibus dichotomis v. subpalmatis, ramulis flexuo-

sis sæpe compressis, axillis acutis v. rotundis; stipite 3-4 mm. cr.; sporis albis, nodulosis, 5-7 \approx 3-3,5.

Hab. ad terram in silvis, Chapel Hill N. C., Amer. bor. (W. C. COKER).

18. **Clavaria Favreæ** (Quélet) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 321. — 1660

Ramaria Favreæ Quélet, Ass. franc. Avanc. Sc. XXII (1893) p. 6, tab. III, fig. 13 (extr.). — Albo-nivea; trunco ramoso; ramis intricatis, contortis, corniformibus v. sublamellatis, margine dentato; carne tenera, fragili, odora, alba; sporis ellipsoideis, hyalinis, 6 μ . longis.

Hab. in silvis Coniferarum prope Neuchâtel Helvetiæ (Domina L. FAVRE). — Habitus quasi *Thelephoræ* v. *Sparassis*, forte lusus luxurians *Clavariæ albæ*.

19. **Clavaria amethystinoides** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 1661

(1907) pag. 102. — Cæspitibus 2-4 cm. latis, ex ramis paucis sat brevibus suberectis constitutis, pallide lilacinis, siccis avellaneo-griseis, ramis distincte compressis et rugosis, plus minusve in sicco pruinosis, apice plerumque acutis; sporis globosis 8 μ . diam.

Hab. inter Sphagna, Stow, Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS). — *Clav. amethystinæ* et *Cl. Schæfferi* proxima.

20. **Clavaria pseudo-flava** Britz. — Syll. XI, p. 138. — Britzelmayr, 1662

Revis. Hymenomyc. (1909) p. 220. — Nunc fasciculata nunc simplex, usque 3 cm. alta, apice dentata, pallide flava v. albo-flavidula; massa sporarum alba; sporis late ellipsoideis v. etiam subglobosis, 8-10 \approx 8 uniguttulatis.

Hab. in silvis prope Teisendorf Baviariæ. — *Clav. flavæ* affinis ut *Cl. gregalis* respectu *Cl. cristatæ*.

21. **Clavaria subfastigiata** Britz — Syll. XI, p. 138. — Britzelm., 1663

Revis. Hymenomyc. (1909) p. 220. — Stipite et ramulis plerumque distinctis, 4-5 cm. long.; ramulis æqualiter crassis, rectis vel etiam curvatis, irregulariter breviter vel longe dentatis, flavis vel e flavido-rubido albis, subfragilibus; massa sporarum alba; sporis 10 \approx 8 late ellipsoideis uniguttulatis.

Hab. in herbis Baviariæ et Algovia. — *Cl. fastigiatæ* affinis sed sporis distincta.

22. **Clavaria subflava** Britz. — Syll. XI, p. 138. — Britzelm., Revis. 1664

Hymenomyc. (1909) p. 220 — Stipite basi 1 cm. diam. non attingente, albo, supra expanso; ramulis inæqualibus, decrescentibus, dentibus acutis plerumque inæqualibus duobus v. pluribus præditis, pallide flavis; sporis breviter ellipsoideis, non guttulatis, 6-8 \approx 3-4.

Hab. in silvis prope Teisendorf Baviariæ. — *Clav. flavæ* similima sed satis distincta.

23. **Clavaria clavæformis** Britz. — Syll. XI, p. 138. — Britzelmayr, 1665
Revis. Hymenomyc. (1909) p. 221. — Usque ad 6 cm. alta; stipite circ. 6 mm. cr., supra ramosa et usque ad 15 mm. lata, ramulis numerosis, dentatis, albis; massa sporarum alba; sporis late ellipsoideis, $10 \approx 7-8$, uniguttulatis.

Hab. in silvis Baviariæ. — *Clav. rugosæ* et *cristatæ* affinis.

24. **Clavaria elongata** Britzelm., Hymenomyc. tab. 742, fig. 50; Re- 1666
vis. Hymenom. (1909) p. 221. — Æqualiter stipitata, usque ad 2 cm.; stipite angusto, usque ad 2 mm. cr.; toto fungo cum ramulis, elongatis, angustis epice acutatis v. bifidis, 7 cm. circ. longo, albo; sporis 3-4 μ . diam., subglobosis rugulosis v. minute et æqualiter aculeolatis.

Hab. in silvis prope Augsburg Baviariæ et in Algovia. — Habitu *Cl. crispulæ* affinis.

25. **Clavaria extans** Britz. — Syll. XI, p. 138. — Britzelmayr, Re- 1667
vis. Hymenomyc. (1909) pag. 221. — Usque ad 7 cm. alta, pallide flava; trunco brevi crassiusculo abrupte in ramos filiformes longos erectos, furcatos, sursum tenuatos, 4-5 cm. longo, summo apice obtusulos diviso; sporis ovoideis, $6 \approx 3-4$, intus granulosis, hyalinis.

Hab. in silvis prope Augsburg Germaniæ. — *Clavariæ Kunzei* subaffinis.

26. **Clavaria asperula** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 54. — Fra- 1668
gilis, a basi tenui repetite ramosissima, candida; cæspite 1-4 cm. alto et lato; ramis patentibus, subarcuatis v. divergentibus; ramulis brevibus, acutis; sporis obovatis, echinulatis, $3-5 \approx 2-4$.

Hab. ad terram in silvis Ithacæ N. Y. Americæ bor.

27. **Clavaria asperulans** Atkins. Ann. Mycol. VI (1908) p. 55 *). — 1669
Albida, 1-4 cm. alta, basi tenui mycelio incrustata; ramis substipatis, repetite furcatis; ramulis brevibus, acutis; sporis subglobosis, 3-4 μ . diam. pedicellatis, asperulatis, papillis minutis et valde remotis.

Hab. ad terram in silvis mixtis Ithacæ N. Y. Amer. bor.

28. **Clavaria rufipes** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 57. — Alba, 1670

*) Diagnoses latinæ, quas hic afferimus, depromptæ sunt a dissertatione cl. ATKINSONII in Ann. Mycol. l. c.; interdum vero satis discrepant a descriptionibus anglicis ab eodem auctore ibi datis; quæ tunc necessario conferendæ sunt.

ad basim trunci rufa, 2 cm. alta, ramosa, similis *C. muscoidi*; apicibus leviter incrassatis; basidiis 4-sporis; sporis obovoideis, levibus, 4-6 \approx 2,5-3.

Hab. ad terram in silvis Ithacæ N. Y., Amer. bor.

29. **Clavaria lavandula** Peck, New Y. St. Mus. Bull. n. 139 (1910) 1671 p. 47. — Cæspitibus 2,5-4 cm. albis, dense et subdichotome ramosissimis, ramis tenuibus, numerosis, compressis, udis florum Lavandulæ colore præditis, siccis pallidioribus pruinosisque, ramulis ultimis sæpe bidentatis; sporis ellipsoideis, 6-8 \approx 3-4.

Hab. in castanetis, Stow Mass. Amer. bor. (S. DAVIS). — *Cl. amethystinæ* affinis.

30. **Clavaria cinereoides** Atkins., Ann. Mycol. VII (1909) p. 367. — 1672 E basi tenui repetitive ramosissima, dichotoma, cinerea, siccitate pallide ochracea, ad basim albicans, apicibus sub lente bidentatis; basidiis 4-sporis, 40-45 \approx 7; sporis globosis, levibus, albis, 4-6 μ cr.

Hab. inter folia pinea dejecta in silvis, Chapel Hill N. C., Amer. bor. (W. C. COKER). — Quoad colorem *Cl. cinereæ* similis, sed sporis minoribus differt.

31. **Clavaria asterella** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) pag. 55. — 1673 Ochracea, ramosa; deorsum ramis patentibus ad basim divaricatis, sursum fastigiatis; sporis hyalinis, obovatis, inæquilateralibus, 4-5 \approx 2,5-3, echinulatis; aculeis brevibus, subremotis.

Hab. ad terram inter folia, Mt. Mitchell, Black Mts. N. C. Amer. bor.

32. **Clavaria comosa** Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. XXII (1906) p. 196. 1674 — Terrestris; stipite erecto, cylindræo, 2 cm. alto, 10 mm. cr., initio albo dein flavido, firmo, carnosofibroso, profunde sulcato, sursum in plures ramos divisos, cinereo-flavidos, angustos, cylindricos, integros v. summo incisos, in cæspitem, rotundatum 5-8 cm. diam., dense congestos; basidiis elongatis sterigmatibus binis præditis; sporis hyalinis, ovoideis subglobulosis, 9-10 \approx 6-8, levibus, guttula magna centrali præditis.

Hab. ad terram prope Alger Africæ bor.

33. **Clavaria xanthosperma** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 94 (1905) 1675 p. 21. — Alba, dein ætate flavescens v. cremea; stipite brevissimo, firmo, solido, in ramos numerosos diviso, albo v. trito rubro, ramulis ultimis brevibus, truncatis v. apice obtuse dentatis, axillis rotundatis; sporis pallide flavis, oblongis, 12-19 \approx 3,5-5, leniter ex uno latere oblique acutatis.

Hab. in silvis Smithtown Co. Amer. bor.

34. **Clavaria intricatissima** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 1676
(1909) p. 279. — Cæspitibus teneris fragilibus, circumscriptione e
globoso obovatis, 1-2 cm. diam. et alt.; stipite e mycelio himan-
tiaceo late matricem ambiente exurgente, tereti, brevi, 2-5 mm.
longo, 1-1,5 mm. cr., abrupte ramoso, ramis brevibus mox dense
di-tri-chotomis, ramulis ultimis brevissimis, acutis sæpeque fim-
briato-denticulatis; sporis subglobosis 3 μ . diam., grosse 1-guttu-
latis atque parce grosseque verrucoso-gibbosis, rubiginosis.
Hab. frequens ad calices capsulasque dejectas putrescentes Eu-
calypti globuli in Parque La Plata Argentinæ.
35. **Clavaria arborea** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 56. — Al- 1677
bo-alutacea, repetite furcato-ramosissima; ramis curvatis et varia-
bilibus, roseis; sporis obovatis, asperulatis, hyalinis, 3-4 \times 2-3.
Hab. ad terram in silvis Varnæ N. Y. Amer. bor.
36. **Clavaria rivalis** Britz. — Syll. XI, pag. 138, — Britzelmayr, 1678
Revis. Hymenomyc. (1909) p. 221. — Usque ad 6 cm. alta ex
trunco usque ad 4 mm. lato; alba v. albida, uda maculis pallide
flavidis vel griseis tincta, in ramulos breves, clavatos, tuberifor-
mes divisa; sporis breviter ellipsoideis subcurvulis et uno apice
subattenuatis, asperulis, 16-18 \times 8-10.
Hab. in silvis prope Teisendorf Bavaricæ.
37. **Clavaria oblectanea** Britz. — Syll. XI, p. 139. — Britzelmayr, 1679
Revis. Hymenomyc. (1909) p. 222. — Non v. indistincte stipitata;
ramis paucis fere e terra oriundis; toto fungo 5 cm. alto et usque
ad 4 mm. lato, ex isabellino flavo-ochraceo clavulis apice plus mi-
nusve denticulatis raro breviter clavatis v. rotundatis; carne al-
bida non amara; sporis flavis, breviter elongatis longe apiculatis,
asperulis v. minute et crebre aculeolatis, 10-13 \times 4-6.
Hab. in silvis prope Augsburg et in Algovia, Bavaria. — *Cl.*
testaceo-flavæ affinis.
38. **Clavaria ornatipes** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 122, p. 18 1680
et pag. 160. — Clavis 2,5-5 cm. altis, gregariis, parce ramosis;
stipite angusto piloso, fusco v. brunneo, ramis irregularibus, tere-
tibus, albidis, griseis v. cinereis, apice acuto v. obtuso; sporis late
ellipsoideis v. subglobulosis, 7,5-11 \times 6-7,5.
Hab. inter muscos in locis humidi silvarum, Sand Lake Amer.
bor. — A *Clavaria trichopoda* Pers. colore et habitu distincta.
39. **Clavaria truncata** Harrison Lovejoy, Botan. Gazette v. 50 (1910) 1681
pag. 385. — Apicibus pileatis rubris, ad rubro-aurantiacum in
apice nutantibus, basi pallide carneis, summitate truncata, e con-

vexo plana v. subconcava, 0,5-3 cm. lata, levi, fere tota, basi excepta, etiam in sicco albo-pruinosa; carne cremea, spongiosa; stipite longitudinaliter usque ad basim sulcato, 3-10 cm. longo; sporis albis, $14 \approx 7$,

Hab. gregaria v. cæspitosa ad terram humosam in silvis Coniferarum in editioribus Rocky Mountain Amer. bor. — A *Clav. pistillari* bene distincta.

40. **Clavaria gracilior** Britz. — Syll. XI, pag. 138. — Britzelmayr, 1682
Revis. Hymenomyc. (1909) pag. 223. — Alba, demum hinc inde pallide flava, 8 cm. alta, basi 1-3 mm. cr., supra usque ad 5 mm. sæpe apice acuminata raro etiam obtusa; massa sporarum alba; sporis hyalinis, breviter ellipsoideis, uniguttulatis, $6-8 \approx 3-4$.

Hab. in herbidis Bavariæ et Algoviæ. — *Clavaria fragilis* Holms. var. *gracilior* Holms. sporis majoribus, $10-12 \approx 4-5$, a præsentente bene distincta.

41. **Clavaria argillosa** Britz. — Syll. XI, p. 138. — Britzelmayr, 1683
Revis. Hymenomyc. (1909) pag. 223. — *Cl. argillaceæ* affinis, a qua differt præcipue sporis multo majoribus, $10-12 \approx 6-8$; solitaria v. subcæspitosa 5-7 cm. alta; stipite flavo, clavulis albidis supra pallide rubro-brunneis, obtusis.

Hab. in herbosis silvaticis prope Oberstaufen Bavariæ.

42. **Clavaria mira** Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII (1907) pag. 71 1684
cum icon. — Solitaria v. 2-3-fasciculata, erecta, simplex, carnosæ. 8-15 cm. alta, regulariter cylindræa, basim versus leniter attenuata, apice 6-11 mm. cr., obtuso-rotundata v. truncata, mamillata, parte hymeniali sulcis longitudinalibus, irregularibus, numerosis, instructa, subtus levi et glabra; pallide brunnea v. pallide avellanea, intus cava; basidiis cylindræeis, clavatis, $30 \approx 19$; sporis hyalinis, ovoideis, levibus, $8-10 \approx 4-5$.

Hab. ad terram in silvis vallis Djirin Indo-Chinæ (EBERHARDT).

Cl. pistillari proxima.

43. **Clavaria helicoides** Pat. et Demange Bull. Soc. Mycol. Fr. (1910) 1685
p. 44. — Solitaria, sparsa, simplex, aurantio-rufescens, cylindræa, apice acuta, deorsum tenuata, 1-3 cm. alta, 1-2 mm. cr., carnosæ, pro more helicoideo-contorta, erecta v. subinclinata; sporis

Hab. ad terram nudam, Hoa Binh Hanoi. — *Clav. spirali* et *Clav. amœnæ* affinis.

44. **Clavaria asperulispora** Atkins., Ann. Mycol. VI (1909) p. 55. — 1686
Simplex, gregaria, ligneo-brunnea, gracilis, cylindrico-subclavata,
Syll. fung. XXI (VIII-1911)

deorsum attenuata, 4-7 cm. alta, 2-3 mm. crassa; basidiis clavatis, 30 \approx 10-12, tetrasporis; sporis hyalinis, globosis, echinulatis, pedicellatis, 6-7 μ .

Hab. ad terram in silvis Ithacæ N. Y. Amer. bor.

45. **Clavaria pallescens** Peck, N. Y. St. Mus. Bull. n. 131 (1909) 1687 p. 35 et n. 139 (1910) p. 47. — Clavis simplicibus, laxe cæspitosis v. gregariis, 2,5-4 cm. longis, clavatis, mollibus, fragilibus, obtusis, luteolis, deinde albescentibus, aliquando minute rugulosis, fectis v. cavis, intus flavis; stipite 2-4 mm. longo, glabro, flavido; sporis oblongis v. ellipsoideis, albis, 9-12 \approx 6-8.

Hab. in solo arido glareoso ad truncum *Kahniæ angustifoliæ*, South Acton Mass., Amer. bor. (S. DAVIS). — *Clav. ligulæ* proxima.

46. **Clavaria rosacea** P. Henn. in Voelzkow, Reise Ostafrika III 1688 (1908) p. 19, taf. II, fig. 5. — Simplex, solitaria, fusoidea, apice acutiuscula, rosacea, levi, glabra, 3-4 cm. longa, 1,5-2 mm. cr.; basidiis clavatis; sporis globosis, 1-guttulatis, hyalinis, 4-5 μ .

Hab. ad corticem arborum, Sakana Madagascar. — *Cl. lætæ* et *Cl. Braunii* sporis diversa.

47. **Clavaria biformis** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) pag. 56. — 1689 Sordide alba v. sordide flava, cylindrica, deorsum leviter attenuata, 1-4 cm. alta, 0,5-1,5 mm. crassa, plerumque simplex, raro 1-2-furcato-ramosa; sporis obovatis, hyalinis, levibus, 3-4 \approx 2-3.

Hab. ad terram in silvis Ithacæ N. Y. et Blue Ridge Mts. N. C. Amer. bor.

48. **Clavaria cinereo-atra** Rick, Broteria V (1906) p. 12. -- Solitaria, 1690 simplex, 2-3 cm. alta, 3-5 mm. crassa; clavula rugosa, cinereo-atra, albo-pruinosa; stipite in vegeto albo, dein stramineo, glabro; sporis albis, subglobosis, 15 μ . diam.

Hab. ad terram Rio Grande do Sul Brasilæ.

49. **Clavaria citripes** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 56. — Sub- 1691 clavata 1,5 cm. alta, 2-3 mm. cr., citrino-flava, siccitate flava; sporis ovatis, hyalinis, glabris, 4-5 \approx 3.

Hab. ad terram in nemoribus Ithacæ N. Y. Amer. bor.

50. **Clavaria conchyliata** Allen, Trans. Brit. Mycol. Soc. (1908), III 1692 (1909) p. 92 tab. VIII. — Minuta, tenuissima, gregaria sed basi discreta; clavulis primo simplicibus apice dentatis, dein dichotome ramulosis, e violaceo decolorantibus 5-10 mm. long.; stipite pubescente rufo-carneo; carne alba; mycelio filamentoso albo; sporis hyalinis globosis, 2,5-3 μ .

Hab. ad terram nudam in coryletis Tickwood Salop, Britannia.

51. **Clavaria foetida** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 56. — Alba, 1693 siccitate flava, gradatim inferne leviter attenuata, 4-6 cm. alta, 1,5-2 mm. crassa; basidiis 2-sporis; sporis obovatis, 6-9 \times 5-7.

Hab. in silvaticis, Coy Glen Ithacæ N. Y. Americæ bor. — Graveolens.

52. **Clavaria Bourdotii** Bres., Fungi gall., Ann. Myc. VI (1908) p. 45. 1694 — Subiculo himanthiiformi, albo; clavulis subulatis, pruinatis sublente dense gregariis, sæpe congestis, pallide olivaceis, 2 mm. circiter longis, $\frac{1}{4}$ mm. crassis; sporis flavo-olivaceis, sabulosis, subfusoides, hilo depressis, 6-8 \times 2 $\frac{3}{4}$ -3 $\frac{1}{2}$; basidiis clavatis, 15-24 \times 5-6.

Hab. ad frustula lignea conglomerata, St. Priest Galliæ. — Species habitu *Hydni Himantia* Schw., sed affinitate *Clavariæ Bresadolæ* accedit et sporis potius *Clavariis* quam *Hydnis* adscribenda.

53. **Clavaria subfalcata** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 58. — 1695 Sparsa, simplex, tenuis, alba in sicco flava raro alba; clavula subfalcata; stipite distincto, ad basim mycelio radianti prædito; sporis ovoideo-subellipsoideis, levibus, 7-10 \times 5-7.

Hab. ad terram in silvis Ithacæ N. Y. et Blue Ridge Mts. N. C. Amer. bor. — *Cl. affini* proxima sed sporis non punctulatis.

54. **Clavaria sibutiana** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. 1696 (1909) n. 2, p. 89. — Terrestris; simplicissima, undique rufula, 1-2 cm. alta; clavula oblonga, vix 1 mm. lata, apice attenuata, glabra, sæpe canaliculata; stipite circiter 2 mm. longo, 0,5 mm. crasso, glabro cylindrico.

Hab. ad terram, Haut-Oubangui, Fort Sibut, Congo Africae trop. — *Cl. falcatae* affinis sed colore diversa.

55. **Clavaria brachyorrhiza** Scopoli, Annus historico-naturalis, IV 1697 (1770) pag. 150, tab. I, fig. 10. — Simplex, aggregata, aurantioflava longe radicata; clavulis interdum bifidis; radicibus invicem quasi connatis, tenuibus, simplicibus, flavescentibus.

Hab. in silvis circa Windschacht Hungariæ.

56. **Clavaria pamparum** Speg. nom. nov., An. Mus. Nac. Buenos Aires 1698 t. XIX (1909) p. 280. — Ita vocanda *Clavaria pampeana* Speg. Fungi Arg. nov. v. crit. n. 279, non Speg. Fungi Arg. pug. IV, n. 40.

57. **Clavaria Zippelii** Lévl. — Syll. VI p. 712. — Huc ducenda est, 1699

teste v. Höhn. Sitzb. k. Akad. d. Wiss. April 1909, *Clavaria æruginosa* Pat.

58. *Clavaria Cavaræ* Sacc. et Trav. — Syll. XIX, pag. 317. — Ita 1700
vocanda est *Clav. Bresadolæ* Cav. — Syll. XI, p. 136 n. 10 —
nam extat anterior homonyma Quéletii (Syll. l. c. p. 136, n. 13).

59. *Clavaria lætissima* Berk. non Pers. ut in Syll. VI, pag. 709 *). 1701

60. *Clavaria umbraticola* Leuba, Champ. comest. p. 77, tab. 42. — 1702

Solitaria, ramosissima, mollis, rufescenti-rubella unicolor; trunco
crasso multifido inæquali, ramis teretiusculis, erectiusculis apice
obtuse dentatis; carne solida ex albo rubella; sapore ingrato ligneo.

Hab. in silvaticis montanis umbrosis inter muscos, præsertim
in abietinis in Helvetia. — Sec. Quélet ms. non satis differt a
Clavaria rufescente.

Clavariæ species sequentes omnino dubiæ memorantur in Syll. XIX,
p. 331: *Clavaria conjugata* Hoffm. - *Cl. crispa* (Scop.) - *Cl. deflexa*
Hoffm. - *Cl. echinata* Scop. - *Cl. erythrina* Lév. - *Cl. minuta* Raddi.

LACHNOCLADIUM Lév. — Syll. VI p. 738, IX p. 252, XI p. 139,
XIV p. 239, XVI p. 209, XVII p. 197.

1. *Lachnocladium odoratum* Atkins., Bull. Connect. St. Nat. Hist. 1703
Surv. III (1905), Ann. Mycol. VI (1908) p. 58. — Dense cæspit-
tosum, 8 cm altum, ramoso-furcatum; ramis luteis v. cinereis,
tactu brunneis, hic illic tomentosus et sterilibus; apicibus brunneo-
rubris, acutis; sporis levibus, 7-10 \approx 3,5-4,5; suaveolens.

Hab. ad ligna putrida, Connecticut Amer. bor.

2. *Lachnocladium chartaceum* Pat., Ann. Mycol. V (1907) p. 365. — 1704
Coriaceum, erectum, 4-8 cm. altum, stipitatum, ramosum, albidum;
stipite brevi, 1-2 cm. long., crassiusculo, 6-8 mm. cr. v. gracili, 2-3
mm., albo, glabro, subtereti, plicato-striato, ramosissimo, ramis gra-
cilibus, æqualiter repetito-furcatis, fastigiatis, lateraliter canaliculatis
puberulisque, axillis compressis, apice longe acuminatis; sporis
subhyalinis, ovoideis, asperulis, 6 \approx 4; mycelio membranaceo, albo,
obducenti.

*) Recte observante Lloyd (Mycol. Not. n. 34, pag. 446) auctor speciei est
Berkeley non Persoon; de quo Sylloges lapsu facete ridet. Cl. Lloyd, mycologus
actuosus et iconum fungorum pretiosus editor, quam est citationum et micro-
scopii avarus, tam est sæpe nugarum amicus et iudex levissimus. Si in sua tam
prædicata bibliotheca mycologica habuisset *Journ. of Linn. Soc.* vol. XVII
(1831), mox vidisset non me sed Berkeleyum esse mendæ auctorem!

Hab. ad truncos, Prov. Sao Paulo, Campinas Brasilæ. — Habitus quasi *Clav. dealbatæ* et *Cl. dilatatæ*.

3. **Lachnocladium manaosense** P. Henn. Fungi Amaz. IV, Hedw. 1705 XLIV (1905) p. 59. — Cæspitosum, stipitatum, coriaceum brunneo-cinerescens, 5-6 cm. altum, stipitibus subteretibus varie longis, basi bulboso-incrassatis, confluentibusque; ramis repetito subverticillatis, subteretibus, circ. 0,5-0,8 mm. cr., axillis haud compressis, ramulis dichotomis v. palmatifidis, subulatis, interdum cirratis, apice acutis, levibus; sporis ovoideis v. subellipsoideis, hyalinis, intus subgranulatis, 5-6 \approx 4,5-5.

Hab. ad terram udam silvaticam Rio Negro, Manáos Amazonia.

4. **Lachnocladium subochraceum** Sacc. Myc. cong. novi, Ann. Myc. 1706 IV (1906) p. 73. — Totum ceraceo-coriaceum sed fragile, ochraceo-fulvum, 3 cm. alt., vix, sub vitro, tenuissime velutinum; trunco brevissimo minuto, 2-3 mm. cr., mox in ramos filiformes et sensim tenuiores multoties dichotomice partito, ramis teretiusculis ad axillas dilatato-compressis, divergenti-ascendentibus; setulis filiformibus, 2,5-4 μ . cr., brevibus, plus minus regulariter dichotomice divisis, ramulis ultimis divergentibus mucroniformibus; sporis..... non visis.

Hab. ad ?ramos putres dejectos, Kisantu, Congo (J. GILLET). —

A *Lachn. ochraceo*, quod habitu æmulatur, differt setulis copiosis eximie iterato-dichotomis, a *Lachn. subpteruloide*, quocum setulis congruit, distinguitur axillis latiusculis et applanatis.

5. **Lachnocladium dubiosum** Bresad. ap. Rick, Broteria V (1906) p. 13, 1707 tab. VI, fig. 3 (sine diagnosi).

Hab. ad frustula lignea, Rio Grande do Sul Brasilæ. — Ex phototypia videtur species valde cæspitoso-intricata, compactiuscula, ramulis minutis gracilibus e trunculis crassiusculis orientibus.

PTERULA Fr. — Syll. VI p. 740, IX p. 255, XI p. 140, XIV p. 242, XVI p. 213, XVII p. 199.

1. **Pterula timorensis** Torrend, Broteria IX (1910) p. 89, fig. 4. — 1708 Dense gregaria, in cæspitulos 2-3 cm. circ. altos fasciculata, tenax cartilaginea, in sicco rufo-brunnea; stipite brevissimo, vix 0,5-2 mm. alto, 1-2 mm. cr., mox ramosissimo; ramis filiformibus ad bifurcationem sæpe membrana tenui 0,5 mm. lata, inter se conjunctis, subulatis; basidiis clavatis, 14-18 \approx 3-4, hyalinis; sporis ellipsoideo-ovoideis, basi apiculatis, 5-6 \approx 3,5-4,5, centro leviter ochraceis; hyphis 3-4 μ . crassis.

Hab. ad corticem arborum in insula Timor Oceaniæ. — *Pt. hirsutæ* P. Henn. subaffinis; inter *Phæopterulas* locanda. An species sit glabra v. pilosa auctor tacet.

2. ***Pterula tahitensis*** Reichardt, Novara-Exped., Fungi (1866), p. 136. 1709
— Cæspitosa, 12-14 mm. alta, caulescens, cornea, crocea, basi pilis fasciculatis canescentibus strigosa, dichotoma, ramis apice compressis, obtusis; basidiis tetrasporis; sporis globosis, 7-8 μ . diam., albis, levibus.

Hab. ad truncos putrescentes in silvis prope Papeiti insulæ Tahiti. — *Pterulæ dendroidi* videtur affinis.

3. ***Pterula Vanderysti*** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo v. II, 1710 fasc. II (1907) p. 96. — Subulata, simplex basi sæpe fasciculata, pallide cinerea pruinosa, c. 2-3 mm. longa, 120 μ . cr., apice acutiuscula 20-40 μ . cr.; sporis globosis, hyalinis, levibus, 5-6 μ . cr.

Hab. ad ramos emortuos, Kisantu (Congo), maj. 1906 (leg. VANDERYST).

4. ***Pterula Winkleriana*** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 1711 p. 121. — Cartilaginea, flavidulo-cinerea, cæspitosa, basi ramoso-fasciculata, bysso albida circumdata; ramis filiformibus plerumque simplicibus, raro ramulis, apice sæpe cirratis, usque ad 3-3,5, 150-180 μ . cr.; basidiis clavatis, 15-20 \times 8; sporis subglobosis, 1-guttulatis, hyalino-flavidulis, 5-7 μ . cr.

Hab. in laciniis Palmarum Victoria Kamerun (WINKLER). — *Pter. importatæ* P. Henn. similis sed sporis sphæroideis diversa.

5. ***Pterula humilis*** Speg. — var. ***tucumanensis*** Speg., An. Mus. Nac. 1712 Buenos Aires, t. XIX (1909) p. 280. — A typo stipite longiore atque apice abruptius ramoso distincta, in vivo candida mollis sed tenax, in sicco carnea rigidula coriacea; sporis ellipsoideis v. ovatis 4 \times 3, grosse 1-guttulatis hyalinis.

Hab. ad ramos emortuos putrescentes in Parque Roca, Tucuman Argentina. — Nullibi reperimus nomen: *Pterula humilis* Speg. Verisimiliter occurrit lapsus calami et loco *Pterulæ* legendum est: *Clavaria humilis* Cooke — Syll. IX, p. 251.

TYPHULA Pers. — Syll. VI p. 743, IX p. 255, XI p. 141, XIV p. 243, XVI p. 214, XVII p. 201.

1. ***Typhula castaneipes*** Atkins. An. Mycol. VI (1908) p. 60. — Cy- 1713 lindrico-subclavata v. teres, lenta, simplex v. raro semel furcata 3-6 cm. alta; clavula 8-20 mm. longa, 1,5-2,5 mm. crassa, alba v. pallide rosea; stipite filiformi, glabro, recto v. flexuoso; basi-

diis clavatis, bisporis; sporis hyalinis, obovato-subglobosis, levibus, 8-11 \times 6-9.

Hab. ad terram in silvis, juxta aquam rivuli decurrentem, Aho Blue Ridge Mts., N. C., Amer. bor.

2. **Typhula tucumanensis** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX. 1714 (1909) pag. 280. — Sclerotigena; sclerotiis pusillis, 0,5 mm. diam., parenchymate innatis nigris subdiscoideis applanatis, areola angusta albescente cinctis; clavulis erectis apice acutissimis simplicibus 2-3 cm. long., 200-250 μ . cr.; basidiis clavulatis 30 \times 8-9, hyalinis, sterigmatibus 4 brevissimis coronatis; sporis ellipsoideis, leniter inæquilateralibus, 6-8 \times 3-4, grosse 1-guttulatis, hyalinis.

Hab. ad folia dejecta putrescentia Bignoniæ cujusdam in parque Roca Tucuman Argentinæ.

3. **Typhula stricta** Appel, Arb. k. Biol. Anst. f. Land. u. Forst- 1715 wirtsch. V (1905) Heft III, p. 151. — Sclerotio globoso, interdum umbilicato, usque ad 5 mm. cr., nitide nigro; stipite solitario, initio ad sclerotium rhizoidibus copiosis adnato, tenui, dein crassiusculo, erecto, 13-32 mm. alto, 1,5 mm. cr., sursum sensim in clavulam producto, ex albido flavido, ceraceo, diaphano; basidiis 5-7 μ , cr., sterigmata quaterna corniculata gerentibus; sporis ellipsoideis, 6-8 \times 3-4,5

Hab. (sclerotium) ad caules siccos Solani tuberosi, jam ad fœnum tegendum adhibitos, prope Berolinum.

4. **Typhula cylindrospora** Atkins., Ann. Mycol. VII (1908) p. 60. — 1716 Alba, 1-3 cm. alta, filiformis; clavula cylindrica, 2-4 mm. longa; stipite solido, glabro, ad basim villosa; basidiis 25 \times 5-6, tetrasporis; sporis cylindrico-oblongis, rectis v. leviter flexuosis, levibus, 10-14 \times 2,5-3.

Hab. ad folia putrida Ithacæ N. Y., Amer. bor.

5. **Typhula subphacorrhiza** Britz. — Syll. XI; p. 141. — Britzelm., 1717 Revis. Hymenomyc. (1909) pag. 224 — Hybernaculo compresso usque ad 8 mm. longo, flavo-rubro v. flavo-rubro-brunneo, tuberculiformi; clavula usque ad 14 cm. alta, stipitibus longis, filiformibus plus minusve incurvatis prædita; parte hymenifera vix 1 mm. lata, apice acutata pallide flavida v. flavido-brunneola; sporis breviter ellipsoideis uno apice acutatis, eguttulatis, 13-16 \times 4,5-6.

Hab. in silvis prope Augsburg Baviaræ. — *Typh. phacorrhizæ* affinis.

6. **Typhula intermedia** Appel et Laubert, Arb. k. Biol. Anst. f. Land- 1718 u. Forstwirtschaft. V (1905) Heft III, p. 153. — Solitaria ex scle-

rotio globoso, sæpe castaneo, umbilicato, 1-4 mm. diam., oriunda, typice simplex, 1,5-2,5 cm. alta, pallida, ceracea; clavula gracili 0,5 cm. longa, 1,5-2 mm. cr., in stipitem filiformem, tenuissime pilosum sensim transeunte; basidiis 4-sterigmaticis; sterigmatibus subulatis, 7,5-10 μ . long., basi 3 μ . cr.; sporis ovoideis, continuis, basi lateraliter apiculatis, 12-14 \times 6, hyalinis, guttulam unam majorem pluraque minutas foventibus.

Hab. sclerotia in sarmentis *Vitis viniferae* per hiemem tectis; clavulae aprili-majo evolvuntur, prope Berolinum. — Non raro occurrunt formae steriles filiformes pluries ramosae vix clavulatae.

7. **Typhula tenerrima** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 1719 (1909) p. 280. — Maculis nullis; clavulis amphigenis, erectis, rectis v. flexuosulis, candidis 3-5 mm. long., 50 μ . cr., apice acutis, basi non vel vix fuscescentibus insititiis; basidiis clavulatis, 25-30 \times 10, hyalinis, sterigmatibus brevibus acutis; sporis levibus non v. vix inaequilateralibus, 6-8 \times 2,5-3, grosse 1-guttulatis, elongato-ellipsoideis.

Hab. ad folia dejecta putrescentia Chamissoe altissimae in dumetis Parque Roca, Tucuman Argentinae.

PISTILLARIA Fr. — Syll. VI p. 752, IX p. 255, XI p. 141, XIV p. 243, XVI p. 215, XVII p. 201.

1. **Pistillaria Batesi** Peck, Journ. of Mycol. XIV (1908) pag. 3. — 1720
Dense gregaria, caespites fere compactos ad ramos hospitis efformans; clava molli, carnosae, ovata v. oblonga, obtusa, sessili vel deorsum stipitiformi-angustata, uda pallida, in sicco griseo-cinnamomea et pruinosa 0,5-1 mm. longa; sporis filiformibus, rectis v. curvulis, hyalinis, 10-20 \times 1-2.

Hab. in ramis *Callirhoe involucratae*, Red Cloud Nebraska, Amer. bor. (J. M. BATES). — Species inter ceteras minima, parasitica.

BAUMANNIELLA P. Henn. — Syll. XIV p. 244.

1. **Baumanniella brasiliensis** Rick, Broteria V (1906) p. 11. — Ca- 1721
pitulis gregariis, globosis, sæpe depressis, cavis, albo-stramineis, demum exsiccando rubro-brunneis, pruinatis, 3-5 mm. diam.; stipite usque ad 3 mm. alto, 0,5 mm. lato, primitus albo-pruinoso, demum obscuriore; basidiis monosporis; sporis ovoideis, 6 μ . long., 3,5 μ . lat., apiculatis; cystidiis lageniformibus,

Hab. in vulneribus arboris *Anchietææ salutaris*, Rio Grande do Sul Amer. austr.

PHYSALACRIA Peck — Syll. VI p. 759, IX p. 256, XVII p. 203.

1. **Physalacria Bambusæ** von Höhn. Stzb. k. Ak. d. Wiss. Wien 1722 CXVIII, Abt. I (1909) p. 290. — *Gregaria alba*, arescendo flavida, capitulo usque ad 330 μ . cr., vesiculoso, cavo, globoso vel ovoideo, sicco collapsio, stipitato, stipite farcto cylindrico 360-450 \times 40-60, ex hyphis parallelis, hyalinis 3-5 μ . cr., conflato; cystidiis nullis; basidiis cylindricis, 12-14 \times 3-4; sterigmatibus quaternis acutis 5 μ . long.; sporis globosis hyalinis, punctato-asperulis 3-4 μ . cr.

Hab. in culmis *Bambusarum* emortuis in Horto Bot. Buitenzorg ins. Javæ.

2. **Physalacria rugosa** Rick, Broteria V (1906) p. 12. — Pileo usque 1723 ad 0,5 cm. diam., hemisphærico, subcarnoso, ceraceo-molli, stramineo, ruguloso ad formam *Gyromitræ* minimæ cujusdam, intus cavo; stipite fuligineo, albo-pruinato, pileum percurrente, 0,5 cm. alto, 2 mm. lato; basidiis clavatis 25 μ . longis, sterigmatibus 3-6 μ . longis; sporis 3,5 μ . long., 2 μ . latis, subhyalinis.

Hab. ad frustula ligni, Rio Grande do Sul Brasiliæ.

3. **Physalacria andina** Patouillard, Essai taxonom. Hyménomyc. p. 50, 1724 *Phys. orinocensis* Pat. et Gaill. — Syll. IX, p. 256. — var. *andina* Pat. Bull. Soc. mycol. (1893) p. 136. — A typo dignoscitur clavula sursum tenuato-conica, non ovoideo-subglobosa; cystidiis obclavato-ampullaceis levibus v. incrustato-asperulis.

Hab. gregatim in ligno emortuo, Pululahua in Æquatoria.

Fam. 6. Tremellaceæ.

1. Auriculariæ.

AURICULARIA Bull. — Syll. VI p. 762, XI p. 143.

1. **Auricularia Butleri** Masee, Kew Bull. n. 4 (1906) p. 94. — Pileo 1725 coriaceo-gelatinoso, tenui, flaccido, effuso, reflexo, sericeo, cinnamomeo, zonis concentricis discoloribus variegatis, margine lobato; hymenio ruguloso, glabro, nudo, e cinereo-nigro, purpurascenti; sporis subcylindræis, curvulis, hyalinis, basi oblique apiculatis, 10-11 \times 5.

- Hab.* in ligno emortuo Dehra Dun Indiæ bor. Asiæ (BUTLER).
— Ab *Aur. mesenterica* Fr. differt præcipue margine lobato, hymenio ruguloso et forma sporarum.
2. **Auricularia Wrightii** (B. et C.) Farl., Bibliogr. Index (1905) p. 309. 1726
Ita vocanda *Hirneola Wrightii* B. et C. — Syll. VI, p. 767.
 3. **Auricularia tenuis** (Lév.) Farl., Bibl. Index (1905) p. 309. — Ita 1727
vocanda *Exidia tenuis* Lév. — Syll. VI, p. 769. — teste Farlow l. c.
 4. **Auricularia nigrescens** (Swartz) Farl., Bibl. Index (1905) p. 308, 1728
Peziza nigrescens Swartz Prodr. p. 150 (1788). Ita nuncupanda est *Hirneola nigra* Fr. — Syll. VI, p. 768.
 5. **Auricularia hispidula** (Berk.) Farl., Bibliogr. Index (1905) p. 307. 1729
— Ita vocanda *Exidia hispidula* Berk. — Syll. VI, p. 769 — teste Farlow l. c.
 6. **Auricularia fusco-succinea** (Mont.) Farl., Bibliogr. Index (1905) 1730
p. 307. — Ita vocanda *Exidia fusco-succinea* Mont. — Sacc. Syll. VI, p. 768 — teste Farlow l. c.
 7. **Auricularia coffeicolor** (Berk.) Farl., Bibliogr. Index (1905) p. 306. 1731
— Ita nuncupanda *Hirneola coffeicolor* Berk. — Sacc. Syll. VI, p. 770 — teste Farlow l. c.
 8. **Auricularia blepharistoma** (B. et C.) Farl., Bibliogr. Index (1905) 1732
p. 306. — Ita vocanda *Hirneola blepharistoma* B. et C. — Sacc. Syll. VI, p. 331 — teste Farlow l. c.

HIRNEOLA Fr. — Syll. VI p. 764, XI p. 144, XVI p. 277.

1. **Hirneola affinis** (Jungh.) Bres. Ann. mycol. (1910) p. 587. — Ita 1733
vocandus *Merulius affinis* Jungh. — Syll. VI, p. 415 — his notis dignoscendus: pilis pilei fasciculatis, stramineis, 50-120 \approx 7-12; sporis hyalinis, cylindræis, curvulis, 10-12 \approx 4,5-5,5; basidiis clavatis, 35-40 \approx 5-6; hyphis contextus intricatis, 1,5 μ . cr. — *Laschia velutina* Lév., teste Bres. l. c. huc quoque spectat.

SACCOBLASTIA Moell. — Syll. XIV p. 244, XVII p. 203.

1. **Saccoblastia pinicola** Bourd. et Galz., Bull. Soc. Myc. Fr. XXV 1734
(1909) p. 16. — Rotundato-effusa, confluens, membranaceo-tomentosa, laxè adhærens, lactea, margine similari sensim attenuato; hyphis hyalinis 3-6 μ . cr., tenuiter tunicatis, fibulato-nodosis, laxè intricatis; probasidiis saccatis pendulis, 40-45 \approx 8-12; basidiis cylindræis, rectis, 96-140 \approx 9-12, 1-3-septatis, ceterum variis; sporis

ovoideis, 15-19 \approx 9-12, tubulis 1-2 cylindræis vel conoideis germinantibus.

Hab. ad ramos superiores Pini silvestris, Causse Noie Galliæ. — *Sacc. graminicolæ* Bres. affinis.

2. **Saccoblastia sebacea** Bourd. et Galz, Bull. Soc. Myc. Fr. XXV 1735

(1909) p. 15. — Late effusa, tenuis, mucoso-gelatinosa, e sordide hyalina livido-rufescens v. pruinoso-cinerescens, sæpius tota evanescens; sporis hyalinis ovoideis 6-10 \approx 4,5-6, promycelio brevi lateraliter v. apice gignentibus conidium ejusdem formæ et mensuræ; probasidiis ovoideis, saccato-pendulis, inferis (ad basim hypharum fertiliū); basidiis 40-65 \approx 5-7, arcuatis, 2-3-septatis, articulis dorso sterigmatiferis, sterigmatibus conoideis, brevibus, 6-10 μ . l.; hyphis frequenter septatis sine nodulis, 3-6 μ . cr.

Hab. ad ligna putridissima Salicis, Fraxini, Juglandis etc., rarius ad humum, Allier, Aveyron Galliæ.

HELICOBASIDIUM Pat. — Syll. VI p. 666, IX p. 245, XIV p. 244 (sub *Stypinella*).

1. **Helicobasidium hypochnoides** (v. Höhn.) Sacc. et Trott. *Stypinella hy-* 1736

pochnoides v. Höhn. Ann. mycol. (1905) p. 324. — Tenuis plus v. minus effusa, fortiter adnata, primum albida minute farinosa, margine attenuata, centro hymenium tenue plerumque brunneo-violaceum, decoloratum vel flavo-brunneum leve vel granulosum efformans; hyphis basilaribus pallidis v. hyalinis, crebre septatis, subtenuiter tunicatis, validis, plerumque ramosis, 8-10 μ . cr., supra quandoque cæspitose-ramosis et apice conoideo- v. sphæroideo-incrassatis; basidiis rectis, Auriculariaceis, 30 \approx 5-6, cylindræis, 3-4-cellularibus, sterigmatibus 20 \approx 2; sporis ovoideis v. elongatis, hyalinis, tenuiter tunicatis, basi acutatis, inæquilateralibus, contentu minute granuloso, 9-11 \approx 4,5-6,5.

Hab. in ligno fagineo putri prope Pressbaum Austriæ. — *Helicobasid.* (*Stypinella*) *orthobasidio* affine.

2. **Helicobasidium incrustans** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 1737

p. 355. — Mycelio hypophyllo radiatim effuso usque ad 1 diam. lato, incrustante, theobromino-brunneo, 60-170 μ . cr.; hyphis non parasiticis, superficialibus, flavo-rubris, stratum cuticulæ adhærens tenuissimum formantibus; ramulis numerosis ex strato surgentibus, æquicrassis; ramulis sterilibus in setulas copiose et iterato ramosas apicibus uncinatas et lateraliter curvato-spinulosas desinentibus; basidiis ex hyphis inferioribus lateraliter surgentibus, basifugaliter

formatis, hyalinis, 20-28 \approx 5-6, sæpius spiralibus vel varie flexis quadricellularibus, sterigmatibus ex quaque cellula oriundis usque ad 60 μ . long.; sporis acrogenis fusosideo-linearibus, 18-24 \approx 3,5-4, hyalinis et levibus.

Hab. in pagina inf. foliorum *Adinandræ*, *Jambosæ*, *Pavettæ* etc. in ins. Java. — A typo generis nonnihil deflectens.

3. **Helicobasidium inconspicuum** v. Höhnel, Sitzb. k. Ak. Wiss. Wien 1738 CXVII (1908) Abt. I, p. 1024. — Effusum tenuissimum, subdiaphanum, subfarinaceum, immarginatum; hyphis intricatis, absque fibulis, 2-3 μ . cr.; basidiis emergentibus tereti-clavatis, rectis curvulisve, sæpius transverse 4-ocularibus, oculis singulis sterigma breve ferentibus, 40-50 \approx 7-8; sporis breviter cylindraceis v. subovoideis, intus granulosis, basi apiculatis, 10-12 \approx 7-7,5.

Hab. in ligno putri quercino, Wienerwald Austriæ. — *Helic. farinaceo* subaffine.

4. **Helicobasidium farinaceum** v. Höhnel, Fragm. z. Mykol. Sitzb. k. 1739 Ak. d. Wiss. Wien Bd CXVI, Abt. I (1907) p. 84. — Maculiforme dein effusum, tenue, arcte adhærens, in marginem sensim evanescens, ex albido cremeum, subinde roseo-tinctum, subfarinaceum; contextu laxo ex hyphis 4-5 μ . cr., ramosis, parce septato-fibulatis; basidiis sparsis, 50-52 \approx 8-9,5, sæpius transverse 4-articulatis; sterigmatibus 8 μ . longis; sporis oblongo-cylindraceis, basi oblique apiculatis, hyalinis, intus granulosis, 16-18 \approx 9-9,5.

Hab. ad ligna putrescentia faginea, Wienerwald Austriæ. — Habitus *Helicobasidii hypochnoidei* v. Höhn. sed fabrica alia.

HERPOBASIDIUM J. Lind, Arkiv. f. Bot. VII (1908) n. 8, Extr. p. 5 (Etym. *herpein* reperere et *basidium*, ob hyphas mycelii basidiophoras supra epidermidem repentes). — Ab affini *Helicobasidio* differt basidiis rectis nec curvatis et hyphis ramulos laterales binos infra septum transversum, basidium a mycelio separans, ferentes; præterea ob sporas magis compactas et interdum coloratas.

1. **Herpobasidium filicinum** (Rostr.) Lind, l. c. pag. 7, tab. I et II, 1740 *Glæosporium filicinum* Rostr., *Exobasidium Brevieri* Boudier — Syll. XVI, p. 198.

Hab. in foliis *Aspidii Filicis-maris*, A. *Dryopteridis* et A. *Phegopteridis* in Norvegia, Suecia, Dania, Gallia, Rossia etc.

SEPTOBASIDIUM Pat. — Syll. XI p. 118, XIV p. 215, XVI p. 184, XVII p. 203. — Sec. Patouillard, Bull. Soc. Myc. de Fr. t. XXIV (1908) pag. 2, ad hoc gen. spectant: *Thelephora Thwaitesii* B. et Br., *Th. dictyoides* B. et Br., *Th. suffulta* Berk. et Br., *Corticium reticulatum* B. et Br.

1. **Septobasidium humile** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 1741 p. 363. — Hypophyllum, tenue; hyphis copiose ramosis, septatis, brunneis, 3-4 μ . cr., fasciculis 40-90 μ . long., ex hyphis basi 4-5 μ . cr., supra abunde ramoso-expansis (200-400 μ .) constitutis; sporis globosis, tenuiter tunicatis, levibus, primum hyalinis, dein hyalino- v. brunneo-tunicatis, 14-16 μ . latis; basidiis hyalinis vel brunneis 34-42 \times 5-7; sterigmatibus lanceolatis 10 \times 3; sporidiolis ovoideis, levibus, rectis, plerumque pallide brunneis, 18-20 \times 5.

Hab. in foliis *Tetrantheræ* sp. Pangerango in ins. Java.

2. **Septobasidium Cinchonæ** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 1742 p. 366. — Crustis albo-cretaceis, fere ceraceis, usque ad 0,5 mm. cr., inæqualibus; strato basilari fere inconspicuo, hymeniali verruciformi; fasciculis 50-200 μ . long., 70-100 μ . latis, hyphis 4-5 μ . cr., supra effusis, crasse tunicatis, pallide brunneis; hyphis stratus hymenialis 2 μ . cr., hyalinis; sporis globosis, tenui-tunicatis, hyalinis 18-25 μ . diam.; basidiis cylindraceutis 45 \times 8; sporidiolis hyalinis, 19 \times 4-5.

Hab. ad ramos *Cinchonæ* in ins. Java.

3. **Septobasidium Mompa** (Tanaka) Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie 1743 (1909) p. 365, *Helicobasidium Mompa* Tanaka, New spec. of Mulberry fungus in Journ. Sc. coll. Tokio (1891) p. 193, t. XXIV-XXVII). — Pileo sessili, resupinato, ex orbiculari oblongo, sæpe irregulariter lobato, 5-10 cm. lat, 2-4 mm. cr., initio membranaceo et velutino, dein subcoriaceo, convexulo, incrustato purpureo-brunneo, denique albo-pruinoso; hymenio albo; basidiis curvis, transverse 1-3-septatis, tetrasporis; sterigmatibus elongatis; sporis ovoideis, curvis, hyalinis, 10-12 \times 5-7.

Hab. ad corticem vivum ramorum et ramulorum *Mori* albæ, cui noxium, afferens morbum *Mompa* dictum, in Japonia. — *Septobasidium bogoriense* Pat. ap. Hennings — Syll. XVI, p. 184 — videtur synonymum.

4. **Septobasidium Bagliettoanum** (Fr.) Bres. Ann. mycol. (1905) p. 164. 1744 Ita vocandus *Hypochnus Bagliettoanus* Fr. — Syll. VI, p. 661 — et ita describendus teste Bres. — E resupinato-adpresso mox liberum, centro tantum adfixum, margine elato vel revoluto, to-

mentoso-membranaceum, fusco-vinosum vel fusco-lividum, ambitu fulvello, fimbriato; hymenio levi; contextu ex hyphis fusco-fulvis, 4 μ . crassis conflato; hyphis basidiiferis superne pallidis 3 μ .; basidiis ex ovoideo cylindraceo-subclavatis, 3-septatis, variæ longitudinis, 4 μ . crassis; sporis hyalinis, sinuoso-vermiformibus, uno apice rostratis vel falcato-rostratis, continuis (an semper?) 22-30 \times 4-6.

Hab. ad corticem *Quercus Ilicis*, in Etruria (MARTELLI).

5. **Septobasidium Cavaræ** Bres. Ann. mycol. III (1905) p. 164. — 1745

Resupinatum, ex orbiculari oblongum, contextu tomentoso ex hyphis tenacibus, umbrinis, sub micr. fulvis, 3-5 μ . crassis, conflato; margine fibroso-fimbriato; hymenio membranaceo, castaneo-umbrino, levi, dein rimoso; hyphis basidiiferis superne pallidis, 3-4 μ . crassis; basidiis ex ovoideis cylindraceo-subclavatis, interdum curvatis, 3-4-septatis, 60-75 \times 8; sporis subclavatis, sæpe sigmoideis, hyalinis, 1-3-septatis vel raro ultra, 27-30 \times 5.

Hab. ad truncos et ramos *Pistaciæ Lentisci*, in Sardinia (CAVARA). — *Septobasidio Micheliano* affine. — Sec. cl. Patouillard, in Addit. Cat. Champ. Tunis. 1909, *Septob. Michelianum* (Cald.) Pat. est species polymorpha, cujus formæ sunt: a. *genuinum* (in Lauro); b. *Alni* (in *A. glutinosa* in Tunisia); c. *Carestianum* [Sept. Carest. Bres.] (in Fraxino, Salice, Corno et in ipsa Lauro, in Italia et Maroco); d. *Phillyreæ* (in Tunisia); e. *Cavaræ* [Sept. Cavaræ Bres.] (in Pistacia, in Sardinia et Tunisia); f. *Ceratonice* (in Algeria).

6. **Septobasidium scopiforme** Pat., Ann. Mycol. V (1907) pag. 364. 1746

Bull. Soc. Myc. Fr. XXIV (1908) p. 1 cum iconib. — Brunneum, erectum, dense cæspitosum, subteres, inflato-nodosum, acutum, circiter 2 cm. altum, ex hyphis brunneis, septatis, 5 μ . crassis, laxè contextis compositum; basidiis acrogenis vel lateralibus, hyalinis, primitus globosis, 10-15 μ . crassis, dein cylindraceo-elongatis, 25-35 μ . longis, rectis vel curvulis, septatis, stipitatis; sporis . . .

Hab. ad caules *Bambusacæ* cujusdam, Prov. Sao Paulo, Campinas. — A typo generis distinguitur receptaculo haud laminari corticioideo sed ascendente cæspitoso quasi *Clavariæ* v. *Lachnocladii*, hinc subgenus *Noackia* Pat. l. c.

7. **Septobasidium abnorme** (P. Henn.) v. Höhn. et Litsch., Stzb. k. 1847

Ak. d. Wiss. Wien CXVI, Abt. I (1907) p. 740. — Ita vocandum *Corticium abnorme* P. Henn. — Syll. XVII, p. 168.

8. **Septobasidium coffeicola** P. Henn., Mission Emil. Laurent fasc. III 1748

(1906) pag. 316. — Resupinatum, late effusum, tenui-membranaceum, cinereo-brunneolum vel subcarneum, pruinatum, margine subfimbriatum, ferrugineum, ex hyphis ramosis, flavo-brunneis v. fuscidulis, sæpe curvatis, c. 2-3,5 μ . cr., dense congestis; basidiis haud visis; sporis ellipsoideis v. subovoideis, hyalinis, 5-6 \times 3-3,5.

Hab. in ramis emortuis *Coffeæ* sp. prope Bolombo Congo. — Habitus et characteres *Septobasidii*, quamquam basidia non visa.

ORDONIA Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) pag. 360 (Etym. ignota). — Mycelium ex hyphis brunneis, ramosis, epiphyticis, arachnoideis constans (ut in *Tomentella* et *Hypochno*); sporæ pleurogenæ, globosæ, solitariæ; basidium rectum, tetrasporum; sporidiola elongata. — Diagnoses hujus et sequentis generis ægre ductæ et contractæ e longis descriptionibus, hinc verisimiliter incompletæ v. inexactæ.

1. **Ordonia Orthobasidium** Raciborski, l. c. p. 360. — Cæspitulis hypophyllis rotundatis maculiformibus ex hyphis brunneis, septatis, ramosis 2-4,5 μ . cr. efformatis; sporis globosis, levibus, primum hyalinis dein brunneis 16-19 μ . diam.; basidiis cylindræis 58-72 \times 7-9; sporidiolis cylindræis, 23-26 \times 5-6. 1749

Hab. in foliis *Tetrantheræ* sp. prope Tjitjuruk in ins. Java.

MOHORTIA Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) p. 361 (Etym. ignota) — Pulvinata, subapplanata, bistratosa; stratu basilari laxiusculo, superiori (hymeniali) compactiusculo, crassiore; sporis senioribus immersis; basidiis transverse septatis, quadrilocularibus. — A *Septobasidio* dignoscitur defectu hypharum in fasciculos conjunctarum quæ sub hymenio sitæ sunt, ceterum habitu omnino *Corticii*.

1. **Mohortia tropica** Raciborski, l. c. p. 361. — Plagulis irregularibus 5-12 mm. latis, compactis, sed mollibus, usque ad 1 mm. cr., griseo-cinereis; sporis globoso-ovoideis 15-18 μ . long., levibus primum hyalinis, brevissime pedicellatis; basidiis curvis, 24-30 \times 10; sterigmatibus conoideis; sporidiolis ovoideis, curvulis, apice rotundatis v. acutatis, hyalinis, 14-17 \times 5-6. 1750

Hab. ad cortices arborum, Pangerango in ins. Java.

PLATYGLŒA Schr. — Syll. VI p. 771, XI p. 146, XIV p. 247, XVI p. 216, XVII p. 204.

1. **Platyglœa Hymenolepidis** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 1751

p. 356. — Amphigena, strata irregulariter crassa usque ad 0,8 mm., alba, nitida, colliculosa formans; hyphis 4-5 μ . cr., non noduloso-fibulatis, hyalinis, pluries ramosis, apicibus in hyphas fertiles cylindricas 250-400 μ . long., apice quadricellulares, cellulis 20 \times 8 (basidiis), sterigmatibus longissimis 100 \times 2-3 ex quaque cellula generatis; sporis oblongo-ovoideis, 14-18 \times 3-4, acrogenis.

Hab. in foliis *Acrostichi* (*Hymenolepis*) spicati in ins. Java.

2. **Platyglœa Peniophoræ** Bourd. et Galz., Bull. Soc. Myc. Fr. XXV 1752 (1909) p. 17. — Rotundata, maculiformis, 1-3 mm., dein confluens, tenuis, ceracea, pallida, ambitu candido radiososo-sericeo, in sicco cornea, grisella; hyphis 1-2 μ .; basidiis erectis v. flexuosis, demum arcuatis, 36-58 \times 5-7, 3-septatis, sterigmatibus 90 μ . et ultra longis; sporis hyalinis, ovoideis, latere rarius depressis, promycelio dorsali v. apicali, filiformi, conidia sporis conformia gignentibus.

Hab. super hymenium *Peniophoræ* puberæ et *Glœocystidii* prætermisii parasitans, Allier Galliæ.

3. **Platyglœa Eriophori** (Bres.) v. Höhn. Fragm. Mykol. VIII (1909) 1753 pag. 3, *Kriegeria Eriophori* Bresad. in Rev. Mycol. XIII (1891) p. 14, tab. 113, *Septoglœum* ? *dimorphum* Sacc., Syll. X p. 497.

Hab. in foliis *Eriophori* angustifolii et *Scirpi* silvatici in Germania. — Teste cl. von Höhn. l. c. fructificatio est auriculariacea, nempe: basidia tereti-clavata, transerse 4-cellularia, 50 \times 12, cellulis singulis lateraliter et superne sterigma edentibus; sporæ ovoideo-globosæ uno latere leviter depressæ, basi breviter et oblique apiculatæ, 20 μ . long. Sporæ germinando sporidiola II et III ordinis gignunt.

4. **Platyglœa Pini** von Höhn. in Strasser Verh. k. k. zool. bot. Ges. 1754 Wien LX (1910) p. 331 (nomen nudum).

Hab. in cortice *Pini*, Sonntagberg Austriæ.

5. **Platyglœa nigricans** Schröt. — Syll. VI, p. 777. — Teste v. Höhnel, 1755 Ann. Mycol. II (1904) p. 273, hujus speciei synonyma essent *Stictis Tiliæ* Lasch = *Stictis Betuli* (A. et S.) var. *nigrescens* Fr., = *Achroomyces pubescens* Riess, *Tachaphantium Tiliæ* Bref., *Ocellaria Betulæ* (A. et S.) v. *nigrescens* (Fr.) Rehm.

SIROBASIDIUM Lag. et Pat. — Syll. XI p. 148, XIV p. 248.

1. **Sirobasidium Cerasi** Bourd. et Galz., Bull. Soc. Myc. Fr. XXV 1756 (1909) p. 19. — Tuberculiforme 1 mm. diam., media basi adnatum, ceraceum, ex obscure griseo spadiceum, indurescens; hyphis

basalibus pseudoparenchymaticis, 6-15 μ . diam., mediis erectis radiatim divergentibus, dichotomis, 2-4 μ . cr., apicibus basidia seriatim disposita, sphaeroidea 8-9 \approx 6-7 gerentibus; sporis quaternis, fusoides, 4-5 \times 2,5-3; inter hyphas basidiophoras conidia innumera congesta cylindraceo-curvula, 3 \approx 0,5.

Hab. ad ligna Cerasi deusta, Caussanel prope St. Sernin Aveyron Gallia.

2. Tremelleæ.

HETEROCHÆTE Pat. — Syll. XI p. 144, XIV p. 247, XVII p. 209.

1. **Heterochæte dubia** Bourd. et Galz., Bull. Soc. Myc. Fr. XXV 1757 (1909) p. 30. — Effusa, mucoso-ceracea, hyalino-albida, exsiccatione griseola v. pallide fuscescens, sæpius evanida; papillis 20-40 μ . diam., pariterque altis, sparsis; cystidiis hyalinis, crasse tunicatis, cylindraceis vel subulatis, primitus succo succineo farctis, 60-75 \times 4-5, 1-3-fasciculatis, supra papillulas exertis; basidiis mox resorptis, sphaeroideis, 11-13 \approx 7-8; sporis copiosis, hyalinis, oblongis v. cylindraceis, curvulis, 7-8 \approx 4.

Hab. ad ligna putridissima Fraxini, Alni, Saint-Sernin, Millau, Aveyron.

2. **Heterochæte javanica** v. Höhn., Stzb. k. Ak. d. Wiss. Wien, CXVIII 1758 Abt. 1 (1909) p. 18, cum icone. — Superficialis plano-pulvinata v. disciformis, medio crassior et compactior, levis v. leviter plicatula, diaphana, sublactea, subtus glabra et levis, supra albo-pulverulenta, margine libero rotundato, 1 mm. crassa, 10 mm. lata, contextu gelatinoso-fibroso, hyphis 1-1,5 μ . cr.; aculeis (*epithelidiis*) ex hyphis hyalinis subparallelis conflatis, obtuse conicis, 100 \times 60-80, apice cystidia divergentia, obclavata, hyalina, solidiuscula, 16-20 \approx 8-9 gerentibus; basidiis ovoideis 16 \approx 8-12, cruciatim partitis, immersis, 4-sterigmaticis; sporis cylindraceis, curvulis, utrinque rotundatis, 20 \times 5, granulosis, hyalinis.

Hab. in fragmentis ligneis in silvis Tjibodas ins. Javae. — Processus peculiare compositi, qui cl. v. Höhnel *Epithelen* nuncupat, latine *epithelidia* vocandi sunt, cum vox epithelium aliam rem denotet.

3. **Heterochæte sublivida** Patouill., Bull. Soc. Mycol. de Fr. XXIV 1759 (1908) pag. 2. — Resupinata, arcte adnata, late effusa, tenuis, livido-violacea, aut fusco-livida, margine albo, villosa stricto; setulis

sparsis, albidis, brevibus; basidiis subglobosis, cruciatim 1-2-septatis, $20 \approx 10$; cystidiis nullis; sporis?

Hab. ad cortices emortuos in Louisiana (LANGLOIS). — *Het. lividæ* proxima, differt præcipue margine non erecto, cystidiis nullis.

SEBACINA Tul. — Syll. VI p. 521, XI p. 117, XIV p. 13 et 214, XVI p. 183.

1. **Sebacina strigosa** Bourd. et Galz., Bull. Soc. Myc. Fr. XXV (1909) 1760 p. 25. — Longe lateque effusa, subiculo crasso, xylostromoideo, albo, superne strigoso hispido; hymenio maculiformi, dein confluyente et subiculum subæquante, e rufo-testaceo badio; hyphis subiculi tenacibus, 2-3 μ ., ad septa sparse nodulosis, laxè intertextis, subhymenialibus gelatinosis; basidiis ovoideis 15-20 \approx 12-15; sterigmatibus 25 \approx 2-3,5; sporis hyalinis, late ellipsoideis, e latere subcompressis, 12-18 \approx 8-11.

Hab. ad corticem et in truncis cavis Populi nigræ, St. Serin Aveyron Galliæ.

2. **Sebacina grisea** (Pers.) Bres., Fungi gall. in Ann. Mycol. VI (1908) 1761 p. 45, *Thelephora grisea* Pers. Myc. Europ. I, p. 149, *Sebacina cæsia* Tul.,? non *Thelephora cæsia* Pers. — Late effusa, incrustans etiam muscos, cartilagineo-gelatinosa, grisea; hymenio sparse tuberculoso in sicco levi; sporis hyalinis cylindræco-curvatis, 10-12 \approx 4 $\frac{1}{2}$ -5; basidiis obovatis, sterigmaticis binis v. quaternis, 13-16 \approx 9-10; hyphis 1 $\frac{1}{2}$ -3 μ . crassis.

Hab. ad ligna abiecta in Gallia.

3. **Sebacina Galzinii** Bres., Fungi Gall. in Annal. mycol. VI (1908) 1762 pag. 46. — Late effusa, ceraceo-membranacea vel subcartilaginea, $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{3}$ mm. crassa, luride ochroleuca, in sicco luride ochracea vel luride fulva, ambitu similari; hymenio levi; sporis hyalinis, oblongis, uno latere depressis, 11-14 \approx 5-7, protoplasmate granuloso, stramineo, mox evacuatis et lateraliter germinantibus, conidium ejusdem formæ et dimensionis gignentibus; basidiis obovatis, sterigmatibus 2-4, 18-24 \approx 8-12; glæocystidiis cuspidatis, 90-135 \approx 6-8, protoplasmate succineo, demum septato, repletis; hyphis hyalinis 2 $\frac{1}{2}$ -4 μ . crassis.

Hab. ad truncos Fraxini et Salicis, Aveyron Galliæ legit cl. GALZIN, cui dicata est species. — *Bourdotia* Bres. l. c., cui species hæc pertinet, est *Sebacina* glæocystidiis prædita: subgenus mycologo Abati H. BOURDOT jure merito dicatum.

TREMELLODENDRON Atkins. — Syll. XVII, p. 208.

1. **Tremellodendron aurantium** Atkins., Ann. Mycol. VI (1908) p. 59. 1763
Simplex, tenue, 1-3 cm. altum, 2-3 mm. crassum, atro-aurantium lentum; basidiis subglobosis, 10-12 μ ., cruciato-quadrupartitis; sterigmatibus longis, filiformibus, flexuosis; sporis obovato-subellipsoideis, hyalinis, 7-10 \times 5-6.

Hab. ad terram in silvis, Blue Ridge Mts. N. C., Amer. bor.

HIRNEOLINA (Pat.) Bres. — Syll. XVII pag. 208. — Ad hoc genus spectat *Radulum Kmetii* Bres. — Syll. XIV p. 206 — quod nuncupandum est *Hirneolina Kmetii* (Bres.) Sacc. et Trott. (= *Eichleriella Kmetii* Bres. in Bourd. et Galz. Bull. Soc. myc. (1909) p. 30).

EXIDIA Fr. — Syll. XI p. 772, IX p. 257, XI p. 146, XIV p. 249, XVI p. 217, XVII p. 207:

1. **Exidia olivacea** Patouill., Bull. Soc. Mycol. de Fr. XXIV (1908) 1764 pag. 2. — Orbicularis, 3-12 mm. lata, sessilis, centro adfixa, convexa, plicato-gyrosa, pallide olivacea, subhyalina, gelatinosa, sicca atra, margine crenato, spiculis distantibus, obtusis, 130 \times 50, brunneolis, subtus planiuscula, radiato-plicata, papillatim dense minuteque velutina, papillis hyalinis, conoideis 80-100 μ . altis; basidiis ovoideis 10 \times 6, 2-4 cruciatim septatis; sporis hyalinis, cylindraceo-curvulis, 12-14 \times 3-4.

Hab. in ligno putri, Louisiana Amer. bor. (LANGLOIS).

EXIDIOPSIS Olsens — Syll. VI p. 541 et 626, XIV p. 248.

1. **Exidiopsis cystidiophora** v. Höhn. Ann. mycol. (1905) p. 323. — 1765
Albida, effusa, usque 2-3 cm. lata, vix 50 μ . cr., arcte adnata, levi, hinc inde ob sporas pulveracea, uda vix inflata et gelatinosa; stratu subhymeniali vix conspicuo; basidiis ovoideo-globosis, tremelloideis, 10-12 μ . latis, numerosis, prominentibus, 28-36 μ . long., 7-9 μ . latis, tenui-tunicatis, cystidiis immixtis contentu homogeneo tenui flavo-brunneo, præditis, supra obtusis, levibus, cylindraceis v. globosis, sæpe curvatis 28-36 \times 7-9; sterigmatibus hyalinis 8-9 μ . longis; sporis elongato-ovoideis, 11-13 \times 6,5-8, contentu crasse granuloso.

Hab. ad lignum abietinum putre prope Wien Austriae. — Ob cystidia (glæocystidia?) prædistincta.

2. **Exidiopsis fuliginea** Rick, Broteria V (1906) p. 8 — Resupinata, 1766
tenuissima, vix papyracea, margine indeterminato, fuligineo-cine-

rea, fere glabra, subgelatinosa; basidiis 10-15 μ . diam., cruciatim partitis, sphaericis, sterigmatibus 4 variæ longitudinis; sporis hyalinis, cylindræis, curvatis, apiculatis, unicellularibus, 12 \times 4-5, germinatione sporidiola curvata in apice hyphæ proferentibus.

Hab. in ligno putri, Rio Grande do Sul Amer. austr. — *Exid. cerinæ* proxima.

3. **Exidiopsis fugacissima** (Bourd. et Galz.) Sacc. et Trott., *Sebacina* 1767
fugacissima Bourd. et Galz., Bull. Soc. Myc. Fr., XXV (1909)
pag. 28. — Indeterminato-effusa, tenuissima, gelatinosa, hyalino-
grisella, mox evanida; hyphis basilaribus tenuiter tunicatis, 2-3 μ .;
basidiis 6-7 \times 5-6; sporis hyalinis cylindræo-curvulis, 6-7 \times 2,5-3,5.

Hab. ad ligna putridissima Quercus, Populi, Vitis, Al-
lier, Aveyron Gallia.

4. **Exidiopsis peritricha** (Bourd. et Galz.) Sacc. et Trott. *Sebacina* 1768
peritricha Bourd. et Galz. in Bull. Soc. Myc. Fr., XXV (1909)
p. 26. — Gelatinoso-ceracea, effusa, subtenuis, ex hyalino-grisello
lilaceo-argentea, pruinosa; margine albo, pubescente, vario; hyphis
contextus indistinctis, adglutinatis, 1-3 μ .; myceliaribus et basa-
libus tenuiter tunicatis, usque ad 4-5 μ . cr.; basidiis obovatis, 10-
15 \times 8-11; sporis cylindræo-curvulis, 10-14 \times 4-6,5.

Hab. in ligno emortuo, Millau, Saint-Thomas Aveyron Gallia.

TULASNELLA Schr. — Syll. VI p. 625, XIV p. 234, XVI p. 202,
XVII p. 209.

1. **Tulasnella Cinchonæ** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 1769
p. 369. — Effusa, applanata, tenuissima, caules et paginam inf.
foliorum obducens, pallide rosea; hyphis hyalinis septatis usque
ad 60 μ . long., depressis sursum copiose ramulosis; basidiis in
apice ramulorum nascentibus, anguste ovoideis, 20-24 \times 8-11, apice
rotundatis; sporis nunc apice nunc etiam lateraliter ad basidia
quaternis globosis v. breviter ovoideis, hyalinis, tenuiter tunicatis,
7-9 μ . diam., non secedentibus.

Hab. in ramulis et foliis vivis Cinchonæ Ledgerianæ, C.
officinalis, C. succirubræ etc. cultarum in ins. Java.

2. **Tulasnella anceps** Bres. et Syd., Ann. Mycol. (1910) p. 490, Myc. 1770
Germ. n. 858. — E pustuliformi mox confluens et late effusa,
tenuis, submembranacea, vix gelatinosa, in sicco subpurpurea,
ex roseolo alba, margine similari; hymenio sublevi in bene evo-
lutis; sporis hyalinis, oblongis, subamygdaliformibus, 8-13 \times 5-7,
apice v. dorso germinantibus et sporam secundariam gignentibus;

basidiis clavato-capitatis, 13-18 \times 6-8, sterigmatibus 2-4 præditis; sterigmatibus primitus obverse obovatis, parvis, dein elongato-cuspidatis, 8-10 \times 2-2,5; hyphis subhymenialibus 2-7 μ . cr., septatis, enodulosis.

Hab. in frondibus Pteridis aquilinæ, quam enecat, pr. Graal Mecklenburg Germaniæ (H. SYDOW).

3. **Tulasnella cystidiophora** v. Höhnel et Litsch., Beitr. z. Kennt. d. 1771
Corticieen, Sitzb. k. d. Wiss. Wien, Bd. CXV, Abt. I (1906) p. 1557, f. 1 (subgenus *Glæotulasnella*). — Irregulariter expansa; viva tenuissima, e gelatinoso ceracea, substrato fortiter adhærens, plagas nudas cyaneo-griseas, in sicco tenuiter crustaceas, efformante; hymenio aperto; basidiis ex obovato globosis, sterigmatibus 4 ovoideis præditis, 10-13 \times 8-11; sporis ovoideis quandoque elongatis v. globosis v. apiculatis, 6-8 \times 5-7, hyalinis, levibus; glæocystidiis variabilibus contentu oleoso, 10-25 \times 7-11; hyphis hyalinis, levibus, septato-nodulosis 2-4 μ . cr.

Hab. ad corticem putri Populi, Mustiala Fenniciæ (KARSTEN).

4. **Tulasnella hyalina** v. Höhnel et Litsch., Stzb. k. Ak. d. Wiss. 1772
Wien CXVII, I (1908) pag. 1114, fig. 8, *Glæotulasnella hyalina* v. Höhn. et Lits. in Wiesner Festschr. (1907) p. 59. — Irregulariter effusa, tenuissima, viva gelatinosa, in sicco vix conspicua, pallida, rubida; hymenio non clauso, basidiis clavatis, 12-15 \times 4-7; sterigmatibus 4, elongatis, obovatis, uno latere plerumque applanatis, 8-11 \times 4-6; sporis globosis v. subglobosis, raro ovoideis, basi distincte apiculatis, tunica tenui, levi, hyalina; contentu etiam in basidiis minute granuloso, 4-6 μ . diam. raro usque ad 7 \times 4; cystidiis cylindræis, fusoideis vel irregularibus apice plerumque obtusatis, laxè dispositis, 15-30 \times 8-12, leniter tunicatis, levibus, contentu hyalino v. copiose guttulato; hyphis indistinctis, 2-3 μ . cr., tenuiter tunicatis, hyalinis, levibus.

Hab. in cortice abietino putri, Rekowinkel-Dürrwien, Wienerwald Austriæ inf.

5. **Tulasnella traumatica** (Bourd. et Galz.) Sacc. et Trott., *Glæotulasnella traumatica* Bourd. et Galz., Bull. Soc. Myc. Fr. XXV (1909) p. 32. — Late effusa, gelatinoso-mollis, hyalino-pallens, sicco pruinosa, ambitu similari; hyphis fibulato-nodulosis, 1,5-2 μ .; basidiis ovoideis 12-17 \times 7-12; sporis ovoideis v. ellipsoideis, basi subangustatis 8-13 \times 4-7, filamento conico v. filiformi conidium gignentibus sporis subconforme, circiter 10 \times 7; glæocystidiis subcylindra-

ceis, basi sæpius ventricosis, versus apicem passim furcatis, 90-210 \approx 5-16, succo lutescente, demum concreto resinoso faretis.

Hab. ad truncos Mali communis in partibus a *Xanthochroo hispido* exesis, Gallia.

TREMELLA Dill. — Syll. VI p. 780, IX p. 258, XI p. 147, XIV p. 249, XVI p. 218, XVII p. 205.

1. **Tremella coriacea** Bres., in Strasser Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1774 LVII (1907) pag. 300. — Conceptaculis superficialibus, minutis, convexo-pulvinatis, 500-700 μ . latis, gelatinosis, dense gregariis mox confluentibus, carneis, subfuscescentibus, basidiis ovoideis, longitudinaliter septatis, 18-21 \approx 12-15; sporis obovatis, sæpe uno latere depressis, 12-15 \approx 8-10; hyphis basidiophoris, 2-2,5 μ . cr.

Hab. ad fragmenta vetusta corii in monte Sonntagberg Austriae inf. — Habitu et colore omnino *Ascophanum carneum* simulat.

2. **Tremella sakanensis** P. Henn., in Voeltzkow Reise Ostafrika (1908) 1775 p. 17, taf. II, fig. 1. — Cæspitose erumpens, succineo-brunnea, glabra, gelatinosa, lobato-gyrosa, c. 4 cm. diam.; lobis spathulatis, undulatis, crenatis; basidiis ovoideis, cruciato-septatis, brunneis, 8-10 \approx 6-8; sporis ovoideis v. subglobosis, flavidulis v. brunneolis, 5-6 \approx 4-5.

Hab. ad ramos, Sakana Madagascar Africae. — *Tr. undulatae* Hoffm. proxima, *Ulocollæ foliaceæ* etiam similis.

3. **Tremella conglobata** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 148. — Britzel- 1776 mayr, Revis. Hymenomyc. (1909) p. 224. — Subglobosa, gelatinosa, albida, pallide sordide flavida; sporis breviter ellipsoideis eguttulatis, 7,5-8 \approx 3,5-4.

Hab. ad truncos Alni prope Augsburg Bavariae. — *Tr. viscosæ* affinis.

4. **Tremella rubro-violacea** Britz. — Syll. XI, pag. 147. — Britzel- 1777 mayr, Revis. Hymenomyc. (1909) p. 224. — Subglobosa, subgelatinosa, rubro-rosea v. sanguinea, dein violacea, demum griseola etiam albicante; margine subrevoluto; superficie sparse rotundato-aphtosa; sporis 6-7 \approx 2, breviter ellipsoideis, rectis v. etiam curvulis.

Hab. in corticibus Pini in Algovia, Bavaria. — *Trem. violaceæ* affinis.

5. **Tremella pinicola** Britz. — Sacc. Syll. XI, p. 147. — Britzelm., 1778 Revis. Hymenomyc. (1909) p. 224. — Gelatinosa extus aurantiaca,

intus pallidiore, sessilis v. brevissime stipitata; superficie minute undulata v. minute subfoveolata; sporis 10-15 \approx 9-10.

Hab. in cortice putri Pinorum in Alpibus Algoviæ in Bavaria. — *Tr. mesentericæ* affinis.

6. **Tremella reticulata** (Berk.) Farlow, Notes on Fungi in Rhodora 1779 Jan. (1908) p. 9. — Ita vocandum *Corticium tremellinum* B. et Rav. var. *reticulatum* Berk. — Syll. VI, p. 632. — ? *Tremella fuciformis* Berk.

7. **Tremella Ilicis** Boud., Icon. mycol. I, t. 179 (ser. IV, p. 29, n. 399) 1780 [Absque diagnosi].

Hab. in ramis emortuis Ilicis Aquifolii in silva Carnelle Galliæ. — Ubi descripta? Non reperitur.

8. **Tremella lutescens** Pers. — Syll. VI, p. 781. — var. **brasiliensis** 1780* Möller, Protobasidiomyc. tab. 4, fig. 15. — In Brasilia.

Tremellæ species dubiæ in Syll. XX, p. 974, 976 et 978 memoratæ, sunt: **Tremella lycoperdoides** Humb. — **Tr. gyrosa** Hoffm. — **Tr. badia** Chev.

NÆMATELIA Fr. — Syll. II p. 227, IX p. 259, XVII p. 205.

1. **Næmatelia encephala** (Willd.) Fr. — Syll. VI, pag. 793. — var. 1781 **Steidleri** Bres. *Tremella encephala* Willd. var. *Steidleri* Bres., Ann. Mycol. VI (1908) p. 46. — Subsessilis, conglobata, plicato-gyrosa, cartilaginea, brunnea, 3-5 cm. lata, intus pallidior; basidiis subglobosis, longitudinaliter partitis, 16-18 \approx 14-16; sporis globosis, hyalinis, 8-9 μ . diam, conidia 3-4 \approx 3 gignentibus; hyphis basidiophoris 2 μ . crassis.

Hab. ad truncos *Quercus* in Moravia, leg. STEIDLER. — Habitu et substantia omnino *Næmateliæ encephalæ* typicæ, a qua differt statura majore, colore et matrice. Etiam in forma typica, ad ligna Coniferarum obvia, sporæ sunt globosæ 8-9 \approx 8 nec, ut habet Brefeld Unters. Mykol. VII, p. 128, 15-18 μ ., teste Bresadola.

GUEPINIA Fr. — Syll. VI p. 805, XI p. 150, XIV p. 252, XVI p. 221, XVII p. 206.

1. **Guepinia capitata** Feltg., Vorst. Pilz.-Fl. Luxemb. II b (1906) 1782 p. 216. — Conferta, 2-4 mm. alta, primum rotundata, plerumque parum applanata, subtus angustata, dein supra elongata, basi ligno infossa, brunneo-nigricans, pruinosa, in 2-3 ramos divisa, capitulis plano-convexis v. excavatis et tunc distincte marginatis albo-flavidis v. flavis; substantia carnosogelatinosa ex hyphis filiformibus ramosis sursum dichotomis formata; sporis in apice ra-

mulorum insertis, cylindraceis utrinque rotundatis rectis v. curvulis, continuis v. uni-biseptatis, hyalinis, 5-7 \approx 2-3.

Hab. in ligno decorticato ? Robiniæ, Luxemburg. — *Guep.* (*Ditiola*) *radicata* et *Dacryomycei capitato* affinis videtur; sed sec. exempl. orig. esset *Tuberculariæ* spec., observante v. Höhnel.

3. *Dacryomycetæ.*

CERACEA Cragin — Syll. VI p. 805, XI p. 150.

1. **Ceracea aureo-fulva** Bres. in Krieger Ann. Mycol. IV (1906) p. 39, 1783 Hedwigia, XLV (1906) p. (75), Fungi saxon. n. 1909. — E suborbiculari elongato-effusa, corticiiformis, adglutinata, ceraceo-subgelatinosa vel subcartilaginea, usque ad 10 cm. elongata, subiculo albo, margino albo fimbriato; hymenio aureo, fulvescente, parum tumido, levi vel vix hic illic subplicato; sporis hyalinis, subcylindraceis uno latere depressis, demum 1-septatis, 11-17 \approx 5,5-7; basidiis clavato-subcapitatis, dein bisterigmatico-furcatis, 50-60 \approx 5-6; hyphis subhymenialibus 2,5 μ . crassis; hyphis subiculi 3,5-4 μ . crassis.

Hab. in ligno vetusto putri Coniferarum, jam fabrefacto, in Saxonia, raro. — Observante von Höhnel (1908) esset eadem species ac *Dacryomyces confluens* Karst.

DACRYOPSIS Masee — Syll. XI p. 149, XVI p. 223.

1. **Dacryopsis Typhæ** v. Höhn., Stzb. k. Ak. d. Wiss. Wien CXVIII, 1784 Abt. I (1909) p. 290, Jaap, Zur Fl. v. Glücksburg in Schr. d. Naturw. Ver. f. Schlesw.-Holst. Bd. XIV, Heft 2, pag. 306. — Sparsa, superficialis, subgelatinosa, alba, hyalina, sicca rigida et flavida, stipitata; stipite flavido, cylindrico, sursum subconica, glabra, levi, 800-1000 \approx 120-150; capitulo hemisphærico v. lenticulari, farcto, hymenio ex paraphysibus et basidiis formato tecto; sporis continuis hyalinis, elongatis, utrinque acutulis, 8-10 \approx 3-4.

Hab. in foliis emortuis dejectis Typhæ angustifoliæ, latifoliæ, Sparganii, Schoenoplecti lacustris pr. Glücksburg in Schleswig Germaniæ (O. JAAP).

2. **Dacryomyces saccharinus** (Bonord.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, 1785 p. 536. — *Tremella saccharina* Bonorden Handb. tab. 12, f. 249. — Tuberculis minutis pulvinatis, 2 mm. diam., aurantiacis, puncto centrali papillato affixis; hyphis prælongis, filiformibus, se-

ptato-dichotomis, apice basidiis clavulatis terminatis; sporis cylindraceis curvulis (septatis?).

Hab. ad cortices arborum in Germania. — Diagnosim imperfectam ex icone erui, hinc species dubia, non vero *Ulocolla saccharina* (Fr.) Bref.

4. *Protohydneæ.*

PROTODONTIA v. Höhnel, *Fragm. z. Myc. in Sitzsb. k. Ak. d. Wiss. Wien Bd. CXVI, Ab. I (1907) pag 83* (Etym. *protos* primus et *Odontia*). — Resupinata effusa, aculeolata (ut *Odontia*) sed gelatinosa. Hyphæ tenues, indistinctæ. Basidia immersa tam in subiculo quam in aculeis, globoso-ellipsoidea, cruciatim quadrilocularia. Sporæ continuæ, hyalinæ.

1. **Protodontia uda** v. Höhnel, *Fragm. z. Myk. in Sitzb. k. Ak. d. 1786 Wiss. Wien, Bd. CXVI, Abt. I (1907) p. 83*. — Resupinata, arcte adhærens, immarginata; subiculo hyalino, tenui, gelatinoso, levi, aculeis laxis, conicis, acutis, subdiaphanis, gelatinosis, ex hyphis e hyalino flavidis v. rubidis, continuis, formatis, 200-400 \times 50-100; basidiis globoso-ellipsoideis, 8 μ . lat.; sporis late ellipsoideis vel ovoideis, leviter inæquilateris, basi oblique apiculatis, 6-8 \times 4-5, intus granulosis.

Hab. in ligno putri Alni glutinosæ ad Danubium prope Tulln Austriæ inf. — *Odontia uda* Fr., ex Bresadola, est vera *Hydnacea*.

5. *Protoclavariæ.*

CALOCERA Fr. — *Syll. VI p. 732, IX p. 251, XIV p. 239, XVI p. 208*.

1. **Calocera expallens** Quélet, *Fl. mycol. p. 457 et Assoc. franc. A- 1787 vanc. Sc. XXII (1893) tab. III, fig. 14*. — Cæspitulosa, tæniæformi-compressa, 2-3-dichotoma, succinea, madore cerea v. opalina, ramulis apicibus corniculatis, basi lenticulari, hirsuta et alba; sporis oblongis 10 μ . long.

Hab. ad ramos dejectos Cerasi in Alsatia.

2. **Calocera subsimplex** Bresad. ap. Britzelm., *Hymenomyc. tab. 759, 1788 fig. 22*. — Gregaria, minuta, flava, anguste clavata, simplex raro 2-3 basi coalescentibus, 8-10 mm. alta, supra 1,5 mm. cr.; sporis

oblongo-ellipsoideis 8-10 \approx 4-5, hyalinis, 2-guttulatis (non curvatis).

Hab. ad ligna in Germania.

3. **Calocera divaricata** Berk., Journ. of Bot. (1842) p. 140, tab. VI, 1789 fig. 2. — Aurea, 3-4 cm. alta, glabra; stipite tenui repetito ramoso, ramis ramulisque acutis divaricatis, axillis ramulorum superiorum compressis.

Hab. ad truncos, Surinam (HOSTMANN). — An sit eadem ac *Pterula divaricata* Lév. memorata in Syll. VI, p. 743, dubium.

4. **Calocera nigripes** Syd., in De Wildem. Flore Bas-et Moy. Congo 1790 t. III, fasc. I (1909) Extr. pag. 8. — Gregaria, tota 0,5-1,5 cm. alta, ramosa, tenuis; stipite levi, nigro tereti, 0,3-0,5 mm. cr.; ramis teretibus aurantiacis, repetito-dichotomis, apice acutis; basidiis cylindraceo-subclavatis, sursum 3-4 μ . cr., ramosis; sporis oblongo-ellipsoideis leviter inæquilateris, hyalinis, plerumque 2-guttulatis, 6-8 \approx 3-4.

Hab. ad truncos, Kisinga (Congo), aprili 1907 (leg. VANDERYST).

GASTEROMYCETÆ *)

Syll. fung. VII p. 1, IX p. 262, XI p. 152, XIV p. 254, XVI p. 224, XVII p. 212.

Fam. 1. Phallaceæ FR.

DICTYOPHORA Desv. — Syll. VII p. 3, 469, IX p. 262, XI p. 152, XIV p. 254, XVI p. 224.

1. **Dictyophora Lilloi** Speg., Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XVI (1906) 1791 p. 30, cum icon. — Tota alba, subparva, 80-100 mm. alta, tenerima, mox fatiscens; peridio conoideo-campanulato, 20 mm. alto, basi 25 mm. lato, extus grosse reticulato-lacunoso, gleba mucilaginosa virescenti fœtida vestito; volva parva candida 20-25 mm. diam.; stipite e cylindraceo conoideo 75-95 mm. longo basi 15 mm. lato, osculo 7-8 mm. lato; indusio retiformi, campanulato 50 mm. alto, basi 50 mm. lato, maculis polygoniis 5-7 mm. diam.; sporis minutis, elliptico-cylindraceis, 4-5 \approx 1-1,5 vix fumoso-chlorinulis.

Hab. in herbosis silvularum Parque Roca prope Tucuman Rep. Argentinae. — *Dict. duplicata* valde affinis.

2. **Dictyophora phalloides** Desv. — Syll. VII, p. 3. — var. **callichroa** 1792 Lloyd, Syn. Phall. p. 20 (*Phallus*). — Dignoscitur receptaculo aurantiaco, velo et stipite albo, — In Brasilia, in Java, Africa et Austr. — var. **Farlowii** Lloyd, Syn. Phall. p. 24: distinguitur velo membranaceo. — In Brasilia. — var. **nasuta** Speg., An. Mus. Nac.

*) Post editos *Gasteromycetes* in Sylloges vol. VII (1888), plurimæ et graves de iis commentationes in lucem prodierunt, operâ imprimis cl. HOLLËS, LLOYD, FISCHER, PETRI, PETCH etc., ex quibus permultæ emendationes synonymorum, characterum, locorum etc. ortæ sunt. Hanc ob causam pars illa Sylloges funditus reformanda esset; tamen de dispositione et interpretatione limitum generis et speciei *Gasteromycetum* longe abest ut mycologi etiam nunc sint unanimes et tunc opus novum præmaturum evaderet. — Phototypiæ *Gasteromycetum* in plurimis cl. C. LLOYD contributionibus, ab eo magna cura et sumptibus undicumque orbis convectæ, sunt revera optimæ et perutiles, tamen brevitatis diagnostici et inopia bibliographiæ difficultates et dubia sæpissime generant.

Buenos A. t. XIX (1909) p. 259: abnormis, pileo apice in appendicem conoideam longiusculam imperforatam producto, ceteris tamen characteribus nullo modo a typo recedens, certe constans nam specimen plurima pluribus locis inventa, semper nasuta. — Ad terram sabulosam in silvis, Puerto Esperanza, Misiones Argentina. — var. **rochesterensis** Lloyd, Syn. Phall. p. 20, f. 18 (*Phallus*): dignoscitur receptaculo elongato digitaliformi et velo anguste cylindræo. — In Australia (Herb. Kew). — Varietas jam nota sub nomine erroneo *Phalli merulini*. — var. **rosea** Lloyd, Syn. Phall. pag. 20 (*Phallus*): dignoscitur velo roseo. — In Guyana gallica (Herb. Mus. Paris), sed nota quoque ex ins. Java.

3. **Dictyophora duplicata** (Bosc) E. Fisch. — Syll. VII, pag. 6. — 1793
var. **Mauritiana** Lloyd, Syn. Phall. p. 22, f. 17 (*Phallus*), *Ithyphallus Mauritianus* (Lloyd) Sacc. et Trav. XIX, p. 989. — A typo differt receptaculi diversa reticulatione nempe areolis minoribus et magis regularibus.

Hab. in ins. Mauritius (CHAS O'CONNOR).

4. **Dictyophora Ravenelii** (B. et C.) Burt, Bot. Gaz. XXII (1896) 1794
p. 385, Scofield, Minnesota Bot. Stud. II, 4 (1900) p. 525, t. 29-31. — Ita vocandus *Ithyphallus Ravenelii* (B. et C.) Ed. Fisch. — Syll. VII, p. 11.

ITHYPHALLUS Fr. — Syll. VII p. 8 et 469, IX p. 262, XI p. 153, XVI p. 1118, XVII p. 212.

1. **Ithyphallus rubicundus** (Bosc 1811) E. Fisch. — Syll. VII, p. 11. 1795
(= *I. aurantiacus* (Mont. 1841) E. Fisch. — Syll. VII, p. 9). — Huc, teste Lloyd Phall. p. 79, referri debet. *Ithyph. coralloides* Cobb Exp. St. Hawaiian Sugar Plant. Assoc. Bull. V (1906) p. 208. — var. **gracilis** Fisch. Ed., Phalloid. p. 88, t. VI, f. 45, Lloyd Syn. Phall. p. 14, f. 6 (*Phallus*). — A typo differt statura graciliore; pileo obtuse campanulato, tenuius membranæo.

Hab. in Australia et in regione meridionali Amer. bor.

2. **Ithyphallus discolor** (Kalchbr.) Sacc. et Trav. — Syll. XIX, p. 987. 1796
Phallus discolor Lloyd, Synops. Phalloid. p. 89, fig. 95 = *Mutinus? discolor* (Kalchbr.) Ed. Fisch. — Syll. VII, p. 14.

MUTINUS Fr. — Syll. VII p. 12, IX p. 263, XI p. 153, XVI p. 226.

1. **Mutinus argentinus** Speg. Fal. Arg. p. 6 (1887) et Myc. Argent. 1797
III (errore IV) p. 32, f. 4, Lloyd Syn. Phall. p. 32, fig. 107. —

Teste cl. Speg. in Myc. Arg. nunc cit. hæc species collidit cum posteriore *M. Mülleri* E. Fisch. in Syll. VII, p. 12 (1888).

Hab. in silvis inter folia coacervata, Chaco Argentinae et in Brasilia. — Habitus *M. canini* et structura *M. bambusini*.

2. **Mutinus pentagonus** Bailey et Lloyd, Phalloids Australasia p. 13, 1798 fig. 11, Synops. Phalloid. p. 31, fig. 28. — Dignoscitur imprimis stipite in sectione pentagono, receptaculo conico pentagono-sulcato, latitudine diametrum stipitis vix superante, gleba in sulcis limitata; volva adpressa.

Hab. ad terram in Australia (BAILEY). — Ex icone 12 cm. altus.

3. **Mutinus xylogenus** Lloyd, Synops. Phalloid. pag. 30, fig. 29. — 1799 Pusillus, vix ultra 1 cm. altus; volva proportione fungi ampla, laxa, stipitem dimidium attingente; receptaculo glebaque globulosa.

Hab. ad ligna in Guyana gallica (Mus. Paris.). — Omnium generis specierum minima, tamen imperfecte nota et dubia.

JANSIA Penz. — Syll. XVI p. 226.

1. **Jansia truncata** Mc. Alp. in Lloyd Mycol. Notes n. 36 Aug. (1910) 1800 p. 484, fig. 377. — Stipite cylindrico, cavo, basi albo sursum sensim salmonæo, areolis polygoniis, excavatis signato; volva albo-cremea, laxa, cupulata, paullo altiore quam lata, basi rhizoidibus albis prædita; receptaculo cylindræo apice cum stipite continuo sed mox distincto colore atro-purpureo et superficie reticulo elevato alveolos irregulares, minutos, formante asperata; receptaculi apice obtuso, ore circulari latiusculo dehiscente; gleba olivacea, glutinosa receptaculum totum obducente; sporis ellipsoideis, minutissimis, hyalinis, 3-3,5 μ . diam.

Hab. in herbosis prope Melbourne Australiae (Mc. ALPINE).

2. **Jansia boninensis** Lloyd, Syn. Phall. p. 34, f. 35, *Mutinus boninensis* Lloyd, Mycol. Not. XXXI (1908) p. 403, f. 240. — 1801 Dignoscitur receptaculo (gleba) leviter ruguloso.

Hab. in insula Bonin. — Videtur intermedia inter gen. *Mutinum* et *Jansiam*. Teste LLOYD l. c. dubium est an *Mut. minimus* et *M. borneensis* cum hac specie collidant

3. **Jansia ? annulata** Lloyd, Syn. Phall. p. 34, f. 34, *Phallus annulatus* Lloyd, Phalloid. Australasia, pag. 13, f. 12 a. — 1802 Stipite albo, receptaculo (gleba) rubro-ochraceo et anulato.

Hab. in Australia. — Forma nota tantum ex icone clari F. M. BAILEY.

CLATHRUS (Mich.) L. — Syll. VII p. 18, IX p. 264, XI p. 154, XIV p. 225, XVI p. 228, XVII p. 212.

1. **Clathrus australis** Speg., Las Faloid. Argent. (1887) p. 10 (Anal. 1803 Soc. cient. Arg. XXIV). — Obovatus, 5-6 cm. alt., 2,5-3 cm. cr.; volva majuscula cupulato-hemisphærica, alba, carnosula, tenacella, lacero-aperta, intus rugosa; receptaculi ramis quinis simplicibus basi puncto connato-adnatis, arcuato-adscendentibus, deorsum teretibus, sursum compressis, apiceque latiuscule confluentibus, fistulosis, dorso transverse rugulosis, parietibus spongiosis dense celluloso-areolatis donatis, primo cinnabarinis, dein rubro-testaceis; substantia sporifera parte interna apicis adnata, per ætatem mucoso-liquescente, viridi-olivacea; sporis minutissimis, elliptico-ovoides, $4 \approx 2$, dilute chlorinis.

Hab. in silvis densioribus, Chaco australi Argentinæ. — Ex stirpe *Laterneæ*.

2. **Clathrus affinis** Lloyd, Syn. Phall. p. 60. — A *Cl. cibario* differt 1804 areolarum superiorum ramis angustioribus quam areolarum inferiorum et harum ramis subcolumnaribus et hinc areolis inferioribus magis elongatis.

Hab. ad terram Pernambuco Brasiliæ (G. A. RAMAGE).

3. **Clathrus americanus** Lloyd, Syn. Phall. p. 56, f. 71. — Receptaculo 1805 rubro elongato, areolis sursum subæqualibus, infra elongatis, subsulcatis, levibus.

Hab. in Brasilia (SCHUB), India occ. (BRACE) et Paraguay (Herb. Berlin). — *Cl. pusillo* valde affinis.

4. **Clathrus pseudocrispus** Lloyd, Syn. Phall. pag. 59, fig. 77. — A 1806 *Cl. crispo* differre videtur receptaculi areolis inferioribus elongatis.

Hab. ad terram, Montego Bay Jamaicae. — Species dubia, nota tantum ex icone Dr. MAC CATTY in Herb. Kew.

5. **Clathrus Spegazzinii** (Lloyd) Sacc. et Trott., *Laternea Spegazzinii* 1807 Lloyd, Syn. Phall. p. 51, f. 63, *Clathrus triscapus* Speg. Myc. Argent. III (1906) p. 33, fig. 3 *f-g*, non Turp. (sub *Laternea*). — Ab affini *Lat. columnata* differt receptaculo papillis prominulis extus asperato.

Hab. ad terram in Argentina.

6. **Clathrus bicolumnatus** (Kusano) Sacc. et Trott., *Laternea bicolumnata* 1808 Kusano ap. Lloyd, Syn. Phall. p. 51, f. 64. — Receptaculo ex columnis binis apice conjunctis, basi liberis, constante; columnis cylindræo-compressiusculis sursum tenuatis; gleba parti interiori apicis columnarum adherente, pallide rubescente.

Hab. ad terram in Japonia (KUSANO).

7. **Clathrus columnatus** Bosc. — Syll. VII, p. 18. — Huc teste cl. 1809 Burt in Bot. Gaz. XXII, 2 (1896) p. 388 spectant: *Clathrus canc.* v. *brasiliensis* E. Fisch, Unters. Phalloid. p. 55, t. II, f. 8-9.

CLATHRELLA E. Fisch. — Syll. XVI p. 228.

1. **Clathrella Treubii** Ch. Bernard. Ann. Jard. Buitenz. XX (1906) 1810 p. 309, Lloyd, Syn. Phall. p. 56, fig. 72, Mycolog. Not. n. 26 (1907) p. 334, fig. 161, n. 30 (1908) p. 382. — Læte rubra, receptaculo supra ex areolis latis constante, infra columnato; ramis receptaculi tubulosis, extus levibus introrsum corrugatis.

Hab. in insula Java (E. NYMAN).

COLUS Cav. et Sech. — Syll. VII p. 21, IX p. 264, XI p. 154, XVI p. 228.

1. **Colus Rothæ** (Fisch.) Sacc. et Trav. XIX, p. 389, *Pseudocolus Rothæ* Fischer apud Lloyd, Phall. Austral. pag. 19, f. 21 et Syn. Phall. p. 53, f. 69. — Dignoscitur columnis tribus tenuibus utrinque conjunctis, stipite brevi volvam non excedente, receptaculo aurantiaco.

Hab. ad terram in Australia (Herb. Kew). — Diagnosim ex icone cl. BAILEY eruimus.

LYSURUS Fr. — VII p. 22, IX p. 264, XVI p. 229, XVII p. 213.

1. **Lysurus argentinus** Speg., Faloid. Argent. (1887) p. 12 (Anal. Soc. 1812 cient. Argent. XXIV). — Volva hemisphærico-turbinata, terra semiinfossa, intus mucosa et bulloso-rugulosa, extus levi, margine submembranacea et laciniato-lacera, 2 cm. alt., 2,5 cm. lat., alba, tenacella; stipite tereti erecto, 6-8 cm. alt., 1,2 cm. cr., basi vix attenuato, intus late fistuloso, papuloso-spongioso, non perforato, candido, parietibus 2,5 mm. cr. ex tunicis tribus laxè areolato-conjunctis formatis prædito; receptaculo primo conico-glandiformi 1,5-2 cm. longo, 1,5-2 cm. lat, dein coroniformi aperto, 5-laciniato, candido, laciniis conniventibus e tereti subtrigonis dein dorso fissis triangularibus, basi applanatis margineque revolutis, apice applanato-subcylindræis, obtuse rotundatis, dorso papillosis, ventre grosse transversim rugosis ac in prima ætate pulpa sporifera olivascente vestitis; sporis minutissimis tereti-ellipsoideis, 5 × 1,5, dilute chlorinis.

Hab. in silvis et in cultis, Chaco Austr. Argentinae. — *Lys. Claraziano* affinis, sed magis fragilis.

PHALLOGASTER Morg. — Syll. XI p. 155.

1. **Phallogaster Whitei** Peck, N. York State Mus. Bull. n. 116 (1907) 1813 pag. 31. — Peridio subgloboso, 8-10 mm. lat., infra abrupte contracto in stipitem 8-9 mm. long., 2 mm. cr., maturo stellatim v. radiatim dehiscente, radiis curvatis; gleba virescente, arescendo nigricanti, massulis per lobos albos columellæ peridii superficiem non attingentes separatis; sporis minutis, oblongis 4-5 μ . long.

Hab. ad ligna, putrescentia, Storres Ct. Americae bor. (E. A. WHITE). — Ab affini *Ph. saccato* forma, dehiscencia, minutie videtur sat diversus.

SIMBLUM Klotsch — Syll. VII p. 16, 469, IX p. 264.

1. **Simblum clathratum** Lloyd, Syn. Phall. p. 67, fig. 88. — Stipite 1814 cavo pallide rubescente, 7 cm. alto, 2,5 cm. cr.; receptaculo laxo clathrato, areolis latis et costis angustis læte rubro, fragili hinc faciliter lacerato.

Hab. in Horto bot. Old Calabar Africae. — Affine *Simbl. sphaeroceph.* quod differt receptaculi rete compacto et areolis minoribus.

ASEROË La Bill. — Syll. VII p. 25, IX p. 265, XVI p. 229.

1. **Aseroë pallida** Lloyd, Synops. Phall. pag. 47, f. 53 a. — Stipite 1815 candido receptaculi laciniis pallide roseis.

Hab. in Nova Caledonia (LE RAT). — Laciniis receptaculi angustioribus et pallidioribus, ab *As. Mülleriana* videtur differre.

Fam. 2. Nidulariaceæ FR.

CYATHUS Hall. — Syll. VII p. 32, IX p. 266, XI p. 156, XIV p. 256, XVI p. 229, XVII p. 214.

1. **Cyathus plumbagineus** Mc. Alp., Descr. New Austral. Fungi, I, 1816 p. 104, t. X, f. 7-12 (Proceed. Linn. Soc. New S. Wal. 1896). — Peridio campanulato, deorsum tenuato, cartilagineo, extus fusco-brunneo, ruguloso, intus griseo-chalybeo, levigato, 9 mm. alt., 8 mm. cr., sicco rigido, margine maturitate leviter reflexo; sporan-

giolis discoideis atro-plumbeis, inæqualiter ovatis, distincte umbilicatis 2 mm. diam., funicolo elastico usque ad 7 mm. longo; sporis globosis v. subglobosis, 24 μ . diam. v. 24-27 \approx 21-24, hyalinis.

Hab. gregatim in fimo vaccino sicco pr. Sydney Australiae (MAIDEN). — Colore et glabritie a ceteris speciebus fimicolis videtur diversus.

2. **Cyathus cauna** Lloyd, The Nidulariac. (1906) pag. 27, tab. 110. — 1817
Peridio campanulato, rigido, 7-8 mm. alto, 6-8 mm. cr., obscure brunneo; extus levi, scabro-tomentoso; intus levi, glabro, ope liviæ dealbato; peridiolis supra tunica tenui argentea tectis; cortice duplici, exteriori tenui, fibrilloso; sporis minutis, globosis, 7-9 μ .

Hab. ad terram Barbados (L. LEWTON-BRAIN). — *C. Earlei* affinis sed sporis distincta.

3. **Cyathus Chevalieri** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. 1818
(1909) n. 2, p. 85. — Peridio obconico usque ad 2 cm. alto, undique hirto-leproso, corona brevissima pilosa donato, intus glabro, striato-plicato, nitenti, pallide ferrugineo, sursum obscuriori subplumbeo; sporangiolis tenuibus, vix 1 mm. latis, orbicularibus, margine tumidulo præditis; sporis hyalinis, numerosis, ovoideis, 8 \approx 5.

Hab. ad truncos putridos, Oubangui Ungourras Congo Africae trop. — *C. microsporo*, *Berkeleyano*, *Lesueurii* affinis.

4. **Cyathus Earlei** Lloyd, The Nidulariac. (1906) p. 26, tab. 110. — 1819
Peridio campanulato rigido 7-8 mm. alt., 6-8 mm. cr., atro-brunneo-nigricanti, extus levi tomento brevi scabriusculo, intus levi v. tenuiter striato albo; peridiolis tunica externa argentea tectis; cortice crasso duplici, exteriori tenui ex fibrillis gracilibus composito; sporis ellipsoideis v. ovato-ellipsoideis, 24-32 \approx 12.

Hab. in insula Cuba (F. S. EARLE) et Hawaii (F. W. TERRY). — *C. vernicoso* subaffinis imprimis colore et sporis diversus.

5. **Cyathus nigro-albus** Lloyd, The Nidulariac. (1906) p. 18, tab. 107. 1820
— Peridio e conico cupulato 6-7 mm. alt., 4-5 mm. ore lat., extus strigoso-hirsuto, levi, atro-brunneo sæpius nigricante, intus argenteo-albo tenuiter striato, peridiolis 1,5 mm. diam., tunica tenui præditis; sporis ellipsoideis, 16-22 \approx 12.

Hab. in lignis putridis, Samoa Polynesiae. — Dense cæspitosus colore atro-nigricante prædistinctus.

6. **Cyathus pygmæus** Lloyd, The Nidulariac. (1906) p. 26, tab. 110. 1821
— Peridio parvo, 4-4,5 mm. alt., 3,5-4 mm. cr., griseo-campanu-

lato, levi, glabro, rigido, pilis adpressis tecto, intus levi; peridiolis parvis, 1 mm. c. cr., tunica tenui præditis; cortice simplici, circa 30 μ ., in parti inf. peridioli crassiore; sporis parvis ovoideis, 12-14 \times 8-9.

Hab. ad ramulos in terra muscosa prope Washington Amer. bor. (C. V. PIPER). — *C. minimo* affinis sed sporis minoribus distinctus.

7. **Cyathus sphærosporus** Lloyd, The Nidulariac. (1906) p. 23, t. 109. 1822
— Peridio minuto uniformi, 5 mm. alt., 4 mm. cr., basi contracto et matrici pulvinulo mycelico pallido adhærente, extus levi pallido et pilis laxis vestito, intus levi; peridiolis 2 mm. diam. tenui tunicatis, cortice singulo; sporis subglobosis 16 \times 15 subinde ellipsoideis.

Hab. in Jamaica (W. JEKYLL). — *Cyatho pallido* valde affinis sed sporis multo majoribus sphæroideis distinctus.

8. **Cyathus triplex** Lloyd, The Nidulariac. (1906) p. 23, tab. 109. — 1823
Peridio cupulato 5-6 mm. alt., 5 mm. cr., intus et extus levi; pilis scabriusculis effuso-conniventibus vestito, intus levi argenteo-albo; peridiolis 2 mm. diam., tunica tenuissima adnata, aquæ ope inflata et alba; cortice crasso manifeste duplici sed subhomogeneo ex fibrillis tenuibus prædito; sporis ellipsoideis, 16-22 \times 12-14.

Hab. in ins. Mauritius (C. A. O'CONNOR). — Cæspitosus ramis et radicibus adhærens, *C. pallido* et *C. intermedio* peraffinis.

9. **Cyathus vernicosus** (Bull.) DC. — Syll. VII, p. 38. — var. **an-** 1824
glicus Lloyd, The Nidulariac. (1906) pag. 25, fig. 17. — A typo differt peridio amplo, sulcato.

Hab. in Angliæ pluribus locis. — Ad sect. eu-Cyathi nutat

NIDULA White — Syll. XVII p. 215.

1. **Nidula emodensis** (Berk.) Lloyd, *Cyathus emodensis* Berk. — Syll. 1825
VII, pag. 40. — var. **Heinricherii** Bres., Ann. Mycol. V (1907) p. 240. — Peridio sessili, e cylindræo cupuliformi vel subcampanulato, cervino, striis plane destituto, extus hirsuto, intus levi, concolore, 5-6 mm. lato, 4-5 mm. alto; sporangiolis umbrinis (in alcohole nigris) 1 mm. circiter latis, funiculo destitutis, pariete externa ex hyphis fulvis, usque ad 9 μ . crassis, apicibus bifidis et laxè spinulosis; sporis hyalinis, obovatis, 9-11 \times 4 $\frac{1}{2}$ -6.

Hab. ad ramulos in insula Java (HEINRICHER).

Fam. 3. Lycoperdaceæ.

SECOTIUM Kunze — Syll. VII p. 51, IX p. 266, XI p. 157, XIV p. 257, XVII p. 217.

1. **Secotium tenuipes** Setchell, Journ. of Mycol. XIII (1907) p. 239, 1826 tab. 107, fig. 4-8. — Gregarium; peridio subgloboso aut late ovoideo, subumbonato, basi plus minusve truncato et velo horizontali exiguo evanescente et arachnoideo instructo, 1-2 cm. lato et 1-1,5 cm. alto, e luteo-fusco fusco, glabro, carnosio; gleba a stipite fere libera sed ad apicem extremum lamelliformiter decurrente, lacunis aut regulariter aut indefinite sinuosis labyrinthica, marginibus lamelliformibus, luteo-fusca, sine venis propriis; stipite usque ad 2 cm. longo, gracili, evolvato, striato, per glebam libere percurrente sed ad apicem in glebam expanso; basidiis 2-4-sporiferis, sterigmatibus distinctis subintumescensibusque; sporis ellipsoideis v. ovoideis, 12-16 \times 8-12, luteo-fuscis, levibus.

Hab. ad terram argillaceam inter folia dejecta prope Berkeley et S. Francisco Californiæ.

ELASMOMYCES Cav. — Syll. XIV p. 258, XVII p. 218.

1. **Elasmomyces russuloides** Setchell, Journ. of Mycol. XII I (1907) 1827 p. 240, tab. 107, fig. 1-3. — Solitarius v. subgregarius; peridio depresso-globoso, inferne umbilicato et pseudolamellas ostendente, 1-1,5 cm. diam., 1-1,25 cm. alto, albo plus minusve rubescente, glabro; gleba alba, a stipite fere ad apicem libera, intus regulariter cellulosa, cellulis polygonato-sinuosis, extus plane lamellosis; stipite brevi v. brevissimo, moderate robusto, tereti, nunc recto nunc curvato, per glebam ad apicem percurrente et distincto; basidiis 2-4-sporiferis, sterigmatibus gracilibus curvatisque, cystidiis nunc frequentibus nunc sparsis, plus minusve clavatis gracilibusque; sporis globosis, albidis, lineis elevatis in rete irregulariter contextis, 6-8 μ . diam.

Hab. ad terram inter folia dejecta, Berkeley Californiæ (N. L. GARDENER et W. A. SETCHELL).

2. **Elasmomyces krjukowensis** (F. Bucholtz) Sacc. et D. Sacc. — Syll. 1828 XVII, p. 218. — f. **pleurotopsis** Bucholtz, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou (1907) n. 4, p. 463. — A typo recedit peridio late fla-

vido, tactu brunneo-maculato, basi in stipitem brevem producto, intusque lateraliter partem sterilem stipitis non genuinam columellam includente.

Hab. ad terram pr. Michailowskoje Rossiaë.

LE-RATIA Patouillard, Bull. Soc. Myc. France, t. XXIII (1907) fa. I, Extr. pag. 3 (Etym. a cl. LE RAT). — Peridium subglobosum, stipitatum, clausum, simplex, columella basilari, brevissima præditum. Gleba firma regulariter loculata, loculis vacuis fertilibus. Sporæ ovoideæ, coloratæ. Cum. gen. *Cauloglosso* et *Gymnoglosso* seriem constituit dignoscendam stipite in columellam interiorem plus minus producto.

1. **Le-Ratia similis** Patouillard, Bull. Soc. Myc. Fr., t. XXIII (1907) 1829 fasc. I, Extr. pag. 3, fig. 1. — Peridio rotundato deorsum attenuato, firmo, levi, obscure rubro, 2-3 cm. lato; stipite erecto cylindræo, rigido, superne leviter dilatato, 1,5 cm. longo, 5 mm. cr., rufo-ochraceo intus cavo luteoloque; columella vix 3 mm. alta, stipitis crassitudine, cylindrica apice truncata, gleba rufa, firma, lacunis minutis regularibus, septis carnosis, 90-100 μ . crassis; sporis ovoideis, levibus, utrinque obtusis, tenuiter tunicatis, pallide fuscis, 10-12 \times 6-8, intus plus minus guttulatis.

Hab. ad terram in Nova Caledonia.

2. **Le-Ratia smaragdina** Patouill., Bull. Soc. Mycol. Fr., XXV (1909) 1830 p. 133. — Peridio tenui, subgloboso, 6-30 mm. diam., levi, pulchre viridi, inferne pallidiori; stipite farcto brevi, 5-10 mm., cylindræo, vix 1 mm. cr., glabro, albido-viridi suffulto, mycelio fibrilloso, ramoso v. membranæo, albido, superficiali oriundo; gleba firma, fusca, lacunosa, lacunis vacuis, minutis, angulosis, radiantibus; sporis ellipsoideis, 10-12 \times 6-7, levibus, pallide fuscis, uniguttulatis; columella seu basi sterili albida, rotundata, subcompacta, infera, bene evoluta.

Hab. ad truncos vetustos montis Dzumac Novæ Caledoniæ (LE RAT). — *Le-Ratia similis* proxima, differt colore et situ.

PODAXON (Desv.) Fr. — Syll. VII p. 58, IX p. 267, XI p. 158, XIV p. 257, XVI p. 232, XVII p. 219.

1. **Podaxon macrosporus** Speg., Anal. Mus. Nac. Buenos Aires, XVI 1831 (1906) p. 27, cum icon — Peridio majusculo 70-80 mm. long., 25 mm. lato elliptico-cylindræo, albido; stipite tereti latissime fistuloso, ut peridio retrorsum squamoso, basi obsolete volvato, 120-

140 mm. long., basi 10 mm. cr. apice 2 mm.; gleba squamuloso-pulverulenta per ætatem atra; sporis ellipsoideis, levibus, olivaceo-fuligineis, 14-18 \times 7-12.

Hab. in aridis saxosis collinis, Zonda vocatis prope San Juan Argentinae.

2. **Podaxon termitophilus** Jumelle et Perrier de la Bâthie, C. R. Ac. 1832 Sc. Paris CXLV (1907) p. 274; Rev. génér. Bot. (1910) p. 53. — Stipite cylindrico squamoso 5-6 cm. longo, basi inflato; peridio tereti-conico late adpresse squamoso, 8 cm. long., 2 cm. cr., albo-griseo; gleba virente; capillitio copioso, sicco brunneo-rubente non spirali; basidiis e flavo brunneolis; sporis ovoideis, apice truncatis, 12 \times 9, e flavo rubentibus.

Hab. in nidis Termitis Perrieri, Madagascar. — *P. carcinomali* et *P. squamoso* affine, differt imprimis sporarum colore.

TYLOSTOMA (Pers.) Spreng. — Syll. VII p. 60, 470, IX p. 268, XI p. 159, XIV p. 258, XVI p. 233, XVII p. 220.

1. **Tylostoma leiosporum** R. E. Fries, Arkiv för Bot. VIII, n. 11 1833 (1909) Extr. p. 28, tab. IV, fig. 7-11. — Peridio subgloboso basique applanato, ad stipitem umbilicato, 10-15 mm. lato et 5-10 mm. alto, papyraceo, sordide cinereo-fulvo, cortice exteriori plus minus secedente albicante; annulo lacerato, 0,5 mm. a stipite distante; ore prominulo, umbonato margine crasso et fimbriato cincto; stipite æquali, basi vix v. paullo incrassato, striato, esquamato v. rarius squamis nonnullis minutis instructo, cavo intusque fibrilloso, isabellino-fulvo, 3-15 mm. longo, 1,5-3 mm. diam.; capillitii floccis hyalinis, ramosis, septis destitutis, 2-6 μ . diam., apicibus vix incrassatis, rotundatis v. truncatis; sporis coacervatis, fulvo-ferrugineis, globosis v. plus minus irregularibus, levissimis, 3,5-4,5 μ . diam.

Hab. in arenosis in prov. Jujuy et ad Sierra S. Barbara in Argentina sept. — *Tyl. poculato* et *Tyl. obeso* affine.

2. **Tylostoma aurasiacum** Patouill., Bull. trim. Soc. Myc. de France, 1834 vol. XXI (1905) p. 117. — Peridio subgloboso, subtus applanato, fulvescente, glabro, levi, 15-20 mm. diam., papyraceo, basi membrana angusta grisea, tomentosa cincto, ostiolo integro prominulo, scarioso; stipite prælongo 8-10 cm., 3-4 mm. cr., strato sulcato, plus minus torto, ochraceo-fulvo, glabrescente, apice in fundo umbilici a membrana formati penetrante; gleba rufa, pulveracea; capillitii floccis hyalinis v. pallide rufis, cylindricis, non torulosis, 5-

10 μ . cr., longissimis, apicibus rotundatis, remote septatis; sporis subgloboso-angulosis, ochraceis, minute punctatis, 5-6 \approx 4.

Hab. ad terram, Batna Algeriæ (TRABUT). — Affine *Tyl. Becariano*.

3. **Tylostoma Chudæi** Pat., Bull. Soc. Myc. Fr., XXIII (1907) p. 84. 1835

— Peridio amplo, subgloboso, albido, glabro, levi, 2 cm. diam., ore prominulo, integro, subcartiagineo, basi zona crassa, rigida tomentoso-pilosa quasi cupuliformi fusco-brunnea cincto; stipite cylindraceo 3-5 cm. long., 5-6 mm. cr. in acetabulum peridii immerso, discreto, lignoso, longitudinaliter rimoso, subsquamoso vel levi, basi bulboso immarginato; gleba fusco-ochracea; capillitii floccis longissimis, hyalinis, ad septa inflato-nodulosis; sporis ovoideo-subglobosis, flavis, asperatis, 4-5,5 \approx 4.

Hab. in arvis Milio satis, Sudan Afric. occid. (CHUDEAU).

4. **Tylostoma Readeri** Lloyd, Tylostomeæ (1906) p. 21, tab. 82, f. 1-2. 1836

— Peridio incolore, firmo, albo; sabuloso, imperfecte separabili et basi persistente; ore elongato, dehiscendo revoluto; stipite longo, obscuro, rugoso sed non squamoso, sæpe fibrillis mycelialibus prædito; capillitio hyalino, late filamentoso, parce septato, apicibus rotundatis, non inflatis; sporis granulatis, 5-6 μ . diam.

Hab. ad terram Casterton Australiæ (F. M. READER). — *Tyl. granuloso* affine sed ore diversum.

5. **Tylostoma Rickii** Lloyd, The Tylostomeæ (1906) p. 20, tab. 81, 1837

fig. 6-7. — Peridio obscure rubro-brunneo, cortice tenui, ore irregulari, dehiscente; stipite obscure rubro-brunneo, cortice fibrilloso, atro, vaginiformi, dein lacerato subpersistente et indumentum circa basim peridii efformante; capillitio hyphis hyalinis compressis tæniatis, contortis; parce septatis, non inflatis; sporis aculeatis 5 μ . diam., spinulis longis non vero densis.

Hab. ad terram in Brasilia (J. RICK). — *Tyl. cyclophoro* affine sed oris conformatione diversum.

6. **Tylostoma floridanum** Lloyd, The Tylostomeæ (1906) p. 18, t. 80, 1838

fig. 1-2. — Peridio obscure castaneo, ore parvo, tubuloso, circulari, prominenti prædito, cortice imperfecte separabili et hinc inde peridio adhærenti, infra incrassato et subpersistente; stipite angusto, obscure rubro-brunneo, sublevi, substriato non squamuloso, intus albo, cavo et centro fibrilloso, capillitio subhyalino, quandoque viscoso, septato levi, inflato; sporis distincte asperatis, 5 μ . diam.

Hab. ad terram, Florida Amer. bor.

7. **Tylostoma pygmæum** Lloyd, *The Tylostomeæ* (1906) p. 16, t. 78, 1839 fig. 3-4. — Peridio incolori v. sordide albo, ore parvo, circulari, protrudenti prædito, cortice adhærenti imperfecte separabili et partim peridio adhærenti, basi incrassato et persistenti; stipite angusto, pallido, rugoso, longitudinaliter strato sed non squamoso; capillitio hyalino, ad septa inflato; sporis distincte asperulis fere rugulosis, 5 μ . diam.

Hab. ad terram Texas et Florida Amer. bor. — *Tyl. albicanti* affine sed differt statura parva et sporis subrugulosis.

8. **Tylostoma Mac-Alpinianum** Lloyd, *The Tylostomeæ* (1906) p. 15, 1840 tab. 78, fig. 1-2. — Peridio incolori, ore circulari, tubuloso, leniter prominenti prædito; cortice crasso, basi subpersistenti; stipite subincrassato, pallido, squamuloso; capillitio hyalino stipite parum inflatis prædito; sporis sublevibus, 5-6 μ . diam.

Hab. ad terram in Australia (MAC ALPINE et TEPPER). — *Tyl. mammoso* affine sed differt peridio incolori et sporis sublevibus.

9. **Tylostoma occidentale** Lloyd, *The Tylostomeæ* (1906) p. 13, t. 76, 1841 fig. 1-2. — Peridio albo, ore parvo, tubuloso, circulari, prominenti prædito; cortice adhærenti, imperfecte separabili et peridio late maculose adhærenti, basi non fortiter incrassato; stipite pallido, non squamoso, crasse longitudinaliter striato, interne albo cavo et centro fibrilloso; capillitio leniter colorato, septis planis v. obliquis non inflatis prædito; sporis fere levibus, 4-5 μ . diam.

Hab. ad terram, Washington Amer. bor. (W. N. SUKSDORF). — *Tyl. albicanti* affine, sed differt colore vere albo, stipite crasse striato, sporis levibus.

10. **Tylostoma egranulosum** Lloyd, *The Tylostomeæ* (1906) pag. 21, 1842 tab. 82, fig. 3-4. — Peridio incolore, irregulariter aperto; cortice a sabulo imperfecte liberato; basi incrassato et persistenti; stipite obscuro, rigido; capillitio subhyalino, sparse noduloso; sporis granulosis, 5-6 μ . diam.

Hab. ad terram Casterton Australiæ (F. M. READER). — *Tyl. granuloso* affine sed ore diversum.

11. **Tylostoma Berkeleyi** Lloyd, *The Tylostomeæ* (1906) p. 25, t. 84, 1843 fig. 8-9. — Peridio colorato rubro-brunneo; cortice sabuloso, imperfecte separabili et arcte adnato, ore fibrillis minutis granulosis circumdato; stipite angusto, obscure rubro, sæpe leniter squamoso, plerumque crasse sulcato, striato; capillitio subcolorato septis subincrassatis sæpe obliquis prædito; sporis 5-6 μ . diam., granulosis.

Hab. ad terram in America. — *Tyl. fimbriato* affine.

12. **Tylostoma mammosum** (Mich.) Fr. — Syll. VII, p. 60. — var. 1844

simulans Lloyd, *The Tylostomeæ* (1906) p. 18, tab. 79, fig. 2-3. — A typo differt peridio pallido, castaneo, ore unicolori; cortice tenui, imperfecte separabili; stipite angusto, pallido, leniter striato et quandoque squamuloso; capillitio parce septato et nodis incrassatis; sporis asperulis 5 μ . diam.

Hab. ad terram, Ohio et Texas Amer. bor. — var. **rufum** Lloyd, l. c. (1906) p. 18, tab. 79, fig. 4-6: a typo differt peridio ampliore et saturatius uniformiter colorato, stipite brevior et crassior et capillitii hyphis nodosis. — Ad terram Texas, Florida, Alabama Amer. bor. — var. **pallidum** Lloyd, *The Tylostomeæ* (1906) p. 17, tab. 79, fig. 1: a typo differt pileo uniformiter pallido, cortice magis adnato, peridio latiori et stipite crassiori; capillitio etiam omnino diverso; septis parcis lenissime inflatis. — Ad terram in Gallia (PYAT FELIX), Italia (C. MASSALONGO). — var. **majus** Petri, *Fl. it. crypt. Gasterales* (1909) p. 118: endoperidio albicante, osculo halone fusco cincto; stipite usque 10-11 cm. longo, tortuoso, albicante, sericeo, medio incrassato, 5 mm. diam., extremitatibus hypharum capillitii minus incrassatis quam in forma typica. — In glareosis « alle Giare » pr. Tridentum (BRESADOLA). — var. **longipes** (Czern.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 1050 — *Tyl. pedunculatum* var. *longipes* Czernaiew, *Bull. Soc. Imper. Nat. Moscou XVIII* (1845) p. 145, tab. III, fig. 1-5; Bulliard, tab. 294 et 471. — A typo differt stipite longiore. — In Gallia et Rossia.

13. **Tylostoma Beccarianum** Bres. in herb. Webb et in Petri, *Ann. mycol.* 1845

(1904) p. 413, tab. V et p. 414; *Fl. it. crypt. Gasterales* p. 124, fig. 73 et fig. 68 IV. — Exoperidio tomentoso, fusco, ex parte persistente, endoperidio subgloboso, papyraceo, glabro, avellaneo, basi umbilicato et zona tomentosa, fusca, interdum oblitterata, cincto, ore integro, mammoso, plus minusve prominulo; stipite ochraceo-brunneo, glabrescente cavo; sublignoso, basi mycelio fibrilloso denso, obducto; capillitii hyphis hyalinis, crasse tunicatis, in articulos facile secedentibus, 5-7 μ . latis, extremitatibus parum incrassatis et non coloratis; sporis globosis, ochraceo-ferrugineis, aculeolatis, 4-5 μ . diam. vel 4-5 \approx 3,5-4.

Hab. in fimetosis hort. bot. Pisa Ital. centr. (O. BECCARI).

14. **Tylostoma Bresadolæ** Petri, *Ann. Mycol.* (1904) p. 414, tab. VI, 1846

fig. 1 et pag. 418; *Fl. ital. crypt. Gasterales* pag. 121, fig. 70 et fig. 68 VI. — Exoperidio pulveraceo, parce manifesto, endoperidio globoso, inferne applanato, umbilicato, obtuso, cartilagineo,

glabro, albido-cremeo, ore mammoso, integro, halone albo cincto; stipite cavo, lignoso, avellaneo, interdum albicante, longitudinaliter sulcato, superne squamis deorsum discretis, obtecto, obconico, basi parce bulboso; capillitii hyphis tenuibus, 2,5-6 μ . latis, parce tunicatis, extremitate incrassatis, coloratis, nec in articulos facile secedentibus; sporis globosis, aculeatis, flavo-ochraceis, 5-8 μ . diam.

Hab. ad terram inter muscos cum *Tyl. mammoso*, Fiesole Firenze (BACCARINI).

15. **Tylostoma melanocyclum** Bres. apud Petri, Ann. Mycol. (1904) 1847 p. 415 et Petri ibid. p. 416-417, tab. VII, fig. 6-7, p. 416; Fl. it. crypt. Gasterales p. 119, fig. 67 et fig. 72 II. — Exoperidio tomentoso, parce manifesto, endoperidio subgloboso, papyraceo, glabro e pallido ochraceo albido, basi zona tomentosa, interdum obsoleta, brunnea, cincto, ore integro, mammoso subcylindraco, usque ad 1 mm. prominulo et halone nigro cincto; stipite cavo, cartilagineo-sublignoso, subæquali v. sursum attenuato, primitus squamulis ochraceis obtecto, dein glabrescente et brunneo, substantia alba; capillitii hyphis hyalinis, majoribus stramineis plus minusve in articulos secedentibus, crasse tunicatis, 4-10 μ . latis, extremitatibus vix incrassatis, ochraceis; sporis ochraceo-aureis, globosis, echinulatis, 5-7 μ . diam.

Hab. in agris glareosis « alle Giare » pr. Trento.

16. **Tylostoma brevipes** Petri, Ann. Mycol. (1904) p. 418 c. ic.; Fl. 1848 ital. crypt. Gasterale p. 125, fig. 72 III. — Exoperidio tomentoso parce manifesto; endoperidio globoso, obtuso, papyraceo, glabro, avellaneo, basi zona tomentosa, grisea cincto, ore integro, minutissimo, subplano; stipite ferrugineo, cavo, tenui, brevi, squamulis plus minus tecto, basi bulboso; capillitii hyphis tenuibus, 2,5-6 μ . latis, depressis, extremitate incrassatis, coloratis, nec in articulos facile secedentibus; sporis globoso-angulosis, aculeolatis, flavo-aureis, sæpe pedicellatis, 4,5-5 μ . diam.

Hab. ad terram pr. Sassuolo, Modena Ital. bor. (A. MORI).

17. **Tylostoma armillatum** Bres. in herb. (1897) Petri, Ann. Mycol. 1849 (1904) p. 422, tab. VI, fig. 17 et p. 423; Fl. it. crypt. Gasterales p. 122, fig. 71 et fig. 68 V. — Exoperidio tomentoso ex parte persistente; endoperidio subgloboso, papyraceo, cremeo, glabro, basi umbilicato et zona tomentosa, brunnea, nec non annulo fibroso, concolore, stipitem amplexente donato, ore integro, mammoso, parum prominulo; stipite cavo, fibroso-sublignoso, brunneo, deorsum sensim incrassato et squamis brunneo-fulvis obtecto, apice

laxo sericeo, subsquamuloso; capillitii hyphis hic illic crasse et undulato-tunicatis, haud facile in articulos secedentibus, extremitatibus incrassatis et rotundatis; sporis ochraceis, levibus, ovoideis, $3,5-4 \approx 3$.

Hab. locis aridis, Rovereto in agro tridentino (P. GIOVANELLA).

18. **Tylostoma Lloydii** Bres. in Petri, Ann. Mycol. (1904) pag. 423, 1850
tab. VI, fig. 4. -- Exoperidio membranaceo, brunneo, mox frustatim collabente et basi zonam concolorem relinquente; endoperidio subgloboso, papyraceo, glabro, pallide subcinereo, basi applanato et profunde umbilicato, 1 cm. lat., 8-9 mm. alt., ore albo, oblongo, $2 \approx 1,5$ mm. parum prominulo, circulo tomentoso 0,5 mm. lat., subfimbriato prædito; stipite cavo fibroso-sublignoso, brunneo, squamis saturatioribus deciduis ubique obsito, apice attenuato et in acetabulum peridii immerso, deorsum sensim incrassato et basi membrana pallida subvolviformi fimbriata prædito, 6-7,5 cm. long., apice 2,5-3 mm., basi 4-5 mm. cr., substantia alba; gleba subochracea; sporis levibus, sæpe inæquilateris, $3,5-4 \approx 3,5$; hyphis capillitii crasse tunicatis, in articulos non facile secedentibus, hyalinis, 3-9 μ . latis.

Hab. ad terram in America boreali (C. G. LLOYD). — *Tylost. squamoso* affine sed notis datis probe distinctum.

19. **Tylostoma fulvellum** Bres. ap. Petri, Ann. Mycol. (1904) p. 423, 1851
et p. 424, tab. VI, fig. 23 et p. 424; Fl. ital. crypt. Gasterales p. 129, fig. 78 et fig. 74 IV. -- Exoperidio tomentoso, brunneo ex parte persistente; endoperidio subgloboso, papyraceo, glabro, fulvello, ætate ochroleuco, basi profunde umbilicato et zona tomentosa, brunneo-fusca, cincto, circa umbilicum annulo fimbriato donato, ore laciniato-dentato, subconico; stipite cavo, sublignoso, deorsum sensim incrassato, brunneo-fulvo, longitudinaliter striato; in squamulas concolores plus minusve excoriato, ætate glabrescente, basi marginato-dilatato et mycelio tomentoso, volvæ ad instar sæpe calceato; capillitii hyphis dilute cremeis (majoribus), hyalinis (minoribus), irregularibus, sinuosis, 2,5-10 μ . latis, facile in articulos secedentibus, articulis tenuioribus, brevibus, ramosis extremitate clavatis, parietibus hypharum majorum undulato-incrassatis; sporis ovatis, ochraceis, levibus, $3,5-4,5 \approx 3-3,5$.

Hab. ad sepes juxta viam, Ravine pr. Trento.

20. **Tylostoma Petrii** Bres., in Ann. Mycol. (1904) p. 428; Petri l. c. 1852
p. 420, tab. VI, fig. 11-12; Fl. ital. crypt. Gasterales pag. 127, fig. 75. — Exoperidio tomentoso ex parte persistente, endoperidio

globoso papyraceo, e flavido-avellaneo, mox albido, basi umbilicato et zona tomentosa, brunnea cincto, ore parvo, lacero-denticulato, submammoso; stipite fibroso-sublignoso, cavo, brunneo, squamulis concoloribus, demum evanidis, primitus obtecto, basi bulbilloso et mycelio fibrilloso, denso obtecto; capillitii hyphis dilute ochraceis plus minusve crasse tunicatis, in articulos haud facile secedentibus, 3-8 μ . latis, extremitatibus incrassatis et ochraceis; sporis globosis, ochraceis, asperulis, 3,5-4,5, raro 5 v. 5 \approx 4.

Hab. in agris glareosis et in cultis « alle Giare » pr. Trento.

21. **Tylostoma Mac-Owani** Bres. ap. Petri, Ann. Mycol. (1904) p. 429, 1853
tab. VI, fig. 13-14. — Peridio globoso, papyraceo, glabro, avellaneo, basi zona tomentosa, fusca cincto, profunde umbilicato, 1-1,5 cm., diam., ore fimbriato, plano; stipite sublignoso, cavo, longitudinaliter sulcato-striato, brunneo, glabrescente, vix excoriato 1.5-4 cm. long., 2-3 mm. cr.; sporis subglobosis, sæpius inæquilateris, aureo-fulvis, minute et laxè asperulis, 5,5-7 μ . diam. v. 5-7 \approx 4-5; hyphis capillitii chlorino-hyalinis, tenuiter tunicatis, in articulos non facile secedentibus, 5-7 μ . lat., extremitatibus incrassatis et ochraceis.

Hab. ad terram pr. Caput Bonæ Spei Africæ (MAC OWAN).

22. **Tylostoma fusipes** Har. et Patouill. Bull. Soc. Mycol. Fr. (1910) 1854
p. 208, tab. IX, f. 3. — Peridio albido, globoso, levi, glabro, nucis avellanæ magnitudinem subæquante, subcartilagineo, sursum circulatim perforato, immarginato, deorsum in membranam, glabram circularem, stipitis apice circumdantem producto; stipite concolori, evolvato, gradatim et regulariter tenuato-fusiforimi, 4 mm. apice, 1,5 mm. basi cr., glabriusculo, plus minus apicem versus sulcatulo; gleba pulverulenta, rubiginosa; capillitio floccis cylindricis, fuscidulis, 10-12 μ . cr., brevibus, facillime dilabentibus formato; sporis globoso-angulatis, levibus, fuscis, 9 μ . diam.

Hab. ad terram, Sahel, Bou Djébéha Tombuctu Africæ. — Totus 6-7 cm. alt. Affine *T. volvulato*.

23. **Tylostoma americanum** Lloyd, The Tylostomeæ (1906) pag. 20, 1855
tab. 80, fig. 5-9. — Peridio incolori pallido sæpe osculis pluribus irregularibus nudis prominulis prædito; stipite crasso pallide vel læte colorato, cavo, sæpe striato, crassitudine et longitudine vario, 6-14 cm. long.; capillitii hyphis hyalinis; sporis 5-6 μ . diam., levibus.

Hab. copiose prope Denver Colorado Amer. bor. (E. B. STERLING). — Probabiliter varietas *Tyl. cæspitosi*.

24. **Tylostoma australianum** Lloyd, *The Tylostomeæ* (1906) pag. 20. 1856
tab. 81, fig. 8-10. — Peridio incolori cortice sabuloso tecto, supra
irregulariter excoriato, basi vero persistente, ore irregulariter de-
hiscente; stipite brevi cortice atro rugoso et non squamoso tecto;
capillitii hyphis hyalinis tenuibus parce septatis hinc inde valde
inflatis; sporis 4-5 μ . diam., levibus.
Hab. ad terram in Australia (MAC ALPINE). — Habitus *Tyl.*
albi sed sporæ leves.
25. **Tylostoma cyclophorum** Lloyd, *The Tylostomeæ* (1906) pag. 25, 1857
tab. 85, fig. 1-2. — Peridio læte brunneo, ore prominente scuti-
formi, fibrilloso; cortice tenui perfecte secedente et peridium de-
nudatum relinquente; stipite gracili atro cortice firmo fibrilloso
demum lacerato et basi persistente et collarium laciniatum for-
mante tecto; capillitii hyphis coloratis crassiusculis sporæ diame-
trum triplo quadruplove superantibus, hinc inde nodoso-subinfla-
tis; sporis 4-5 μ . diam., granulosis.
Hab. in Africa australi (Miss B. STONEMAN). — Affine *Tylost.*
Rickii.
26. **Tylostoma bulbillosum** Bres. in Rick, *Broteria* V (1906) pag. 28, 1858
tab. I, fig. 11.
Hab. ad terram, Rio Grande do Sul in Brasilia. — Nomen
nudum; a *T. Berteroano* diversum.
27. **Tylostoma volvulatum** Borsz. — Syll. VII, p. 61 — f. **elatum** 1859
Patouill., Bull. Soc. myc. Fr., XXVI (1910) p. 207, t. IX, fig. 2.
— A typo recedit statura majore, usque ad 16 cm. altum.
Hab. Bou Djébéha Nigeria Africa centr.

MITREMYCES Nees — Syll. VII p. 68, IX p. 270, XI p. 162, XVI
p. 236, XVII p. 225.

1. **Mitremyces Le-Rati** Pat., in Lloyd *Mycol. Notes* n. 22 (1906) p. 273. 1860
— Pusillus, subglobosus, 10-12 mm. lat.; exoperidio brunneo in
frustula minuta exoperidio adnata orbiculariter rupto; endoperidio
fusco-succineo regulariter tenuiterque foveolato; osculo coccineo
4-5 dentibus instructo; mycelio stipitiformi 12-25 mm. longo e
fibris cartilagineis obscure melleis composito; sporis ovoideo-sub-
globosis, sub lente hyalinis, minute asperatis, 9-12 \approx 8-10.
Hab. ad terram, Mont Mou Novæ Caledoniæ (LE RAT). — *My-*
tremycti Ravenelii, *M. Teyleri* proximus.
2. **Mitremyces Teyleri** Lloyd, *Mycolog. Notes* n. 20 (1905) p. 240, 1861
tab. 68, fig. 1-2. — *Mitr. Ravenelii* var. *minor* Lloyd, *Mycolog.*

Notes pag. 127. — Differt a *M. Ravenelii* peridio leviori, colore pallide olivaceo et statura minori.

Hab. ad terram in Amer. bor.

3. **Mitremyces insignis** Lloyd, Mycolog. Not. n. 20 (1905) pag. 241, 1862
tab. 69, fig. 3-4. — Exoperidio volva gelatinosa apparenter con-
spurcato; endoperidio levi flavido; sporis magnis, globosis, ruditer
spinulosis, 15-17 μ . diam.

Hab. ed terram in insula Ceylon (herb. Kew).

GEASTER (Mich.) Fr. — Syll. VII p. 70, 471, IX p. 271, XI p. 162,
XIV p. 260, XVI p. 237, XVII p. 226.

1. **Geaster violaceus** Rick, Broteria V (1906) p. 26, tab. I, f. 16. — 1863
Primitus globosus, collo longo, violaceus, in 8, aut minus, lacinias
dehiscens; exoperidio extus brunneo-violaceo, intus pulchre lila-
cino, endoperidio brunneo aut griseo, granulato, tomentosulo, in
collum papilliforme aut etiam longum producto; collo determi-
nato, laxe striato et irregulariter fibroso; sporis subrotundis, mi-
nimis.

Hab. solitarius ad terram, Rio Grande do Sul Brasiliæ.

2. **Geaster Harioti** Lloyd, Mycolog. Not. n. 25, (1907) p. 311, t. 99. 1864
— Exoperidio rigido in segmenta 5-7, lata, ovalia diviso; endo-
peridio sessili globoso nigro, ore sulcato concolore.

Hab. ad terram in Amer. austr., ubi videtur frequens, præci-
pue in Chile et Brasilia. — Species lecta est quoque in Hispania
(Herb. Kew) et Martinica (Herb. Berolin.). — *Geasteri umbilicato*
affinis.

3. **Geaster Lloydianus** Rick, Broteria v. V (1906) pag. 27, tab. II, 1865
fig. 10; Lloyd, Puff-Ball-Letters n. 2 Paris may 1904. — Parvus,
sessilis; endoperidio sessili, nigro, ostiolo sulcato, exoperidio re-
curvato.

Hab. ad terram, Rio Grande do Sul Brasiliæ. — *Geast. eleganti*
affinis, sed differt præcipue endoperidio nigro.

4. **Geaster mirabilis** Mont. — Syll. VII, p. 79 et 472. — var. **subi-** 1866
culosus Lloyd, Mycol. Not. n. 25 (1907) p. 314, tab. 100, f. 4-5.
— A typo differt statura majore ceterum valde similis.

Hab. ad terram in Australia, in India et Florida. — var. **tri-**
chifer Rick, in Lloyd Mycol. Not. n. 25 (1907) p. 314, fig. 147-
148: a typo differt exoperidio fortiter strigoso. — In Amer. austr.
(RICK).

5. **Geaster Smithii** Lloyd, Mycol. Not. n. 23 (1906) p. 287. f. 128, 1867

Geastræ p. 21, f. 37, *G. umbilicatus* Smith Gard. Chron. (1873) p. 469, non Fries. — Initio globosus exoperidio subhygroskopico in 8-12 segmenta in sicco incurvata usque ad medietatem diviso; strato mycelico tenui sæpe adnato; endoperidio subpedicellato sed pro more sessili; osculo conico-depresso areola depressa cincto, regulariter sulcato-striato; gleba nigricante; hyphis capillitii 4-5 μ . cr.; sporis globosis, asperulis, apiculatis, 4-5 μ . diam.

Hab. ad terram in Britannia et Florida Amer. bor.

6. **Geaster infrequens** Lloyd, Mycol. Notes, n. 22 (1906) pag. 263, 1868 fig. 99. -- Exoperidio levi, pallido, tenui supra medium in 6-8 segmenta acuta conniventia diviso; endoperidio sessili, brunneo-rubente, osculo indeterminato.

Hab. ad terram in Tirolia (R. Pater A. LUISIER). — Ab affini *G. fimbriato* a quo differt colore, segmentis conniventibus et endoperidio acetabulo exoperidii fere infosso.

7. **Geaster Morganii** Lloyd, Mycol. Not. n. 8 (1901) p. 80, fig. 45-46, 1869 Geastræ p. 20, fig. 31-36; Höllos, Gasteromyc. p. 50, tab. XXIX, fig. 27. — Peridio juniore acuto; exoperidio ad medium in 7-9 segmenta acuta partito; endoperidio globoso, sessili, osculo conico indefinite sulcato; columella globoso-clavata; capillitii hyphis sporæ diametro crassioribus; sporis minutis, globosis, 4 μ . diam., pro more levibus.

Hab. ad terram circa Cincinnati Amer. bor. (LLOYD). — Teste Bresadola ap. Höllos l. c. occurrit quoque in Italia.

8. **Geaster arenarius** Lloyd, Geastræ p. 28, f. 53-54, Mycolog. Notes n. 25 (1907) p. 317, tab. 95, fig. 12-16; Höllos, Gasteromyc. pag. 50-51, tab. XXIX, fig. 19-20. — Minutus, 1,5 cm. lat.; exoperidio subhygroskopico in 5-7 segmenta acuta, sicca incurvata diviso, extus non rimoso; endoperidio subgloboso brevissime sed pro more distincte pedicellato; osculo levi, acute conico, definito, sæpe saturatius colorato quam residuo endoperidii; columella obsoleta; sporis globosis, rugulosis, 3-4 μ . diam.

Hab. in sabulosis ad Jupiter Floridæ Amer. bor. (CULBERSTON et LLOYD). — Affinis *G. minimo*.

9. **Geaster simulans** Lloyd, Lycoperd. of Austral. (1905) p. 17, f. 11-12. — Exoperidio crasso, fortiter hygroskopico; endoperidio sessili, ore indefinite dehiscente; sporis parvis, globosis, 4-5 μ . cr.

Hab. Drummond in Australia. — A *Geast. hygrometrico* differt sporis multo minoribus. *Geast. rufescenti* etiam affinis.

10. **Geaster calceus** Lloyd, Mycol. Not. n. 25 (1907) p. 311, tab. 95. 1872

Geast. minimo affinis sed major, endoperidio particulis granularibus albis, crassiusculis, dense tecto.

Hab. in Africa austr. (Herb. Berolin.).

11. **Geaster viridis** Ruffieux, Mém. Soc. Fribourg d. Sc. Nat. I (1904) 1873 pag. 194. — Minutus; exoperidio quadrivalvi, viridi; endoperidio griseo, striato.

Hab. ad terram sub Pinis in silva Bourguillon Helvetia, semel. — Diagnosis omnino incompleta; color viridis forte ex algulis chlorophyceis parasiticis.

12. **Geaster fenestratus** (Batsch) Lloyd, Mycol. Not. n. 7 (1901) p. 70, 1874 fig. 33. — Prioritatis causa ita vocandus esset, teste Lloyd l. c., *Geaster fornicatus* (Huds.) Fr. — Syll. VII, p. 73.

13. **Geaster ambiguus** Mont. — Syll. VII, p. 78. — Huc ducendus 1875 *Geaster avellaneus* Kalchbr., Gasteromycetes novi, tab. V, fig. 4. — Teste Höllos, Gasterom. Ungar. p. 153, hæc species non differt.

14. **Geaster mammosus** Chev. — Syll. VII, pag. 85. — Huc certe 1876 spectat *Geaster Sowerbyi* Corda, Anleit. p. LXXX, t. D, f. 43⁶⁻⁹.

15. **Geaster velutinus** Morg. — Syll. XIV, p. 260. — var. **cæspitosus** 1877 Lloyd, Mycol. Not. n. 25 (1907) p. 315, tab. 100; *Geastræ* p. 36, fig. 72-73. — A typo differt statura minore et habitu cæspitoso.

Hab. prope Cincinnati Amer. bor.

BROOMEJA Berk. — Syll. VII p. 93.

1. **Broomeja ellipsozona** v. Höhn. (Æsterr. bot. Zeitschr. (1905) p. 99. 1878 — Pallide violaceo-brunnea, inæqualiter oblonga, 3,5 cm. lata, 4,5 cm. lg., suberoso-lignosa, probabiliter breviter et late stipitata, infra bicorticata, versus marginem acutum, dentatum inflexum tunica simplici 1-2 mm. cr. prædita, sursum in 20 alveolos partita et totidem peridiola 12 \approx 10 mm. globulosa minuta ostiolata gerente; columella nulla; gleba pulverea subcinnamomea; sporis ellipsoideo-oblongis, levibus, brunneolis, 6-9 \approx 4-5, interdum cylindraceis et utrinque rotundatis.

Hab. in sabulosis in Africa australi (E. HOLUB). — Sporis oblongis levibus a ceteris generis speciebus dignoscitur.

LANOPILA Fr. — Syll. VII p. 95, XI p. 164, XVI p. 240.

1. **Lanopila pygmæa** R. E. Fries, Arkiv för Bot. VIII n. 11 (1909) 1879 Extr. p. 16, tab. II, fig. 6-9; Lloyd, Mycolog. Not. n. 33 (1909) p. 442, fig. 253. — Subglobosa, sessilis, pygmæa, 7-11 mm. diam., matura radicibus destituta, mobilis; peridio levi, fragili, tenui, fu-

moso, demum irregulariter secedente, membrana tenuissima vestito; gleba fertili peridium totum implente, olivaceo; capillitii floccis longissimis, parce ramosis, non septatis, flavido-brunneis, 3-4 μ . diam., peripheriam versus densius articulatis et stratum elasticum formantibus; sporis coacervatis, olivaceo-fulvis, globosis, levibus, 6-7 μ . diam.

Hab. locis subsiccis arenosis sub *Acaciis*, Tarija Boliviae austr. et in prov. Jujuy Argentinae sept. — Minutie et colore præpripriis dignoscenda species.

CALVATIA Fries — Syll. VII p. 105, XIV p. 262, XVII p. 234.

1. **Calvatia artica** Ferdin. et Winge, Fungi terrestres from North- 1880
East Greenland, in Danmark-Eksped. til Groenlands (1906-1908)
Bd. III, n. 5 (1910) pag. 144, tab. IX. — Peridio fere habitum
Sclerodermatis aurantii æmulante, subreniformi-globoso, inferne
stipitiformi-protracto indeque plicato, lat. ad 6 cm., alt. circ. 3 cm.
plus v. minus radicato; exoperidio tenui, superne verrucis eximie
pyramidatis, lineolis horizontalibus parallelis ornatis, obsesso, non-
numquam magis irregulariter areolato-cælato, inferne, secundum
limitem satis distinctum, granuloso, primo albo, ad maturitatem
fungi ochraceo; endoperidio crasso, irregulariter dehiscente, fra-
gili; gleba peridium fere totum explente, initio alba, matura gri-
seo-brunneola, levissime olivaceo-tincta, basi sterili pallida, parvo
cellulari, parte infimam stipitiformem peridii tantum occupante,
instructa; basidiis obovato-clavatis, 14-16 \times 7-8, sterigmatibus te-
nuibus, usque ad 18 μ . long., suffultis; sporis globosis 4,5-5,5 μ .
diam., minute papillatis, uniguttulatis, tenuiter tunicatis, flavidulis,
ad maturitatem verrucis hyalinis, perexiguis, deciduis exasperatis;
floccis diametro fere sporarum (raro ad $7/2$ μ . lat.), iisdem sub-
concoloribus nonnumquam dichotome ramosis.

Hab. ad terram in tractu litoreo Groenlandiæ orientalis, Lat.
bor. c. 77.°

2. **Calvatia lachnoderma** Pat., Ann. Mycol. V (1907) p. 366. — Pe- 1881
ridio subgloboso vel ovoideo, 3-6 cm. diam., superne rotundato
inferne conico, rigido, firmo, crasso, levi, minute velutino rufulo,
frustulatim dehiscenti; basi sterili peridii tertium inferum occu-
pante, compacta, dura, celluloso-fibrosa, albo-olivascens; gleba pul-
verulenta, ochracea dein obscure rufo-ochracea; capillitio parum
evoluto, ex hyphis brevibus, vix ramosis, rufo-ochraceis, 5 μ . cr.

formato; sporis globosis rufidulis, levibus vel vix rugulosis, ecaudatis, 6 μ . diam.

Hab. ad terram, Prov. Sao Paulo, Araraquara Brasiliæ. — Affinis *C. Hespericæ* Morg. a quo differt glebæ et sporarum colore et basi sterili distinctissimâ.

BOVISTELLA Morgan, Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. XIV (1892) p. 141. — Peridium externum tenue, mox evanidum, internum subflaccidum, basi sterili persistente plerumque præditum. Capillitii hyphæ discretæ, in ramos tenuiores, attenuatos divisæ. Dignoscitur peridio *Lycoperdi* et capillitio *Bovistæ*. — Quoad alias species huic generi spectantes cfr. Syll. XIX, pp. 197-198.

1. **Bovistella floridensis** Peck, Bull. Torr. Bot. Club, XXXVI (1909) 1882 pag. 338. — Peridio subgloboso, 6-20 mm. lato, flaccido, cortice minute granulati v. pulverulento, brunneo, in siccitate squamulas minutas circum apicem formante, demum evanescente; peridio interius glabro, albido, ore rotundo dehiscente, basi sterili parvo; capillitio filamentis longis, gracilibus, ramosis, intricatis, subhyalinis composito; sporis globosis, asperulis, pedicellatis, 4-5 μ . latis; pedicellis 10-20 μ . longis.

Hab. ad terram prope De Funiak Springs Florida Amer. bor. (G. CLYDE FISHER).

2. **Bovistella japonica** Lloyd, Mycol. Not. n. 23 (1906) p. 281, t. 88 et 1883 p. 126 — Peridio firmo, rigido, basi valide radicato; cortice spinulis minutis, nodulosis, fasciculatis consperso; basi sterili grosse cellulosa, molliuscula, dimidium peridium occupante; gleba pallide olivacea; capillitio discreto ex hyphis valde ramosis, pallide coloratis formato; sporis globosis 4-5 μ . diam., levibus, tenui-pedicellatis.

Hab. ad terram in Japonia (K. MIYABE). — *Bov. ammophilæ* proxima.

3. **Bovistella australiana** Lloyd, Mycol. Not. n. 23 (1906) pag. 281, 1884 t. 33 et 70. — Subglobosa v. oblonga, basi sterili grosse cellulosa; cortice minute, noduloso-furfuraceo, dein nudato; gleba olivaceo-umbrina; capillitii hyphis longis, ramis acuminatis præditis; sporis globosis, levibus, 4 μ . diam., pedicello tenui, 12-15 μ . longis, donatis.

Hab. ad terram, Grandville Australiæ (J. T. PAUL) et Antoner Novæ Zelandiæ (R. BROWN).

4. **Bovistella glabrescens** Lloyd, Mycol. Not. n. 23 (1906) p. 282. — Peri- 1885

dio basi sterili minute cellulosa prædito, denudato (an ab initio?); gleba olivaceo-umbrina; capillitii hyphis intricatis, longis; sporis globosis, 5 μ . diam., levibus; pedicellis tenuibus, 10-12 μ . long.

Hab. ad terram in Tasmania (herb. Kew).

5. **Bovistella scabra** Lloyd, Not. Mycol. n. 23 (1906) p. 282, t. 70. — 1886
Peridio basi sterili laxè cellulosa prædito; cortice spinulis brevibus, scabris, conniventibus consperso; gleba olivaceo-umbrina; capillitii hyphis longis, ramosis intricatis, affixis; sporis globosis, 4-5 μ . diam., levibus, tenui-pedicellatis.

Hab. ad terram in Australia (TEPPER, READER, PAUL). — *Bovistella australianæ* affinis sed notis corticis satis differt.

6. **Bovistella Miyabei** Lloyd, Mycol. Not. n. 23 (1906) p. 282, t. 88. — 1887
Peridio globoso-ovoideo; cortice spinulis brevibus subgemmatis consperso, dein decedentibus et superficiem reticulato-rugosam ostendente; basi sterili grosse cellulosa peridii tertiam partem occupante; gleba olivacea; capillitii hyphis saturate coloratis, intricatis, longis; sporis globosis, levibus, 4 μ . diam., pedicello longissimo, usque ad 20 μ . præditis.

Hab. ad terram in Japonia (K. MIYABE). — *Bovistellæ pedicellatæ* affinis.

7. **Bovistella dominicensis** Lloyd, Mycol. Notes n. 23 (1906) p. 283, 1888 fig. 128. — Peridio globoso in basim stipitiforem contracto; cortice furfuraceo, initio forsitan spinuloso, mox vero nudato; gleba olivacea; capillitii hyphis longis, intricatis, ramosis, coloratis; sporis globosis, 4-5 μ . diam., minute spinulosis, pedicellis 16-20 μ . longis, donatis.

Hab. ad terram in insula Dominica Indiæ occid.

8. **Bovistella Henningsii** Lloyd, Mycol. Not. n. 23 (1906) p. 284, t. 89, 1889 fig. 5-6. — Subglobosa; peridio papyraceo-cartilagineo; cortice spinulis minutis fasciculatis, persistentibus consperso; basi sterili nulla; gleba olivaceo-alutacea, capillitio discreto, atro-colorato, hyphis crasse tunicatis 12-16 μ . cr., ramulis vero fortiter tenuatis, acutis; sporis globosis, levibus, 4-5 μ . cr., tenui-pedicellatis.

Hab. ad terram Maisur Indiæ or. (herb. Horti berol.). — A *Bov. plumbea* certe diversa.

9. **Bovistella Davisii** Lloyd, Mycol. Notes n. 23 (1906) p. 286, t. 89. — 1890
Peridio subgloboso, flaccido, cortice spinulis fasciculatis, minutis consperso; basi sterili nulla; gleba olivacea; capillitii hyphis pallidis, ramosis; sporis globosis, minute asperulis, 4-5 μ . diam., pedicello tenui, 10-14 μ . longo.

Hab. ad terram Massachusetts Amer. bor. (S. DAVIS et C. W. JENKS).

10. **Bovistella trachyspora** Lloyd, Myc. Not. n. 23 (1906) p. 287, f. 89. 1891

— Peridio atro, rubro-brunneo, globoso, minuto, 0,5-1 cm. diam., tenui, cortice spinulis sparsis fasciculatis minutis consperso, dein nudato; basi sterili nulla; gleba atro-brunnea; capillitii hyphis longis, ramosis, ramis intricatis, crispatis; sporis globosis, 5 μ . diam., tuberculatis, 10-12 μ . diam., tenui-pedicellatis

Hab. ad terram Maisur Indiæ or. (W. GOLLAN). — Præsertim sporis distincte tuberculatis dignoscenda species.

CATASTOMA Morg. — Syll. XI p. 165.

1. **Catastoma africanum** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. nat. 1892

(1909) n. 2, p. 86. — Globoso-depressum, 2-3 cm. latum, exoperidio fragili, brunneolo, tenui, inferne persistenti; endoperidio sub lente velutino, undique pallide-castaneo; ostiolo leviter prominulo; gleba pallide fusca; capillitio ex hyphis fuscidulis, levibus, 5 μ . latis, formato; sporis globosis, concoloribus, verruculosus, 4,5-5 μ .

Hab. ad terram, Baguirmi, Chari, Congo Africæ bor. — *Cat. circumscisso* affinis.

2. **Catastoma maculatum** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. nat. 1893

(1909) n. 2, p. 86. — Globoso-depressum, 2-3 cm. latum; exoperidio membranaceo, omnino discernibili, intus albido-fusco, extus villosulo; endoperidio sub lente velutino, papyraceo, castaneo, superne pallidiori; ostiolo plano orbiculari; peridio externo delapso, macula orbiculari cum ostiolo analogâ in peridio interno remanenti; gleba olivaceo-fusca; capillitio ex hyphis brunneolis, levibus, 4 μ . latis, formato; sporis globosis, concoloribus, sublevibus, papilla minuta auctis, 4-5 μ .

Hab. ad terram sabulosam, Baguirmi, Congo Africæ trop. — *C. circumscisso* affine sed distinctum.

3. **Catastoma pila** Long ap. R. E. Fries, *Disciseda pila* R. E. Fries, 1894

Arkiv för Bot. VIII, n. 11 (1909) Extr. p. 15, tab. IV, fig. 1-4, Cfr. Lloyd, Mycol. Notes, n. 33 (1909) p. 443, fig. 254. — Subglobosum vel paullo depressum, sessile, majusculum, 2,5-4 cm. diam.; peridio externo ad majorem partem secedente, basi solum fragmentarie plus minus persistente, arenoso; peridio interno suberoso elastico, 0,5 mm. crasso, levi, sordide umbrino-atro, apice ore rotundo v. elongato, vulgo 1-2 mm. diam., pertuso; capillitii floccis parce ramosis, spiraliter tortis, hyalinis, levibus, 2-

3 μ . diam. in fragmenta 75-150 μ . longa dilabentibus; sporis coacervatis viridi-olivaceis, singulis luce penetrante brunneis, globosis, verrucosis, 9-12 μ . diam., pedicello persistente, minutissimo, 2 μ . long, hyalino præditis.

Hab ad terram in prov. Jujuy Argentinae sept. (FRIES) et in Texas Amer. bor. (W. H. LONG). — Videretur *Bovista pila* sed capillitium *Catastomatis*.

LYCOPERDON Tourn. — Syll. VII p. 106, 476, IX p. 275, XI p. 165, XIV p. 263, XVI p. 241, XVII p. 229.

1. **Lycoperdon saccatum** Vahl — Syll. VII, p. 128 et 477. — *Cal-* 1895
vatia saccata (Vahl) Morg. — var. **capitatum** Hollós, *Gasteromyc.* Hung. (1904) p. 89, tab. XVI, fig. 11-13. — Peridio longo, anguste stipitato, capitato, sordide ochraceo, dein umbrino, minute aculeolato; gleba umbrina, parte sterili rhabarbarino-purpurascen- te; sporis flavo-brunneolis, globosis, verrucosis, 4-5 μ . diam., pedicellis hyalinis longis præditis; capillitio brunneolo, sporæ diametro angustiore, raro ramoso.

Hab. ad terram in Hungaria. — Var. **brevipes** Hollós, *Gasteromyc.* Hung. (1904) p. 89, tab. XVI, fig. 14-17 — Peridio rubro-brunneo, granuloso, 3-4 cm. lat, breviter stipitato, stipite 1-2 cm. long.; gleba umbrina, parte sterili rhabarbarina; sporis brunneolis, globosis, verrucosis, 4-5 μ . diam., nunc longe pedicellatis, nunc pedicellis evanescentibus. — Ad terram in Hungaria. — var. **pseudoflavescens** Hollós, *Gasteromyc.* p. 88, tab. XVI, fig. 18-21: peridio flavido-brunneo, 5-10 cm. alto, minute aculeato, parte fertili et sterili subæqualibus, stricturâ separatis, prima reniformi citrina dein olivacea, secunda rhabarbarina, elastica; sporis flavis, verrucosis minute pedicellatis, 4-6 μ . diam. — Ad terram in Hungaria. — var. **apiocarpum** (Hazsl.) Hollós, *Gasteromyc.* p. 88, tab. XVII, fig. 1-2; *L. saccatum* v. *apiocarpum* Hazsl., *Zool. bot. Ges.* XXIV, p. 224: habitus *Lycop. excipuliformis* gigantei, ad partis fertili- basim constrictis; sporis flavo-brunneolis, verrucosis, 4-5 μ . diam., initio hyalino-pedicellatis; capillitii floccis brunneolis, raro ramosis, diametro sporam æquantibus. — In silvis quercinis in Hungaria.

2. **Lycoperdon ostiolatum** Pat. et Har., *Bull. Soc. Mycol. Fr.*, XXII 1896 (1906) pag. 119. — Terrestris; subglobosum, 1-2 cm. diam., velo papyraceo-membranaceo, levi, fragili; peridio glabriusculo in sicco ochraceo-fusco, flaccido, deorsum subapplanato, sursum rotundato, apice ostiolo mammoso, transverse elongato, 5 mm. long., 1-2 mm.

lat., aperto; basi sterili nulla; gleba gossypina, olivacea; capillitio pallide olivaceo ex hyphis longissimis, parce ramosis, levibus 3 μ . cr.; sporis globosis, levibus, ecaudatis, olivaceis, 4 μ . diam.

Hab. ad terram in ins. Java (P. SERRE). — Species velo papyraceo et ostiolo prominenti transverse elongato prædistincta.

3. **Lycoperdon abscissum** R. E. Fries, Arkiv för Bot. VIII n. 11 1897 (1909) Extr. p. 8, tab. III; Lloyd, Mycolog. Not. 33 (1909) p. 442, fig. 252. — Peridio sessili, primo globoso, maturo semigloboso v. turbinato, supra plano, quasi abscisso, disco margine conspicuo a lateribus discreto, 1,5-2,5 cm. alto et 2-4 cm. diam., cortice rigide papyraceo, maturo levi, umbrino primo verrucis albidis spiniformibus apice stellatim connatis, in disco 1-1,5 mm. altis, in lateribus brevioribus, mox deciduis vestito; ore rotundo plano, 3-4 mm. diam.; parte sterili suberosa, lacunosa, subfuliginea, maximam partem peridii occupante, membrana subhorizontali a gleba fertili limitata; hac, in speciminibus maturis, disciformi 1-2 mm. cr.; capillitii floccis parce ramosis, coloratis, 3-6 μ . cr.; sporis globosis levibus, coacervatis fuligineis, 3,5-4,5 μ . diam.

an Lya. marginatum

Hab. ad terram in Boliviae austr. et Argentinae sept. pluribus locis.

4. **Lycoperdon separans** Peck, 26 Rep. 1872 (1874) p. 73; Lloyd, 1898 Photogr. tab. III; Morgan, Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. XIV (1891) tab. I, fig. 1, *L. Wrightii* var. *separans* Peck — Syll. VII, p. 111. — Subglobosum, sessile, 3-5 cm. lat., album, exoperidio verrucis pyramidatis substellatis dense consperso; verrucis inter se connexis et maturitate in membranæ formam secedentibus; capillitio et sporis atro-olivaceis, postremis globosis, levibus, 3,5-4 μ . diam.; floccis inæquilatis, parce ramosis, nonnullis sporas diametro subæquantibus.

Hab. ad terram in graminosis in Americæ borealis pluribus locis.

5. **Lycoperdon Bubakii** Bres., Fungi gall. in Ann. Myc. VI (1908) 1899 p. 46. — Peridio subgloboso vel obovato aut subturbinato, stipitato, albo, dein luride stramineo, in speciminibus exsiccatis glabro, cortice areolato-impressa, 1 1/2-2 cm. lato, 1 1/2 cm. alto; stipite deorsum attenuato, concolore, interdum subplicato, 5-7 mm. longo crassoque; gleba flava, dein olivaceo-umbrina; capillitio ex hyphis luteis, ramosis, crasse tunicatis, usque ad 9 μ . crassis conflato; basi sterili, non cellulosa, umbrina, inferne livido-tincta; sporis flavis, levibus, globosis vel subglobosis, 4-6 μ . diam. vel 5-6 \approx 4-5,

cauda filiformi, 10-18 μ . longa, constanter præditis; mycelio albo, parco, fibrilloso.

Hab. in pratis paludosis ad Bamo Jezero in Montenegro (Prof. Dr. BUBAK). — Forma et colore ad *Lycoperdon furfuraceum* accedit, a quo defectu veli manifesti, sporis caudatis et capillitio crassiori et tenaciori optime distinguitur. Forma sporarum caudata *Lycoperdon pedicellatum* Peck commemorat, sed aliis notis prorsus diversum.

6. **Lycoperdon mammosum** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. 1900
nat. (1909) n. 2, pag. 85. — Pusillum, 5-8 mm. altum, globoso-
ovoideum, in sicco albido-rufulum, leve, apice ostiolo mammiformi
centro regulariter pertuso donatum; basi sterili nulla; gleba rufa,
pulveracea; capillitio pallide rufidulo, 4-5 μ ., ex hyphis longissi-
mis flexuosis; sporis ovoideis levibus, fuscis, 6 \approx 4.

Hab. ad terram, Kaga Pangourou, Pays Balidja, Dar Banda,
Congo Africæ trop.

7. **Lycoperdon oubanguiense** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. 1901
nat. (1909) n. 2, p. 86. — Peridio turbinato, 15-30 mm. diam.,
superne rotundato, levi, inferne plicato-scrobiculato, in radicem
ramosam attenuato, papyraceo, velutino, albide ochraceo; velo sub-
membranaceo, fragili, dense aculeato; ostiolo apicali irregulariter
lacerato; gleba ochracea; capillitio ex hyphis longissimis, gracili-
bus, olivaceis, parce ramosis, 4-6 μ . cr.; sporis globosis, concolo-
ribus, verruculosus, 4 μ . cr.; basi sterili alba fere lacunosa.

Hab. ad terram, Oubangui infra Haute Tomi et Haute Ourbella.

8. **Lycoperdon todayense** Copeland, Ann. Mycol, III (1905) p. 25. — 1902
Peridio obovato vel piriformi, 1-2 cm. lato, deorsum plicato, levi,
sursum verruculis vel floccis aquose hyalinis, deciduis vestito, de-
nique minute subtiliterque areolato, albido-flavescente, osculo api-
cali dehiscente; gleba fertili a basi sterili cellulari discretissima;
sporis concoloribus, globosis, levibus, 3,5-4 μ . diam.; capillitio ru-
dimentali, irregulari, crasso.

Hab. ad terram sub Musa sp. cæspitosum, Todaya, Davao, in
insul. Mindanao Philippinensium.

9. **Lycoperdon chilense** Speg, Fungi Chilenses (1910) pag 12. — 1903
Mediocre, turbinatum, 5-8 cm. alto, 4-6 cm. diam., primo leve al-
bum mox superne frustulatim irregulariterque dehiscent, gleba
gossypino-pulverulenta compactiuscula pulchre lilacina cum basi
sterili cinnamomea, superne grosse celluloso-alveolata inferne com-
pactiuscula v. minutissime spongiosula continua, floccis tenuibus,

fumosis, levibus, 3,5-4 μ . cr.; sporis globosis minutis levissimis, ecaudatis, grosse uniguttulatis, 3,75-4,50 μ . diam.

Hab. ad terram in collibus infra Viticura et Salto Amer. austr.

— *Lyc. lilacino* (Mont.) Speg. affine.

10. **Lycoperdon rimulatum** Peck in Morgan, Journ. Cincinnati Soc. 1904 Hist. Nat. XIV (1891) tab. I, fig. 6; Hollós, Gasteromyc. Hung. tab. 18, fig. 36-38; Lloyd, Mycol. Not. t. 56, fig. 1-9; Trelease, Trans. Wisc. Ac. of Sc. VII (1888) tab. IX, fig. 3. — Peridio depresso-globoso v. late abovoideo, basi plicato et albo-radiculoso, cortice tenui, levi, continuo dein reticulatim rimuloso, demum secedente et endoperidium leve e griseo purpureo-brunneum relinquente; basi sterili quartam peridii partem occupante, supra plana; gleba demum brunneo-purpurea; capillitii concoloris floccis subsimplicibus, inæquicrassis, sed sporæ diametro angustioribus; sporis globosis, distincte verrucosis, 6-7 μ . diam., sæpe pedicellatis, purpureo-brunneolis.

Hab. ad terram, Preston Ohio et Madison Wis. Amer. bor.

11. **Lycoperdon piriforme** Schæff. — Syll. VII, pag. 117 et 480. — 1905 var. **usambarense** Eichelb., Verh. Naturw. Ver. Hamburg, 3. Flge., XIV (1906) p. 90. — Peridio deorsum in stipitem conicum brevem albo-radiculosum tenuato, 2 cm. alt., 1,5 cm. cr., flavo-albido, sursum minute nigro-squamuloso, deorsum albido-aculeolato, basi sterili albida, medio in columellam minutam elevata; gleba roseo-viridula; sporis levibus, 4-4,5 μ . diam., sæpe pedicello 10-13 μ . longo munitis.

Hab. ad caudices (?) Amani Africæ orient. (ELSA BRAUNE).

12. **Lycoperdon sphærale** Lév. in herb. Mus. Paris., Hariot C. R. 1906 Ass. franc. Avanc. Sc. (1901) p. 451, Petri, Fl. it. crypt. Gaster. (1909) p. 58. — Globosum, sessile, radice unica suffultum; exoperidio albo, verrucoso, verrucis minutis, confertis, subfloccosis, basi divisus apice coalitis obtecto, capillitio purpureo fusciscenti; sporis globosis, concoloribus, valde verrucosis, 6 μ . diam.

Hab. ad terram in Corsica (BOULLOU). — An affine v. var. *L. atropurpurei*?

13. **Lycoperdon Desmazierii** Lloyd, Mycol. Not. n. 19-20 (1905) p. 213 1907 et p. 230, tab. 49, fig. 1-4. — *Lyc. piriformi* affine a quo differt forma elongata, cylindræa, basi sterili.

Hab. ad terram in Europa et Amer. bor.

14. **Lycoperdon subpratense** Lloyd, Mycolog. Notes n. 20 (1905) p. 231, 1908 tab. 62, fig. 1-7; Mycolog. Notes n. 23 (1906) pag. 288. — De-

presse globosum, suburceolatum; cortice primum spinuloso, spinulis 2 mm. circ. longis dein sæpe secedentibus; peridio demum late aperto; basi sterili lata et a parte fertili distincte separabili; gleba primum olivacea dein brunnea; capillitio colorato, fibrillis ramosis prædito; sporis globosis, levibus, 4 μ . diam.

Hab. ad terram Amer. bor. — A *Lyc. pratensi* differt præcipue capillitio colorato.

15. **Lycoperdon coprophilum** Lloyd, Lycoperd. Australia p. 34, f. 37. 1909 — Subglobosum, basi filamentis mycelialibus radiciformibus præditum, cortice spinulis rigidis scabriusculis prædito; basi sterili nulla; gleba obscura subpurpurascenti; sporis parvis 4 μ . diam., apiculatis, subrugosis.

Hab. in fimo vaccino, Brisbane Australia.

16. **Lycoperdon compressum** Lloyd, Myc. Notes n. 20 (1905) p. 236, 1910 tab. 66, fig. 5-8. — Subglobosum, flavidum, cæspitosum et compressum; cortice spinuloso, subfurfuraceo; gleba olivacea dein brunnea; sporis 5 μ . diam., levibus v. maturis rugulosis.

Hab. ad terram Americæ borealis. — *Lycoperdon umbrino* affine.

17. **Lycoperdon cupricolor** Lloyd, Mycol. Notes n. 22 (1906) p. 265. 1911 — A *Lycop. piriformi* videtur tantum differre colore cupreo metallico.

Hab. ad terram in Dania (R. P. BREITUNG).

18. **Lycoperdon macrogemmatum** Lloyd, Mycol. Notes n. 22 (1906) 1912 p. 265, fig. 102-104. — A *Lyc. gemmato* recedit verrucis multo crassioribus et longioribus, sporisque majoribus et magis verrucosis.

Hab. ad terram in Bavaria (Doct. HARZ).

19. **Lycoperdon turbinatum** Lloyd, Mycol. Notes n. 22 (1906) p. 265, 1913 fig. 100 et 101. — A *Lycop. gemmato* mox distinguitur forma exquisite turbinata seu obconica peridii.

Hab. ad terram, Wales Britannicæ. — Ex icone fungus 5 cm. alt., 4 cm. superne lat.

20. **Lycoperdon septimum** Lloyd, Mycol. Notes n. 24 (1906) p. 307, 1914 fig. 142-143. — Peridio subgloboso, radice robusta nigricante prædito; cortice tenui, stellato, atro, spinulis nodulosis consperso, basi sterili nulla; gleba umbrino-purpurea; capillitio saturate colorato; sporis globosis, levibus, 4-5 μ . diam., pedicellis intermixtis.

Hab. ad terram Quito Æquatoricæ (L. MILLE S. J.).

21. **Lycoperdon delicatum** Lloyd, Mycol. Not. n. 19 (1905) p. 209, 1915 tab. 44, fig. 1, non Berk. et Curt. nec Berk. in Hook. — A *L.*

atro-purpureo dignoscitur peridio globoso-depresso, exoperidio granuloso-furfuraceo, non cruciato-spinuloso.

Hab. ad terram in Lusitania (C. TORREND). — Cum *Lyc. umbrino* sistit potius subspecies *Lycop. atro-purpurei*, ut habet ipse Lloyd.

22. **Lycoperdon stellare** (Peck) Lloyd, Mycolog. Notes n. 20 (1905) 1916 pag. 225, tab. 57, fig. 7-10, *Lycop. atro-purpureum* var. *stellare* Peck. — A *Lycop. atro-purpureo* differt spinulis præcipue ad basim crassioribus.

Hab. ad terram in Europa ed Amer. bor.

23. **Lycoperdon subvelatum** Lloyd, Mycolog. Notes n. 20 (1905) p. 224, 1917 tab. 56, fig. 10-11; Mycolog. Notes n. 22 (1906) p. 274. — Subglobosum; exoperidio stellatim diffracto; gleba subpurpurascens.

Hab. ad terram, Florida Amer. bor. et probabiliter in Europa. — *Lycop. velato* europæo affine, a quo differt basi magis evoluta, cortice crassiori et exoperidio magis distincto.

24. **Lycoperdon tessellatum** Lloyd, Mycol. Not. n. 20 (1905) p. 230, 1918 t. 50. — A typico *Lycop. piriformi* distinguitur corticis verrucis in areolas induratas conjunctim secedentibus.

Hab. a caudices, Minnesota, Missouri, Massachusetts, Indiana, Nebraska, Amer. bor.

25. **Lycoperdon faveolum** Lloyd, Mycol. Notes n. 20 (1905) p. 230, 1919 tab. 61, fig. 4. — *Lycop. piriformi* affine sed differt superficie foveis latiusculis exarata (an abnormiter?).

Hab. ad terram, Michigan Amer. bor. (O. LONGYEAR).

26. **Lycoperdon excoriatum** Lloyd, Mycol. Not. n. 20 (1905) p. 229, 1920 tab. 60, fig. 1-4. — A *Lycop. cruciato*, cui accedit verrucis conjunctim in crustas secedentibus, differt peridio, post excoriationem omnino levigato, nec cicatricato.

Hab. ad terram in Amer. bor. variis locis.

27. **Lycoperdon floccosum** Lloyd, Mycol. Not. n. 20 (1905) p. 226, 1921 tab. 59, fig. 1-4. — *Lycop. umbrino* affine a quo differt spinulis mollibus flocculosis, albis, parcis.

Hab. ad terram in Amer. bor. pluribus locis. — *Lycop. velato* quoque affine.

28. **Lycoperdon polytrichum** Lloyd, Mycol. Not. n. 20 (1905) p. 237, 1922 tab. 67, fig. 6-10. — Peridio longe stipitato; peridio subgloboso in stipitem sensim tenuato, 2-2,5 cm. cr.; stipite cylindræo 2,5 cm. longo. 6-8 mm. cr.; sporis plerumque levibus sed maturis minutissime rugulosis.

Hab. ad terram inter muscos in Amer. bor. pluribus locis. — *Lycop. muscorum* affine, a quo differt etiam stipite longiore et habitu.

29. **Lycoperdon stipitatum** Bonjean in litt. (non Retz.) Colla Herb. 1923
Ped. VII, p. 287, n. 10; est *Tylostoma* sp. Cfr. Petri, Fl. it. crypt. Gasterales (1909) p. 58.

30. **Lycoperdon Ulmi** Bell., Oss. Bot. p. 59, App. p. 76; Colla Herb. 1924
Ped. VII, p. 287, n. 9. — Acaule, album, ore perforato crenulato.

Hab. ad corticem Ulmi, Augustæ Taurinorum. — Sec. Petri, Fl. it. crypt. Gasterales (1909) p. 58, est verisimiliter species *Lycogalactis* v. *Myxomycetis* alius.

SCLERODERMA Pers. — Syll. VII p. 134, 489, IX p. 278, XI p. 167, XIV p. 266, XVI p. 244, XVII p. 235.

1. **Scleroderma leptopodium** Pat. et Har., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXIV 1925
(1908) p. 14. — Stipitatum, stipite recto, cylindraco, glabro, 3 cm. longo, vix 5 mm. cr., undique æquali, ochraceo, in acetabulo peridii insidenti; peridio tenui, globoso 3 cm. diam., inferne depresso-umbilicato, superne rotundato, undique minute verrucoso, pallide ochraceo, verrucis saturatoribus, irregulariter apice dehiscente; gleba umbrino-olivacea; sporis globosis, echinulatis, brunneis, 7-10 μ . latis; dissepimentis maturitate obsoletis.

Hab. ad terram, Oubangui, Fort-de-Possel (A. CHEVALIER). — *Scler. umbrino* affine, peridio tota superficie verruculoso distincta.

2. **Scleroderma tuberoideum** Speg, Anal. Mus. Nac. Buenos Aires 1926
XVI (1906) p. 28. — Euscleroderma, subhypogenum, solitarium v. sæpius 3-7 gregarium, globosum vel ovatum, 20-60 mm., fulvo-ferrugineum, leve, primum clausum, serius parte exerta irregulariter frustulatim disruptum; gleba compacta carnosae ex atro-violascente nigra, albo-marmorata; sporis sphaeroideis dens verrucosis confertissimis opacis, 14-15 μ . diam.

Hab. frequens inter radices Eucalypti globuli circa La Plata Reip. Argentinæ. — Sp. *Scl. vulgari* affinis vegetatione hypogæa, cortice tenuiori minusque rigido sporisque majoribus distincta.

3. **Scleroderma ambiguum** Petri, Fl. ital. crypt. Gasterales (1909) 1927
pag. 101. — Globosum, sessile, 2 cm. circ. cr.; peridio incrassato, coriaceo v. sublignoso, superficie rugulosa, sublevi, maturitate fuliginea; gleba atro-purpurea e floccis albo-marmorata, sporis globosis, albis, membrana gelatinosa, nigra, opaca cinctis; absque

membrana dilute fuligineis, minutissime echinulatis, 12-15 μ . diam. (18-21 μ . cum membrana); capillitio subnullo.

Hab. ad terram Longobardiæ (VITTADINI).

4. **Scleroderma patens** Lloyd, Mycol. Notes n. 22 (1906) pag. 275, 1928 fig. 122-123. — Inter *Sclerod. vulgare* et *Sclerod. Geasterem* fere medium, primi habet structuram squamulasque corticis, postremi dehiscenciam stellatam per lacinias subquinas.

Hab. ad terram in ins. Mauritio Oceani Indici (O' COONOR). — Est potius var. *Scl. vulgaris*; structura enim a *Scl. Geastere* omnino diversa.

5. **Scleroderma radicans** Lloyd, Mycol. Not. n. 21 (1906) pag. 246, 1929 f. 88. — Longe stipitato-radicatum; peridio globoso levigato, firmo, pallide colorato; gleba cyaneo-nigricanti; radice crassa, deorsum tenuata, vagina peculiari myceliali pannosa obtecta; sporis globosis, 12-14 μ . diam., echinulatis, hyphis intermixtis.

Hab. in ligno putri cavo semicombusto, prope fl. Wimmera Australiæ (F. M. READER).

CORDITUBERA P. Henn. — Syll. XIV p. 266.

1. **Corditubera microspora** v. Höhnelt, Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien 1930 CXVII (1908) Abt. I, pag. 1019 fig. 3. — Ascomate 21-23 mm. lat., 10-15 mm. cr., tuberiformi, impresso; carne sordide flavida, venis e media basi reticulatim prodeuntibus anastomosantibus basique pseudocolumellam formantibus; contextu ex hyphis hyalinis 2-3 μ . cr., hinc inde inflato-vesiculosus formato; cortice 0,5-0,7 mm. cr.; nucleis fertilibus rotundato-polygonis 200-600 μ . diam.; basidiis brevibus, 5-6 μ . long.; sporis 5-6 in quoque basidio acrogenis, e hyalino flavidulis, globosis 3,5-5 μ . diam., pedicello 1,5-3 μ . longo, præditis, levibus dein muriculato-punctatis.

Hab. ad terram in insula Java. — Diagnosis more solito desideratur in cujus loco adest accurata sed perlonga descriptio, quam cfr.

PELLORINA Berk. — Syll. VII p. 145, IX p. 279, XI p. 167, XIV p. 267, XVII p. 239.

1. **Phellorina argentinensis** (Speg.) R. E. Fries, Arkiv för Bot. VIII, 1931 n. 11 (1909) Extr. p. 25, tab. IV, fig. 5-6, *Cypellomyces argentinensis* Spegazz., Ann. Mus. Nac. Buenos Aires, XVI (1906) p. 25, cum icon. — Peridio exteriori albo, volviformi, interiori avellaneo breve pedicellato primum obovato depresso, dein substellatim de-

hiscente, 10-20 mm. diam.; gleba subpulverulenta sublateritia; sporangiolis minimis e capillitio subhyalino efformatis, 30-50 μ . diam.; sporis parvis minute laxequae papillosis, fulvellis 6-7 μ . diam.; basidiis primariis obovatis 15 \times 10, minute 3-4-papillatis, secundariis globosis, 8-10 μ . diam. etiam 3-6 papillulatis.

Hab. ad terram in collinis præandinis aridissimis saxosis subsalsis, loco Los Berros vocato prope San Juan (SPEGAZZINI) et in prov. Jujuy Argentinae (R. E. FRIES). — Totus fungus 8-9 cm. alt., perid. 2.5 cm. cr., stipes 6-7 mm. cr. Observante cl. R. E. Fries species a genere *Phellorina* non separanda.

WHETSTONIA Lloyd, Mycol. Notes n. 22 (1906) p. 270 (Etym. a cl. Doct. MARIA S. WHETSTONE, mycologiae cultrice). — Peridium stipitatum, a stipite membranâ distinctâ separatum. Gleba ex sporis in cellis, seu loculis persistentibus inclusa, globosa, continua. Capillitium nullum. Basidia aggregata v. racemosa, persistentia.

1. **Whetstonia strobiliformis** Lloyd, l. c. p. 270, tab. 90, f. 1-5. — 1932
Peridio irregulariter, depresso globoso, cortice in squamas crassas, majusculas angulosas diffracto; squamis ad stipitis apicem coronam formantibus; gleba pluriloculari, rubiginosa, sepimentibus tenuibus flaccidis, demum evanescentibus; sporis globosis, crasse verrucosis 5-7 μ . diam.; basidiis racemoso-aggregatis; stipite crasso, supra tereti, deorsum bulboso firmo, sublignoso, demum cavo extus rugoso-squamuloso.

Hab. ad terram, Minnesota Amer. bor. (Doct. MARIA WHETSTONE). — Fungus grandis, ex icone 10 cm. alt.; perid. 4-5 cm. diam., stipes basi 5-6 cm. cr., superne 2,7 cm.

POLYSACCUM DC. — Syll. VII p. 146, 490, IX p. 280, XI p. 167, XVII p. 237.

1. **Polysaccum Kisslingi** (E. Fisch.) Sacc. et Trott. *Pisolithus Kisslingi* Ed. Fisch., Mitteil. naturf. Ges. Bern. (1906) Extr. p. 10. — 1933
Peridio longe stipitato, stipite sæpe curvato, cylindræo, 12 cm. long., c. 2 cm. cr., basi terra infosso, deorsum leviter compresso, flavo-brunneo, fibroso-squamoso, carnosolento; peridio (tantum ejus basi observata) levigato, subinæquali, flavido pluri-loculato, loculis 1-1,5 mm. diam., sepimentis flavis, senio nigricantibus; sporis loculos implentibus globosis, minute verrucosis, 8-9 μ . diam., rarius ad 6 v. 10 μ . variantibus, brunneo-ochraceis.

Hab. ad terram in silvis primigeniis in ins. Sumatra. — Ex

auct. certe *Pisolithi* sp., sed in exemplari peridii pars superior omnino elapsa.

2. **Polysaccum Boudieri** Lloyd, Mycol. Notes n. 17 (1904) pag. 184, 1934 fig. 76. — Ovato-ellipsoideum, oblongatum 8 cm. alt., 3,5 cm. cr., in stipitem teretem 8 mm. crassum, sensim tenuatum, peridio bi-stratoso, strato externo frustatim secedente; peridiolorum sepi-mentis ex hyphis hyalinis gossypinis formatis; sporis globosis, asperulis, 8-10 μ . diam. coloratis.

Hab. ad terram in insula Corsica (comm. E. BOUDIER). — Præcipue forma verticaliter oblongata videtur distincta species.

ARACHNION Schw. — Syll. VII p. 150, XI p. 168.

1. **Arachnion fœtens** Speg., Anal. Mus. Nac. Buenos Ayres XVI 1935 (1906) p. 28. — Subterraneum, fœtidum, subglobosum, albidum, glabrum vix radicum; peridio molli tenacello a gleba plane discreto; gleba glauco-cinerea subcarnosula sporangiolis coalescentibus minutis efformato; sporangiolis 150-200 μ . diam., elliptico-diformibus, ægre secedentibus; sporis globosis e mutue pressione obsolete angulosis, 5-6 μ . diam. minute papillulosis, fumosis, grosse 1-guttulatis.

Hab. in humo ad radices *Macluræ Moræ* in silva primæva secus Rio Pescado, Orán, Jujui, Reip. Argentinae. — Vegetatione hypogæa sporangiolisque non discretis a genere satis recedens et facile inter *Sclerodermata* recensenda.

2. **Arachnion rufum** Lloyd, Mycolog. Notes, tab. 73, fig. 4; Mycolog. 1936 Notes n. 21 (1906) p. 250 et 254, fig. 93. — Peridio tenaci, obscure rubro-brunneo, superficie rugosa, ovoideo apice acutato; gleba brunnea, ex peridiolis irregularibus, minutis, granulosis e sporarum massulis potius constitutis; loculis evanidis; sporis globosis, levibus, 5-6 μ . diam. pedicellatis; capillitii hyphis parcissimis.

Hab. ad terram in Australia (Mc. ALPINE). — Ab *Arachnio albo* peridiolis parum distinctis, peridio crassiori, rufo-brunneo distinguitur.

HOLOCOTYLON Lloyd, Mycol. Notes n. 21 (1906) p. 254, fig. 94-95 (Etym. *holos* totus, *cotyle* poculum). — Peridium tenue, fragile, irregulariter erumpens; basi sterili nulla. Gleba e massarum cellis v. loculis confluentibus irregulariter limitatis constituta. Capillitium nullum. Sporæ plerumque pedicellatæ. — Gen. *Arachnio* affine sed glabæ structura prædistinctum.

1. **Holocotylon Brandegeeanum** Lloyd, Mycol. Notes n. 21 (1906) p. 254, 1937 tab. 73, fig. 5-7. — Peridio globoso tenui et fragili, flavo, irregulariter erumpente; gleba obscure brunnea; sporis globosis, levibus, plerumque 5-6 μ . diam., pedicellatis.

Hab. ad terram San Diego California et Culiacan Mexico (T. S. BRANDEGEE).

2. **Holocotylon texense** Lloyd, Mycol. Notes n. 21 (1906) pag. 255, 1938 fig. 96, tab. 73, fig. 8; n. 22 (1906) p. 271, fig. 112-113. — Peridio globoso, tenui et fragili, albo, irregulariter erumpente; gleba brunnea; sporis globosis, levibus, plerumque 4-5 μ . diam. pedicellatis.

Hab. ad terram Huntsville Texas Amer. bor. (J. W. STILES).

— Habitus *Arachni albi* sed differt colore et glebæ structura; ab

Hol. Brandegeano differt statura multo minori et peridio albo nec flavo.

GYROPHRAGMIUM Mont. — Syll. VII p. 57, XI p. 157, XVI p. 230.

1. **Gyrophragmium italicum** Petri, Fl. ital. crypt. Gasterales (1909) 1939 pag. 28. — Peridio hemisphærico, parve umbonato, albido-rubiginoso, ad ambitum levi, subfatiscente 5-6 cm. lato; stipite suberoso-lignoso, superne crassiore nec striato, 15-20 cm. longo, 2-2,5 cm. cr., squamis utrinque vestito septis subferrugineis, 25-30 μ . latis, fibrosis; sporis globosis, ferrugineis, levibus, uniguttulatis, 5 μ . diam.

Hab. ad terram, Margherita di Savoia prope Foggia (A. FIORI).

Fam. 4. Hymenogastraceæ

LYCOGALOPSIS Fisch. — Syll. VII p. 153, XVII p. 242.

1. **Lycogalopsis africana** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. 1910 (1909) n. 2, p. 86 — Peridio albido, globoso, 3-6 mm. lato, farinaceo, astomo, demum irregulariter rupto, e mycelio superficiali concolori, membranaceo, plus minus evoluto, nascenti; gleba pallide ochracea, filamentis capillitii hyalinis, tenuissimis, gregariis, erectis percursa; sporis globosis v. ovoideis, levibus, pallidis, 2 μ . circ. latis.

Hab. in ligno corrupto gregaria, Haut Oubangui, Fort Sibut Congo, Africae bor. — *L. Dussii* valde affinis.

HYSTERANGIUM Vitt. — Syll. VII p. 155 et 491, IX p. 281, XI p. 168, XVI p. 245.

1. **Hysterangium Gardneri** Ed. Fisch., Botan. Ztg. (1908) p. 164, t. VI 1941 fig. 19. — Irregulariter tuberosum, superficie umbrinum; peridio non divisibili, crasso; strato exteriori ex hyphis crassis dense implexis constructo, interiore gelatinoso et glebæ septis dilatatis constante; gleba æruginea, venis externis ex exteriori peridii strato orientibus perducta; glebæ lacunis et septis angustissimis; sporis oblongis, 10-11 \approx 3-4.

Hab. ad terram sub Pinu radiata, Berkeley California Amer. bor. (N. L. GARDNER).

2. **Hysterangium stoloniferum** Tul. — Syll. VII, p. 157. — var. **mutabile** Bucholtz, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou (1907) n. 4, p. 467. — A typo differt imprimis peridio per ætatem et tactu ex albo in griseo-rubentem se tingente et gleba ex viridi in olivaceum abeunte; sporis 21-23 \approx 6-7.

Hab. sub Tiliis, Michailowskoje Rossiaë.

HYDNANGIUM Wallr. — Syll. VII p. 175, IX p. 280, XI p. 172, XVI p. 255.

1. **Hydnangium pila** Patouill., Bull. Soc. Mycol. Fr. (1910) p. 201, 1943 fig. 2 (p. 202). — Globosum, colliculosum, basi depressum, album, aëre rufescens, 2-3 cm. diam.; peridio continuo, inferne tantum perforato lacunoso, puberulo; trama densa, tenaci a gleba seceribili; gleba firma, alba, dein rufidula, tota ex cavitatibus minutis, sinuosis, subæqualibus formata; basi sterili nulla, sepimentis hinc ex hyphis filiformibus illinc ex cellulis isodiametricis formatis; basidiis clavatis, obtusis deorsum fere abrupte tenuatis, 30-45 \approx 15-20, tetrasterigmaticis; sporis ex hyalino pallide fulvis, rotundatis vel subellipsoideis, 10-12 μ . diam. vel 10-14 \approx 9-11, minute acuteque muriculatis, intus crasse 1-guttatis.

Hab. semihypogæum in quercetis, Jura Galliaë. — Accedit ad *Hydn. galathejum*.

HYMENOASTER Vitt. — Syll. VII p. 168 et 491, IX p. 281, XI p. 170, XVI p. 252, XVII p. 239.

1. **Hymenogaster javanicus** v. Höhnel, Sitzb. k. Ak. d. Wiss. Wien 1914 CXVII, I, (1908) p. 1018. — Peridio carnosofirmo, extus flavo-ochraceo, intus theobromino, subgloboso, basi subdepresso, fasciculo myceliali subconico, subcarnoso, 2,5 mm. lato, 1,5 mm. long.,

medio prædito, 9 mm. lat., 7,5 mm. alt., odore subrancido; loculis 350-400 μ . diam., bistratosis; gleba ex loculis oblongis, irregularibus 1-2 mm. long., 0,4 mm. lat., sepimentis usque ad 120 μ . crassis, divisis; basidiis cylindræis, 26-28 \times 10-14, loculorum parietem intern. obducentibus, monosporis; sterigmatibus filiformibus 20 \times 4; sporis sublimoniformibus, apice breve papillatis, basi truncatis, 17-18 \times 10-12, specie asperulo-granulosis, hyalinis.

Hab. ad terram humosam silvarum pr. Tjibodas in ins. Java. — *Hymenog. Bulliardi* forte affinis.

2. **Hymenogaster anomalus** Peck, New York State Mus. Bull. (1907) 1945 n. 116, pag. 31. — Peridio tenui, subgloboso, 18-24 mm. diam., glabro, parce lacunoso, sæpe basi filamento radiciformi mycelii prædito, albido, subinde rubro-tincto, intus albo et celluloso, cellulis 1-2 mm. diam.; basi sterili fere obsoleta; odore subnullo; sporis globosis v. late ellipsoideis, levibus, hyalinis, 1-nucleatis, 10-13 \times 9-12.

Hab. ad terram pr. Washington Amer. bor. — Affinis *Hymenogasteri Thwaitesii*.

3. **Hymenogaster Pumilionum** A. Ade, in Mitt. Bayer. Bot. Gesell. II, 1946 n. 13 (1909) p. 219 cum icone. — Receptaculo globoso v. depresso globoso, 1,5-2 cm. diam.; peridio simplici, ad 1 mm. cr., a gleba vix separabili, extus leviter granuloso, hyphis teneris circumtexto, luteo-rubenti, intus fuscescenti; gleba tenaciter viscoso-carnosa, molli, primum albescenti dein luteo-fuscescente, basi sterili, cellis angustis, irregulariter labyrinthiformi-contortis, sporis repletis, lumine 0,1-0,3 mm., centrum versus ampliore; sepimentis 0,1-0,5 mm. cr.; sporis tereti-ellipsoideis, utrinque obtusis, 7-9 \times 3, lutescentibus; basidiis 5-6 \times 3-4; sterigmatibus 1,5 \times 1; odore fungi fere nullo.

Hab. ad terram humosam inter radices *Rhododendri ferruginei* et *Pini montanæ* in regione Mughli in Algovia. — Nonnullis notis ad *Hysterangium Marchii* Bres. et ad *Rhizopogonem rubescentem* nutat. Ulterius inquirenda species.

USTILAGINACEÆ Tul.

Syll. VII p. 449, IX p. 282, XI p. 330, XIV p. 410, XVI p. 367, XVII p. 472.

Subfam. Ustilagineæ *)

USTILAGO Pers. — Syll. VII p. 451, IX p. 282, XI p. 230, XIV p. 410, XVI p. 367, XVII p. 472.

1. **Ustilago violacea** (Pers.) Fuck. — Syll. VII, p. 474. — f. **Salviæ** 1947 Ferraris, Reliq. Ces. in An. R. Ist. bot. Roma IX, fasc. 3 (1902) pag. 190. — Sporidiis obscurioribus, violaceis, fortiter reticulatis, globosis, 12-14,5 v. 16 \approx 14.

Hab. in staminibus *Salviæ pratensis*, Alpi Valdesi, Italia bor. (ROSTAN).

2. **Ustilago Claytoniæ** Shear, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 1948 p. 317. — Soris in ovariis inclusis, massam obscure purpureo-vinoso coloratam efformantibus; sporis purpureis, plerumque sphaeroideis, v. subsphaeroideis, 11-16 μ . diam., costato-reticulatis; costis 1-2 μ . lat., 2,5 μ . altis.

Hab. in floribus *Claytoniæ linearis*, Vancouver Barracks Washington Amer. bor. (T. E. WILCOX). — Ab *Ustilagine Calandrinæ* et *Sorosporio Monticæ* diversa.

3. **Ustilago calandrinicola** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 1949 (1909) p. 287. — Floribus infectis parum mutatis, antheris, rarius ovariis, sæpius incrassatis mox irregulariter dehiscentibus atque pulverem obscure violascentem ostendentibus; sporis dense consti-

*) Conferendæ egregiæ et perutiles monographiæ cl. D. MAC ALPINE, *The Smuts of Australia, their structure, life history, treatment and classification* Melbourne, 1910, tabulis perspicuis LVI phototypicis exornata et cl. H. C. SCHELLENBERG, *Die Brandpilze der Schweiz* Bern, 1911, optimis quoque figuris ornata, nec non G. P. CLINTON in North Amer. Fl. vol. VII [1906] (*Ustilag.*). Opera de *Ustilagineis* ejusdem priora jam laudavimus (Syll. XVII, p. 472).

patris 6-8 μ . diam., laxe majusculaque subspinulosis, non areolatis, grosse 1-guttulatis, pallide fumoso-violascentibus.

Hab. in floribus *Calandrinia* affinis in collibus Neuquen Amer. austr. — Ab *U. Calandriniae* Clint., sporis 2-3-plove minoribus non areolatis recedere videtur.

4. **Ustilago albida** Bubák, Bull. Herb. Boiss. 2 ser., VI (1906) p. 394. 1950
— Soris albidis, antheras omnes inficientibus; sporis globosis vel globoso-ovoideis, 3-4,5 μ . diam., levibus, hyalinis.

Hab. in antheris florum *Genista* spathulatæ, Liesanska nahija Montenegro. — Specimina non prorsus matura, sed de genere cl. Auct. non dubitat.

5. **Ustilago punctata** Clint., North Amer. Fl. VII, Pt. I, pag. 23. — 1951
Soris in inflorescentia tota plus vel minus evolutis vel in floribus singulis, bracteis floralibus cinctis, rarius in foliis floralibus pustulas generantibus; massa sporarum pulveracea, atro-purpurea; sporis maturis atro-purpureis, subirregularibus, subconglomeratis, ex ovoideo sphæroideis quandoque subcompressis et irregulariter elongatis, apparenter levibus sed fortiter microscopio auctis minute punctato-reticulatis, 13-17 raro usque ad 19 μ .

Hab. in inflorescentia *Polygoni* sp. Newberry, Washington Amer. bor.

6. **Ustilago inflorescentiæ** (Trel.) Maire, Œsterr. Bot. Ztschr. LVII 1952 (1907) p. 273. — Ita vocanda, teste Maire, *Ustilago Bistortarum* DC. var. *inflorescentiæ* Trel. — Syll. XVII, p. 473.

7. **Ustilago Nawaschini** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 1953 p. 349. — Soris in floribus deformatis evolutis, flavo-aurantiacis; sporis globosis, tenui-tunicatis, pallide flavis 13-16 μ . cr., minute punctulatis; facile germinantibus; probasidio cylindræo, hyalino usque ad 3 μ . cr., 50-80 μ . longo, in 2-4 cellulas diviso; sporidiolis globosis, levibus, 2,5 μ . cr., plerumque e quoque cellula subquaternatis.

Hab. in floribus *Pollia* sp. (Commelinaceæ) in Buitenzorg Java (S. NAWASCHIN). — Quandoque promycelia ramosa adsunt.

8. **Ustilago Albucæ** Syd., Deutsche Zentr.-Afrika Exped. (1907-1908) 1954 Bd. II, p. 94. — Soris in ovariis et antheris evolutis, atro-brunneis, pulverulentis: sporis subglobosis, ellipsoideis v. oblongis, minute verruculosis, flavo-brunneolis, 9-16 \approx 7-12.

Hab. in antheris et ovariis *Albucæ*, Ruanda Africae trop.

9. **Ustilago Fimbristylis-miliaceæ** P. Henn., Engl. Bot. Jahrb. XXXVII 1955 (1905) p. 156. — Soris ovariiculis deformantibus, subcorniformibus,

membrana rufa vestitis, c. 1,5-2 mm. longis, usque ad 300 μ . cr.; sporis subgloboso-angulatis, 8-13 \approx 8-11, episporio flavo-brunneo, levi.

Hab. in ovariis *Fimbristylis miliaceæ*, prov. Kozuke et Iwaki Japoniæ (S. KUSANO).

10. **Ustilago Royleani** Syd. et Butl., Ann. Mycol. IV (1906) p. 426. 1956
— Soris in rhachidibus evolutis easque deformantibus, pulverulentis, atris; sporis globosis v. subglobosis, breviter echinulatis, olivaceo-brunneis, 11-14 \approx 9-12.

Hab. in spicis *Paspali Royleani*, Dehra Dun, Indiæ or. (E. J. BUTLER).

11. **Ustilago Rottboelliæ** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 486. 1957
— Soris in rachidibus floribusque evolutis, eos deformantibus, atris, pulverulentis; sporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, levibus, dilute brunneis, 6-8 μ . diam.

Hab. in spicis *Rottboelliæ compressæ*, Pusa Indiæ (E. J. BUTLER).

12. **Ustilago Readeri** Sydow ap. Mc. Alp. Smuts Austr. (1910) p. 159, 1958
tab. XVIII, XXXI, LIII. — Soris culmi-folii-ovariiculis, nigris, pulverulentis, plerumque inflorescentias totas destruentibus, initio in vaginis foliorum inclusis, dein in ovariis, demum erumpentibus; sporis globosis v. ellipsoideis, primo obtutu levibus, sed delicate echinulatis, 10-13 μ . diam. v. 10-14 \approx 8-11, demum dispersis et rhachidem nudam v. glumis tantum præditam relinquentibus.

Hab. in culmis, foliis, vaginis ovariisque *Danthoniæ penicillatæ* et *Danthoniæ spec.* in Australiæ pluribus locis. — Cum *Ust. Danthoniæ* non comparanda.

13. **Ustilago Pappiana** Bacc., Funghi d. Eritrea, Ann. di Bot. IV (1906) 1959
p. 274, tav. X, fig. 8. — Soris globosis ovaria floresque replentibus, cuticula alutacea, tenui fragili tectis glumisque suffultis; sporis atris rotundo-angulatis, 12-15 μ .; episporio crasso levi.

Hab. in ovariis *Penniseti orientalis*, Oculè-Cusai et *Penniseti Ruppellii*, Mareb in Erythræa Afr. (PAPPI). — Affinis *U. Schweinfurthianæ* et *U. Penniseti-japonici*.

14. **Ustilago kamerunensis** Syd., Engler's Bot. Jahrb. 45. Bd. (1910) 1960
p. 262. — Soris in inflorescentiis evolutis easque omnino destruentibus, atris; sporis globosis, levibus, brunneolis, 6-8 μ . diam.

Hab. in *Penniseto sp.* Djutitasa Kamerun Africae trop. (LEDERMANN).

15. **Ustilago Kellermanii** Clint., North Amer. Fl. VII Pt. I (1906) 1960*

pag. 15. — Soris in inflorescentia terminali immatura evolutis et eam in massam sporarum prælongam mutantibus vaginisque obtectis et cum interiore contextus parte lacerata commixtis; sporis obscure brunneo-rubescens, ex ovoideo sphaeroideis, quandoque magis elongatis v. irregularibus, distincte verrucosis, 10-14 μ . long.

Hab. in inflorescentia *Euchlænæ luxuriantis*, Guatemala Amer. centr.

16. **Ustilago Iseilematis** Syd. et Butl., Ann. Mycol. IV (1906) p. 426. 1961

— Soris in ovariis evolutis, atro-fuscis, pulveraceis, columella simplici vel interdum ramosa percursis; sporis globosis, subglobosis v. ovoideis, interdum angulosis, levibus, dilute olivaceo-brunneis, 6-9 \approx 6-7.

Hab. in ovariis *Iseilematis laxi*, Samalkota, Madras Indiæ or., leg. C. A. BARBER (E. J. BUTLER).

17. **Ustilago Inayati** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 486. — 1962

Soris in ovariis evolutis eaque deformantibus, pulveraceis, atro-fuscis, columella simplici vel interdum ramosa percursis; sporis globosis, dense echinulatis, brunneis, 9-12 $\frac{1}{2}$ \approx 8-11.

Hab. in ovariis *Iseilematis laxi*, Orai Indiæ orient. ubi legit INAYAT (E. J. BUTLER). — Soris et columellâ cum *U. Iseilematis* Syd. et Butl. convenit, at mox dignoscitur deformatione paniculæ, sporis spinulosis, amplioribus et obscurioribus.

18. **Ustilago hordeicola** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 1963

(1909) pag. 289. — Spiculis infectis omnino destructis sed rachide immutata; sporis dense constipatis sed non angulatis, 8-10 μ . diam., episporio tenui fumoso-olivaceo, papillis obtusis relaxatis obsito.

Hab. in inflorescentiis *Hordei jubati* in pratis secus Rio S. Cruz Patagonia, Amer. austr. — Ab *U. Hordei* (Pers.) K. et Sw. sporis conspicue majoribus atque eximie verrucosis satis riteque distincta videtur.

19. **Ustilago Microchloæ** Syd. et Butl., Ann. Mycol. IV (1906) p. 427, 1964

non Griff. quæ = *U. Griffithsii* Syd. proximæ. — Soris in inflorescentiis evolutis easque destruentibus, atro-olivaceis, globoso-piriformibus, compactiusculis, 1,3 mm. diam., diutius tectis sporis globosis, subglobosis, ellipsoideis v. subangulatis, minutissime echinulatis v. punctatis, brunneis, 8-10 μ . diam.

Hab. in inflorescentiis *Microchloæ setacææ*, Bilikere, Mysore Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

20. **Ustilago Griffithsii** Sydow, Ann. Myc. V (1907) p. 290, *Ustilago* 1965

Microchloæ Griffiths (1907) Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV, p. 207 nec Syd. et Butl. (1906). — Soris in inflorescentia evolutis easque transformantibus et plus minusve tegentibus; sporis subglobosis, ovoideis plerumque irregularibus, variabilibus 12-18 μ . diam., in massa nigris nitidis luce transmissa brunneis; episporio tenui, levi, contentu granuloso, maturo saturatiore.

Hab. in inflorescentia *Microchloæ* indicæ prope San Luis Potosi et Aguas calientes, Mexico.

21. **Ustilago Elionuri** P. Henn. et Evans, in P. Henn. Engl. Bot. 1966 Jahrb. XLI (1908) p. 270. — Soris ovaria destruentibus deformantibusque, corniformibus, atris, epidermide cinerea vestitis, c. 1 cm. longis, 1 mm. cr.; sporis subglobosis v. ellipsoideis, angulatis, olivaceo-fuscis, 5-8 \approx 5-6.

Hab. in ovariis *Elionuri* argentei, Pretoria, Transvaal Africae austr. (EVANS).

22. **Ustilago Elionuri-candidi** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 1967 t. XIX (1909) pag. 288 (*U. Elionuri*). — Soris cylindræis 5-7 mm. long., 1 mm. cr., vix e glumis immutatis protrudentibus, tunica tenui subhyalina vestitis, arista elongata armatis, diu compactiusculis, serius modice pulveraceis; sporis dense constipatis obtusis, angulosis, 6-9 μ . diam., episporio tenui levi olivaceo vestitis, intus minute granulosis.

Hab. ad inflorescentias *Elionuri* candidi in pratis prope Reconquista S. Fé Amer. austr. (MARIO ESTRADA). — An diversa a præcedente?

23. **Ustilago Aschersoniana** Fisch. v. Waldh. Hedw. XVIII (1879) 1968 p. 12, *Ustilago Cutandicæ-memphiticæ* R. Maire, Not. myc. in Ann. Myc. v. IV (1906) p. 334; Bull. Soc. Bot. de Fr., LIII (1906) p. CXCVII, cum icone. — Soris in parenchymate corticali ramorum paniculæ evolutis, deformantibus, nigris, pulveraceis; sporis globosis vel subglobosis, 9-13 μ . diam., episporio usque ad 1,5 μ . crasso, brunneo, dense verruculoso.

Hab. in paniculis *Cutandicæ* memphiticæ in dunis Ain-Sefra Africae bor.

24. **Ustilago cornuta** Syd. et Butl., Ann. Mycol. IV (1906) p. 426. — 1969 Soris in spicis, raro in floribus evolutis eosque deformantibus, atro-fuligineis, membrana cinerea e cellulis hyalinis globosis 9-14 μ . diam., facile secedentibus composita tectis; sporis globosis, subglobosis vel angulato-globosis, levibus, olivaceo-brunneis, 5-7 μ . diametri.

Hab. in spicis nondum evolutis, raro in floribus *Ophiuri corymbosi*, Surat, in India orientali (E. J. BUTLER).

25. **Ustilago bulgarica** Bubák, Mitt. bot. Inst. landwirth. Tabor in 1970
Zeitschr. f. landwirth. Versuchswesen Wien (1910) p. 53, fig. 1 c
et fig. 2 a c. — Sporarum massa in ovariis tantum evoluta, viri-
dulo-brunnea et ipsa ovaria in corniculos breviter exertos sæpe
curvatos deformante, initio epidermide grisea tecta, demum hinc
inde nudata, parum fœdante; sporis læte olivaceo-brunneis, glo-
bosis, 5,5-9,5 μ . diam. vel ovoideis 7,5-9,5 \times 5,5-7,5, membrana te-
nui, 0,5 μ . cr., levi.

Hab. in ovariis *Sorghii vulgaris* in horto agrario Sadovo
Bulgaricæ. — *Ustilagini cruentæ* affinis, tamen bene distincta.

26. **Ustilago Setariæ-aureæ** P. Henn., in Fl. du Bas-et Moy-Congo, 1971
in Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) pag. 86. — Soris
atris, pulverulentis, ovaria incolentibus destruentibusque; sporis
subglobosis fusco-olivaceis v. atro-fuscis 3,5-4,5 μ . diam., episporio
verrucoso.

Hab. in ovariis *Setariæ aureæ*, Dembo Congo (VANDERYST).

27. **Ustilago Evansii** P. Henn., Engl. Bot. Jahrb. XLI (1908) p. 270. 1972
— Soris atris ovaria destruentibus, bullatis, epidermide cinereo-fu-
sca vestitis; sporis globosis 10-15 μ . diam., episporio dense ver-
rucosis, olivaceo-atris, verrucis c. 2 μ . longis.

Hab. in ovariis *Setariæ aureæ*, Zoutpanstey, Transvaal
(EVANS).

28. **Ustilago Rickerii** Clint, North Amer. Fl. VII, Pt. I (1906) p. 11. — 1973
Soris ovariicolis, ex ovoideo subsphæroideis, 3-6 mm. circ. long.,
membrana glabra dein lacerata tectis; massa sporarum nigro-oli-
vacea, pulveracea; sporis brunneo-rubescensibus, ex ovoideo sub-
sphæroideis, intus plerumque guttulatis, apparenter levibus sed
fortiter auctis minute et sparse granuloso-echinulatis, 9-9,5.

Hab. in ovariis *Panici paspaloidis*, Cuba (A. S. HITCH-
COCK).

29. **Ustilago operta** Syd. et Butl., Ann. Mycol. IV (1906) p. 426. — 1974
Soris in ovariis evolutis eaque vix deformantibus, compactiusculis,
tectis, inter glumas vix perspicuis, basi columella conica præditis;
sporibus plerumque globosis, interdum breviter ellipsoideis, brunneis,
episporio breviter tuberculato, obscure brunneo, 9-12 \approx 9-10.

Hab. in ovariis *Panici villosi*, Ootacamud Nilgiri Hills,
alt. 2500 m. (C. A. BARBER).

- 30 **Ustilago cacheutensis** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 1975

(1909) p. 293. — Soris nigris, pulveraceis, fibris relaxatis percur-
sis, nudis; sporis omnibus isomorphis atque eadem magnitudine,
globosis, 10-12 μ . diam., pellucidis, atro-fuliginis, eximie reti-
culatis.

Hab. in paniculis, quas destruit, *Panici leucophæi* in præ-
andinis Cacheuta prope Mendoza Amer. austr.

31. **Ustilago bonariensis** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 1976

(1909) p. 287. — Soris maximis 3-8 cm. long., 5-10 mm. diam.,
primo erectiusculis compactiusculis, tunica candida vestitis, serius
erumpentibus fibroso-pulverulentis atro-olivaceis; sporis subglobo-
sis, e mutua pressione leniter difformibus 5-7 μ . diam., episporio
crassiusculo levissimo olivaceo, endoplasmate grosse 1-guttulato v.
minute pluriguttulato.

Hab. in spicis *Penniseti tristachyi*, *Panici elaphan-*
tipedis, *P. spectabilis*, prope Buenos Aires Amer. austr.

32. **Ustilago Beckeræ** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, Ann. 1977

Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) p. 85. — Soris ovariiculis
inclusis, atris; sporis subglobosis, atris, granulatis, 15-20 μ . cs.

Hab. in foliis et ovariis *Beckeræ* sp., socia *Placosphæria Be-*
ckeræ, Kisantu (Congo), maj. 1906 (VANDERYST).

33. **Ustilago aristidicola** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 266. 1978

— Soris in spicis, eas omnino destruentibus, atris, effusis; sporis
subglobosis v. ellipsoideis, atro-olivaceis intus granulatis, 4-7 \approx 4-6.

Hab. in floribus *Aristidæ* sp., Bahia, Maracàs, sept. 1906.

34. **Ustilago Anthistiria** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya IV 1979

Pt. V (1909) p. 304. — Soris ovariiculis; sporis globosis, spinu-
losis, nigro-olivaceis, 6-7 μ . diam.

Hab. in ovariis *Anthistiria* tremulæ, Peradeniya Ceylon.

35. **Ustilago Arthurii** Hume, Proc. Jowa Ac. Sc. IX (1902) p. 233 1980

et in Clinton North Amer. Flora, Fungi VII, pag. 20. — Soris
in foliis convolutis nidulantibus, lineatim dispositis, demum totam
folii partem interiorem oblitterantibus et strato-rufo-brunneo in-
quinantibus; sporis olivaceo-brunneis, satis regularibus sphaeroideis
v. sphaericis, 12,5-16 μ . diam., tuberculis v. squamulis, rarius sub-
anastomosantibus conspersis.

Hab. in foliis *Panicularia* (Glyceria) americana, Jowa
Amer. bor. — Teste Clinton non sat diversa ab *Ustilagine Sco-*
lochloæ Griff. — Syll. XVII, p. 478.

36. **Ustilago Tepperi** Ludw., Centrbl. (1889) p. 341, Mac Alp. Smuts 1981

Austral. (1910) pag. 161. — Soris cauliculis et floricolis, nigris,

pulverulentis, partes infectas destruentibus; sporis globosis v. breve ellipsoideis, brunneis, papillatis v. subaculeolatis, 12-17 μ . diam.

Hab. in caule floribusque *Amphipogonis stricti* et *Neurachnes alopecuroidis*, Torrens George et Highbury Scrub Australiæ merid. (TEPPER).

37. **Ustilago Sieglingiae** Ricker, Journ. of Myc. (1905) pag. 112. — 1982
Soris ovariiculis, ellipsoideis, 3-4 mm. long., spiculas plurimas inefficientibus, trans flosculos visibilibus; sporis ellipsoideis v. subglobosis, rufo-brunneis, 4-6 μ . diam., specie levibus, sed revera dense et minute echinulatis.

Hab. in inflorescentia *Sieglingiae* (*Danthonia*) purpureæ Punta Rassa Floridæ Amer. bor. (HITCHCOCK).

38. **Ustilago Pappophori** Patouill., Bull. Soc. Myc. Fr. XXII (1906) 1983
p. 199. — Soris nigris, pulverulentis, inflorescentiæ axin floralem quasi cornulum ramulosum persistens circumdantibus; sporis brunneo-olivaceis, globosis v. ellipsoideis, 10 \approx 8, episporio tenui, distincte asperato præditis, initio massa subgelatinosa, achroa obvolutis.

Hab. in inflorescentia *Pappophori scabri*, quod destruit, ab In-Salah ad Ahaggar in territorio Algeriensi et Tunetano.

39. **Ustilago Stiparum** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 1981
(1909) p. 288. — Paniculis infectis plus minusve vaginis spathiformibus tectis, diu compactiusculis, serius fibroso-solutis pulverulentis; sporis globosis e mutua pressione subangulosis, 8-10 μ . diam., olivaceis, levibus, intus minute granulosis, rarius grosse 1-guttulatis, episporio tenuiusculo.

Hab. ad paniculas evolutas *Stipæ* cujusdam prope Luján de Cuyo, Mendoza Amer. austr.

40. **Ustilago ? appendiculata** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Air. t. XIX 1985
(1909) p. 288. — Paniculis infectis vagina suprema plus minusve tectis, rhachide immutata, spiculis omnino destructis ac in pulverem atrum transformatis; sporis e cuboideo globosis, 6-8 μ . diam., levibus, crassiuscule tunicatis, opposite v. ad angulos cellulis arcte adnatis pusillis auctis, promycelio filiformi hyalino subulato apice sporidiola numerosa sæpe dichotomice proferente; sporidiolis ellipsoideis, 2-2,5 \approx 1-1,5, subhyalinis levibus.

Hab. in paniculis nondum evolutis *Stipæ chrysophyllæ* in montes Cacheuta prope Mendoza Amer. austr. — Species sporis appendiculatis a genere sat desciscens.

41. **Ustilago Macrochloæ** Patouill., Bull. Soc. Myc. Fr. XXII (1906) 1986

p. 199. — Soris totam paniculam inficientibus et in massam rufonigram et pulveraceam strictam transmutantibus; sporis subglobosis 5-6 μ . diam. v. ovoideis, 7 \approx 5, episporio crassiusculo, nigro-brunneo, levi v. vix punctulato.

Hab. in inflorescentia *Macrochloæ* (*Stipæ*) *tenacissimæ* in territorio Algeriensi-Tunetano Afric bor. — Ab *Ust. segetum* satis diversa.

42. **Ustilago Mildbrædii** Syd., Deutsche-Zentral Afrika Exped. (1907- 1908) Bd. II, pag. 94. — Soris in ovariis evolutis eaque omnino destruentibus, pulverulentis, atris, columella elongata, pluries ramosa; sporis globosis, minute verruculosus, brunneis, 4-5 μ . diam.

Hab. in ovariis *Andropogonis Schœnanthi* Mpororo Africae trop. — A ceteris speciebus in *Andropogone* vigentibus, sporis minoribus prædistincta species.

43. **Ustilago Schœnanthi** Syd. et Butl., Ann. Mycol. IV (1906) p. 425. 1988

— Soris in ovariis evolutis, atro-fuscis, columella simplici v. furcata v. interdum multiplici percursis, membrana cinerea e cellulis globosis hyalinis composita tectis; sporis globosis vel subglobosis, levibus, dilute brunneis, 6-8 μ . diam.

Hab. in ovariis *Andropogonis Schœnanthi*, Alancolam, Tinneveli, Madras Indiae or. (C. A. BARBER et E. J. BUTLER).

44. **Ustilago Nardi** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 425. — Soris in 1989

ovariis evolutis, atro-brunneis, elongatis, columella elongata valde prominente; sporis globosis vel subglobosis, levibus, olivaceo-brunneis, 6-9 μ . diam.

Hab. in ovariis *Andropogonis Nardi*, Wynaad Hills, Malabar Indiae (E. J. BUTLER).

45. **Ustilago congensis** Syd., in De Wildem. Flore du Bas-et Moy.- 1990

Congo t. III, fasc. I (1909) Extr. p. 9. — Soris ovaria incolentibus eaque omnino destruentibus, 1-2 cm. longis, membrana plumbea tectis, pulverulentis, atris; sporis globosis v. subglobosis, minute verruculosus, olivaceo-brunneis, 4-6,5 μ . cr.

Hab. in ovariis *Andropogonis* sp., Kisantu (Congo) april. et sept. 1908 (VANDERYST).

46. **Ustilago Duthiei** Ricker, Journ. of Mycol. (1905) p. 111. — Soris 1991

spicularum incolis, ovaria inficientibus, non deformantibus, dehiscencia tantum conspicuis, olivaceo-brunneis; sporis aureo-brunneis, ovoideis v. subsphaericis, 8-12 μ . diam.

Hab. in inflorescentia *Andropogonis Bladhii*, Denra Dun Indiae (DUTHIE).

- x 47. **Ustilago Andropogonis-aciculati** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Pera- 1992
 deniya IV Pt. V (1909) p. 303. — Soris in inflorescentiis non-
 dum evolutis insidentibus; sporis sphaeroideis, levibus, 5 μ . cr.
Hab. in inflorescentiis *Andropogonis acicularis*, Pera-
 deniya Ceylon.
48. **Ustilago effusa** H. et P. Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 425. — 1993
 Soris in vaginis et foliis nondum expansis evolutis, tandem in foliis
 perfecte evolutis longe lateque effusis eaque pulvere atro-olivaceo
 omnino obtegentibus; sporis globosis v. subglobosis, minutissime
 verruculosis, olivaceo-brunneis, 3 $\frac{1}{2}$ -5 μ . diam.
Hab. in foliis, vaginis culmisque *Andropogonis muricati*,
 Kanaighat, Sylhet, Ind. or. (E. J. BUTLER).
49. **Ustilago Warneckeana** P. Henn., Engl. Bot. Jahrb. XXXVIII 1994
 (1905) p. 119. — Soris in floribus, eos deformantibus et destru-
 entibus atro-brunneis, corniformibus usque ad 1 cm. longis, epider-
 mide fusca circumdatis, dein pulverulentis; sporis subgloboso-an-
 gulatis 10-14 μ . cr.; episporio melleo dein fusco, reticulato-ver-
 rucoso.
Hab. in floribus (et foliis?) *Andropogonis contorti* prope
 Togo Camerun Africae.
50. **Ustilago Vanderysti** P. Henn., in Fl. du Bas-et Moy.-Congo, 1995
 Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) p. 85. — Soris flores
 destruentibus tumefacientibus cornuformibus, atris, pulverulentis,
 epidermide cinerea v. isabellina tectis; sporis subglobosis, atro-
 fuscis, granulatis, 6-10 μ . diam.
Hab. in floribus *Andropogonis* sp. var., Kisantu et Dembo
 Congo Africae (VANDERYST).
51. **Ustilago tenuis** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) pag. 425. — Soris 1996
 in inflorescentiis evolutis, linearibus, $\frac{3}{4}$ -1 cm. longis, atro-brun-
 neis, columella apice saepe bifida; sporis globosis vel subglobosis,
 levibus, olivaceo-brunneis, 7-10 μ . diam.
Hab. in inflorescentiis *Andropogonis pertusi*, Hunsur,
 Mysore, Indiae or. (E. J. BUTLER). — *Ust. Ischaemi* proxima, differt
 praecipue soris minoribus et tenuioribus.
52. **Ustilago ischaemonoides** P. Henn., in Fl. du Bas-et Moy.-Congo, 1997
 Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) p. 85. — Soris flores
 destruentibus, corniformibus, atris, epidermide cinerea tectis; spo-
 ris subglobosis v. ellipsoideis, atro-olivaceis, granulatis, 8-12 \approx 6-10.
Hab. in floribus *Andropogonis* sp., Leopoldville, Congo
 (VANDERYST).

53. **Ustilago Andropogonis-finitimi** Maubl., Bull. Soc. Mycol. Fr., XXII 1998 (1906) p. 74-75, fig. 3. — Soris in ovariis evolutis, atris, demum pulverulentis, elongatis, contortisque, 3 cm. long., 0,5 cm. cr., primo membrana albida tenui tectis; sporis subglobosis, atro-brunneis, opacis, distincte verrucosis, 8-12 μ . diam.
Hab. in ovariis *Andropogonis finitimi* in Africa orient. Lusitanica (LE TESTU). — Species certe dubia nam cl. Auct. describit e pingit ejusdem statum evolutum quasi esset *Cerebellæ* forma.
54. **Ustilago Scheffleri** Syd., Engler's Bot. Jahrb. 45. Bd. (1910) 1999 p. 262. — Soris in inflorescentiis evolutis easque omnino destruentibus, usque ad 3 cm. longis, atris, pulverulentis, membrana cinerea tenui primo tectis; sporis globosis v. subglobosis, reticulatis, brunneis, 8-12 μ . diam.
Hab. in inflorescentiis *Penniseti inclusi*, Lamuru Massai Africæ trop. (SCHEFFLER).
55. **Ustilago longissima** (Sw.) Tul. — Syll. VII, p. 451. — var. **magellanica** Speg., Ann. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) p. 289. — Soris atro-olivaceis; sporis globosis 8-10 μ . diam., levibus, crassiuscule tunicatis, intus dense minuteque guttulato-nubilosus.
Hab. in foliis vivis *Glyceriæ magellanicæ* in uliginosis prope Buenos Aires Amer. austr. 2000
56. **Ustilago Lolii** Magn. in Hedw. 49 (1909) pag. 93, t. IV, f. 1-4, 2001
Ustilago Tritici (Pers.) Jens. et *U. segetum* (Bull.) Ditt., Auctor. p.p. — Soris in inflorescentiis deformatis evolutis; sporis nigris plerumque sphæroideis raro subovoideis 6,85 μ . diam.; membrana æqualiter minute verruculosa.
Hab. in inflorescentiis *Lolii temulenti* in collinis prope stationem Amria Alexandria Ægypto (J. BORNMÜLLER).
57. **Ustilago Isoëtis** Rostr., Mykol. Meddel. IX (1905) p. 306 (Bot. 2002 Tidsskr.) et Rev. Mycolog. (1905) p. 165. — Soris dilute brunneis, pulveraceis; sporis exacte globosis, 12-13 μ . diam., episporio crasso, flavo-brunneo, subtiliter granulato-punctato.
Hab. in basi foliorum. inter microsporas, *Isoëtis lacustris* in Dania.
58. **Ustilago Cucumeris** Griff. in Proc. Roy. Soc. Edinb. 15 (1888) 2003 p. 403, t. 16. — Species omnino dubia; an *Bacillo radicolæ* affinis?
Hab. in excrescentiis radicalibus tuberculiformibus *Cucumeris sativæ*, Ham Green Bristol, Britannia (E. F. CROCKER).

SPHACELOTHECA De Bary — Syll. VII p. 499, XVII p. 486.

1. **Sphacelotheca Fagopyri** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 486. 2004

— Soris in ovariis tumefactis evolutis, atroviolaceis, membrana tenui e cellulis hyalinis subrotundatis ac columella e cellulis similibus formatis; sporis globosis vel subglobosis, dense verrucosis, brunneis, 10-14 μ . diam., episporio ca. 2 μ . crasso.

Hab. in ovariis Fagopyri esculenti, Kulu, Himalaya leg. G. WATT (E. J. BUTLER). — A *Sphac. Hydropiperis*, præter matricem, differt sporarum episporio crassiore.

2. **Sphacelotheca Hydropiperis** (Schum.) De Bary — Syll. VII, p. 499. — 2005

var. **Berkeleyana** Tul. Mém. Ustil. et Ured. p. 94, Mc. Alp. Smuts Austral. p. 156. — Soris ovaria inficientibus et omnino implentibus, strato exteriori compacto celluloso sterili, vertice irregulariter erumpentibus, laceris, basi tunicatis, columella longe lineari usque ad 4 mm. longa, cava; sporis 10-13 μ . diam. v. 11-12 \times 8, minutissime echinulatis, violaceis.

Hab. in floribus Polygoni sp. Queensland (BAILEY) et Polygoni minoris, Tasmania (RODWAY).

3. **Sphacelotheca Polygoni-alpini** Cruch., Bull. Herb. Boiss. 2. ser., 2006

VIII (1908) p. 247. — Soris plus minus amplis, brunneis, plerumque hypophyllis, epidermide dehiscente erumpentibus, folium brunneum, bullosum margineque revolutum efficientibus, circumcirca strato sterili hypharum septatarum cinctis; sporis ex centro sororum se evolventibus, sphæroideis, 6-9 μ . diam., dense tenuiter aculeolatis, coacervatis brunneo-violaceis, singulis diaphane violaceis.

Hab. in foliis Polygoni alpini in Alpibus valesiacis ad Col du Gries in territorio italico. — A *Sph. alpina* imprimis differt quia foliicola nec floricola.

4. **Sphacelotheca Polygoni-vivipari** Schellenberg, Ann. Mycol. V (1907) 2007

pag. 388 cum icon. tab. IX (sine diagnosi). — Bulbillis matricis tuberculiformi deformatis; columella massam sporarum dimidiam attingente; sporis brunneo-violaceis 9-12 μ . diam., vix verrucosis; promycelio tenui 2-5-septato, 50 \times 5-7; sporidiolis oblongis 6-8 μ . long., facile deciduis.

Hab. in bulbillis Polygoni vivipari in Alpibus. — Forte varietas *Ustilaginis Bistortarum* (? var. *inflorescentiæ* Trelease) quæ species quoque verisimiliter ad *Sphacelothecam* pertinet.

5. **Sphacelotheca alpina** Schellenberg, Annales Myc. V (1907) p. 392 2003

(sine diagnosi). — Soris in vaginis foliorum et pedunculis evolutis

aximque inflorescentiæ destruentibus, brunneis, hyphis sterilibus cinctis; sporis subrotundis v. ob pressionem subangulosis, 12-17 μ . diam., episporio levi et violaceo-brunneo.

Hab. in vaginis pedunculisque Polygoni alpini in Alpibus.

6. **Sphacelotheca Aristidæ-lanuginosæ** Maire, Bull. Soc. Bot. Fr. LIV 2009 (1907) p. CXCIX. — Soris totam paniculam occupantibus, nigris, pulveraceis, pellicula fungina albida obvolutis; sporis subglobosis v. ovoideis v. plus minusve angulosis, 10-13 \times 8-11, episporio tenui, brunneo, subtilissime et dense verruculoso.

Hab. in paniculis Aristidæ lanuginosæ, Beni-Ounif Algeria Africa bor.

7. **Sphacelotheca diplospora** (Ell. et Ev.) Clint. — Syll. IX, p. 284 2010 (*Ustilago*). — var. **glabra** Clint. et Ricker, North Amer. Fl. VII, Pt. I (1906) p. 27. — A typo differt sporis minus coloratis, indistincte verruculosis.

Hab. in ovariis Panici rottboellioidis, Cuba (A. S. HITCHCOCK). — var. **verruculosa** Clint., l. c. p. 27: a typo differt sporis paullo majoribus et magis distincte verrucosis. — In ovariis Panici sp. prope Mexico Amer. bor. (E. W. D. HOLWAY).

8. **Sphacelotheca Chudæi** Har. et Patouill., Bull. Soc. Mycol. Fr. 2011 (1910) p. 208. — Soris totum florem occupantibus, ovoideis, 3 cm. longis, membrana pellucida, candida, apice erumpente e cellulis hyalinis, sterilibus, rotundatis, 22 μ . diam., circumcinctis; columella e matrice enata simplici, sori apicem attingente; massa sporarum brunnea; sporis sphaericis, raro angulosis, levibus, 8 μ . dm.

Hab. in floribus Panici turgidi, Biakh Mauritaniae Africae.

9. **Sphacelotheca Schweinfurthiana** (Thuem.) Sacc., Ann. Mycol. VI 2012 (1908) p. 554. — Ita vocanda *Ustilago Schweinfurthiana* Thuem. — Syll. VII, p. 457.

Hab. præter loca indicata, intra glumas Imperatæ cylindricæ, Panormi, Siciliae (J. H. MATTEI) et Vallis Mesimæ Calabria (A. TROTTER). — Sporæ subglobosæ, leves, olivaceo-fuscæ, 10-11,5 μ . diam. Cellulæ steriles, hyalinæ, parce guttulatæ, globosocuboideæ, 8-9 μ . diam. Forte *Ustilago Sacchari* Rabenh. non differt.

CINTRACTIA Corn. — Syll. VII p. 480, IX p. 285, XI p. 233, XIV p. 420, XVI p. 373, XVII p. 479.

1. **Cintractia javanica** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) p. 351, 2013 fig. 4 (sine diagnosi). — Soris in inflorescentiis evolutis, nigris, primum tectis dein erumpentibus pulveraceis, cylindræis, 1-3,5

cm. long., 2,5-4 mm. cr.; sporis tunica brunnea præditis, in massa nigris, pulveraceis, verrucis crebris irregularibus et irregulariter sparsis tectis, poro solitario hyalino præditis, globosis v. subcompressis, non (ex mutua pressione) angulosis, 16-19 μ . diam.

Hab. in inflorescentiis deformatis *Cyper*i sp. in ins. Java.

2. **Cintractia *Cyper*i-polystachyi** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) 2014 p. 250. — Soris oblongis effusis atris, primo tectis, compactis et pedunculis tumentibus; sporis subglobosis v. ellipsoideis angulatis, pluriguttulatis, 7-11 \times 6-9, episporio fusco-olivaceo, 0,5 μ . cr., levi.

Hab. pedunculis *Cyper*i polystachyi, Manila (MERRILL).

3. **Cintractia *Merrillii*** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 250. — 2015 Soris ovaria destruentibus efformantibusque, subglobosis, duris, compactis, fusco-olivaceis, filis rigidis, flexuosis pallide olivaceis, echiniformi-asperatis; sporis subglobosis v. ellipsoideis angulatis; 7-10 \times 6-9, episporio olivaceo, 2 μ . c. cr., radiato-striatulo.

Hab. in ovariis *Caricis* sp., Luzon, Prov. Benguet, Panai insul. Philipp. 2260 m. alt. (MERRILL).

4. **Cintractia *togoensis*** P. Henn., Engl. Bot. Jahrb. XXXVIII (1905) 2016 p. 119. — Soris in floribus globulosis, duris, atris et paleis subinclusis; sporis subglobosis v. subellipsoideis, intus granulatis, 12-14 \times 11-13, episporio levi, olivaceo-brunneo; hyphis hyalinis intermixtis.

Hab. in floribus *Cyper*i sp., Togo Camerun Africae.

5. **Cintractia *tangensis*** P. Henn., Engl. Bot. Jahrb. XXXVIII (1905) 2017 pag. 103. — Soris in axillis foliorum globosis, primo membrana hyalina vestitis, dein pulverulentis, aterrimis, 5-6 mm. c. cr.; sporis subglobosis 8-11 μ . diam. v. ellipsoideis et c. 8-12 \times 7-8, brunneo-olivaceis, intus granulosis, episporio levi.

Hab. in axillis foliorum *Cyper*i sp., Tanga Usambara Africae.

6. **Cintractia *congensis*** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, 2018 Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) pag. 87. — Soris in floribus v. foliorum axillis evolutis, subglobosis v. oblonge effusis, atris, pulverulentis, primo epidermide fusca tectis; sporis subglobosis v. ellipsoideis angulatis, atro-olivaceis, granulosis, 10-14 \times 7-13.

Hab. in floribus foliisque *Cyperaceæ* cujusdam, inter Matadi et Léopoldville Congo (VANDERYST).

7. **Cintractia *Leveilleana*** R. Maire, Bull. trim. Soc. Myc. de France, 2019 XXI (1905) p. 143 cum icone. — Soris nigris, ovariiculis, mox pulveraceis, 1-2 mm. diam.; sporis compressis, ovoideo-angulatis,

10-12 \approx 8-11, e latere 6-7 μ . cr.; episporio tenui, pellucido, fusco, distincte verrucoso.

Hab. in ovariis *Rhynchosporæ glaucæ* pr. Aomori Japoniæ (legit FAURIE; comm. H. LÉVEILLÉ).

8. **Cintractia exerta** Mc. Alp., Smuts Austral. (1910) p. 170, t. XVI, 2020 XXXVIII. — Soris in spiculis inclusis et membrana grisea, demum secedente, tectis et massas atro-brunneas vel nigras sporarum ostendentibus; sporis levibus olivaceis, globosis v. ellipsoideis, olivaceis, 6-8 μ . diam. v. 6-8 \approx 6-6,5, interdum leviter angulosis.

Hab. in spiculis *Anthistiria ciliatæ*, Victoria Australiæ. — Massæ sporarum elongatæ ad circ. 0,7 cm. e spiculis deformatis et fere destructis oriuntur.

9. **Cintractia Distichlidis** Mac Alp., Smuts Austral. (1910) pag. 169, 2021 t. XXIV, XXXVI. — Soris internodia, sæpius per totam longitudinem culmi protractis, occupantibus, initio vaginis foliorum inclusis dein erumpentibus et sporarum massas atro-brunneas densas ostendentibus; sporis late olivaceis globosis v. breve ellipsoideis, levibus, minutis, 5-6 μ . diam. v. 6-7 \approx 4,5-5.

Hab. in culmis *Distichlidis maritimæ*, Victoria Australiæ. — *Cintractiæ* (Ustil.) *hypoditi* affinis, sed sporæ minores.

10. **Cintractia densa** Mac Alp., Smuts Austral. (1910) p. 168, t. XXIII, 2022 XXXVI, LIII. — Soris inflorescentiam occupantibus et singulos flosculos destruentibus, inque massas compactas atro-brunneas secus rhachidem dispositis, initio membrana grisea tectis, mox nudatis et sporas ostendentibus; sporis brunneis globosis vel e globoso ellipsoideis, levibus, 6,5-9,5 μ . diam. vel 9-9,5 \approx 6,5-8 intus tenuiter granulosis.

Hab. in inflorescentia *Rottboellia compressæ*, Victoria Australiæ.

11. **Cintractia columellifera** (Tul.) Mac Alp., Smuts Austral. (1910) 2023 pag. 166, t. LIII. *Ustilago carbo* v. *columellifera* Tul., Mémoire Ustil., Ured. p. 81. — Soris ovariiculis, initio glumis inclusis, columellam simplicem v. ramoso-spinescentem includentibus; sporis ex brunneo olivaceis, levibus, globosis v. subglobosis, 7-8 μ . diam., contentu demum vacuolato-granuloso.

Hab. in inflorescentia *Andropogonis australis* Queensland Australiæ et *Andropogonis hirti*, Penniseti cenchroidis in Mauritania et ins. Madera.

12. **Cintractia Lygei** (Rabenh.) Maire, Bull. Soc. bot. Fr. LIV (1907) 2024 pag. CXCVIII, t. XXXIX, *Ustilago Lygei* Rabenh. in Unio itin.

Crypt. (1866) IV. — Ab *Ust. hypodite* (cfr. Syll. VII, p. 453) nunc *Cintractia hypodites* (Schlecht.) Maire l. c. nuncupanda, imprimis differt quia occupat inflorescentias et non culmos sub vaginis foliorum.

Hab. in inflorescentia *Lygei Sparti*, Licata in Sicilia (BEL-TRANI-PISANI) et in Algeria (MAIRE).

13. **Cintractia Bambusæ** Miyabe et Hori, Bot. Mag. Tokyo XIX 2025 (1905) p. (199).

Hab. in foliis *Phyllostachydis bambusoidis* in Japonia. — Verisimiliter eadem ac *Ustilago Shiraiana* P. Henn.

SOROSPORIUM Rud. — Syll. VII p. 511, IX p. 288, XI p. 237, XIV p. 428, XVI p. 379, XVII p. 484.

1. **Sorosporium enteromorphum** Mc. Alp., Smuts Austral. (1910) p. 177, 2026 t. XVI, XL. — Soris floricolis, vaginâ intestiniformi grisea, dein brunnea et erumpendo sporas emittente inclusis, usque ad 2 cm. long.; sporis compositis irregulariter oblongis v. subglobosis 20-40 μ . diam., v. 30-60 μ . long.; cellulis (sporis) e globoso ovoideis, olivaceis, laxe adhærentibus, 5-8 μ . diam. v. 6-10 \times 4-7, episporio tenui brunneo, tenuissime echinulato.

Hab. in inflorescentia *Anthistiria ciliatæ* pr. Melbourne et Dandenony Ranges Australiæ (ROBINSON, FRENCH).

2. **Sorosporium africanum** Syd., Ann. Mycol. VII (1909) p. 244. — 2027 Soris ovaria occupantibus eaque omnino destruentibus, atris, pulverulentis; glomerulis e sporis usque ad 8 compositis, 12-25 μ . diam.; sporis globosis v. angulato-globosis, subtilissime verruculosus v. punctatis, olivaceis v. olivaceo-brunneis, 5-9 μ . diam.

Hab. in ovariis *Panici trichopodis*, Africa or. lusitanica (C. W. HOWARD).

3. **Sorosporium confusum** Jacks., Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) 2028 p. 148. — Soris ovaricolis, membrana inconspicua dehiscenti cinctis, 3 mm. long.; glomerulis irregularibus, subglobosis v. elongatis, 30-100 μ . long., primum firmis, dein facile secedentibus; sporis subsphæroideis v. polygoniis, frequenter applanatis, 12-14 μ . lat., raro 10 μ . v. usque ad 15,5 μ . long., tunica verruculosa.

Hab. in ovariis *Aristidæ dichotomæ* et *A. purpurascens*, Delaware, Alabama Amer. bor.

4. **Sorosporium flagellatum** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) 2029 p. 489. — Soris elongatis, in spicis rhachidibusque evolutis, primo epidermide argentea vestitis, dein pulverulentis, atro-brunneis;

glomerulis e 10-50 sporis formatis, facile secedentibus; sporis globosis vel e mutua pressione angulatis, fuliginosis, minute verrucosis, 11-16 μ . diam.

Hab. in spicis nondum evolutis *Ischæmi timorensis*, Wynaad, Malabar, Indiæ or. (E. J. BUTLER). — Inflorescentiæ infectæ rhachis evadit scopiformis et incurvata.

5. **Sorosporium ovarium** Griff., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 2030 pag. 209. — Soris in ovariis leniter incrassatis nidulantibus, pellicula griseo-brunnea matricis tectis, apice erumpente, pulverem nigrum efformantibus; glomerulis sporarum subfirmis, irregularibus, angulari-compressis, 50-100 μ . diam.; sporis e subgloboso angulato-compressis, 8-12 μ . diam., episporio minute echinulato præditis.

Hab. in ovariis *Panici cæspitosi*, Dublan, Hidalgo Mexico. — *Sor. Eriochloæ* Griff. affinis.

6. **Sorosporium Paspali** Mc. Alp., Smuts Austral. p. 180, t. XLIV. 2031 — Soris in inflorescentia mox destructa inclusis et demum sporarum massam nigram circumcirca ostendentibus, sporis compositis atro-brunneis e globoso oblongis v. irregularibus, 30-40 μ . diam. 30-50 μ . long., initio firmis, dein in articulos oblongos v. polygonios v. piriformes, 13-16 \times 10-13 (media mensura) secedentibus, episporio crassiusculo, levi.

Hab. in inflorescentia *Paspali scrobiculati*, Queensland Australiæ (BAILEY).

7. **Sorosporium Setariæ** Mc. Alp., Smuts Austral. (1910) pag. 183, 2032 t. LIV. — Soris nunc inflorescentias totas destruentibus ovariaque in massas pulvereas mutantibus, nunc partem spicæ super. tantum invadentibus et inferiorem intactam relinquentibus; sporis compositis atro-brunneis, versiformibus globosis, ovoideis, oblongis, angulosisve, 60-160 μ . long., ex articulis numerosis formatis, articulis globosis, ellipsoideis, angulosisque, levibus, olivaceis, 10-12 μ . diam. v. 10-13 \times 7-10.

Hab. in spicis *Setariæ glaucæ*, Queensland Australiæ (ROBINSON).

8. **Sorosporium Wildemanianum** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.- 2033 Congo, Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) pag. 87. — Soris ovaria staminaque destruentibus, atris epidermide cinerea tectis; glomerulis ellipsoideis v. subglobosis e sporis numerosis compositis, 50-80 \times 50-60; sporis subglobosis v. ellipsoideis fusco-brunneis, verrucosis, 7-10 \times 6-9.

Hab. in foliis *Andropogonis* sp., Mbele Congo (VAN-
DERYST).

9. **Sorosporium Tembuti** P. Henn. et Evans, in P. Henn. Engl. Bot. 2034
Jahrb. XLI (1908) pag. 270. — Soris atris, ovaria staminaque
destruentibus; glomerulis subglobosis v. ellipsoideis, atris, 40-80 μ .
diam.; sporis globoso-angulatis, rufo-brunneis v. castaneis, levibus
8-10 μ .

Hab. in floribus *Andropogonis cymbosi?*, vulgo *Tem-
buti-Grass*, Weterval Oncle, Transvaal, Africae (EVANS).

10. **Sorosporium tumefaciens** Mc. Alpine, Smuts Australia (1910) 2035
p. 184, t. LIV. — Soris inflorescentias totas invadentibus et de-
struentibus, partim vagina foliari inclusis, initio paniculam totam
tumefaciunt et albo-griseo colorantibus, demum irregulariter
lacerantibus et pulvere sporarum conspergentibus; sporis compo-
positis e globoso ellipsoideis v. oblongis irregularibusque ex oli-
vaceo atro-brunneis, 50-80 μ . diam.; articulis ex olivaceo brun-
neis, firme cohærentibus, globosis, v. ellipsoideis v. subinæquali-
bus, levibus, sæpe guttulatis, imprimis sub germinatione, 8-10 μ .
diam. v. 8-10 \approx 6,5-7,5, rarius 11,5 μ . long.

Hab. in inflorescentia *Stipæ pubescentis* et *Stipæ* sp.,
Queensland Australiae (ROBINSON). — A *Sorosp. granuloso* sporis
(articulis) minoribus differre videtur.

11. **Sorosporium Turneri** Mc. Alp., Smuts Austral. (1910) pag. 185, 2036
t. XLIV. — Soris ovariculis, plerumque spiculas singulas infi-
cientibus, demum nudatis et massas densas atras efformantibus,
pistillorum parte et contextu plantæ matricis columelliformi re-
manentibus; sporis compositis e globoso oblongis irregularibusve,
60-100 μ . long.; articulis atro-olivaceis, globosis, 10-11 μ . diam.,
diu cohærentibus, episporio tenui, levi.

Hab. in inflorescentia *Eragrostidis nigrae* v. *trachy-
carpæ*, New-South-Wales Australiae (TURNER).

12. **Sorosporium Tristachydis** Syd., Engler's Bot. Jahrbüch. 45. Bd. 2037
(1910) p. 263. — Soris in ovariiis evolutis eaque omnino destruen-
tibus, inter glumas obsconditis ideoque ægre perspicuis, atris, pul-
verulentis; glomerulis globosis v. ellipsoideis, e sporis numerosis
compositis, 40-85 μ . diam.; sporis globosis, subglobosis v. ellipsoi-
deis, subinde angulatis, levibus, brunneis, 10-18 \approx 9-14, episporio
1,5-2 μ . cr.

Hab. in ovariiis *Tristachyæ* sp. prope Leinde Kamerun A-
fricae trop. (LEDERMANN).

13. **Sorosporium Borrichiæ** Ell. et Ev. apud Millspaugh, Publ. Field 2038
Columb. Mus. Bot. Ser. II (1900) tab. 52.

Hab. in *Borrichiæ* sp. in Amer. bor. (Vide ad calcem voluminis).

14. **Sorosporium mixtum** (Mass.) Mc. Alp., Smuts Austral. (1910) 2039
pag. 178, t. XLI. — Ita dicatur *Tilletia mixta* Masee — Syll.
XVI, p. 374.

TOLYPOSPORIUM Wor. — Syll. VII p. 501, XI p. 235, XIV p. 425,
XVI p. 377, XVII p. 490.

1. **Tolyposporium juncophilum** Mc. Alp., Smuts Austral. pag. 188, 2040
t. XLVII. — Soris calamicolis, massas sporaceas densas pulvereas
formantibus, dein erumpentibus et nigro-inquinantibus; sporis com-
positis opacis e subgloboso oblongis, ex articulis numerosis firme
cohærentibus, circ. 60 μ . long. (ex icone); articulis e globoso elli-
psoideis, subangulosis, olivaceo-brunneis, 10-12 μ . diam. (ex icone),
episporio inæqualiter crasso, levi.

Hab. in calamis *Junci pallidi* in Australiæ pluribus locis.
— E *T. Junci* articulis paucioribus in quaque spora composita et
perfecte levibus mox dignoscitur.

2. **Tolyposporium Lepidospermæ** Mc. Alp., Smuts Austral. (1910) p. 188, 2041
tab. XLVII. — Soris spiculis inclusis, oculo nudo non visibilibus,
nisi ex sporis compositis inflorescentiam velut pulvere nigro gra-
nuloso conspergentibus; sporis compositis opacis, versiformibus e
globoso oblongis irregularibusque, 50-60 μ . long. ex articulis nu-
merosis arcte cohærentibus compositis; articulis e brunneo casta-
neis e globoso ellipsoideis v. polygoniis, extus fortiter verrucosis,
15-17 μ . longis.

Hab. in inflorescentia *Lepidospermæ angustatæ*, Victo-
ria Australiæ (READER).

3. **Tolyposporium Rodwayi** Mc. Alp., Smuts Austral. (1910) pag. 189, 2042
t. XLVII. — Soris spiculis inclusis, oculo nudo non visibilibus et
massas granulatas nigras formantibus; sporis compositis nigris,
versiformibus, e sphærico oblongis v. fere elongatis 30-60 μ . diam.
50-100 μ . longis, ex articulis arcte cohærentibus numerosis forma-
tis; sporis ellipsoideis v. late oblongis, subinde oblique productis;
articulis ex ellipsoideo late oblongis, subinde introrsum obtuse api-
culatis v. cuneatis et inter se cohærentibus, 15-21 \times 9-12.

Hab. in spiculis *Lepidospermæ lateralis* in Tasmania
Australiæ (RODWAY).

4. **Tolyposporium Muellerianum** (Thüm.) Mc. Alp., Smuts Austral. 2043

(1910) p. 189, t. XLVII. — Ita vocandum *Sorosporium Muelle-
rianum* Thüm. — Syll. VII, p. 514.

5. **Tolyposporium filiferum** W. Busse, in Arb. d. Biol. Abt. d. k. Ge- 2044
sundheitsamtes, Berl. (1904) IV p. 2 (extr.). — Soris in ovariis
pustulas ovato-oblongas v. subcylindræas, leniter curvatas, 10-
25 mm. long., 3-4 mm. lat., maturitate apice fasciculo 8-10 pilo-
rum nigrescentium ex ovarii basi nascentium perforatas, vagina
brunneo-flavescente, papyracea, matura fragili obtectas formanti-
bus; glomerulis irregulariter angulatis, rarius subglobosis v. cylin-
dræeis, 50-180 \approx 50-136 ex articulis (sporis) numerosis compositis,
articulis globosis v. subglobosis, v. subovoideis, sæpe polygonaliter
compressis, 12-16 \approx 10-16, episporio crasso, brunneo-ochraceo, acu-
leato v. interdum verruculoso

Hab. in ovariis Sorghi vulgaris in Africa austr. Ger-
manica.

6. **Tolyposporium Decorsei** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. 2045
Nat. (1909) n. 2, p. 197. — Ovariicola; ovariis pulvere granu-
loso atro-fusco repletis; glomerulis sporarum magnitudine et forma
variis, 20-50 μ .; sporis arcte adglutinatis, globosis v. ellipsoideis,
olivaceo-fuscis, 8-12 μ ., subtiliter punctatis.

Hab. in ovariis Trichopterygis (*T. giganteæ* affinis), Cha-
ri, Congo Africæ trop.

7. **Tolyposporium bogoriense** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 2046
p. 349. — Soris in floribus nondum efformatis evolutis; sporis
sæpe cellulis secedentibus, crasse tunicatis, irregulariter sphæroi-
deis 13-18 μ . diam., minute punctatis, nigro-brunneis; sporidiolis
17-20 \approx 2-2,5, cylindræeis, rectis, raro septatis, sæpe anastomosan-
tibus; basidiis rectis, 28-38 \approx 2,5-3.

Hab. in floribus Panici sp. in Buitenzorg, Java.

8. **Tolyposporium globuligerum** (B. et Br.) Ricker, Journ. of Myc. 2047
XI (1905) p. 112. — Ita vocanda *Thecaphora globuligera* B. et
Br. — Syll. VII, p. 509 = *Testicularia Leersiae* Cornu = *Ustilago*
Leersiae Dur.

THECAPHORA Fing. — Syll. VII p. 507, IX p. 289, XI p. 237,
XIV p. 428, XVI p. 379, XVII p. 487.

1. **Thecaphora Lagenophoræ** Mc. Alp., Smuts Austral. (1910) p. 185, 2048
t. XLV. — Soris ovariiculis, massas sporaceas brunneas, pulvereas
formantibus; sporis compositis cinnamomeo-brunneis, globosis v.
subglobosis v. ovoideis, ex 3-10 articulis compositis; articulis glo-

bosis v. subglobosis v. ovoideis, latere libero verrucosis, lateribus interioribus levibus, 18-22 μ . diam.

Hab. in ovariis Lagenophoræ emphisopodis in Tasmania Australiæ (RODWAY). — Matricis capitula in massam sporaceam omnino mutantur.

Subfam. Tilletiæ.

TILLETIA Tul. — Syll. VII p. 481, IX p. 286, XI p. 233, XIV p. 421, XVI p. 373, XVII p. 489.

1. **Tilletia Courtetiana** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. 2049 (1909) n. 2, pag. 197. — In ovariis hypertrophice deformatis et massam sporarum subcompactam brunneo-olivaceam includentibus; sporis exacte globosis, primitus flavescentibus, dein brunneo-fuscis, 18-22 μ . diam., episporio crassiusculo eximie reticulato, alveolis subpentagoniis circiter 4 μ . diam.

Hab. in ovariis Panici proliferi var. longijubati, Baguirmi Congo Africae trop.

2. **Tilletia Eragrostidis** Clinton et Ricker, Journ. of Mycol. (1905) 2050 p. 111. — Soris ovariicolis, ovoideis v. oblongis $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ mm. long., flores partim tantum inficientibus sed valde conspicue; sporis globosis v. subglobosis, atro-brunneis 25-37 μ . diam. regulariter reticulatis, reticulo 2,8-4,5 μ . lat., 2,5-3 μ . alto.

Hab. in inflorescentia Eragrostidis glomeratae, Yazoo City Miss. Amer. bor. (TRACY).

3. **Tilletia Schenckiana** P. Henn., Deutsche Südpol.-Exped. Bd. VIII 2051 (1906) pag. 4, t. I, f. 2 a-c (Extr.). — Soriis ovaria inficientibus eaque paulo deformantibus et destruentibus, paleis laxe circumdati, translucentibus, ellipsoideis, firmis, membrana cinereo-fusca vestitis, 1 \approx 1,5 mm.; sporis ellipsoideis v. subglobosis, 20-30 \approx 20-24, episporio reticulato, melleo dein fusco-brunneo, 2-3 μ . cr., interdum filis hyalinis, flexuosis 2-4 μ . crassis intermixtis.

Hab. in floribus Deschampsiae antarcticae in ins. Kerguelen. — A *Till. cerebrina* et *Till. Airæ* omnino diversa.

4. **Tilletia Airæ-cæspitosæ** Lindr., Mykol. Mitt. 11-15 in Acta Soc. 2052 pro Fauna et Fl. Fenn. XXVI (1904) pag. 15. — Soris pulverulentis fere nigris, mesophyllum fere totum foliorum destruentibus, ex rimis pl. cm. longis, erumpentibus; sporis rotundatis, brunneis,

7-9 μ . diam., membrana verruculis crebris, minutissimis, rotundatis conspersa.

Hab. in foliis Airæ (Deschampsia) cæspitosæ, Nylandia Fennia. — Germinatio non observata hinc species quoad genus paullulum dubia.

5. **Tilletia inolans** Mc. Alp., Agric. Gaz. N. S. W. VII (1896) p. 154, 2053
 Mc. Alpine, Smuts Austral. (1910) p. 191, t. XLIX. — Soris spiciculis et epiphyllis, nigris, pulverulentis, inodoris; hyphis septatis, hyalinis, 4-5 μ . diam.; sporis globosis, atro-brunneis, 30-39 μ . diam., sæpius 34 μ ., episporio grosse obtuse verrucoso sed membrana tenui hyalina levi, 3-6 μ . cr., obvoluto; verrucis variis sæpe obtuse dentiformibus.

Hab. in inflorescentia foliisque Deyeuxiæ Forsteri, Victoria Australiæ (ROBINSON).

6. **Tilletia Muhlenbergiæ** Clint., North Amer. Fl. VII, Pt. I (1906) 2054
 p. 49. — Soris ovariiculis totam inflorescentiam fere occupantibus, ellipsoideis, 3 mm. circ. long., glumis eos involventibus, apice membranâ tectis dein eam lacerantibus, massa sporarum pulveracea atro-brunnea; cellulis sterilibus hyalinis, minoribus, subsphæroideis v. sphæroideis, tunica tenui v. crassiuscula præditis; sporis ex atro-rubido brunneis, subsphæroideis vel sphæroideis, 28-34 μ . diam., distincte et profunde reticulatis, 4-8 μ . lat., 3 μ . altis.

Hab. in inflorescentia Muhlenbergiæ Schaffneri var. elongatæ prope Mexico Amer. bor. (E. W. D. HOLWAY).

7. **Tilletia Pancicii** Bub. et Ranojevic, in Zeitschr. f. landwirt. Ver- 2055
 suchsw. (Esterr. (1909) p. 545, fig. 1; Ann. Mycol. VIII (1910) p. 365. — Massis sporarum atro-brunneo-violaceis, ovaria omnia implentibus et tumefacientibus, non pulveraceis, clupeæ odorem emittentibus; sporis globosis 20-24 μ . diam. v. ex ovoideo breviter ellipsoideis, 22-28 \approx 18-22; episporio pallide brunneo-violaceis, areolis 2-3,2 μ . alt., 2-6 μ . lat. reticulatim dispositis prædito.

Hab. in ovariis Hordei vulgaris prope Wladimirzi Serbiæ (N. RANOJEVIC).

8. **Tilletia Redfieldiæ** Clint., North Amer. Fl. VII, Pt. I (1906) p. 50. 2056
 — Soris ovariiculis, ellipsoideis, e glumis prominentibus, 4-5 mm. circ. long.; cellulis sterilibus hyalinis, ex ovoideo subsphæroideis, quandoque subpolygoniis v. irregularibus, tunica 3-6 μ . cr. præditis sporis latioribus, quandoque usque ad 42 μ . long.; sporis rubro-brunneis, ex ovoideo sphæroideis v. quandoque longioribus v.

angulosis, 18-22 μ . cr. v. usque ad 25 μ ., distincte et regulariter reticulatis, reticulis 2,5-5 μ . lat., 2-3 μ . altis.

Hab. in *Redfieldia flexuosa*, Nebraska Amer. bor. (P. A. RYDBERG). — *Till. asperifoliæ* affinis.

9. **Tilletia Velenovskii** Bub. — Syll. XVII, p. 489. — Teste BUBAK 2057 (Ann. Myc. VI (1908) p. 570) ut synonymum habenda est *Tilletia belgradensis* P. Magn. Hedw. XLVIII (1908) p. 145.

10. **Tilletia subfusca** Hume, Proc. Jowa Ac. of Sc. IX (1902) p. 235 2058 (absque diagnosi).

Hab. in foliis Sporoboli neglecti, Jowa, Amer. bor. — Teste Clinton, in North Am. Fl. Fung. VII, p. 17, vix v. non diversa ab *Ustilagine Vilfæ*.

11. **Tilletia Sydowii** Sacc. et Trott., *Tilletia pulcherrima* Syd., Engler's 2059 Bot. Jahrb. 45. Bd. (1910) p. 261, non Ell. et Gall. (1904). — Soris ovaria occupantibus, eaque omnino destruentibus oblongis, c. $\frac{1}{2}$ cm. longis, membrana tenui cinerea inclusis, pulverulentis, atris; sporis semper globosis, grosse et amœne reticulatis, sordide brunneis, 14-18 μ . diam.

Hab. in ovariis *Ammochloæ* subacaulis, Ued-Biskra Algeria, Africa bor. (SCHWEINFURTH).

12. **Tilletia pulcherrima** Ell. et Gall. in Bull. Torr. Bot. Cl. 31 (1904) 2060 p. 85, f. 5-6. (Vide ad calcem voluminis).

13. **Tilletia ? eremophila** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2061 (1909) p. 291. — Maculis obsoletis indeterminatis vix pallescentibus 2-7 mm. diam.; acervulis folio contra lucem inspecto opacitate manifestis, subcallosulis; sporis sæpius conglobatis et ob mutuam pressionem irregularibus v. angulosis, 12-16 \approx 9-14, episporio tenui, endoplasmate vix nubiloso, sæpius 1-guttulatis.

Hab. in foliis vivis *Hypochæridis* variabilis in pratis circa La Plata Amer. austr. *Entyloma hypochæridis!*

ENTYLOMA De B. — Syll. VII p. 487, IX p. 286, XI p. 233, XIV p. 423, XVI p. 375, XVII p. 482.

1. **Entyloma Meliloti** Mc. Alp., Smuts Austral. (1910) p. 195, t. LVI. 2062 — Soris foliicolis, in utraque pagina pustulas minutas, rotundas, leviter elevatas margine brunneas, centro pallide v. atro-coloratas sæpe confluentes formantibus; sporis hyalinis v. melleis, globosis v. ellipsoideis v. subinde pressione angulosis, levibus, 10-12 μ . diam. v. 11-13 \approx 9-9, 5.

Hab. in foliis *Meliloti indicæ*, Victoria Australiæ (C. FRENCH, jun.).

2. **Entyloma Feurichii** Krieg., Fungi Saxon. n. 1751, Hedw. XLIV 2063 (1905) p. (86). — Maculis brunneis, centro demum griseo-brunneis, 1-3 mm. diam., subinde confluentibus, plerumque copiose in toto folio sparsis; sporis subrotundis 12-18 μ . diam., hyalinis, membrana levi, 1,5 μ . cr.

Hab. in foliis *Lathyri silvestris* supra Rotstein pr. Zoblitze Saxonie (FEURICH).

3. **Entyloma Mágocsyanum** Bubák, Beitr. Pilzfl. Ungar., in Növény-tani Közlemények (1907) Heft 4, Extr. p. 9. — Maculis minutis, 1-3 mm. diam., angulosis, nervis acute limitatis, alutaceis, dein expallentibus, utrinque conspicuis, planis, sat numerosis; sporis globosis v. subglobosis 9-13 μ . diam., sæpe mutua pressione polygoniis, flavo-brunneis, membrana levi, 1-1,5 μ . cr.

Hab. in foliis vivis *Tordylii maximi* pr. Básiás et Orsova in Hungaria.

4. **Entyloma Schinzianum** (P. Magn.) Bubák, Ann. Mycol. IV (1906) 2065 pag. 106. — *Exobasidium Schinzianum* P. Magn. — Syll. XI, p. 130 — est status conidiophorus. — Maculis hypophyllis flavo-albidis, supra pallidis, rotundatis, 6-7 mm. latis, non distincte marginatis, sparsis v. gregariis; sporis globosis v. subglobosis, 12-35 μ . diam., dilute v. saturate flavis, tunica 2 μ . cr., tenuiter verrucosa; conidiis fusoidis, 12-18 μ . longis, leviter curvis, 1-2-cellularibus, hyalinis.

Hab. in foliis *Saxifragæ rotundifoliæ* in Montenegro et Helvetia. — Status conidiophorus in *Saxifraga Heuffelii* in Hungaria.

5. **Entyloma Bupleuri** Lindroth, Mykol. Mitteil. 11-15 in Acta Soc. 2066 pro Fauna et Fl. Fenn. XXVI (1904) pag. 14. — Soris per nonnulla mm. elongatis, solitariis v. confluentibus, oblongis, planis, brunneolis v. carneis; sporis rotundatis, 13-16 μ . diam., hyalinis, membrana crassiuscula prædita.

Hab. in foliis caulibusque *Bupleuri glauci*, Provence Gallie.

6. **Entyloma Petuniæ** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2067 (1909) pag. 292. — Maculis pallescentibus indefinitis sæpe totum folium occupantibus; acervulis endogenis subalbescentibus dense gregariis sæpeque confluentibus, discoideis 0,5-0,3 mm. diam., ad hypophyllum concaviusculis, ad epiphyllum convexulis, in sene-

ctute arescentibus albido-cinereis; sporis conglobatis non v. vix angulosis 9-10-12 μ . diam., chlorinis, episporio crasso levi pluribus tunicis superpositis constituto, inde concentricè striato, endoplasmate homogæneo, nucleo globoso maximo donatis.

Hab. in foliis vivis *Petuniæ nyctaginifloræ* in arvis pr. Salta Amer. austr.

7. **Entyloma luteo-maculans** Hume, Proc. Jowa Ac. of Sc. IX (1902) 2068 p. 238 (sine diagnosi).

Hab. in foliis *Mertensia virginicæ*, Jowa Amer. bor. — Sec. Clinton in North Am. Flora, Fungi VII, p. 64 non est satis diversum ab *Ent. serotino* Schröt.

8. **Entyloma Convolvuli** Bres., apud Torrend in Broteria IV (1905) 2069 p. 211. — Soris in maculis orbicularibus v. oblongis, subtus rufis supra pallidis, rufo-fusco-marginatis, nidulantibus; sporis intercellularibus, globosis, fulvis, 14-15 μ . diam., episporio tenui, haud stratoso, brunneo; hyphis mycelialibus hyalino-stramineis, ramosis, 1,5 μ . diam.; sporidiolis non visis.

Hab. in foliis *Convolvuli Soldanellæ*, in agro Setubal Lusitanicæ.

9. **Entyloma veronicicola** Lindr., Mykol. Mitteil. 11-15, in Acta Soc. 2070 pro Fauna et Flora Fenn. XXVI (1904) p. 13. — Maculis minutis 0,5-1 mm. diam., rotundatis, brunneolis, zona obsolete pallidiore cinctis, solitarie sparsis; sporis rotundatis, 5-7 μ . diam., membrana 1,2 μ . cr., flavo-viridula, levi præditis.

Hab. in foliis vivis *Veronicæ serpyllifoliæ* in Nylandia Fennicæ.

10. **Entyloma peregrinum** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2071 (1909) pag. 292. — Maculis nullis; acervulis tantum fere contra lucem et trans folium inspectis manifestis, subopacis 0,5-2 mm. diam., non bullosis; sporis conglobatis, globosis v. e mutua pressione obtuse angulosis 13-16 μ . diam., episporio crassiusculo hyalino, endoplasmate nubiloso grosse 1-guttulato, hyalino præditis, jam intra matricem germinantibus, tubulis 1 v. 2 brevibus continuis concoloribus ornatis.

Hab. in foliis vivis *Veronicæ peregrinæ* in herbosis circa La Plata Amer. austr. — Ab *E. Linariæ* Schr., episporio hyalino, ab *E. Veronicæ* (Halst.) Lag., sporis conspicue majoribus recedens.

11. **Entyloma Spilanthi** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2072 (1909) p. 292. — Maculis nullis v. obsoletissime pallescentibus;

acervulis, folia contra lucem inspecto, opacis perspicuis subdiscoideis 0,5-1,5 mm. diam., non v. vix vix callosulis; sporis conglobatis sphaeroideis 14-16 μ . diam., episporio crassiusculo hyalino levi, endoplasmate concolore nubiloso v. minute uniguttulato.

Hab. in foliis vivis *Spilanthis leptophyllæ*, Ensenada Amer. bor.

12. **Entyloma Bellidiastris** Maire, *Æsterr. Bot. Ztschr.* LVII (1907) 2073 p. 274. — Maculis albicantibus, dein brunneolis, rotundatis, 1-4 mm. latis; sporis globosis v. ovoideo-globosis, primo hyalinis, dein dilute brunneolis, 8-14 μ . diam.; episporio levi 1-1,5 μ . cr.; acervulis conidiophororum hypostomaticis sterilibus.

Hab. in foliis *Bellidiastris Michellii* in Alpibus et in Jura, et in silvis supra Brennerbad Tirolia.

13. **Entyloma Holwayi** Sydow, *Ustil.* n. 282 (1901), Clinton, North Amer. Fl. VII, Pt. I (1906) pag. 62. — Soris foliicolis maculas circulares v. angulosas in utraque pagina conspicuas efformantibus, primum flavidis demum rubro-brunneis, distinctis vel raro confluentibus, 2-6 mm. diam.; sporis ex hyalino rubro-brunneis, ovoideo-subsphaeroideis, levibus tunica duplici præditis, exteriori plerumque irregulariter incrassata, 12-15 v. 17 μ . diam.; conidiis non visis.

Hab. in foliis *Cosmi sulphurei* prope Mexico.

14. **Entyloma Thrinciæ** Maire, *Bull. Soc. Bot. Fr.* LIV (1907) p. CC. 2075 Maculis ex albido brunneis, rotundatis, explanatis, interdum confluentibus, conidiorum evolutione furfuraceis; sporis globosis 11-14 μ . episporio levi brunneolo, usque ad 2,5 μ . cr.; conidiophoris (*Cylindrosporium Thrinciæ*) in acervulis hypostomaticis congestis, e stomatibus erumpentibus, conidiis acicularibus rectis, utrinque acutiusculis, hyalinis, levibus, circ. 20-26 \times 0,5.

Hab. in foliis *Thrinciæ tuberosæ* prope Oran Algeria Africa bor.

15. **Entyloma crepidicola** Trotter, *Ann. Mycol.* VI (1908) p. 21, cum 2076 3 icon. — Sporis initio in soros minutos intracellulares confertis, in quaque cellula paucis, demum in soros multo majores confluentibus et lacunas plus minusve distinctas occupantibus, initio hyalinis irregulariter guttulatis dein flavidis mature vero intense brunneo-castaneis, sphaeroideo-ellipsoideis, ovoideis, quandoque leniter depressis et obscure angulosis, 13-15 μ . diam., episporio levi, distincto, parum (quandoque irregulariter) incrassato (1,5-2,4); mycelio filiformi, 2 μ . cr. parce ramuloso saepe circa sporam implexo.

Entyloma hypochæridis Peg. = *cupst.* n. 2061!

Hab. in tumoribus radicalibus (mycocecidiiis) *Crepidis bulbosæ*, prope S. Agata (Avellino) Ital. merid, majo 1907.

16. **Entyloma Aposeridis** Jaap, Ann. Mycol. VI (1908) pag. 195. — 2077

Soris in maculis foliorum fuscis punctiformibus, vix 1 mm. diam., sparsis sed valde numerosis, subrotundis, brunneolis, serius obscurioribus, applanatis v. lenissime emergentibus; sporis globosis v. subellipsoideis, interdum mutua pressione polyedricis, 12-14 μ . diam e hyalino flaveolis; episporio levi, inæqualiter 2-3 μ . crasso; contentu hyalino, granuloso; conidiis non visis.

Hab. in foliis *Aposeridis fœtidæ* prope Eisenkappel Carinthiæ.

17. **Entyloma spectabile** Karst, Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. 2078

XXVII (1905) 4, p. 14. — Soris in macula flaventi nidulantibus, elongatis, brunneis, elevatis, usque ad 3 cm. longis; sporis globosis, flavescentibus, 20-30 μ . diam.

Hab. in foliis *Glyceriæ spectabilis* in opp. Sortavala (O. LÖNNBOHM)

18. **Entyloma Pammelii** Hume, Proc. Jowa Ac. of Sc. IX (1902) 2079
p. 238 (sine diagnosi).

Hab. in foliis *Zizaniæ aquaticæ*, Jowa Amer. bor. — Teste Clinton in North Amer. Flora, Fung. VII, pag. 60, idem est ac *Entyloma lineatum* (Cooke) Davis (= *Ustilago lineata* Cooke — Syll. VII, p. 456).

19. **Entyloma majus** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. 2080

(1909) n. 2, p. 197. — Soris bullaceis, 1-3 mm. longis, 0,5-2 mm. latis, griseo-plumbeis, demum epidermide fissa cinctis, intus nigerimis, aliquando in lineas striiformes usque ad 1 cm. longas confluentibus; sporis densissime gregariis sæpius ovoideis, nonnumquam globosis, plus minus angulosis, fusco-brunneis, crasse diluteque tunicatis, levibus, 8-15 \approx 8-10.

Hab. in foliis *Sporoboli spicati*, Ins. Tchar inter Modon et Bérirem, Congo Africae trop. — Colore et magnitudine sororum inter *Entylomata* graminacearum distincta species.

TUBURCINIA Fr. — Syll. VII p. 507, XVI p. 378.

1. **Tuburcinia javanica** Koord., Botan. Untersuch. (1907) pag. 196, 2081

fig. 21. — Soris explanatis, amphigenis, epidermide tectis, maculas maximas irregulares efficientibus; sporis in glomerulos subglobosos 60-70 \approx 40-60 dense congestis, 8-15 μ . diam., globosis, el-

lipsoideis v. angulatis, episporio levi, dilute fuligineo, postea obscure brunneo, plerumque poro hyalino munitis, conidiis ignotis.

Hab. in foliis vivis *Hymenocallidis* sp. cultæ in Magelang prov. Kedu. (JAVA), maio 1905 (KOORDERS).

UROCYSTIS Rab. — Syll. VII p. 515, IX p. 290, XI p. 237, XIV p. 429, XVI p. 380, XVII p. 491.

1. **Urocystis Lithophragmæ** Garret in Clint., North Amer. Fl. VII, 2082 Pt. I (1906) pag. 56. — Soris in foliis et petiolis evolutis eosque plus minusve deformantibus, in massas pulveraceas nigras mutantibus, primum membrana albida tectis; soris compositis subsphæroideis, cellulis sterilibus extus plus minusve distincte circumdati, 20-30 μ . cr.; cellulis sterilibus ex ovoideo sphæroideis v. subsphæroideis, brunneo-olivaceo tinctis, parvis, 6-10 μ . v. usque ad 12 μ ., long.; sporis 1 vel raro 2, rubido-brunneis, subsphæroideis, 12-16 μ . diam.

Hab. in foliis petiolisque *Lithophragmæ* bulbiferæ, Utah Amer. bor. (A. O. GARRETT).

2. **Urocystis ? Arjonæ** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2083 (1909) p. 293, fig. 4. — Partibus infectis primo vix turgentibus fungum omnino occupantibus serius tuberiformibus 3-20 mm. diam., arescendo rugoso-contractis cinerescentibus sæpeque irregulariter dehiscens ac pulverem nigrum emittentibus; sporis compositis irregulariter subglobosis 20-60 μ . diam., atris, opacis, multicellularibus, levibus; cellulis fertilibus subglobosis, 5-15 μ . diam., pellucidis, cellulis sterilibus centralibus non perspicuis.

Hab. in turionibus et tuberculis *Arjonæ* andinæ in summis Andibus circa Puente del Inca et Las Cuevas, Amer. austr.

3. **Urocystis Giliæ** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) 2084 p. 294. — Tuberculis pisi v. phaseoli magnitudine, plus minusve profunde delitescens e subgloboso difformibus primo carnosulis candidis, serius cinerescentibus, postremo pulverulentis nigris; sporis compositis majusculis 30-60 μ . diam., obtuse angulosis, cellulis 1-3 centralibus ægerrime perspicuis, majoribus 15-18 μ . dm., cellulis fertilibus subglobosis, 6-12 μ . diam., subparenchymatice connatis fuscis pellucidis crasse tunicatis.

Hab. ad radices v. turiones *Giliæ* fœtidæ in summis Andibus prope Puente del Inca Amer. austr. — *Uroc. Arjonæ* affinis sed videtur diversa.

4. **Urocystis Sophiæ** Griff. Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 2085

pag. 209. — Sporis compositis 30-40 μ . diam., fortiter connexis, plerumque ex 1-4 loculis formatis; cellulis seu loculis subglobosis v. angulato-compressis, 15 μ . c. cr., stratu simplicis cellularum hyalinarum v. subcoloratarum 3 μ . cr. circumdati; sporis in pseudo-parenchymate hyphis anastomosantibus et agglutinatis constituto immersis.

Hab. in tuberculis radicalibus verruciformibus 1-10 mm. cr. Sophiæ Andrenarum, Tucson Arizona Amer. bor.

5. **Urocystis Dioscoreæ** Syd., Ann. Mycol. VIII (1909) p. 173. — 2086

Soris atris, in caulibus, petiolis et nervis foliorum evolutis, pustulas elongatas efformantibus; sporis compositis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, 18-35 \approx 16-25; cellulis centralibus 1-4, obscure brunneis, 10-14 μ . diam.; sporis periphericis hemisphærico-convexis, pallidioribus, 5-7 μ . diam.

Hab. in caulibus, petiolis et nervis foliorum Dioscoreæ Tokoro, Mont. Ushive, Tosa Japoniæ (YOSHINAGA).

6. **Urocystis destruens** Mc. Alp., Smuts Austral., (1910) pag. 196, 2087

tab LII. — Soris foliiculis, strias latas inflatas, initio epidermide grisea v. plumbea tectis, dein erumpentibus et pulverem sporarum nigrum ostendentibus; sporis compositis typice globosis v. subglobosis, 18-22 μ . diam. v. rarius oblongis et usque ad 30 μ . longis; articulis e flavo-brunneo atro-brunneis, firme tunicatis, levibus, in quaque spora 1-2, globosis v. ovoideis, 10-14 μ . diam., cellulis sterilibus flavidis globulosis, 6-8 μ . diam., articulum seu articulos fertiles omnino obducentibus.

Hab. in foliis Wurmbæ dioicæ, pr. Melbourne Victoria Austral. — *Urocysti Colchici* affinis.

7. **Urocystis Stipæ** Mc. Alp., Smuts Austral. (1910) p. 198, tab. LI. 2088

— Soris foliiculis, vaginicolis et culmiculis, strias elongatas, atras, formantibus, initio epidermide tectis, dein erumpentibus; sporis compositis, forma et magnitudine maxime variabilibus, globosis, ellipsoideis, oblongis v. polygoniis late aureo-brunneis, 22-32 μ . diam. v. 28-48 \approx 20-32; articulis fertilibus, 1-5 in quaque spora, globosis v. ovoideis, levibus, 12-16 \approx 9-12; articulis sterilibus pallide flavis 8-12 μ . long., strato simplici fertiles omnino v. partim obtegentibus.

Hab. in foliis, vaginis culmisque Stipæ Luehmanni, Victoria Australiæ (C. FRENCH). — *Urocysti occultæ* subaffinis.

8. **Urocystis aristidicola** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2089 (1909) p. 294. — Ovariis infectis fuscescentibus clavulatis, glumis

immutatis patentibus suffultis, primo compactiusculis dein, tunica tenui irregulariter disrupta, pulverulentis; sporis compositis subglobosis v. e mutua pressione obtuse angulosis, 25-110 \approx 20-70, grosse papillosis atris opacis; cellulis sterilibus centralibus 3-10 majusculis obscurioribus 12-20 μ . diam.; cellulis fertilibus ex olivaceo fuligineis subglobosis, 8-10 μ . diam., episporio subtenui levi, endoplasmate vix granuloso farctis.

Hab. in paniculis Aristidæ pallescentis, Juárez Celman, nec non abunde Arist. complanatæ prope Posadas Amer. austr. — An ab *U. Aristidæ* Peck satis distincta?

9. **Urocystis Tritici** Körn. in Hedw. XVI, p. 33 (1877), *U. occulta* 2090 (Wallr.) Rab. — Sacc. VII, p. 515 ex p. — Sporis obscure fuscis solitariis v. binis rarius ternis conglutinatis, subtiliter punctulatis, appendicibus sæpe confluentibus depressis v. sæpe impressis, fusciscentibus prorsus obtectis.

Hab. in vaginis, foliis, culmisque Tritici vulgaris strias longitudinales formans, in Nova Hollandia (R. SCHOMURGK). — Affinis *Uroc. occulta* (in Secale) distinguitur sporis evidentius punctatis, appendicibus partim sed non omnino tectis, observante cl. Körnicke.

Species omnino excludendæ, in Syll. vol. XX, p. 1070 memoratæ, sunt: **Urocystis cholerae** Hallier, **Ur. cholerae-asiaticæ** Hallier, **Ur. intestinalis** Hallier, **Ur. Oryzæ** Hallier.

DOASSANSIA Corn. — Syll. VII p. 502, IX p. 288, XI p. 235, XIV p. 427, XVI p. 378, XVII p. 481.

1. **Doassansia Horiana** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 157. 2091 — Soris crasse bullatis, gallæformibus usque ad 3 cm. longis, 1 cm. crassis altisque, fuscis, granuloso-verrucosis; glomerulis subglobosis v. ellipsoideis, atris, 130-230 \approx 100-200; sporis marginalibus ovoideis v. cuneatis 10-12 \approx 8; sporis centralibus angulato-subglobosis, 8-10 μ ., episporio atro-brunneo, levi v. punctulato.

Hab. in foliis petiolisque deformatis Sagittariæ sagittifoliæ, Tokyo, Nishigahara Japoniæ (S. HORI).

GRAPHIOLA Poit — Syll. VII p. 522, XVI p. 381, XVII p. 493. Adhuc dubium genus sed vix ustilagineum.

1. **Graphiola applanata** Syd. et Butl., Ann. Mycol. IV (1906) p. 428. 2092 — Peridiis congestis, subglobosis vel ellipticis, verticaliter compressis, sæpe longitudinaliter plicatis, $\frac{1}{2}$ -1 mm. longis, 1 mm. latis, $\frac{1}{2}$ mm. altis, primo clausis, dein radiatim dehiscentibus; exo-

peridiis atris, corneis; endoperidiis flavis; filamentis sterilibus e basi cinnamomea dense parallele ortis, fertilibus hyalinis ramosis breviter articulatis; sporis bacillaribus, rectis vel leniter curvulis, subinde globosis, hyalinis vel subhyalinis, $2-5 \approx 1,5-2$.

Hab. in foliis Phœnicis silvestris, Dehra Gopipur Kangra, Punjab Indiæ or. (J. H. BURKILL). — Exemplaria immatura tantum observata.

2. **Graphiola Borassi** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 489. — 2093

Peridiis amphigenis, sparsis, erumpenti-superficialibus, nigris, hemisphæricis, sæpe umbilicatis vel paullo plicatis, $\frac{1}{4}$ -1 mm. diam., diu clausis; exoperidiis nigris, corneis; endoperidiis ferrugineis, filamentis sterilibus ferrugineis; fertilibus dilute flavis, breviter articulatis, in segmenta cuboidea facile secedentibus; sporis 3-8 e segmentis superioribus oriundis, bacillaribus, rectis vel curvulis, hyalinis, $2\frac{1}{2}-3\frac{1}{2} \approx \frac{3}{4}-1\frac{1}{2}$.

Hab. in foliis vivis Borassi flabelliferi, Pusa Indiæ or. (E. J. BUTLER), Arrah (P. N. BHATTACHEYIA), Madras (E. J. BUTLER).

FARYSIA Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) p. 354 [absque diagnosi] (Etym. non indicata). — Sori floricolæ initio inclusi, dein erumpentes et ob hyphas copiosas longe penicillatas floccosi; sporæ globosæ solitariæ in hyphis superficialibus septatis pleurogenæ et cum hyphis germinantes; sporidiola elongata pleurogena. — Genus dubium cum *Graphiola* forte analogum et *Cintractia* etiam affine. Cfr. de hoc genere observationes cl. v. Höhnel Fragm, Myc. VII, p. 1 (1909) qui et st. conidicum et chlamidosporicum invenit.

1. **Farysia javanica** Raciborski, l. c. p. 354, fig. 6 (absque diagnosi). 2094

— Soris solitariis flavo-brunneis, globosis 1,5-2,5 mm. diam. floccosis; hyphis 1-2 mm. long. et basi 15-30 μ . cr., in divisis v. sursum in fasciculos 2-3 angustiores partitis; fasciculis ex hyphis numerosis brunneolis fere conglutinatis septatis et 1,5-2,5 μ . cr., formatis; sporis sessilibus pleurogenis, brunneis, 9-12 μ . cr., membrana crassa verruculosa striata.

Hab. in inflorescentia Caricis sp. in ins. Java. — An huc *Cintractia Merillii* Henn. sec. Racib.

USTILAGINOIDEA Bref. — Syll. XIV p. 431, XVI p. 382, XVII p. 492.

1. **Ustilaginoidea Arundinellæ** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) 2095

p. 157. — Sclerotiis ovariculis, duris, subglobosis, brunneis dein atris, usque ad 1 cm. diam., intus pallidioribus, corneis; conidiis superficialibus subglobosis, 4-5 μ . diam., episporio atro, grosse verrucoso.

Hab. in paniculis *Arundinellæ anomalæ*, Mt. Yanuze Japoniæ (T. YOSHINAGA).

2. **Ustilaginoidea bogoriensis** Racib., Bull. Ac. Sc. Cracovie (1906) 2096 p. 906. — Soris flosculos spicæ nonnullos inficientibus et destruentibus, 1 mm. diam., sclerotioideis sed molliusculis, non emergentibus, intus albidis; hyphis subparallele divergentibus, subramosis, septatis articulis ad peripheriam sporigeris; sporis rotundis, sessilibus, ochraceo-flavis, sub aqua sulphureis, verrucosis (ope chloralii verrucis et colore evanescentibus) 4-5 μ . diam.

Hab. in spicis *Hymenachnes* (Panici) indicæ in ins. Java.

3. **Ustilaginoidea congensis** P. Henn. in Fl. du Bas- et Moy-Congo, 2097 v. II, fasc. II (1907) p. 88. — Sclerotiis in floribus duris, globosis v. subturbinatis, extus olivaceo-pulverulentis; conidiis subglobosis dense verrucosis, atro-olivaceis, 4-5 μ . cr.

Hab. in floribus *Panici maximi*, Kisantu, Congo (VANDERYST).

4. **Ustilaginoidea strumosa** (Cke.) Clint., Journ. of Mycol. XI (1905) 2098 p. 112. — Ita vocanda *Ustilago strumosa* Cke. — Syll. VII, p. 457.

UREDINACEÆ Brongn. *)

Syll. VII p. 528, IX p. 291, XI p. 174, XIV p. 269, XVI p. 257, XVII p. 244.

UROMYCES Lk. — Syll. VII p. 531, IX p. 291, XI p. 174, XIV p. 269, XVI p. 257, XVII p. 244, 470 **).

1. **Uromyces Fischerianus** Mayor, Bull. Herb. Boiss. 2 sér., VI (1906) 2099 p. 1015 cum icon. A, B, C. — Soris petiolicolis et amphigenis, atro-brunneis, zona flavida cinctis; uredosoris sparsis, luteo-fuscis, discretis v. teleutosoris intermixtis, subcutaneo-erumpentibus; uredosporis sphaericis 17-23 \approx 17-21, pallide luteis, episporio 2 μ . cr., tenuissime echinulato, pedicellis 23-26 \approx 4-6, deciduis; teleutosoris epidermide diu tectis in foliis rotundatis, in petiolis elongatis usque ad 3 mm. diam., discretis, raro confluentibus; paraphysibus marginalibus stipatis, apice 4-8 μ . cr.; teleutosporis ovato-ellipsoideis 19-28 \approx 12-19 pallide brunneis, sursum saturatioribus, apice obtusulis, non papillatis, episporio levi, 1 μ . cr.; pedicellis hyalinis, subdeciduis, sporam subæquantibus.

Hab. in petiolis foliisque vivis **Ranunculi** glacialis in Alpibus Vallesiacis, loco Col de Fenêtre ad fines Italiae, 2700 m. alt.

2. **Uromyces hypericinus** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2100 (1909) p. 311. — Maculis nullis v. vix pallescentibus indeterminatis; teleutosoris sparsis v. laxè gregariis orbicularibus, minutis 0,25-0,50 mm. diam., valde convexis carnosulo-compactis omnino

*) Conferenda potissimum de Uredineis opera egregia: P. et H. SYDOW, *Monogr. Uredinearum* I et II, Berol. 1904-1910; ED. FISCHER, *Die Uredineen der Schweiz*, Bern 1904; MC. ALPINE, *The Rusts of Australia*, Melbourne 1906; P. HARIOT, *Les Uredinées*, Paris 1903, nec non contributiones DIETELII, HOLWAY, ITO, ARTHUR, MAGNUS etc. Quod ad biologiam generalem Uredinearum spectat, cfr. lucidam expositionem: MAIRE R., *La biologie des Uredinales (État actuel de la question)* in *Progressus rei botanicæ*, IV (1911) p. 109-162.

**) Plurimæ emendationes ad hoc genus spectantes allatæ sunt a coll. H. et P. SYDOW, in *Ann. mycol.* 1908, p. 135-143 et in *Monogr. Uredin.* II, p. 346-352.

nudis, ferrugineis; teleutosporis elliptico-ovatis, supra obtusis crassissime tunicatis levibus infra rotundato-subcuneatis 18-24 \approx 12-15, melleis, pedicello deorsum sensim leniterque incrassatulo 25-30 \approx 5-6, vix colorato ruffultis.

Hab. in foliis vivis Hyperici brasiliensis in silva Iponá prope Formosa Chaco Amer. austr. — Ab *Urom. Hyperici* (Schw.) Crt. teleutosporis ovatis crassius tunicatis stipiteque brevioribus recedit.

3. **Uromyces truncatulus** Trotter, Ann. Mycol. II (1904) p. 533, 2101 fig. 1; Flora ital. crypt. Fungi: Uredinales p. 39, fig. 406 — ? Pycnidii; æcidiis cum *Æc. Geranii* DC. satis concordantibus. — Uredosoris hypophyllis, rotundatis, laxe gregariis, erumpentibus, epidermide lacerata plus minusve cinctis, maculis pallidis, flavescens, irregularibus insidentibus; uredosporis subglobosis v. ellipsoideis, dilute flavidis, episporio crasso (5 μ .), verruculoso, 22-29 \approx 16-23; teleutosporis conformibus, uredosoris immixtis, pulverulentis, atris; teleutosporis castaneis, subglobosis, subovoideis v. piriformibus, infra rotundatis v. attenuatis, supra rotundatis, apice summo (papillæ loco) typice truncatis et ibidem episporio pallido præditis, 25-32 \approx 20-26, episporio crassiusculo (3 μ .), obscuriori, levi, plasmate minute granuloso farctis; pedicello hyalino, usque ad 60 μ . longo, 4 μ . cr., sed mox fragili.

Hab. in foliis Geranii striati prope Abellinum (Avellino) et M. Matese Italiæ merid.

4. **Uromyces extensus** (Arth.) Syd., Mon. Ured. II (1910) pag. 148, 2102 *Pileolaria extensa* Arthur, North Amer. Fl. Ured. p. 148 (1907). — Uredosoris amphigenis vel cauliculis, ramulos foliaque juniora plerumque omino denseque obtegentibus, deformationes efformantibus, minutis, pulverulentis, mox nudis, cinnamomeis; uredosporis ovatis, ellipsoideis v. fusiformibus, lineis rectis v. subrectis e verrucis minutis dispositis ornatis, flavo-brunneis, 28-42 \approx 18-25, episporio c. 3 μ . cr., poris germ. ut videtur 3 instructis; teleutosporis adhuc ignotis.

Hab. in foliis ramulisque junioribus Rhois (Pistaciæ) mexicana, Zapotlan Mexico (PRINGLE).

5. **Uromyces propinquus** Syd., Mon. Ured. II (1910) pag. 149. Syn. 2103 *Pileolaria mexicana* Arth., North Amer. Fl. Ured. p. 149 (1907), non *Urom. mexicanus* Diet. et Holw. — Uredosoris hypophyllis, maculis purpurascens insidentibus, sparsis v. aggregatis confluentibusque, mediocribus, c. 0,5-1 mm. diam. v. confluendo majoribus, pulverulentis, obscure rufo-brunneis; uredosporis ovatis v.

ellipsoideis, lineis rectis b. subrectis e verrucis minutis hyalinis dispositis ornatis, brunneis, 28-52 \approx 24-32, episporio crasso (3-4 μ .), poris germ. plerumque 3 instructis; teleutosporis adhuc ignotis.

Hab. in foliis *Rhois* (*Styphoniæ*) mollis, Oaxaca in Mexico (HOLWAY).

6. **Uromyces Toxicodendri** Berk. et Rav., *Grevillea* III (1874) p. 56; 2104
 Sydow, *Mon. Ured.* II (1910) p. 146, tab. V, fig. 85, *Pileoloria brevipes* Berk. et Rav. *Grevillea* III (1874) p. 58. — Uredosoris primariis plerumque in petiolis et nervis foliorum evolutis, plus vel minus expansis et usque 2 cm. long., crassis, pulverulentis, cinnamomeis; secundariis amphigenis, sparsis, minutis, punctiformibus, dilute brunneis; uredosporis primariis ellipsoideis apice papilliformi-protractis ibique dilutioribus, lineis sporam spiraliter circumdantibus e verrucis minutis dense aggregatis hyalinis dispositis præditis, dilute brunneis, 30-54 \approx 24-32, poris germinationis duobus instructis, episporio c. 3,5 μ . cr.; secundariis eadem fere forma et structura, sed minoribus 28-40 \approx 20-27; teleutosoris amphigenis, præsertim epiphyllis, maculis flavidis plerumque insidentibus, minutis, sparsis v. subinde aggregatis, rotundatis, usque ad 1 mm. diam., pulverulentis, atris; teleutosporis globoso-lenticularibus, apice basique plus minusve compressis, ad pedicelli insertionem excavato-umbonatis, verrucoso-undulatis, obscure castaneo-brunneis, 16-23 μ . altis, 23-28 μ . latis; pedicello persistenti, hyalino, usque ad 75 μ . longo.

Hab. in foliis et petiolis *Rhois aromaticæ*, *floridanæ*, *radicantis*, *Rydbergii*, *Toxicodendri*, *America bor.*, *Japonia*. — Ab *U. Terebinthi* differt uredosporis omnino diversis et pedicello teleutosporarum brevioribus.

7. **Uromyces patzcuarensis** Holw., *Ann. mycol.* (1904) p. 393; Arthur, 2105
North Amer. Fl. VII (1907) p. 148 (*Pileolaria*). — Pycnidiis epiphyllis, gregariis, in parvos greges 0,5-1 mm. diam., confertis, papillatis, primitus subcuticularibus, sed manifestis, dein nigricantibus, hemisphærico-depressis, 80-120 μ . diam.; uredosoris amphigenis, irregulariter sparsis, rotundatis, minutis, 0,1-0,2 mm. diam., mox nudis, pulveraceis, pallide cinnamomeo-brunneis; uredosporis late fusiformi-ellipsoideis 30-40 \approx 23-29, utrinque ex obtuso acutatis; tunica brunnea 3-4 μ . cr., supra usque ad 5-8 μ . incrassata, verrucosa, verrucis subseriatis, poris minutis 3, æquatorialibus prædita; teleutosoris plerumque epiphyllis, sparsis, rotundatis, 0,2-0,7 mm. diam., mox nudis compactis, theobromino-brun-

neis; teleutosporis primum globosis, utrinque depressis, demum discoideis, 30-38 \times 12-15; tunica theobromino-brunnea, 5-6 μ . cr., crebre sed indistincte verrucosa, apice non umbonato; pedicello hyalino, firmo, 5 μ . cr., 50-75 μ . long. basi rugosulo.

Hab. in foliis *Rhois schmidelioidis*, *R. Emoryi*, *R. mollis*, Patzcuaro et Oaxaca, Mexico.

8. **Uromyces Fremonti** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 29. — Soris 2106
 uredosporiferis amphigenis, sine maculis, sparsis, rotundatis, minutis vel mediocribus, ca. 1-2 mm. diam., primo epidermide tectis, tandem ea fissa cinctis, pulverulentis, brunneis; uredosporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, echinulatis, dilute brunneis, 20-26 \times 16-22; soris teleutosporiferis conformibus, epidermide diutius tectis, obscurioribus; teleutosporis subglobosis, ovatis vel oblongis, apice rotundatis vel acutiusculis, incrassatis usque ad 7 μ ., levibus, brunneis, 23-35 \times 14-21, episporio 2 $\frac{1}{2}$ -3 μ . crasso; pedicello brevi, hyalino, deciduo.

Hab. in foliis *Oenotheræ* (*Megapterii*) *Fremonti* in Kansas Amer. bor. — Affinis *Urom. plumbario* sed teleutosporæ majores, crassius tunicatæ etc.

9. **Uromyces paradoxus** Syd., Ann. Mycol. VII (1909) pag. 543. — 2107
 Uredosoris hypophyllis, maculis orbicularibus 3-6 mm. latis, fuscis insidentibus, in greges rotundatos 3-5 mm. latos, laxe v. irregulariter dispositis, minutis, c. $\frac{1}{3}$ mm. diam., subdiscoideis, compactiusculis, brunneis; uredosporis subglobosis v. sæpius ellipsoideis v. oblongis, laxe echinulatis, dilute brunneis, 25-35 \times 20-25, episporio c. 3-3,5 μ . cr.; teleutosporis immixtis fusiformibus, apice abrupte acutatis, basim versus attenuatis, levibus, rectis v. leniter inæquilateralibus aut curvulis, dilute brunneis, 50-70 \times 12-18, episporio 1 μ . cr.; pedicello subnullo.

Hab. in foliis *Commiphoræ* sp. Africa or. lusitanica (C. W. HOWARD).

10. **Uromyces lychnidicola** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX, 2108
 (1909) p. 313, *Urom. sparsus* (Kze. et Schum.) Lév. var. *lychnidicola* Speg. — Syll. XVI, p. 258.

Hab. in foliis *Lychnidis patagonicæ* et speciei indeterminatæ in herbosis, Rio Santa Cruz, Cerro de Plata, Mendoza Americæ austr.

11. **Uromyces verruculosus** Schröt., 50 Jahresb. Ges. (1872) p. 140, 2109
 non B. et Br. (1873). — Ita vocandus *Urom. Schröterianus* De

De Toni in Syll. fung. VII, p. 551, nam reapse species Schröteriana est anterior.

12. **Uromyces formosus** Syd., Ann. Mycol. VI (1908) pag. 527. — 2110

Uredosoris amphigenis, sparsis v. aggregatis ellipticis v. oblongis $\frac{3}{4}$ -2 mm. long., epidermide diu tectis, dein ea fissa cinctis, pulveraceis, ochraceo-brunneis; uredosporis subglobosis v. ovoideis v. ellipsoideis, dense minuteque verrucosis, flavo-brunneis 18-28 \approx 18-25, episporio 2,5-3,5 μ . cr.; teleutosoris foliicolis v. cauliculis, dimorphis, in foliis sparsis, ellipticis $\frac{3}{4}$ -2 mm long., subcutaneo-erumpentibus brunneis v. atro-brunneis, pulveraceis, in caulibus majoribus elongatis 0,5-2 cm. long., epidermide diu tectis; teleutosporis subglobosis v. ovoideis apice papilla majuscula 2-3 μ . alt. dilutiore auctis, levibus, brunneis, 25-32 \approx 23-28, episporio 3-3,5 μ . cr.; pedicello hyalino sporam subæquante, crassiusculo.

Hab. in foliis caulibusque Dianthi Libanotidis, D. criniti, D. macranthoidis in Persia occid. et boreali-occidentali (TH. STRAUSS).

13. **Uromyces Stellaris** Syd., Ann. Mycol. VI (1908) p. 526. — Te- 2111

leutosoris amphigenis, maculis indeterminatis flavidis plerumque insidentibus, in greges rotundatos vel irregulares ad 1 cm. latos plus minus dense dispositis, epidermide diutius tectis vel semivelatis, pulveraceis, atro-brunneis; uredosporis immixtis globosis, v. subgloboso-ellipsoideis, echinulatis, flavis, 19-28 \approx 17-23, episporio 1,5-2 μ . cr.; teleutosporis globosis v. subgloboso-ellipsoideis, apice rotundatis et papilla dilutiore minuta præditis, verrucosis (verrucis sublineatim dispositis) brunneis, 18-28 \approx 17-25, episporio 2-3 μ . cr., pedicello brevi hyalino, tenui, deciduo.

Hab. in foliis Stellaris Kotschyanae in Persia occid. (TH. STRAUSS). — Affinis Urom. Gypsophilæ.

14. **Uromyces Arenaris** Tranzschel, Ann. Mycol. (1907) p. 547. — 2112

Teleutosoris lineari-oblongis, epidermide rupta cinctis, subpulverulentis, atro-fuscis; teleutosporis subglobosis vel ellipsoideis, 22-27 \approx 17-22, episporio brunneo, crasso (2-3 μ .), levi, apico papilla hyalina, lata, 2-3 μ . alta, ornato, pedicello fragili.

Hab. in foliis Arenaris capillaris Poir, ad fines provinciarum Turgaj et Uralsk Rossis in montibus Mugodzaricis (V. DUBIANSKY). — Uredosporæ ignotæ, sed probabiliter adsunt.

15. **Uromyces Alsines** Tranzschel, Ann. Mycol. V. (1907) p. 547. — 2113

Uredo-teleutosoris rotundatis, mox nudis, pulverulentis, atro-fuscis; uredosporis globosis vel subglobosis, 21-25 \approx 20-22, episporio

fusco echinulato, poris germinantibus 3; teleutosporis globosis, 18-22 μ . diam., episporio castaneo-brunneo, apice papilla lata, plana subhyalina ornato, verruculis parvis rotundis sat dense obsito, pedicello fragili.

Hab. in foliis et calycibus *Alsines setaceæ* prope Simferopol Tauriæ Rossia.

16. **Uromyces melosporus** (Therry) Sydow, *Myc. germ.* n. 456 et *Ann.* 2114 *Myc.* IV (1906) p. 484, *Uredo melospora* Therry, *Ann. Soc. bot. Lyon* II (1873-74) p. 148. Ita vocandus *Uromyces Alchemillæ-alpinæ* Ed. Fisch., *Bull. Soc. bot. Fr.* (1894) p. CCXLI et *Ured. Schw.* p. 46, *Trott. Fl. It. crypt. Ured.* p. 63. — Uredosoris ut *Urom. Alchemillæ*; uredosporis 21-28 \approx 18-21, tunica parum incrasata, hyalina, echinulata; teleutosoris pierumque hypophyllis, rotundatis v. elongatis, diu tectis; teleutosporis subglobosis v. ellipsoideis, 25-35 \approx 25-28, tunica crassa, pallide brunnea, verrucis irregularibus, majusculis instructa, v. levi v. parum verrucosa.

Hab. in foliis *Alchemillæ alpinæ*, M. S. Bernardo, colle di Tenda et in Helvetia. — Uredosoris paullo minoribus, generatione teleutosporarum unica nec duplici et matrice peculiari videtur differre ab *Uromycete Alchemillæ*, ergo potius notis biologicis quam morphologicis.

17. **Uromyces Usteri** Spegazz., *Fungi Paulist.*, *Rev. Mus. La Plata* 2115 t. XV, pag. 7, fig. A, 1-5. — Uredosoris hypophyllis pulvinatis albidis v. aurantiacis, minutis, 0,3-0,9 mm. cr., irregulariter sparsis vel hinc inde glomeratis, pulverulentis; uredosporis subglobosis, 20-25 μ . cr., episporio crassissimo præcipue superne atque grosse papilloso hyalino, endoplasmate aurantio guttulato; teleutosoris compactiusculis hemisphæricis roseo-aurantiacis; teleutosporis ovatis v. obovatis, 30-40 \approx 24-30, episporio hyalino superne crassissimo, longitudinaliter spiraliterque 5-10-sulcato-striato, striis minute denseque denticulatis, endoplasmate grosse guttulato fusco-aurantiaco, pedicello 20-40 \approx 5-6, hyalino fragilissimo suffultis.

Hab. ad folia *Rubi urticifolii* in dumetis Avenida Paulistana Brasilia (USTERI).

18. **Uromyces Arthuri** Syd., *Mon. Ured.* II (1910) p. 203. — Teleu- 2116 tosoris hypophyllis, irregulariter sparsis v. aggregatis, perexiguis, c. 0,1-0,2 mm. diam., albidis, compactiusculis; uredosporis immixtis late ellipsoideis, ovato-ellipsoideis v. ellipsoideo-oblongis, lineis subrectis e verrucis crassis dense stipatis compositis obsitis, hyalino-flavis, 20-25 \approx 16-20, episporio 2-2,5 μ . cr. ad apicem usque

5 μ . cr., poris germinativis indistinctis; teleutosporis plerumque oblongis, sed forma valde peculiari et variabili, apice incrassatis (5-10 μ .) inciso-lobatis, quasi processibus 1-10 μ . latis, humilibus 3-6 μ . long., semper obtuse rotundatis sæpe irregularibus præditis, basim versus attenuatis, sæpe cuneatis, levibus, subhyalinis, 20-42 μ . long., quoad latitudinem variabilibus, ad apicem plerumque latioribus (usque ad 32 μ .), deorsum angustioribus (18-24 μ .), episporio 1-1,5 μ . cr.; pedicello brevi, hyalino.

Hab. in foliis Rubi Schiedeani, Verapag Guatemala Americae centr. (H. v. TUERCKHEIM).

19. **Uromyces Usterianus** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) pag. 96. — 2117

Maculis rubiginosis, flavo-areolatis circularibus; soris hypophyllis minutis in acervulos rotundatos ca. 6 mm. latos, congestis cinnamomeis nudis; teleutosporis obovatis vel clavatis, apice rotundatis vel conoideis, 25-38 \approx 13-20, apice usque 9 μ . incrassatis, levibus flavo-brunneis, pedicello usque ad 80 μ . longo, hyalino firmo suffultis.

Hab. in foliis Myrtaceæ cujusdam, S. Paulo Brasiliæ (A. USTERI). *est U. myosurus Diet., Syd. 23 652.*

20. **Uromyces elatus** Syd., Ann. Myc. VI (1908) p. 482, Mon. Ured. 2118

II, p. 112, tab. IV, fig. 73. — Pycnidiis epiphyllis, minutis, flavo-brunneis; æcidiis hypophyllis, maculis minutis orbicularibus flavidis vel obsolete insidentibus, sparsis, solitariis vel raro binis trinis aggregatis, diu omnino clausis et hemisphæricis, tandem applanatis et poro rotundo apertis, $\frac{1}{2}$ -1 mm. latis, flavis; contextu e cellulis angulato-globosis magnis laxè coalitis hyalino-flavidis verrucosis 45-70 μ . diam., composito; æcidiosporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, verrucosis, hyalino-flavidis, 28-38 μ . diam., episporio ca. 3 $\frac{1}{2}$ μ . crasso; soris teleutosporiferis hypophyllis, maculis orbicularibus flavidis sæpe insidentibus, minutis, sed in greges rotundatos vel irregulares usque 1 $\frac{1}{2}$ cm. longos, dense dispositis, compactis, flavo-brunneolis; teleutosporis oblongis vel oblongo-cylindræis, apice rotundatis, non incrassatis, basi attenuatis vel etiam rotundatis, levibus, hyalino-flavidis, 40-68 \approx 17-21; pedicello crasso, firmo, hyalino, sporam circiter æquante.

Hab. in foliis vivis Lupini ramosissimi, La Paz Boliviae, 3700 m. s. m. (O. BUCHTIEN).

21. **Uromyces lupinicola** Bubák, Stzb. k. böhm. Ges. Wiss. Prag 2119

(1902) extr. pag. 8; Sydow, Uredin. 2155, Mon. Ured. II (1909) p. 114. — Uredosoris hypophyllis, sparsis, minutis, rotundatis, pul-

verulentis, cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, laxe breviterque echinulatis, flavo-brunneolis, 18-24 \approx 15-20, episporio tenui (c. 1-1,5 μ); teleutosoris conformibus, obscurioribus; teleutosporis subglobosis v. sæpius ovatis aut piriformibus, apice papillula minutissima auctis, basi plerumque in pedicellum attenuatis, verrucosis, brunneis, 21-30 \approx 13-20; pedicello hyalino tenui.

Hab. in foliis Lupini sp. pr Pragam Bohemiæ (HOFFMANN), in foliis Lupini angustifolii in Megalopolitania (SYDOW). — Ab *U. renovato* Syd. (= *U. Lupini* Sacc. nec Berk. et Curt.) differt uredosporis tunica tenuiori præditis, teleutosporis minoribus minus verrucosis ovoideis v. piriformibus.

22. **Uromyces montanus** Arthur, Bot. Gaz vol. XXXIX (1905) 2120 p. 386; Sydow, Mon. Ured. II, p. 112, tab. IV, fig. 74. — Teleutosoris hypophyllis, maculis orbicularibus flavis v. flavo-brunneis insidentibus, minutis, sed in greges rotundatos usque ad 1 cm. diam., dense et circinatim dispositis, compactis, cinnamomeo-brunneis, ob germinationem teleutosporarum plerumque cinereis; teleutosporis ovatis, oblongis v. oblongo-clavatis, apice rotundatis, incrassatis (4-7 μ), basi attenuatis, levibus, hyalino-flavidis, 30-40 \approx 17-24; pedicello hyalino, crasso, persistenti, usque ad 60 μ . longo.

Hab. in foliis Lupini mexicani, Nevada de Toluca Mexico (E. W. D. HOLWAY).

23. **Uromyces rugosus** Arthur, Bot. Gaz. v. XXXIX (1905) p. 386; 2121 Sydow, Mon. Ured. II, p. 115. — Uredosporis hypophyllis, sparsis, minutis, c. $\frac{1}{3}$ - $\frac{3}{4}$ mm. diam., rotundatis, cinnamomeis; uredosporis globosis v. subglobosis, minute et sparse verrucosis, flavis 21-27 \approx 20-24, episporio 2-2,5 μ . cr., poris germinativis 8 sparsis instructis; teleutosoris hypophyllis, sparsis v. subinde aggregatis, minutis, 0,5-1 mm. diam., mox nudis, pulverulentis, obscure brunneis; teleutosporis subglobosis v. late ellipsoideis, apice papilla humillima hyalina præditis, dense verrucosis, brunneis, 19-26 \approx 18-23, episporio 2-3 μ . cr., pedicello brevi hyalino, deciduo.

Hab. in foliis Lupini sp., Amecameca Mexico (E. W. D. HOLWAY). — Ab *Urom. occidentali* uredosporis verrucosis nec minute echinulatis præcipue differt.

24. **Uromyces substriatus** Sydow, Ann. Mycol. IV (1906) pag. 30; 2122 Mon. Ured. II, p. 113. — Teleutosoris sparsis v. circulariter dispositis, rotundatis, minutis, pulverulentis, brunneis; teleutosporis

globosis, subglobosis, ovatis vel ellipsoideis, apice papillula minutissima hyalina præditis, tenuiter striatis, brunneis, 18-25 \approx 12-18; pedicello brevi, hyalino.

Hab. in foliis *Lupini argentei*, Livingston, Montana Americæ bor. (leg. A. B. SEYMUR).

25. **Uromyces renovatus** Sydow, Mon. Ured. II (1909) pag. 113. — 2123
Ita dicendus *Uromyces Lupini* Sacc. — Syll. VII, p. 554 — non Berk. et Curt.

26. **Uromyces Lupini** Berk. et Curt., Proceed. Amer. Ac. Sc. IV 2124
(1858) p. 127; *Uredo Lupini* B. et C. — Syll. VII pag. 852. — *Uromyces tomentellus* Cke. — Syll. VII, p. 585 — *Urom. Astragali* var. *Lupini* De Toni — Syll. VII, p. 550. — Ab *U. renovato* et *U. lupinicola* præcipue differt teleutosporis levibus et statu æcidiali præsentibus.

27. **Uromyces Ervi** West., Bull. Ac. R. Sc. de Belg. XXI P. II 2125
(1854) p. 246; Sydow, Mon. Ured. II, pag. 96. — *Æcidiiis* (*Æc. Ervi* Wallr.) amphigenis v. petiolicolis, solitariis v. paucis (2-5) in greges minutos dispositis, cupulatis, albidis, margine leniter revolutis, parum inciso; æcidiosporis angulato-globosis v. ellipsoideis, dense minuteque verruculosis, hyalino-flavescentibus, 16-25 \approx 14-18; uredosporis rarius evolutis, amphigenis, petiolicolis vel cauliculis, sparsis, minutis, oblongis, epidermide fissa cinctis, cinnamomeis; uredosporis ovatis v. ellipsoideis, laxè echinulatis, flavo-brunneolis, 20-30 \approx 18-22, poris germinativis 2 (raro 3) instructis; teleutosporis amphigenis v. sæpius petiolicolis cauliculisque, sparsis, minutis, oblongis, epidermide fissa cinctis, atro-brunneis; teleutosporis subglobosis, ovatis v. ellipsoideis, apice plerumque rotundatis, valde incrassatis (usque ad 8 μ .), basi rotundatis vel attenuatis, levibus, brunneis, 20-28 \approx 14-20; pedicello persistenti, brunneolo, sporam æquante v. eam duplo superante.

Hab. in foliis petiolis caulibusque *Ervi hirsuti*, Europa, Japonia.

28. **Uromyces Briardi** Hariot, Bull. Soc. Myc. Franc., VIII (1892) 2126
p. 38 et Les Uredin. in Encycl. scient. (1908) pag. 213; Sydow, Mon. Ured. II, p. 138, tab. V, fig. 82. — Uredosporis plerumque hypophyllis, sparsis v. hinc inde aggregatis, minutis, pulverulentis, dilute brunneis; uredosporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, echinulatis, flavo-brunneis, 19-23 \approx 18-21, episporio 1,5 μ . cr., poris germinativis 3-5 instructis; teleutosporis conformibus, obscure brunneis; teleutosporis subglobosis v. ovatis, apice non in-

crassatis, haud papillatis, ubique verrucis magnis crassis conicis subhyalinis laxè dispositis obsitis, brunneis, 22-32 \approx 20-25, pedicello hyalino, tenui, deciduo.

Hab. in foliis *Viciæ sativæ*, Dépt. Aube Gallia. — Teleutosporis grosse tuberculatis imprimis distinctus.

29. **Uromyces corrugatus** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2127 (1909) p. 311. — Maculis nullis v. totum folium leniter dealbans; teleutosporis sæpius hypophyllis minutis 0,20-0,40 mm. diam. erumpentibus subpulverulentis sparsis v. laxè gregariis; teleutosporis subobovatis v. ovatis 30-35 \approx 18-20, episporio sursum incrassatulo obscure ferrugineo, sæpe in umbonem parvulum producto, vestitis, udis levibus, siccis dense radiatim corrugatis, fuliginis, pedicello vix longiore hyalino fluxili fultis.

Hab. in foliis vivis *Viciæ patagonicæ*, secus Rio Sehuen Patagonia Amer. austr. — *Urom. appendiculato* et *U. striato* affinis sed certe distinctus.

30. **Uromyces Heimerlianus** P. Magn., Ber. deutsch. bot. Ges. XXV 2128 (1907) p. 253, tab. IX, fig. 23-31; Sydow, Mon. Ured. II, p. 137. — Uredosporis hypophyllis, sparsis, minutis, mox nudis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis globosis v. subglobosis subtiliter verruculosis, flavo-brunneis, 18-24 μ . diam., episporio c. 1,5 μ . cr., poris germinativis plerumque 3-5 instructis; teleutosporis conformibus, obscurioribus; teleutosporis globosis, subglobosis v. ovatis, apice subinde papillula humillima auctis, dense minuteque verruculosis, brunneis, 20-30 \approx 18-25, episporio 1,5 μ . cr.; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis *Viciæ hirsutæ* prope Brixen Tirolia (G. HEIMERL). — *U. Fischeri-Eduardi* affinis, ab eo differt teleutosporis minoribus papilla minori præditis.

31. **Uromyces Nordenskjöldii** Diet., Öfvers. K. Vetensk.-Akad. Förhandl. (1899) p. 746; Sydow, Mon. Ured. II (1909) p. 138. — Teleutosporis præsertim epiphyllis, sine maculis, sparsis, minutis, c. $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam., rotundatis, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, castaneis; teleutosporis late ellipsoideis, ovatis v. subglobosis, apice papilla hyalina medioeri ornatis, subtiliter verruculosis, flavo-brunneis, 23-33 \approx 20-26, episporio c. 1,5 μ . cr.; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis *Viciæ* sp., Punta Arenas Americae austr. (P. DUSÉN).

32. **Uromyces kisantuensis** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, 2130

Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) p. 88; Sydow Mon. Ured. II, p. 122. — Maculis minutis gregariis, fuscis; uredosoris hypophyllis minutis pulvinatis, gregariis, ferrugineis, paraphysibus clavatis brunneis, 20-40 \times 6-10; uredosporis subglobosis castaneis, verrucosis, 18-23 μ . cr.; teleutosoris atro-ferrugineis, gregariis hypophyllis; teleutosporis subglobosis, verrucosis, atro-castaneis vertice haud incrassatis, 18-24 μ . crassis, pedicello hyalino 15-20 \times 4-5.

Hab. in foliis *Dolichi* sp., Kisantu Congo, Afric. trop. (VANDERYST). — Ab *U. Dolichi* differt teleutosporis tunica tenuiori sed verrucis crassioribus prædita.

33. **Uromyces Dolicholi** Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 2131 = *Uromyces*
 p. 27; Sydow, Mon. Ured. II, p. 96, tab. IV, fig. 67. — Uredosoris amphigenis, sparsis, rotundatis, 0,2-0,5 mm. lat., mox nudis, pallide cinnamomeo-brunneis, pulverulentis; uredosporis globosis (Speg.) *Uromyces*
 18-21 μ . diam., tunica cinnamomeo-brunnea, 1,5-2 μ . cr., minute (Speg.) *Uromyces*
 et crebro echinulata, poris germinativis 4 æquatorialibus prædita; teleutosoris amphigenis, sparsis, rotundatis, 0,2-0,2 mm. diam., mox nudis, cinnamomeo-brunneis, pulverulentis; teleutosporis oblongis v. oblongo-lanceolatis, 26-32 \times 10-15, utrinque angustatis, tunica pallide brunneo-aurata, levi, tenui, usque ad 1 μ ., apice crassiore, 3-6 μ ., apiculo hyalino præditis; pedicello angusto, sporam dimidiam æquante, hyalino.

Hab. in foliis *Dolicholi* (*Rhynchosia*) *texani*, S. Angelo Texas Amer. bor. (C. L. SHEAR).

34. **Uromyces Sojæ** (P. Henn.) Sydow, Ann. Mycol. IV (1906) p. 429; 2132
 Mon. Ured. II (1909) p. 128. — Uredo (cfr. *Uredo Sojæ* P. Henn. — Syll. XVII, p. 446). — Teleutosoris conformibus; teleutosporis globosis v. subglobosis, apice non incrassatis, dense verrucosis, castaneo-brunneis, 20-25 μ . diam.; pedicello tenui, hyalino, deciduo, paraphysibus immixtis.

Hab. in foliis *Sojæ* (*Glycines*) *hispidæ* in Japonia, Java, India or.

35. **Uromyces phaseolicola** Speg., An. Mus. Nac. B. Aires t. XIX (1909) 2133
 p. 314. — Maculis amphigenis irregularibus pallescentibus; soris hypophyllis laxè gregariis 0,20-0,40 mm. diam., erumpenti-superficialibus subpulverulentis, testaceis v. ferrugineis; uredosporis obovatis episporio sursum incrassatulo papilloso, deorsum tenui levi vestitis 25-30 \times 20, grosse uniguttulatis; teleutosporis e globoso obovatis, levibus, sureum crassiuscule tunicatis, eximie apiculatis,

subopacis, ferrugineis 30-35 \times 18-22, pedicello persistenti 25-35 \times 5-7, hyalino fultis.

Hab. in foliis vivis Phaseoli prostrati in campis prope Ledesma, Salto, Amer. austr. — Ab *U. appendiculato* uredosporis teleutosporisque conspicue majoribus atque pedicello graciliori diversa.

36. **Uromyces punctiformis** Sydow, Ured. Exsicc. n. 1513 (1901) et 2134 Mon. Ured. II (1909) pag. 122, tab. IV, fig. 76. — Teleutosoris epiphyllis, sine maculis, sparsis v. hinc inde aggregatis, minutissimis, punctiformibus, c. $\frac{1}{4}$ mm. diam., pulverulentis, atris; teleutosporis globosis, subglobosis v. late ellipsoideis, apice rotundatis, papilla flavida magna usque ad 8 μ . alta, hemisphærica instructis, verrucis hyalinis facile deciduis præcipue ad apicem laxè obsitis, castaneo-brunneis, 28-36 \times 24-30, episporio usque ad 4 μ . cr.; pedicello hyalino, crasso, sæpe flexuoso, in aqua lenissime intumescente et tunc usque ad 12 μ . lato, usque ad 80 μ . longo.

Hab. in foliis Vignæ strobiliphoræ prope Guadalajara Mexico (HOLWAY). — *U. appendiculato* et *U. Pазschkeano* proximus, differt soris epiphyllis, minutis, punctiformibus, pedicello teleutosporarum longiore et crassiore.

37. **Uromyces Vignæ** Barcl. in Addit. Ured. from the neighbourhood 2135 of Simla in Journ. Asiat. Soc. of Bengal, LX, pt. II (1891) p. 211, tab. V, fig. 19; Sydow, Mon. Ured. II (1909) p. 124. — Uredosoris amphigenis, minutis, sparsis, rotundatis, brunneolis; uredosporis globosis, subglobosis v. ovatis, dense echinulatis, brunneolis, 19-26 \times 18-19, episporio tenui; teleutosoris conformibus, obscure brunneis; teleutosporis ovatis, apice papilla humili pallidiore præditis, levibus, obscure brunneis, 27-35 \times 20-22, pedicello, hyalino usque ad 40 μ . longo.

Hab. in foliis Vignæ vexillatæ in India or. (BARCLAY).

38. **Uromyces Vignæ-luteolæ** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, 2136 Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) pag. 89. — Maculis rotundatis v. effusis, fuscis; soris plerumque hypophyllis, interdum epiphyllis sparse gregariis, fuscis; uredosporis subglobosis, ellipsoideis v. ovoideis, flavo-fuscidulis, aculeato-verrucosis, 18-26 \times 15-20; teleutosporis oblongo-ellipsoideis v. ovoideis vertice 7-8 μ . incrassatis, obtuse rotundatis, subhyalinis, 25-30 \times 18-20, castaneis, levibus, pedicello hyalino, 15-30 \times 3-4.

Hab. in foliis Vignæ luteolæ, Kisantu Congo, Afric. trop. (VANDERYST).

39. **Uromyces ? vignicola** P. Henn., Engl. Bot. Jahrb. XXXVIII (1905) 2137

pag. 103. — Maculis rotundatis gregariis v. effuso-confluentibus, amœne roseis; pseudoæcidiis plerumque hypophyllis, petioli- vel leguminiculis gregarie sparsis, primo hemisphærico-pulvinatis, roseolis v. flavidulis, dein cupulatis; æcidiosporis catenulatis, subglobo-angulatis, intus roseolis v. flavidulis, 15-25 μ . cr., episporio hyalino, levi.

Hab in foliis, petiolis fructibusque Vignæ sinensis, Amani Usambara Africæ (ZIMMERMANN).

40. **Uromyces Bæumlerianus** Bubák, Hedwigia XLVII (1908) p. 363 2138 cum icon; Sydow, Mon. Ured. II, p. 117. — Uredosoris amphigenis vel cauliculis, minutis, sparsis, rotundatis, punctiformibus, mox nudis, pulverulentis, dilute brunneis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, subtiliter echinulatis, flavo-brunneis, 20-28 \approx 17-22, episporio c. 1,5-2 μ . cr., poris germinativis 3-4 instructis; teleutosoris conformibus, obscure brunneis; teleutosporis globosis, subglobosis vel ovatis, apice papilla minuta brunneola auctis, tenuissime verruculosus, brunneis, 20-27 \approx 17-23, episporio c. 1-1,5 μ . cr.; pedicello tenui, brevi, hyalino, deciduo.

Hab. in foliis caulibusque Meliloti sp. prope Pressburg Hungariæ (J. A. BÆUMLER).

41. **Uromyces Loti** Blytt, Christiania Vidensk.-Selskabs Forhandl. 2139 (1896) n. 6 Extr. p. 37; Sydow, Mon. Ured. II (1909) pag. 110, *Urom. Euphorbiæ-Corniculati* Jord, Centralbl. f. Bact., II Abt. Bd. XI (1904) p. 791; *Puccinia Loti* Kirchn. — Syll. VII, p. 710. — Pycnidiis æcidiisque ut in *Urom. Pisi*; uredosoris amphigenis, sparsis, minutis, subinde confluendo majoribus, epidermide fissa cinctis, mox nudis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, laxe echinulatis, brunneolis 17-25 \approx 16-23, episporio 2,5-3 μ . cr., poris germinativis 2-5 instructis; teleutosoris conformibus, obscurioribus; teleutosporis globosis v. ovatis, apice papillula minutissima humili auctis, verrucis minutis sæpius longitudinaliter dispositis obsitis, brunneis, 17-25 \approx 14-21, pedicello brevi, hyalino, deciduo.

Hab. æcidia in foliis Euphorbiæ Cyparissiae, uredo- et teleutosporæ in foliis Loti corniculati, et varr. japonici, tenuifolii, uliginosi in Europa et Japonia.

42. **Uromyces flectens** Lagerh., Svensk. Bot. Tidskrift III (1909) 2140 p. 36. — Soris hypophyllis, præsertim nerviculis et petioliculis, majusculis, bullatis, diu tectis, dein pulveraceis, obscure brunneis; teleutosporis (ut *Uromycetis Trifolii-repentis*) subglobosis v. ovato-

ellipsoideis, apice rotundatis et minutissime hyalino-papillulatis sublevibus, brunneis 18-30 \approx 16-25, episporio 2 μ . cr.; pedicello hyalino, tenui brevi deciduo.

Hab. in foliis petiolisque Trifolii repentis in Bohuslan Sueciæ. — Ab *Ur. Trifolii-repentis* differret quia teleutosporis tantum præditus sit, hinc e sect. *Microuromyces*.

43. **Uromyces Trifolii-repentis** (Cast.) Liro, Acta Soc. pro Fauna et 2141
Fl. fenn. XXIX (1906) n. 6, p. 15; Sydow, Mon. Ured. II (1906)
p. 131, *Æcidium Trifolii-repentis* Castagne, Obs. I, p. 33 (1842)
et Catal. II, p. 215 (1851). — Ab *U. Trifolii* (Hedw. f.) Lév. —
Syll. VII, p. 534 pp. — differt statu æcidiali præsentis, uredosporis
poris germinativis numero minoribus, matrice etiam distincta.

Hab. in foliis petiolisque Trifolii repentis, Europa, Anatolia, Persia, Amer. bor., Argentina, Australia.

44. **Uromyces Spartii-juncei** Sydow, Mon. Ured. II (1909) p. 130. — 2142
Uredosoris cauliculis v. ramiculis, elongatis, epidermide primo tectis,
dein ea fissa cinctis, rimose erumpentibus confluentibusque, pulverulentis,
dilute cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobosis v. sæpius ellipsoideis
aut ovatis, laxe echinulatis, flavo-brunneis, 20-35 \approx 18-28, episporio c.
1,5-1 μ . cr., poris germinativis 3-6 instructis; teleutosporis immixtis
globosis, subglobosis, ovatis vel ellipsoideis, apice papillula minutissima
instructis, verrucis minutis lineatim dispositis obsitis, brunneis, 20-25
 \approx 16-20; pedicello hyalino, brevi.

Hab. in caulibus ramisque Spartii juncei prope Marseille Galliæ (CASTAGNE). — *U. Genistæ-tinctoriæ* proximus, sed differt præcipue uredosporis majoribus.

45. **Uromyces fulgens** Bubák, Ann. k. k. Naturh. Hofmus. Wien 2143
XXII (1907) pag. 82, *Æcidium fulgens* Hazsl. — Syll. VII, p. 785. —
Sydow, Mon. Ured. II, p. 89. — *Æcidii* hypophyllis v. sæpe etiam ramiculis,
maculis flavis vel fuscis rotundatis insidentibus, in greges maculam
explentes usque ad 1 cm. diam., laxe et eos ambientes ordinatis, cupulatis,
margine albido revoluto inciso; æcidiosporis angulato-globosis, subtiliter
verruculosis, flavescentibus, 18-24 \approx 15-20; uredosoris hypophyllis,
sparsis minutis, rotundatis, mox nudis, pulverulentis, cinnamomeis;
uredosporis globosis v. subglobosis, laxe minuteque echinulatis, flavo-brunneis,
20-25 μ . diam., episporio c. 2 μ . cr., poris germinativis 3-6 instructis;
teleutosoris conformibus, obscurioribus; teleutosporis globosis,

subglobosis v. ovatis, apice papillula minutissima hyalina instructis, quoad membranæ structuram variabilibus, verrucosis v. verrucoso-striolatis, brunneis, 15-25 × 14-19; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis ramisque *Cytisi austriaci*, *C. hirsuti* in Austria, Hungaria, Italia, Serbia, Bulgaria. — Ab *U. Genistæ-tinctoriæ* differt præcipue statu æcidiali presenti.

46. **Uromyces Cladrastidis** Kusano, Bot. Mag. Tokyo XIX (1905) 2144 p. 83. — Teleutosoris hypophyllis, sine maculis, sparsis, minutissimis, punctiformibus, c. $\frac{1}{10}$ mm. diam., pulverulentis, atris; teleutosporis globosis, subglobosis v. late ellipsoideis, apice leniter papilliformi incrassatis (c. 3 μ .), verruculosis, castaneo-brunneis, 18-26 × 16-20; pedicello hyalino, crassiusculo, usque ad 50 μ . long.; paraphysibus numerosis, curvulis, pallide flavis.

Hab. in foliis *Cladrastidis shikokianæ*, Chichibu in prov. Mushashi Japoniæ (Y. YABE). — Ab *U. shikokiano* teleutosporis magis rotundatis, et magis minute verrucosis differt.

47. **Uromyces shikokianus** Kusano, Bot. Mag. Tokyo XIX (1905) 2145 pag. 83 cum icon. — Teleutosoris hypophyllis, sparsis, minutissimis, punctiformibus, pulverulentis, atris; uredosporis (paucis tantum visis) obovatis v. ellipsoideis, verrucosis, flavo-brunneis, 25 × 20, episporio subtenui; teleutosporis ellipsoideis v. ellipsoideo-oblongis, apice conice papilliformi-incrassatis (usque ad 7 μ .) et dilutioribus, verrucis majusculis undique denseque obsitis, olivaceo-brunneis, 28-38 × 14-18; pedicello hyalino, crassiusculo, persistenti, sporam æquante v. eam superante; paraphysibus numerosis, curvulis, flavis.

Hab. in foliis *Cladrastidis shikokianæ* in Mt. Yan a ze, prov. Tosa Japoniæ (YOSHINAGA).

48. **Uromyces amurensis** Kom. — Syll. XVI, pag. 261. — Hujus 2146 synonymum est *Uromyces ædipus* Diet. in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1905) pag. 583, teste ipso cl. Diet. in litt. — Habitat quoque in *Cladrastide amurensi* var. *floribunda* in Japonia (KUSANO).

49. **Uromyces castaneus** Sydow, Mon. Ured. II (1909) p. 94, tab. IV, 2147 fig. 65. — Teleutosoris hypophyllis, sine maculis, per totam folii superficiem plus minusve sparsis vel eam æque obtegentibus, minutis, pulverulentis, atro-brunneis; uredosporis immixtis plerumque globosis, subtiliter echinulatis, flavo-brunneis, 14-18 μ . diam., episporio tenuissimo, c. 1-1,5 μ . cr., poris germinativis 3-4 in-

structis; teleutosporis plerumque globosis, apice papillula humilima auctis, subtilissime verruculosus, castaneo-brunneis, 18-22 μ . diam., episporio c. 3,5-4 μ . cr.; pedicello hyalino, tenui, usque ad 35 μ . longo.

Hab. in foliis *Desmodii incani*, Rio de Janeiro (ULE). —

Uromyceti tenuistipiti et *U. Hedysari-paniculati* affinis.

50. **Uromyces Hedysari-obscuri** (DC.) Carestia et Piccone, Erb. critt. 2148 it. ed. II, fasc. IX, n. 447 (1871), Sydow, Mon. Ured. II, p. 99; *Puccinia Hedysari-obscuri* DC. Synops p. 46 (1806); *Urom. Hedysari* Fuck. — Syll. VII p. 560. — *U. Hazslinszkii* De Toni — Syll. VII, p. 565 — *U. borealis* Peck — Syll. VII, p. 561.

Hab. in foliis, petiolis caulibusque *Hedysari* americani, borealis, flavescentis, *Mackenzii*, *obscuri* in Europa, Asia, Amer. bor.

51. **Uromyces Onobrychidis** (Desm.) Lév., Ann. Sc. Nat. 3 sér. VIII 2149 (1847) p. 371, *Uredo Onobrychidis* Desm., Cat. plant. omis. p. 25 (1823); *Puccinia Onobrychidis* Otth — Syll. XIV, pag. 297. — Uredosoris amphigenis, sparsis, minutis, subinde confluendo majoribus, mox nudis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, laxe echinulatis, pallide brunneis, 18-32 \times 15-23, episporio 1,5 μ . cr., poris germinativis plerumque 3 instructis; teleutosoris conformibus, obscurioribus; teleutosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, apice papillula minuta humili auctis, minute punctato-verruculosus, brunneis, 20-24 \times 17-21, pedicello brevi, deciduo.

Hab. in foliis *Onobrychidis arenariæ*, gracilis, montanæ, sativæ, viciifoliæ, in Europa.

52. **Uromyces Galegæ** (Opiz) Saccardo, Nuove Ruggini, in Acc. Padova XXIV (1874) p. 13, fig. 9-12, *Uredo Galegæ* Opiz, Seznam (1854). — Uredosoris subcircularibus v. oblongis, hypophyllis rarius epiphyllis et petiolicolis, 0,5-1 mm. diam., cinnamomeis, primum epidermide tectis dein erumpentibus; uredosporis sphaerico-subovoideis 18-20 μ . diam., pallide ochraceis, minute verruculosus, interea longiuscule hyalino-stipitatis; teleutosporis raro immixtis e globoso ovoideis eximie sulcato-tuberculatis, apice papillatis, brevi hyalino-stipitatis, brunneis, 22 \times 18, rarius globulosis et 20 μ . dm.

Hab. ad folia *Galegæ officinalis*, Selva in agro Tarvisino et Patavii Italiæ bor. — Species hæc inter syn. *Urom. Genistæ-tinctoriæ* aut *Ur. Laburni* locata fuit sed forte distingui meretur saltem biologice.

53. **Uromyces Phacæ-frigidæ** (Wahlbg.) Har., Journ. de Bot. (1893) 2151 p. 375; Sydow, Mon. Ured. II (1909) p. 119; *Æcid. Phacæ-frigidæ* Wahlb., Fl. lapp pag. 525 (1812); *Cæoma appendiculatum* Sommerf., Suppl. Fl. lapp. p. 232 (1826); *Urom. Phacæ-frigidæ* Lagerh., Tromsø Mus. Aarshefter XVI, 1893 (1894) pag. 151; *Urom. Genistæ* f. *Phacæ* Erikss., Fungi paras. Scandinav. fasc. VI. — Teleutosoris hypophyllis, plerumque per totam folii superficiem v. magnam ejus partem æque distributis, minutis, rotundatis, mox nudis, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, cinnamomeo-brunneis; teleutosporis subglobosis v. ovatis, apice sæpius minute papillatis, minutissime punctatis, brunneolis, 21-22 \approx 15-20, episporio tenui; pedicello hyalino, tenui, brevi.

Hab. in foliis *Phacæ frigidæ*, Norvegia, Fennia. — Ab *U. Phacæ* Thüm. differt habitu et teleutosporis majoribus.

54. **Uromyces lapponicus** Lagh. — Syll. IX, pag. 292. — *Uromyces* 2152 *carneus* (Nees) Har., Journ. de Botan. VII (1893) p. 376, Sydow, Mon. Ured. II, p. 69, tab. III, fig. 53, *Æcidium carneum* Nees, in Funk Krypt. Gew. Fichtelgeb. Heft 25, n. 523 (1818); *Æcid. Astragali* Erikss. — Syll. IX, p. 326.

Hab. in foliis *Astragali alpini*, australis in alpibus Austriæ, Helvetiæ, Sueciæ, Norvegiæ.

55. **Uromyces Jordianus** Bubák, Ann. mycol. III (1905) pag. 218, 2153 *Urom. Astragali* Jordi in Centralbl. f. Bakt. II Abt. XI, p. 763, non *Urom. Astragali* (Opiz). — Uredosoris amphigenis sparsis v. aggregatis, minutis, subinde confluendo majoribus, mox nudis, pulverulentis, dilute cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, laxe echinulatis, paucis sublevibus interdum imixtis, pallide brunneis, 17-24 μ . diam., episporio subtenui, 1,5-2,5 μ . cr., poris germinativis 6-8 præditis; teleutosoris conformibus, obscure brunneis; teleutosporis globosis v. ovoideis, apice non incrassatis, papillula minutissima humili hyalina auctis, dense minuteque verruculosus, brunneis, 15-22 \approx 14-20, pedicello brevi, hyalino deciduo.

Hab. in foliis *Astragali* excipi in Germania, Austria, Hungaria, Helvetia. — Ab *U. Astragali* (Op.) Sacc., uredosporis poris germinativis numerosis præditis præcipue differt.

56. **Uromyces persicus** Syd., Ann. Mycol. VI (1908) p. 17. — Pycni- 2154 diis ut videtur nullis; æcidiis hypophyllis, subinde etiam paucis epiphyllis, sparsis vel etiam per majorem folii partem laxè vel densiuscule et irregulariter distributis, cupulatis, margine revolutis,

inciso, albido; æcidiosporis angulato-globosis vel ellipsoideis, subtilissime verruculosus, hyalino-flavidis, 17-24 \approx 14-18; soris teleutosporiferis hypophyllis, sparsis, minutis, epidermide plumbea diutius tectis, pulverulentis, atro-brunneis; teleutosporis variabilibus, globosis, ovatis vel angulatis, apice rotundatis, papilla sæpe distincta hyalina auctis, levibus, in maturitate castaneo-brunneis, 23-35 \approx 21-28, episporio ca. 2 $\frac{1}{2}$ -3 μ . crasso; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis Astragali remotijugi, ad pagum Getschësär mont. Elburs occid. Persiæ borealis (BORNMÜLLER). — Ab *Ur. splendente* et *U. lapponico* teleutosporarum fabrica facile dignoscitur.

57. **Uromyces Orobi** (Schum.) Lév., Ann. Sc. Nat. 3^e ser., t. VIII (1847) 2155 p. 371 et 376, *Uredo Orobi* Schum. Enum. Plant. Sælland. p. 232, (1803); Sydow, Mon. Ured. II, p. 106. — Pycnidiis hypophyllis inter æcidia evolutis; æcidiis (*Æc. Orobi* Pers., *Æc. Orobi-tuberosi* Pers.) hypophyllis, maculis flavidis insidentibus, in greges rotundatos v. oblongos 1-5 mm. longos, dense dispositis, raro solitariis, brevibus, cupulatis, margine inciso albido revoluto; æcidiosporis angulato-globosis vel ellipsoideis, dense minuteque verruculosus, flavidis, 14-21 μ . diam.; uredosoris amphigenis, sparsis, minutis, punctiformibus, pulverulentis, brunneis, 20-28 \approx 18-25, episporio 3-4 μ . crasso, poris germinativis 3-4 instructis; teleutosoris conformibus obscure brunneis; teleutosporis subglobosis, ovatis vel ellipsoideis, apice rotundatis v. truncatis, valde incrassatis (7-11 μ .) levibus, brunneis, 25-35 \approx 18-28; pedicello persistenti, hyalino-flavido, crasso, usque ad 100 μ . long.

Hab. in foliis Lathyrî (Orobi) montani (= tuberosi) in Europa. Cfr. n. 97 (in Leguminosis).

58. **Uromyces Coluteæ** Arthur, Bull. Torr. Bot. Club. (1910) p. 574 2156 cum icon. — Pycnidiis et æcidiis ignotis; uredosoris hypophyllis, sparsis, rotundatis, parvis, 0,2-0,3 mm. diam., mox nudis, subpulverulentis, pallide cinnamomeo-brunneis, epidermide rupta conspicuis; uredosporis late ellipsoideis v. globosis, 21-27 \approx 18-24; tunica brunneo-aurata, 1,5-2 μ . cr., minute et crebro echinulata; poris germinativis 3 raro 4 æquatorialibus; teleutosoris conformibus sed obscurioribus; teleutosporis late ellipsoideis v. obovoideis 19-23 \approx 15-19, tunica cinnamomeo-brunnea, 1,5-2 μ . apice apiculo hyalino prædita, moderate et æqualiter verrucosa; pedicello brevi, hyalino, deciduo.

Hab. in foliis Coluteæ arborescentis, Manhattan Kansas

Amer. bor., Europa. — *Uromyces Caraganæ* (Thüm.) Manus (in *Colutea arbor.*! nec in *Caragana*!) verisimillime eadem species est. Cfr. Trott. Ured. Ital. p. 60.

59. **Uromyces mbelensis** P Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, 2157
Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) pag. 89. — Maculis minutis v. confluenso effusis, fuscidulis; soris amphigeneis sparsis v. gregariis, ferrugineis; uredosporis subglobosis brunneis, verrucosis 15-18 μ .; teleutosporis subglobosis v. ovoideis, vertice haud incrassatis, granulatis, brunneis, 15-20 μ . cr., pedicello hyalino, 20-30 \times 3 3,5.

Hab. in foliis *Indigoferæ* sp., Mbela Congo, Africae (VANDERYST). — Observante Sydow, Mon. Ured. II, p. 350, est forma tantum uredosporica.

60. **Uromyces orientalis** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 490; Mon. 2158
Ured. II, p. 102. — Soris uredosporiferis amphigenis vel cauliculis, sparsis, rotundatis, in caulibus oblongis, minutis, $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ mm. longis, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, breviter aculeatis, brunneis, 17-20 μ . diam., episporio 1 $\frac{1}{2}$ -2 μ . crasso; soris teleutosporiferis amphigenis vel sæpe etiam cauliculis, in foliis minutis, punctiformibus, rotundatis, sparsis, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam., in caulibus oblongis, subinde confluentibus, majoribus, compactis, atris; teleutosporis globosis, subglobosis, ovatis vel ellipsoideis, apice rotundatis, valde incrassatis (usque ad 10 μ .), levibus, castaneo-brunneis, 24-32 \times 20-28, episporio crasso (3-5 μ .); pedicello persistenti, crasso, hyalino vel flavido, usque 120 μ . longo.

Hab. in foliis caulibusque *Indigoferæ* linifoliæ (typus, uredo et teleutosporæ), Pusa, I. cordifoliæ, Poona Indiae or. (teleutosporæ tantum) (legit E. J. BUTLER). — *Uromyceti Indigoferæ* affinis.

61. **Uromyces insularis** Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1906) 2159
p. 515. — Uredosoris amphigenis, sparsis, parvis, rotundatis, 0,1-0,4 mm. lat., mox nudis, obscure cinnamomeo-brunneis; uredosporis globosis 23-25 \times 19-23, tunica brunneo-aurata, 1-1,5 μ . cr., sparse conoideo-echinulata, poris germinativis 3 æquatorialibus; teleutosoris amphigenis sparsis v. ovoideis, 0,2-0,8 mm. lat., mox nudis, leniter cinnamomeo-brunneis; teleutosporis late lanceolatis, utrinque rotundatis v. obtusatis 29-33 \times 15-18, tunica flavo-aurata, tenui 1 μ . c. cr., apice papilla hyalina 3-7 μ . cr., prædita; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

- Hab.* in foliis *Clitoria cyanifoliae*, prope Dorado, Porto Rico Amer. centr. (J. URBAN). — Ab *Ur. Clitoria* Arth. diversus.
62. **Uromyces Clitoria** Arthur, Bot. Gaz. v. XXXIX (1905) p. 389. 2160
 Uredosoris hypophyllis, sparsis, minutis, pulverulentis, brunneolis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, echinulatis, flavo-brunneis, 23-32 \approx 20-28, episporio c. 1,5-2 μ . cr., poris germinativis 3 ut videtur instructis; teleutosoris hypophyllis, conformibus, obscure brunneis; teleutosporis subglobosis, ovatis v. ellipsoideis, apice rotundatis, lenissime incrassatis (usque ad 4 μ .) minute denseque verruculosus, brunneis, 19-28 \approx 17-23, episporio c. 2-3 μ . cr.; pedicello tenui, hyalino, sporam circiter æquante, deciduo.
Hab. in foliis *Clitoria mexicana*, Jalapa Mexico (E. W. D. HOLWAY).
63. **Uromyces Erythrina** Lagerh., in Sydow, Mon. Ured. II (1910) 2161
 p. 357. — Uredosoris hypophyllis, maculis nullis v. obsoletis insidentibus, irregulariter sparsis v. hinc inde aggregatis, minutissimis, $\frac{1}{10}$ mm. diam., pulverulentis, brunneis; uredosporis globosis, subglobosis v. ovatis, laxè echinulatis, flavo-brunneis, 25-32 \approx 20-27, episporio 1,5 μ . cr.; teleutosoris conformibus, compactiusculis; teleutosporis oblongis, lanceolatis v. clavatis, apice plerumque conico-attenuatis, non incrassatis, levibus, flavidis, 26-35 \approx 14-18, episporio 1 μ . cr.; pedicello persistenti, tenui, hyalino, sporam circiter æquante.
Hab. in foliis *Erythrina* sp., Puente de Chimbo Æquatoria Amer. austr. (LAGERHEIM).
64. **Uromyces Vanderysti** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, 2162
 Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) p. 89; Sydow, Mon. Ured. II, p. 131. — Maculis fuscidulis effusis; uredosoris amphigenis sparsis v. aggregatis, pallide ferrugineis; paraphysibus clavatis v. falcatis, brunneis 40-80 \approx 10-14; uredosporis subglobosis, brunneis, verrucosis, 15-20 μ . cr.; teleutosoris amphigenis sparsis, ferrugineis; teleutosporis oblonge clavatis, apice rotundatis obtusis, interdum subcristatis, longitudinaliter 3-striatulis, hyalino-flavidis, 25-35 \approx 10-15, pedicello hyalino, usque ad 40 μ . longo, 5 μ . crasso.
Hab. in foliis *Teramni labialis*, Dolo, Congo Africae occ. (VANDERYST).
65. **Uromyces achrous** Syd., Ann. Mycol. V (1907) pag. 491; Mon. 2163
 Ured. II, p. 91, tab. IV, fig. 62. — Soris uredosporiferis hypophyllis, maculis nullis, sparsis, minutis, compactiusculis, epider-

mide tectis, dein nudis, flavo-luteis, tandem pulverulentis; uredosporis globosis, subglobosis vel ovatis, æqualiter verruculosis, 12-17 \approx 10-13, episporio subhyalino, ca. 1 μ . crasso; soris teleutosporiferis conformibus, subceraceis, compactiusculis, flavo-luteis teleutosporis oblongis vel fusiformibus, utrinque rotundatis vel obtuse attenuatis, apice non incrassatis, levibus, episporio hyalino, tenuissimo, 17-26 \approx 7-11, statim germinantibus; pedicello hyalino, tenui, ca. 20-25 μ . longo.

Hab. in foliis subinde etiam in ramulis Dalbergiæ Sissoo, Pusa, Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

66. **Uromyces Hardenbergiæ** Mac Alpine, Rusts of Australia (1906) 2164 pag. 94, tab. XVII, fig. 143-145, tab. G, fig. 34; Sydow, Mon. Ured. II (1909) p. 98, tab. IV, fig. 68. — Uredosoris hypophyllis, maculis minutis 1-3 mm. diam., brunneis insidentibus, sparsis v. paucis aggregatis, rotundatis, subinde confluentibus 0,5-1 mm. diam., epidermide rupta cinctis, brunneis; uredosporis subglobosis, ovatis, ellipsoideis vel piriformibus, subtiliter echinulatis, flavo-brunneis, 22-35 \approx 18-25, episporio c. 3-3,5 μ . cr.; poris germinativis 4-5 instructis; teleutosporis immixtis ovatis vel ellipsoideis, apice apiculo hyalino ornatis, levibus, brunneis, 25-28 \approx 18-21, episporio 3-3,5 μ . cr.; pedicello hyalino, persistenti, usque ad 35 μ . longo.

Hab. in foliis Hardenbergiæ monophyllæ in Victoria Australiæ.

67. **Uromyces decoratus** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 491; Mon. 2165 Ured. II, p. 88. — Uredosoris hypophyllis, maculis minutis flavis vel obsolete insidentibus, sparsis vel aggregatis, minutis, epidermide rupta cinctis, pulverulentis, dilute brunneis; uredosporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, echinulatis, dilute brunneis, 21-25 μ . diam., episporio ca. 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso; teleutosoris conformibus, atris; teleutosporis subglobosis, ovatis vel oblongis, apice non incrassatis, sed apiculo hyalino ca. 3 μ . alto, ornatis, basi rotundatis vel etiam attenuatis, verrucis majusculis longitudinaliter dispositis obsitis, castaneo-brunneis, 20-28 \approx 14-20, episporio ca. 1 $\frac{1}{2}$ -2 μ . crasso; pedicello tenui, hyalino, deciduo, sporam circiter æquante.

Hab. in foliis Crotalarïæ junceæ, Samalkota, Madras Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

68. **Uromyces Cologaniæ** Arthur, Bot. Gaz. vol. XXXIX (1905) 2166 pag. 387. — Uredosoris hypophyllis, maculis nullis vel minutis, brunneis insidentibus, sparsis, minutis, rotundatis, c. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ mm.

diam., mox nudis, pulverulentis, pallide brunneis; uredosporis globosis v. subglobosis, minute echinulatis, flavo-brunneis, 16-24 μ . diam., episporio 1,5-2 μ . cr., poris germinativis 3-4 æquatorialibus instructis; teleutosporis hypophyllis, conformibus, brunneis; teleutosporis hypophyllis, conformibus, brunneis; teleutosporis globosis, subglobosis v. ovatis, apice rotundatis, lenissime incrassatis vel minutissime papillatis, dense minuteque verruculosi, brunneis, 18-26 \approx 16-20, episporio 1,5-2 μ . cr., pedicello hyalino, deciduo, brevi.

Hab. in foliis Cologaniæ affinis, congestæ, pulchellæ in Mexico.

69. **Uromyces anthemophilus** Vestergr., Monogr. d. Urom. auf Bauhin. 2167
Stockh. (1905) p. 24, t. II, f. 16 (Ark. f. Bot. IV). — Teleutosporis in floribus et calycibus evolutis, variæ magnitudinis, 3-10 mm. long., pulverulentis, fuscis; teleutosporis globosis, subglobosis v. ovatis, apice rotundatis, non v. vix papillatis, distincte et regulariter reticulatis, dilute brunneis, 18-25 \approx 18-22, episporio c. 3-3,5 μ . cr., pedicello tenui, hyalino, deciduo.

Hab. in floribus calycibusque Bauhinia longifoliae, Cuyaba Matto Grosso Brasiliæ (G. MALME). — *U. florali* proximus; differt apiculo nullo, reticulatione magis distincta.

70. **Uromyces Bauhinia** (Berk. et Curt.) Vestergr., Ark. f. Bot. IV, 2168
(1905) pag. 21, tab. I, fig. 4, *Uredo Bauhinia* Berk. et Curt. — Syll. VII, p. 843 — Sydow, Mon. Ured. II, p. 76. — Uredosporis hypophyllis sine maculis, sparsis, minutis, punctiformibus, c. 1 mm. diam., pulverulentis, brunneis; uredosporis globosis, subglobosis v. breviter ellipsoideis, aculeatis, dilute brunneis, 26-30 \approx 24-26, episporio c. 2-2,5 μ . cr., poris germinativis 3 (raro 4) instructis; teleutosporis immixtis subglobosis v. breviter ellipsoideis, apice rotundatis, non v. lenissime incrassatis, distincte et minutissime reticulatis, obscure brunneis, 20-25 \approx 19-21, episporio 3 μ . cr., ad apicem usque ad 4 μ .; pedicello sporam circiter æquante, hyalino.

Hab. in foliis Bauhinia sp., Nicaragua Americæ centr. (C. WRIGHT).

71. **Uromyces prætextus** Vestergr. Monogr. d. Uromyc. auf Bauhin. 2169
Stockh. (1905) p. 19, tab. I, f. 2 (Ark. f. Bot. IV). Ita vocandus *Ur. Bauhinia* P. Henn. — Syll. XIV, p. 274. — non B. et C. — Syll. VII, p. 843 (*Uredo*).

72. **Uromyces bauhnicola** Arthur, in Vesterg. Monogr. d. Urom. auf 2170
Bauhin. Stockholm. (1905) p. 28, t. I, f. 9 (Ark. f. Bot. IV) et

Bot. Gaz. v. XXXIX (1905) p. 389. — Teleutosoris amphigenis, sparsis, minutis, punctiformibus, $\frac{1}{4}$ -1 mm. diam., atro-brunneis pulverulentis; teleutosporis subglobosis v. sæpius ellipsoideis aut ovatis, apice corona flavo-brunnea 3-5 μ . alta ornatis, distincte reticulatis (reticulis dimorphis, aliis sporæ propriæ rhomboideis 3-4 μ . altis, aliis coronæ valde elongatis) castaneo-brunneis, 20-26 \approx 17-21, episporio c. 3-4 μ . cr.; pedicello hyalino, 30-40 μ . longo, subpersistenti.

Hab. in foliis Bauhinia Pringlei et Bauhinia sp. in Mexico (HOLWAY).

73. **Uromyces congoensis** Syd., in De Wildem., Flore du Bas- et Moy. 2171

Congo t. III, fasc. 1 (1909) Extr. p. 10. — Teleutosoris amphigenis, maculis decoloratis insidentibus, sparsis v. irregulariter aggregatis, minutis, hinc inde confluentibus, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, obscure brunneis; uredosporis immixtis, globosis, subglobosis, ovatis v. ellipsoideis, longiuscule aculeatis, flavo-brunneolis, 23-30 \approx 21-25, episporio 2,5 μ . c. cr.; teleutosporis subglobosis, ovatis v. ellipsoideis, apice rotundatis, non v. lenissime incrassatis, laxe verruculosi, castaneo-brunneis, 18-28 \approx 18-23, episporio 2,5-3 μ . c. cr.; pedicello hyalino, sporam subæquante, deciduo.

Hab. in foliis Bauhinia sp., Dembo, Kiala, Kinkasi, Lazaret Saint-Jean (Congo), Africae occ. (VANDERYST). — *Urom. verruculoso* B. et Br. affinis, differt structura uredosporarum.

74. **Uromyces Fiebrigii** P. Henn. et Vestergr., in Vester. Monogr. d. 2172

Uromyc. auf Bauhinia Stockhol. (1905) p. 27, t. I, f. 8, *Urom. Dietelianus* Paz. var. *Fiebrigii* P. Henn. in litt. — Teleutosoris plerumque epiphyllis, sparsis vel in greges rotundatos 2-4 mm. diam., dispositis, minutis, c. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$ mm. diam., obscure brunneis, pulverulentis; uredosporis immixtis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, breviter laxequae echinulatis, flavo-brunneis, 19-24 \approx 16-19, episporio c. 1,5-2 μ . cr., poris germinativis 3 instructis; teleutosporis subglobosis v. sæpius ovatis aut ellipsoideis, apice corona flavo-brunnea 2-4 μ . alta v. subinde etiam humiliori instructis, distincte reticulatis, castaneo-brunneis, 19-27 \approx 17-22, episporio c. 3 μ . cr.; pedicello hyalino sporam circiter æquante.

Hab. in foliis Bauhinia sp. in Paraguay (FIEBRIG). — *U. superfixo* affinis sed differt teleutosporis minoribus et corona depressa præditis, uredosporis tunica tenuiori etc.

75. **Uromyces floralis** Vesterg., Monogr. d. Urom. auf Bauhin. Stockh. 2173
(1905) p. 23, t. II, f. 17 (Ark. f. Bot. IV), Sydow, Mon. Ured.

II, p. 77. — Teleutosoris in foliis, floribus, calycibus et ramis inflorescentiæ evolutis, variæ magnitudinis, in foliis minoribus, in ramis floribusque sæpe magnis, 2-20 mm. long., pulverulentis, epidermide fissa cinctis, castaneo-brunneis; teleutosporis globosis, subglobosis, ovatis v. breviter ellipsoideis, apice rotundatis, papillula humillima dilutiore usque ad 1,5 μ . alta præditis, distincte et regulariter reticulatis, dilute brunneis, 17-25 \times 17-20, episporio c. 2,5 μ . cr.; pedicello tenui, hyalino, deciduo.

Hab. in foliis, ramis inflorescentiæ, floribus, calycibus Bauhinia cuyabensis, hiemalis, holophyllæ et sp. affin. in Brasilia.

76. **Uromyces guatemalensis** Vestergr., Monogr. d. Uromyc. auf Bauh. 2174
Stockh. (1905) p. 20, t. I, f. 3 (in Ark. f. Bot. IV). — Teleutosoris hypophyllis, sparsis, minutis, punctiformibus, pulverulentis, atro-brunneis; uredosporis immixtis globosis v. subglobosis, sparse echinulatis, pallide brunneis, 19-24 \times 18-21, episporio c. 1,5 μ . cr., poris germinativis 3-4 plerumque æquatorialibus instructis; teleutosporis globosis, subglobosis, ellipsoideis v. ovatis, apice rotundatis, non v. lenissime incrassatis, distincte et regulariter reticulatis, castaneo-brunneis, 18-28 \times 18-24, episporio 2,5-3 μ . cr.; pedicello brevi, hyalino, deciduo.

Hab. in foliis Bauhinia sp. in Guatemala (BERNOULLI et CARIO). — *U. prætexto* proximus sed uredosporis et teleutosporis tenui-tunicatis papilla apicali minori sat distinctus.

77. **Uromyces Hemmendorffii** Vestergr., Monogr. d. Urom. auf Bauh. 2175
Stockh. (1905) pag. 32, t. I, f. 12 (Ark. f. Bot. IV). — Teleutosoris epiphyllis, sparsis, punctiformibus, $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ mm. diam. pulverulentis, castaneo-brunneis; uredosporis (paucis tantum visis) ellipsoideis v. ovatis, sparse aculeatis, flavo-brunneis, 23-28 \times 15-17, episporio 2 μ . cr., poris germinativis 4 instructis; teleutosporis globosis, subglobosis v. breviter ellipsoideis, apice rotundatis, corona nulla v. humili usque 2,5 μ . alta tantum ornatis, minute reticulatis, flavo-brunneis, 18-22 \times 16-18, episporio 2,5 μ . cr., pedicello brevi, deciduo.

Hab. in foliis Bauhinia forficatae, Sao Paulo Brasiliæ (E. HEMMENDORFF).

78. **Uromyces jamaicensis** Vestergr., Monogr. d. Uromyc. auf Bauhin 2176
(1905) p. 33, t. II, f. 14 (Ark. f. Bot. IV). — Teleutosoris amphigenis, sine maculis, sparsis v. hinc inde aggregatis, 0,5-1 mm. diam., pulverulentis, dilute castaneo-brunneis; teleutosporis sub-

globosis v. ovatis, apice rotundatis, corona subhyalina humili usque 2,5 μ . alta ornatis, distincte minuteque reticulatis, flavidis, 16-19 \approx 12-14, episporio 1,5 μ . cr.; pedicello brevi, hyalino, deciduo.

Hab. in foliis *Bauhinia* divaricatae in Mexico (KOERBER), *B. porrecta* et sp. affin. in Jamaica (LAGERHEIM, THAXTER).

79. **Uromyces pannosus** Vestergr., Monogr. d. Uromyc. auf Bauhinia. 2177

Stockh. (1905) p. 30, t. I, f. 11 (Ark. f. Bot. IV). — Uredosoris plerumque hypophyllis, sparsis, minutis, c. 0,5 mm. diam., pulverulentis, flavo-brunneis; uredosporis plerumque ovatis v. ellipsoideis, rarius globosis, breviter laxequae echinulatis, flavidis, 21-27 \approx 16-22, episporio 1,5-2 μ . cr., poris germinativis 4-5 (raro 6) instructis; teleutosoris conformibus, brunneis; teleutosporis plerumque ovatis v. ellipsoideis, apice corona flavo-brunnea c. 3-5 μ . alta ornatis, reticulatis, dilute castaneo-brunneis, 25-30 \approx 16-21, episporio c. 2 μ .; pedicello hyalino, tenui, spora plerumque brevior.

Hab. in foliis *Bauhinia* sp. Porto Alegre Brasiliae (G. MALME).

80. **Uromyces Perlebiae** Vestergr., Monogr. d. Uromyces auf Bauhin. 2178

Stockh. (1905) p. 26, t. I, f. 6 (Ark. f. Bot. IV). — Uredosoris amphigenis, sine maculis, sparsis, minutis punctiformibus, $\frac{1}{3}$ - $\frac{3}{4}$ mm. diam., pulverulentis, brunneis; uredosporis globosis, subglobosis, v. ellipsoideis, laxe echinulatis, flavidis, 22-26 \approx 21-24, episporio 1,5-2 μ . cr., poris germinativis 4 raro 5 instructis; teleutosoris conformibus, obscure brunneis; teleutosporis globosis, subglobosis v. breviter ellipsoideis, apice rotundatis et corona flavo-brunnea 2,5-3 μ . raro 4 μ . alta instructis, distincte reticulatis, obscure brunneis, 22-26 \approx 20-23, episporio 3-3,5 μ . cr.; pedicello hyalino, subpersistenti, sporam circiter æquante v. parum superante, crassiusculo.

Hab. in foliis *Bauhinia* (olim *Perlebiae*) pentandrae prope Cuyaba, Matto Grosso Brasiliae (G. MALME). — *U. foveolato* affinis.

81. **Uromyces regius** Vestergr. d. Urom. auf Bauhin. Stockh. (1905) 2179

p. 31, t. II, f. 13 (Ark. f. Bot. IV). — Teleutosoris amphigenis, sine maculis, sparsis, punctiformibus, $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam., obscure brunneis, pulverulentis; uredosporis immixtis globosis, subglobosis v. ovatis, echinulatis, flavo-brunneis, 16-23 \approx 16-20, episporio 2 μ . cr., poris germinativis 4 instructis; teleutosporis globosis, subglobosis v. ovatis, apice corona flavo-brunneola usque ad 6 μ . alta, ornatis, reticulatione variabili praeditis, dilute castaneo-brunneis, 20-27 \approx 17-20, episporio 2,5 μ . cr.; pedicello hyalino, tenui, sporam circiter æquante.

Hab. in foliis *Bauhiniæ candicantis*, Rio Grande do Sul Brasiliæ (C. A. M. LINDMAN). — *U. Dieteliano* et *pannoso* affinis sed differt præcipue uredosporis minoribus, fortius aculeatis etc.

82. **Uromyces superfixus** Vestergr., Monogr. d. Uromyc. auf Bauhin. 2180
Stockh. (1905) p. 26, t. I, f. 7 (Ark. f. Bot. IV). — Teleutosoris amphigenis, plerumque epiphyllis, sine maculis, sparsis vel hinc inde aggregatis, $\frac{1}{8}$ -1 mm. diam., pulverulentis, atro-brunneis; uredosporis immixtis globosis, subglobosis, ovatis v. ellipsoideis, laxe breviterque echinulatis, flavo-brunneis, 22-27 \approx 19-23, episporio c. 2,5-3 μ . cr., poris germinativis typice 3 raro 2 vel 4 instructis; teleutosporis globosis, subglobosis v. late ellipsoideis, apice rotundatis et corona flavo-brunnea, 3-5 μ . alta instructis, distincte reticulatis, obscure brunneis, 22-28 \approx 22-26, episporio 4-4,5 μ . cr.; pedicello hyalino, sporam circiter æquante v. brevior.

Hab. in foliis *Bauhiniæ mollis* in Bolivia et Argentina.

83. **Uromyces Schinzianus** P. Henn., Bull. Herb. Boiss. t. VI (1906) 2181
p. 702. — Maculis ferrugineo-fuscis, rotundatis, sparsis, v. subgregariis confluentibusque; uredosoris amphigenis, plerumque aggregatis, pulvinatis, primo epidermide pallida, dein rupta, velatis ferrugineis; uredosporis ellipsoideis, ovoideis v. subglobosis, hyalino-brunneolis v. castaneis, subaculeato-verrucosis, 18-30 \approx 16-28; teleutosoris intermixtis pulvinatis, castaneis; teleutosporis ellipsoideis v. ovoideis, apice rotundatis, haud incrassatis, episporio brunneo, levi, 3-3,5 μ . crasso, 20-30 \approx 18-26; pedicello persistente, hyalino 30 \approx 4.

Hab. in foliis *Bauhiniæ* ? *reticulatæ*, Boroma in regione Sambesi Africæ orient. australis. — Observante cl. Sydow Monogr. Ured. II, p. 351 nil est nisi forma uredosporica.

84. **Uromyces Vestergreni** Sydow, Mon. Ured. II, p. 74, *Urom. ver-* 2182
ruculosus B. et Br., Afr. (1873) non Schroet. (1872) — Syll. VII, p. 577. — Uredosoris amphigenis, maculis minutis 2-3 mm. diam., flavis insidentibus, sparsis v. paucis aggregatis, minutissimis, punctiformibus, 0,3 mm. diam. pulverulentis, ferrugineis; uredosporis globosis, subglobosis, ovoideis v. ellipsoideis, minute echinulatis, dilute flavo-brunneis, 21-26 \approx 19-22, episporio 1,5 μ . cr., poris germinativis plerumque 4 (raro 5 v. 2) instructis; teleutosoris conformibus, obscure brunneis; teleutosporis subglobosis, ovoideis v. ellipsoideis, apice rotundatis non v. lenissime incrassatis, laxe verrucosis, castaneo-brunneis, 18-28 \approx 18-22, episporio 2,5-3 μ . cr.; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis *Bauhiniæ tomentosæ*, Ceylon Indiæ orient.

85. **Uromyces bicinctus** Mac Alpine, Rusts of Australia (1906) p. 93, 2183 tab. XLIII, fig. 318; Sydow, Mon. Ured. II (1909) pag. 61. — Uredosoris sparsis vel gregariis, sæpe confluentibus, epidermide fissa cinctis, compactis, ferrugineis; uredosporis ovatis ellipsoideis v. oblongis, apice rotundatis et leniter incrassatis (usque ad 4 μ .), verrucis regulariter in lineas longitudinales dispositis dense obsitis, flavo-brunneis, 22-45 \times 11-18, episporio c. 3-3,5 μ . crasso, poris germinativis numerosis præditis; teleutosporis immixtis ovatis vel ellipsoideis, apice rotundatis, valde incrassatis (8-11 μ .), levibus, brunneis, 28-35 \times 16-22, pedicello persistenti, hyalino, apice flavido, brevi.

Hab. in phyllodiis fructibusque *Acaciæ fasciculiferæ*, Queensland Australia.

86. **Uromyces discoideus** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 2184 pag. 267. — Soris primum tectis, epiphyllis, dein erumpentibus, compactis, sparsis brunneis, discoideis; uredosporis et teleutosporis immixtis; uredosporis oblongo-ovoideis, pedicellatis, apice rotundatis, tenuiter tunicatis, pallide flavis, verruculis acutis tectis, 2-4 poris germinativis æquatorialibus præditis, 23-28 \times 9-11,5; teleutosporis globosis v. basi plerumque applanatis, crasse tunicatis, levibus, flavo-brunneis, mox germinantibus; pedicello hyalino, 15-30 \times 3-3,5.

Hab. in foliis *Acaciæ* sp. in Buitenzorg, Java.

87. **Uromyces phyllodiorum** (B. et Br.) Mac Alpine, Rusts of Australia (1906) p. 95, tab. XXV, fig. 218-228; Sydow, Mon. Ured. II (1909) p. 62, tab. III, f. 52. — *Uromyces digitatus* Wint. — Syll. VII, pag. 556 — *U. phyllodiæ* Cke. et Mass. — Syll. IX, pag. 291. — Ita vocanda *Melampsora phyllodiorum* B. et Br. — Syll. VII, p. 594.

88. **Uromyces Cedrelæ** (P. Henn.) P. Henn., in Koords. Botan. Untersuch. (1907) p. 199, f. 23 I, *Uredo Cedrelæ* P. Henn. — Sacc. Syll. XVII, p. 450. — Maculis rotundatis fuscis, dein exaridis; soris hypophyllis suborbiculariter dispositis v. nervos sequentibus; pulvinatis, epidermide fusca tectis, dein nudis; uredosporis subglobosis ovoideis vel ellipsoideis, hyalino-fuscidulis v. brunneis, 14-18 \times 12-15, episporio aculeato-aspero; teleutosporis unilocularibus, globosis v. ovoideis, fuscis, apice haud incrassatis, levibus, 11-18 \times 10-15, pedicello hyalino, 10-15 \times 2, deciduo suffultis.

Hab. in foliis vivis *Cedrelæ serratæ* prope Sapuran et Ke-

dung, Java (KOORDERS). — Observante Sydow Mon. Ured. II, p. 347 non est *Uromyces* sed genuina *Uredo*.

89. **Uromyces Urbanianus** P. Henn., Hedwigia XXXVI (1897) p. 213; 2187
 Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 245. — *Æcidiis* hypophyllis, maculis flavo-brunneis insidentibus, plerumque in greges rotundatos 1-4 mm. diam., dispositis, breviter cylindræis, margine recto v. parum recurvato, albido, inciso; *æcidiosporis* angulato-globosis, minute verruculosis, hyalino-flavidis, 22-35 \approx 21-30; *teleutosoris* amphigenis, sparsis, minutis, c. $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ mm. diam., epidermide primo tectis, dein ea fissa cinctis, pulverulentis, ferrugineis; *teleutosporis* ellipsoideis, oblongis v. subclavatis, apice rotundatis v. attenuatis, plerumque parum incrassatis, verrucis longitudinaliter dispositis dense obsitis, flavo-brunneis, 30-46 \approx 14-20, episporio c. 2,5-3 μ . cr.; pedicello brevi, hyalino.

Hab. in foliis *Oryctanthi* spicati, St. Anna ins. Trinidad (J. H. HART). — *Urom. circumscripto* Neg. affinis.

90. **Uromyces Fiorianus** Sacc. in Ann. Mycol. VIII (1910) p. 335. — 2188
 Maculis obsoletis, minutis, flavescentibus; soris amphigenis, sed plerisque hypophyllis, ex orbiculari angulosis, 1-2 mm. diam., mox erumpentibus, compactiusculis, castaneo-nigris; *teleutosporis* subglobosis, 36-38 \approx 30-34, saturate cinnamomeis, episporio crasso, 5,5-6 μ ., extus levissime asperulo, apice obtuse rotundato pallidiore; pedicello valido, tereti-obclavato-hyalino, 70-80 usque ad 115 μ . longo, deorsum incrassato ibique 14 μ . cr.

Hab. in foliis subvivi *Peucedani fraxinifolii*, Nefasit Mahabar, alt. 1600 m. (Hamasen) *Erythrææ* (AD. FIORI). — Pulcra species, uredine, ut videtur, carens, hinc *Leptouromyces*.

91. **Uromyces Seseli-graminis** Ed. Fisch., Centralbl. f. Bakter. etc. 2189
 II Abt. XVII (1906) p. 204; Bubák, Ann. Myc. II (1904) p. 361. *Æcidiis* (*Æc. Seselis* Niessl p. p., Syll. VII, p. 793 p. p.); uredo- et *teleutosporis* ut in *Urom. graminis* (Niessl) Bub.

Hab. *æcidia* in foliis *Seselis glauci*, uredo- et *teleutosporæ* in foliis *Melicæ ciliatæ*, *Arrhenateri elatioris*, Poæ, in Europa.

92. **Uromyces Laserpitii-graminis** Ed. Fisch., Centralbl. f. Bakter. II, 2190
 Abt. XVII (1906) pag. 204. — *Æcidiis* (*Æc. Seselis* Niessl p. p., Syll. VII, p. 793 p. p.); uredo- et *teleutosporis* ut in *Urom. graminis* (Niessl) Bub.

Hab. *æcidia* in foliis *Laserpitii Sileris*, uredo- et *teleutosporæ* in foliis *Melicæ ciliatæ* etc.

93. **Uromyces Galii** Diet., Ann. Mycol. V (1907) p. 71; Sydow, Mon. 2191
Ured. II, p. 21, tab. I, fig. 21. — Æcidiis hypophyllis, in acervulos irregulares congestis v. sparsis, cupulatis, margine laceratis; æcidiosporis polyedricis v. globosis, 17-21 μ . diam.; teleutosoris amphigenis v. præsertim cauliculis, irregularibus, sæpe confluentibus, epidermide plumbea tectis; teleutosporis ellipsoideis, ovatis v. piriformibus, apice plerumque rotundatis, rarius truncatis, incrassatis (5-9 μ .), levibus, castaneis, 24-30 \approx 16-25, pedicello persistenti, dilute brunneolo, usque ad 45 μ . longo.

Hab. in foliis caulibusque Galii Aparines, Aki-machi prov. Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA).

94. **Uromyces vestitus** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) p. 94. — Ure- 2192
dosporis in foliis amphigenis et cauliculis, minutis sparsis v. dense gregariis cinnamomeis; uredosporis globosis vel ellipsoideis 28-44 \approx 27-39, episporio 2-3 μ . cr., flavo-brunneo, tuberculis validis irregularibus ornato vestitis; pedicello caduco, cum spora per cellulam conoideam sterilem conjuncto; teleutosoris epiphyllis (an semper?) minutis, in acervulos mediocres congestis, confluentibus, primo epidermide lacerata cinctis, mox nudis, subpulverulentis, obscure brunneis; teleutosporis ellipsoideis v. globosis, vertice papilla lata dilute brunnea quasi rostratis, episporio castaneo verrucoso, cuticula dilutiore tenui vestito instructis, 35-48 \approx 27-30, pedicello c. 50 μ . longo, basi hyalino, superne brunneolo et inflato suffultis.

Hab. in foliis caulibusque Sappii sp., Taragna, S. Paulo Brasilia (A. USTERI). — *Uromyceti Cisneroano* Speg. affinis, differt vero structura uredosporarum.

95. **Uromyces Manihotis-Catingæ** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) 2193
p. 266. — Maculis fuscis, rotundatis v. effusis; soris hypophyllis, sparsis v. gregariis erumpentibus ferrugineis, epidermide cinerea fissa velatis; uredosporis ellipsoideis v. ovoideis, brunneis, aculeatis, 25-28 \approx 15-20; teleutosporis ellipsoideis v. ovoideis, apice conoideo-papillatis, flavo-brunneis, 8-10 μ . incrassatis, grosse verrucosis, castaneis, 30-35 \approx 25-30, pedicello hyalino usque ad 40 \approx 8.

Hab. in foliis Manihotis Catingæ, Bahia, Remanso, in Brasilia.

96. **Uromyces jatrophiicola** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 266. 2194
— Maculis flavidis sparsis v. effusis; uredosoris amphigenis sparse gregariis, rotundato-pulvinatis, ochraceis v. aurantiacis, farinosis, c. 1 mm. diam.; uredosporis ellipsoideis vel subglobosis, verrucosis,

flavidis v. citrinis, 18-22 \times 15-20; teleutosoris plerumque epiphyllis, gregarie sparsis, rotundato-pulvinatis atris; teleutosporis subglobosis v. ellipsoideis, grosse verrucosis, castaneis, 20-26 \times 18-23.

Hab. in foliis *Jatrophæ* sp., Bahia, Calderao, Brasilia.

97. **Uromyces Fischeri-Eduardi** P. Magn., Ber. deutsch. bot. Ges. XXV, 2195 (1907) p. 340, tab. IX, f. 32-38; Sydow, Mon. Ured. II, p. 136. —

Urom. Jordianus P. Magn., l. c. p. 253. — Pycnidiis æcidiisque ut in *Urom. Pisi*; uredosoris hypophyllis, sparsis, minutis, mox nudis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis globosis v. subglobosis, subtiliter verrucosis, flavo-brunneis, 20-26 μ . diam., episporio 1,5-2 μ . cr., poris germinativis 3-5 instructis; teleutosoris conformibus, obscurioribus; teleutosporis subglobosis, ovatis v. ellipsoideis, apice papillula humili auctis, dense minuteque verrucosis, brunneis, 24-30 \times 19-25, episporio 1,5-2 μ . cr.; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. æcidia in foliis *Euphorbiæ Cyparissiæ*, uredo- et teleutosporæ in foliis *Viciæ Craccæ* in Germania, Austria, Helvetia.

98. **Uromyces levis** Körnike, Hedwigia XVI (1877) p. 38, p. p. — 2196

Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 182. — Mycelio totam innovationem inficiente, sed folia vix deformante; pycnidiis deficientibus v. interdum evolutis; teleutosoris hypophyllis per totum folium sparsis, immersis, pustuliformibus, a contextu foliorum rupto cinctis, atro-brunneis; teleutosporis plerumque ovatis v. etiam oblongis v. subglobosis, apice plerumque papilla levi hyalina brevi conica ornatis, levissimis, aureo-brunneis, 22-30 \times 16-23, episporio mediæ crassitudinis, post maturitatem mox germinantibus; pedicello hyalino, tenui.

Hab. in foliis *Euphorbiæ Gerardianæ* in Germania, Austria, Helvetia, Gallia, Hollandia, Rossia.

99. **Uromyces Dictyospermæ** Ell. et Ev., in Dietel Ured. in Engl. u. 2197

Prantl, Natürl. Pflanzenfam. I, 1** (1900) p. 58, fig. 35 D.-Tranzschel Ann. Myc. VIII (1910) p. 12; Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 165. — Æcidiis ignotis; uredosoris hypophyllis v. etiam epiphyllis, epidermide cinctis, cinnamomeis; uredosporis globosis vel ovatis, aculeolatis, flavidis v. subhyalinis, 20-23 \times 18-20, poris germinativis plerumque 5; teleutosoris hypophyllis v. etiam epiphyllis, etiam cauliculis, sparsis vel circa solum centrale congestis, epidermide cinctis v. nudis, atris v. atro-brunneis; teleutosporis globosis v. ellipsoideis, epapillatis, verrucis grossis late conicis acu-

tiusculis hyalinis ornatis, brunneis v. castaneis, 22-30 \approx 20-25, episporio crasso; pedicello hyalino, tenui brevi.

Hab. in foliis caulibusque *Euphorbiæ dictyospermæ* F. et M. in America boreali. — Ab *Ur. tuberculato* differt verrucis majoribus et acutioribus.

100. **Uromyces tuberculatus** Fuck., Symb. myc. p. 64 (1869); Tranzschel, Ann. Mycol. VIII (1910) pag. 13; Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 165; Syn. *Urom. proëminens* Auct. p. p. — Syll. VII, p. 553, p. p. — Mycelio generationis æcidineæ totam plantam v. ramos inficiente; pycnidiis et æcidiis hypophyllis, per totum folium æqualiter sparsis; æcidiis contextu foliorum circumdatis, cupuliformibus, margine denticulato parum emergentibus; cellulis pseudoperidii in sectione longitudinali rhomboideis, pariete externo crasso (circa 7-8 μ .), striolato, pariete interno tenuiore (3 μ .), dense verruculoso; æcidiosporis angulato-globosis v. ellipsoideis, verruculosis, 17-25 \approx 14-20; uredosporis hypophyllis, sparsis, primo epidermide tenui tectis, dein nudis, cinnamomeis; uredosporis globosis v. subglobosis, flavo-brunneis, aculeolatis, 20-25 μ . diam., episporio 1,5-2,5 μ . cr., poris germinativis plerumque intumescens 5-7 præditis; teleutosporis hypophyllis v. etiam epiphyllis et cauliculis, plerumque sparsis, interdum in greges parvos congestis, pulverulentis, atro-brunneis v. atris; teleutosporis globosis v. ellipsoideis, papilla apicali plerumque deficiente v. rarius plana, lata, hyalina, verrucis sat laxè dispositis, late conicis obtusiusculis hyalinis ornatis, castaneis, 20-30 \approx 18-24, episporio 2-2,5 μ . cr.; pedicello hyalino, deciduo.

Hab. in foliis *Euphorbiæ exiguæ*, in Germania, Gallia, Helvetia, *Euph. hissaricæ* in Turkestan.

101. **Uromyces euphorbiicola** (Berk. et Curt.) Tranzschel, Ann. Myc. VIII (1910) p. 8, *Trichobasis euphorbiæcola* Berk. et C., *Uredo euphorbiæcola* (B. et C.) De Toni — Syll. VII, p. 847 — Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 161. — Differt ab *Urom. proëminente* et ab illis speciebus, statu uredosporico præditis, uredosporis plerumque 3 (2-4 rarissime 5) poris germinativis præditis.

Hab. in foliis *Euphorbiæ piluliferæ* in America bor. et austr., *E. maculatæ*, America bor., *E. humistratæ*, America bor., *E. thymifoliæ* America austr., *E. prostratæ*, Amer. bor. et in insulis Canariensibus.

102. **Uromyces Poinsettiae** Tranzsch., Ann. Myc. VIII (1910) p. 11; Sydow, Mon. Ured. II (1910) pag. 163. — *Uromyces Euphorbiæ*

Auct. p. p. — Syll. VII, pag. 556 p. p. — Ab *Urom. proëminente* Lév. differt matrice et teleutosporis verrucis majoribus et magis sparsis.

Hab. in foliis *Euphorbiæ* (*Poinsettia*) *dentatæ*, Amer. bor., *E. heterophyllæ*, Amer. bor. et austr.

103. **Uromyces alpestris** Tranzsch., Ann. Mycol. VIII (1910) p. 17; 2201
 Sydow, Mon. Ured. II (1910) pag. 169; *Uromyces excavatus* P. Magn. p. p., *U. scutellatus* Auct. p. p. — Syll. VII, p. 552, p. p. — Mycelio totam innovationem inficiente; pycnidiis plerumque deficientibus; teleutosporis hypophyllis, pustuliformibus, apice poro pertusis, castaneo-brunneis; teleutosporis ovatis, ellipsoideis v. subglobosis, quoad formam et magnitudinem valde ludentibus, apice papilla humili hyalina v. fusciscente verruculosa auctis, verruculis punctiformibus dense obsitis, flavo-brunneis, 24-38 × 18-28 episporio tenui; pedicello hyalino, tenui.

Hab. in foliis *Euphorbiæ* *Cyparissia*, Carniola, Tirolia, Helvetia, Gallia. — Ab *U. excavato* differt præcipue teleutosporis majoribus, verruculis crebris etc.

104. **Uromyces Haussknechtii** Tranzsch., Ann. Mycol. VIII (1910) 2202
 p. 18; Sydow, Mon. Ured. II (1910) pag. 170. — Mycelio totam innovationem v. ramos inficiente, in foliis mediis et superioribus dilatatis fructificante, pycnidiis non visis; teleutosporis per totam paginam inferiorem sparsis, in *Euph. thamnoides* apertis, ab epidermide cinctis, in *Euph. spinosa* pustuliformibus, contextu foliorum circumdatis, poro pertusis, brunneis; teleutosporis quoad formam et magnitudinem in eodem soro valde variabilibus, plerumque ovatis, supra porum germinationis (interdum in latere sporæ evoluta) papilla lata, sæpe cristiformi verruculosa subhyalina ornatis, dense punctato-verrucosis, in sectione propter structuram bacillarem striolatis, flavo-brunneis, sporis minoribus 19-23 × 12-15, mediocribus, 25-32 × 17-23, majoribus 35-50 × 22-30, sporis minoribus ad basim plerumque rotundatis, majoribus sæpe versus pedicellum attenuatis, episporio 2-2,5 µ. cr., pedicello tenui hyalino.

Hab. in foliis *Euphorbiæ thamnoidis* prope Tripolin Syriæ (HAUSSKNECHT), *E. spinosæ* in Gallia merid. et Italia bor. — *Urom. natalensis* P. Mag. affinis.

105. **Uromyces Tranzschelii** Syd. in Tranzsch. Ann. Mycol. VIII, 2203
 (1910) p. 20; Sydow, Mon. Ured. II, 1910, pag. 171. — Mycelio totam innovationem inficiente; pycnidiis hypophyllis; teleutosporis hypophyllis, dense dispositis, pulverulentis, ab epidermide rupta

cinctis, castaneo-brunneis; teleutosporis globosis vel ellipsoideis, apice papilla humillima plana hyalina præditis, verruculis punctiformibus dense dispositis, interdum præcipue in parte inferiore sporæ ordines indistinctos formantibus obsitis, dilute brunneis, 17-23 \approx 17-20, episporio tenui (1,5 μ . crassi); pedicello hyalino tenui.

Hab. in foliis *Euphorbiæ montanæ* in Colorado Amer. bor. — *Urom. monspessulano* affinis, differt teleutosporis plerumque globosis, verruculis magis confertis etc.

106. **Uromyces monspessulanus** Tranzsch., Ann. Mycol. VIII (1910) 2204 p. 20; Sydow, Mon. Ured. II (1910, pag. 172; *Uredo excavata* γ *Euphorbiæ serratæ* DC. Fl. franc. VI, p. 69 (1815). — Mycelio totam innovationem inficiente; pycnidiis deficientibus; teleutosporis hypophyllis, pustuliformibus, contextu foliorum poro apicali rupto cinctis, pulvere brunneo; teleutosporis ellipsoideis, rarius subglobosis, apice papilla parva prominente plerumque levi, hyalina præditis, verruculis tenuibus plerumque in ordines irregulares interdum interruptos dispositis et haud raro præcipue in parte inferiore sporæ confluentibus et striolas plus minus longas formantibus obsitis, dilute brunneis, 17-30 \approx 15-23, plerumque 22-25 \approx 18-20, episporio tenui; pedicello hyalino, tenui.

Hab. in foliis *Euphorbiæ serratæ* in Gallia meridionali.

107. **Uromyces Bresadolæ** Tranzsch., Ann. Mycol. VIII (1910) p. 22; 2205 Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 174. — Mycelio totam innovationem inficiente; pycnidiis non visis; teleutosporis hypophyllis, dense dispositis, sat parvis, epidermide rupta cinctis, junioribus pustuliformibus, mox subplanis, castaneis v. atro-brunneis; teleutosporis late ellipsoideis v. subglobosis, apice papilla humili subhyalina verruculosa præditis, dense reticulatis, brunneis, variæ magnitudinis, 17-30 \approx 17-25, episporio crassiusculo; pedicello hyalino tenui.

Hab. in foliis *Euphorbiæ angulatæ* pr. Chegal et Trento in agro Tridentino (BRESADOLA).

108. **Uromyces striatellus** Tranzsch., Ann. Mycol. VIII (1910) p. 24; 2206 Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 176. — Mycelio totam innovationem inficiente; pycnidiis hypophyllis, numerosis, magnis; teleutosporis hypophyllis, pustuliformibus, brunneis; teleutosporis ellipsoideis, ovatis v. oblongis, plerumque apice et basi rotundatis, apice papilla hyalina parva hemisphærica v. plana præditis, striolis longitudinalibus haud raro interruptis et interdum in ordines ver-

rucularum solutis ornatis, brunneis, 21-27 \approx 15-17(-22), episporio tenui; pedicello hyalino, tenui.

Hab. in foliis *Euphorbiæ hebecarpæ*, Persia austr. (BORN-MÜLLER) et *Euphorbiæ* sp. Persia austr. (KOTSCHY). — *Urom. striolato* affinis.

109. **Uromyces cristulatus** Tranzsch., Ann. Mycol. VIII (1910) p. 26; 2207
Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 178; *Urom. excavatus* var. *cristulatus* Tranzsch., Trav. Mus. Bot. Ac. St. Pétersb. II, pag. 38 (separ. 1904) 1905. — Mycelio totam innovationem inficiente; pycnidiis paucis visis; teleutosoris hypophyllis, epidermide rupta cinctis, mox planis, atro-brunneis v. atris; uredosporis immixtis ellipsoideis, aculeatis, flavidis, 26-33 \approx 18-25, poris germinativis 4 instructis; teleutosporis ellipsoideis v. globosis, apice sæpe obtusis, epapillatis v. papilla plana lata ornatis, verrucis grossis sæpe in ordines longitudinaliter dispositis et in cristas confluentibus v. in striolas elongatis obsitis, castaneis, 26-34 \approx 20-26, episporio 2,5-3 μ . cr., pedicello hyalino, tenui.

Hab. in foliis *Euphorbiæ petrophilæ* prope Jalta Tauriæ et *E. Gerardianæ* prope Nelahozeves (Mühlhausen) Bohemiæ (KABÁT). — *Urom. scutellato* affinis sed sporis obscurioribus verrucis et striis crassioribus distincta.

110. **Uromyces undulatus** Tranzsch., Ann. Mycol. VIII (1910) p. 24; 2208
Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 176. — Mycelio totam innovationem inficiente; pycnidiis hypophyllis; teleutosoris hypophyllis, pustuliformibus, atro-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, ovatis v. oblongis, plerumque apice et basi rotundatis, interdum angulatis, apice papilla parva hemisphærica, hyalina præditis, in sicco levibus v. striolis paucis longis interdum indistinctis ornatis, brunneis, 22-30 \approx 17-24, episporio 1,5-2 μ . cr.; pedicello hyalino, tenui.

Hab. in foliis *Euphorbiæ* sp. in Turkestania (KOMAROV). — Ab *Urom. striatello* differt striolis vix distinctis.

111. **Uromyces Winteri** Wettst., Sitzb. k. Ak. di Wiss. mathem.-naturw. Kl., Wien XCVIII, Abt. I (1889) p. 353 (1890); Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 179. — Mycelio totam plantam, rarius singulos ramos inficiente, folia vix deformante; pycnidiis non visis; teleutosoris per totam foliorum paginam inferiorem æque sparsis, rarius etiam epiphyllis, rotundatis, primo epidermide mox secedente tectis, atris; teleutosporis plerumque globosis v. ellipsoideis, apice papilla hyalina sæpe vix conspicua interdum bene evoluta lata truncata præditis, verrucis sat laxè dispositis late conicis

majusculis hyalinis interdum longitudinaliter elongatis v. confluentibus obsitis, castaneis, 20-25 \times 18-22, episporio crasso; pedicello hyalino, tenui.

Hab. in foliis *Euphorbiæ falcatæ* in Pamphylia, Kurdistania Assyriaca, Caucaso, Tauria, *Euphorbiæ* sp. in Turkestan. — *Urom. tuberculato* affinis

112. **Uromyces sublevis** Tranzsch., Ann. Mycol. VIII (1910) p. 29; 2210
Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 181, *Urom. excavatus* var. *sublevis* Tranzsch., Trav. Mus. Bot. Ac. St. Petersl. II, p. 38 (separat. 1904) 1905 (et l. c. I, p. 57 (1902) sub *Urom. excavati* forma). — Mycelio totam innovationem inficiente; pycnidiis deficientibus v. rarius in foliis inferioribus parce evolutis; teleutosoris hypophyllis per totum folium sparsis, interdum etiam epiphyllis, immersis, contextu foliorum rupto circumdatis, atro-brunneis v. atris; teleutosporis ellipsoideis, rarius subglobosis, v. oblongis, apice papilla levi hyalina humili brevi conica ornatis, sublevibus v. subtilissime et dense punctato-verrucosis (tantum in sporis siccis v. sub lente immersis), brunneis, 25-32 \times 20-25, episporio crasso; pedicello hyalino tenui.

Hab. in foliis *Euphorbiæ petrophilæ* in Tauria rossica, *E. luteolæ* in Hispania, *E. glareosæ* et var. *pannonicæ* in Europa, *E. nicaeensis* in Gallia, Hispania, *E. tinctoriæ* in Cappadocia, Syria.

113. **Uromyces striolatus** Tranzsch., Ann. Mycol. VIII (1910) p. 23; 2211
Sydow, Monogr. Ured. II (1910) pag. 175; *Uromyces scutellatus* Auct. p. p. — Mycelio totam innovationem inficiente, foliis infectis quam normalibus latioribus; pycnidiis hypophyllis numerosis; teleutosoris hypophyllis, pustuliformibus, contextu foliorum poro apicali rupto circumdatis, brunneis; teleutosporis ovoideis v. piriformibus, sæpe elongatis, apice rotundatis et papilla parva hemisphærica præditis ad basim plerumque tenuatis, striolis longis longitudinalibus interdum anastomosantibus ornatis, dilute brunneis, 26-30(-40) \times 16-22, episporio tenui; pedicello hyalino, tenui.

Hab. in foliis *Euphorbiæ Cyparissicæ* in Helvetia, Italia, Gallia et *Euphorbiæ* spec. in Turkestan.

114. **Uromyces Privæ** Syd., Ann. Myc. V (1907) pag. 338. — Soris 2212
teleutosporiferis hypophyllis, paucis etiam epiphyllis, maculis orbicularibus fuscis 2-5 mm. diam. depressis insidentibus, minutis, sed dense confertis et plerumque tandem circa unum majorem omnino confluentibus maculamque explentibus, pulvinatis, compa-

ctis, obscure brunneis; teleutosporis ovatis vel ellipsoideis, subinde subglobosis, apice plerumque rotundatis, leniter incrassatis (3-6 μ .), levibus, brunneis, 20-26 \times 11-18; pedicello brunneolo, crassiusculo, persistenti, usque ad 50 μ . longo.

Hab. in foliis *Privæ lappulacææ*, El Yunque, Barocoa, Cuba (E. W. D. HOLWAY).

115. **Uromyces Lippiæ** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires (1909) 2213
t. XIX, p. 313. — Maculis nullis; teleutosporis innato-erumpentibus compactiusculis subcarnosis, nudis, sordide ferrugineis, orbicularibus 0,5-1 mm. diam., sparsis v. rarius circinantibus; teleutosporis dense obovatis levibus superne crasse tunicatis, obtusissime rotundatis v. subtruncatis sæpeque tridentatis, fulvellis, 22-24 \times 18-19, basi cuneatis, sæpius e latere compressis, pedicello pallidiore, 40-60 \times 5, fultis.

Hab. in foliis *Lippiæ canescentis* ad margines Rio Sora, Salta Amer. austr. — In eodem acervulo sæpe teleutosporæ bicellulares inveniuntur, immo, teste Syd. Mon. Ured. II, p. 349, species est potius ad *Pucciniam* referenda et verisimiliter eadem ac *P. accedens* Syd.

116. **Uromyces Thapsi** (Opiz) Bubák, Uredin. Bohemiæ (1906) p. 96, 2214
Uredo Thapsi Opiz Sezuam p. 153 (1852); *Æcid. Thapsii* Opiz, in sched., *Æcid. Verbasci* Ces. in Rabenh. Herb. myc. I, n. 1491; *Uromyces Verbasci* Niessl; *Urom. Scrophulariæ* (DC.) Schröt. ex p. Syll. VII, pag. 550. — Ab *U. Scrophulariæ* (DC.) Fuck differt cellulis pseudoperidii tunica extus crassiore, teleutosporis pedicello longiore (usque ad 40 μ .) præditis sed præcipue habitu.

Hab. in foliis *Verbasci Lychnitis*, *Neilreichii*, *nigri*, *orientalis*, *phlomoidis*, *Schraderi*, *Thapsi*, *thapsiformis*, Europa med. et merid.

117. **Uromyces Strobilanthis** Barel., Descr. List of the Ured. of Simla 2215
III, p. 78, in Journ. of the Asiatic Soc. of Bengal LIX, pt. II, (1890); Sydow, Mon. Ured. II (1909) p. 26. — Teleutosporis hypophyllis; teleutosporis elongatis, apice valde incrassatis, flavo-brunneis, 26-34 \times 14-16, pedicello persistenti, c. 40 μ . longo.

Hab. in foliis *Strobilanthis Dalhousiani* in India or.

118. **Uromyces Ruelliæ** Holw. Ann. mycol. II (1904) p. 394; Sydow, 2216
Mon. Ured. II, pag. 25, tab. II, fig. 25, ? *Urom. texensis* Hol. et Parl. — Syll. VII, pag. 578. — Uredosporis amphigenis, maculis flavis v. brunneolis subinde insidentibus, sparsis, minutis, pulverulentis, brunneis; uredosporis globosis, subglobosis, ovatis v. el-

m. Pucc. accedens
Syd. Mon. Ured. II, p. 349.
Sacc. XVII, 332.

lipsoideis, laxè aculeatis, flavis v. flavo-brunneolis, 18-30 × 12-26, poris germinativis 2 rarius 3 æquatorialibus instructis; teleutosoris conformibus, atris; teleutosporis variabilibus, subglobosis, ovatis v. oblongis, subinde irregularibus et angulatis, apice plerumque rotundatis plus minusve incrassatis (usque ad 8 μ). laxè verrucosis, obscure brunneis, subopacis, 25-40 × 20-30; pedicello hyalino, crassiusculo, usque ad 50 μ . long.

Hab. in foliis *Ruellia* sp. Cardenas, San Luis Potosi, Mexico.

119. **Uromyces kwangensis** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, 2217
Ann. Mus. du Congo, II, fasc. II (1907) pag. 88; Sydow, Mon. Ured. II, p. 25. — Maculis sparsis rotundatis, fuscis; teleutosoris hypophyllis, densis, ferrugineis; teleutosporis oblonge fusoides v. clavatis, sæpe curvulis, apice 4-5 μ . incrassatis, obtusis, hyalinis v. subfuscidulis, 20-24 × 11-13; pedicello persistente usque ad 40 μ . longo, 3-4,5 μ . cr., hyalino.

Hab. in foliis *Acanthaceæ*, *Justicia* affinis, Boko, Sainte-Barbe Congo, Africa trop. (VANDERYST).

120. **Uromyces Ipomœæ** (Thüm.) Berk., *Grevillea* VI (1882) p. 19, 2218
Æcidium Ipomœæ Thüm.; Sydow, Mon. Ured. II (1909) p. 33, tab. II, fig. 31; *Uredo aterrima* Thüm. — Syll. VII, pag. 841. *Æcidiis* amphigenis, etiam in fructibus evolutis, in greges rotundatos dispositis, primo hemisphæricis, dein apertis et fere cupulatis, flavis, margine erecto inciso; æcidiosporis angulato-globosis, dense minuteque verrucosis, hyalino-flavidis, 20-25 μ . diam.; teleutosoris amphigenis, sparsis, minutis, rotundatis, c. $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam., epidermide fissa cinctis, pulverulentis, atris; teleutosporis globosis, radiatim sulcatis, primo brunneis, tandem atris, 25-34 μ . latis, 20-26 μ . altis; pedicello napiformi, in aqua statim valde intumescente et tunc omnino globoso, diametrum sporæ æquante v. superante.

Hab. in foliis fructibusque *Ipomœæ argyreoidis*, Somerset East Promont. Bonæ Spei Africae austr. (Mc OWAN).

121. **Uromyces pachycephs** Lagerh. in Sydow Mon. Ured. II (1910) 2219
p. 355. — Teleutosoris hypophyllis, maculis obsoletis indeterminatis insidentibus, minutissimis, sed in greges minutos rotundatos 1-2 mm. latos, densissime constipatis tandemque plerumque omnino confluentibus, pulvinatis, brunneis; teleutosporis oblongis v. clavatis, apice rotundatis, valde incrassatis (usque 12 μ), basi attenuatis, levibus, subhyalinis v. hyalino-flavidis, 35-50 × 18-28, episporio tenuissimo; pedicello crasso, usque 50 μ . longo, 15 μ . cr.

Hab. in foliis *Ipomœæ* sp. Guayas Æquatoriæ Amer. austr.
(LAGERHEIM).

122. **Uromyces Hewittiae** Sydow, Ann. Mycol. IV (1906) p. 30. — 2220

Æcidiis hypophyllis, maculis orbicularibus v. suborbicularibus brunneolis flavo-cinctis c. 1 cm. latis, insidentibus, aggregatis, flavis, brevibus, margine crasso, revoluto; æcidiosporis angulato-globosis, subtiliter verruculosus, hyalino flavescentibus, 12-18 μ . diam.; uredosoris hypophyllis, maculis sæpius indetsrminatis insidentibus, sparsis v. irregulariter aggregatis, minutis mox nudis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis globosis v. subglobosis, echinulatis, brunneis, 17 $\frac{1}{2}$ -24 \approx 17-22; teleutosoris conformibus, obscurioribus; teleutosporis globosis v. subglobosis, levibus, apice subinde lenissime incrassatis, brunneis, 17-25 μ . diam.; pedicello hyalino, brevi, caduco.

Hab. in foliis *Hewittiae* bicoloris, Cotta Pato, ins. Philippin. (E. B. COPELAND).

123. **Uromyces brasiliensis** Trott., Ann. Mycol. (1904) II, p. 533. — 2221

Ita vocandus *Urom. giganteus* Dietel (1897). — Syll. XIV, p. 279 non *U. giganteus* Speg. (1879).

124. **Uromyces Payenæ** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 2222

p. 268. — Maculis foliiculis irregulariter sparsis, rotundatis, cinnabarinis, 1-2 mm. latis; soris hypophyllis raro 1, plerumque 2-3 in quaque macula, 0,3 mm. cr. erumpentibus; uredosporis subconoideis 37-46 \approx 34-44, tunica interna brunnea, externa hyalina præditi, aculeolatis, 3-4 poris germinativis præditi, pedicelloque 80-90 \approx 7-9 suffultis; teleutosporis oblongo-ellipsoideis, pallide flavis, tenui-tunicatis, levibus, utrinque rotundatis, 46-54 \approx 21-25, mox in soris germinantibus, pedicello hyalino 70-95 \approx 5-10; sporidiolis globosis 14-19 μ . cr., quoque mox germinantibus.

Hab. in foliis *Payenæ* Suringarianæ, P. Junghunianæ in ins. Java.

125. **Uromyces Mimusopsidis** Cke. — Syll. VII, p. 579. — Uredo- 2223

soris hypophyllis, maculis nullis v. obsolete flavidis insidentibus, sparsis, rotundatis, c. 0,5-1 mm. diam., epidermide fissa cinctis, brunneis; uredosporis oblongis v. subfusoides, apice plerumque rotundatis, basi sæpe leniter attenuatis, flavo-brunneis, verrucis majusculis in lineas longitudinales ordinatis dense obsitis, 32-42 \approx 15-21, episporio 3-3,5 μ .; teleutosoris conformibus sed compactis, obscure brunneis; teleutosporis late clavatis, apice rotundatis et

levissime incrassatis, basi attenuatis, levibus, flavidis, 52-80 \times 18-28; pedicello crassiusculo, hyalino, usque ad 40 μ . longo.

Hab. in foliis *Mimusopsidis*, Natal Afr. austr. et in Africa or. lusitana (C. W. HOWARD). — Status uredosporus nunc primum a Cl. SYDOW descriptus (Ann. Mycol. VII (1909) p. 545).

126. **Uromyces Lucumæ** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) pag. 95. — 2224

Uredosporis globosis usque ad 25 μ . latis, episporio subcrasso echinulato achroo præditis; teleutosoris hypophyllis mediocribus, usque ad 2 mm. latis, pulvinatis, nudis, postea expallescens; teleutosporis oblongo-clavatis, 35-48 \times 14-19, episporio tenui æquali hyalino vestitis, contentu aureo, pedicello usque ad 70 μ . longo, fusiformi hyalino, in aqua diffuente suffultis, statim germinantibus.

Hab. in foliis et fructibus *Lucumæ* sp., Brasilia et in Horto bot. Goeldi, Perù (J. HUBER).

127. **Uromyces Primulæ-integrifoliæ** (DC.) Niessl, Verh. Naturf. Ver. 2225

Brünn, Bd. X 1871 (1872), p. 163, *Uredo Primulæ-integrifoliæ* DC.; *Uromyces Primulæ* (DC.) Lév. — Syll. VII, pag. 565 pp. — Ab *U. Primulæ* Fuck. differt statu uredosporico absentis, statu æcidiali perennanti nec non matrice diversa.

Hab. in foliis *Primulæ integrifoliæ* in Gallia, Italia, Austria.

128. **Uromyces ovirensis** Jaap, Verh. Bot. Ver. Prev. Brand (1908) 2226

p. 39; Ann. Mycol. VI (1908) p. 195. — Pycnidiis epiphyllis, in greges rotundatos v. oblongos plus minus numerose dispositis, brunneolis; æcidiis plerumque epiphyllis, maculis pallidis insidentibus, in greges rotundatos v. irregulares dispositis, flavis v. flavo-brunneolis, breviter cylindræis, margine albido, lacerato; æcidiosporis angulato-globosis, subtiliter verruculosus, hyalino-flavidis, 16-21 μ . diam.; teleutosoris epiphyllis, sparsis, solitariis v. inter æcidia evolutis, minutis, rotundatis v. ellipticis, diu epidermide tectis; teleutosporis ovoideis, apice rotundatis et papilla lata usque 5 μ . alta, hyalina v. flavidula præditis, verruculosus, brunneis, 42-50 \times 36-40, episporio usque 3,5 μ . cr., pedicello hyalino, usque ad 50 μ . long., crasso.

Hab. in foliis *Primulæ Wulfenianæ* in monte Hochobir Carniolæ (O. JAAP). — Ab *U. Primulæ-integrifoliæ* teleutosporis majoribus præcipue differt.

129. **Uromyces speciosus** Holway Ann. Mycol. IV (1905) p. 23. — 2227

Teleutosoris amphigenis, sparsis, sine maculis, rotundatis, minutis, 0,5-1 mm. diam., epidermide primo tectis, dein ea fissa cinctis,

pulverulentis, brunneis; uredosporis immixtis globosis, subglobosis v. late ellipsoideis, subtiliter echinulatis, brunneolis, 24-28 μ . diam. episporio 2 μ . c. cr.; teleutosporis subglobosis, ovatis, ellipsoideis v. oblongis, apice non incrassatis, subinde papillula minuta hyalina præditis, dense minuteque verrucosis, brunneis, 18-20 \times 16-20; pedicello hyalino, longiusculo, sed valde deciduo.

Hab. in foliis *Fraseræ macrophyllæ* pr. Cloudercroft in New Mexico Amer. bor. (E. W. D. HOLWAY). — Ab *U. Fraseræ* Arth. et Rick. omnino diversus.

- 130 **Uromyces Tournefortiæ** P. Henn., Hedw. XLVII (1908) p. 267. 2228
— Maculis flavidis effusis; soris amphigenis sparsis, pulvinatis; teleutosporis clavatis, ovoideis v. ellipsoideis, apice obtuso incrassatis v. subpapillatis, brunneis v. cinnamomeis, verrucosis, 28-38 \times 20-30; pedicello hyalino, c. 30 μ .

Hab. in foliis *Tournefortiæ* in Horto botanico Rio de Janeiro Brasiliæ.

131. **Uromyces cystopiformis** Lagerh., in Sydow Mon. Ured. II (1910) 2229
p. 353. — Teleutosoris amphigenis, maculis orbicularibus v. suborbicularibus, brunneis 2-3 mm. diam., sæpe obsoletis insidentibus, sparsis v. paucis laxè aggregatis, minutis, dilute brunneis, subpulvinatis; teleutosporis oblongis subinde clavatis, apice plerumque rotundatis, mox leniter, mox magis incrassatis (5-11 μ .), basi attenuatis, levibus, subhyalinis, 30-45 \times 14-25, episporio tenuissimo, statim germinantibus; pedicello persistenti crassiusculo, sporam circiter æquante.

Hab. in foliis *Siphocampyli*, Corazon Æquatoriae, America austr. (LAGERHEIM).

132. **Uromyces Wulffiæ-stenoglossæ** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) 2230
p. 96. — Maculis flavis indeterminatis vel fuscis vel nullis; soris hypophyllis minutis, sparsis, obscure castaneis vel nigris; uredosporis et teleutosporis intermixtis; uredosporis ellipsoideis vel subglobosis 25-28 \times 21-25, brunneis echinulatis; teleutosporis obovatis, ellipsoideis vel rarius globosis, 26-36 \times 20-26, castaneis, levibus, apice 5-8 μ . incrassatis et interdum hyalinis, pedicello hyalino, sporam fere æquante mediocriter firmo instructis, facile germinantibus.

Hab. in foliis *Wulffiæ stenoglossæ*, Marco Pará Brasiliæ (C. F. BAKER).

133. **Uromyces senecionicola** Arthur, Bot. Gaz. (1905) XL, p. 198; 2231
Sydow, Mon. Ured. p. 9, tab. I, fig. 11. — Teleutosoris hypo-

phyllis, maculis indistinctis insidentibus, sparsis, rotundatis, c. $\frac{1}{2}$ mm. diam., epidermide grisea diu tectis, compactiusculis; teleutosporis ovatis v. oblongo-ovatis, subinde angulatis, apice plerumque rotundatis, leniter incrassatis (3-6 μ .), basi sæpius attenuatis, levibus, dilute brunneis, 24-36 \approx 18-25, episporio 1-2 μ . cr.: pedicello subhyalino, crassiusculo, sporam subæquante.

Hab. in foliis Senecionis Roldanæ, Amecameca in Mexico (HOLWAY).

134. **Uromyces Wedeliæ** Bacc., Funghi Eritrea, Ann. Bot. IV (1906) 2232 p. 269, tav. X, fig. 9. — Uredosoris rotundis, pallide aurantiacis, non maculiculis; uredosporis rotundis, episporio crasso, levi vel minutissime punctato, 30-35 μ . latis; teleutosoris rotundatis vel irregularibus, ad mm. 0,6 latis, sæpe confluentibus, hypophyllis; teleutosporis castaneo-brunneis, episporio levi, apice paullo incrassato pallidiore, 36 μ . latis; pedicello hyalino, æqualiter 6-7 μ . cr., 60 μ . longo.

Hab. in foliis Wedeliæ sp., Sangus-Ambatocam, Oculé Cusai Erythrææ, 2000 m. alt. (PAPPI). — Ex icone potius quam ex diagnosi videtur eadem species ac homonyma Henningsii. Cfr. Syll. XVII, p. 245.

135. **Uromyces pianhyensis** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 266. 2233 — Maculis fuscidulis vel flavidis, rotundato-sparsis vel effusis; uredosoris hypophyllis gregarie sparsis, rotundato-pulvinatis, farinosis, ca. 0,5 mm. diam., ferrugineis; uredosporis subglobosis vel ellipsoideis, flavo-brunneis, asperatis, 16-20 \approx 15-18; teleutosoris hypophyllis, raro epiphyllis, sparsis, atro-brunneis; teleutosporis subglobosis apice obtuso-papillatis, 4-5 μ ., incrassatis, castaneis, verrucosis, 20-26 \approx 18-22; pedicello persistenti, hyalino, 20-30 \approx 4-5.

Hab. in foliis Wedeliæ sp., Pianhy, Serra Nova.

136. **Uromyces comptus** Sydow, Engler's Bot. Jahrbüch. 45 Bd. 2234 (1910) p. 259 et Monogr. Ured. II, p. 354. — Teleutosoris amphigenis, maculis nullis v. obsoletis flavidis insidentibus, sparsis, rotundatis, epidermide diutius tectis, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ mm. diam., atris subpulverulentis; uredosporis immixtis subglobosis v. ellipsoideis, echinulatis, brunneis, 22-32 \approx 18-24, episporio 1,5-2 μ . cr.; teleutosporis ellipsoideis v. ovatis, apice papilla dilutiore sæpe subhyalina lata usque 7 μ . alta, instructis, levibus, castaneo-brunneis, 24-38 \approx 24-28, episporio 4-6 μ . cr.; pedicello persistenti, crasso, hyalino, usque ad 70 μ . longo.

Hab. in foliis *Ipomœæ* bipinnatipartitæ prope Okahandja Africae trop.

137. **Uromyces insignis** Sydow, Mon. Ured. II (1909), p. 6, tab. I, 2235 fig. 6. — Uredosoris amphigenis, sæpius hypophyllis, sparsis, minutis, rotundatis, c. 0,5 mm. diam., subpulverulentis, cinnamomeis, uredosporis globosis v. subglobosis, echinulatis, flavo-brunneolis, 18-21 μ . diam., episporio tenui; teleutosoris conformibus plerumque hypophyllis, obscure brunneis; teleutosporis globosis, subglobosis v. rarius ellipsoideis, apice papilla magna hyalina (usque ad 11 μ . alta) instructis, levibus, flavo-brunneolis, 21-28 \times 16-24, episporio tenui; pedicello hyalino, tenui, usque ad 40 μ . longo, subpersistenti.

Hab. in foliis *Melantheræ* latifoliæ (= *Echinocephali latifolii*), in Brasilia (SELOW).

138. **Uromyces amœnus** Syd. Ann. Mycol. IV (1906) p. 28. — Soris 2236 teleutosporiferis hypophyllis, maculis amœnis orbicularibus 3-8 mm. diam., purpureis flavo-marginatis insidentibus, minutis, punctiformibus, in greges maculam subexplentes dense dispositis, sed vix confluentibus, compactis, atris; teleutesporis globosis, ovatis vel ellipsoideis, apice rotundatis, leniter incrassatis (usque 4 μ .), levibus, brunneis, 18-28 \times 14-22; pedicello leniter colorato, tenui, persistenti, sporam subæquante.

Hab. in foliis *Gnaphalii* (*Anaphalis*) margaritacei in Washington et Columbia britannica Americæ bor. (HOLWAY, SUKSDORF).

139. **Uromyces Homogynes** Ed. Fischer, Centralbl. f. Bakter. etc. II 2237 Abt. Bd. XXII (1908) p. 96, fig. 3. — Pycnidiis et æcidiis (*Æcidium Homogynes* Schr., Syll. VII, p. 801); uredo et teleutosporæ ut in *Urom. Veratri* (DC.) Schr., s. l., Syll. VII, p. 543.

Hab. æcidia in foliis *Homogynes* alpinæ, uredo- et teleutosporæ in foliis *Veratri* albi, in Helvetia alibique.

140. **Uromyces Adenostylis** Ed. Fischer, Centralbl. f. Bakter. etc. 2238 II Abt. Bd. XXII (1908) p. 96, fig. 2. — Æcidiis *Æc. Adenostyles* Sydow — Syll. XVI, p. 340.

Hab. æcidia in foliis *Adenostylis* albifrontis, uredo- et teleutosporæ in foliis *Veratri* albi.

141. **Uromyces Silphii** Arth., Journ. Myc. XIII (1907) p. 202. — Pycni- 2239 diis et æcidiis (*Æc. Compos.* v. *Silphii* Burr., Syll. VII, p. 798, *Æc. Silphii* Syd.); uredosoris amphigenis, sparsis, rotundatis v. elongatis, parvis 0,3-0,5 mm. long., 0,2-0,3 mm. latis, diu tectis, ob-

scure cinnamomeo-brunneis; uredosporis late ellipsoideis v. quandoque obovatis, 15-23 \approx 13-19, tunica flavo-aurata, 1,5 μ . circ. cr., sparse et conspicue echinulata, poris 5-6 sparsis; teleutosoris amphigenis, sparsis, rotundatis v. subelongatis, 0,2-0,6 mm. long., 0,2-0,3 mm. latis, diu tectis, firmis, subpulvinatis, nigro-brunneis, erumpentibus; teleutosporis angulato-obovatis, rotundatis, truncatis, v. supra raro acutatis, basi plerumque angustatis, 26-35 \approx 12-19, tunica castaneo-brunnea 1,5-2 μ . cr., supra usque ad 7-10 μ . incrassata, levi; pedicello pallide castaneo-brunneo, sporam æquante v. dimidio longiore.

Hab. æcidia in foliis Silphii integrifolii, S. terebinthinacei, S. perfoliati, S. laciniati, uredo- et teleutosporæ in foliis Junci tenuis, J. dichotomi, Amer. bor.

142. **Uromyces comedens** Sydow, Mon. Ured. II (1909) pag. 37. — 2240

Æcidiis hypophyllis, maculis orbicularibus fuscis depressis insidentibus, in greges rotundatos 2-8 mm. latos, dense dispositis et incrassationes efficientibus, cupulatis, albido-flavis, margine laceratis; æcidiosporis angulato-globosis, dense verruculosis, hyalino-flavidis, 18-21 μ . diam.; teleutosoris intra æcidiorum cupulas erumpentibus sed eos non omnino dejicientibus, pulvinatis, obscure brunneis; teleutosporis ellipsoideis, oblongis subinde clavatis, apice rotundatis, truncatis v. acutis, vix v. leniter incrassatis (usque 5 μ .), levibus, brunneis, 30-58 \approx 18-25, episporio c. 3,5-4 μ . cr.; pedicello brunneo, persistenti, crasso usque ad 100 μ . longo.

Hab. in foliis Jasmini pubescentis, Muniपुर Indiae or. (G. WATT). — *U. Hobsoni* Viz. proximus.

143. **Uromyces Plantaginis** Vestergr. in Sydow, Mon. Ured. II (1910) 2241

p. 354. — Teleutosoris amphigenis, irregulariter distributis, subinde totum folium obtegentibus, minutis, rotundatis $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam., epidermide fissa cinctis, pulverulentis, cinnamomeo-brunneis; teleutosporis globosis, subglobosis v. late ellipsoideis, apice rotundatis, vix v. lenissime incrassatis, dense minuteque punctatis, brunneis, 21-30 \approx 18-25, episporio c. 2 μ . crasso; pedicello brevi, hyalino.

Hab. in foliis Plantaginis tubulosæ, Jujuy, Moreno pr. Salinas grandes, Argentina (R. E. FRIES).

144. **Uromyces Armeriæ** (Schlecht.) Lév. Ann. Sc. Nat. III Sér., 2242

v. VIII (1847) p. 375, Syd. Mon. Ured, II, p. 40, *Cæoma Armeriæ* Schlecht., Fl. Berol. II pag. 126 (1824); *Urom. Limonii* (DC.) Lév. — Syll. VII, p. 533, p. p. — Ab *U. Limonii* differt

soris mox pulveraceis, teleutosporis brevioribus sed latioribus; pedicello breviori, mox deciduo, hyalino.

Hab. in foliis caulibusque *Armeriæ alpinae*, *A. longibracteatae*, *A. splendentis*, *A. vulgaris* in tota Europa.

145. **Uromyces Acantholimonis** Syd. Ann. Mycol. IV (1906) p. 28. — 2243

Soris uredosporiferis amphigenis, sparsis, rotundatis vel oblongis, epidermide diutius tectis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobosis vel late ellipsoideis, dense verruculosis, flavo-brunneis, 25-35 \approx 24-32, episporio 2 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ μ . crasso, poris germinationis 2-3 instructis; soris teleutosporiferis amphigenis, sparsis, rotundatis vel oblongis, epidermide fissa cinctis vel semitectis, pulvinatis, atris; teleutosporis globosis, subglobosis, ovatis vel ellipsoideis, rarius oblongis, apice rotundatis, rarius leniter attenuatis, incrassatis (usque ad 7 μ .), basi sæpius rotundatis, levibus, brunneis, 24-40 \approx 20-28; pedicello persistenti, hyalino, apice tantum dilute brunneolo, crasso, usque ad 90 μ . longo.

Hab. in foliis *Acantholimonis schirasiani* et spec. affin. in Persia, Turkestan — Intermedia species inter *U. Armeriæ* et *U. Limonii*.

146. **Uromyces Limonii** (DC.) Lév. — Sacc. Syll. VII, pag. 532. — 2244

var. **Statices-pycnanthæ** R. Maire, Champ. Asie Min., Bull. Soc. Sc. Nancy (1906) Extr. pag. 17. — A typo differt teleutosporis rotundatis, non elongatis, 24-39 \approx 21-26, plerumque 25-29 \approx 23-25; teleutosoris ab uredosoris non distinctis.

Hab. in foliis caulibusque *Statices pycnanthæ* in paludibus salsis Kilissé-Hissar, infra Nigde Asiæ minoris.

147. **Uromyces politus** Mac Alpine, Rusts of Australia (1906) p. 98, 2245

tab. XXXIX, fig. 297-298, tab. XLIII, fig. 317; Sydow, Mon. Ured. II (1910) pag. 236. — *Æcidiis* (cfr. *Ræstelia polita* Berk., Syll. VII, pag. 833); teleutosoris iisdem maculis insidentibus, sæpe *æcidiis* immixtis, sparsis v. confluentibus, oblongis, 1-2 mm. longis, epidermide fissa cinctis, brunneis v. atro-brunneis, compactis; teleutosporis ellipsoideis v. oblongis, apice rotundatis, incrassatis (usque ad 8 μ .), levibus, brunneis, 26-40 \approx 18-25; pedicello hyalino, persistenti, crasso, usque ad 150 μ . longo.

Hab. in caulibus *Muehlenbeckiæ Cunninghamsi*, Australia.

148. **Uromyces tingitanus** P. Henn. — Syll. XVII, p. 257. — Maire, 2246

Ann. Mycol. IV (1906) p. 334. — Hic auctor legit loco classico prope Aïn-Sefra in foliis *Rumicis tingitani* etiam statum

uredosporum quem l. c. ita describit: uredosoris in maculis minutis purpureis insidentibus, cinnamomeo-ferrugineis, diu epidermide atro-purpurea velatis, rotundatis, 0,1-1,5 mm. diam., sæpe confluentibus et totam folii superficiem obtegentibus; uredosporis plerumque ellipsoideo-oblongis, rarius ovoideis, 26-33 \times 16-22, episporio fulvo, tenui, dense verruculoso, verruculis subtilissimis longitudinaliter seriatis; poris duobus æquatorialibus, sed ægre conspicuis.

149. **Uromyces borealis** Liro in Uredineæ Fennicæ, pag. 77 (1908); 2247 Syd. Monogr. Ured. II. p. 241. — Omnia ut in *Urom. Acetosæ*, sed differt defectu uredosporarum et teleutosporis magis verruculosis vel verruculoso-reticulatis.

Hab. in foliis *Rumicis arifolii*, Kola Fennicæ (KARSTEN).

150. **Uromyces argæus** R. Maire, Champ. Asie Min., Bull. Soc. Sc. 2248 Nancy (1906) Extr. p. 16, fig. 3. — Uredosoris maculis pallidis insidentibus, mox nudis, minutis, rotundatis, sparsis, cinnamomeo-brunneis; uredosporis ovoideis v. ellipsoideis 19-30 \times 18-25, episporio dilute brunneo, sparse verruculoso, 3 rarius 2 poros gerentibus; teleutosoris atro-brunneis, minutis, pulverulentis, rotundatis, sparsis; teleutosporis subglobosis ovoideis v. ellipsoideis, basi rotundatis, apice poro pertuso papilla hyalina applanata auctis, 22-28 \times 18-24, episporio brunneo, crassiusculo, 3 μ ., minute verruculoso, verruculis inordinatis; pedicello hyalino, deciduo.

Hab. in foliis *Rumicis tuberosi* ad insulas in M. Argæo pr. Tekir alt. 2000 m. Asiæ minoris. — Ab *Urom. Rumicis* et *Urom. Acetosæ* satis distinctus.

151. **Uromyces Salsolæ** H. W. Reichardt, Verh. k. k. zool. bot. Ges. 2249 Wien (1877) p. 842-843. — Syll. VII, p. 574. — *Uromyces Salsolæ* Rabenh. Hedwigia (1879) pag. 19 nom. nud. Sec. Cl. W. Tranzschel (Ann. Mycol. V (1907) p. 548) hæc est completa diagnosis speciei: pycnidiis inter æcidia dispositis, ostiolo prominente; æcidiis foliicolis in greges parvos, 2 mm. diam., dense aggregatis, semiimmersis, cupuliformibus, margine albo lacerato, parum prominentibus, pariete cellularum pseudoperidii externa incrassata, levi, interna tenui, verrucosa; æcidiosporis angulatis 17-24 \times 17-20, episporio achroo, minutissime verruculoso, contentu aurantiaco; uredosoris foliicolis v. calycicolis, sparsis v. aggregatis, rotundatis v. oblongis, epidermide lacerata cinctis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis ellipsoideis vel oblongis, 22-27 \times 15-19, episporio flavido, dense minute echinulato, poris germinativis 6-9; teleutosoris uredosoris similibus sed compactis, fusco-atris; teleuto-

sporis ovatis v. subglobosis, 24-34 \approx 18-24, apice rotundatis, obtusis v. conoideis, basi rotundatis, episporio castaneo-brunneo, levi apice incrassatis (3-5 μ .), pedicello hyalino, persistente, usque ad 100 μ . longo.

Hab. in foliis Salsolæ Kali in Romania, Rossia merid., S. Sodæ in Austria, S. brachiatae in Rossia merid., S. gossypinæ, S. glaucæ, S. rigidæ in Turkestania. In speciebus variis Petrosimonie, Halimocnemis, Halanthii nascitur species peraffinis nisi identica cum *Uromycete Salsolæ*, ulterius tamen inquirenda et ad quam forte pertinet ipsa *Puccinia Polycnemi* J. Libosch. Mém. Soc. Sc. nat. Moscou V (1817) p. 73-83, t. IV, f. 3 a-b (TRANZSCHEL l. c.).

152. **Uromyces nidificans** Tranzschel, Ann. Mycol. V (1907) p. 548. 2250

— Uredosoris caules et folia occupantibus, rotundatis v. irregularibus, epidermide rupta cinctis, partim confluentibus, cinnamomeo-fuscis; uredosporis ovatis, ellipsoideis vel rarius subglobosis, 22-30 \approx 19-22, episporio æquali, echinulato, fuscidulo, poris germinativis 10 (an semper?); teleutosoris compactis, atro-fuscis; teleutosporis, serius in uredosoris orientibus, subglobosis v. ovatis, apice rotundatis, 22-28 \approx 18-23, episporio levi, brunneo, apice usque ad 6 μ . incrassato, pedicello persistente, hyalino, usque ad 70 μ . longo, 8 μ . crasso.

Hab. in foliis caulibusque Salsolæ subaphyllæ C. A. M. in arenosis prope Repetek regionis Transcaspicæ Turkestaniæ. — Ex ramis vix inflatis, ex uno loco, multi ramuli congesti, crebre ramosi, normalibus crassiores, fungo infecti oriuntur, quasi nidum (usque ad 35 cm. diam.) in frutice æmulantes. *Uromyceti Salsolæ* Reich. affinis.

153. **Uromyces Eurotiæ** Tranzschel, Ann. Mycol. V (1907) p. 547. 2251

— Soris teleutosporarum hypophyllis, parvis, sparsis, maculis supra lutescentibus insidentibus, fuscis, pulverulentis; teleutosporis globosis, 18-19 μ . diam vel etiam ellipsoideis, 22-24 \approx 17-18, episporio tenui, flavido-fusco, levi, apice papilla hyalina plana humillima ornato; uredosporis paucis immixtis ellipsoideis, 25-29 \approx 22-24, episporio dilute flavido, sparse echinulato, poris germinativis 4 visis.

Hab. in foliis Eurotiæ ceratoidis prope Sarepta prov. Saratov Rossicæ (BECKER et WUNDERLICH in herbario).

154. **Uromyces Atriplicis** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 100, 2252 tab. XVII, fig. 146-147; Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 228. —

Uredosoris plerumque epiphyllis, sparsis, minutis, rotundatis, c. $\frac{1}{2}$ mm. diam, epidermide fisso cinctis, compactis, flavo-brunneolis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, subtiliter echinulatis, flavo-brunneis, 21-29 \approx 18-25, episporio c. 2,5 μ . cr., poris germinativis 3-5 præditis; teleutosporis immixtis, globosis subglobosis v. breviter ellipsoideis, apice rotundatis et lenissime incrassatis, longitudinaliter tenuissime striatis, brunneis, 22-29 \approx 20-25; pedicello hyalino, brevi.

Hab. in foliis *Atriplicis semibaccatæ*, prope Melbourne Victoria, Australia.

155. **Uromyces Iresines** Lagerh. in Sydow, Mon. Ured. II (1910) 2253 p. 227. — Teleutosoris hypophyllis, maculis rotundatis vel indeterminatis pallidis insidentibus, minutis, c. 0,5 mm. diam., in greges orbiculares v. suborbiculares sæpe concentrice dispositis, compactis, fuscis, ob germinationem cinereo-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, oblongis v. clavatis, apice rotundatis, plerumque lenissime incrassatis, basi plerumque attenuatis, levibus, hyalino-flavidis, 28-42 \approx 14-20, episporio 1 μ . cr.; pedicello hyalino vel flavidulo, persistenti, crassiusculo, usque ad 80 μ . longo.

Hab. in foliis *Iresines* sp., Quito Æquatoriae Amer. austr. (LAGERHEIM).

156. **Uromyces Polycnemi** Mac Alp., Rusts of Austr. (1906) p. 210, 2254 tab. XLIII, fig. 319; Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 229. — Æcidiis plerumque hypophyllis, sparsis v. aggregatis, cylindraceutis, usque ad 1,5 mm. longis, albo-flavis, margine lacerato, revolutis; æcidiosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, subtiliter verruculosis, flavidis, 18-25 \approx 17-22; uredosoris amphigenis, sparsis vel aggregatis, minutis v. confluendo majoribus et tunc usque ad 2 mm. longis, primo epidermide plumbeo tectis, brunneis; uredosporis plerumque ovatis v. ellipsoideis, subtiliter echinulatis, flavidis, 25-32 \approx 18-24, poris germinationis pluribus instructis; teleutosoris conformibus sed obscurioribus; teleutosporis ellipsoideis v. oblongis, apice rotundatis, vix incrassatis, levibus, brunneis, 28-45 \approx 17-25, episporio c. 1,5-2 μ . cr.; pedicello hyalino, persistenti spora brevior.

Hab. in foliis *Polycnemi pentandri*, Port Fairy Victoria Australiæ.

157. **Uromyces Celtidis** Diet., Ann. Mycol. V (1907) p. 244. — Soris 2255 hypophyllis rotundatis 1-3 mm. latis, applanatis vel convexis floccosis, exsiccatis albis, nudis; teleutosporis ellipsoideis vel clavatis,

32-45 \times 12-18, episporio incolorato æquali irregulariter striolato indutis, pedicello longissimo suffultis, mox germinantibus.

Hab. in foliis *Celtidis* sp., Mandagni, Sao Paulo Brasiliæ (A. USTERI).

158. **Uromyces Musæ** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, Ann. 2256

Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) p. 88. — Maculis oblongis v. striiformi-confluentibus gregariis, atris; uredosoris plerumque hypophyllis, rotundatis, pulvinatis, epidermide pallida fissa velatis, ferrugineis; uredosporis subglobosis v. ellipsoideis brunneis, echinatis 18-24 \times 16-20; teleutosoris rotundatis v. oblongis, atris, epidermide fissa velatis; teleutosporis ellipsoideis v. subovoideis vertice usque ad 12 μ . incrassatis, rotundatis v. acutiusculis, cinnamomeis, 22-30 \times 15-21, pedicello persistente hyalino usque ad 60 \times 4.

Hab. in foliis *Musæ* sp., Kisantu Congo Afr. trop. (VANDERYST).

159. **Uromyces Thelymitræ** Mac Alp., Rusts of Austr. (1906) p. 90, 2257

tab. XVI, fig. 136-137; Sydow, Mon. Ured. II (1910) pag. 250; *Uromyces Thelymitræ* Racib. (1909). — *Æcidiis* (*Æcid. Thelymitræ* Racib., Syll. XVI, p. 348); uredosoris amphigenis, sparsis v. gregariis, rotundatis v. ellipticis, usque ad 1,5 mm. long., epidermide fissa cinctis v. semitectis, pulverulentis, flavo-brunneis; uredosporis subglobosis, ellipsoideis v. ovatis, echinulatis, flavis, 21-30 \times 18-23, episporio c. 2,5 μ . cr., poris germinationis quatuor instructis; teleutosoris sparsis v. gregariis, rotundatis v. ellipticis, usque ad 1,5 mm. long., epidermide fissa cinctis, compactiusculis, brunneis; teleutosporis subglobosis, ellipsoideis v. oblongis, apice papilla lata dilutiore præditis, brunneis, tuberculis paucis irregularibus majusculis obsitis, 32-45 \times 25-30, episporio 6-7 μ . cr.; pedicello hyalino, longiusculo, sed deciduo.

Hab. in foliis *Thelymitræ* antenniferæ, aristatæ, crinitæ, flexuosæ, Australia, Th. javanicæ ins. Java. — Ab *Urom. citriformi* videtur diversus.

160. **Uromyces Veratri** (DC.) Schröt. — Syll. VII, p. 543. — Sec. 2258

Cl. FISCHER (Centralbl. f. Bakter. etc. II Abt. XXII (1908) p. 96) hujus speciei habentur formæ sequentes: f. **Adenostylis** Ed. Fischer l. c. (*Æcid. Adenostylis* Syd.) in *Adenostyle alpina* et f. **Homogynes** Ed. Fischer l. c. (*Æcid. Homogynes* Schr.) in *Homogyne alpina*. — Cfr. nn. 139 et 140.

161. **Uromyces Spegazzinii** (De Toni) Arthur, Bull. Torr. Bot. Cl. 2259

(1910) p. 573. — Pycnidiis et æcidiis ignotis; uredosoris (*Uredo Spegazzinii* De Toni, Syll. VII, p. 845); teleutosoris amphigenis,

sparsis, rotundatis v. ovoideis, 0,6-1 mm. cr., mox nudis, pulvinatis, theobromino-brunneis, epidermide rupta conspicuis; teleutosporis ellipsoideis v. obovoideis, 29-35 \approx 21-24, utrinque rotundatis; tunica castaneo-brunnea, 1,5-2 μ . cr., supra usque 8-10 μ . incrassata, pallide umbonata; pedicello hyalino v. subhyalino, subcrasso, sporam subæquante.

Hab. in *Commelina virginica*, *C. eleganti*, *C. erecta*, *C. angustifolia* etc., America bor. et austr.

162. **Uromyces durus** Diet., Ann. Mycol. V (1907) p. 70. — Uredo- 2260
 soris sparsis, parvis, pallide ochraceis; uredosporis ellipsoideis vel subglobosis, 23-30 \approx 18-26, episporio tenui dilute brunneo subtiliter echinulato indutis; teleutosporis crustaceis duris, nigris, irregulariter oblongis usque ad 2 cm. long., epidermide tectis; teleutosporis obovatis v. clavatis, 24-37 \approx 13-23, castaneis, levibus, apice vix incrassatis, breviter pedicellatis, paraphysibus copiosis obscure castaneis inclusis.

Hab. in foliis caulibusque *Allii nipponici*, Aki-machi, Tosa Japoniæ. — Affinis *Urom. aterrimo*.

163. **Uromyces Solariæ** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) p. 94. — Soris 2261
 amphigenis minutis vel mediocribus, rotundatis vel oblongis, epidermide fissa diu velatis vel semivelatis, obscure castaneis pulverulentis; teleutosporis ellipsoideis, subglobosis vel ovoideis, apice plerumque papilla humili hyalina ornatis, 26-40 \approx 20-25, episporio flavo-brunneo anguste reticulato donatis, pedicello brevi caduco suffultis.

Hab. in foliis *Solaria miersioidis*, Santiago, Chile (K. REICHE).

164. **Uromyces Reichei** Dies., Ann. Mycol. VI (1908) p. 94. — Soris 2262
 amphigenis minutis, sed numerosis in acervulos rotundatos usque 8 mm. longos, confluentes congestis, epidermide fissa primo semivelatis, deinde pulverulentis, castaneis; teleutosporis ellipsoideis vel obovatis, interdum angulatis, 25-34 \approx 22-30, episporio castaneo æquali levi indutis, pedicello mediocri caduco instructis.

Hab. in foliis *Triteleia Gaudichaudiana*, Santiago Chile (K. REICHE). — Ab *U. Tritelæ* dignoscitur teleutosporis majoribus et papilla apicali carentibus.

165. **Uromyces Gageæ** G. Beck. Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien 2263
 Bd. XXIX (1880) p. 26; Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 273. — Teleutosporis amphigenis, sine maculis, sparsis, rotundatis v. ellipticis, 1-3 mm. longis, epidermide plumbea medio longitudinaliter

fissa tectis, pulverulentis, tandem nudis, obscure brunneis; teleutosporis subglobosis, ovatis v. ellipsoideis, apice non incrassatis sed apiculo hyalino ornatis, levibus, brunneis, 26-40 \approx 18-28, episporio c. 2-2,5 μ . cr.; pedicello hyalino, spora brevior.

Hab. in foliis *Gageæ luteæ* et *G. pratensis*, Europa media et bor.

166. **Uromyces Lili** (Lk.) Fuck. Symb. Myc. Nachtr. III (1875) p. 16, 2264
Cæoma Lili Lk. Sp. Plant. II, p. 8 (1825); Sydow, Mon. Ured. II (1910) pag. 277; *Uromyces Erythronii* (DC.) Pass. Auct. — Pycnidiis inter æcidia dispositis, flavo-brunneolis; æcidiis (*Æc. Liliacearum* Ung., *Æc. Meleagris* Dub.) amphigenis, plerumque hypophyllis v. etiam petiolicolis cauliculisque, maculis flavescentibus v. flavo-brunneolis insidentibus, in greges rotundatos v. elongatos variæ magnitudinis sæpeque valde expansos plus vel minus dense dispositis, diu hemisphærico-clausis, tandem poro centrali apertis, sed vix cupulatis, margine non revoluta, magnis, c. 1 mm. diam., flavis; æcidiosporis angulato-globosis, dense minuteque verruculosus, flavescentibus 22-35 \approx 20-26, episporio 3-3,5 μ . cr.; teleutosporis amphigenis, plerumque hypophyllis, maculis flavescentibus insidentibus, sparsis v. greges plus v. minus dense dispositis, rotundatis v. oblongis, in petiolis sæpius elongatis, epidermide primo tectis, dein ea fissa cinctis, pulverulentis, obscure brunneis; teleutosporis globosis, subglobosis, ellipsoideis, oblongis v. piriformibus, apice rotundatis, papilla prominula hyalina instructis, verrucis lineatim dispositis vel lineis indistinctis, sæpe interruptis obsitis, brunneis, 28-44 \approx 22-30, episporio 2-3 $\frac{1}{2}$ μ . cr.; pedicello hyalino, tenui, deciduo.

Hab. in foliis, petiolis caulibusque *Fritillariæ delphinensis*, græcæ, *Meleagris*, messanensis, minoris, ruthenicæ, *Lili bulbiferi*, candidi, carniolici, crocei, passim in Europa.

167. **Uromyces Nothoscordi** Syd. — Syll. XVI, p. 1119 (nomen). — 2265
 Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 280, tab. XI, fig. 141. — Æcidiis amphigenis, maculis pallidis obsoletis insidentibus, sparsis v. paucis aggregatis, primo hemisphærico-clausis, dein cupulariter apertis, margine lacerato, non recurvato, albido; æcidiosporis angulato-globosis, subtilissime verruculosus; hyalino-flavidis 21-27 \approx 16-22; teleutosporis amphigenis, sine maculis, sparsis vel hinc inde aggregatis, minutis, rotundatis v. oblongis, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, atro-brunneis; teleutosporis ovatis v. piriformibus.

apice non incrassatis, apiculo hyalino interdum obliquo præditis, levibus, flavo-brunneis, 20-32 \approx 15-20; pedicello hyalino, tenui, sporam æquante, deciduo.

Hab. in foliis vivis *Nothoscordi striati*, Austin in Texas Amer. bor. (LONG jun.), *Allii* sp. pr. Toluca Mexico (HOLWAY). — *Urom. primoverili* Speg. affinis.

168. **Uromyces heterodermus** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 29. — 2266

Soris teleutosporiferis amphigenis, maculis nullis vel obsoletis insidentibus, irregulariter sparsis, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, rotundatis vel sæpius oblongis, usque 2 mm. longis, cinnameo-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, apice rotundatis, papillula minuta hyalina instructis, basi rotundatis, rarius leniter attenuatis, in parte superiore, præsertim circa papillulam, verrucis majusculis obsitis, deorsum levibus v. sublevibus, dilute brunneis, episporio tenui, 25-38 \approx 17-24; pedicello hyalino, caduco, sporam subæquante.

Hab. in foliis *Erythronii parviflori*, Wasatch Mts., Salt Lake Co. Utah (A. O. GARRETT).

169. **Uromyces Flemmingiæ** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo 2267

in Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. III (1908) p. 221. — Maculis effusis, fuscis; soris sparse gregariis in villo nidulantibus, atris; uredosporis subglobosis castaneis minute verrucosis, 18-22 \approx 15-20; teleutosporis subglobosis castaneis, levibus, 20-22 \approx 18-20; pedicello 10 \approx 3-4, fuscidulo.

Hab. in foliis *Flemmingiæ* sp., Boko-Sainte-Barbo Congo, Africae tropic. (VANDERYST).

170. **Uromyces Maireanus** Syd., Mon. Ured. II (1910) pag. 280. 2268

Uredosoris amphigenis, maculis irregularibus pallidis insidentibus, sparsis v. paucis laxè aggregatis, ellipticis v. oblongis, c. $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{3}$ mm. long., epidermide diutius tectis v. semivelatis, flavo-brunneis, pulverulentis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, subtiliter echinulatis, flavidis, 20-30 \approx 16-24, episporio c. 1,5 μ . cr.; teleutosoris conformibus, epidermide plumbea diu tectis; teleutosporis subglobosis, ovatis, ellipsoideis v. piriformibus, apice plerumque rotundatis, non incrassatis, levibus, flavo-brunneis, 20-34 \approx 16-24; pedicello leniter colorato, crassiusculo, usque ad 30 μ . longo.

Hab. in foliis *Ornithogali sessiliflori* prope Oran Algeriæ (R. MAIRE).

171. **Uromyces algeriensis** Syd., Mon. Ured. II (1910) p. 281; Juel 2269

Bull. Soc. Myc. Fr. (1901) p. 259, fig. 2. — Teleutosoris amphi-

genis, in greges rotundatos v. irregulares plus minusve dense dispositis, minutis, rotundatis v. oblongis, epidermide plumbea diutius tectis, obscure cinnamomeis; uredosporis immixtis subglobosis v. ellipsoideis, subtiliter minuteque echinulatis, subhyalinis, 24-32 \times 18-24, episporio c. 2 μ . cr.; teleutosporis subglobosis, ovatis v. oblongis, apice plerumque rotundatis, rarius leniter truncatis v. attenuatis, non incrassatis, basi attenuatis, levibus vel lineis paucis ab apice ad basim decurrentibus subinde anastomosantibus præditis, brunneis, 21-32 \times 14-21, episporio tenui c. 1,5 μ . cr.; pedicello hyalino, sporam æquante v. eam superante deciduo.

Hab. in foliis Scillæ obtusifoliæ in Algeria et Scillæ sp. in Tunisia (JUEL). — Ab *Ur. Scillarum* differt statu uredosporico præsentate.

172. **Uromyces Ecklonii** Bub. in Sydow, Mon. Ured. II (1910) p 25E 2270

— Uredosoris amphigenis, rotundatis v. irregularibus, sparsis v. hinc inde aggregatis, subinde confluentibus et tunc usque 1 ad mm. long., epidermide fissa cinctis, flavo-brunneolis; uredosporis globosis, subglobosis v. ovatis, minute verruculosus, flavidis 15-20 \times 13-17, episporio 1,5 μ . cr., sine paraphysibus; teleutosoris conformibus sed compactiusculis, atris; teleutosporis ovatis, ellipsoideis v. piriformibus, subinde angulatis, apice rotundatis, truncatis vel etiam conico-attenuatis, incrassatis (4-10 μ .), levibus, dilute brunneis, 22-32 \times 16-24, episporio c. 2 μ . cr.; pedicello hyalino, summo apice leniter colorato, usque ad 40 μ . longo.

Hab. in foliis *Freesiæ refractæ*, in Promontorio Bonæ Spei Africæ austr. (ECKLON et ZEYHER). — *Ur. Freesiæ* Bub. differt paraphysibus præsentibus.

173. **Uromyces Zeyheri** Bub. in Syd., Mon. Ured. II (1910) p. 255. 2271

— Teleutosoris amphigenis, sparsis vel hinc inde aggregatis, rotundatis v. transverse oblongis et confluentibus, atris, compactis, diu epidermide tectis; uredosporis immixtis globosis, subglobosis, ovatis v. oblongis, brevissime echinulatis, flavidis, 20-27 \times 20-24, episporio c. 2 μ . cr., poris germinativis 6-8 præditis; teleutosporis globosis, ovatis v. ellipsoideis, apice rotundatis, rarius truncatis v. attenuatis, incrassatis (6-9 μ .), levibus, brunneis, 25-35 \times 20-30, episporio 3-3,5 μ . cr.; pedicello persistenti, flavo v. brunneolo, crassiusculo, usque ad 70 μ . longo.

Hab. in foliis *Ixiæ scillaris* in monte Huwhoekberg Africæ austr. (R. SCHLECHTER). — Ab *Ur. Ixiæ* differt præcipue uredosporis majoribus.

174. **Uromyces delagoënsis** Bubák in Syd., Mon. Ured. II (1910) 2272 p. 255. — Uredosoris amphigenis, sparsis, minutissimis, rotundis v. oblongis, flavis; uredosporis globosis, subglobosis, ovatis v. ellipsoideis, subtiliter echinulatis, flavidis, 18-24 \approx 17-22, episporio 2-2,5 μ . cr., poris germinativis 8 instructis; teleutosoris conformibus sed atris; teleutosporis globosis, ovatis v. piriformibus, rarius ellipsoideis, subinde angulatis, apice rotundatis, truncatis, v. conico-attenuatis, incrassatis (4-9 μ .), subinde etiam vix incrassatis, levibus, brunneis, 26-38 \approx 20-28, episporio c. 2 μ . cr.; pedicello hyalino v. dilutissime brunneolo, usque ad 45 μ . longo.

Hab. in foliis Lapeyrousiæ delagoënsis, Mozambico Africæ trop. (J. JUNOD).

175. **Uromyces Bonæ-spei** Bub. in Syd., Mon. Ured. II (1910) p. 258, 2273 tab. IX, fig. 126. — Uredosoris amphigenis, sparsis v. aggregatis, rotundatis v. irregularibus, sæpe transverse oblongis confluentibusque, irregulariter apertis, flavis, pulverulentis; uredosporis globosis, subglobosis v. ovatis, brevissime echinulatis, flavidis, 20-27 \approx 15-22, episporio 2 μ . cr.; teleutosoris conformibus sed compactis, atris; teleutosporis globosis, ovatis, piriformibus v. ellipsoideis, apice rotundatis, truncatis v. conico-attenuatis, incrassatis (5-10 μ .), levibus, castaneo-brunneis, 24-36 \approx 19-27, episporio 2-3 μ . cr.; pedicello persistenti, brunneolo, crassiusculo, usque ad 50 μ . longo.

Hab. in foliis Tritoniæ scillaris et Acidantheræ pallidæ, Africa austr.

176. **Uromyces Watsoniæ** Syd., Mon. Ured. II (1910) p. 258 — Te- 2274 leutosoris amphigenis, sparsis v. aggregatis, minutis, plerumque rotundatis v. ellipticis, epidermide diu tectis, $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ mm. long., compactis, atris; uredosporis immixtis, globosis, subglobosis, vel ellipsoideis, brevissime echinulatis, flavidis, 16-20 μ . diam., episporio 1,5-2 μ . cr.; teleutosporis variabilibus, plerumque ovatis v. ellipsoideis, sæpe angulatis, apice rotundatis, truncatis v. acutiusculis, mox parum mox magis incrassatis (4-7 μ .), levibus, flavo-brunneis, 19-30 \approx 14-20, episporio tenui (c. 1 μ . cr.); pedicello brunneolo, tenui, persistenti, usque ad 50 μ . longo; paraphysibus dense coalitis, flavo-brunneis.

Hab. in foliis Watsoniæ densifloræ, Belfost Transvaal Africæ austr. (E. M. DOIDGE). — Ab *Urom. nyjkensi* Syd. et *U. Sparaxidis* Syd. distinctus.

177. **Uromyces Arisæmæ** Cke., Bull. Torr. Bot. Cl. VI (1875) p. 32; 2275

Sydow, Mon. Ured. II (1910) pag. 295; *Uromyces Caladii* Farl. et Auct. p. p. — Syll. VII, p. 537. — Pycnidiis hypophyllis, numerosis; æcidiis hypophyllis sine maculis plerumque per totam foliorum superficiem v. magnam ejus partem æqualiter distributis, minutis, breviter cupulatis, flavis, margine inciso; æcidiosporis angulato-globosis v. ellipsoideis, minute verruculosis, hyalino-flavidis, 18-26 \approx 15-21; uredosoris amphigenis, sparsis vel laxe gregariis, irregulariter distributis, minutissimis, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, dilute brunneis; uredosporis ellipsoideis, ovatis v. piriformibus, apice incrassatis (usque ad 7 μ), echinulatis (præcipue ad apicem), flavis, 25-38 \approx 17-25, episporio c. 3 μ . cr.; teleutosoris conformibus, obscure brunneis; teleutosporis subglobosis, ovatis v. oblongis, apice papilla hyalina v. subhyalina usque ad 7 μ . alta, instructis, levibus, flavis v. flavo-brunneolis, 25-32 \approx 17-25, rarius usque ad 36 μ . long., episporio 1,5-2,5 μ . cr.; pedicello hyalino, tenui, sporam circiter æquante.

Hab. in foliis *Arisæmæ Dracontii*, macrospathi, triphylli in America bor. et Mexico.

178. **Uromyces Ari-virginici** (Schw.) Howe Bull. Torr. bot. Club V 2276 (1874) p. 43, p. p., *Uredo Caladii* Schw. in Syn. Fg. Carol. sup. p. 71 (1822); Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 295. — Uredosoris amphigenis, maculis nullis v. minutis flavidis insidentibus, sparsis, subinde paucis laxè aggregatis, minutissimis, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, flavo-brunneis; uredosporis plerumque oblongis subinde clavatis, rarius ellipsoideis, apice incrassatis (usque ad 9 μ), laxè echinulatis (præcipue ad apicem), flavidis, 28-45 \approx 17-25, episporio 3-3,5 μ . cr.; teleutosoris conformibus, brunneis; teleutosporis ovatis v. oblongis, apice papilla dilutiore subhyalina usque ad 7 μ . alta, instructis, levibus, flavis v. flavo-brunneolis, 28-45 \approx 20-28, episporio 2-2,5 μ . cr.; pedicello brevi, hyalino.

Hab. in foliis *Peltandræ virginicæ*, America bor. — Ab *Urom* *Arisæmæ* differt statu æcidiali nullo nec non uredo- et teleutosporis majoribus.

179. **Uromyces juncicola** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2277 (1909) p. 312. — Maculis pallescentibus indeterminatis; soris hinc inde sparsis rarius gregariis, rimose erumpentibus subellipsoideis, 0,5-1 mm. long., tumidulis, pulverulentis, atro-ferrugineis; uredosporis globosis v. ovoideis 20-24 μ . diam., pallide fulvis. episporio tenui, minute papilluloso; teleutosporis ellipsoideo-obovatis levibus supra rotundatis, subtruncatis vel umbonatis, incrassatis,

deorsum cuneatis 25-40 \approx 24-25 pallide fulvis, pedicello subpersistente 50-60 \approx 5-6, hyalino v. vix fumoso fultis.

Hab. in foliis Junci stipularis in uliginosis alpini prope Puente del Juca Mendoza, Amer. austr.

180. **Uromyces Junci-effusi** Syd., Mon. Ured. II (1910) pag. 290; 2278

Urom. effusus Arth. (1907) nec Peck. — Uredosoris amphigenis, sparsis, ellipticis v. linearibus, minutis, $\frac{1}{3}$ -1,5 mm. longis, denique nudis, epidermide fissa cinctis, cinnamomeo-brunneis; uredosporis subglobosis v. ovatis, sparse et obtuse echinulatis, flavo-brunneolis, 18-26 \approx 14-20, episporio c. 1,5-2 μ . cr., poris germinativis 4 æquatorialibus instructis; teleutosoris amphigenis, sparsis, ellipticis v. linearibus, 0,5-2 mm. longis, confluendo subinde majoribus, epidermide denique fissa cinctis, pulvinatis, atris; teleutosporis ellipsoideis, ovatis v. oblongis, apice rotundatis v. rarius acutiusculis, valde incrassatis (usque ad 10 μ .) levibus, brunneis, apice obscurioribus, 24-34 \approx 14-19; pedicello brunneolo, persistenti, sporam circiter æquante v. parum superante.

Hab. in foliis Junci effusi in America bor.

181. **Uromyces effusus** Arth., Journ. of Mycol. XIII (1907) p. 193. 2279

— Pycnidiis et æcidiis ignotis; uredosoris amphigenis, sparsis, oblongis v. linearibus, 0,1-0,3 mm. latis, 0,3-1,5 mm. long., diu tectis, obscure cinnamomeo-brunneis, erumpentibus; uredosporis late ellipsoideis v. ovoideis 18-26 \approx 14-19, tunica flavidula 1,5 μ . cr., remote et ruditer echinulata, poris germinativis 4 æquatorialibus prædita; teleutosoris amphigenis, numerosis, sparsis, oblongis vel linearibus 0,2-0,5 mm. diam., 0,3-2 mm. v. ultra long., raro confluentibus, demum erumpentibus pulveraceis; teleutosporis obovatis v. late ovoideis 24-33 \approx 13-19, apice obtusis vel raro acutis, plerumque basi augustatis; tunica castaneo-brunnea, 1,5-2 μ . crassa, supra crassiore, 6-10 μ ., levi; pedicello colorato, sporam subæquante.

Hab. in foliis Junci effusi, in America boreali.

182. **Uromyces Heleocharidis** Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII 2280

(1906) p. 514. — Uredosoris amphigenis, sparsis, oblongis 0,3-1,5 mm. long., tarde una v. pluribus rimis longitudinalibus dehiscen-
tibus, obscure cinnamomeo-brunneis; uredosporis ex oblongo late ovoideis, 19-29 \approx 15-19, tunica flavo-aurata, 1-1,5 μ . cr., sparse et minute echinulata; poris germinativis plerumque 3, æquatorialibus v. subæquatorialibus; teleutosoris amphigenis, sparsis, 0,5-2 mm. long. v. ultra, tarde dehiscen-
tibus, theobromino-brunneis; teleu-

tosporis angulato-obovatis, supra truncatis v. rotundatis, infra angustatis, 27-45 \times 16-22, tunica leviter castaneo-brunnea, 1-1,5 μ . cr., apice 7-10 μ ., levi; pedicello colorato, sporam subæquante v. dimidium longiore.

Hab. in foliis *Heleocharidis palustris*, Amer. bor. — *U. Junci* affinis sed satis diversa.

183. **Uromyces ? americanus** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 2231 t. XIX (1909) p. 310. — Maculis subdeterminatis 1-2 mm. diam., sæpe confluentibus; acervulis minutis erumpentibus 0,5 mm. diam., epidermide fissa cinctis, subpulverulentis testaceis; uredosporis globosis 20 μ . diam., tunica tenui leniter vestitis, flavidis; teleutosporis (an mesosporis?) valde polymorphis sæpius elongato-ellipsoideis 30-50 \times 15-20, rarius clavulatis vel ovatis, rarissime 1-septato-bacillaribus, fulvis, episporio levi ubique tenui sed in marginalibus sæpe valde incrassato atque in umbonem perelongatum producto subhyalino vestitis, pedicello nullo v. brevissimo fultis, endoplasmate fulvello vix nubiloso fartis; poris germinativis sæpius tribus ad medium sitis.

Hab. in culmis vivis *Scirpi* americani in uliginosis prope Mendoza Amer. austr.

184. **Uromyces Caricis-sempervirentis** Ed. Fisch. — Syll. XIV, p. 285. 2282 — Huc spectat velut st. æcidiosp.: *Æcidium Phyteumatis* Ung. — Syll. VII, p. 567, teste cl. Fisch. Ured. Schw. p. 532, c. icone.

185. **Uromyces uniporus** Kern, *Rhodora* XII (1910) p. 125, cum 2283 icon.; Sydow, *Mon. Ured.* II (1910) p. 297. — Uredosporis hypophyllis, sparsis, minutissimis, $\frac{1}{10}$ - $\frac{1}{3}$ mm. diam., punctiformibus, mox nudis, subpulverulentis, dilute brunneis; uredosporis globosis v. subglobosis, laxe echinulatis, obscure cinnamomeo-brunneis; uredosporis globosis v. subglobosis, laxe echinulatis, obscure cinnamomeo-brunneis, 21-23 \times 18-21, episporio c. 1,5 μ . cr., poro germinativo unico prope basim sito præditis; teleutosporis hypophyllis, sparsis, minutissimis, punctiformibus, 0,2-0,5 mm. longis, mox nudis, subpulvinatis, obscure brunneis; teleutosporis ovatis, ellipsoideis v. oblongis, apice rotundatis, incrassatis (usque ad 4-9 μ .), levibus, primo flavidis, dein brunneis, 16-26 \times 13-18, episporio c. 1 μ . cr.; pedicello persistenti, apice brunneolo, sporam circiter æquante.

Hab. in foliis *Caricis debilis* var. *Rudgei*, Central Village Connect. Amer. bor. (J. L. SHELDON).

186. **Uromyces valens** Kern, *Rhodora* XII (1910) p. 125 cum icon. 2384

Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 30. — Uredosoris hypophyllis, sparsis, ovatis v. oblongis 0,5-1 mm. longis, epidermide diutius tectis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis ellipsoideis, laxe echinulatis, cinnamomeis, 19-26 \approx 16-19, episporio 1,5-2 μ . cr., poris germinativis 4 æquatorialibus instructis; teleutosoris hypophyllis, sparsis, mediocribus, oblongis v. linearibus, 0,5-2 cm. long., pulvinatis, atro-brunneis; teleutosporis ovatis, oblongis v. oblongo-clavatis, apice rotundatis, valde incrassatis (7-10 μ .), levibus, primo flavidis, dein castaneo-brunneis, 25-42 \approx 16-22, episporio 1,5-2 μ . crasso; pedicello persistenti, hyalino v. subhyalino usque ad 70 μ . longo.

Hab. in foliis Caricis utriculatae, Mattsville Indiana Amer. bor. (G. WILSON).

187. **Uromyces ovalis** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 97. — 2285

Soris amphigenis præcipue hypophyllis, minutis, e punctiformi linearibus, plus minusve distincte seriatim dispositis, nudis; uredosporis obovoidels v. ellipsoideis 20-27 \approx 16-21, dilute brunneis, echinulatis, paraphysibus capitatis numerosis dilute brunneis intermixtis; teleutosporis ovoideis, basi plerumque rotundatis, rarius tenuatis apice processibus irregularibus obtusis, coronatis, 18-30 \approx 13-17, apice castaneis basi dilutioribus; pedicello usque ad 40 μ . long., brunneolo, persistenti.

Hab. ad folia Leersia oryzoidis, Tokio Japonia. — Ab americano *Urom. Halstedii* satis diversus.

188. **Uromyces Poæ-alpinæ** W. Rytz, Mitt. Naturforsch. Gesell. Bern. 2286

(1910) pag. 6 (extr.). — Uredosoris amphigenis subrotundatis v. ellipsoideis, brunneis, diu epidermide tectis; uredosporis globosis v. ellipsoideis, sæpe angulatis, subtiliter verruculosus, flavescens, poris germinativis 2-3 præditis, 18-26 μ . diam.; teleutosoris ex uredosoris nascentibus, subrotundatis, ovatis, ellipsoideis v. oblongis, diu epidermide tectis, nigris; teleutosporis globosis, ovatis v. ellipsoideis, quoad formam et magnitudinem valde variabilibus, 18-23 \approx 15-19, semper brunneis, apice non atrioribus, episporio æqualiter crasso, rarius apice leniter incrassato.

Hab. in foliis Poæ alpinæ, Telli Kientales Helvetiæ. — Ab *U. Poæ* differt characteribus biologicis, teleutosporis brunneis nec pallidis apice non obscurioribus nec crassioribus.

189. **Uromyces Poæ** Rabh. in Unio itin. (1866) n. XXXVIII; Sy- 2287

dow, Mon. Ured. II (1910) p. 310, *Urom. pratensis* Juel (1905) *Urom. Dactylidis* Otth — Syll. VII, pag. 540 p. p. — Pycnidiis

epiphyllis, melleis, etiam hypophyllis inter æcidia sparsis, æcidiis (*Æc. Ficaricæ* Pers., *Æc. Ranunculacearum* DC. p. p., Syll. VII, p. 540 p. p.) hypophyllis v. petiolicolis, maculis flavis insidentibus, in greges rotundatos v. irregulares in petiolis sæpe elongatos dispositis, cupulatis, flavis, laceratis, margine recurvato; æcidiosporis globosis v. angulato-globosis subtiliter verruculosus, hyalino-flavidis, 17-25 \approx 12-20; uredosoris amphigenis, sparsis v. seriatim dispositis, minutis, ellipticis v. oblongis, primo epidermide tectis, pulverulentis, flavo-brunneis; uredosporis globosis, subglobosis, ovatis v. ellipsoideis, tenuiter echinulatis, flavis, 14-25 \approx 14-20, episporio 1,5-2 μ . cr., poris germinativis 4-9 instructis, subinde paraphysibus immixtis; teleutosoris plerumque hypophyllis, sparsis v. seriatim dispositis, minutis, confluendo subinde majoribus, oblongis, epidermide semper tectis, compactis, atris; teleutosporis ovatis, ellipsoideis v. piriformibus, apice rotundatis v. truncatis, vix leniter incrassatis (usque ad 4 μ .), levibus, flavo-brunneis, ad apicem obscurioribus, 17-28 \approx 14-20, episporio 1,5 μ . cr.; pedicello brunneolo, sporam subæquante; paraphysibus coalitis, brunneis.

Hab. æcidia in foliis *Ranunculi auricomi*, *bulbosi*, *cas-subici*, *Ficaricæ*, *repentis*, *silvatici*, uredo- et teleutosporæ in foliis *Poæ annuæ*, *bulbosæ*, *compressæ*, *fertilis*, *nemoralis*, *pratensis*, *trivialis*, *violacæ*, *Agrostidis albæ*, Europa, Anatolia. — Ab *Urom. Dactylidis* characteribus morphologicis ægre dignoscitur. Ob statum æcidialem in *Ranunculi* speciebus compluribus multæ formæ specificæ institutæ sunt, de quibus confer Sydow l. c.

190. **Uromyces Ranunculi-Distichophylli** Semad., Centralbl. f. Bakt. 2288 II, Abt. XVI (1906) p. 385. — Pycnidiis et æcidiis (*Æc. Ranunculacearum* f. *Ranunculi parnassifolii*), uredo- et teleutosporis ab illis *Uromycetis Poæ* ægre distinguendis.

Hab. æcidia in foliis *Ranunculis parnassifolii*, uredo- et teleutosporæ in foliis *Triseti distichophylli* in Helvetia.

191. **Uromyces Lygei** Syd., Mon. Ured. II (1910) p. 331. — Teleu- 2289
tosoris hypophyllis, sparsis, minutis, rotundatis v. oblongis, epidermide tectis, compactis, atris; uredosporis paucis immixtis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, echinulato-verruculosus, hyalino-flavidis, 20-26 μ . diam.; teleutosporis variabilibus, ovatis, oblongis v. clavulatis, apice rotundatis v. truncatis, leniter incrassatis (c. 4 μ .), basi attenuatis, levibus, dilute brunneis, apice obscurioribus, 21-28 \approx 14-20; pedicello flavido, persistenti, sporam circit. æquante.

Hab. in foliis Lygei Sparti in Sardinia (O. REINHARDT).

192. **Uromyces graminis** (Niessl) Diet. Mitth. Thür. Bot. Ver. Neue 2290

Folge Heft II (1892) p. 18, *Capitularia graminis* Niessl in Rabenh. Fungi europ. n. 1191 (1868); Sydow Mon. Ured. II (1910) p. 331; *Urom. Dactylidis* Auct. p. p. — Syll. VII, p. 540 p. p. et pag. 793 p. p. — Pycnidiis amphigenis, inter æcidia evolutis, flavidis; æcidiis (*Æc. Seseli* Niessl) amphigenis, maculis flavidis insidentibus, subinde etiam petiolicolis, in greges elongatos plerumque dispositis, albo-flavis, primo hemisphærico-clausis, dein medio poro rotundo apertis et cylindræis, margine vix revolutis, inciso; æcidiosporis globosis v. subglobosis, dense verrucosis, flavidis, 22-30 μ , diam., episporio c. 4 μ . cr., poris germinativis 3-4 prominulis instructis; uredosoris epiphyllis, sæpe etiam in vaginis evolutis, oblongis v. linearibus, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, echinulatis, flavo-brunneolis, 20-28 \approx 20-25, episporio c. 3,5 μ . cr., poris germinativis 6-8 præditis; teleutosoris epiphyllis, oblongis v. linearibus, subinde confluentibus et tunc elongatis, mox nudis, atris; teleutosporis subglobosis, ovatis v. ellipsoideis, apice rotundatis, incrassatis (usque ad 9 μ .), levibus brunneis, 22-30 \approx 18-25; pedicello hyalino, apice leniter colorato, crasso, persistenti, usque ad 120 μ . longo.

Hab. æcidia in foliis *Seseli* glauci, *Laserpitii* Sileris; uredo et teleutosporæ in foliis *Melicæ* ciliatæ et spec. affin., Italla, Austria, Helvetia, Gallia, Lusitania. — *Urom. graminis* duas species biologicas comprehendit idest *Urom. Seseli-graminis* Fisch. et *Urom. Laserpitii-graminis* Fisch. Cfr. nn. 91, 92.

193. **Uromyces Ranunculi-Festucæ** Jaap, Verh. Bot. Ver. Prov. Bran- 2291

denb. XLVII (1905) p. 90; Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 328. — Pycnidiis et æcidiis eis *Urom. Dactylidis* et *U. Poæ* simillimis; uredosoris epiphyllis, maculis flavis distinctis insidentibus, minutis, ellipticis v. oblongis, mox nudis, pulverulentis, aurantiacis, sine paraphysibus; uredosporis globosis v. subglobosis, rarius ovatis v. ellipsoideis, subtiliter echinulatis, flavis, poris germinativis 6-8 instructis, episporio 2,5-3 μ . cr.; teleutosoris epiphyllis, maculis flavidis v. obscurioribus insidentibus, minutis, ellipticis v. oblongis, compactis, atris; paraphysibus brunneis, dense coalitis; teleutosporis ovatis, piriformibus v. oblongis, apice rotundatis, truncatis v. leniter attenuatis, levibus, dilute flavo-brunneis, ad apicem obscurioribus, 20-40 \approx 15-22; pedicello sporam circiter æquante, brunneolo.

Hab. æcidia in foliis Ranunculi bulbosi; uredo- et teleutosporæ in foliis Festucæ ovinæ, Triglitz Germaniæ. — Ab *Urom. Festucæ* Syd. vix dignoscitur teleutosporis longioribus.

194. **Uromyces coronatus** Yosh. apud Diet., Ann. Mycol. V (1907) 2292 p. 70. — Soris amphigenis, præcipue hypophyllis, minutis, sparsis; uredosporis obovatis v. ellipsoideis, 21-32 \approx 16-22, dilute brunneis, apice plerumque obscurioribus, breviter echinulatis, paraphysibus clavatis, intermixtis; teleutosoris nigris pulvinatis, firmis, epidermide rupta tenui velatis; teleutosporis obovatis, obconicis v. oblongis, 25-40 \approx 12-20, apice incrassatis et processibus obtusis, varie ornatis, castaneis, basi dilutioribus; pedicello brunneolo firmo, usque ad 40 μ . longo.

Hab. in foliis Zizaniæ aquaticæ, Ushive-mura Tosa Japoniæ. — Affinis *Urom. ovali*.

195. **Uromyces tenuicutis** Mac Alp., Rusts of Austr. (1906) pag. 87, 2293 tab. XVI, fig. 133; Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 341, tab. XIV, fig. 173. — Uredosoris amphigenis sed plerumque epiphyllis, sæpe etiam culmicolis, maculis indistinctis flavidis insidentibus, minutis, ellipticis v. oblongis, 0,5 mm. longis, interdum usque 1 mm. long., primo epidermide tectis, dein ea fissa cinctis, flavo-brunneolis, pulverulentis; uredosporis subglobosis, ovatis v. ellipsoideis, echinulatis, flavidis, 25-40 \approx 18-26, episporio c. 2 μ . cr., poris germinativis 3-4 instructis; teleutosoris hypophyllis, sparsis, ellipticis v. oblongis, $\frac{1}{3}$ - $\frac{3}{4}$ mm. longis, epidermide diu tectis, atris; teleutosporis ovatis, fusiformibus v. oblongis, apice plerumque rotundatis, rarius truncatis v. acutiusculis, leniter incrassatis (usque ad 4 μ .), levibus, flavo-brunneis, 21-35 \approx 16-25; pedicello subpersistenti, brunneolo, usque ad 35 μ . longo.

Hab. in foliis Sporoboli indici, Victoria Australiæ et forte in Japonia.

196. **Uromyces Schœnanthi** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 429. — 2294 Uredosoris hypophyllis, maculis brunneolis elongatis insidentibus, sparsis v. seriatim dispositis, linearibus, 0,5-2 mm. longis, epidermide fissa cinctis, ferrugineis; uredosporis globosis, subglobosis v. ovato-oblongis, subtiliter echinulatis, flavis v. flavo-brunneis, 18-24 \approx 15-19, episporio 1,5-2 μ . cr.; teleutosoris conformibus, atris; teleutosporis variabilibus e globoso oblongis, sæpe angulatis, apice vix v. parum incrassatis, levibus, flavo-brunneis, apice obscurioribus, episporio tenui, 18-26 \approx 17-24; pedicello hyalino, apice leniter colorato, subtenui, usque ad 50 μ . longo.

Hab. in foliis *Andropogonis Schœnanthi*, Poona Ind. orient. (E. J. BUTLER).

197. **Uromyces mussooriensis** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 430. 2295

— Teleutosoris hypophyllis, sparsis v. paucis seriatim dispositis, minutis, v. oblongis 0,5-0,7 mm. long., pulvinatis, obscure brunneis; uredosporis immixtis e subgloboso ellipsoideo-oblongis, verruculosi, 17-26 \approx 14-18, flavidis, episporio 2-2,5 μ . cr.; teleutosporis globosis v. e subgloboso-oblongis apice rotundatis, incrassatis (usque ad 8 μ .), levibus brunneis, 21-28 \approx 16-23, pedicello crassiusculo persistenti, hyalino v. apice leniter colorato, usque ad 60 μ . longo.

Hab. in foliis *Stipæ sibiricæ* Mussoorie Indiæ or. (E. J. BUTLER).

198. **Uromyces Sclerochloæ** Tranzschel, Ann. Mycol. V (1907) p. 550. 2296

— Uredosoris amphigenis, sparsis, oblongis, epidermide rupta cinctis, aparaphysatis; uredosporis subglobosis, 17-25 μ . diam., episporio subachroo, dilute lutescente, echinulato, poris germinativis indistinctis (2-3?); teleutosoris amphigenis, minutis, aggregatis confluentibusque, sæpe circa sorum uredosporiferum anulum efformantibus, compactis, epidermide tectis, nigris; teleutosporis ovoideis, apice rotundatis et incrassatis (circa 3 μ .), in pedicellum brevem persistentem attenuatis, 20-28 \approx 15-18, episporio brunneo, apice incrassato obscuriore, levi; soris paraphysibus linearibus brunneis circumdatis.

Hab. in foliis *Sclerochloæ duræ* P. B. prope As'chabad regionis Transcaspicæ (S. KORZINSKIJ). — *Uromyceti Poæ* Rabh. similis.

199. **Uromyces Muehlenbergiæ** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku 2297

Imper. Univ. v. III (1909) n. 2, p. 184, tab. X, fig. 5. — Teleutosoris plerumque hypophyllis; parvis oblongis v. linearibus, sparsis v. gregariis, sæpe confluentibus, nudis, pulvinatis, compactis, prominentibus, brunneo-nigris; uredosporis sæpe immixtis, globosis, subglobosis v. ellipsoideis, minute echinulatis, 17-24 \approx 16-26, episporio brunneo-flavo, 2-3 v. 4 μ . cr.; poris germinativis 3-4; teleutosporis subglobosis ovoideis v. oblongis, apice rotundatis, angulosis v. apiculatis, incrassatis 6-13 μ ., basi rotundatis, levibus, castaneo-brunneis, apice obscurioribus, 18-28 \approx 12-21 raro usque ad 32 μ . longis; episporio crassiusculo; pedicello brunneolo, persistenti, 10-42 μ . v. usque ad 60 μ . longo; paraphysibus nullis.

Hab. in foliis *Muehlenbergiæ japonicæ*, Japonia.

200. **Uromyces Inayati** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 493. — Ure- 2298
 dosoris hypophyllis, sparsis, minutis, oblongis, usque 1 mm. lon-
 gis, pulverulentis, ferrugineis; uredosporis globosis vel subglobosis,
 dense verruculosis, dilute brunneis, 15-18 μ . diam., episporio crasso
 (ca. 3 μ .); teleutosoris hypophyllis, punctiformibus vel oblongis,
 ca. $\frac{1}{2}$ mm. longis, atris, epidermide rupta cinctis; teleutosporis
 subglobosis vel ovatis, apice semper distincte incrassatis (usque ad
 8 μ .), levibus, brunneis, 17-24 \approx 14-18; pedicello subhyalino v. fla-
 vido, usque ad 25 μ . longo, crassiusculo.
Hab. in foliis *Apludæ aristatæ*, Kumaon, Himalaya (leg.
 INAYAT, comm. E. J. BUTLER).
201. **Uromyces fragilipes** Tranzschel, Ann. Mycol. V (1907) p. 549. 2299
 — Teleutosoris amphigenis, in maculis pallidis insidentibus, diu
 epidermide bullata tectis, pulverulentis, magnis, usque ad 3 mm.
 diam., castaneo-brunneis; teleutosporis ovoideis, globosis vel rarius
 oblongis, 20-27 \approx 16-20, episporio levi, brunneo, apice non incre-
 sato; pedicello fragili.
Hab. in folio *Agropyri squarrosi* prope As'chabad re-
 gionis Transcaspicæ (S. KORZINSKI). — Sorus unicus observatus!
 sed species videtur distincta.
202. **Uromyces Sessæ** Lagerh. in Sydow, Mon. Ured. II (1910) p. 354. 2300
 — Teleutosoris epiphyllis, sine maculis, sparsis v. paucis irregu-
 lariter laxeque aggregatis, minutis, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam., rotundatis
 v. irregularibus, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, atris; te-
 leutosporis ellipsoideis, apice rotundatis, papilla plerumque conica
 flavida usque ad 7 μ . alta, ornatis, basi rotundatis, ubique verru-
 cosis (verrucis lineatim dispositis), castaneo-brunneis, 28-42 \approx 18-
 27, episporio c. 4 μ . cr.; pedicello hyalino, usque ad 35 μ . longo
 sed deciduo.
Hab. in foliis *Sessæ* sp., inter Yerbas buenas et Guayrascaja
 Æquatoriæ Amer. austr. (LAGERHEIM).
203. **Uromyces Eriochloæ** (Syd.) Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) 2301
 p. 492. — Status uredosporifer est *Uredo Eriochloæ* Syd. quam
 cfr. — Teleutosoris amphigenis vel culmicolis, minutis, sparsis v.
 aggregatis, oblongis, ca. $\frac{1}{2}$ mm. longis, atris, epidermide diutius
 tectis; teleutosporis irregularibus, angulato-globosis, ovatis vel ir-
 regulariter ellipsoideis, apice non incrassatis, levibus, flavo-brun-
 neis, 18-26 \approx 15-21, episporio tenuissimo; pedicello hyalino, tenui,
 usque ad 20 μ . longo.

Hab. in foliis culmisque *Eriochloæ polystachyæ*, Pusa, (E. J. BUTLER).

204. **Uromyces Danthoniæ** Mac Alp., Rusts of Austr. (1906) p. 85, 2302
t. XVI, f. 131 et tab. J. — *Æcidiis* amphigenis, in greges discretis dense congregatis, aurantiacis, pseudoperidiis cupulatis, albidis, re-ctis, minute dentatis 320 μ . cr.; cellulis pseudoperidii elongatis, polygoniis, margine striatis; *æcidiosporis* e subgloboso polygoniis, aurantiacis, 16 μ . cr. v. 16 \approx 12; *uredosoris* minutis, erumpentibus, parum sparsis, ferrugineis; *uredosporis* pallide flavis v. flavo-aurantiacis, late ellipsoideis vel ovatis, minute echinulatis, sex vel ultra poris germinativis præditis, 27-32 \approx 23-26; *teleutosoris* brunneis v. nigris, elongatis, seriatis, diu tectis; *teleutosporis* primo *uredosporis* immixtis, piriformibus, ovatis vel late fusoides, levibus, apice incrassatis, 30-41 \approx 20-26; pedicello elongato, persistente, pallidiore usque ad 96 μ . longo.

Hab. *æcidia* in foliis *Danthoniæ* sp., *uredo-* et *teleutosporæ* in foliis *Danthoniæ semiannularis*, Victoria, Tasmania, Australia.

205. **Uromyces Atropidis** Tranzschel, Ann. Mycol. V (1907) p. 550. 2303
— *Uredosoris* (perpaucis visis) epiphyllis, linearibus, epidermide fissa tectis, aparaphysatis; *uredosporis* subglobosis vel late ellipsoideis, 19-27 \approx 19-23, episporio subachroo, dilute lutescente, echinulato, poris germinativis indistinctis; *teleutosoris* amphigenis, linearibus, sæpe elongatis, compactis, epidermide diu tectis, nigris; *teleutosporis* ovoideis vel oblongis, in pedicellum brevem persistentem attenuatis, apice rotundatis et incrassatis (2-3 μ .), 24-32 \approx 15-22, episporio brunneo, apice incrassato obscuriore, levi; paraphysibus brunneis linearibus intermixtis.

Hab. in foliis *Atropidis distantis* pr. As'chabad et pr. Akar- 3304
Cesme (Akar-Tscheschme) regionis Transcaspicæ (S. KORZINSKIJ).

206. **Uromyces Apludæ** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 493.
Soris *uredosporiferis* hypophyllis, sparsis, oblongis, ca. 1 mm. longis, pulverulentis, ferrugineis; *uredosporis* globosis, subglobosis vel ellipsoideis, echinulatis, flavo-brunneis, 17-22 \approx 16-20, episporio tenui ca. 1 $\frac{1}{2}$ -2 μ . crasso; *soris teleutosporiferis* conformibus, sed atris et minoribus; *teleutosporis* subglobosis vel ovatis, apice non v. raro vix incrassatis, levibus, brunneis, 18-15 \approx 15-21, episporio tenui; pedicello subhyalino, tenui, usque ad 25 μ . longo.

Hab. in foliis *Apludæ aristatæ*, Bassein Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

207. **Uromyces Andropogonis annulati** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V 2305

(1907) p. 492. — Soris uredosporiferis hypophyllis, maculis stramineis vel purpureis insidentibus, sparsis vel seriatim dispositis, epidermide fissa cinctis, minutis, oblongis, ferrugineis; uredosporis globosis, subglobosis vel ovatis, subtiliter echinulatis, flavo-brunneis, 18-25 \approx 15-24, episporio tenui, ca. 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso; soris teleutosporiferis hypophyllis, eisdem maculis insidentibus, minutis, oblongis, ca. $\frac{1}{3}$ - $\frac{3}{4}$ mm. longis, atro-brunneis; teleutosporis globosis, subglobosis vel angulatis, apice rotundatis non incrassatis, levibus, castaneo-brunneis, 25-32 \approx 18-26, episporio æqualiter crasso (c. 6 μ .); pedicello hyalino, brevi, tenui.

Hab. in foliis *Andropogonis annulati*, Pusa, Wai, Cawnpur, Kumaon Himalaya, Dehra-Dun Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

208. **Uromyces Glyceriæ** Arthur, Bull. Torr. Bot. Cl. (1910) p. 572. 2306

Pycnidiis et æcidiis ignotis; uredosporis amphigenis, sparsis, ovoideis v. sublenticularibus, minutis, 0,2-0,4 mm. long., mox nudis, pulverulentis, flavo-brunneis; uredosporis late ellipsoideis v. globosis, 18-26 \approx 16-21; tunica pallide flavo-aurata, 1,5-2,5 μ . cr., minute et æqualiter verruculoso-echinata; poris 6-8 sparsis subdistinctis; teleutosporis conformibus diu tectis demum pulvinatis, obscure castaneo-brunneis, rima longitudinali conspicuis; teleutosporis irregulariter obovoideis vel oblongo-obovatis, 21-34 \approx 14-19, rotundatis, supra truncatis v. obtusis, basi plerumque angustatis; tunica levi, cinnamomeo-brunnea, basi pallidiori, 1-1,5 μ . cr., apice usque 3-7 μ . cr.; pedicello angusto, colorato, sporam æquante.

Hab. in foliis *Glyceriæ septentrionalis*, Gl. acutifloræ in America boreali. — *Ur. Poæ* affinis, a quo differt præcipue uredosporis poris germinativis numerosis præditis.

209. **Uromyces amphidymus** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 29. — 2307

Soris uredosporiferis amphigenis, sparsis, minutis, oblongis, ca. $\frac{1}{2}$ mm. longis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis globosis subglobosis vel late ellipsoideis, subtiliter echinulatis, flavidis, 21-28 μ . diam.; soris teleutosporiferis amphigenis, seriatim dispositis, oblongis vel linearibus, sed non vel vix confluentibus, usque 1 mm. longis, epidermide fissa cinctis, atris; teleutosporis variabilibus, ovatis subinde lanceolatis, apice mox rotundatis v. truncatis et vix incrassatis, mox acutiusculis et magis incrassatis (usque ad 11 μ .), basi attenuatis, levibus, flavis, 21-38 \approx 12-18; pedicello persistenti, flavido, usque ad 60 μ . longo.

Hab. in foliis *Glyceriæ fluitantis*, Oregon in Illinois

Americæ bor. (M. B. WAITE). — Subaffinis *Uromyceti graminicolæ* Burr., sed uredosporæ omnino diversæ.

210. **Uromyces Alopecuri** Seym. — Syll. IX, p. 295. — var. **japonicus** 2308
S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. Univ. vol. III, n. 2
(1909) pag. 184, tab. X, fig. 3. — A typo differt uredosoris amphigenis v. epiphyllis, uredosporis majoribus, 27-28 μ ., teleutosoris hypophyllis.

Hab. in foliis *Alopecuri fulvi* et *A. japonici*, Japonia.

211. **Uromyces superfluus** Syd., Mon. Ured. II (1910) p. 337, t. XIII, 2309
fig. 169. — Uredosoris hypophyllis, seriatim dispositis, linearibus v. elongatis, 1-2 mm. long., epidermide diutius tectis, ferrugineis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, dense minuteque verrucosis, flavidis, 18-25 \approx 16-20, episporio c. 2-3 μ . cr.; teleutosoris (paucis tantum visis) oblongis, $\frac{1}{2}$ mm. long., atris; teleutosporis globosis, subglobosis v. ovatis, apice rotundatis, valde incrassatis (usque ad 9 μ .), levibus, brunneis, 21-25 \approx 19-24, episporio c. 3 μ . cr.; pedicello persistenti, crasso, hyalino v. dilute flavido, usque ad 70 μ . longo.

Hab. in foliis *Panici antidotalis*, prope Dehra Dun India or. (E. J. BUTLER). — Ab *Urom. lineari* forma uredosporarum diversa.

212. **Uromyces leptodermus** Syd. Ann. mycol. IV (1906) p. 430 et 2310
V (1907) p. 493. — Uredosoris amphigenis, sparsis v. aggregatis minutis rotundatis v. oblongis 0,3-0,7 mm. long., mox nudis, pulverulentis, dilute cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, echinulatis brunneis, 21-32 \approx 18-25, episporio 1,5 μ . cr.; teleutosoris amphigenis sparsis, minutissimis, 0,3 mm. diam., punctiformibus, epidermide diu velatis, atris; teleutosporis variabilibus, subglobosis, angulato-globosis ovoideo-oblongis, apice non incrassatis, levibus, dilute brunneis, 18-30 \approx 14-21, episporio tenuissimo 1 μ . cr.; pedicello hyalino tenui, sporam subæquante.

Hab. in foliis *Panici javanici*, P. *Isachnes*, P. prostrati in Indiæ orient. pluribus locis. — *Uredo Isachnes* et *U. Panici-prostrati* huc spectant.

UROMYCLADIUM Mac Alp. in Ann. mycol. (1905) pag. 304 (Etym. *Uromyces* et *clados* ramus, quia plures species ramicolæ). — Pycnidia subcuticularia præcocia, depresso-globulosa, ore periphysibus destituta; sporulæ globulosæ hyalinae, minutæ. *Æcidia* hucusque ignota. Uredosporæ solitariae, teleutosporis sæpius majores, poris

germinativis pluribus distinctis præditæ, aparaphysatæ. Teleutosporæ-depresso-globosæ, in pedicello singulo sæpius binæ-ternæ, nunc omnes fertiles, nunc altera sterili cystiformi, hyalina. Species nonnullæ sunt galligenæ. — A gen. *Uromycete* teleutosporis aggregatis et horizontaliter depressis dignoscitur; postremo caractere ad *Uromycetem* (Pileolariam) *Terebinthi* vergit. Hucusque tantum Acaciarum parasita.

1. **Uromycladium simplex** Mac Alp. l. c. p. 305, tab. VIII f. 21-24, 2311
Rusts of Australia (1906) pag. 110, tab. XIX, fig. 161-165, tab. XXXII, fig. 275. — Pycnidiis rubro-brunneis, confertis, minutis, punctiformibus, circinatim dispositis, foliicolis et amphigenis sed etiam quandoque cauliculis; sporidiolis hyalinis, breviter ellipsoideis $4-5 \approx 3-4$; soris amphigenis, e rubro-brunneis obscure brunneis, numerosis quandoque in greges confertis, bullatis, mox erumpentibus, nudis; uredosporis e flavido-brunneis brunneo-auratis, e fusoido-ovoideis, apiculo hyalino præditis, minute verruculosi, plerumque 6 poris germinativis æquatorialibus præditis, $48-58 \approx 21-25$; teleutosporis primum uredosporis immixtis, solitariis et lateraliter vesicula præditis, flavido-brunneis, e depresso globosis subglobosis, levibus, apice leniter incrassatis ibique poro germinativo præditis, $22-25 \approx 25-32$, basi subumbilicatis; pedicello, hyalino, usque 80 μ . longo et ultra; vesicula hyalina, globosa, 19-22 μ . dm.

Hab. in phyllodiis et ramulis Acaciæ pycnanthæ, Victoria Australiæ.

2. **Uromycladium bisporum** Mac Alp. l. c. p. 307, tab. IX, f. 30-31, 2312
Rusts of Australia (1906) pag. 106, tab. XXIV, fig. 207-208 et tab. XXXIII. — Teleutosoris in ramulis plus minusve inflatis insidentibus, theobromino-brunneis et in foliis hypophyllis pulveraceis; teleutosporis binis, flavido-brunneis, e subgloboso depresso globosis, quandoque apiculo lateraliter auctis, apice leniter incrassatis ibique poro germinativo præditis, $18-22 \approx 22-30$.

Hab. in ramulis, foliis leguminibusque Acaciæ dealbatæ Victoria et Tasmania Australiæ.

3. **Uromycladium alpinum** Mac Alp. l. c. p. 308, tab. IX, f. 32-38, 2313
Rusts of Australia (1906) p. 105, tab. XXIV, fig. 209-215. — Pycnidiis minutis, nigris, nitidis, punctiformibus, confertis, amphigenis in maculis decoloratis insidentibus, demum soris uredoteleutosporiferis immixtis; sporidiolis hyalinis, ellipsoideis $3 \approx 2$; soris amphigenis, ferrugineo-brunneis, sparsis v. confertis, bullatis, erumpentibus dein nudis; uredosporis e flavido-brunneis brunneo-

auratis, subclavatis, raro ovoideis vel oblongis, verrucosis, apice modice incrassatis, poris germinativis 3-5 æquatorialibus lateraliter præditis, 35-51 \approx 21-26 raro usque ad 58 μ . long.; teleutosporis uredosporis primum immixtis, binis, e depresso globosis subglobosis, e flavido-brunneis obscure brunneis, levibus, apice lenissime incrassatis ibique poro germinativo distincto præditis, 19-22 \approx 25-30; vesicula globosa v. leniter ellipsoidea 25 μ . circa diam.; mesosporis uredosporis sæpe immixtis ex ellipsoideo oblongis v. obovatis, apice rotundatis, levibus, 15-25 \approx 10-15.

Hab. in phyllodiis et foliis *Acaciæ buxifoliæ*, *A. Dallahianæ*, *A. dealbatæ*, *A. implexæ*, et *A. linifoliæ*, Victoria, New South Wales, Tasmania, Queensland etc. Australiae. — *Urom. maritimo* affine sed habitu *Urom. simplicis*.

4. **Uromycladium Robinsonii** Mac Alp. l. c. p. 306, tab. VII, f. 10-13, Rusts of Australia (1906) pag. 109, tab XXII, fig. 185-189, tab. XXXII, fig. 274. — Pycnidiis supra tuberculos discoideos sitis, minutis, punctiformibus, rubro-brunneis; sporidiolis hyalinis minutis, subglobosis, 3-4 μ . circ. diam.; soris amphigenis, numerosis, confertis, usque ad $\frac{3}{4}$ mm. diam. ferrugineis, mox erumpentibus, pulveraceis, pycnidia sæpe circumdantibus; uredosporis pallide flavidis, ex ovoideo ellipsoideis v. elongato-ellipsoideis, apice usque ad 6 μ . incrassatis, verrucosis, 2-3 poris germinativis æquatorialibus præditis, 38-45 \approx 19-22; teleutosporis primum uredosporis immixtis, solitariis sed vesicula laterali sterili præditis, e flavo auratis, e depresso globosis subglobosis, levibus, apice leniter incrassatis, 19-26 \approx 25 \approx 34; vesicula hyalina, e globoso breviter ellipsoidea, 20-25 μ . diam. v. 22-27 \approx 16-23; mesosporis ex ellipsoideo elongato-ellipsoideis v. elongato-oblongis, tunica tenui levi præditis, apice rotundatis, poris germinativis nullis, 18-22 \approx 9-12.

Hab. in phyllodiis *Acaciæ melanoxyli*, Victoria (ROBINSON), Tasmania Australiae. — *Urom. simplici* affine.

5. **Uromycladium maritimum** Mac Alp l. c. p. 307, tab. VI et VII, f. 20, Rusts of Australia (1906) p. 107, tab XX, XXI, fig. 166-184, tab. XXIV, fig. 216-217, tab. XXXII, fig. 273, t. XLIII, fig. 313-315. — Pycnidiis primum rubro-brunneis, demum nigris, punctiformibus et supra tuberculum discoideum natis, 120 μ . dm.; sporulis hyalinis breviter ellipsoideis 3 \approx 2; soris obscure brunneis, elongatis, compactis, confluentibus, erumpentibus, 2-3 mm. long., pycnidia plerumque circumdantibus; uredosporis ex ovoideis ellipsoideis v. elongato-ellipsoideis, e pallide brunneis obscure brun-

neis, verrucosis apice incrassatis, 3-7 poris germinativis æquatorialibus præditis, 45-60 \approx 24-28; pedicello deciduo, hyalino, elongato 106 \approx 5; teleutosporis primum uredosporis immixtis, binis et vesicula laterali solitaria, hyalina præditis, e subglobosis depresso globosis, obscure brunneis, crasse tunicatis, levibus, contentu minute granuloso, apice leniter incrassatis, poro germinativo apicali prominenti præditis, 30-32 μ . diam. v. 22-25 \approx 24-30; vesicula sterili hxalina, globosa, tenuissime tunicata, 30-35 μ . diam.; mesosporis plerumque uredosporis immixtis, plerumque unilocularibus raro bilocularibus, pallidis, levibus, poris germinativis, inconspicuis, fusoides v. ellipsoideis v. quandoque etiam clavatis, 22-45 \approx 11-19, raro usque ad 57 μ . long.

Hab. in ramulis et phyllodiis *Acaciæ longifoliæ*, Victoria et Tasmania Australiæ.

6. **Uromycladium notabile** (Ludw.) Mac Alp. l. c. pag. 309, tab. IX, 2316 f. 39-42, *Uredo notabilis* Ludw. — Syll. XI, p. 222. — Teleutosporis uredosporis intermixtis, subglobosis vel depresso globosis, flavido-brunneis, verrucis crebris lineatis conspersis, apice leviter incrassatis, 16-23 \approx 21-26.
7. **Uromycladium Tepperianum** (Sacc.) Mac Alp. l. c. p. 310 c. ic. p. 311 2317 et tab. VII, fig. 14-19. — Ita vocandus *Uromyces Tepperianus* Sacc. — Syll. IX, p. 291.

BLASTOSPORA Dietel, Ured. aus Japan. II, Ann. Mycol. II (1908) p. 220, cum icon. (Etym. *blastos* germen et *spora*). — Uredosporæ solitariæ, non catenulatæ. Teleutosporæ solitariæ, liberæ, uniloculares statim post maturitatem germinantes, apice in promycelium typicum quadriloculare elongatæ.

1. **Blastospora Smilacis** Diet. l. c. p. 211 cum icon. — Maculis brun- 2318 neis rotundatis, soris uredosporiferis hypophyllis minutis, ochraceis vel aureis, nudis; uredosporis globosis vel subglobosis, 20-25 μ . diam., episporio hyalino echinulato præditis, contentu aurantiaco; teleutosporis circularibus vel irregularibus 1-2 mm. latis, nudis, pulveraceis, aureis; teleutosporis late ellipsoideis, episporio tenui levi hyalino indutis, 37-45 \approx 27-35; pedicello brevi, caduco instructis, e promycelio 85 μ . longo, 18 μ . lato, germinantibus.

Hab. in foliis *Smilacis Sieboldi* Miq. Engyoji, Tosa, in Japonia (T. YOSHINAGA).

GERWASIA Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) p. 270 (Etym. ignota). — Hypha fertilis apice vesiculose incrassata et sterigmatibus tecta. Teleutosporeæ globulosæ coloratæ regulariter peripherice dispositæ et tunc a gen. *Uromycete* et *Uromycladio* diversa.

1. **Gerwasia Rubi** Raciborski, l. c. p. 271. — Maculis hypophyllis, 2319 sparsis, flavo-aurantiacis, rotundatis vel irregularibus 0,2-1 mm. lat.; soris paucisporis vix conspicuis; hypha fertili ex stomatibus exeunte, 20-24 μ . long., cylindræa 4-6 μ . lata, apice vesiculosa et 8-12 μ . lata; sterigmatibus 4-15, basi incrassatis 18-23 \approx 6-9; sporis globosis, levibus, flavo-aurantiacis, 20-24 μ . cr.; teleutosporis mox germinantibus; sporidiolis subobovatis, 14-16 \approx 9-10.

Hab. in foliis *Rubi* sp. in ins. Java.

ENDOPHYLLUM Lév. — Syll. VII p. 767, XVI p. 322, XVIII p. 263.

1. **Endophyllum Dichroæ** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 2320 p. 274. — Maculis foliicolis hypertrophicis flavo-aurantiacis 3-4 mm. latis; teleutosoris cylindræeis, profunde immersis 400 \approx 160, peridio parum distincto circumdati; teleutosporis ovoideo-angulosis, levibus, flavo-aurantiacis, tenui-tunicatis, 28-38 \approx 18-20, a cellulis magnis quadrangulis separatis, sed inter se semper connexis; basidiis cylindræeis, rectis v. incurvatis 10-13 μ . cr., longitudine variabilibus; sterigmatibus breviter conoideis 10-13 μ long.; sporidiolis breviter ovoideis, levibus.

Hab. in foliis *Dichroæ cyanitis* in mont. Gedeh et Pangerango in ins. Java.

2. **Endophyllum Vernoniæ** (Arth.) Arth., North Amer. Pl. VII (1907) 2321 p. 126, *Dietelia Vernoniæ* Arthur, Botan. Gaz. 40 (1905) p. 198. — Pycnidiis plerumque epiphyllis, numerosis, in greges orbiculares confertis, punctiformibus, e flavo-auratis brunneis, prominentibus subepidermicis, depresso-globosis, subconoideis, 130-145 μ . latis, cavitate centrali ampla, periphysibus agglutinatis; teleutosoris hypophyllis, pycnidiis contraposis 2-7, circinnatim dispositis v. solitariis, rotundatis, 0,5 mm. diam., mox nudis pulverulentis; pseudoperidio evanescenti; teleutosporis ellipsoideis v. globosis, plus minusve angulosis mutua pressione irregularibus, 30-37 \approx 22-27; tunica pallide flava, 1,5-2 μ . cr., crebre et crasse verrucosa, areola basilari excepta, tuberculis quandoque deciduis.

Hab. in foliis *Vernoniæ* (Deppeanæ?), Mexico.

3. **Endophyllum Rivinæ** (B. et C.) Arth., North Amer. Fl. VII (1907) 2322 p. 126. — Ita vocandum est *Æcidium Rivinæ* B. et C. — Syll. VII, p. 818.

COLEOPUCCINIA Pat. — Syll. IX, p. 313.

1. **Coleopuccinia simplex** Diet., Ann. Mycol. VII (1909) p. 355. — 2323
Maculis purpureis circ. 1 mm latis; teleutosoris plerumque globosis, ceraceis, flavis, 0,2-1 mm. latis; teleutosporis unilocularibus, forma valde variis: oblongis, fusiformibus, ovoideis v. subglobosis, 20-55 × 10-20 (horizontaliter seriatis et deorsum vagina gelatinosa obductis).

Hab. in foliis *Eriobotryæ japonicæ*, Ushioe-mura Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA). — A typo generis teleutosporis simplicibus, non partitis dignoscitur.

HEMILEJA Berk. et Br. — Syll. VII, p. 585.

1. **Hemileja indica** Masee, Kew Bull. (1906) p. 40, tab. I, fig. 12. — 2324
Hypophylla; soris sparsis, subcirculariter dispositis, pulverulentis, aurantiis, 3-5 mm. lat.; uredosporis sphaericis 25 μ . diam., aurantiacis, episporio sparse et minute verrucoso, hilo late circulari; pedicello sporis longiore, 10 μ . cr., 3-septato, hyalino; teleutosporis sororum centrum occupantibus late obovatis vel subglobosis, hyalinis, episporio levi, 18-20 μ . diam.

Hab. in foliis vivis *Macropanacis* sp, Belgaum, Bombay Indiæ (HOBSON). — *Æcidia* et germinatio ignota.

2. **Hemileja helvola** Syd., Engler's Bot. Jahrb. 45 Bd. (1910) p. 260. 2325
Uredosoris hypophyllis, maculis flavis indeterminatis insidentibus, dense sparsis et sæpe totum folium æque obtegentibus, minutissimis, flavidis; uredosporis angulato-globosis v. angulato-ovatis, una parte aculeis validis hyalinis c. 3 μ . long., obsitis, altera ut videtur sublevibus, 20-32 × 18-26, membrana hyalina 2-3 μ . cr.; teleutosoris conformibus sed pallidioribus; teleutosporis in apice hypharum ramosarum per epidermidem fasciculatim erumpentium solitarie ortis, primo subovatis v. subglobosis, mox autem varie angulatis et processus complures variæ formæ et magnitudinis ostendentibus, ceterum levibus hyalinis, 16-32 μ . diam.

Hab. in foliis *Rubiaceæ* cujusdam, Ndembo Congo Africæ trop.

3. **Hemileja Scholzii** (P. Henn.) Syd., Engler's Bot. Jahrbüch. 45 Bd. 2326 (1910) p. 260, *Uredo Scholzii* P. Henn. — Uredosporis globosis

v. subglobosis, aculeis validis usque ad 2 μ . longis, densiuscule obsistis, 20-28 \times 18-25, membrana hyalina 1,5-2 μ . cr.; teleutosporis angulato-globosis v. triangularibus, hyalinis, levibus, sine processibus, 18-24 \times 14-20.

Hab. in foliis *Clerodendri* spec. divers. Africa trop. — *Habitus Hemil. helvolæ* Syd.

4. **Hemileja Oncidii** Griff. et Maubl. Bull. Soc. Myc. Fr. XXV (1909) 2327 p. 138 cum tab. VI. — Maculis indeterminatis, primum vix visibilibus, dein luteolis, pulvere aurantiaco ad paginam inferiorem tectis, tandem brunneis; uredosoris hypophyllis, numerosis, pulverulentis, aurantiacis, minutis 50-100 μ . diam.; hyphis fertilibus fasciculatis, ex ostiolo stomatum exeuntibus, ramosis, 25-30 μ . long., apice clavatis; uredosporis globosis, aculeatis, intus guttulis aurantiacis repletis, tunicâ hyalinâ, 16-18 μ .; teleutosoris in centro macularum nascentibus, pallide brunneis; teleutosporis subglobosis v. fusiformibus, primum hyalinis, aculeatis, demum pallide brunneis sublevibusque, 20-23 \times 15-20; mycelio intercellulari; haustoriis ellipsoideis v. ovatis, superne denticulatis lobatisve, inferne pedicello filiformi mycelio adnexis.

Hab. in foliis vivis *Oncidii Marshalliani*, crispis, varicosi in calidariis prope Parisios Galliæ. — Ab *Hemileja americana* differt sporis minoribus, teleutosporis levibus et haustoriis.

5. **Hemileja americana** Masee, Gard. Chron. XXXVIII (1905) p. 153, 2328 fig. 53; Kew Bull. (1906) p. 40, t. I, fig. 7-11. — Hypophylla; soris late effusis, saturate aurantiis, subinde per plurima cm. extensis; uredosporis perfecte sphaericis, 24-32 μ . diam., breviter stipitatis; episporio verrucis minutis sparsis rotundatis consperso, poris binis; promycelio cylindraceo brevi-parceque ramoso; teleutosporis sororum centrum occupantibus, breviter stipitatis, hyalinis, sæpe umbone minuto obtuso apice præditis, late obovatis v. turbinatis, 30 \times 25, episporio dense minuteque verruculoso.

Hab. in foliis vivis *Cattleyæ Dowianæ*, Costa Rica.

HYALOPSORA Magn. — Syll. XVII, p. 268.

1. **Hyalopsora Asplenii-Wichuriæ** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) p. 228. 2329 — Maculis sordide brunneis indeterminatis; soris uredosporiferis amphigenis sparsis, vix 1 mm. latis, epidermide flava diu tectis; uredosporis obovatis vel piriformibus, rarius clavatis, plerumque angulatis, 22-38 \times 13-23, episporio incolorato subtiliter verruculoso inæqualiter crasso vestitis; teleutosporis adhuc ignotis.

Hab. in foliis *Asplenii Wichuriæ*, Joki-mura, Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA). — A *Hyalopsora Filicum* videtur satis distincta.

2. **Hyalopsora Cryptogrammes** Diet., Ann. Mycol. VII (1909) p. 356. 2330
— Maculis ferrugineis v. brunneis indeterminatis; uredosoris hypophyllis parvis sparsis oblongis, epidermide brunnea diu tectis, pseudoperidio tenero inclusis; uredosporis oblongis obovatis v. piriformibus, 19-28 \approx 12-17, episporio tenui, levi v. subtilissime punctato, incolori vestitis; teleutosporis non visis.

Hab. in *Cryptogramme japonica*, Matobuchi Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA).

3. **Hyalopsora Cheilanthis** (Peck) Arth., North Amer. Fl. vol. VII 2331 (1907) pag. 113; Syn. *Hyalops. pellæicola* Arth., Bull. Tor. bot. Club 33 (1906) p. 30. — Ita vocandum *Cæoma Cheilanthis* Peck, Bull. Torr. Bot. Club X (1883) p. 62 (= *Uredo Pellææ* Diet. et Neg. — Syll. XVI, p. 350 = *U. Pasadenæ* Syd. — Syll. XVII, p. 458).

Hab. in foliis *Ceropteridis triangularis*, *Cheilanthis Pringlei*, *Cryptogrammes Stelleri*, *Pellææ andromedæfoliæ* in Amer. bor. et *Pellææ ternifoliæ* in Chile.

CHNOOSPORÆ Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 423 cum icone (Etym. *chnoos* crusta et *spora*). — Pycnidia depressa, subcutanea. *Æcidia* erumpentia, irregularia, pseudoperidio nullo. *Æcidiosporæ* catenulatæ. Teleutosori ceraceo-crustacei subcutaneo-erumpentes, dein nudi. Teleutosporæ uniloculares, rarius septo transverso v. obliquo divisæ, successive non contemporanee evolutæ in eodem soro, posteriores inter prius formatas se immitentes, maturæ per mycelium quadriloculare germinantes.

1. **Chnoospora Butleri** Diet. et Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 423 2332 cum ic. — *Æcidiis* adhuc ignotis; teleutosoris hypophyllis indeterminatis, late diffusis, sæpe totam fere paginam foliorum occupantibus, sordide cinnamomeis denique albicantibus; teleutosporis cylindraceo-prismaticis v. clavatis, 35-55 \approx 10-15, flavidis.

Hab. in foliis *Adathodæ vasicæ*, Dehra Dun Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

2. **Chnoospora Sancti-Johannis** (Barcl.) Diet., Ann. Mycol. IV (1906) 2333 pag. 423. — Ita vocanda *Melampsora Sancti-Johannis* Barcl. — Syll. IX, p. 296 — quæ generis typus.

NECIUM Arthur, North Am. Xlora VII (1907) p. 114 (Etym. videtur a *necys*, *necyos* defunctus). — Teleutosporæ cellulas epidermicas matricis implentes, strata continua elongata e soris confluentibus formata constituentes, oblongæ v. prismaticæ, apparenter 1-cellulares, membrana levi colorata præditæ.

1. **Necium Farlowii** Arthur, l. c. pag. 114. — Soris continuis secus 2334 nervum medium dispositis, vix prominulis, rubentibus, ceraceis, linearibus, 1-2 mm. long., 0,3-0,6 mm. cr., soris singulis 60-100 μ . long.; teleutosporis intra cellulas epidermicas dilatatas dense stipatis, oblongis v. cylindræis, 35-58 \times 7-10, membrana pallidissime brunnea, levi, æquali, 0,5-0,8 μ . cr.

Hab. in foliis *Abietis canadensis*, Massachusetts Amer. bor. (A. B. SEYMUR).

MELAMPSORA Cast. — Syll. VII p. 586, IX p. 296, XI p. 183, XIV p. 287, XVI p. 1118, XVII p. 266, 464.

1. **Melampsora Passifloræ** Hariot, Les Uredin. in Encyclop. scient. 2335 (1908) pag. 258. — Uredosoris pustuliformibus, vix prominulis, sparsis, hypophyllis, albidis, irregularibus; uredosporis ovoideis, ellipsoideis, rarius globulosis, verrucosis, pallide flavis, paraphysibus clavatis, 68 \times 20; teleutosporis

Hab. in foliis *Passifloræ luteæ* in horto botanico, Avignon Galliæ.

2. **Melampsora Kusanoi** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 104. 2336 — Uredosoris hypophyllis in maculis flavidulis v. ochraceis, minutis, sparsis; uredosporis late ellipsoideis 19-24 \times 15-18, episporio hyalino, verrucoso vel aculeato indutis, paraphysibus numerosis, capitatis hyalinis intermixtis; soris teleutosporiferis, parvis, crustaceis sparsis v. irregulariter congregatis primo castaneis postremo nigris; teleutosporis prismaticis, usque ad 30 μ . long., 5-10 μ . lat., flavis, apice obscurioribus et vix incrassatis.

Hab. ad folia *Hyperici Ascyri*, Yumoto Nikko Japoniæ (KUSANO).

3. **Melampsora mexicana** (Arthur) Sacc. et Trott. *Bubakia mexicana* 2337 Arthur, North Amer. Fl. VII (1907) p. 104. — Uredosoris amphigenis, sparsis, rotundatis, 0,5 mm. circ. cr., mox dehiscentibus, cinnamomeo-brunneis, pulveraceis, subinconspicuis; uredosporis obovatis 27-35 \times 20-24, tunica flavo-aurata 2-2,5 μ . cr., sed supra usque ad 5-8 μ . cr., æqualiter et crasse echinulata, poris germinativis

apparenter æquatorialibus, minutis, obscuris; teleutosoris amphigenis, sparsis, irregulariter orbicularibus, confluentibus 0,5-1 mm. diam., tenuissime elevatis, indehiscentibus, nitide brunneis; teleutosporis massam compactam efformantibus, obscure catenulatis, 2-4 cellulis in quaque serie, sporis ellipsoideis v. cuboideis, 18-35 \times 10-15, externis longioribus, tunica levi, cinnamomeo-brunnea, 2-3 μ . cr., in sporis exterioribus apice 7-9 μ . incrassata.

Hab. in foliis *Crotonis calvescentis* et sp. Mexico.

4. **Melampsora albertensis** Arth, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII 2338 (1906) p. 517; North Amer. Fl. VII (1907) p. 101 (sub *Uredo*). — Uredosoris hypophyllis, numerosis, sparsis, rotundatis, 0,2-0,4 mm. lat., mox nudis, pulverulentis, pallide flavis; paraphysibus numerosis, sporis intermixtis, clavatis, 67-90 \times 9-15, tunica hyalina, 3-5 μ . cr., levi, stipite solido; uredosporis lateraliter depressis, ellipsoideis 23-27 \times 16-19 v. 23-27 \times 13-15, tunica hyalina 1,5-2 μ . pariete compresso crassiori, 2,5-3,5, æqualiter et sparse verrucoso-echinulatis, sed maculis levibus omnino destituta; teleutosoris hypophyllis, numerosis, parvis, irregularibus, distincte confluentibus, circum uredosoris in greges plus minusve extensos dispositis, subepidermicis, ceraceis, brunneo-aurantiacis; teleutosporis prismaticis 25-39 \times 10-13, tunica brunneo-aurata, levi, tenui, 1 μ . c. cr., apice crassiori 2-3 μ ., poro germinativo apicali conspicuo.

Hab. in foliis *Populi tremuloidis*, Moraine Lake, Laggan, Alberta, Canada (E. W. D. HOLWAY).

5. **Melampsora Acalyphæ** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya IV, 2339 Pt. V (1909) p. 301. — Uredosoris irregularibus v. elongatis et curvatis, epidermide rupta cinctis, maculis parvis nigris hypophyllis limitantibus, macula in pagina superiori centro alba; uredosporis in massa pallide brunneis, vitro auctis fere hyalinis, piriformibus v. subglobosis, verrucosis, 27-34 \times 24-28; teleutosporis immaturis (?) immixtis, obscure griseis, oblongis, rectis v. curvis, 40-50 \times 10-14.

Hab. in foliis *Acalyphæ fruticosæ*, Peradeniya Ceylon.

6. **Melampsora Laricis-Reticulatæ** O. Schneid., Centralbl. f. Bakter. 2340 II Abt. XV (1905) p. 233 et XVI (1906) p. 85 et pag. 167. — Species biologica affinis *Mel. Laricis-Retusæ* E. Fisch.

Hab. cæomosporæ in foliis *Laricis deciduæ*, uredo- et teleutosporæ in foliis *Salicis reticulatæ* et *S. hastatæ*, leniter inficit *Sal. herbaceam*, in Helvetia.

7. **Melampsora Ribesii-Grandifoliæ** O. Schneid., Centralbl. f. Bakter. 2341

II Abt. XV (1905) p. 233 et Bd. XVI (1906) p. 92 et p. 169. — Species biologica affinis *Melamp. Ribesii-Auritæ* Kleb.

Hab. cæomosporæ in foliis præcipue *Ribesii* alpinæ, nec non in foliis *Rib. aurei* et *R. sanguinei*, uredo- et teleutosporæ in foliis *Salicis grandifoliæ*, Helvetia.

8. **Melampsora Laricis-Nigricantis** O. Schneid., Centralbl. f. Bakter. 2342 II Abt. Bd. XIII (1904) p. 223, Bd. XVI (1906) p. 77 et p. 166. — Species biologica *Melamps. Laricis-epiteæ* Kl. affinis.

Hab. cæomosporæ in foliis *Laricis deciduæ*, uredo- et teleutosporæ in foliis *Salicis nigricantis*, *S. glabræ*, *S. Hegetschweileri*, lenissime inficit *Salicis daphnoidem*, *S. cineream*, *incanam*, *arbusculam*, *fragilem*, *acutifoliam*, *grandifoliam*, *herbaceam*, *reticulatam*, Helvetia.

9. **Melampsora Laricis-Purpureæ** O. Schneid., Centralbl. f. Bakt. II 2343 Abt. Bd. XIII (1904) p. 223, Bd. XVI (1906) p. 80 et p. 166. — Species biologica *Melamps. Laricis-epiteæ* et *M. Laricis-Daphnoidis* affinis.

Hab. cæomosporæ in foliis *Laricis deciduæ*, uredo- et teleutosporæ in foliis *Salicis purpuræ*, leniter inficit *Salicem auritam* et *Sal. daphnoidem*, fortuito *Sal. nigricantem*, *incanam*, *grandifoliam*, *cineream*, Helvetia.

10. **Melampsora Evonymi-Incanæ** O. Schneid., Centralbl. f. Bakter. II 2344 Abt. Bd. XIII (1904) p. 222, Bd. XVI (1906) p. 89 et p. 169. — Species biologica *Melamps. Laricis-Nigricantis* affinis, a qua differt matrice status cæomospori.

Hab. cæomosporæ in foliis *Evonymi europæi*, uredo- et teleutosporæ in foliis *Salicis incanæ*, Helvetia.

11. **Melampsora Gelmii** Bres. in Müller, Centralbl. f. Bakter. II Abt. 2345 XIX Bd. (1907) p. 546 et p. 561, fig. 3! et fig. 1-2 (f). — Teleutosporis cylindræo-prismaticis, gracilibus, arcte confertis, 60-90 \approx 7,5-12, apice plerumque lenissime incrassatis.

Hab. in foliis *Euphorbiæ dendroidis*, ins. Majorca et Cagliari Sardinia. — Verisimiliter etiam in *Euph. terracina* et in *E. hebecarpa*.

12. **Melampsora Euphorbiæ-Gerardianæ** W. Müll., Centralbl. f. Bakter. 2346 II Abt. XVII (1906) p. 210, Bd. XIX (1907) p. 548 et p. 561, fig. 6!, fig. 4, 5, 8, 9 (formæ). — Teleutosporis 40-65 \approx 7,5-12, apice crassiusculis.

Hab. in foliis *Euphorbiæ Gerardianæ*, Helvetia et E.

falcata, Istria. — Verisimiliter etiam in Euph. Characias, E. græca (? *Melamps. græca* Müll. l. c. p. 548, fig. 5), E. macrocarpa, E. oxyodonta.

13. **Melampsora Euphorbiæ-amygdaloidis** Müll., Centralbl. f. Bakt. II 2347 Abt. XIX (1907) p. 559. — Uredosporis iis ceteris speciebus simillimis; teleutosporis ignotis; habitu *Mel. Gelmii* v. *M. Gerardianæ* affinis.

Hab. in foliis Euphorbiæ amygdaloidis, Europa.

14. **Melampsora Helioscopiæ** (Pers.) Müller, Centralbl. f. Bakt. etc. 2348 II Abt. XVII (1907) p. 210, Bd. XIX (1907) p. 552 et p. 561, fig. 4!, fig. 10, 11, 12, 13 (formæ). — Syll. VII p. 586 p. p. — Teleutosporis prismaticis, 40-60 \approx 7,5-12, tunica tenui apice non incrassata præditis.

Hab. in foliis Euphorbiæ Helioscopiæ, Europa. — Huc verisimiliter ducendæ sunt formæ in Euph. orientali, E. pterococca, E. Schimperiana, E. peploidi.

15. **Melampsora Euphorbiæ-Cyparissiæ** Müll., Centralbl., f. Bakt. II 2349 Abt. XIX (1907) p. 553 et p. 561, fig. 16!, fig. 15, 19, 20, 21, 22 (formæ). — Teleutosporis prismaticis 30-50 \approx 7,5-15, tunica tenui apice non incrassata præditis, apice rotundatis.

Hab. in foliis Euphorbiæ Cyparissiæ, E. lucidæ, E. akenocarpæ, E. Esulæ, E. palustris, E. verrucosæ, Europa.

16. **Melampsora Euphorbiæ-exiguæ** W. Müll., Centralbl. f. Bakter 2350 II Abt. XVII (1907) p. 210, XIX (1907) p. 553, fig. 17 et fig. 31. — Species biologica et typo *M. Euphorbiæ-Cyparissiæ* adscribenda.

Hab. in foliis Euphorbiæ exiguæ, Helvetia.

17. **Melampsora Euphorbiæ-Pepli** W. Müll., Centralbl. f. Bakt. II Abt. 2351 XVII (1907) p. 210, XIX (1907) p. 554, fig. 18 et fig. 30. — Species biologica et typo *Mel. Euphorbiæ-Cyparissiæ* adscribenda.

Hab. in foliis Euphorbiæ Pepli, Helvetia, Austria.

18. **Melampsora Euphorbiæ-dulcis** Otth in Müller, Centralbl. f. Bakt. 2352 II Abt. XIX (1907) p. 557 et p. 561, fig. 27!, et fig. 22, 24, 25, 26, 27, 28 (formæ). — Teleutosporis e prismatico ovoideis v. rotundatis, laxis, 20-40 \approx 7,5-15, tunica plerumque crassa sed apice æquali.

Hab. in foliis Euphorbiæ dulcis (*Mel. Euphorbiæ-dulcis* Müll. s. s.), E. adenochloræ, E. muricatæ, E. virgatæ, E. pekinensis, E. carniolicæ, Europa, Asia, Japonia.

19. **Melampsora Euphorbiæ-strictæ** W. Müll., Centralbl. f. Bakter. 2353

II Abt. XVII (1907) p. 210, XIX (1907) p. 558, fig. 29. — Species biologica et typo *Mel. Euphorbiæ-dulcis* Otth adscribenda.

Hab. in foliis *Euphorbiæ platyphyllæ*, Gorizia.

MELAMPSORIDIUM Klebh. in Sorauer Zeitschr. Pflanzenkr. (1899) p. 21 et in Engl. Pflanzenfam. Pilze II, pag. 550 (Etym. a *Melampsora*, cui affine). — *Æcidia* et uredosori pseudoperidio prædita. Uredosporæ paraphysibus nullis obvallatæ, discretæ, pedicellatæ. Teleosporæ prismaticæ in crustas ceraceas connexæ.

1. **Melampsorium betulinum** (Pers.) Klebh., loc. cit. — Ita vocanda 2354
Melampsora betulina (Pers.) Tul. — Syll. VII, p. 592.
2. **Melampsorium Alni** (Thüm.) Diet. in Engl. Pflanzenf. Pilze II, 2355
pag. 551. — Ita vocanda *Melampsora Alni* Thüm. — Syll. VII,
p. 594.
3. **Melampsorium Carpini** (Nees) Diet., l. c. p. 551. — Ita vocanda 2356
Melampsora Carpini (Nees) Fuck. — Syll. VII, p. 593.

OCHROPSORA Dietel, in Berich. Deut. bot. Gesell. (1895) p. 401 et in Engl. Pflanzenfam. Pilze II, p. 43, f. 27 (Etym. *ochros* flavidus et *psora* scabies. — *Æcidia* ignota. Uredosporæ singulæ, pedicellatæ. Teleosporæ in crustas ceraceas approximatae, clavato-cylindraceæ initio 1-cellulares, dein in cellulas quatuor superimpositas partitæ. Cellulæ singulæ germinatione sporidiolum unicum fusoidem sterigmate brevi suffultum generantes.

1. **Ochropsora Sorbi** (Oud.) Diet., l. c. — Ita vocanda *Melampsora* 2357
Ariæ (Schleich.?) Fuck. — Syll. VII, p. 592.
2. **Ochropsora Nambuana** (P. Henn.) Diet., Ann. Mycol. VI (1908) 2358
p. 228. — Ita vocandum *Coleosporium Nambuana* P. Henn. —
Syll. XVI, p. 317.

Hab. st. uredo-teleutosporifer in *Elaeagno macrophylla*, Nikko Japoniæ (N. NAMBU).

CRONARTIUM Fr. — Syll. VII p. 597, IX p. 298, XIV p. 291, XVI p. 272, XVII p. 461.

1. **Cronartium eupatorinum** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2359
(1909) p. 314. — Maculis amphigenis orbicularibus determinatis, 1-4 mm. diam., fusco-albescentibus, parvis amphigenis; columellis hypophyllis laxè gregariis melleis, filiformibus, erectis v. flexuosis coriacellis 1-3 mm. long., 50-200 μ . cr., e cellulis elongatis subhyalinis dense constipatis coalescentibus constitutis; sporis elli-

psoido-obovatis, tenuissime tunicatis, 12-15 \times 10, utrinque obtusis, levibus, hyalinis, eguttulatis.

Hab. in foliis vivis Eupatorii sp. prope Coloniam Mocovi, Chaco, Amer. austr.

2. **Cronartium Comptoniæ** Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII (1906) 2360 p. 29; North Amer. Fl. VII (1907) p. 121. — Uredosoris hypophyllis, sparsis v. sæpe gregariis, rotundatis, parvis, 0,1 mm. latis, centro dehiscentibus, mox apertis, pulverulentis; peridiis subfirmis, cellulis polygoniis, partim tunica 1 μ . cr., apice usque 10 μ .; uredosporis ovoideis v. obovatis, 23-31 \times 16-21, tunica hyalina, 2,5 μ . cr., sparse et minute echinulata; teleutosoris hypophyllis, filiformibus, 40-100 μ . cr., 0,5-2 mm. long.; teleutosporis fusiformi-oblongis, 28-56 \times 13-17, utrinque obtusis; tunica subhyalina, levi, tenui 1-1,5 μ . cr.

Hab. in foliis Comptoniæ peregrinæ, Myricæ Gales, in Amer. bor. plurimis locis.

3. **Cronartium Jacksoniæ** Henn., Hedwigia, XL (1901); p. 127, Mac 2361 Alpine, Rusts Australia p. 190, tab. 37-38. — Pycnidiis melleis, confertis v. lineariter dispositis, circularibus, applanatis, cauliculis v. hypophyllis; sporulis hyalinis ex ovoideis ellipsoideis, 5-6 \times 2,5-3; teleutosoris in columnis rubro-brunneis, rectis v. curvulis, simplicibus, confertis, 2-2,5 mm. long., apice obtusis, in ramulos subinflatos dispositis; teleutosporis in massa rubro-brunneis, singillatim plus minusve pallidis, elongatis, plerumque utrinque subattenuatis, e cylindraceo fusoideis, contentu granuloso, 40-50 \times 8-10; sporioliis hyalinis, globosis, 6-7 μ . circ. diam.

Hab. in ramulis deformatis Jacksoniæ scopariæ, Platylobii formosi, Gompholobii latifolii, Bossiææ cineræ, Aoti villosæ, Victoria, Queensland, Tasmania Australia.

4. **Cronartium coleosporioides** (Diet. et Holw.) Arth., North Amer. 2362 Fl. VII (1907) p. 123. — Huc ducenda est *Uredo coleosporioides* Diet. et Holw. — Syll. XIV, p. 396. — Teleutosoris columnaribus hypophyllis, cylindraceis, brevibus, 0,5 mm. long., 80-110 μ . cr.; teleutosporis oblongis v. fusoideo-oblongis, 30-52 \times 12-17, utrinque obtusis; tunica subhyalina, levi, 1 μ . cr.

Hab. in foliis Castillejæ foliosæ et miniatæ, in Amer. boreali.

CEROTELIUM Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII (1906) pag. 30; North Amer. Fl. VII (1907) p. 123 (Etym. *ceros* cera et *telium*

pro teleutospora). — Pycnidia et æcidia ignota. Uredosori pseudo-peridio præditi, centrales dehiscentes. Uredosporæ singulæ, pedicellatæ, tunica subhyalina, echinulata, poris germinativis obsoletis, contentu colorato. Teleutosori ex teleutosporis in columnam brevem v. in massam globularem conjunctis formati, ceracei et ex uredosoris exsiliantes. Teleutosporæ 1-cellulares, catenatæ, tunica levi, subhyalina. — A gen. *Cronartio* imprimis ob teleutosporarum columnas multo breviores dignoscendum.

1. **Cerotelium Canavaliæ** Arth., l. c. — Uredosoris hypophyllis, gregariis in maculis rubro-brunneis insidentibus, confertis, parvis 0,1-0,2 mm. lat, bullatis, centro dehiscentibus; peridio tenui, cellulis polygoniis; uredosporis late ellipsoideis, v. globoideis, 26-34 \approx 18-23, tunica 1-2 μ . cr., pallide flava, sparse et minute echinulata, poris inconspicuis; teleutosoris hypophyllis, columnis supra pseudoperidia parum elevatis circ. tam longis quam crassis; teleutosporis cylindræis v. polygoniis parvis, 13-17 \approx 6-9, tunica levi, tenui, 0,5-0,8 μ ., hyalina.

Hab. in foliis *Canavaliæ* ensiformis, Porto Rico Amer. (G. P. CLINTON).

CYSTOPSORA Butler, Ann. Mycol. (1910) p. 448 (Etym. *cystis* vesica et *psora* scabies). — Sori minuti e stromatibus erumpentes. Teleutosporæ plures e cellula basali sterili oriundæ, pedicellatæ, continuæ e quibus mox germinantibus promycelium bicellulare, semi-internum sporidiola sessilia gerens oritur.

1. **Cystopsora Oleæ** Butler, l. c. p. 448, tab. VI. — Æcidiis hypophyllis dense confertis, maculis pallide brunneis leniter bullatis, 0,2-1,5 cm. diam. insidentibus, immersis, pseudoperidiis nullis; æcidiosporis globosis, ellipsoideis v. subangulatis, intus luteis, 20-24 \approx 17-22 episporio alveolato-reticulato; teleutosoris minutissimis, hypophyllis in maculis fulvis congestis albidis; teleutosporis globosis v. subpiriformibus, 20-26 μ . diam., episporio hyalino, verruculoso, crasso, basin versus attenuato, levi, pedicello caduco; promycelio crasso, sæpe curvo; sporidiolis, globosis, aurantiacis, 14-17 μ . diam.

Hab. in foliis *Oleæ* dioicæ, Khandala pr. Belgaum Indiæ orientalis.

PHACOPSORA Diet. — Syll. XIV p. 289, XVI p. 270, XVII p. 267.

1. **Phacopsora erythræa** Sacc., Ann. mycol. (1910) p. 336. — Soris 2365

hypophyllis, gregariis, pulvinatis, erumpentibus, pallidis, mox atro-fuligineis, compactis, 190-250 μ . diam.; teleutosporis in catenulas verticales 100-112 μ . altas, stipatas 8-10 superimpositis, oblongo-prismatico-cuboideis, denique secedentibus, levibus, sursum sensim crassioribus a 8-10 μ . cr. usque ad 13-14 μ . (apice) cr.; teleutosporis terminalibus brunneo-fuligineis, apice obtuse rotundatis ibique crasse et saturatius tunicatis, 18-20 \approx 13-14, e fronte visis subhexagoniis et ob contiguitatem reticulum fingentibus.

Hab. in foliis languidis *Stereospermi dentate* (Bignon.) loco Elaberet (Hamasen), Erythrææ, alt. 1550 m. (ADR. FIORI). — Pulchra species, a *Ph. punctiformi* et *Ph. Meliosmæ* teleutosporis in singula catenula multo numerosioribus, nempe 8-10 nec 3-4, mox dignoscenda. Catenulæ ex cellulis paliformibus subhyalinis oriuntur.

2. **Phacopsora Phyllanthi** Diet., Ann. mycol. (1910) p. 469. — Ma- 2366
culis magnitudine variis usque ad 2 cm. lat., arescentibus, rotundatis v. irregularibus; uredosoris hypophyllis aggregatis, parvis, singulis etiam solitariis, majoribus usque ad 1 mm. latis, stramineis, epidermide diu velatis, paraphysibus arcuatis hyalinis circumdatis; uredosporis ovoideis subglobosis, rarius oblongis, 21-30 \approx 17-21, episporio hyalino dense echinulato tenui præditis, poris germinativis nullis; teleutosoris in iisdem maculis, hypophyllis, nigris, punctiformibus, nudo oculo vix conspicuis, 80-230 μ . lat., usque ad 100 μ . cr.; teleutosporis oblongis v. polyedricis 12-20 \approx 8-14, arcte conjunctis, superioribus brunneis ceteris pallidioribus, episporio apice non incrassato vestitis.

Hab. in foliis *Phyllanthi distichi*, Godavery et Madras Ind. orient.

3. **Phacopsora Zizyphi-vulgaris** (P. Henn.) Diet., Ann. mycol. (1910) 2367
p. 469, *Uredo-Zizyphi-vulgaris* P. Henn. — Syll. XVII, p. 444 — est status uredosporicus. — Maculis fuscis epiphyllis; teleutosoris hypophyllis minimis, irregulariter aggregatis vel sparsis, nigris, lenticularibus v. minoribus globosis, usque ad 0,25 mm. lat., 45-50 μ . altis; teleutosporis oblongis v. polyedricis, 10-18 \approx 6-10, arcte conjunctis apice non incrassatis, superioribus castaneis, ceteris pallidis.

Hab. in foliis *Zizyphi Jujubæ*, Pusa Indiæ orient. et *Z. vulgaris* in Japonia.

4. **Phacopsora Meliosmæ** Kusano, Bot. Mag. Tokyo XVIII (1904) 2368
p. 148, cum icone. — Uredosoris hypophyllis, minutis, punctatis,

sparsis, pseudoperidio carentibus; paraphysibus numerosis, clavatis v. apice inflatis, 25-38 μ . diam. apice crasse tunicatis; uredosporis ellipsoideis v. obovatis, grosse echinulatis, 20-25 \approx 15-18; teleutosporis hypophyllis, minutis, densis, subinde confluentibus, epidermide velatis, ceraceis, pallide brunneis; teleutosporis inter se compactis, compressis, 3-4-stratosis, plerumque cuboideis v. elongatis, e fronte polygoniis, tenui-tunicatis, pallide brunneis, 13-25 \approx 9-18.

Hab. in foliis *Meliosmæ myrianthæ* Takao prov. Musashi Japoniæ (KUSANO).

SKIERKA Rac. — Syll. XVI p. 271.

1. **Skierka Agallocha** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) p. 275. 2369 — Maculis foliicolis rotundatis, rubidis, 1-3 mm. latis; soris ex stomatibus exeuntibus, sparsis v. circinatim dispositis; teleutosporis unilocularibus 60-100 \approx 8-12, levibus, tenuiter tunicatis, apiculo 18-25 μ . longo auctis; pedicello indistincto; sporidiolis globoso-piriformibus, 8-10 μ . latis.

Hab. in foliis *Excœcariæ Agallochæ* prope Bataviam in ins. Java.

2. **Skierka congensis** P. Henn, in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) p. 90. — Maculis gregarie sparsis, flavis, sobrotundatis; uredosoris hypophyllis sparsis v. aggregatis minutis, rotundatis, pallide ferrugineis; uredosporis clavatis v. fusoides, echinato-verrucosis, subhyalinis, 23-38 \approx 8-13; teleutosporis longe lanceolato-fusoides, utrinque acutatis, hyalinis, continuis, 50-85 \approx 6-8 in columellam capilliformem flexuosam flavidulam, c. 5 mm. long., 20-50 μ . cr., laxè coalitis.

Hab. in foliis *Sterculiaceæ* (? *Dombeyæ*), Sonso Congo, Afr. trop. (VANDERYST).

UREDINOPSIS P. Magn. — Syll. XVII p. 269.

1. **Uredinopsis Phegopteridis** Arth., North Amer. Fl. VII (1907) p. 117. — Uredosoris hypophyllis, in maculis decoloratis, venis limitatis insidentibus, sparsis, rotundatis, bullatis, minutis, 0,1 mm. diam. v. minus, brunneo-flavis, apice dehiscentibus; peridio delicato; uredosporis ovoideis v. fusiformibus, 29-58 \approx 10-16, acutis v. acuminatis, in rostrum longum, angustum 12-26 μ . long., productis, tunica hyalina, 1 μ . cr., levi sed lineis duabus longitudinalibus papillarum minutarum præditâ; teleutosporis numerosis in

mesophyllo sitis, 2-4-cellularibus, globosis, 15-19 μ . diam., tunica hyalina, tenui, usque ad 1 μ . cr., levi.

Hab. in foliis Phegopteridis Dryopteridis, Wisconsin Amer. bor. (J. J. DAVIS).

2. **Uredinopsis Pteridis** Diet. et Holw. — Syll. XIV, p. 407 (*Uredo*) 2372 et XVI p. 271. — var. **congensis** P. Henn, in Fl. Du Bas- et Moy.-Congo, Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) p. 92. — Maculis fuscidulis, rotundatis vel effusis, uredosoris hypophyllis, sparsis v. gregariis rotundatis, epidermide fuscidula primo tectis; uredosporis clavatis v. fusoideis, hyalinis, 25-50 \approx 10-17 apice acutatis, una serie aculeorum obsessis.

Hab. in foliis Pteridis aquilinæ, Hindu, Congo, Africae trop. (VANDERYST).

GYMNOSPORANGIUM Hedw. — Syll. VII p. 737, IX p. 314, XI p. 205, XVI p. 314, XVII p. 271, 461.

1. **Gymnosporangium inconspicuum** Kern, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIV 2373 (1907) p. 461; Mycologia I (1909) p. 209, 2 fig. — Teleutosoris in ramulis plerumque herbaceis insidentibus, sparsis v. plerumque aggregatis v. confluentibus, oblongis, pulvinatis, 0,4-1 mm. latis, usque 1,5 mm. alt., rubro-brunneis; teleutosporis oblongo-ellipsoideis 55-80 \approx 25-29 apice rotundatis v. acutatis, basi obtusatis, tunica tenui, 1 μ . c. cr., flavo-aurata, levibus, pedicello hyalino, carotiformi, prope sporam incrassato, 25-65 μ ., longissimo; poro germinativo in quoque loculo singulo, in superiore apicali, in inferiori ad pedicellum approximato.

Hab. in ramulis Juniperi (Sabinæ) utahensis, Glenwood Springs Colorado Amer bor. (ARTHUR et KERN).

2. **Gymnosporangium durum** Kern. Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 2374 p. 469. — Teleutosoris in excrescentia sphæroidea gallæformi 0,5-5 cm. diam., firma, inæqualiter dispositis, irregulariter applanatis, 1-1,5 mm. cr., usque 3-5 mm. altis, sæpe confluentibus, vivide castaneo-brunneis; teleutosporis anguste ellipsoideis 50-65 \approx 18-22, utrinque angustatis, septo leniter constrictis, membrana pallide cinnamomeo-brunnea, 1-1,5 μ . cr., levi, pedicello hyalino, cylindraceo, uniformi, 4-6 μ . diam., longissimo; poris germinativis 2 in quoque loculo ad septum approximatis.

Hab. in ramis Juniperi (Sabinæ) utahensis, Colorado Amer. bor.

3. **Gymnosporangium Betheli** Kern, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 2375

(1907) p. 459. — Teleutosoris in ramis plus minusve incrassatis, irregulariter dispositis, conoideis, 1-1,5 mm. cr., 1-3 mm. alt. e basi usque 3-4 mm., castaneo-brunneis, epidermide rupta circumdatis; teleutosporis ellipsoideis, 40-55 \times 17-25, utrinque rotundatis v. subangustatis, ad septum non v. parum constrictis, tunica obscure cinnamomeo-brunnea, 1-2 μ . cr., levi; pedicello hyalino, cylindraceo uniformi, 6-7 μ . diam., longissimo; poris germinativis in quoque loculo ad septum approximatis.

Hab. in ramis Juniperi (Sabinæ) scopulorum, Colorado Amer. bor.

4. **Gymnosporangium Sabinæ** (Dicks.) Wint. — Syll. VII, p. 739. — 2376
f. **constrictum** Barsali, Bull. Soc. bot. it. (1906) p. 97. — A typo differt teleutosporis ellipsoideo-oblongis, medio constrictis, 45-60 \times 16-24, castaneo-brunneis.

Hab. in ramis Juniperi phœniceæ in littorali a Castiglioncello ad Cecina Etruriæ.

5. **Gymnosporangium Amelanchieris** E. Fischer, Ztschr. f. Botanik, I 2377
(1909) p. 705, cum icon. — Ab affini *Gymnosp. juniperino* morphologice vix differt teleutosporis typice paullo majoribus et cellula superiori pro more obtusiore, sæpe rotundata; insuper æcidiis in *Amelanchiere vulgaris*, non in *Sorbo aucuparia* vigentibus.

Hab. st. æcid. in foliis Amelanchieris vulgaris, st. teleutosporicis in ramulis foliisque Juniperi communis in alpibus Helvetiæ et Italiæ.

6. **Gymnosporangium multiporum** Kern, Mycologia v. I (1909) p. 210, 2378
cum icon. — Teleutosoris inter folia squamosa erumpentibus, irregulariter dispositis, musciformibus, parvis, 0,5-0,8 mm. altis, pallide castaneo-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, 45-51 \times 20-24, apice et basi rotundatis, medio constrictis; episporio cinnamomeo-brunneo, 1,5-2,5 mm. crasso; pedicello hyalino, 7-9 μ . diam., longissimo; poris germinationis 5-7 sparsis instructis.

Hab. in ramulis Juniperi (Sabinæ) monospermæ, Trinidad, Colorado, Amer. bor. (FR. D. KERN).

7. **Gymnosporangium Davisii** Kern, Bull. Torr. Bot. Club, XXXV 2379
(1908) pag. 507. — Teleutosoris plerumque epiphyllis, ovatis v. oblongis, 0,7-1 mm. latis, 1-2 mm. long., hemisphæricis, 0,5-1 mm. altis, fusco-brunneis, epidermide rupta cinctis; teleutosporis late ellipsoideis 40-55 \times 18-28, basi plerumque angustatis, apice sæpe attenuatis, apice et sæpe juxta septum in quaque cellula papillis hyalinis 4-7 μ . cr., præditis, medio non vel vix constrictis,

episporio cinnamomeo-brunneo, 1-1,5 μ . cr.; pedicello hyalino, longissimo 3-5 μ . diam.; poris germinativis apice vel juxta septum singulis v. binis.

Hab. in ramulisque Juniperi sibiricæ, Wind Lake Wisconsin Amer. bor. (J. J. DAVIS).

8. **Gymnosporangium exterum** Ark. et Kern., Mycol. I (1909) p. 254. 2380

— Pycnidiis epiphyllis, prominulis, depresso globosis, 95-125 \times 65-90, periphysibus 48-65 μ . long.; æcidiis hypophyllis, in areis latis decoloratis insidentibus, pseudoperidiis mox laciniatis, non revolutis, cellulis 58-100 \times 10-18, pariete interiore rugoso 3-5 μ . cr.; æcidiosporis late ellipsoideis v. globoideis, 21-26 \times 17-21, tunica pallide cinnamomea, 2-2,5 μ . cr., minutissime verrucosa, poris 8-10 sparsis; teleutosoris ramulicolis e mycelio perennanti, fusoides 2-6 cm. long., 0,5-1,5 cm. cr., compressis, subinde versiformibus et anastomosantibus, subcastaneo-brunneis, demum (ob germinationem) flavidis; teleutosporis ellipsoideis, 32-42 \times 18-23, utrinque rotundatis, tunica subcinnamomea, 1-1,5 μ . cr., poro singulo in quaque cellula; pedicellis cylindricis, æqualibus, longissimis, 3-4 μ . cr.

Hab. st. æcid. in foliis Porteranthi (Spiræa) stipulati, Perryville (DEMETRIO) et Mammoth Cave (ALLEN); st. teleut. in ramulis Juniperi virginianæ, Mammoth Cave Ky. Amer. bor. (ARTHUR, KERN).

9. **Gymnosporangium globosum** Farl., The Gymosp. of the Un. States, 2381

p. 18, t. I, f. 7-11 (ut var. *Gymn. fusci*). Status æcidialis: *Æcidium globosum* Farl., Bibliogr. Index (1905) p. 49, Fischer. Hedwig. XXXIV (1895) p. 4, fig. 6, p. 3. — Pseudoperidii cellulis pariete laterali striis regularius parallelis et confertioribus, cetera ut in *Æc. cancellato*; teleutosoris dense aggregatis, siccis atrobunneis, udis aurantiacis, compresse conoideis, linguiformibus, 8-25 mm. long.; teleutosporis ovoideis subacutis, 38-45 \times 19-21; promyceliis pro more quatuor; mycelio perennanti, ramis hinc inde globoso-inflatis.

Hab. st. æcid. in foliis Piri Mali, Sorbi americanæ, Cratægi plur. spec.; st. teleut. in ramulis vivis Juniperi virginianæ in Americæ borealis pluribus locis.

10. **Gymnosporangium tremelloides** Hartig, Lehrb. d. Baumkr. II ed. 2382

p. 53 et Lehrb. d. Pflanzenkr. p. 149, f. 133-135. — *Æcidiis* (*Ræstelia penicillata* Müll., Fr., non Reb.). — Pseudoperidiis hypophyllis cupulatis in area tuberculosa nascentibus, crassiusculis ad

basim usque in filamenta 1 mm. longa, nigricantia (ob æcidiosporas fuscas) divisis; teleutosoris ex massis irregulariter auriculiformibus, flavo-aureis dein flavo-brunneis constantibus; teleutosporis late fusoides utrinque obtusiusculis, 35-60 \times 21-30, membrana sat tenui apice non incrassata præditis, illis serius evolutis paullo brevioribus, crassioribus et intensius coloratis.

Hab. æcid. et pycnid. in foliis Piri Mali, Sorbi Ariæ et Chamæmepili; teleutosp. in ramulis Juniperi communis in Germania.

11. **Gymnosporangium exiguum** Kern, Bull. Torr. Bot. Club. XXXV 2383 (1908) p. 508. — Teleutosoris foliicolis, irregulariter sparsis, liguliformibus v. conoideis, parvis v. 5-1 mm. crassis, 1-1,5 mm. altis, castaneo-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, 45-55 \times 18-23, apice et basi rotundatis v. interdum conico angustatis; medio non v. vix constrictis; episporio cinnamomeo-brunneo, 1,5 μ . c. cr.; pedicello longo, hyalino 5-6 μ . diam.; poris germinativis binis juxta septum positis.

Hab. in foliis Juniperi virginianæ, Fredericksburg Texas Amer. bor. (F. GRASSO). — A *Gymn. Nelsoni* et *inconspicuo* affine sed satis diversum.

12. **Gymnosporangium floriforme** Thaxt. in Kern, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXV (1908) p. 503. — Pycnidiis epiphyllis, copiosis, gregariis, in maculis decoloratis, punctiformibus, flavo-melleis dein nigrescentibus, subglobosis, 150-175 μ . diam.; æcidiis hypophyllis, in greges 2-6 mm. latos in maculis decoloratis circinatim dispositis, primum cylindræis 1-1,5 mm. altis, 0,2-0,5 mm. diam.; peridio dein minute fimbriato et distincte revoluto; cellulis peridialibus longis et angustis, 65-85 \times 10-14, dein humiditate curvis; æcidiosporis angulato-ellipsoideis, 23-29 \times 18-23; tunica castaneo-brunnea, 1,5-2,5 μ . cr., minute verrucosa; poris germinativis 6-8, sparsis; teleutosoris sparsis in gallis globosis v. reniformibus insidentibus, conoideis v. cylindrico-acuminatis, demum 3-10 mm. long., 1-1,5 mm. latis, castaneo-brunneis dein flavidis et epidermide rupta cinctis; teleutosporis bilocularibus, anguste ellipsoideis, 39-50 \times 15-19, utrinque rotundatis ad septum non v. leniter constrictis; episporio dilute cinnamomeo-brunneo 1-1,5 μ . cr., levi; pedicello hyalino, longissimo, 3-6 μ . diam.; poris germinativis binis ad septum approximatis.

Hab. æcidia in foliis Crtægi spathulatæ in Alabama et Arkansas Amer.; bor. teleutosporeæ in foliis ramulisque Juniperi virginianæ, Auburn Alabama Amer. bor.

13. **Gymnosporangium Miyabei** Yamada et Miyake, Bot. Mag. To- 2385
kyo XXII, n. 253 (1908) p. 23, cum icon. 1-9. — Pycnidiis epi-
phyllis, sæpe aggregatis; æcidiis hypophyllis, discretis v. confertis,
flavido-brunneis, soris 3 mm. long.; æcidiosporis irregulariter glo-
bosis v. ellipsoideis, $24 \approx 18-21$; teleutosoris initio epidermide ve-
latis, dein erumpentibus, prominenter verruciformibus v. crusti-
formibus; teleutosporis pro more 2-cellularibus, subinde 1- vel
rarius 3 cellularibus, ad septa vix constrictis, $36-80 \approx 8-20$, crasse
tunicatis, atro-brunneis; promycelio 4-cellulari, sporidiola ovoidea
 $12-18 \approx 7-11$ gerente.

Hab. st. pycn. et æcid. in foliis Piri Miyabei et P. Ariæ
var. kamaonensis; stat. teleutosp. in ramulis Chamæcypa-
ris pisiferæ et ejusdem varr. plumosæ et squarrosæ,
Morioka, Tokyo, Hakone Nikko et Iwaki Japoniæ.

14. **Gymnosporangium Libocedri** (Henn.) Kern Bull. Torr. Bot. Cl. 2386
XXXV (1908) p. 509, *Phragmidium Libocedri* (Mayr.) Henn. Hedw.
(1898) XXXVII p. 271. — Ita vocandum est *Gymn. aurantiacum*
Syd. — Syll. XVII, p. 271. — quum extat anterius homonymum
Chevallieri, Fl. env. Paris I, p. 424 (1826).

UROPYXIS Schröter -- Syll. VII p. 735, XI p. 204, XIV p. 358,
XVI p. 313.

1. **Uropyxis Roseana** Arth., North Amer. Fl. VII (1907) p. 157. — 2387
Pycnidiis amphigenis, in parvos greges uredosoris circumdatis,
brunneo-flavidis, punctiformibus, inconspicuis, subcuticularibus,
minutissimis $80-110 \mu$. latis, $60-80 \mu$. altis; uredosoris amphi-
genis, in parvos greges circulariter dispositis, sæpe confluenti-
bus in maculis decoloratis dispositis, rotundatis v. oblongis, $0,3-0,8$
mm. long., mox nudis, pallide cinnamomeo-brunneis, pulve-
rulentis; paraphysibus nullis; uredosporis obovatis v. ellipsoideis,
 $23-27 \approx 17-22$; tunica tenui $1-1,5 \mu$. cr.; pallide flava, echinulato-
verrucosa, poris germinativis 12 v. ultra sparsis, obscuris prædi-
tis; teleutosoris non visis; teleutosporis uredosoris immixtis, elli-
psoideis $29-37 \approx 18-23$, utrinque rotundatis, septo leniter constri-
ctis; tunica stratosata, stratu interno cinnamomeo-brunneo, $1,5-2,5$
 μ . cr., poris germinativis 2 in quaque cellula, stratu externo co-
lorato, vix conspicuo, minuto verrucoso, pedicello colorato, bre-
vissimo, udo non inflato, angusto.

Hab. in foliis Craccæ Talpæ, Mexico.

2. **Uropyxis Agrimonix** Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. (1910) p. 575. — 2388

Pycnidiis ignotis; uredosoris hypophyllis; uredosporis late ellipsoideis v. obovoideis, 18-21 \times 13-15, tunica flavo-aurata, 1,5 μ . cr., æqualiter echinulato-verrucosa, poris germinativis 8 in zonis duabus ab æquatore æquidistantibus distributis, quaque zona ex poris 4 constituta; teleutosoris hypophyllis, sparsis, mox nudis, obscure theobromino-brunneis, pulveraceis; teleutosporis ellipsoideis 25-27 \times 18-21, utrinque rotundatis, septo leniter constrictis; tunica obscure stratososa, stratu gelatinoso udo leniter inflato, theobromino-brunnea, 1,5-2 μ . cr., apice 3 μ . incrassata, crebre et æqualiter verrucosa; poris duobus in quaque cellula, lateralibus, plerumque indistinctis, uno quandoque apicali; pedicello sæpe oblique inserto, hyalino, firmo, angusto, tereti, supra acutato et rugoso, udo non inflato, spora duplo quadruplove longiore.

Hab. in foliis Agrimonie mollis, Sumner Mo. Amer. bor. (E. BARTHOLOMEW).

3. **Uropyxis Rickiana** P. Magn., Hedwigia XLV (1906) pag. 173, 2389 tab. IX et fig. pag. 175. — Ramos longe et crasse tumefaciens, tumoribus superficie irregulariter colliculosis, lignosis; soris pulvinatis, erumpentibus, confluentibus, tantum teleutosporiferis; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, ad septum constrictis, 39-40 \times 23-24, tegumento tri-stratoso, tunica, externa tenuissima hyalina, media crassa brunnea, verrucosa, interna hyalina, tenui; cellula utraque poris binis mediis prædita; pedicello cylindræo, sporam æquante.

Hab. ad truncos Bignonie sp. prope Sao Leopoldo Brasiliæ (Prof. J. RICK).

Puccinia Pers. — Syll. VII 600, IX p. 298, XI p. 184, XIV p. 292, XVI p. 273, XVII p. 401, 469.

1. **Puccinia Hibbertiæ** Mac Alpine, Rusts of Australia (1906) p. 185, 2390 tab. XXX, fig. 265. — Teleutosoris brunneo-rubris vel nigris, compactis, mox nudis, usque ad 1 mm. diam., hypophyllis; teleutosporis pallide flavo-brunneis, oblongis v. clavatis, levibus, septo constrictis, 35-41 \times 18-21, apice plerumque rotundatis v. quandoque conoideo-attenuatis, plerumque incrassatis usque ad 6 μ ., basi plerumque rotundatis v. quandoque subattenuatis, pedicello hyalino, persistenti, elongato, gracili 120-150 μ . longo; mesosporis raro occurrentibus, concoloribus, plerumque fusoides, apice incrassatis, quandoque elongatis, 33-35 \times 12-16.

Hab. in foliis Hibbertiæ sericeæ, Victoria Australiæ.

2. **Puccinia ustalis** Berk. — Syll. VII, p. 691 — Huc spectat *Puccinia occulta* Barcl. Ured. Simla 4 (1891) t. V, fig. 13. In textu p. 217, species audit *P. ustalis* Berk.? sed severa, observ. Sydow, Monogr. Uredin. I, p. 546, species Barclayi est genuina *P. ustalis* Berk. (In Ranunculo hirtello, R. pulchello, R. sorganarico in Ind. orient., Turkestan et Mongolia). 2391
3. **Puccinia diffusa** Holway, North Amer. Uredin (1905) p. 13, f. 16, nom. nov. — Ita vocanda *Puccinia Ranunculi* Seym. 1884. — Syll. VII, p. 723 — non Blytt, 1882. — Syll. XI, p. 184 (*P. Blyttiana*). (In Ranunculo auricomo et R. alpestri). 2392
4. **Puccinia droogensis** Butler, Some Indian Forest Fungi, pag. 30, c. ic. in Indian Forester (1905) XXXI. — Uredosoris amphigenis, sparsis, minutis, epidermide diu tectis, flavidis, in maculis pallidis centro rubris, epiphyllis; uredosporis longe ellipsoideis v. subclavatis, flavis, 27-42 \approx 15-21, episporio 3 μ . cr., spinuloso; teleutosoris in maculis rubris amphigenis, pulvinatis, confluentibus, irregularibus, 0,3-1 mm. diam.; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, ad septum constrictis, brunneis, 30-45 \approx 18-24, episporio crasso seriatim tuberculoso. 2393
- Hab.* in foliis Berberidis aristatæ, Droog, Nilghiri, 2000 m. alt. Indiæ orient.
5. **Puccinia Streptanthi** v. Höhn., Fragm. Myk. IX, p. 1 (1909). — Teleutosoris cauliculis, subrotundis v. oblongis 0,5-7 mm, sæpius 1-2 mm., atro-brunneis, firmulis, epidermide diu tectis, sæpe in crustas latas confluentibus; teleutosporis oblongo-clavatis, flavo-brunneis, levibus, cellulis subæqualibus v. superiore paullo majore leviter constrictis, apice rotundatis v. obtuse conoideis, raro obtusatis, 42-56 \approx 20-25, membrana 2 μ . cr., apice usque ad 9 μ . incrassata; pedicello brunneolo, subplicato, persistente, usque ad 120 μ . longo, 6-8 μ ., supra 14 μ . cr. 2394
- Hab.* in caulibus Streptanthi, Clairmont Californiæ (C. F. BAKER).
6. **Puccinia utahensis** Garrett, in Holway, North Amer. Ured. I, Pt. II (1906) p. 46, phot. 67 — Teleutosoris amphigenis sparsis, castaneis, rotundis, 1 mm. diam, epidermide tectis, demum nudis et pulverulentis; teleutosporis brunneis, ellipsoideis vel oblongis, sæpe angulosis, tunica æquali 2,5 μ . cr., septo valde constrictis, cellulis ellipsoideis, rarius superiori paullo latiori, inferiori in pedicellum tenuata, episporio dense et longitrorsum seriatim tuber-

culato, apice papilla lata lætius colorata præditis, 30-44 \times 16-20; pedicello fragili hyalino brevi.

Hab. in foliis *Thlaspeos glauci*, Utah Amer. bor.

7. **Puccinia Cruciferæ** Mac Alp., *Rusts of Australia* (1906) p. 184, 2396 tab. XXX, fig. 266. — *Æcidiis* amphigenis v. cauliculis, irregulariter congregatis v. circinatim dispositis, magnis, cupulatis, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam.; pseudoperidiis margine albido, crenulato, parum reflexo; *æcidiosporis* aurantiacis, subglobosis, minute echinulatis, 14-16 μ long.; teleutosoris epiphyllis in foliis inferioribus sitis, *æcidiis* immixtis, rotundatis bullatis, compactis, initio epidermide cinerea turgida tectis, irregulariter dehiscenti, usque ad 1 mm. diam.; teleutosoris congregatis nigris, solitariis castaneo-brunneis, oblongis v. clavatis, levibus, septo modice constrictis, apice subacutatis, rotundatis v. truncatis, incrassatis usque ad 9 μ , basi rotundatis v. conoideo-attenuatis, 37-62 \times 18-25, pedicello apice vix colorato, persistenti, usque ad 50 μ . longo, 10 μ . cr.; mesosporis plerumque immixtis, concoloribus v. pallidioribus, forma variabilibus, apice incrassatis usque ad 7 μ , 25-34 \times 14-20, pedicello subæquante.

Hab. in foliis caulibusque *Cruciferarum*, New South Wales Australiae.

8. **Puccinia ornatula** Holw., *N. Amer. Ured. I Pe. III* (1907) p. 67, 2397 phot. 101 *a-b*. — Maculis pallide flavis, irregularibus vel nullis; teleutosoris hypophyllis, rotundis brunneis, punctiformibus usque 0,3 mm. diam., epidermide prominula persistente cinctis, subinde in series 15 mm. long., nervisequas confluentibus; teleutosoris ellipsoideis v. oblongis, brunneis, apice truncatis, 24-40 \times 16-22, septo constrictulis, sæpe inæquilateris, tunica 2 μ . vix crassa, æquali, levi, subinde seriebus 2-4 longitudinalibus verrucularum notata, cellula superiori poro singulo prædita; pedicello fragili hyalino sporam subæquante.

Hab. in foliis *Violæ* (probab. canadensis) Alpine Meadow. Glacier B. C. Amer. bor.

9. **Puccinia Hederaceæ** Mac Alp., *Rusts of Australia* (1906) p. 183, 2398 tab. XIII, fig. 109-112, tab. E, fig. 24-25. — Pycnidiis plus minusve congregatis, melleis; sporulis hyalinis, globosis, minutis 2,5-3 μ . cr.; *æcidiis* amphigenis plerumque etiam cauliculis et floricolis, in greges circulares v. irregulares dispositis; pseudoperidiis applanatis, 0,5 mm. cr., margine albo revoluto, laciniato; *æcidiosporis* subglobosis v. subellipsoideis, minute verruculosis, flavo-aurantiacis, 16 μ . c. cr. v. 16-19 \times 12-14; uredosoris minutis, brun-

neis, rotundatis, erumpentibus, sparsis, mox nudis amphigenis; uredosporis subglobosis v. subellipsoideis, brunneo-auratis, distincte echinulatis, 2-3 poros germinativos ex uno latere gerentibus, 25-29 \times 18-22; teleutosoris minutis, nigris, rotundatis, erumpentibus, pulverulentis, epidermide rupta plerumque cinctis; teleutosporis initio uredosporis intermixtis, ellipsoideis v. oblongis, utrinque rotundatis v. basi attenuatis, septo valde constrictis, distincte verruculosus præcipue in loculo superiori, castaneo-brunneis, apiculatis, quandoque unilocularibus, 29-49 \times 17-22, pedicello hyalino, brevi, fragili.

Hab. in foliis petiolis caulibusque etc. *Violæ hederaceæ*, *V. betonicifoliæ*, Victoria, Tasmania, New South Wales Australiae. — A *Puccinia Violæ* (Sch.) DC. et *P. ægra* Grov. diversa

10. **Puccinia Vanderysti** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy-Congo, 2399
Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) pag. 91. — Maculis rotundatis, fuscis, pallide cingulatis; teleutosoris hypophyllis aggregato-confluentibus, compactiusculis, ferrugineis; teleutosporis oblongis apice obtusis usque ad 8 μ . incrassatis, medio constrictis, flavo-brunneis, 30-42 \times 13-22, pedicello persistente 20 \times 4-5, fuscidulo.

Hab. in foliis *Cucurbitaceæ* sp., Kisantu Congo (VANDERYST).

11. **Puccinia Melothriæ** Stevens, Botan. Gazette v. XXXXIII (1907) 2400
p. 283, cum icon. — Teleutosoris hypophyllis, circulariter dispositis, pustulatis, mox nudis, pulverulentis, cinnamomeis, dein in germinatione cinereis, epidermide rupta cinctis, maculis pallescentibus indefinitis; teleutosporis e hyalino flavescentibus 40-52 \times 10-16, apice non v. lenissime incrassatis, medio non v. plus minusve constrictis, tunica levi 2 μ . circ. cr., loculo superiori rotundato raro elongato, 12-20 \times 10-16, inferiori angustato longiori 20-30 \times 10-15; pedicello hyalino 20-45 μ . longo, præditis, mox germinantibus.

Hab. in foliis *Melothriæ pendulæ*, West Raleigh N. C. Amer. bor.

12. **Puccinia Cephalandræ-indicæ** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 433. 2401
Teleutosoris hypophyllis, maculis nullis vel obsoletis insidentibus, sparsis, rotundatis, $\frac{1}{2}$ -1 mm. diam., mox nudis, pulverulentis, brunneis; teleutosporis ellipsoideis vel oblongis, apice rotundatis, non incrassatis vel subinde apiculo minuto verruciformi auctis, medio non vel leniter constrictis, basi sæpius rotundatis, subtiliter verruculosus, brunneis, 32-42 \times 18-27, episporio ca. 2 μ . crasso; pe-

dicello hyalino, breviusculo; mesosporis plus minusve immixtis subglobosis vel ellipsoideis.

Hab. in foliis *Cephalandræ indicæ*, Nadiad, Bombay Presidency (E. J. BUTLER). — Affinis *Pucc. Momordicæ*, differt teleutosporis grossius verrucosis et crassius tunicatis.

13. **Puccinia Sidalceæ** Holw., N. Amer. Ured. I Pt. III (1907) p. 67, 2402
phot, 100. — Maculis purpureis irregularibus; teleutosporis hypophyllis, epidermide diu tectis, dein erumpentibus, rotundis v. oblongis, sparsis v. circinatis, firmis, prima ætate læte flavis, demum atro-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, magnitudine variis maturis rufo-brunneis, cellulis subæqualibus, utrinque rotundatis, tunica 4-6 μ . cr., deorsum sensim tenuata præditis, levibus, raro verrucis paucis obtusis conspersis, a 32×20 usque ad 56×36 ; pedicello fragili, hyalino, usque ad 120 μ . longo.

Hab. in foliis *Sidalceæ oreganæ*, Klamath Co Oregon Amer. bor.

14. **Puccinia Malvacearum** Mont. — Syll. VII, 686. — var. **Sphæral-** 2403
ceæ Speg., An. Mus. Nac. Buenos Airas t. XIX (1909) p. 305. — A typo differt teleutosporis fusoides sæpissime unicellularibus 40-50 \times 12-13, rarissime bicellularibus normalibus v. loculo infero minimo subappendiciformi, pallide fulvis, pedicello 80-100 \times 5-7, hyalino fultis.

Hab. in foliis caulibusque vivis *Sphæralaceæ collinæ* pr. Mendoza Amer. austr.

15. **Puccinia Hibisci** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo in Ann. 2404
Mus. du Congo v. II, fasc. III (1908) p. 222. — Maculis rotundatis, sparsis, fuscis, sæpe bullatis; soris hypophyllis compacte aggregatis, rotundatis, ferrugineis; teleutosporis clavatis v. subfusoides, apice obtuso-rotundatis interdum apiculatis subrostratis haud incrassatis, medio 1-septatis, constrictis, fuscidulis, 25-45 \times 10-18, pedicello usque ad 60 μ . longo, 3-5 μ . cr., persistenti, hyalino subflavidulo.

Hab. in foliis *Hibisci rostellati* Guill. et Per., Kisantu Congo Africæ (VANDERYST).

16. **Puccinia Usterii** Diet., Ann. Mycol. V (1907) p. 245. — Soris 2405
hypophyllis minutis castaneis in tomento foliorum nidulantibus; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, ad septum valde constrictis, 32-38 \times 23-26, episporio æquali vel apice paulo incrassato, subtiliter granulato vestitis, pedicello caduco instructis.

Hab. in foliis *Malpighiaceæ* sp., Villa Marianna, Sao Paulo

Brasiliæ (A. USTERI). — Affinis *P. Banisteriæ* sed forma teleutosporarum et habitu diversa.

17. **Puccinia hæmatites** Sydow, Engler's Bot. Jahrb. 45. Bd (1910) 2406 p. 260. — Teleutosoris plerumque epiphyllis, rarius hypophyllis, sine maculis, sparsis v. hinc inde aggregatis, minutis, c. $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam, mox nudis, pulverulentis, atris; teleutosporis ellipsoideis v. ovato-ellipsoideis, utrinque rotundatis, apice non incrassatis, medio non constrictis, ubique verrucis majusculis dense obsitis, primo flavis, in maturitate amœne sanguineis, 32-42 \times 22-28; pedicello hyalino, crasso, subpersistenti, usque 70 ad μ . longo, basi discoideo dilatato; mesosporis paucis subinde immixtis.

Hab. in foliis *Triaspidis auriculatæ*, Kibwezi Africa trop. britannica.

18. **Puccinia inflata** Arth., Bull. Torr. Bot. Cl., XXXIII (1906) p. 516. 2407 — Pycnidiis hypophyllis, in greges orbiculares confertis, punctiformibus, prominentibus, pallide flavis v. brunneis, subepidermicis, irregulariter globosis, 100-120 μ . cr.; sterigmatibus latis; uredosoris plerumque hypophyllis, sparsis v. gregariis, rotundatis, parvis, 0,1-0,3 mm. latis, mox nudis, subpulverulentis, cinnamomeo-brunneis; uredosporis late obovatis v. ellipsoideis, 26-33 \times 21-25, tunica cinnamomeo-brunnea, 1,5-2 μ . cr., sparse et acute echinulatis; poris germinativis 3 v. 4, plerumque sparsis raro æquatorialibus; teleutosoris amphigenis, sparsis v. gregariis, rotundatis, parvis, 0,1-0,5 mm. latis, mox nudis, subpulverulentis, theobromino-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, 29-34 \times 23-26, utrinque rotundatis, septo non v. leniter constrictis, tunica theobromino-brunnea, æquiter 4-5 μ . incrassata, conspicue reticulata, areolis 2-3 μ . lat; pedicello sæpe plus minusve oblique inserto, hyalino, dimidio v. duplo sporæ longiore, supra globoso-inflato.

Hab. in foliis *Stigmatophylli periplocifolii*, Cuba Amer. centr.

19. **Puccinia amaniensis** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 2408 p. 104. — Maculis fuscidulis rotundatis; teleutosporis hypophyllis pulvinatis, dense gregariis pallidis; teleutosporis longe clavatis, vertice obtuse rotundatis, raro subacutiusculis, paulo incrassatis, pallidis, medio v. superne 1-septatis constrictis, 50-60 \times 16-20, episorio hyalino, levi, pedicello plus minusve elongato, 20-60 \times 3-6.

Hab. in foliis *Triumfettæ* sp., Amani Usambara Africae (EICHENBAUM).

20. **Puccinia Puspa** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) p. 273. 2409

— Maculis foliicolis, rotundatis, 2-4 mm. diam., brunneolis; teleutosoris hypophyllis, circinatim dispositis, minutis, pulvinatis; teleutosporis nunc cylindraceis $80 \approx 16$ medio non constrictis, nunc breviter ovoideis, $35 \approx 25$, medio constrictis; pedicello hyalino, tunica supra incrassata, $36-55 \approx 12-14$.

Hab. in foliis *Acronodiæ punctatæ*, Pangerango in ins. Java. — *Æcid. Puspa* Rac. huc pertinet? Cfr. Syll. XVI, p. 332.

21. **Puccinia Lychnidis-Miquelianæ** Diet., Ann. Mycol. V (1907) p. 73. 2410

— Soris in maculis rotundatis, usque 1 cm. latis, arescentibus, partim hypophyllis, parvis, circinatim concentrice dispositis, partim epiphyllis marginem macularum circumvallantibus bullatis, epidermide vesiculosa diu tectis, firmis, obscure brunneis; teleutosporis oblongis, clavatis v. fusiformibus, $40-62 \approx 15-20$, basi tenuatis v. rotundatis, apice plerumque conoideis, rarius obtusis, septo paullo constrictis, episporio levi, flavo-brunneo, apice dilutiore, subhyalino et usque ad 12μ . incrassato; pedicello firmo usque ad 90μ . longo.

Hab. in foliis *Lychnidis Miquelianæ* Nikko Japoniæ (KUSANO). — A *Pucc. Arenariæ* etiam habitu dignoscenda.

22. **Puccinia Dianthi-japonici** P. Henn., Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 2411

p. 595. — Maculis rotundatis v. vagis, flavidis; uredosoris hypophyllis, gregariis, rotundato-angulatis, subferrugineis, diutius epidermide grisea tectis v. velatis uredosporis subglobosis, ellipsoideis v. ovoideis, brunneis, asperulis, $20-28 \approx 20-22$; teleutosoris gregariis, hypophyllis, rotundato-pulvinatis, epidermide pallida velatis, cinnamomeis; teleutosporis ellipsoideis v. subclavatis, brunneis, apice rotundatis v. paullo incrassatis, medio 1-septatis subconstrictis, $25-35 \approx 18-23$, episporio levi, rufo-brunneo; pedicello hyalino, usque ad $30 \approx 3-4$.

Hab. in foliis *Dianthi japonici*, Aki-machi, Tosa Japoniæ (YOSHINAGA).

23. **Puccinia Raunkiærii** Ferd. et Winge, Botanisk Tidsskr. XXIX 2412

(1908) p. 8, tab. I, fig. 1. — *Æcidiis* (*Æc. Rivinæ* B. et C.) caules petiolosque incolentibus, dense gregariis, distorsiones tumoresque sæpe valde elongatos efficientibus, cupulatis; pseudoperidiis albidis, margine subintegro; æcidiosporis subglobosis, ellipsoideis, obovoideis, sæpe angulatis, omnino irregularibus, subtiliter verruculosus, cinnamomeis, sub vitro aurantiacis, $22-36$ (nonnullis usque ad 50) $\approx 16-25$, granuloso-farctis; uredosporis teleutosoris intermixtis, subglobosis, ellipsoideis v. obovoideis, plerumque $26-31 \approx 21-26$,

brunneo-flavis, aculeis validis, deciduis, hyalinis obsessis; teleutosoris phyllogenis, maculas pallido-flavas 1-2 mm. diam., hypophyllas formantibus, amphigenis, plerumque epiphyllis, in greges orbiculares circulariter aggregatis confluentibusque, castaneo-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, apice vix incrassatis, medio non v. vix constrictis, crasse tunicatis, brunneis, 32-40 \times 22-26 (raro oblongo-obovoideis 45-50 μ . long.), pedicello hyalino, flexili, superne circ. 6 μ . cr., deorsum attenuato, usque ad 55 μ . longo præditi.

Hab. in caulibus, petiolis foliisque Rivinæ humilis in insula St. Thomas Indiæ occ. (RAUNKIAER).

24. **Puccinia Rivinæ** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) 2413 p. 304. — Uredo- et teleutosoris sæpius immixtis, epiphyllis rarius amphigenis, maculis flavescentibus v. subalbescentibus indeterminatis insidentibus circinantibusque, suborbicularibus minutis 0,4-0,8 mm. diam., erumpenti-superficialibus; uredosporis e globoso obovatis, 20-25 \times 20-22, episporio crassiusculo dense minuteque papilloso vestitis, endoplasmate fulvello nubiloso grosse 1-guttulato farctis; teleutosporis late ellipsoideis v. obovatis, crassis 30-40 \times 25-30, loculis subæqualibus, supero non umbonato obtusissimo v. rotundato-subtruncato, episporio ubique incrassato dense verruculoso, ad septum non v. leniter constrictis, ferrugineis, pedicello 5-10 \times 5-6 mox fatiscente suffultis.

Hab. in foliis caulibusque vivis Rivinæ levis in silvis Rep. Argentinae Amer. austr. — In ramulis socium adest sæpe *Æcidium Rivinæ* B. et C.

25. **Puccinia escharoides** Syd., Deutsche Zentral-Afrika Exped. (1909- 2414 1908) II Bd. p. 95. — Teleutosoris hypophyllis v. præcipue petiolicolis, in foliis in greges minutos v. mediocres, in petiolis in greges plus minusve elongatos crassiusculos usque 1 cm. longos, densissime dispositis, epidermide lacerata cinctis, pulverulentis, obscure bruneis; teleutosporis ellipsoideis vel ovatis, utrinque rotundatis, apice haud incrassatis nec papillatis, medio vix v. non constrictis, verrucis majusculis et acutiusculis omnino densissimeque obsitis, brunneis, 22-32 \times 18-22, episporio 1,5-2 μ . cr., pallido, sporam circiter æquante, hyalino facile deciduo.

Hab. in foliis petiolisque Geranii sinensis, Karisimbi pr. Kahama Africae trop.

26. **Puccinia Geranii-pilosi** Mac Alp., Ured. Australia (1906) tab. XII, 2415 fig. 103, 104 — Uredosoris hypophyllis, castaneo-brunneis, sparsis

v. subgregariis, orbicularibus, mox nudis epidermide rupta cinctis, compactis, usque ad 1 mm. diam, in maculis purpurascensibus insidentibus; uredosporis flavo-brunneis, ellipsoideis v. obovatis, echinulatis, episporio basi modice incrassato, $25-30 \approx 19-22$; teleutosporis elongatis, frequenter petiolicolis, obscure-brunneis vel nigris, quandoque confluentibus, erumpentibus, compactis, $1-1,5 \mu$. long.; teleutosporis uredosporis intermixtis, oblongis v. oblongo-clavatis, castaneo-brunneis, levibus, septo modice constrictis, $32-48 \approx 22-32$, plerumque $36 \approx 25$, apice rotundatis non v. modice incrassatis, basi rotundatis v. quandoque subcuneatis, pedicello hyalino, deciduo, usque ad 80μ . longo; mesosporis rarioribus, concoloribus, subglobosis, apice incrassatis, $25-26 \mu$. diam.

Hab. in foliis *Geranii pilosi*, Victoria et New South Wales Australiæ. — Quandoque occurrunt teleutosporæ septo verticali præditæ.

27. **Puccinia cuneata** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 304. — Soris 2416 hypophyllis, maculis purpureis vel fuscis irregularibus insidentibus, hemisphæricis v. elongato-pulvinatis, usque ad 8 mm. longis, simplicibus vel ex acervulis minoribus confluentibus, firmis, obscure brunneis, epidermide vesiculosa diu velatis vel margine cinctis, denique nudis; teleutosporis clavatis vel cuneiformibus, apice plerumque obtusis, truncatis, rarius conoideis, basi attenuatis, medio leniter vel non constrictis, $35-58 \approx 17-30$, episporio levi castaneo, apice usque ad 12μ . incrassato indutis, pedicello firmo crasso superne brunneolo, 40μ . c. longo, suffultis.

Hab. in foliis *Geranii* sp., Mte. Shirane prope Nikko Japoniæ (S. KUSANO). — *Pucciniæ Morthieri* Körn. valde affinis.

28. **Puccinia Morrisoni** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 180, 2417 tab. XII, fig. 102, tab. F, fig. 29. — Æcidiis amphigenis, minutis, aurantiacis, circinatis, quandoque teleutosporis immixtis; pseudo-peridiis margine expanso et lobato; æcidiosporis pallide aurantiacis, minute echinulatis, ellipsoideis vel subquadratis, $19-22 \approx 16$; uredosporis plerumque hypophyllis, rotundatis, parvis, brunneis, pulverulentis, solitariis v. confluentibus, gregariis; uredosporis subglobosis v. ellipsoideis, flavo-brunneis, echinulatis, $22-24$ v. $22-27 \approx 19-22$; teleutosporis intermixtis, solitariis v. in parvos greges confluentibus, plerumque rotundatis, nigris, compactis, epidermide rupta cinctis; teleutosporis castaneo-brunneis, clavatis, septo constrictis, levibus, apice oblique acuminatis v. rotundatis, usque ad 9μ . incrassatis, $33-64 \approx 19-25$, basi pallidioribus attenuatis, pedicello

colorato, plerumque brevi, persistenti usque ad 38 μ . long., 6-9 μ . cr.; mesosporis concoloribus, oblongis vel ovoideis, apice obtuse acuminatis et incrassatis, 33-38 \approx 16-20.

Hab. in foliis petiolis caulibusque Pelargonii australis, Victoria et Tasmania Australiæ.

29. **Puccinia Eriostemonis** Mac Alp, Rusts of Australia (1906) p. 182, 2418 tab. XIII, fig. 105. — Teleutosoris hypophyllis, aurantiacis, ellipsoideis, quandoque circulariter dispositis, erumpentibus, epidermide rupta cinctis, usque ad 2 mm. longis; teleutosporis clavatis v. ellipsoideis, contentu granuloso aurantiaco, compactis, levibus, apice plerumque rotundatis, quandoque acutatis, modice incrassatis, basi plerumque conoideo-attenuatis, septo constrictis, 30-45 \approx 15-18, pedicello persistenti, hyalino, elongato, usque ad 125 μ . longo, 3-5,5 μ . cr.; mesosporis quandoque immixtis, concoloribus, ellipsoideis, apice subacutatis incrassatis, 30-32 \approx 13-16.

Hab. in foliis Eriostemonis myoporoidis, Victoria Australia.

30. **Puccinia Toddaleæ** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracoviæ (1909) 2419 p. 272. — Maculis foliicolis flavo-aurantiacis, rotundatis, hypertrophicis, 4-8 mm. cr.; pycnidiis epiphyllis conoideis usque ad 200 μ . latis; teleutosoris primum immersis dein erumpentibus usque ad 400 μ . diam., hypophyllis, strato mycelico tenui pseudoparenchymatico circumdatis; teleutosporis tenui-tunicatis, pallide flavis, levibus, medio profunde constrictis, 42-48 \approx 26-30, loculis facile secedentibus; pedicello hyalino, 50 \approx 13.

Hab. in foliis Toddaleæ aculeatæ, M. Gedeh in ins. Java. — Teleutosporæ mox germinantes, sporidiolis ovoideis, utrinque rotundatis, hyalinis, 17-21 \approx 10.

31. **Puccinia Benkei** Kusano, Bot. Mag. Tokyo XVIII (1904) p. 147, 2420 c. icon. — Teleutosoris pro more hypophyllis, concentricè dispositis maculas subrotundas 6-8 mm. latas, formantibus, prominulis, orbicularibus, compactis, nigris, rarius epiphyllis (in centro macularum); teleutosporis ellipsoideis v. oblongis utrinque æqualiter rotundatis, septo lenissime constrictis, tunica vertice leniter incrassata, 30-40 \approx 18-22, pedicello persistente, usque ad 140 μ . long., crasse tunicato, angusto, hyalino v. pallido.

Hab. in foliis Sedi Telephii var. purpurei, Nikko Japoniæ (KUSANO). — A *Pucc. Sedi* et *Pucc. exanthematica* bene distincta.

32. **Puccinia Rompelii** P. Magn., in Rick Fungi austro-amer. V, n. VI, 2421

Ann. Myc. V (1907) p. 29. — Soris folia et plerumque petiolos omnino obtegentibus, pulverulentis, atro-brunneis; teleutosporis ovoideis, ellipsoideis v. oblongis, variis, utrinque rotundatis v. uno fine tenuatis, apice vix v. parum, usque ad 8 μ . incrassatis, medio constrictis, sæpe oblique septatis, levibus, brunneis, 16-32 \times 10-18, crasse tunicatis; pedicello hyalino crassiusculo, persistenti, usque ad 100 μ . longo, subinde oblique inserto; mesosporis sæpe immixtis.

Hab. in foliis et petiolis Myrtaceæ cujusdam, Sao Leopoldo Brasiliæ.

33. **Puccinia Dissotidis** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, in 2422
Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. III (1908) p. 222. — Maculis sparsis, rotundatis, ferrugineis, zona lata atro-violacea circumdatis; soris hypophyllis rotundato-aggregatis, subceraceis, flavo-brunneolis; teleutosporis fusoideis v. clavatis apice rotundatis, sæpe attenuatis, haud incrassatis, medio 1-septatis, constrictis, hyalinis, 28-40 \times 14-17; pedicello sæpe incrassato, hyalino, 10-16 \times 7-10.

Hab. in foliis Dissotidis sp., Dembo Congo, Africæ (VAN-
DERYST).

34. **Puccinia aliena** Sydow, Engler's Bot. Jahrbüch. 45 Bd. (1910) 2423
p. 259. — Teleutosoris epiphyllis, singulis interdum hypophyllis, sine maculis, sparsis v. hinc inde aggregatis confluentibusque, minutis v. mediocribus, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ mm. diam., pulverulentis, ferrugineis; teleutosporis ovato-oblongis subinde subclavatis, apice rotundatis, non incrassatis, medio constrictis, basi plerumque attenuatis, levibus, flavo-brunneis, 38-62 \times 19-26; pedicello hyalino, crasso, usque ad 35 μ . longo.

Hab. in foliis Alchemillæ pedatæ prope Lamuru Africæ tropicalis.

35. **Puccinia Moringæ** Koord., Botan. Untersuch. (1907) pag. 198, 2424
fig. 23, IV. — Maculis rotundatis, pallide flavescentibus 3-4 mm. diam.; soris amphigenis; teleutosporis clavato-oblongis, basi truncatis, apice obtuse breviter acuminatis v. obtusis, 27-30 \times 5-8, subhyalinis, pallide flavescentibus, medio non constrictis, subsessilibus, transverse uniseptatis, episporio minute granulato.

Hab. in foliis vivis Moringæ pterygospermæ cultæ in Parworedjo Java (KOORDERS).

36. **Puccinia Zornix** (Diet.) Mac Alp., Rusts of Australia (1906) 2425
p. 172, tab. X, fig. 87, *Uredo Zornix* Diet., *Uredo Zornix* Berk., nomen nudum. — Uredosoris amphigenis v. plerumque hypophyllis, primo flavidis, dein brunneo-rubiginosis, rotundatis v. ellipsoi-

deis, bullatis, primo tectis dein erumpentibus et epidermide rupta cinctis, gregariis vel confluentibus; uredosporis flavo-auratis, ellipsoideis v. obovatis, minute echinulatis, poris binis germinativis præditis, 25-32 \times 19-22; teleutosporis conformibus obscurioribus; teleutosporis uredosporis intermixtis, concoloribus, oblongis, levibus, septo fortiter constrictis, 32-44 \times 20-24, utrinque rotundatis, apice incrassatis (usque ad 6 μ .); pedicello hyalino, persistenti, sporam subæquante.

Hab. in foliis Zornix diphylle, New South Wales Australiæ.

37. **Puccinia Dolichi** Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 2426 p. 28. — Uredosporis hypophyllis, irregulariter sparsis, rotundatis, parvis, 0,25 mm. lat., mox nudis, castaneo-brunneis, pulverulentis; uredosporis globosis, parvis, 19-23 μ . cr.; tunica castaneo-brunnea, subtenui, 1,5-2 μ ., minute echinulata, poris germinativis 3 v. raro 4 equatorialibus; teleutosporis ignotis; teleutosporis uredosporis intermixtis, oblongis, latis, 50-70 \times 30-40, apice acutis vel acuminatis, basi rotundatis v. obtusis, ad septum non. v. leniter constrictis; tunica semiopaca, theobromino-brunnea, 3 μ . crassa, apice incrassata, rostro prominenti pallidiori 10-15 μ . alto prædita, superficie crebre verrucosa, verrucis in rostro subprominentibus; pedicello supra colorato, 6-12 μ . cr., sporam æquante.

Hab. in foliis Dolichi reticulati, Aguacate Cuba, Amer. centr. (E. W. D. HOLWAY).

38. **Puccinia Gouaniæ** Holw., Ann. Mycol. III (1905) p. 21. — Ma- 2427 culis flavis, irregularibus; uredosporis plerumque hypophyllis, minutis, quandoque confluentibus, sparsis, cinnamomeo-brunneis; uredosporis cinnamomeo-brunneis, e triangulari globosis, remote echinulatis, tunica 2 μ . cr., 28-32 μ . diam., poris germinativis 2 æquatorialibus præditis; teleutosporis conformibus atro-castaneo-brunneis; teleutosporis castaneo-brunneis, late ellipsoideis, tuberculatis, apice non incrassatis, utrinque rotundatis, tunica 4 μ . cr., 40-48 \times 30-34; pedicello hyalino, quandoque supra colorato, persistenti, angusto, 60 μ . long., 5 μ . cr.; teleutosporis paraphysibus hyalinis, curvatis, uniseptatis, 60 μ . long., 12 μ . cr. circumdatis.

Hab. in foliis Gouaniæ tomentosæ, Gebara Cuba.

39. **Puccinia paraënsis** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) p. 96. — Ure- 2428 dosporis amphigenis, præsertim hypophyllis in tumoribus firmis hemisphæricis, pagina foliorum superiore depressis, ca. 2 mm. latis vel majoribus irregularibus, confertis, cinnamomeis; uredosporis

obovatis vel subglobosis, 29-38 \times 24-30, pallide brunneis, spinulosis; teleutosoris conformibus pallide cinnamomeis vel albidis; teleutosporis ellipsoideis vel cuneatis, utrinque rotundatis vel basi in pedicellum angustatis, ad septum paullo constrictis, 30-44 \times 18-24, episporio tenui æquali hyalino vestitis, pedicello mediocri instructis, statim germinantibus.

Hab. in foliis *Gouania* pirifoliae (?), Marco, Pará Brasiliae (C. F. BAKER).

40. **Puccinia Ludwigiae** Holw., N. Amer. Ured. I, Pt. III (1907) p. 72. 2429

— Ita vocanda *Puccinia Neseæ* Ell. et Ev. — Syll. XIV, p. 298

— nam matrix est *Ludwigia* non *Nesea*. Ut st. æcidialis huc spectat *Æcidium Ludwigiae* Ell. et Ev. — Syll. XI, p. 216.

41. **Puccinia glabella** Holw., N. Amer. Ured. I, Pt. III (1907) p. 76, 2430

phot. 114. — Soris amphigenis atro-brunneis, rotundis, punctiformibus, 1 mm. diam., sæpe pulvinatis, diu epidermide tectis dein pulverulentis; uredosporis intermixtis brunneis, globosis ellipsoideis v. subangulosis, echinulatis, 22-30 \times 20-25, tunica 3-4 μ . cr., poris binis æquatorialibus, late hyalino-papillatis; teleutosporis brunneis, oblongis, levibus, utrinque rotundatis v. deorsum paullo tenuatis, rarius obtuse acutatis, 25-32 \times 15-18, tunica æquali apice vix incrassata, 2 μ . cr., poro apicali v. laterali in cellula superiori, prope septum in inferiori; pedicello hyalino, fragili, brevi.

Hab. in foliis *Boisduvaliae* glabellae, Oregon Amer. bor. — A *Pucc. Boisduvaliae* diversa.

42. **Puccinia Fuchsiae** Sydow et Holw., in Sydow, Ann. Mycol. IV 2431

(1906) p. 30. — Teleutosoris hypophyllis, maculis valde conspicuis rufo-purpureis 1-4 mm. diam. insidentibus, minutis, punctiformibus, sed plerumque in greges maculam explentes circinatim dispositis, compactis, cinnamomeis; teleutosporis oblongo-clavatis, apice rotundatis, rarius leniter acutiusculis, valde incrassatis (usque ad 8 μ . crasso), medio constrictis, basi sæpius attenuatis, levibus, flavidis, 28-40 \times 12-18; pedicello crassiusculo, concolori, persistente, usque ad 25 μ . longo.

Hab. in foliis *Fuchsiae* thymifoliae, Amecameca, Mexico (HOLWAY). — *Pucciniae Jussiae* Speg. proxima.

43. **Puccinia rigensis** F. Bucholtz, Ann. Myc. III (1905) p. 457. — 2432

Uredosoris amphigenis, sparsis, minutis, rotundatis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis globosis v. subglobosis, echinulatis, brunneis, poris 2-3 instructis, 26-30 \times 20-24; teleutosoris conformibus, deinde subaggregatis, atro-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, utrin-

que rotundatis, medio parum constrictis, apice non v. vix incrassatis, levibus v. sublevibus, brunneis, 27-38 \approx 18-33; pedicello hyalino, deciduo.

Hab. in foliis Osterici palustris prope Riga Rossia.

44. **Puccinia Xanthosiae** Mac Alp., Rrusts of Australia (1906) p. 169, 2133 tab. IX, fig. 76. — Uredosoris amphigenis v. petiolicolis, atro-brunneis, pulvinatis, gregariis, ellipsoideis, sæpe confluentibus, erumpentibus, $\frac{3}{4}$ mm. longis; uredosporis brunneo-auratis, crasse tunicatis, echinulatis, globosis v. ellipsoideis, 30-32 v. 30-37 \approx 24-28; pedicello hyalino 4-6 μ . cr.; teleutosoris raro occurrentibus, in foliis senioribus, minutis, nigris; teleutosporis oblongis v. oblongo-clavatis, atro-brunneis, levibus, septo. constrictis, 40-60 \approx 20-25, apice rotundatis ibique modice incrassatis, quandoque truncatis, basi rotundatis v. attenuatis, pedicello persistenti, colorato, 20 μ . longo; mesosporis quandoque occurrentibus, concoloribus, obovatis, apice incrassatis, 32 \approx 20.

Hab. in foliis petiolisque Xanthosiae pusillae, Victoria Australia.

45. **Puccinia chærophyllina** Sydow, Ann. Mycol. VI (1908) p. 17. — 2434 Soris teleutosporiferis amphigenis, minutis, sparsis vel aggregatis, valde pulverulentis, tandem confluentibus, atro-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, apice non incrassatis, medio vix vel leniter constrictis, punctato-reticulatis, brunneis, 34-50 \approx 17-28, episporio ca. 2 μ . crasso; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis Chærophylli macropodi, in alpe Totschal prope Scheheristanek, Gilan Persiae borealis (BORNMÜLLER). — In primis teleutosporis majoribus et tenuiter reticulatis a ceteris speciebus chærophyllicolis dignoscenda.

46. **Puccinia distinguenda** Syd., Ann. Mycol. VI (1908) p. 482. — 2435 Teleutosoris amphigenis vel sæpe petiolicolis, sparsis vel etiam aggregatis, mediocribus, rotundatis vel ad nervos et petiolos elongatis ibique confluendo 1-5 mm. longis, epidermide rupta cinctis, pulverulentis, atris; uredosporis immixtis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, subtiliter echinulatis, flavis, 21-26 \approx 17-23, poris germinationis tribus præditis, episporio ca. 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso; teleutosporis ovato-ellipsoideis, ellipsoideis vel oblongis, utrinque rotundatis, apice non incrassatis, medio non vel leniter constrictis, distincte et grosse reticulatis, obscure brunneis, 28-38 \approx 18-26, episporio, 3 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$ μ . crasso; pedicello sporam subæquante, sed deciduo, hyalino, subinde oblique inserto.

Hab. in foliis petiolisque *Chærophylli macropodis* pluribus locis in Persia bor. (BORNMÜLLER). — Teleutosporis fortiter reticulatis a ceteris speciebus chærophyllicolis dignoscenda.

47. **Puccinia Angelicæ-edulis** T. Miyake in Journ. Sapporo Agric. 2436 College, vol. II, part 3 (1906) p. 111, tab. III, fig. 6. — Spermogoniis amphigenis, sparsis, dilute flavis; soris uredosporiferis primariis in nervis et petiolis elongatis, flavo-brunneis, dein brunneis, tandem atro-brunneis; secundariis plerumque hypophyllis, sparsis, in maculis pallidis minutis insidentibus, brunneis pulverulentis; uredosporis ovatis, ellipsoideis vel ovato-oblongis, echinulatis, apice incrassatis (7-12 μ .), flavo-brunneis, 25-40 \times 22-35, poris germinationis tribus raro quatuor æquatorialibus instructis; soris teleutosporiferis hypophyllis vel raro amphigenis, sparsis, minutis, rotundatis, pulverulentis, atris; teleutosporis ellipsoideis vel oblongis, utrinque rotundatis vel leniter attenuatis, medio tenuiter constrictis, levibus, castaneo-brunneis, 30-55 \times 19-25, episporio ca. 2,7 μ . crasso, poro germinationis cellulæ superioris ad ejus apicem, cellulæ inferioris ad septum sito; pedicello hyalino, tenui, sporam æquante vel brevior.

Hab. in foliis *Angelicæ edulis*, *Matsumuræ*, *Miquelianaæ*, *polycladæ*, *polymorphæ*, *shikokianaæ*, *ursinaæ*, *vulgata* in Japonia.

48. **Puccinia Œnanthes** (Diet.) T. Miyake in Journ. of the Sapporo 2437 Agricult. College, vol. II, part. 3 (1906) p. 106, tab. III, fig. 3. Soris teleutosporiferis amphigenis vel petiolicolis aut cauliculis, minutis, sparsis, atro-brunneis, diu epidermide tectis; teleutosporis ellipsoideis vel oblongis, apice non incrassatis, rotundatis, medio non vel leniter constrictis, basi rotundatis vel leniter attenuatis, reticulatis, dilute castaneis, 30-40 \times 20-27, poro germinationis cellulæ superioris ad ejus apicem, cellulæ inferioris in ejus parte inferiori sito; pedicello hyalino, tenui, deciduo.

Hab. in foliis *Œnanthes stoloniferæ* in Japonia. — Status uredosporiferus est *Uredo (Enanthes)* Diet. in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII (1900) p. 290. — Syll. XVI, p. 254.

49. **Puccinia Miyabeana** T. Miyake in Journ. of the Sapporo Agri- 2438 cult. College, vol. II, part 3 (1906) pag. 119, tab. III, fig. 7. — Soris teleutosporiferis plerumque hypophyllis, minutis, sparsis, pustuliformibus, compactis, epidermide rupta cinctis, atro-brunneis; uredosporis ovato-oblongis vel ellipsoideis, apice incrassatis (5-10 μ .), sæpe etiam haud incrassatis, echinulatis, flavo-brunneis,

27-42 \approx 18-27, poris germinationis 2-3 æquatorialibus instructis; teleutosporis oblongis, ovato-oblongis vel ellipsoideis, levibus, apice rotundatis, haud incrassatis, sed papillula humillima subhyalina instructis, medio plus vel minus constrictis, basi rotundatis v. leniter attenuatis, castaneo-brunneis, 40-53 \approx 26-30, poro germinationis cellulæ superioris ad ejus apicem, cellulæ inferioris ad septum posito, pedicello subhyalino vel hyalino, tenui, longissimo (50-190 μ .), superne inflato.

Hab. in foliis Angelicæ hakonensis, kiusianæ, utilis, in Japonia.

50. **Puccinia ligusticicola** T. Miyake in Journ. of the Sapporo Agri- 2439
cult. College, vol. II, part 3 (1906) p. 118. — Soris teleutosporiferis hypophyllis v. petiolicolis, sparsis, rotundatis, 1-2 mm. diam., atris; uredosporis immixtis globosis vel ellipsoideis, echinulatis, apice incrassatis (usque ad 7 μ .), dilute flavo-brunneis, 25-36 \approx 22-28, poris germinationis tribus præditis; teleutosporis ellipsoideis vel oblongo-ellipsoideis, apice rotundatis, leniter constrictis, basi rotundatis vel leniter attenuatis, levibus, castaneis, 32-54 \approx 23-34, poro germinationis cellulæ superioris ad ejus apicem, cellulæ inferioris ad septum sito; pedicello hyalino vel subhyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis Ligustici sotici, ibukiensis, in Japonia.

51. **Puccinia Pozzii** Semadeni in Centralbl. Bakter. Paras. u. Infekt. 2440
II Abt. Bd. XIII (1904) pag. 532, cum icon. — Teleutosoris in greges dispositis, minutis sed tandem confluentibus, subcutaneis, dein nudis; teleutosporis irregularibus oblongis, apice minute papillatis, leniter constrictis, levibus, brunneis, 22-45 \approx 14-25, poro germinativo loculi inferioris in pariete laterali inter septum transversum et pedicellum varie collocato, loculi superioris infra papillulam.

Hab. in foliis, petiolis caulibusque Chærophylli hirsuti prope Sempione et v. glabrato pr. Wolkenstein in Tirolia. — A *Pucc. Astrantiæ* Kalchbr., *Imperatoricæ* Jacky, *enormi* Fuck. etc. morphologice vix distincta.

52. **Puccinia Angelicæ-mamillata** Klebahn, Wirtswechls. Rostpilze (1904) 2441
p. 321; Semadeni, in Centralbl. f. Bakt. Paras. und Infekt. II Abt. Bd. XIII (1904) pag. 542, c. ic. — Pycnidiis epiphyllis v. inter æcidia sparsis; æcidiis (*Æcid. Angelicæ* Rostr. Syll. VII, p. 833, *Bubakianum* Juel) foliicolis v. petiolicolis, cellulis pseudo-peridii tunicæ extus 5-6 μ . cr., intus 3-5 μ .; acidiosporis obtuse

polygoniis 18-24 μ . cr.; uredosporis 20-26 \approx 19-24, tunica usque ad 2,5 μ . cr.; teleutosporis 24-42 \approx 17-21, poro germinativo loculi inferioris septo valde approximato.

Hab. æcidia in foliis petiolisque Angelicæ silvestris, uredo- et teleutosporæ in foliis Polygoni Bistortæ et P. vivipari, Helvetia, Italia etc.

53. **Puccinia Mei-mamillata** Semadeni, in Centralbl. f. Bakt. Paras. 2442 und Infekt. II Abt. Bd. X (1903) p. 523, Bd. XIII (1904) p. 541, cum ic. — Pycnidiis satis copiosis, rotundatis, pallide flavis 135 μ . cr.; æcidiis (*Æc. Mei* Schr., *A. Mei-Mutellinæ* Wint., Syll. VII, p. 793 p. p.); uredosporis tunica usque ad 3-5 μ . cr.; teleutosporis 24-35 \approx 18-21, poro germinativo loculi inferioris pedicello plus minusve approximato.

Hab. æcidia in foliis petiolisque Mei Mutellinæ, uredo- et teleutosporæ in foliis Polygoni vivipari et P. Bistortæ, Helvetia, Italia, Austria etc. — Typo *Pucc. mamillatæ* Schr. pertinet; cfr. Syll. VII, p. 639.

54. **Puccinia Traversiana** Syd. Monogr. Uredin. I, p. 889. — Teleu- 2443
tosoris amphigenis, sæpius hypophyllis, sine maculis, sparsis vel hinc inde confluentibus, mediocribus, $\frac{3}{4}$ -2 mm. diam., epidermide plumbea diutius tectis, dein ea fissa cinctis, pulverulentis, atris; teleutosporis ellipsoideo-oblongis, apice rotundatis, non incrassatis, medio vix v. leniter constrictis, basi sæpius rotundatis, subtilissime verruculosus, brunneis, 26-36 \approx 18-27, episporio c. 2 μ . cr.; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis Phellopteri purpurascens, Colorado Amer. bor. (C. F. BAKER). — *Puccinia sphalerocondræ* Lindr. affinis.

55. **Puccinia Rossii** Bub. in Ann. myc. IV (1906) p. 107. — Maculis 2444
expallentibus; soris hypophyllis sparsis v. aggregatis, 0,5-1 mm. lat., subconvexis, diu epidermide tectis, dein rimose erumpentibus; uredosoris late brunneis, pulveraceis; uredosporis ovoideis, 31-35 \approx 26-29, apice rotundatis et ad 9 μ . incrassatis, membrana flavo-brunneola, spinulosa, poris 2-3 æquatorialibus, late papillato-operculatis; teleutosoris nigris, non pulvereis; teleutosporis irregulariter ovoideis v. oblongis, angulosis, 35-58 \approx 22-35, membrana castaneo-brunnea, 4,5 μ . cr., minute granulosa et insuper costulis hyalinis v. flavo-brunneis, subinde usque ad 6 μ . altis percursa; poro loc. sup. laterali, loc. inf. mediano, utroque papillato-operculato; pedicello hyalino, firmo, brevi, raro usque ad 20 μ . longo.

Hab. in foliis *Cnidii apioidis* in Sicilia (H. Ross, herb. sicul. n. 135).

56. **Puccinia Thümenii** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 168, 2445 tab. IX, fig. 68-75, tab. C, fig. 16-17, *Pucc. Castagnei* Thüm. — Syll. VII, p. 643 — non Schroet. Addatur locus in foliis caulibusque *Apii prostrati* et *A. graveolentis*, Victoria et Tasmania Australiæ. Teste cl. Tranzschel *Pucc. Castagnei* Schröt. non viget in *Thalictro angustifolio* sed in *Umbellifera*, prob. *Silao pratensi* et collidit cum *Pucc. bullata*; tunc mutatio nominis a cl. Mac Alpine facta non videtur necessaria.

57. **Puccinia pallido-maculata** Ell. et Ev. in N. Am. Fungi n. 2234 2446 (1889) sine diagnosi; Holw. N. Am. Ured. I, p. 49, fotogr. 73a-b. — Maculis pallide flavis; teleutosoris amphigenis, minutis, initio tectis, sæpe circinantibus in greges 2-5 mm. diam., demum nudis, confluentibus, pulveraceis, castaneis v. cinnamomeis; teleutosporis cinnamomeo-brunneis, raro ellipsoideis et oblongis, plerumque fusoides, levibus, tunica æquali, 1,5-2 μ . cr., poro in cellula superiori apicali, in inferiori æquatoriali, utroque prominulo-papillato, ad septum non constrictis, 28-36 \times 14-16; pedicello hyalino, fragili.

Hab. in foliis *Saxifragæ Lyallii* in Canada, Sax. punctatæ, Montana Utah, Colorado, Washington Amer. bor. — Ab affini *P. Adoxæ* videtur distincta.

58. **Puccinia Fischeri** Cruchet et Mayor in Bull. Soc. Vaud. Sc. nat. 2447 XLIV (1909) p. 471 c. icone. — Teleutosoris rotundatis, vix 1 mm. diam., discretis v. aggregatis, epiphyllis, epidermide tectis, deinde nudis, pulverulentis, brunneis; teleutosporis ovato-ellipsoideis, utrinque rotundatis, medio distincte constrictis, deciduis, 30-43 \times 17-23; cellulis eadem forma et dimensione; membrana læte brunnea, ubique æque crassa, minutissime punctulata; poro germinativo cellulæ superioris apicali, inferioris ad basim; poris papilla hyalina et parum præminente tectis; pedicello hyalino, deciduo.

Hab. ad folia viva *Saxifragæ bifloræ* in Alpibus Vallesiæ Helvetiæ.

59. **Puccinia Lithophragmæ** Holw., North Amer. Ured. I, Pt. II (1906) 2448 p. 51, phot. 75 a-b. — Maculis nullis v. pallide viridibus; teleutosoris castaneo-brunneis, sæpius hypophyllis, minutis, rotundis, pulverulentis, statim in greges 1-3 mm. diam. dispositis v. petiolos longe obtegentibus, epidermide rupta emergentibus; teleutosporis ellipsoideis v. oblongis, læte brunneis, septo plerumque constrictis, tunica æquali 1,5-2 μ . cr. et papilla conica hyalina præ-

ditis, 32-44 \times 16-20; episporio elate reticulato; pedicello brevi, fragili, hyalino.

Hab. in foliis et petiolis *Lithophragmæ parvifloræ*, Utah Amer. bor. (A. O. GARRETT).

60. **Puccinia loranthicola** Mac Alp., *Rusts of Australia* (1906) p. 167, 2449 tab XXXI, fig. 268-271. — *Æcidiis* aurantiacis, plerumque confluentibus amphigenisque; pseudoperidiis tubulosis, margine albido reflexo præditis; *æcidiosporis* ellipsoideis, oblongis v. subangulatis, flavo-aurantiacis, distincte echinulatis, 37-56 \times 22-31; *uredo-* et *teleutosoris* amphigenis, brunneis, bullatis, congregatis, quandoque circulariter confluentibus et *teleutosoros* obscuriores circumdantibus, epidermide longitudinaliter rupta persistenti cinctis; *uredosporis* flavo-aurantiacis, ellipsoideis v. ovoideis v. oblongis, grosse echinulatis, 3-5 poris germinativis equatorialibus uno latere præditis, 40-65 \times 22-32 raro 80 \times 22, tunica 3-4,5 μ . c. cr.; *teleutosporis* sæpe intermixtis, subhyalinis, cylindræis v. clavato-cylindræis, levibus, septo modice constrictis, apice rotundatis plus minusve incrassatis, basi modice cuneatis, 65-94 \times 15-24, raro trilocularibus et 86 μ . longis, pedicello hyalino, persistenti, usque ad 200 μ . longo, apice usque ad 14 μ . cr.; *mesosporis* subhyalinis levibus, fusoides, apice vix incrassatis, 71-77 \times 25-28, pedicellatis.

Hab. in folii *Loranthi celastroidis*, Victoria Australiae.

61. **Puccinia Stylidii** Mac Alp., *Rusts of Australia* (1906) p. 204 et 2150 p. 210, tab. XXVIII, fig. 242. — *Uredosoris* (*Uredo Stylidii* Mac Alpine l. c.) amphigenis, solitariis v. subgregariis, ellipsoideis, bullatis, lineariter erumpentibus, quandoque lateraliter confluentibus, 1 mm. long. v. ultra; *uredosporis* flavo-aurantiacis, ellipsoideis v. subglobosis, echinulatis, poro solitario præditis, 22-24 \times 16-18; *teleutosoris* amphigenis nigro-brunneis v. nigris, rotundatis v. ellipsoideis, quandoque lineariter confluentibus, pulvinatis, epidermide rupta cinctis, 1,5 mm. long. v. ultra; *teleutosporis* initio *uredosporis* intermixtis, castaneo-brunneis, clavatis vel oblongis, apice acuminatis et incrassatis (9-11 μ .), basi rotundatis vel attenuatis, quandoque trilocularibus, forma et magnitudine variabilibus, 40-62 \times 17-28, pedicello hyalino, persistenti, usque ad 45 μ . longo; *mesosporis* concoloribus, apice incrassatis, ovoideis, elongatis vel ellipsoideis, 30-40 \times 15-23.

Hab. in foliis *Stylidii graminifolii*, Tasmania Australiae.

62. **Puccinia Noackii** Syd., *Ann. Mycol.* V (1907) p. 354. — *Teleu-* 2451 *tosoris* hypophyllis, sine maculis, sparsis, minutissimis, punctifor-

mibus, epidermide diutius tectis, tandem liberis, subcompactiusculis, atro-brunneis; uredosporis immixtis (paucis tantum visis) ellipsoideis vel ovatis, breviter echinulatis, subhyalinis, 21-27 \approx 18-22, episporio ca. 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso; teleutosporis oblongis vel clavatis, apice plerumque rotundatis, valde incrassatis (usque ad 14 μ .), medio leniter constrictis, basi rotundatis vel sæpius attenuatis, levibus, flavis, ad incrassationem paullo obscurioribus ibique flavo-brunneolis, 42-58 \approx 18-25; pedicello persistenti, crassiusculo, hyalino v. subhyalino, usque ad 75 μ . longo.

Hab. in foliis *Eupatorii* sp., in horto bot. Sao Paulo Brasiliæ.

63. **Puccinia cacheutensis** Speg, An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2452 (1909) p. 309. — Maculis nullis v. vix manifestis indeterminatis pallescentibus; uredosporis foliicolis sæpius hypophyllis minutis orbicularibus 0,5-1 mm. diam., erumpentibus ferrugineis subpulverulentis; uredosporis subglobosis latere altero tenuiter, altero crassiuscule tunicatis, dense papillulosis, 26-30 \approx 24-26, grosse uniguttulatis, fulvis; teleutosporis ramulicolis majusculis 2-10 mm. long., tumidulo-pulvinatulis compactis, fusco-ferrugineis, laciniis epidermidis disrupte cinctis; teleutosporis late elliptico-ovoideis, superne obtusissimis, non v. obsoletissime subumbonatis crassiuscule tunicatis, basi rotundatis v. subtruncatis, medio non v. modice constrictis, levibus, 40-42 \approx 30, loculis subæquilongis sæpius grosse 1-guttulatis, pedicello 40-50 \approx 5-8, hyalino persistente suffultis.

Hab. in foliis vivis *Eupatorii* patentis, in dumetis Cacheuta prope Mendoza Amer. austr. — *Pucc. Hieracii* affinis.

64. **Puccinia rosea** Roth, Bot. Gaz. XL (1905) p. 206. — St. æcidiosporicus: *Æcidium roseum* Diet. et Holw. — Syll. XIV, p. 380. — A *Puccinia Conoclinii* cui valde proxima, differt uredosporis et teleutosporis conspicue majoribus.

Hab. in foliis *Eupatorii* deltoidei, *E. tubiflori*, *E. glabrati*, *E. trinervii*, *E. Gonzalesii*, *Steviae* rhombifoliae, *Agerati* stricti, *A. corymbosi*, in Mexici compluribus locis.

65. **Puccinia Phæopappi** R. Maire, Bull. trim. Soc. Myc. de France, 2454 vol. XXI (1905) p. 149, cum icone. — Teleutosporis folii- v. cauliculis, amphigenis, maculis lutescentibus insidentibus, sparsis vel rarius confluentibus, 0,2-1 mm. diam., rotundatis, pulvinatis, primitus nudis, densis, firmis, nigris, uredosporis paucis immixtis, castaneo-brunneis, compressis, subdisciformibus, 28-32 \approx 29-36, e latere 14-18 μ . cr., episporio echinulato, 2,5-3 μ . cr., poris binis

æquatorialibus prædito; teletosporis castaneo-brunneis, ellipsoideis, 38-50 \approx 26-34, utrinque rotundatis, apice vix incrassatis, medio vix constrictis, episporio 6-9 μ . cr., laxe verrucoso, poris papilla hyalinula verrucosa apertis uno in cellula superiore apicali, altero cellulæ inferioris juxta septum; pedicello hyalino, persistenti, usque ad 105 \approx 8.

Hab. in foliis caulibusque Phæopappi Kotschyani, in montibus Tauri prope Pilas Cilicicas. — *Pucc. montanæ* affinis.

66. **Puccinia Tridacis** Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 2455 p. 516. — Pycnidlis nullis; teleutosoris hypophyllis, numerosis, sparsis, 0,2-0,5 mm. lat., sparsis, v. sæpe gregariis et circinatim dispositis 2-5 mm. lat., mox nudis, pulverulentis, castaneo-brunneis; teleutosporis oblongis v. anguste oblongis, apice rotundatis v. obtusatis, basi obtusis v. angustatis, 40-50 \approx 13-17, tunica brunneo-aurata, levi, 1 μ . c. cr. apice usque ad 6-10 μ . cr., pedicello hyalino, brevi, sporam dimidiam æquante.

Hab. in foliis Tridacis procumbentis, Punta Brava, Cuba Amer. centr. (BAKER et O'DONOVAN).

67. **Puccinia gnaphaliicola** P. Henn. — Syll. XVI, p. 295. — Huc 2456 referenda est *Puccinia Gnaphalii* Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires, t. XIX (1909) p. 309, cujus st. ured. est *Uredo Gnaphalii* Speg. — Syll. VII, p. 849.

Hab. (adde) in foliis vivis Gnaphalii purpurei pr. Lago Blanco Patagonia et in Potrerillos Mendoza Amer. austr. — A *Pucc. investita* Schw. æcidiorum defectu et pedicello longiore recedit.

68. **Puccinia mutisiicola** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2457 (1909) p. 306. — Teleutosoris amphigenis, subhemisphæricis, minutis 0,25-1 mm. diam., erumpenti-superficialibus, nudis, compactiusculis; teleutosporis dense constipatis, ellipsoideis v. subovatis, levibus, apice incrassatis sed non umbonatis, loculis subæquilongis, medio non v. vix constrictulis, 50-60 \approx 25-30, fusco-ferrugineis, stipite flexuoso subpersistenti, 75-100 \approx 8-10, deorsum sensim leniterque attenuato.

Hab. in foliis languidis Mutisiæ subspinosa, in montanis Chacheuta prope Mendoza Amer. austr. — A *Pucc. Mutisiæ* Lagerh. omnino diversa.

69. **Puccinia præandina** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2458 (1909) p. 308. — Uredosoris hypophyllis erumpentibus confertis confluentibusque 250-1000 μ . diam., vivide aurantiis; uredosporis

obovatis 25-32 \approx 25-28 episporio minute denseque papillulato hyalino endoplasmate aurantio grosse guttulato farctis; teleutosoris uredosporiferis immixtis sed valde rarioribus, confertis, pulvinatis 200-500 μ . diam., erumpentibus numquam pulverulentis; teleutosporis ex elliptico obovatis antice obtusis modice incrassatis non v. vix obsolete subumbonatis, medio v. parum infra septatis loculis subæqualibus, 45-50 \approx 25-28, medio non v. vix constrictis, pallide fulvis, levibus, pedicello hyalino gracili 60-70 \approx 5-8, persistente impositis.

Hab. in foliis vivis *Baccharidis pulchellæ* in dumetis Cacheuta prope Mendoza, Amer. austr. — Cum ceteris *Pucciniis* in *Baccharidibus* vigentibus non comparanda.

70. *Puccinia Tessariæ* (Speg.) Diet., Ann. Mycol. V (1907) p. 246. 2459
 Status uredosporifer = *Uredo Tessariæ* Speg. — Syll. VII, p. 861. — Teleutosoris amphigenis sparsis, parvis vel mediocribus, nudis, nigris; teleutosporis ellipsoideis vel oblongis utrinque rotundatis, ad septum leniter constrictis, 45-75 \approx 27-35, episporio castaneo sublevi vel subtilissime verruculoso, apice 7-10 μ . incrassato inductis, pedicello hyalino usque ad 100 μ . vel supra longo, haud firmo præditis.

Hab. in foliis *Tessariæ absinthoidis*, Santiago Chile (K. REICHE). — *Puccinia Tessariæ* Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) p. 305, lecta in foliis caulibusque *Tessariæ absinthoidis*, Mendoza Argentinæ non differt.

71. *Puccinia Podolepidis* Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 162, 2460
 tab. XXIX, fig. 256, 257. — Pycnidiis melleis congregatis, hemisphæricis, 120 μ . cr.; æcidiis vivide aurantiacis, amphigenis, numerosis, plerumque circulariter dispositis et sæpe confluentibus; pseudoperidiis cupulatis, immersis, margine albo, revoluto, laciniato; æcidiosporis aurantiacis, ellipsoideis v. subglobosis, levibus, 24-32 \approx 16-22; teleutosoris nigris æcidia circumdantibus; teleutosporis castaneo-brunneis, oblongis v. clavatis, septo constrictis, levibus, apice rotundatis, truncatis v. etiam quandoque acuminatis, incrassatis, 9-12 μ ., basi rotundatis v. attenuatis, 38-54 \approx 22-32, pedicello persistenti, hyalino, brevi; mesosporis plerumque immixtis, concoloribus v. pallidioribus, ellipsoideis, obovatis, cuneatis vel subclavatis, apice rotundatis et incrassatis, pedicellatis, 32-44 \approx 16-22.

Hab. in foliis *Podolepidis longipedatæ* A. Cunn., Victoria Australiæ.

72. **Puccinia Lagasceæ** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2461 (1909) p. 307. — Maculis nullis v. pallescentibus indeterminatis; soris sæpius hypophyllis parvis 0,25-0,75 mm. diam., subhemisphæricis, erumpenti-superficialibus, subpulverulentis, atro-ferrugineis; uredosporis fulvellis globosis vix papillulosis 20-22 μ . diam., episporio crassiusculo præditis, endoplasmate nubiloso guttuloso farctis; teleutosporis obovatis v. vix umbonatis quandoque utrinque depresso-subtruncatis, 30-40 \approx 20-25, levibus subopacis ferrugineis, medio plus minusve constrictis, loculis subæquilongis grosse uniguttulatis, pedicello tereti 40 \approx 5-6, subchlorino fultis.

Hab. in foliis vivis Lagasceæ Kunthianæ prope Metan, Salta Amer. austr.

73. **Puccinia Eleutherantheræ** Diet., Ann. Mycol. VII (1909) p. 354. 2462 — Maculis flavis, interdum centro arescentibus, irregularibus, magnitudine variis; teleutosoris hypophyllis minutis pulvinatis nudis, plerumque in acervulos usque ad 5 mm. latos congestis, castaneis; teleutosporis oblongis, apice truncatis, rarius conoideis vel rotundatis, basi plerumque angustatis, ad septum leniter constrictis, 28-43 \approx 12-20, episporio flavo-brunneo, basi dilutiore levi, apice plus minusve incrassato indutis, pedicello firmo suffultis, statim germinantibus; mesosporis numerosis intermixtis.

Hab. in foliis Eleutherantheræ ruderalis, in Horto bot. Musei Goeldi, Para Brasiliæ (C. F. BAKER).

74. **Puccinia Calotidis** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 152, 2463 tab. XLIII, fig. 310. — Æcidiis amphigenis in greges irregulares congestis, aurantiacis; pseudoperidiis cupulatis, margine revoluta, albido, laciniato; æcidiosporis subglobosis v. polygoniis, minute echinulatis, 13-14 μ . cr. v. 13-15 \approx 12; teleutosoris minutis, nigris, erumpentibus, gregariis, compactis; teleutosporis atro-castaneo-brunneis, oblongis, elongatis v. clavatis, levibus, septo constrictis, apice rotundatis v. acuminatis, incrassatis usque ad 9 μ ., 37-50 \approx 18-28; pedicello hyalino, persistente, basi conoideo, 30 μ . longo v. spora brevior; mesosporis paucis concoloribus, pedunculatis, obovoideis v. ellipsoideis, apice rotundatis v. acuminatis, incrassatis (6-8 μ .), 28-37 \approx 15-18.

Hab. in foliis Calotidis cuneifoliæ et Calotidis spec., New South Wales Australiæ.

75. **Puccinia Calocephali** Mac. Alp., Rusts of Australia (1906) p. 151, 2464 tab. VII, fig. 58. — Æcidiis epiphyllis sparsis, $\frac{1}{3}$ mm. c. cr.; pseudoperidiis cupulatis, margine laciniatis; æcidiosporis subglobo-

sis vel angulatis, flavo-aurantiacis, levibus, 4 poris germinativis præditis, 16-19 \approx 12-13 v. 14-16 μ . cr.; teleutosoris nigris v. nigro-brunneis, diu epidermide tectis, pulvinatis, compactis, rotundatis v. elongatis, quandoque confluentibus, 1-1 $\frac{1}{2}$ mm. long.; teleutosporis clavatis, obscure brunneis, præcipue in loculo superiori, septo modice constrictis, levibus, 40-57 \approx 17-24, apice inæqualiter rotundatis, quandoque truncatis et apice incrassatis usque ad 11 μ ., loculo inferiori flavo-brunneo, basi attenuato, pedicello persistenti, hyalino v. colorato 35 μ . long., quandoque 10 μ . cr.; mesosporis multis immixtis, elongatis, ellipsoideis, pallidioribus, apice incrassatis, 28-35 \approx 13-16.

Hab. in foliis Calocephali Drummondi et C. lactei, Victoria Australiæ.

76. **Puccinia Brachycomes** Mac Alp, Rusts of Australia (1906) p. 150, 2465 tab. VIII, fig. 66. — *Æcidiis* in foliis, petiolis, caulibus congregatis, hypertrophias et distorsiones efficientibus, $\frac{1}{3}$ mm. diam.; pseudoperidiis rotundatis, erectis, margine albido revoluta, laciniata; *æcidiosporis* subglobosis, ellipsoideis, flavidis, minute echinulatis, 13-16 μ . diam vel 13-16 \approx 10-13; teleutosoris ellipsoideis, pustulatis, nigris v. nigro-brunneis, diu tectis, congregatis, confluentibus, dein maculas magnas efficientibus; teleutosporis clavatis, obscure castaneo-brunneis, levibus, septo modice constrictis 48-64 \approx 18-25, apice truncatis, conoideis v. rotundatis, incrassatis, usque ad 9 μ .; basi attenuatis, quandoque rotundatis, pedicello persistenti, hyalino vel colorato, usque ad 35 μ . longo; mesosporis quandoque immixtis, ellipsoideis v. rotundatis, apice incrassatis, 28-30 \approx 14-19.

Hab. in foliis caulibusque Brachycomes ciliaris, B. diversifoliæ, B. pachypteræ, B. scapiformis, Victoria Australiæ.

77. **Puccinia æmulans** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 31. — *Æci-* 2466 diis hypophyllis, maculis orbicularibus 2-4 mm. diam., flavidis insidentibus, in greges maculam explentes plus minus dense dispositis, cupulatis, albis, margine inciso, revoluta; *æcidiosporis* angulato-globosis, dense minuteque verruculosis, hyalino-flavidis, 18-25 \approx 16-20; soris uredosporiferis amphigenis, sine maculis, sparsis, minutis, rotundatis, pulverulentis, cinnamomeo-brunneis; uredosporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, echinulatis, brunneis, 18-25 \approx 16-22, episporio ca. 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso; soris teleutosporiferis amphigenis, plerumque hypophyllis, maculis nullis vel minutis, flavidis orbicularibus insidentibus, sparsis vel hinc inde aggregatis.

rotundatis, minutis vel mediocribus, ca. $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ mm. diam., pulvinatis, compactis, atris; teleutosporis oblongo-ellipsoideis vel oblongis, utrinque rotundatis, apice incrassatis (usque ad 10 μ .), medio constrictis, levibus, brunneis, 35-42 \approx 21-28; pedicello hyalino, crasso, persistenti, usque ad 70 μ . longo.

Hab. in foliis *Gymnolomiæ multifloræ*, in Utah et Colorado Amer. bor. — Ab affini *P. Helianthi* differt præcipue biologice, idest quoad *Æcidii* tempus evolutionis. Cfr. Syd. l. c.

78. **Puccinia Parthenii** (Speg.) Arthur, Bull. Torr. Bot. Club, (1910) 2467 p. 570. — Uredosoris (*Uredo Parthenii* Speg, Syll. XVI, p. 356); teleutosoris amphigenis, irregularibus et sæpe confluentibus, uredosoris conformibus sed obscurioribus, mox nudis, subpulveraceis, theobromino-brunneis, erumpentibus; teleutosporis ellipsoideis, sæpe irregularibus, elongatis, 40-45 \approx 29-32, levibus, utrinque rotundatis v. obtusis, septo non v. leniter constrictis; tunica obscure theobromino-brunnea, 4-6 μ . cr., apice 6-9 μ . incrassata, apiculata, poro in loculo inferiore conspicuo, septo proximo; pedicello hyalino, crasso, sporam æquante v. duplo longiore.

Hab. in foliis *Parthenii hysterothori*, *P. incani*, *P. argentati*, Mexico, Texas, Amer. bor.

79. **Puccinia Bäumlariana** Bubák, Ann. Mycol. VI (1908) p. 23, cum 2468 icon. — Teleutosoris hypophyllis, sparsis, vel gregariis, pustulatis, minutis, compactis, brunneis vel atro-brunneis; teleutosporis raro ellipsoideis, plerumque elongatis, piriformibus v. clavatis, flavo-brunneis apice obscurioribus incrassatis (4,5-9 μ .), 44-75 \approx 13-22, ad septum non vel vix constrictis; mesosporis raro immixtis.

Hab. in foliis *Anthemidis tinctoriæ* prope Pressburg (A. BAEUMLER). — A *Puccinia Anthemidis* Syd. teleutosporis longioribus paullulum diversa (in *P. Anthemidis* teleutosporæ 32-54 μ . longæ), ceterum similis.

80. **Puccinia Cinerariæ** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 155, 2469 tab. VIII, fig. 60. — *Æcidii*s amphigenis, gregariis secus nervos plerumque distributis, deformantibus, $\frac{1}{3}$ mm. diam.; pseudoperidiis parum prominentibus, margine albo, revolutis, laciniatis; *æcidio*-sporibus distincte aurantiacis, subglobosis v. polygoniis, minute verrucosis, 15-19 μ . cr. v. 15-17 \approx 13; teleutosoris paucis *æcidii*s intermixtis, nigris; teleutosporibus clavatis, castaneo-brunneis, plerumque apice rotundatis v. acuminatis, incrassatis (usque ad 9 μ .) quandoque truncatis, septo constrictis, 36-54 \approx 17-24, loculo superiori obscuriori, inferiori basi attenuato, subtriangulari, pedicello persi-

stenti, colorato, 45 μ . longo; mesosporis concoloribus, obovatis, elongatis v. ellipsoideis, apice incrassatis, longe pedunculatis, 27-36 \approx 13-23.

Hab. in foliis Cinerariæ sp. cultæ, Victoria Australiæ.

81. **Puccinia solidaginicola** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 307. — 2470

Soris maculis flavis, centro depressis insidentibus, hypophyllis, mediocribus vel parvis, solitariis, pulvinatis, firmis, fuscis nudis; teleutosporis oblongis, apice rotundatis vel conoideis, medio constrictis, basi paulo attenuatis, 33-50 \approx 13-18, episporio levi, dilute brunneo, apice valde (usque ad 12 μ .) incrassato indutis, pedicello hyalino firmo, sporam æquante vel brevioris suffultis.

Hab. in foliis Solidaginis sp., in Chile (F. NEGER). — Cfr. observationes cl. Dietelii l. c.

82. **Puccinia Solidaginis-microglossæ** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) 2471

pag. 307. — Soris maculis flavis vel fuscis, centro depressis insidentibus, hypophyllis, mediocribus vel parvis, pulvinatis, firmis, castaneis, nudis; teleutosporis clavatis vel fusiformibus, apice obtusis rarius conoideis, ad septum modice vel non constrictis, basi attenuatis, 45-67 \approx 16-21, episporio levi, dilute brunneolo, apice modice vel raro usque ad 12 μ . incrassato indutis, pedicello hyalino firmo, sporam fere æquante suffultis.

Hab. in foliis Solidaginis microglossæ, Delta Rio Paraná Argentinae (M. S. PENNINGTON). — Cfr. observationes l. c. cl. Dietelli.

83. **Puccinia Solidaginis-mollis** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 308. 2472

— Teleutosoris maculis pallidis deinde brunneolis et arescentibus insidentibus, hypophyllis et minus copiose epiphyllis, parvis sed numerosis in acervulos majores rotundatos vel irregulares v. secus nervos elongatos congestis et confluentibus, pulvinatis, compactis obscure brunneis; teleutosporis oblongis apice rotundatis, modice (5-7 μ .) incrassatis, basi plerumque rotundatis, rarius attenuatis, ad septum constrictis, levibus, castaneis, 35-53 \approx 17-30, pedicello firmo hyalino, apice brunneolo usque ad 120 μ . longo, suffultis.

Hab. in foliis Solidaginis mollis, Utah Amer. bor. (A. O. GARRETT).

84. **Puccinia semiinsculpta** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 204. — 2473

Uredosoris amphigenis, sparsis, rotundatis, parvis, 0,2-0,3 mm. diam., cinnamomeo-brunneis, mox nudis, pulveraceis; uredosporis late ellipsoideis v. globosis 22-28 \approx 17-25, tunica 2 μ . cr., echinulata, poris indistinctis, probabiliter 3, æquatorialibus; teleutosoris

amphigenis v. sæpe epiphyllis, sparsis, rotundatis, parvis, 0,2-0,5 mm. diam., sæpe confluentibus, mox nudis, pulveraceis, compactis theobromino-brunneis vel ob germinatione cinerescentibus; teleutosporis late ellipsoideis v. ellipsoideo-obovatis, 40-50 \times 25-36, utrinque rotundatis v. basi angustatis, septo non v. leniter constrictis, tunica minute sed distincte reticulato-verrucosa, crassa, 4-6 μ ., apice non v. leniter incrassata, 5-9 μ ., concolori; pedicello hyalino, 4-7 μ . cr. plus minusve minute ruguloso, sporam subæquante v. ea duplo longiore.

Hab. in foliis *Vernoniæ Alamani*, Mexico.

85. **Puccinia egregia** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 204. — Ure- 2474
dosporis teleutosporis immixtis, globosis, 24-28 \times 23-26, tunica flavo-aurata, subtenui, echinulata, poris 3 æquatorialibus; teleutosporis amphigenis, sparsis, pulvinatis, theobromino-brunneis; teleutosporis ellipsoideis 35-46 \times 27-30, utrinque rotundatis, septo non vel leniter constrictis, tunica 4-6 μ . cr., apice non vel leniter incrassata, crebre et prominenter verrucosa, papillis conicideis subremotis; pedicello hyalino 5-6 μ . cr., spora duplo longiore.

Hab. in foliis *Vernoniæ unifloræ*, Oaxaca Mexico.

86. **Puccinia Le-Testui** Maubl., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXII (1906) 2475
p. 71, cum icone. — Maculis brunneis, vix limitatis, sæpe nullis; æcidiis hypophyllis solitariis v. laxè aggregatis, margine albido, laciniato; æcidiosporis globoso-angulosis v. ellipsoideis, pallidis minute aculeatis, 18-24 \times 16-20, cellulis pseudoperidii 5-6-angulatis 19-24 \times 16-19; teleutosporis hypophyllis, æcidiis immixtis, erumpentibus dein nudis; teleutosporis oblongis v. ellipsoideo-oblongis, utrinque rotundatis v. basi tenuatis, medio constrictis, episporio crasso, apice usque ad 8 μ . incrassato, papillatisque, levibus, flavo-brunneis, 36-50 \times 18-25; pedicello subhyalino, persistenti, ad 50 μ . long.; mesosporis immixtis ellipsoideis v. clavatis, 28-30 \times 20.

Hab. in foliis *Vernoniæ spec.* (e sect. *Decaneuron*) Marromen Africæ orient. lusitanicæ (LE TESTU).

87. **Puccinia vernoniphila** Speg., An. Mus. Nac Buenos Aires t. XIX 2476
(1909) p. 306. — Maculis nullis v. obsoletis pallescentibus indeterminatis; teleutosporis hypophyllis erumpenti-superficialibus sparsis, suborbicularibus 0,4-1 mm. diam., convexulis omnino nudis compactiusculis, fusco-ferrugineis; teleutosporis crasse ellipsoideis v. obovatis, obscure fusco-ferrugineis, superne obtusis inferne subcuneatis 45-50 \times 20-25, medio constrictulis ibique septo quandoque obliquo præditis, episporio ad verticem sat incrassato sed non um-

bonato, loculis subæqualibus non v. 1-guttulatis, pedicello flexuoso 50-75 \approx 5-6 deorsum sensim attenuato donatis.

Hab. in foliis vivis *Vernoniæ flexuosæ* in pratis prope Buenos Aires Amer. austr. — *P. vernonicolæ* P. Henn. affinis sed diversa, a *P. Lorentzii* P. Henn. et *P. pingui* Diet. longius recedens.

88. **Puccinia Vittadinia** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 164, 2477 tab. XXXIX, fig. 292, XLIII, fig. 308-309. — *Æcidii*s amphigenis v. plerumque epiphyllis, sparsis v. in greges confluentibus, minutis, pseudoperidiis immersis, margine lobatis; *æcidiosporis* flavidis, ellipsoideis, minute verrucosis, 14-17 \approx 11-13; *teleutosoris* minutis, nigris, sparsis, *æcidii*s intermixtis; *teleutosporis* atro-castaneo-brunneis, oblongis oblongatis v. clavatis, levibus, septo constrictis, plerumque utrinque rotundatis, quandoque apice obtuse acuminatis vel truncatis, apice incrassatis (6-9 μ .), 31-46 \approx 18-25; pedicello hyalino persistenti, 30-40 μ . longo, basi 9 μ . c. cr.; *mesosporis* numerosis, concoloribus, pedunculatis, ovoideis v. oblongo-ellipsoideis, apice rotundatis v. acutatis, incrassatis, usque ad 9 μ ., 25-34 \approx 14-17.

Hab. in foliis *Vittadinia* australis, Victoria Australiæ.

89. **Puccinia Cacalia** Kusano, Bot. Mag. Tokyo, XVIII (1904) p. 147, 2478 cum ic. — *Teleutosoris* hypophyllis, sparsis, irregularibus, 1,5 mm. diam., nudis, pulverulentis, nigris; *teleutosporis* oblongis v. fusoides, apice subrotundatis, plerumque deorsum tenuatis, cellula superiori paullo crassiori, 55-63 \approx 18-23, tunica apice incrassata papillam conicam 15 μ . long. formante, levi, brunnea; pedicello elongato hyalino v. pallido.

Hab. in foliis *Cacalia* syneilesis, Mont. Komagadake, prov. Kai (K. TAMURA). — A *Pucc. Tranzschelii* omnino diversa.

90. **Puccinia divergens** Bubák, Ber. deutsch. bot. Ges. Bd. XXV 2479 (1907) p. 57. — *Uredosoris* amphigenis, sed uberius hypophyllis, diu tectis, pustuliformibus, dein erumpentibus, demum nudis, brunneis, rotundis v. ellipsoideis, pulveraceis; *uredosporis* globosis, ovoideis v. ellipsoideis, rarius piriformibus, 28-36 \approx 22-33, raro usque ad 40 μ . long., brunneis, poris 3, raro 4, æquatorialibus et uno apicali, papilla parum prominula præditis; membrana distincte aculeolata, 2-2,5 μ . cr.; *teleutosoris* conformibus, sed atro-brunneis v. nigris; *teleutosporis* pro more ellipsoideis, rarius ovoideis 40-51 \approx 24-33, cellulis subæqualibus, v. inferiore paullo minore, apice v. utrinque rotundatis, septo constrictis, membrana 2,5-3,5 μ . cr.

brunnea, distincte verruculosa, poris in cellula superiori uno apicali et altero subapicali, in inferiori submediano, papilla præditis.

Hab. in foliis *Carlinæ vulgaris*, in Hungaria (KMET) et in Bulgaria (K. MALKOFF).

91. **Puccinia Saussureæ-alpinæ** Lindr. Mykol. Mitt. 11-15 in Act. 2480

Soc. pro Fl. et Fauna fenn. XXV (1904) p. 11. — Uredosoris minutis, rotundatis, solitariis, brunneis; uredosporis subglobosis, 20-25 μ . diam., membrana æqualiter crassa, minute aculeolata, poris ternis (raro 2 v. 4) æquatorialibus; teleutosoris minutissimis, 0,3-0,5 mm, pulveraceis, epiphyllis v. amphigenis, sparsis, absque macula, atro-brunneis; teleutosporis ellipsoideis utrinque rotundatis, medio vix constrictis, 24-38 \times 16-25, membrana 1,5 μ . cr. flavo-brunneola, verruculis longitrorsum seriatis, minutis conspersa; poro in quaque cellula singulo; pedicello hyalino, deciduo, 25 \times 7,5.

Hab. in foliis vivis *Saussureæ alpinæ* in Karelia pomorica Fennicæ. — A speciebus in *Saussurea* vigentibus bene distincta.

92. **Puccinia hellenica** Trotter, Bull. Soc. bot. it. (1905) p. 249. — 2481

Teleutosoris plerumque hypophyllis, maculicolis, compactiusculis, castaneo-brunneis, subhemisphæricis, 0,5-0,7 mm. diam., sparsis v. sæpius infra nervos regulariter aggregatis; teleutosporis forma variabilibus, ellipsoideis, ovoideis v. subcylindricis, utrinque plus minus rotundatis; quandoque truncatis, sæpe asymmetricis, apice papilla hyalinula auctis, medio plerumque constrictulis, flavo-brunneis, 40-55 \times 25-30; episporio levi, subtenui, 3 μ . cr.; pedicello hyalino, 75 μ . longo, fragili.

Hab. in foliis *Echinopis microcephali*, in Mont. Pelio pr. Volo Græciæ. — A *Pucc. Echinopis* et *Pucc. pulvinata* diversa.

93. **Puccinia Diaziana** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 203. — Te- 2482

leutosoris hypophyllis, in maculis pallidis gregarie insidentibus, plerumque circinatim dispositis, parvis, usque ad 0,25 mm. diam., rotundatis, pulvinatis, castaneo-brunneis v. pallidioribus; teleutosporis oblongo-linearibus v. oblongo-fusoideis, 38-54 \times 15-21, plerumque utrinque angustatis et obtusis, septo leniter constrictis, tunica cinnamomeo-brunnea, infra pallidiori, levi, 1-1,5 μ . crassa, apice 5-8 μ . cr.; pedicello leniter colorato, crasso, dimidiam sporam æquante.

Hab. in foliis *Verbesinæ encelioidis*, City of Porfirio Diaz, Mexico.

94. **Puccinia verbesinicola** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 308. — 2483

Uredosoris minutis, plerumque circulariter dispositis confertis, epi-

dermide rupta pseudoperidii instar circumdatis v. semitectis; uredosporis ellipsoideis ovoideis vel subglobosis, 25-30 \approx 21-25, episporio incolorato laxe spinuloso vestitis; teleutosporis amphigenis, præsertim epiphyllis, sparsis parvis pulverulentis, obscure castaneis; teleutosporis ellipsoideis vel oblongis utrinque rotundatis, ad septum leniter constrictis, 33-47 \approx 20-31, episporio æquali castaneo verrucoso indutis, pedicello fragili brevi instructis.

Hab in foliis *Verbesinæ* sp., Guaranda Æquatoriae (LAGERHEIM).

95. **Puccinia Chamæcyparissi** Trotter, sp. n. — Teleutosoris cauli-folii- 2484
colis sparsis v. hinc inde aggregatis et subinde confluentibus, erumpenti-superficialibus, pulvinatis, prominentibus, compactis, saturate rufo-nigricantibus, e circulari oblongis, solitariis et usque ad 1 mm. diam. vel confluendo præcipue in caulibus usque ad 3-5 mm. long.; teleutosporis ellipsoideis interdum clavato-ellipsoideis, ad septum distincte constrictis, apice rotundatis v. obtuse acutatis, tunica tenui levi apice usque ad 5-10 μ . incrassata, saturate ochraceo-fulvis, basi rotundatis vel subcuneatis, 42-56 \approx 20-25; pedicello firmo, hyalino, cylindrico, longitudine vario usque ad 150 μ . longo, 5,5-6 μ . -cr.

Hab. in foliis caulibusque *Santolinæ Chamæcyparissi*, M. Vernacolo ad 800 m. alt. prope Avellino Italiæ merid. julio 1911 (A. TROTTER). — A *Pucc. Millefolii* et *P. Ptarmicæ* differt teleutosoris sæpe cauliculis majoribus magis prominentibus saturatius coloratis, teleutosporis majoribus, longius pedunculatis et itidem saturatius coloratis. A *Pucc. Santolinæ* Magn. mox dignoscitur defectu st. uredinei, teleutosporis apice incrassatis etc.

96. **Puccinia Santolinæ** P. Magn., Hedwigia 49 (1909) p. 97, tab. IV, 2485
fig. 11-18. — Uredosoris foliicolis et cauliculis pallide brunneis aparaphysatis; uredosporis ovoideis 27,4-34 25 \approx 23,30-27,4, crebre aculeolatis, poris germinativis 3 æquatorialibus distincte papillatis; teleutosoris plerumque cauliculis obscure brunneis; teleutosporis saturate brunneis, oblongis, medio plerumque constrictulis, apice non incrassatis, 43-48 \approx 26-27,5, poro germinativo loculi superioris ab apice plus minus remoto, in loculo inferiore septo approximato; episporio sublevi v. depresso granuloso.

Hab. in foliis caulibusque *Achilleæ Santolinæ*, pr. Alexandriam Ægypti, in collinis deserti ad occasum lacus Mareotici pr. stationem Amria. — *Pucc. Hieracii* s. lato affinis.

97. **Puccinia Senecionis-scandentis** Lindroth, Mykol. Mitteil. in Act. 2486

Soc. pro Fauna et Fl. fenn. XXVI (1904) p. 12. — Teleutosoris (tantum notis) compactis brunneis v. rubescenti-brunneis, rotundatis, convexis, usque ad 2 mm. diam., hypophyllis; teleosporis late fusoides v. clavatis v. ellipsoideis v. irregularibus sæpe basi rotundatis v. tenuatis, medio conspicue constrictis, $34-52 \approx 15-25$, membrana flavido-brunnea, levi, apice usque ad 8 μ . incrassata ibique pallidiore, poro cellulæ superioris apicali, inferioris septo proximo; pedicello persistenti, non deciduo, flavido, sporam æquante v. paullo superante.

Hab. in foliis Senecionis scandentis, Sikkim Indiæ or. (HOOKER fil.).

98. **Puccinia senecionicola** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 199. — 2487

Uredosoris amphigenis, subgregariis v. solitariis, rotundatis, parvis, demum erumpentibus, nudis pulveraceis, cinnamomeo-brunneis; uredosporis globosis, $25-32 \approx 24-27$, tunica cinnamomeo-brunnea, tenui, sparse et crasse echinulata, poris germinativis 2 contrapositis prædita; teleutosoris hypophyllis, sparsis v. subconfluentibus, punctiformibus v. bullatis, epidermide diu tectis; teleosporis oblongis v. oblongo-clavatis, $42-60 \approx 16-27$, obtusis, truncatis vel apice æqualiter v. oblique rotundatis, basi plus minusve angustatis, septo non v. leniter constrictis, tunica brunneo-aurata, quandoque supra obscurioribus, tenui, apice plus minusve incrassata, 3-12 μ ., concolori; pedicello brevi, subhyalino.

Hab. in foliis Senecionis angulifolii, S. sinuati, Cacaliæ Pringlei, C. ampullaceæ, C. sinuatæ, C. amplifoliæ, C. obtusilobæ, Mexico.

99. **Puccinia Arnicæ-scorpoidis** (DC.) Magn. Ber. Deut. Bot. Gesell. 2488

(1893) p. 459, *Uredo Arnicæ-scorpoidis* DC. Fl. fr. VI, p. 65. — Teleutosoris amphigenis, sæpe maculis flavis insidentibus, sparsis, solitariis, mediocribus, usque ad 3 mm. diam., rotundatis, diu epidermide tectis, demum, ea fissa, irregulariter cinctis, pulveraceis, atro-cinnamomeis; uredosporis paucis immixtis, globosis, echinulatis, pallide brunneis, 27-33 μ . diam.; teleosporis plerumque ellipsoideis, utrinque rotundatis, rarius basi leniter attenuatis, apice non incrassatis, medio non v. vix constrictis, minute verruculosi, pallide brunneis, $25-35 \approx 16-22$, episporio tenui; pedicello hyalino brevi.

Hab. in foliis vivis Aronici (Arnicæ) Clusii, A. glacialis, A. scorpoidis, in Helvetia et Pyrenæis.

100. **Puccinia Absinthii** DC. Encycl. VIII, p. 245, Sydow, Mon. Ur. 2489

I, p. 11, Trotter in Fl. ital. crypt. Ured. p. 90, f. 52, *P. Tanacetii* Fuck. ex p. — Syll. VII, p. 637. — Uredosoris ut plurimum hypophyllis v. maculis flavis parvis v. nullis insidentibus, sparsis v. aggregatis, minutis, non confluentibus, rotundatis v. rarius elongatis, pulverulentis, pallide brunneis; uredosporis subglobosis vel ellipsoideis, echinulatis, flavo-brunneolis, 20-35 \approx 15-26; teleutosoris amphigenis, sæpius hypophyllis, interdum cauliculis, rotundatis v. confluendo-elongatis (in caule) minutis, mox nudis, atro-brunneis; teleutosporis ellipsoideo-oblongis v. oblongo-clavatis, apice rotundatis et 3-7 μ . incrassatis, medio constrictis, deorsum subtenuatis, loculo superiori punctato vel verruculoso, inferiore subinde levi, brunneis, 38-62 \approx 20-27; pedicello hyalino, crasso, persistenti, usque ad 80 μ . longo.

Hab. in foliis caulibusque *Artemisiæ Absinthii*, *A. Abrotani*, *A. campestris*, *A. camphoratae*, *A. Dracunculi*, *A. maritimæ* etc. in tota Europa, Amer. bor. et Japonia.

101. **Puccinia Centaureæ** DC. s. l. — Syll. VII, p. 633. — *Puccinia* 2490
Centaureæ-vallesiaceæ Hasl. Centralbl. f. Bakter. etc. II Abt., XXI (1908) p. 511.

Hab. in *Cent. vallesiaca*, *C. rhenana*, *C. alba*, Muri Helvetiæ. — HASLER l. c. ex *Pucc. Centaureæ* DC. (typ. B Jacky) distinguit etiam has formas matriciales: f. *Scabiosæ* in *Cent. Scabiosa*, f. *Nigræ* in *Cent. nigra*, f. *Transalpinae* in *C. transalpina*, *C. Jacea*, *C. nervosa*, *C. phrygia*, *C. austriaca*, *C. alba* et *C. nigrescenti*.

- 102 **Puccinia pereziiicola** Speg, An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2491 (1909) p. 307. — Maculis nullis sed folium totum sæpe obsolete pallescens; soris sæpius epiphyllis valde numerosis sed non confluentibus, omnino nudis subsuperficialibus deterrentibus, uredosporiferis pallidioribus teleutosporiferis commixtis; uredosporis fuliginosis globosis 25-30 μ . diam., episporio crassiusculo dense minuteque papilloso, endoplasmate grosse guttulato; teleutosporis ex elliptico obovatis loculis subæquilongis, levissime superne incrassatis non umbonatis, medio vix constrictis, 45-50 \approx 28-32, pedicello breviusculo hyalino mox diffluente suffultis.

Hab. in foliis caulibusque vivis *Pereziiæ prenanthoidis* in alpinis Punta de Vacas et Puente del Inca Mendoza, Amer. austr.

103. **Puccinia leuceriiana** Sacc. et Trott. *Puccinia leuceriicola* Speg., 2492
An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) p. 308, non Sydow.

Maculis nullis; teleutosoris amphigenis sparsis mediocribus 0,5-1 mm. diam., convexulis subsuperficialibus, omnino nudis sed tomento foliorum plus minusve velatis, atro-ferrugineis; teleutosporis 40-42 \times 22-28 ex elliptico obovatis levibus apice obtusis vix incrassatis medio subconstrictulis subopacis ferrugineis, loculis subæquilongis; pedicello mox evanido hyalino fultis.

Hab. in foliis vivis Leuceriæ candidissimæ secus Rio Lista Patagoniæ Amer. austr.

104. **Puccinia Angustifoliæ** Mac Alpine, Rrusts of Australia (1906) 2493 p. 150, tab. VII, fig. 53. — *Æcidii*s in foliis dense congregatis in caulibus plerumque sparsis $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mm. cr., pseudoperidio margine revoluta lacinulato; *æcidiosporis* globosis vel ellipsoideis vel subquadratis, flavo-aurantiacis, 16 \times 11-13 v. 13-14 μ . d.; teleutosoris foliicolis v. cauliculis nigris, diu epidermide tectis, confluendo elongatis; teleutosporis clavatis v. oblongis, brunneo-fuligineis, septo modice constrictis, apice plerumque rotundatis, incrassatis usque ad 9 μ ., basi attenuatis v. rotundatis, levibus, 40-53 \times 16-21, pedicello hyalino deciduo brevi, 38 μ . longo 9 μ . cr.; mesosporis frequenter immixtis ovoideis, apice incrassatis, 25-30 \times 16-17.

Hab. in foliis caulibusque Scorzoneræ angustifoliæ, Victoria Australiæ. — A cæteris speciebus in Scorzonera et Tragopogone vigentibus statu uredosporico absentibus, teleutosporis levibus diversa.

105. **Puccinia paupercula** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 206. — 2494 Teleutosoris hypophyllis, orbiculariter confertis, 1-4 mm. diam., minutis, punctiformibus, confluentibus, mox nudis, compactis, theobromino-brunneis, in germinatione cinereis; teleutosporis oblongis v. lanceolato-oblongis, 39-50 \times 15-17, apice acutis v. obtusis, basi obtusis v. angustatis, septo non v. leniter constrictis, tunica levi, subtenui, apice crassiore, 7-9 μ .; pedicello sporæ concolori, firmo vix dimidiam sporam æquante.

Hab. in foliis Elephantopodis spicati, Veracruz Mexico. — A *Pucc. Elephantopodis* distincta.

106. **Puccinia Zaluzaniæ** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 205. — 2495 Uredosoris plerumque epiphyllis, sparsis, rotundatis, parvis, mox nudis, erumpentibus; uredosporis obovatis, 23-27 \times 16-21, tunica brunneo-aurata, subtenui, 1,5-2, sparse et minute echinulata, poris 2 æquatorialibus contraposis; teleutosoris plerumque epiphyllis, sparsis, minutis, punctiformibus, confluentibus, subpulverulentis, nigricantibus; teleutosporis semiopacis, ellipsoideis, 39-45 \times 21-27,

utrinque obtusis v. rotundatis, septo non vel leniter constrictis, tunica obscure theobromino-brunnea, minute rugosa, 1,5-2,5 μ . cr., apice crassiore; pedicello basi hyalino, basi attenuato, rugoso, spora duplo longiore.

Hab. in foliis *Zaluzaniæ asperrimæ*, Tehuacan Mexico.

107. **Puccinia concinna** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) pag. 205. — 2496

Uredosporis teleutosoris immixtis, globosis, 24-28 \approx 19-22, tunica 1 μ . cr., minute echinulata, poris germinativis 4 subæquatorialibus; teleutosoris plerumque hypophyllis, sparsis, rotundatis, 0,5-1 mm. diam., pulvinatis, nigricantibus; teleutosporis oblongis v. ellipsoideis, 37-50 \approx 24-30, apice rotundatis vel obtusis, basi rotundatis, septo non v. leniter constrictis, tunica theobromino-brunnea, levi, 3-3,5 μ ., crassa, supra crassiore, 6-10 μ ., concolori; pedicello basi hyalino, tenui, elongato usque ad 100-150 μ ., plerumque fragili.

Hab. in foliis *Conoclinii Greggii*, Sierra Madre Mexico. — A *Pucc. Eupatorii* distincta.

108. **Puccinia globulifera** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 200. — 2497

Uredosporis hypophyllis, parvis, rotundatis, sparsis, pulverulentis, cinnamomeo-brunneis; uredosporis globosis, parvis, 15-18 μ . diam., tunica 2 μ . cr., cinnamomeo-brunnea, æqualiter et crasse echinulata, poris germinativis 2 contrapositis, æquatorialibus; teleutosporis amphigenis, parvis, rotundatis, sparsis, subpulverulentis, nigrescentibus; teleutosporis oblongo-sphæroideis 24-32 \approx 22-25, subopacis, utrinque rotundatis, septo non constrictis, tunica obscure brunneo-theobromina 3 μ . cr., crebre et æqualiter aculeata et aculeis conoideis prædita; pedicello basi hyalino, angusto, firmo, 5-6 μ . cr., spora duplo longiore v. ultra, irregulariter inserto.

Hab. in foliis *Otopappi epalacei* var. *Pringlei*, Mexico. — A *P. Otopappi* Syd. forma et magnitudine teleutosporarum diversa.

109. **Puccinia Gymnolomiæ** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 200. — 2498

Uredosporis hypophyllis, sparsis, parvis, nudis, pulveraceis, nitide cinnamomeo-brunneis; uredosporis globosis v. obovato-globoideis, 21-27 \approx 20-24, tunica flavo-aurata, subtenui 1-2 μ ., crasse et crebre echinulata, poris germinativis 2 oppositis subæquatorialibus prædita; teleutosporis hypophyllis, sparsis, parvis, subpulveraceis, castaneo-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, 36-45 \approx 26-30, utrinque rotundatis, medio valde constrictis, tunica castaneo-brunnea, levi, æqualiter crassa, 3-4 μ ., apice paullo crassiori et apiculo hyalino aucta; pedicello hyalino, sporam subæquante.

Hab. in foliis *Gymnolomiæ subflexuosæ*, *G. patentis* var. *brachypodæ*, Mexico.

110. **Puccinia Caleæ** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 201. — Py- 2499

cnidiis epiphyllis, in parvos greges confertis, punctiformibus, inconspicuis, globosis, 100-130 μ . diam.; æcidiis hypophyllis, circulariter dispositis, peridio cylindraceo, lacerato; æcidiosporis globosis, 20-27 \approx 18-24, tunica pallide flava, tenui, crebre et prominenter verrucosa; uredosoris amphigenis, confertis vel sparsis, parvis, subnudis, pulveraceis, cinnamomeo-brunneis; uredosporis globosis v. obovato-globoideis, 24-30 \approx 20-24, tunica obscure cinnamomeo-brunnea, 1,5-2,5 μ . cr., sparse et crasse echinulata, poris germinativis 2 contrapositis subæquatorialibus; teleutosoris plerumque epiphyllis, sparsis, 1-1,5 mm. diam., subnudis, subpulverulentis, nigricantibus; teleutosporis obovato-oblongis v. ellipsoideis, 40-54 \approx 20-30, supra obtusis infra angustatis, quandoque utrinque rotundatis, septo non v. leniter constrictis, tunica obscure castaneo-brunnea, levi, 3-3,5 μ . cr., apice æquali v. plus minusve apiculata, poro germinativo loculi inferioris etiam papillulato; pedicello hyalino, firmo, sporam subæquante v. longiore.

Hab. in foliis *Caleæ axillaris* var. *urticæfoliæ*, *C. Zaccatechichi* var. *rugosæ*, *C. hypoleucæ*, Mexico.

111. **Puccinia Axinophylli** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 201. — 2500

Uredosoris ignotis; uredosporis teleutosoris immixtis, ellipsoideis v. globosis, 21-26 \approx 16-24, tunica flavida 1-1,5 μ . cr., sparse et crasse echinulata, poris verisimiliter 3, æquatorialibus, subinconspicuis; teleutosoris hypophyllis, irregulariter gregariis v. sparsis, subconfluentibus, parvis, demum nudis, leniter castaneo-brunneis; teleutosporis oblongis v. obovato-oblongis, irregularibus, 45-60 \approx 24-30, obtusis v. supra oblique truncatis, infra subangustatis, septo non v. leniter constrictis, tunica levi, cinnamomeo-brunnea v. hinc inde obscuriori, 1,5-2,5 μ . cr., supra valde incrassata 7-12 μ .; pedicello colorato, firmo, 7-12 μ . cr., dimidiam sporam æquante v. etiam brevior.

Hab. in foliis *Axinophylli tomentosi*, Mexico.

112. **Puccinia Noccæ** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 202. — Ure- 2501

uredosoris amphigenis, parvis, sparsis, pulverulentis, cinnamomeo-brunneis; uredosporis 18-28 μ . diam., tunica pallide brunnea, tenui, 1,5-2 μ . crassa, æqualiter echinulata, poris germinativis 3; teleutosoris amphigenis, parvis, sparsis, nigricantibus, subpulverulentis; teleutosporis late oblongis vel ellipsoideis, 32-42 \approx 26-31,

utrinque rotundatis, v. apice obtusis, septo non constrictis, tunica levi, obscure castaneo-brunnea, 3-4 μ . cr., apice crassiore usque ad 10-12 μ ., apiculata; pedicello hyalino, firmo, sporam subæquante v. ea dimidio longiore.

Hab. in foliis *Nocceæ decipientis*, *N. rigidæ*, *N. suaveolentis*, Mexico.

113. **Puccinia jaliscana** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) pag. 202. — 2502

Uredosoris hypophyllis, parvis, rotundatis, pallide flavidis, mox nudis, subpulveraceis; uredosporis globosis v. oblongo-globoideis, 21-27 \approx 18-24 pallide brunneis vel subhyalinis, tunica 1,5-2 μ . cr., minute echinulato-verrucosa, poris germinativis 6-8 sparsis; teleutosoris plerumque hypophyllis, parvis, rotundatis, mox nudis, nigricantibus, subpulverulentis; teleutosporis ellipsoideis, 30-32 \approx 20-24, utrinque rotundatis, septo leniter constrictis, semiopacis, tunica theobromino-brunnea, distincte verrucosa, crassa, 2,3-3 μ ., apice leniter incrassata 4-6 μ .; pedicello hyalino, sporam æquante v. ea dimidio longiore.

Hab. in foliis *Porophylli Holwayani*, Mexico.

114. **Puccinia Ptilosiæ** Bubák, Journ. of Mycol. XII (1906) p. 52. — 2503

Teleutosoris rotundatis v. ellipsoideis, amphigenis sed plerumque epiphyllis, primum tectis dein nudis $\frac{1}{8}$ -1 mm. latis, obscure castaneo-brunneis, pulveraceis; teleutosporis ellipsoideis raro elongatis, plerumque 33-48 \approx 22-29 (raro 18 μ . cr.), utrinque rotundatis v. leniter attenuatis, medio subconstrictis, tunica brunnea 2,5 μ . cr. distincte verrucosa; verrucis 1 μ . circ. crassis, poris germinativis ab apice et septo plus minusve remotis; pedicello brevi, hyalino.

Hab. in foliis *Ptilosiæ lactucinæ*, Amador County California. — A *Pucc. Picridis-strigosæ* Sydow differt teleutosporis multo minoribus.

115. **Puccinia Launææ** R. Maire, Ann. Myc. IV (1906) p. 334; Bull. 2504

Soc. Bot. de Fr. t. LIII (1906) pag. CCIII. — Soris utriusque formæ in maculis pallidis interdum obsoletis insidentibus, minutis, rotundatis, pulverulentis, epidermide diu tectis, sparsis vel circumatis; uredosporiferis cinnamomeo-brunneis; teleutosporiferis atro-brunneis, uredosporis sæpe immixtis; uredosporis subglobosis vel ovoideis, 22-26 \approx 19-22, episporio tenui, flavo-brunneo, laxè echinulato, poris 2 æquatorialibus; teleutosporis ellipsoideis vel ellipsoideo-oblongis, ad septum haud vel vix constrictis, utrinque rotundatis, 33-45 \approx 21-26, episporio brunneo, levi, apice haud in-

crassato, tenui (usque ad 3 μ . crasso); pedicello brevi vel sporam æquante, valde deciduo.

Hab. in foliis *Launææ nudicaulis*, Marocco Afr. bor. — A *P. Endiviæ* et *P. Marquesii* imprimis dignoscitur teleutosporis levissimis.

116. **Puccinia Inayati** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 494. — Teleu- 2505
 tosoris hypophyllis, maculis fuscis insidentibus, minutis, sed plerumque in acervulum majorem 1-2 mm. latum, omnino confluentibus, compactis, atro-brunneis; teleutosporis oblongo-clavatis vel clavatis, apice rotundatis, rarius leniter acutiusculis, valde incrassatis (usque ad 11 μ .), medio constrictis, basi plerumque attenuatis, levibus, pallide flavo-brunneolis, 35-52 \approx 11-18; pedicello flavido, crassiusculo, persistenti, sporam æquante.

Hab. in foliis *Launææ nudicaulis*, Kumaon Himalaya (INAYAT, comm. E. BUTLER). — A præcedente imprimis teleutosporis apice valde incrassatis differt.

117. **Puccinia Butleri** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 431. — Æci- 2506
 diis hypophyllis vel cauliculis, confertis, æque per totam paginam distributis, cupulatis, tandem explanatis, margine albo; æcidiosporis angulato-globosis, hyalino-flavescentibus, subtiliter verruculosis, 14-22 μ . diam.; soris uredosporiferis amphigenis, minutis, rotundatis, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis plerumque globosis vel subglobosis, echinulatis, flavo-brunneis, 17-25 μ . diam., episporio 2 μ . cr.; teleutosoris conformibus, atris; teleutosporis ellipsoideis, ovatis vel oblongis, apice rotundatis, non incrassatis, medio constrictis, basi sæpius rotundatis, verruculosis, brunneis, 28-42 \approx 17-26, episporio tenui; pedicello hyalino, deciduo tenui.

Hab. in foliis caulibusque *Launææ asplenifoliæ*, Pusa, Cawnpore aliisque locis Ind. orient. frequens (E. J. BUTLER). — Cfr. observ. cl. Sydowii l. c.

118. **Puccinia Crucheti** Hasler, Centralbl. f. Bakter. etc. II Abt., XXI 2507
 (1908) p. 510 (absque diagn.).

Hab. in *Crepide succisifolia*, Muri Helvetiæ.

119. **Puccinia Nabali** Arthur, Bull. Torr. Bot. Club (1910) p. 571. 2508
 — Pycnidiis non visis; teleutosoris plerumque hypophyllis, gregariis, in maculis decoloratis 2-5 mm. diam., orbiculariter dispositis, pulveraceis, rotundatis, minutis, 0,2-0,5 mm. diam., sæpe confertis confluentibusque, pulvinatis, obscure theobromino-brunneis, epidermide rupta cinctis; teleutosporis clavatis v. spatulatis,

39-45 \approx 16-19, supra rotundatis v. truncatis, infra subattenuatis, septo leniter constrictis; tunica castaneo-brunnea, infra pallidiori, 1,5-2 μ . crasso, supra crassiori, 7-9 μ ., levi, pedicello subcolorato, firmo, plerumque basi attenuato, spora dimidio longiore vel brevior.

Hab. in foliis Nabali racemosi, Saguenay Co. Quebec Amer. bor. (C. B. ROBINSON).

120. **Puccinia Crepidis-montanæ** Magnus in Fischer, Uredin der Schweiz (1904) p. 212, fig. 165. — Pycnidiis epiphyllis; æcidiis (? *Æc. Crepidis-montanæ* Syd.) plerumque hypophyllis in greges plus minusve numerosos congregatis, maculis flavidis insidentibus; æcidiosporis variabilibus 21-24 μ . cr., tunica tenui, hyalina, minute et crebre verruculosa vestitis; uredo- et teleutosoris amphigenis, parvis mox pulverulentis; uredosporis ellipsoideis vel subovatis 32 \approx 24, 3 poris germinativis præditis, tunica 1,5-2 μ . cr., pallide brunnea et laxè aculeolata; teleutosporis plerumque ellipsoideis utrinque rotundatis, medio constrictulis, 31-35 \approx 21-24, tunica flavo-brunnea 3 μ .; cr., laxè verruculosa, poro germinativo loculi superioris subapicali, loculi inferioris medium parietis circiter occupante; pedicello brevi hyalino, tenui deciduo.

Hab. in foliis Crepidis montanæ, in Helvetia.

121. **Puccinia Crepidis-japonicæ** (Lindr.) Diet., Ann. Mycol. VI (1908) p. 226, *Uredo Crepidis-japonicæ* Lindr., Act. Soc. pro fauna et fl. fenn. XXII, n. 3. — Syll. XVII, pag. 438. — Teleutosoris amphigenis, sparsis, parvis, pulveraceis, castaneis, epidermide rupta semitectis; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, ad septum vix constrictis, 22-32 \approx 17-23, episporio æquali, minute verruculoso, brunneo præditis, pedicello brevi caduco instructis.

Hab. in foliis Crepidis japonicæ, Shimura Japoniæ.

122. **Puccinia Crepidis-grandifloræ** Hasl., Centralbl. f. Bakter. etc. II Abt., XXI (1908) pag. 510 (absque diagn.). *Pucciniæ majori* Diet. — Syll. XVI, p. 310. — proxima, characteribus vero biologicis et etiam morphologicis satis diversa.

Hab. in Crepide grandiflora, C. tectorum, C. bellidifolia, C. nicænsi, Muri Helvetiæ.

123. **Puccinia Crepidis-blattarioidis** Hasl., Centralbl. f. Bakter. etc. II Abt. XXI (1908) p. 510 (absque diagn.).

Hab. in Crepide blattarioidi, Cr. tectorum, C. alpestri, C. virenti, in Engadina etc. Helvetia.

124. **Puccinia Piloselloidearum** Probst, Centralbl. f. Bakter. etc. II 2513

Abt., XXII (1909) p. 712, fig. 3. — Soris plerumque epiphyllis serius apparentibus quam in *Puccinia Hieracii* s. s.; uredosporis tunica poris germinativis plerumque et distincte æquatorialibus prædita.

Hab. in speciebus variis Hieraciorum e sect. *Pilosellæ* in Helvetia.

125. **Puccinia Hyoseridis-scabræ** R. Maire, Bull. Soc. Myc. de France, 2514 t. XXI (1905) fasc. 4, p. 219, fig. 2. — Soris sparsis primo uredosporiferis, cinnamomeo-brunneis, dein teleutosporiferis atro-brunneis, minutis, rotundatis, amphigenis, epidermide lacerata cinctis, maculis obsoletis insidentibus; uredosporis subglobosis v. ovoideis, echinulatis flavo-brunneis, episporio tenui, poris binis æquatorialibus donato instructis, 23-28 \times 18-23; teleutosporis ellipsoideis v. elliptico-oblongis, apice rotundatis, non incrassatis, medio non v. vix constrictis, basi rotundatis v. rarius attenuatis, subtiliter verruculosus, brunneis, 34-48 \times 18-26; pedicello hyalino, brevi.

Hab. in foliis vivis Hyoseridis scabræ, Baranco de Soller in insula Majorica Balearium.

126. **Puccinia Hyoseridis-radiatæ** R. Maire, Bull. Soc. Myc. de Fr., 2515 t. XXI (1905) fasc. 4, p. 220, f. 3. — Soris minutis, rotundatis, epidermide lacerata cinctis, maculis obsoletis insidentibus; uredosporis cinnamomeo-brunneis plerumque hypophyllis, teleutosporis atro-brunneis plerumque epiphyllis; uredosporis subglobosis vel ovoideis, echinulatis, flavo-brunneis, episporio tenui, poris 2 æquatorialibus, 23-26 \times 18-23; teleutosporis ovato-ellipsoideis v. ellipsoideis apice rotundatis non incrassatis, medio non v. vix constrictis, basi rotundatis v. tenuatis, minute verruculosus, brunneis, 32-40 \times 18-23; pedicello hyalino, brevi.

Hab. in foliis vivis Hyoseridis radiatæ, Castillo de Belver insulæ Majoricæ Balearium. — A *Pucc. Hyoseridis-scabræ* videtur satis diversa teleutosporis minoribus etc.

127. **Puccinia Lactuæ-debilis** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) p. 225. 2516 — Æcidiis hypophyllis, in acervulos usque ad 2 mm. latos plerumque concentrice dispositis, minutis, margine denticulato caduco albo præditis, æcidiosporis polyedricis, 17-20 \times 15-18, subtilissime verruculosus; uredosporis teleutosporis intermixtis, ovoideis v. late ellipsoideis, echinulatis, 23-25 \times 20-21; teleutosporis hypophyllis minutis sparsis, primo epidermide semitectis, demum nudis pulverulentis, obscure brunneis; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, ad septum leniter constrictis, episporio æquali verrucoso

castaneo vestitis, 28-42 \approx 23-30, pedicello brevi caduco instructis.

Hab. in foliis *Lactucæ debilis*, Sakawa, Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA).

128. **Puccinia Lactucæ-denticulatæ** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) 2517 p. 103. — Uredosoris hypophyllis, sparsis, minutis, cinnamomeis, pulverulentis, in maculis epiphyllis, flavis; uredosporis globosis v. ellipsoideis, 18-22 \approx 18-20, brunneis, echinulatis, poris 4 æquatorialibus; teleutosoris conformibus, obscure brunneis, nudis; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, septo non v. vix constrictis, 23-33 \approx 18-22,5, castaneis, verrucosis, apice non incrassatis; pedicello caduco instructis.

Hab. in foliis *Lactucæ denticulatæ* in Japonia.

129. **Puccinia Marquesii** Roll., Bull. Soc. Myc. Fr. XX (1904) p. 209; 2518 Maire R., ib. XXI (1905) p. 218. — Soris amphigenis vel cauliculis, minutis, rotundatis, pulverulentis, epidermide lacerata cinctis, atro-brunneis, sparsis v. interdum confluentibus; teleutosporis ellipsoideis v. ovato-ellipsoideis, utrinque rotundatis vel deorsum attenuatis, apice non incrassatis, medio non vel vix constrictis, episporio tenui, brunneo v. flavo-brunneo, distincte v. fere indistincte verruculosis, 30-40 \approx 20-25, pedicello hyalino, usque ad 80 μ . longo; uredosporis immixtis, globosis v. ovoideis, echinulatis, flavo-brunneis, 2 poris germinativis instructis, 25-30 \approx 22-27.

Hab. in foliis caulibusque *Seriolæ ætnensis* in ins. Majorica (ROLLAND) et Corsica (MAIRE).

130. **Puccinia montivaga** Bubák, Ann Mycol. III (1905) p. 222. — 2519 Pycnidiis melleo-brunneis, amphigenis in centro uredosporarum sitis; uredosoris primariis amphigenis in maculis purpurascensibus flavido-marginatis, pycnidia circumdantibus, mox nudis pulvereis, cinnamomeis; uredosoris secundariis plerumque hypophyllis, perexiguis subcastaneis, uredosporis utriusque formæ ellipsoideo-oblongis 28-33 \approx 20-26, membrana flavo-brunnea, aculeata; poris binis; teleutosoris nigris, pulverulentis; teleutosporis ovoideis, piriformibus v. ellipsoideis, raro oblongis, utrinque rotundatis, medio subconstrictis, 33-38 \approx 20-24, membrana castanea minute verrucosa; pedicello brevi, hyalino, deciduo; poris binis.

Hab. in foliis *Hypochæridis unifloræ*, Riesengebirge Bohemiæ. — Affinis *P. Hypochæridis*.

131. **Puccinia Taraxaci-bithynici** R. Maire, Champ. Asie Min., Bull. Soc. Sc. Nancy (1906) Extr. p. 17, fig. 4. — 2520 Uredosoris amphigenis, maculis pallescentibus insidentibus, sparsis, rotundatis v. ob-

longis, minutis, brunneis; uredosporis globosis v. ovoideis, poris 2 æquatorialibus præditis, echinulatis, brunneis, 25-31 \approx 21-26; teleutosoris conformibus, brunneis, mox in pulverem abeuntibus; teleutosporis ovoideis v. ellipsoideis, apice rotundatis, non incrassatis, medio non vel vix constrictis, basi rotundatis vel tenuatis, episporio tenui, 1,2-1,8 μ . cr., brunneo, distincte verruculoso præditis, 31-42 \approx 21-26.

Hab. in foliis vivis *Taraxaci bithynici*, in Monte Olympo Bithyniæ. — Teleutosporis distincte verrucosis, majoribus etc. a *P. Taraxaci* dignoscitur.

132. **Puccinia coætanea** Bubák, in Ann. Mycol. III (1905) p. 218. — 2521

Pycnidiis amphigenis, majusculis, melleo-brunneis, aggregatis; æcidiiis hypophyllis, in maculis flavo-rubrescentibus sparsis v. paucis aggregatis; pseudoperidiis depressis 250-420 μ . diam., margine reflexo, lacinulato; cellulis rhomboideis, tunica externe fortiter incrassata; æcidiosporis globoso-ovoides, pro more polygoniis, 20-26 \approx 15-22, tunica crebre minute verruculosa; uredosoris amphigenis, erumpentibus, convexo-inflatis, confluentibus, brunneis, pulvereis; uredosporis globoso-ovoides, 22-28 \approx 20-29, tunica, læte brunnea, minute muriculata; poris 2-3; teleutosoris pro more hypophyllis rarius cauliculis, majusculis, rotundis v. oblongis, mox nudis, sæpe confluentibus, nigris, compactis; teleutosporis clavatis, apice obtusis, raro tenuatis, in pedicellum tenuato-cuneatis, leviter constrictis, 42-62 μ . long., cellula superiore 20-28 μ . cr., apice usque ad 18 μ . incrassato et saturatiore, cellula inferiori 17-22 μ . cr., poro sæpe late hyalino-papillato; pedicello spora longiore v. brevior, crassiusculo, persistenti.

Hab. in foliis *Asperulæ galioidis*, in Bohemia, Saxonia et Hungaria, totus cyclus metageneticus.

133. **Puccinia Oliganthæ** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 165, 2522

tab. X, fig. 77. — Uredosoris hypophyllis, cinnamomeo-brunneis, subglobosis v. ellipsoideis mox nudis, epidermide rupta cinctis, in maculis elongatis confluentibus; uredosporis globosis, breviter ellipsoideis, vel obovatis, brunneo-auratis, minute echinulatis, poris germinativis singulo v. binis in una facie præditis, 25-29 \approx 22-25; teleutosoris cauliculis, atro-brunneis v. nigris, elongatis, bullatis, mox nudis, compactis, 2 mm. longis v. ultra; teleutosporis clavatis v. oblongis, brunneis, septo constrictis, apice incrassatis, 9-10 μ ., rotundatis v. obscure acutatis quandoque etiam truncatis, basi attenuatis, pallidioribus, 32-54 \approx 16-21; pedicello flavido, persistenti

48 μ . c. longo; mesosporis quandoque immixtis, concoloribus, fusoides, apice acutatis, incrassatis, 28-32 \times 12-13.

Hab. in foliis et ramis *Asperulæ oliganthæ*, Victoria Australiæ.

134. **Puccinia deminuta** Vleugel, Svensk Botanisk Tidskr. II (1908) 2523 p. 318, cum icon. — *Æcidiiis* sparsis v. aggregatis, dein ore dentato dehiscentibus, albidis; *æcidiosporis* globosis v. late ellipsoideis, levissime punctatis, luteis, 18-23 μ . diam., poris germinativis 2-3 præditis; *uredosoris* foliicolis, maculis luteis insidentibus, aggregatis, interdum sparsis, rotundatis v. oblongis, pulveraceis; *uredosporis* globosis v. ovoideo-globosis, 23-28 \times 18-21, membrana parce aculeata, 2 μ . cr., contentu aurantiaco, poris germinativis 2 præditis; *teleutosoris* hypophyllis v. etiam cauliculis, aggregatis, interdum sparsis, rotundatis v. oblongis, atro-fuscis; *teleutosporis* ellipsoideo-clavatis, sursum rotundatis v. interdum acuminatis, ad septum vix constrictis, deorsum in pedicellum satis crassum attenuatis, 33-49 \times 18-23, membrana dilute flavo-brunnea, apice 10 μ . circ. incrassata, poro germinativo loculi superioris sæpius apicali, inferioris ad septum approximato.

Hab. in foliis caulibusque *Galii uliginosi* et *G. palustris*, in Suecia.

135. **Puccinia algerica** Patouill., Bull. trim. Soc. Myc. de France, 2524 XXI (1905) p. 119. — *Uredosoris* hypophyllis, linearibus, 1-2 mm. long., sparsis, brunneo-castaneis, epidermide rupta cinctis; *uredosporis* rotundatis v. ovoideis, brunneis, minute verrucosis, 30-35 \times 18-22; *teleutosoris* hypophyllis, conformibus, nigris; *teleutosporis* clavatis levibus, ad septum constrictulis 50-65 \times 20-25, brunneis, loculo superiori elongato et apice attenuato, raro rotundato v. truncato, incrassato usque ad 15-20 μ ., loculo inferiori cuneiformi; stipite fragili, hyalino, 60 \times 3-5.

Hab. in foliis *Rubiæ levis*, Medea, Algeria Africae bor. — *P. punctatæ* proxima, differt *teleutosporis* majoribus, stipite longiore etc.

136. **Puccinia oldenlandiicola** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) 2525 p. 267. — Maculis fuscis; soris cauliculis effuso-erumpentibus, pulvinatis v. confluentibus, brunneo-fuscis, firmis; *teleutosporis* ovoideis v. ellipsoideis, vertice obtuse rotundatis, haud incrassatis, brunneis, medio septatis haud constrictis; pedicello hyalino flavescente, usque ad 50 \times 3.

Hab. in caulibus *Oldenlandiæ herbaceæ*?, Tambury, Bahia Brasilæ.

137. **Puccinia Psychotriæ** P. Henn., Fungi Amaz. IV, in Hedwigia 2526 (1905) p. 57. — Maculis fuscidulis v. obsoletis; soris plerumque epiphyllis, sparsis v. orbiculariter dispositis, pulvinatis, primo epidermide fusca tectis; uredosporis ovoideis v. ellipsoideis, hyalino-fuscidulis, aculeato-echinatis, 15-22 \times 10-16; teleutosporis interdum intermixtis, oblongis v. clavatis, apice rotundatis, haud incrassatis, medio 1-septatis, paullo constrictis, hyalino-fuscidulis, 30-35 \times 13-16; pedicello hyalino, 10 \times 3-4.

Hab. in foliis vivis *Psychotriæ* sp., socia *Meliola asterinoidi* var., Manaós, Rio Negro Amazoniæ. — Teleutosporæ parvæ, uredosporæ copiosæ observatæ.

138. **Puccinia bokensis** P. Henn., in Fl. du Bas - et Moy.-Congo, 2527 in Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) p. 91. — Maculis sparsis fuscis rotundatis; teleutosoris hypophyllis, aggregatis atroferrugineis; teleutosporis clavatis v. subfusoideis, apice paullo incrassatis, obtusiusculis, medio constrictis, fusco-brunneis, levibus, 30-44 \times 10-18, pedicello 18-25 μ . longo, fusco.

Hab. in foliis *Spermacoces* sp., Boko Sainte Barbe, Congo Africae (VANDERYST).

139. **Puccinia melanoplaca** Syd., Ann. Mycol. VII (1909) p. 168. — 2528 Teleutosoris epiphyllis, maculis vix distinctis, minutissimis, sed in plagulas orbiculares 2-8 mm. latas densissime aggregatis confluentibusque, aterrimis, pulvinatis; teleutosporis oblongis v. clavatis, apice rotundatis v. leniter acutiusculis, incrassatis (usque ad 9 μ), incrassatione sæpe lateraliter producta, medio vix v. leniter constrictis, basi rotundatis v. etiam attenuatis, levibus, brunneis, 35-52 \times 18-25, pedicello brevi, flavidulo, usque ad 20 μ . longo.

Hab. in foliis *Patriniaë* palmatæ, Mount Kurohime prov. Shinano Japoniæ.

140. **Puccinia delicatula** (Arth.) Sacc. et Trott. *Polioma delicatula* 2529 Arth., Journ. of Mycol. XIII (1907) p. 29. — Teleutosoris hypophyllis, sparsis v. subconfluentibus, compactis, rotundis, 0,3-0,4 mm. diam., mox nudis, pulvinatis, sordide albis, dein in germinatione cinereis; teleutosporis oblongis vel fusoideo-oblongis, apice obtusis v. rotundatis, 40-48 \times 12-15, ad septum non v. vix constrictis; tunica hyalina, 1-2 μ . cr., apice non incrassata, levi; pedicello hyalino, brevi.

Hab. in foliis *Salviæ* elegantis, Amecameca Mexici (HOLWAY). — Affinis *P. griseolæ*.

141. **Puccinia Delavayana** Pat. et Har., Bull. Soc. myc. Fr. (1905) p. 84. 2530
Syll. fung. XXI (XII-1911)

— Soris hypophyllis, sparsis, maculis nullis, minutissimis, punctiformibus, atris, inter pilos foliorum nidulantibus, pulverulentis; teleutosporis subglobosis v. late ellipsoideis, apice non incrassatis, sæpissime papilla subhyalina obtusa præditis, medio constrictis, obscure castaneo-brunneis, levibus, 36-40 \times 24-28, tenuiter tunica-tis; pedicello hyalino brevissimo.

Hab. in foliis *Salviæ* cujusdam, Yunnan Sinarum (DELA-WAY).

142. **Puccinia nivea** Holway, Journ. of Mycol. XI (1905) p. 158. — 2531

Teleutosoris hypophyllis, brunneolis, parvis, compactis, 4-12 in maculis obscure brunneis, flavido- v. purpureo-marginatis insidentibus, sæpe confluentibus v. in venis elongatis; teleutosporis mox germinantibus, hyalinis v. subhyalinis, contentu granuloso, levibus, septo constrictis, magnitudine variabilibus, 40-80 \times 16-28, loculo superiori magis rotundato et magnitudine majore, inferiori ad angulum apicalem producto, basi angustiore, tunica in loculo superiori 4 μ . circ. cr., in inferiori tenuiore.

Hab. in foliis *Salviæ* purpureæ, Oaxaca, Mexico.

143. **Puccinia badia** Holway, Journ. of Mycol. XI (1905) p. 158. — 2532

Uredosoris amphigenis, punctiformibus, sparsis, brunneis; uredosporis brunneolis, echinulatis, tunica tenui præditis, globosis, ovoideis v. angulosis, 18-24 μ . diam. sed plerumque 20 μ ., sæpe uno latere tunica tenuiore et dilutius colorata; teleutosoris nigris; teleutosporis castaneo-brunneis, subopacis, crebre tuberculatis, 32-36 \times 28-32, tunica 4 μ . cr., apice leniter apiculatis, pedicello persistenti, hyalino, usque ad 50 μ . longo, sæpe lateraliter inserto.

Hab. in foliis *Salviæ* albicantis et *Salviæ* chrysanthæ, Mexico.

144. **Puccinia infrequens** Holway, Journ. of Mycol. XI (1905) p. 158. 2533

— Uredosoris hypophyllis, brunneolis, minutis, sparsis; uredosporis pallide brunneis, globosis, echinulatis, 20-24 μ . diam.; teleutosoris conformibus; teleutosporis brunneolis, ex ellipsoideo oblongis, raro globosis, tuberculatis, utrinque rotundatis, apice late-apiculatis, tunica 2-3 μ . cr.; pedicello hyalino fragili, sporam subæquante.

Hab. in foliis *Salviæ* cinnabarinæ, Oaxaca Mexico.

145. **Puccinia Brunellarum-Molinæ** Cruchet, Centralbl. f. Bakter. etc. 2534

II Abt. Bd. XIII (1904) p. 96, Bd. XVII (1906) p. 503 et icon p. 674. — Pycnidiis et æcidiis (*Æc. Brunellæ* Wint., — Syll. VII, p. 815); uredo-et teleutosporis illis *Pucc. Moliniæ* simillimis.

Hab. æcidia in foliis *Brunellæ* vulgaris et *B. grandi-*

floræ, uredo- et teleutosporæ in foliis *Molinia* cæruleæ, in Europa.

146. **Puccinia majoricensis** R. Maire, Bull. Soc. Mycol. de France, 2535 t. XXI (1905) fasc. 4, p. 221, fig. 4. — Maculis nullis; teleutosoris hypophyllis v. cauliculis, minutis, rotundatis, confluentibus, in series plus minusve longas dispositis, mox nudis, pulvinatis, primo rufo-brunneis, dein atro-brunneis; teleutosporis oblongis, apice valde incrassatis (usque ad 8 μ .), plerumque rotundatis, rarius tenuatis, medio leniter constrictis, basi rotundatis v. tenuatis, levibus, brunneis, 40-50 \times 14-20; pedicello brunneolo, persistente usque ad 100 μ . longo.

Hab. in foliis caulibusque *Teucrii capitati* prope Palma ins. Majoricæ (Mallorca) Balearium. — A *Pucc. anulari* et *Pucc. Teucrii* facile dignoscitur.

147. **Puccinia Mayorii** Ed. Fischer, Die Uredin. der Schweiz (1904) 2536 p. 549. fig. 341. — Pycnidii amphigenis sparsis; æcidiis (*Æcid. Mayorii* Ed. Fisch., Syll. XVII, p. 417) plerumque hypophyllis; teleutosoris æcidiis immixtis v. non, pulverulentis, 0,5 mm. cr.; teleutosporis plerumque ellipsoideis, sæpius rotundatis, atro-brunneis, utrinque rotundatis, raro basi attenuatis, medio plerumque distincte constrictis, 28-40 \times 19-24, tunica pallide brunnea, levi, tenui v. parum inæqualiter incrassata; pedicello hyalino, tenui, deciduo.

Hab. in foliis *Sideritis hyssopifoliæ*, Vallon d'Andran, Reculet, Jura Helvetiæ. — *Pucc. Harioti* et *P. Vossii* proxima.

148. **Puccinia Hoslundia** Sydow, Deutsche Zentral-Afrika Exped. 2537 (1907-1908) II Bd., pag. 96. — Uredosoris amphigenis, præcipue epiphyllis, maculis flavidis indeterminatis insidentibus, sparsis vel paucis aggregatis, minutis, punctiformibus, epidermide diutius tectis, flavo-brunneis, pulverulentis; uredosporis globosis, subglobosis vel ovatis, tenuiter echinulatis, flavo-brunneis, 20-28 \times 17-22, episporio 1,5-2 μ . cr.; teleutosporis immixtis ellipsoideis vel ellipsoideo-oblongis, apice rotundatis, lenissime incrassatis (usque ad 4 μ .), medio non v. vix constrictis, levibus, castaneo-brunneis, 26-38 \times 18-22, episporio 1 $\frac{1}{4}$ -2 μ . cr.; pedicello hyalino brevi.

Hab. in foliis *Hoslundia verticillatæ*, Ruanda Afr. trop.

149. **Puccinia princeps** H. et P. Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 432. 2538 — Teleutosoris ramicolis, tumores crassos magnos 1-3 cm. v. ultra in omni directione metientes (longos, latos altosque) duriusculos efficientibus; teleutosporis oblongis subinde clavatis, apice rotundatis

v. attenuatis, non v. vix incrassatis, medio plerumque valde constrictis, basi sæpius attenuatis, levibus sed plicis longitudinalibus percursis, flavo-brunneolis, 36-52 \approx 15-26, facile in loculos secedentibus; pedicello concolore v. rufo-brunneo, persistenti, crasso (usque ad 9 μ .) 100 μ . longo.

Hab. in ramis *Pogostemi* sp., Debra Dun, Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

150. **Puccinia distorta** Holway, Ann. Myc. III (1905) p. 22. — Soris 2539
obscure brunneis in tota planta diffusis, sæpe caules et folia deformantibus, 2-30 mm. long., pulveraceis; teleutosporis 32-44 \approx 20-26, cinnamomeo-brunneis, tuberculatis, ellipsoideis, apice rotundatis, non incrassatis, tunica 4 μ . circ. cr., cellulis magnitudine et forma subæqualibus, cellula inferiore raro ad pedicellum angustata, pedicello fragili, hyalino, 3-4 μ . cr., usque ad 80 μ . longo.

Hab. in foliis caulibusque *Mesosphæri pectinati* et *Mesosphæri* sp., Mexici pluribus locis.

151. **Puccinia Serpylli** Lindr., in Act. Soc. Fauna et Fl. Fenn. (1903) 2540
XXVI, p. 11, f. 6, a (extr.) — Teleutosoris minutis, 2-10 mm. long., sæpe confluentibus, non pulveraceis, nigris; teleutosporis anguste ellipsoideis obovatis v. clavulatis, utrinque subrotundatis v. deorsum paullo tenuatis, medio subconstrictis, 35-54 \approx 18-28, poro cellulæ inferioris apud septum posito; tunica levi, flavo-brunnea v. brunnea, vertice usque ad 7 μ . incrassata; stipite firmo 50-120 \approx 7, flavido v. pallide brunneo.

Hab. in caule *Thymi Serpylli*, Karelia Keretina in Fennia. — A *Pucc. caulicola* Schneid. — Syll. VII, p. 677 — teleutosporis multo majoribus et pori loco statim dignoscenda.

152. **Puccinia hymenochætoides** P. Henn., Engl. Jahrb. XL (1907) 2541
p. 226. — Soris capsuliculis confluentibus, bullatis, galliformibus, pileis *Hymenochætæ* similibus, firmis, ferrugineis, c. 15 mm. longis, 1 cm. latis; teleutosporis ellipsoideis v. clavatis, apice obtuso-rotundatis, vix incrassatis, medio 1-septatis, constrictis, 34-42 \approx 15-23, episporio læte brunneo v. castaneo, verrucoso; pedicello hyalino, 5-15 \approx 3-5.

Hab. in fructibus *Bignoniaceæ* sp., inter Norquinia et Matucana Peruviae (WEBERBAUER).

153. **Puccinia æquinoctialis** Holway, Ann. mycol. III (1905) p. 22. 2542
— Maculis flavis, e rotundato circularibus; uredosoris hypophyllis, cinnamomeo-brunneis, in greges parvos irregulares dispositis, epidermide lacerata cinctis; uredosporis pallide brunneis, echinulatis,

e globoso ovoideis, tunica tenui, 16-20 \approx 16-22; teleutosporis immixtis, pallide brunneis, late ellipsoideis, levibus, tunica tenui præditis, utrinque rotundatis, apice non incrassatis, ad septum constrictis, cellulis facile secedentibus, 40-48 \approx 24-28; pedicello hyalino, fragili, dimidiam sporam æquante.

Hab. in foliis *Bignoniæ æquinoctialis*, Baracoa, Cuba.

154. **Puccinia mesomorpha** Syd., Ann. Mycol. VIII (1910) p. 36. — 2543

Soris teleutosporiferis hypophyllis, maculis orbicularibus brunneolis 4-8 mm. diam. vel indistinctis obsolete insidentibus, in greges rotundatos maculam explentes plerumque circinatim dispositis, minutis, ferrugineo-brunneis, compactiusculis; teleutosporis ellipsoideis, ovatis vel oblongis, apice plerumque rotundatis, leniter incrassatis (usque ad 6 μ .), medio non vel parum constrictis, basi sæpius rotundatis, levibus, dilute brunneis, 24-35 \approx 14-18, episporio 2 $\frac{1}{2}$ -3 μ . crasso; pedicello persistenti, crassiusculo, brunneolo usque ad 80 μ . longo; mesosporis numerosis subglobosis, ellipsoideis v. ovatis, 20-32 \approx 16-21.

Hab. in foliis *Hypoestis spec.*, Mount Mariveles, Bataan, prov. Luzon (E. D. MERRILL),

155. **Puccinia phæosticta** Pat. et Har., Bull. Soc. Mycol. Fr. XXII 2544

(1906) p. 116. — Maculis amphigenis orbicularibus, sparsis, 5-15 mm. diam., brunneis; soris pro more hypophyllis, subglobosis, brunneis, compactiusculis, numerosissimis; teleutosporis ovoideis v. ovoideo-clavatis, brunneis, apice non v. vix incrassatis, levibus, medio leniter constrictis, 28-32 \approx 16-20; pedicello brunneo, persistenti, 50-80 μ . longo.

Hab. in foliis *Asystasiæ ex Acanthaceis*, Hanoi Tonkin (BALANSA).

156. **Puccinia Mussoni** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 141, 2545

tab. V, fig. 43-44. — Soris amphigenis, minutis, plerumque rotundatis, bullatis, sparsis v. congregatis; uredosporis flavidis, pariete crasso castaneo, globosis v. breviter ellipsoideis, distincte echinulatis, poris germinativis binis instructis, 30-38 \approx 18-23; teleutosporis intermixtis, obscure castaneo-brunneis, oblongis, tunica crassa rugulosa, quandoque septo leviter constrictis, utrinque rotundatis, apice non incrassatis, 36-46 \approx 28-36, pedicello plerumque lateraliter inserto quandoque etiam ad septum, flexuoso, hyalino, 60 μ . et ultra longo 7 μ . cr.

Hab. in foliis *Ruellia australis*, New South Wales Australia.

157. **Puccinia bahamensis** (Arth.) Sacc. et Trott. *Prospodium baha-* 2546
mense Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) pag 587. —
 Uredosporis teleutosporis paucis intermixtis, late ellipsoideis vel
 globosis 24-27 \approx 18-23, tunica brunneo-aurata, 2,5-3 μ . cr., sparse
 et crasse verrucosis, poris germinativis 2 contrapositis et æqua-
 torialibus; teleutosoris hypophyllis, minutis, sparsis v. in greges
 pulvinatos confertis 0,2-1 mm. cr., mox nudis, nigricantibus; pa-
 raphysibus numerosis, periphericis, basi confertis, teretibus 35-
 64 \approx 9-10, acuminatis, curvulis, tunica crassa, circ. 2 μ ., obscure
 castaneo-brunnea, levibus; teleutosporis in quoque soro paucis, late
 ellipsoideis, 32-39 \approx 24-27, utrinque rotundatis, ad septum leniter
 constrictis, tunica castaneo-brunnea, crassiuscula 3,5-4,5 μ ., stratu
 gelatinoso flavo-aurato, apice solum conspicuo umboniformi 2-3 μ .
 cr., sparse verrucosulis; pedicello pallide succineo, sporam sub-
 æquante, basi appendicibus ramosis latiusculis prædito.
- Hab.* in foliis *Tecomæ bahamensis*, New Providence Ba-
 hamas Amer. bor. (EL. G. BRITTON).
158. **Puccinia compressa** Diet., Ann. Mycol. V (1907) pag. 245. — 2547
 Soris in maculis atro-brunneis amphigenis rotundatis, ca. 3 mm
 latis, cinnamomeis vel castaneis, lobulis epidermidis partim cinctis,
 pulverulentis; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis vel sæ-
 pius depressis, ad septum leniter constrictis, magnitudine valde
 variis, 30-45 \approx 20-30, episporio brunneo verrucoso, apice leniter
 incrassato indutis, pedicello tenui, fragili, sporam fere æquante
 suffultis, mesosporis haud raris.
- Hab.* in foliis *Bignoniaceæ* sp., Ipiraga, Sao Paulo Brasiliæ
 (A. USTERI). — Inter *Puccinia elegantem* et *Puccinia exitiosam*
 media.
159. **Puccinia Gesneriacearum** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) p. 96. — 2548
 Maculis rotundatis magnis, interdum confluentibus, flavis vel fu-
 scis; soris teleutosporiferis hypophyllis punctiformibus, numero-
 sissimis in acervulos rotundatos usque ad 1 cm. latos congestis, non
 confluentibus, nudis, pulvinatis, obscure castaneis; teleutosporis bi-
 formibus, bilocularibus et numero prævalentibus unilocularibus
 (mesosporis; bilocularibus ellipsoideis, utrinque rotundatis v. basi
 cuneatis, haud raro obliquis, 22-35 \approx 17-25, pedicello interdum la-
 teraliter inserto; unilocularibus plerumque obovatis vel clavatis,
 magnitudine valde variis, 18-27 \approx 15-25, levibus, dilute brunneis,
 apice obscurioribus et modice incrassatis, pedicello firmo mediocri
 instructis, mox germinantibus.

Hab. in foliis calycibusque Gesneriaceæ cujusdam lignosæ et sarmentosæ, in horto Goeldi cultæ, Pará Brasiliæ (C. F. BAKER).

160. **Puccinia Phrymæ** Arthur, Journ. of. Mycol. XIV (1908) p. 22. 2549

— Pycnidiis amphigenis, minutis, in parvos greges confertis, inconspicuis, flavo-melleis, dein nigro-brunneis, globoso-depressis, 77-100 μ . diam., 65-80 μ . alt., periphysibus 40-50 μ . long.; æcidiis (*Æc. Phrymæ* Halst, Syll. VII, p. 816); uredosoris hypophyllis, sparsis, rotundatis v. oblongis, mox nudis, erumpentibus; uredosporis late ellipsoideis 18-20 \approx 15-18, tunica cinnamomeo-brunnea, 1-1,5 μ . cr., minute sparse echinulata, poris germinativis 2 in superiori parte positis; teleutosoris hypophyllis, sparsis, rotundatis v. oblongis, 0,2-0,4 mm. diam., 0,3-0,8 mm. long., mox nudis, obscure theobromino-brunneis, pulvinatis, erumpentibus; teleutosporis clavato-oblongis 35-45 \approx 12-15, apice rotundatis v. obtusis, basi angustatis, tunica castaneo-brunnea, concolori, 1-1,5 μ . cr., apice usque ad 9-13 μ . cr.; pedicello sporam subæquante v. brevior, colorato.

Hab. æcidia in foliis Phrymæ leptostachyæ, uredo- et teleutosporæ in foliis Caricis longirostris, Wisconsin Americæ borealis. — Revera rectius *Puccinia Caricis-Phrymæ* vocanda species.

161. **Puccinia Schimperiana** Sydow, Engler's Bot. Jahrbüch. 45. Bd. 2550

(1910) p. 260. — Teleutosoris epiphyllis, maculis flavidis indeterminatis insidentibus, sparsis v. paucis hinc inde aggregatis, epidermide fissa cinctis, $\frac{1}{2}$ mm. diam., subpulverulentis, atris; teleutosporis ellipsoideis, ovatis v. oblongis, apice rotundatis, leniter incrassatis (usque ad 5 μ), medio non v. vix constrictis, basi rotundatis, levibus, castaneo-brunneis, 35-45 \approx 20-28, episporio 2-3 μ . cr., pedicello hyalino, deciduo.

Hab. in foliis Lantanæ (? citrifoliæ), Æthiopia Africae (SCHIMPER).

162. **Puccinia Lantanæ** Farl. — Syll. VII, p. 721. — f. **Erythrææ** 2551

Bacc., Funghi Eritrea, Ann Bot. IV (1906) p. 270, t. X, f. 10. — Teleutosporis in soro germinantibus, obovatis, obtusis, leniter ad septum constrictis, apice obtusiusculo v. applanato, 45 \approx 28.

Hab. in foliis Lantanæ sp., Gheleb-Nuret, Mensa Erythrææ (PAPPI).

163. **Puccinia lippiivora** Syd., in De Wildem., Flore du Bas - et Moy. 2552

Congo, t. III, fasc. I (1909) Extr. p. 11. — Teleutosoris hypophyllis, maculis nullis v. indistinctis insidentibus, sparsis, paucis

aggregatis, minutis, hemisphæricis, pulvinatis, c. 0,3-0,5 mm. diam., obscure brunneis; teleutosporis ovato-oblongis v. oblongis, utrinque rotundatis, apice vix v. leniter incrassatis (usque ad 4 μ .) medio parum constrictis, levibus, flavo-brunneolis, 28-50 \times 16,5, episporio 3 μ . c. cr., statim germinantibus; pedicello persistenti, crassiusculo, hyalino, sporam superante, mesosporis paucis immixtis.

Hab. in foliis *Lippia* sp., Boko Sainte-Barbe Congo Africae (VANDERYST). — Differt a *Puccinia accedenti* Syd. teleutosporis majoribus.

164. ***Puccinia lippicola*** Pat. et Har., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIV 2553 (1908) p. 13. — Maculis amphigenis, brunneolis, sparsis confluentibusve, 2-6 mm. diam., orbicularibus; teleutosporis hypophyllis, pulvinatis, dense congregatis, brunneis, compactiusculis; teleutosporis pallide fulvis, fusoides, utrinque attenuatis, apice truncatis, rotundatis, medio non v. lenissime constrictis, æqualiter incrassato-tunicatis (tunica 3 μ . cr.) brevissimis, 40-50 \times 16-20, pedicello hyalino, gracili, fere æquilongo.

Hab. in foliis *Lippia adoensis*, Chari, Gribingui, Koddo ad Kaga M'bra Africae (A. CHEVALIER).

165. ***Puccinia Volkartiana*** Ed. Fischer, Die Uredin. der Schweiz 2554 (1904) pag. 381, fig. 274. — Teleutosporis rotundatis v. elongatis, solitariis v. confluentibus, pustulatis v. nudis, atro-brunneis; teleutosporis e conoideo-fusoides apice attenuatis v. rotundatis v. 2 3 appendicibus irregularibus præditis, basi attenuatis, medio plerumque constrictis, 35-66 \times 12-16, tunica flavo-brunnea, levi, apice fortiter incrassata; pedicello firmo, flavido, spora brevior.

Hab. in foliis, caulibus etc. *Androsaces Chamæjasmæ*, in Helvetia.

166. ***Puccinia Glaucis*** Arthur, Bull. Torr. Bot. Club (1910) p. 571. 2555 — Pycnidiis non visis; teleutosporis amphigenis, solitariis v. quandoque in parvos greges confluentibus, 1,5-2 mm. diam., rotundatis 0,5-1 mm. cr., mox nudis, pulvinatis, compactis, obscure brunneis, dein ob germinationem sporarum griseis; teleutosporis lanceolato-oblongis, 43-50 \times 13-16, utrinque obtusis, septo leniter constrictis; tunica levi, brunneo aurata, 1-1,5 μ . cr., apice obtusa, usque ad 6-9 μ . incrassata; pedicello pallide flavo. angusto, sporam æquante v. duplo longiore.

Hab. in foliis *Glaucis maritimæ*, Halifax Nova Scotia Amer. bor. (J. DEARNESS).

167. ***Puccinia desertorum*** Sydow, Engler's Bot. Jahrbüch. 45. Bd. 2556

(1910) p. 259. — Teleutosoris amphigenis v. sæpe etiam cauliculis, sparsis v. hinc inde aggregatis, oblongis, usque ad $\frac{1}{2}$ mm. long., atris, compactiusculis; uredosporis immixtis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, breviter echinulatis, flavo-brunneis, 20-28 \times 15-20, episporio 1-1,5 μ . cr.; teleutosporis oblongis v. clavatis, apice incrassatis (usque ad 10 μ .), medio constrictis, basi plerumque attenuatis, levibus, brunneis, 28-50 \times 17-21; pedicello persistenti, hyalino, apice leniter colorato, crassiusculo, sporam circiter æquante.

Hab. in foliis caulibusque *Evolvuli alsinoidis* prope Okahandja Africae trop.

168. **Puccinia Sibutiana** Hariot et Patouillard, Bull. Museum Hist. Nat. Paris (1909) pag. 84. — Maculis amphigenis, orbicularibus, sparsis, usque ad 8 mm. diam., brunneis; teleutosoris hypophyllis compactis, pulvinatis, minutis, dense gregariis; teleutosporis subcylindræis, pallide brunneolis, medio leniter constrictis, apice rotundatis v. acutiusculis, non incrassatis, deorsum attenuatis, levibus, 30-40 \times 12-16, pedicello hyalino brevi, vix 15 μ . longo.

Hab. in foliis *Convolvulaceæ* cujusdam, Chari, Fort-Sibut, Congo Africae trop.

169. **Puccinia Lepistemonis** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) pag. 103. — Maculis rotundatis, atro-fuscis; teleutosoris hypophyllis aggregatis, pulvinatis, ferrugineis; teleutosporis oblonge clavatis, apice obtuso-rotundatis, 4-5 μ . cr., fuscis, medio uniseptatis, constrictis, 40-50 \times 12-18; pedicello persistente, fuscidulo, 10-30 \times 4-5.

Hab. in foliis *Lepistemonis*, Amani et Muyusi Usambara Africae (ZIMMERMANN, EICHELBAUM).

170. **Puccinia concolor** Syd., Ann., Myc. VI (1908) p. 482. — Soris teleutosporiferis hypophyllis, maculis orbicularibus brunneis, 2-8 mm. diam. insidentibus, minutis, sed in pulvinulum crassiusculum rotundatum 1-4 mm. latum plerumque omnino confluentibus, compactis, brunneis; teleutosporis oblongis vel clavatis, apice rotundatis vel acutiusculis, incrassatis (usque ad 9 μ .), medio constrictis, levibus, dilute flavo-brunneolis, 35-55 \times 14-18; pedicello persistenti, flavo-brunneolo, crasso, usque ad 40 μ . longo; mesosporis sæpe immixtis.

Hab. in foliis *Lepistemonis owariensis*, in Africa orient. germanica (A. KARASEK).

171. **Puccinia Haleniæ** Arth. et Holw. — Syll. VII, p. 716. — Ut synonym. adde: *Puccinia melasmoides* Tranzsch. var. *Aquilegiæ vi-*

ridifloræ — Syll. XVII, p. 358. — Cfr. Karsten, Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. XXVII, 4 (1905) p. 16.

172. **Puccinia Weberbaueri** P. Henn., Engl. Jahrb. XI (1907) p. 225. 2561

— Maculis flavido-fuscis, rotundatis gregariis; teleutosoris hypophyllis pulvinatis, atro-castaneis, cæspitose confluentibus; teleutosporis ellipsoideis v. ovoideis, apice obtuso-rotundatis usque ad 8 μ . incrassatis, medio 1-septatis vix constrictis, 20-33 \approx 13-23, episporio flavo-brunneo levi; pedicello hyalino, persistente, 60-100 \approx 4-6.

Hab. in foliis Solani sp., Ocos, 3400 m. alt. Peruvia (WEBERBAUER).

173. **Puccinia transformans** Diet., Ann. Mycol. V (1907) p. 245. — 2562

Pycnidiis numerosis, sparsis vel confertis, melleis; æcidiis ramulos totos occupantibus, folia et petiolos obtegentibus, oblongis vel hemisphæricis, pseudoperidio irregulariter lacerato indutis; æcidiosporis aureis oblongis v. ellipsoideis, haud raro angulatis, 20-30 \approx 15-20, subtiliter verrucosis; teleutosoris in ramulis foliisque valde deformatis et tumefactis dense gregariis eaque amplectentibus, pulvinatis nudis atro-fuscis, ca. 1 mm. latis; teleutosporis ellipsoideis vel oblongis, utrinque rotundatis vel basi angustatis, rarius apice conoideis, ad septum vix vel modice constrictis, 36-55- (raro usque ad 70 \approx 20-27, episporio castaneo levi, apice non vel vix incrassato indutis, pedicello longo fragili hyalino instructis.

Hab. in ramulis, foliis et petiolis Solani Tomatillo, Santiago, Chile (K. REICHE).

174. **Puccinia Heliotropii** Kern et Kellerm. Journ. of Mycol. XIII 2563

(1907) p. 23. — Teleutosoris hypophyllis, gregariis, in greges orbiculares arcte confertis, rotundatis, parvis, 0,1-0,2 mm. diam., mox nudis, pulveraceis, castaneo-brunneis, dein ob germinationem cinerescentibus; teleutosporis oblongis, supra rotundatis v. obtusis, infra plerumque angustatis, 30-40 \approx 10-14, septo subconstrictis, tunica pallide cinnamomeo-brunnea, tenui, 1 μ . c. cr., apice crassiore, 2-4 μ ., levi; pedicello hyalino dimidiam sporam æquante.

Hab. in foliis Heliotropii indici, Gualán Zacapa Guatemala. — A *Pucc heliotropicola* Speg. sporis longioribus et apice incrassatis distinguitur.

175. **Puccinia fumosa** Holway, Ann. Mycol. III (1905) p. 23. — Ma- 2564

culis flavis; æcidiis parvis, hypophyllis, 4-15 in greges rotundatos v. oblongos congestis, margine lacinulatis; æcidiosporis e globoso angularibus, minute tuberculatis, 20-24 μ . diam.; uredosoris brun-

neis, parvis, amphigenis; uredosporis flavido-brunneis, echinulatis, e globoso ovatis, 24-32 \approx 20-24; poris germinativis inconspicuis, apparenter 2; teleutosoris parvis, amphigenis, nigris; teleutosporis castaneo-brunneis, levibus, ellipsoideo-oblongis, apice rotundatis, 6-10 μ . cr., 40-52 \approx 20-28, cellula inferiore basi angustata v. rotundata, pedicello hyalino, persistenti, sporam subæquante.

Hab. in foliis *Læseliæ coccineæ*, *L. glandulosæ*, *L. ciliatæ*, in Mexici pluribus locis.

176. **Puccinia lagoensis** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 267. 2565

— Maculis rotundatis v. effusis, fuscidulis; soris hypophyllis sparse gregariis, rotundato-pulvinatis v. confluenti-effusis, atris; teleutosporis ovoideis v. ellipsoideis apice haud incrassatis, rotundatis 1-septatis, constrictis, brunneis, levibus, 18-28 \approx 11-17, pedicello 25-70 \approx 4-5, hyalino-fuscidulo; mesosporis continuis ovoideis v. ellipsoideis intermixtis.

Hab. in foliis *Oxypetali* spec., Pianby, Serra da Lagoa, in Brasilia.

177. **Puccinia Amphistelmæ** P. Henn., Hedw. XLVII (1908) p. 267. 2566

— Soris cauliculis oblonge effusis, atris, firmis, 1-3 mm. longis; teleutosporis ovoideis v. ellipsoideis, vertice rotundatis, haud incrassatis, medio v. oblique v. longitudinaliter septatis, brunneis, 18-27 \approx 15-22, pedicello hyalino-fuscidulo, usque ad 50 \approx 3.

Hab. in ramulis *Amphistelmæ* spec., Bahia, Maracás, in Brasilia.

178. **Puccinia callistea** Syd., Ann. Mycol. VII (1909) pag. 543. — 2567

Uredosoris amphigenis, plerumque hypophyllis, maculis orbicularibus flavis 2-4 mm. diam. indeterminatis insidentibus, solitariis in quaque macula, rotundatis, minutis, punctiformibus, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, dilute brunneis; uredosporis globosis, subglobosis v. ovatis, valide aculeatis, flavo-brunneis, 28-34 \approx 22-30, episporio 1-1,5 μ . cr.; teleutosoris amphigenis eisdem maculis insidentibus eademque distributione qua uredosporiferis, conformibus, atris; teleutosporis ellipsoideis v. ellipsoideo-oblongis, utrinque rotundatis, apice non incrassatis, medio vix leniter constrictis, castaneo-brunneis, aculeis validis dilutioribus usque ad 3 μ . longis ubique sed laxè obsitis, 35-50 \approx 21-28; pedicello crasso, persistenti, usque ad 55 μ . longo, hyalino, apice brunneolo, parte superiore 6-8 μ . cr., parte inferiore napiformi v. spathulato-incrassata ibique usque ad 25 μ . lato.

Hab. in foliis Voacangæ Thaurisii, Polana, Lorenzo Marques in Africa or. Lusitanica (C. W. HOWARD).

179. **Puccinia Elaeagni** T. Yoshinaga in Diet., Ann. Myc. IV (1906) 2568 p. 304. — Maculis epiphyllis magnis stramineis, centro fuscis depressis, orbicularibus, confluentibus; soris hypophyllis usque ad 12 mm. latis, circularibus vel lobato-rotundatis, interdum confluentibus, bullatis, pulvinatis, nudis, firmis, ex acervulis minoribus dense confertis numerosis compositis, cinnamomeis; teleutosporis fusiformibus, clavatis vel oblongis, utrinque attenuatis vel apice rotundatis, ad septum plus minusve constrictis, 50-80 \times 12-18, episporio levi dilute flavo-brunneo, apice modice incrassato indutis, pedicello usque ad 80 μ . longo suffultis; teleutosporis unicellularibus haud raris.

Hab. in foliis Elaeagni pungentis, Komodamura, Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA). — A *Pucc. achroa* Syd. rite distincta.

180. **Puccinia Thesii-decurrentis** Dietel., Annales Mycol. vol. VI 2569 (1908) p. 225, St. uredosp.: *Uredo Thesii-decurrentis* P. Henn. — Syll. XVII, p. 451. — Teleutosporis nigris vel obscure castaneis; teleutosporis ellipsoideis vel oblongis, utrinque rotundatis, ad septum modice constrictis, 31-40 \times 20-23, episporio castaneo subtiliter verruculoso, apice non vel leniter incrassato indutis, pedicello tenui usque ad 40 μ . longo suffultis; teutosporis unilocularibus seu mesosporis globosis intermixtis.

Hab. in foliis Thesii sinensis, Nikko Japoniæ (N. NAMBU). — A *Pucc. Passerinii* teleutosporis paullo minoribus et tenuius tunicatis distinguenda.

181. **Puccinia Sebastianæ** Syd., in Theissen, Ann. Myc. VIII (1910) 2570 p. 452. — Teleutosporis hypophyllis, in epiphyllis maculas minutas orbiculares 2-3 mm. latis plus minusve depressas, brunneas v. griseo-brunneas efformantibus, solitariis in quaque macula et eandem omnino explentibus, obscure brunneis, compactiusculis; teleutosporis oblongis, apice rotundatis, leniter incrassatis (usque ad 8 μ .), medio leniter constrictis, basi plerumque rotundatis, levibus, brunneis v. dilute brunneis, 28-45 \times 18-21, episporio 2,5-3 μ . cr., mox germinantibus; pedicello persistenti, hyalino v. apice sæpe dilutissime colorato, usque ad 100 μ . longo; mesosporis paucis imixtis.

Hab. in foliis Sebastianæ Klotzschianæ, Sao Leopoldo Brasiliæ.

182. **Puccinia intumescens** (Sydow) Holway, North Amer. Uredin. 2571

(1907) p. 60, fig. 90, *Pucc. Euph.* var. *intumescens* Sydow, Mon. Ured. I, p. 457. — Maculis nullis v. flavo-rubidis, irregularibus; æcidiis hypophyllis, parvis, sparsis v. 1-6 confertis, flavis, peridiis irregulariter ruptis, non reflexis; æcidiosporis e globoso ellipsoideis, pallide flavis, verrucosis 24-36 \approx 22-28; teleutosoris in æcidiis evolutis, sed plerumque contrapositis, nigris, pulveraceis, epidermide rupta cinctis; teleutosporis oblongis, obscure rubro-brunneis, anguste reticulatis, loculo inferiori plus minusve angustato, superiori apice usque ad 12 μ . conoideo-apiculato, 52-80 \approx 26-36; pedicello supra colorato, usque ad 120 μ . longo, persistenti, centro v. basi subincrassato.

Hab. in foliis *Euphorbiæ calyculatæ*, Mexico.

183. **Puccinia Polygoni-sachalinensis** Pat. et Har. Bull. Soc. myc. Fr. 2572

(1905) p. 84. — Soris hypophyllis sparsis, pulverulentis, brunneis, punctiformibus, maculis nullis, circ. 350-400 μ . diam.; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, medio constrictis, levibus, læte castaneo-brunneis, apice valde obscuriori incrassatis, ibique 8-10 μ . cr., 32-40 \approx 16; pedicello persistenti, subhyalino, usque ad 40 μ . longo.

Hab. in pagina inferiori foliorum *Polygoni sachalinensis*, in Japonia.

184. **Puccinia Polygoni-alpini** Cruch. et Mayor, Bull. Herb. Boiss. 2573

2 ser. VIII (1908) pag. 245. — Uredosoris hypophyllis, pallide brunneis, epidermide rupta cinctis, 1 mm. diam.; uredosporis sphaericis, 20-22 μ . diam., episporio 1-2 μ . cr., pallide luteo, minutis verrucis 2 μ . distantibus consperso, poris 3-4, plano-papillatis; teleutosoris hypophyllis minutis, dein confluentibus, expositis, atro-brunneis; teleutosporis subirregularibus, apice rotundatis, basi non tenuatis, medio subconstrictis, 26-38 \approx 17-27, sæpius 29-33 \approx 20-24, cellulis subæqualibus, episporio levi, brunneo, æquali 2-3 μ . cr.; poris uno apicali, altero ad septum, papillis subhemisphaericis instructis; pedicello hyalino, minimo valde fragili.

Hab. in foliis *Polygoni alpini*, in Alpibus valesiacis inter Bettelmatten et Morast in parte sup. vallis Gries Italiae superioris. — Affinis *Pucc. septentrionali*.

185. **Puccinia Astrantiæ-Vivipari** Semad., Centralbl. f. Bakter. etc. 2574

II Abt., XVI (1906) p. 385. — Species biologica, ad typum *Pucciniæ Bistortæ* spectans.

Hab. æcidia in foliis *Astrantiæ minoris*, uredo- et teleutosporæ in foliis *Polygoni vivipari*, Helvetia.

186. *Puccinia Evansii* P. Henn., Engl. Bot. Jahrbüch. XLI (1908) 2575

p. 271. *Æcidiis* folii- vel cauliculis ea sæpe deformantibus, bullatis v. curvatis in maculis rufo-brunneis v. fuscis; pseudoperidiis gregariis amphigenis cupulato-semiimmersis, flavidis, margine fimbriatis, contextu cellulis oblonge polyedricis, hyalino-subfuscidulis, reticulatis; *æcidiosporis* angulato-subglobosis v. ellipsoideis, flavido-hyalinescentibus, levibus, $15-23 \approx 12-20$; teleutosoris amphigenis, pulvinatis, atris, farinosis, usque ad 2 mm. diam.; teleutosporis ellipsoideis, apice haud incrassatis, medio .1-septatis haud v. paulo constrictis, castaneis, levibus, $30-42 \approx 20-30$, pedicello longitudinaliter v. lateraliter inserto, hyalino, flexuoso, usque ad 200 μ longo, 3-6 μ . cr.

Hab. in foliis *Acalyphæ*, Pretoria Transvaal (EVANS), — Incertum est an hoc *Æcidium* vere ad *Pucciniam Evansii* spectet.

187. *Puccinia Eurotiæ* Griff., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) 2576

p. 210. — Soris hypophyllis, rotundatis, plerumque congregatis et confluendo plagas nigras efformantibus, 1 mm. diam., pulvinatis, primo tectis dein erumpentibus et nigris; teleutosporis ex ovoideo obovatis, apice rotundatis v. obtuse acuminatis, incrassatis v. non, $32-42 \approx 20-25$; pedicello longo, hyalino, $120 \approx 3$, pariete irregulariter verrucoso.

Hab. in foliis *Eurotiæ lanatæ* prope Lovelock Nevada Amer. bor.

188. *Puccinia calosperma* Syd. et Butl., Ann. Mycol. IV (1906) p. 432. 2577

— *Æcidiis* in caulibus, petiolis, floribus et foliis evolutis, partes omnes, præcipue caules petiolosque varie deformantibus et greges plus minusve elongatos incrassatos efformantibus, in foliis hypophyllis plerumque in greges rotundatos ca. $\frac{1}{4}$ -1 cm. latos dense confertis ibique in maculis fuscis bullatis insidentibus, cupulatis, albo-flavis; *æcidiosporis* angulato-globosis, hyalino-flavescentibus, subtiliter verrucosis, $16-24 \approx 15-20$; soris teleutosporiferis foliiculis maculis nullis vel obsoletis insidentibus, amphigenis, minutis, rotundatis, ca. $\frac{1}{2}$ mm. diam., mox nudis, sparsis vel secus orbem dispositis, pulverulentis, atris; uredosporis immixtis plerumque oblongo-piriformibus, hyalino-flavidis, aculeatis, $20-32 \approx 14-18$; teleutosporis ellipsoideis vel oblongo-ellipsoideis, utrinque rotundatis, apice non incrassatis, medio parum constrictis, verrucosis, amœne castaneo-brunneis, $38-52 \approx 25-34$; pedicello hyalino, crasso, in aqua leniter intumescente, usque ad 75 μ . longo.

Hab. in foliis, petiolis, caulibus floribusque *Deeringiæ* celosioïdis, Dehra Dun Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

189. **Puccinia Eichelbaumii** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 2578 p. 103. — Maculis fuscidulis v. obsoletis; uredosoris hypophyllis sparsis, minutis, primo tectis, fuscidulis; uredosporis subglobosis, flavo-fuscidulis, verrucosis, 18-20 μ . dm.; teleutosoris epi- v. hypophyllis sparsis v. subgregariis, atro-fuscis, minutis, pulvinatis; teleutosporis oblonge ellipsoïdeis, apice obtuse rotundatis v. papillatis vix incrassatis, medio 1-septatis, constrictis, basi annulato-incrassatis v. subappendiculatis, castaneis, levibus, 25-32 \times 18-20; pedicello hyalino, 10-20 \times 2,5-3.

Hab. in foliis Piperaceæ sp., Amani Usambara Africae (EICHELBAUM).

190. **Puccinia subangulata** Holw., North Amer. Ured. I, pt. I (1905) 2579 p. 25, Photo. n. 34. — Teleutosoris amphigenis, atro-brunneis, oblongis v. ellipsoïdeis, 1-2 mm. long., epidermide velatis dein, ea fissa, erumpentibus; teleutosporis læte cinnamomeis, variis, ellipsoïdeis, oblongis v. angulosis, constricto-1-septatis, 28-44 \times 16-28, tunica tenui apice non incrassata, irregulariter reticulato-rugulosa, rugulis subinde longitudinalibus; pedicello hyalino, fragili, sporam subæquante, sæpe lateraliter inserto; mesosporis frequentibus.

Hab. in foliis *Brodiaëæ congestæ*, Washington Amer. bor. — In eadem matrice adest status æcidialis (cfr. descriptionem l. supra c.) qui probabiliter ad hanc *Pucciniam* spectat.

191. **Puccinia Ornithogali-thyrsoïdis** Diet., Hedw. XLIV (1905) p. (178). 2480 — Soris amphigenis v. cauliculis; uredosoris oblongis v. rotundatis, læte cinnamomeis, epidermide vesiculosa cinctis; uredosporis ellipsoïdeis v. globosis, 20-27 \times 16-22, episporio dilute flavido minute echinulato, poris numerosis; teleutosoris nigris, epidermide tectis, oblongis v. punctiformibus interdum confluentibus, duris; paraphysibus brunneis inclusis; teleutosporis oblongis v. clavatis v. mutua pressione irregularibus, apice truncatis v. conoïdeis, rarius rotundatis, paullo, vix ultra 8 μ . incrassatis, basi sæpius attenuatis, medio vix constrictis, levibus, brunneis, 30-60 \times 16-27; pedicello brevi v. mediocri; mesosporis intermixtis.

Hab. in foliis caulibusque *Ornithogali thyrsoïdis*, in promontorio Bonæ Spei Africae austr. (MAC OWAN).

192. **Puccinia Bessei** Cruchet, in Bull. Soc. Vaud. Sc. nat. XLIV 2581 (1909) p. 469, c. fig. — Teleutosoris amphigenis, primum minimis punctiformibus, deinde rotundatis v. oblongis, epidermide fissa cir-

cumdatis, $\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$ mm. longis, interdum confluentibus, compactis, obscure brunneis; teleutosporis ovoideis, apice leniter attenuatis v. rotundatis v. truncatis, sæpe valde proteiformibus, parum incrassatis (1 μ .), apice crassioribus (2 μ .), medio plus minusve constrictis, deorsum multum attenuatis, sæpe fere truncatis, propter membranam baculis minimis parallelis instructam punctulatis, læte brunneis, 28-38 \approx 15-25; pedicello apice sat crasso (5-6 μ .), hyalino, deciduo, brevi, sæpe vix conspicuo; poro germinativo subapicali in cellula superiore, prope pedicellum in cellula inferiore.

Hab. in foliis, rarius in caule, *Lloydia serotina* in alpinis Valesiacis Helvetiæ.

193. **Puccinia Asphodeli** Moug. in Duby — Syll. VII, pag. 666. — 2582
var. **Asphodeli-subalpini** R. Maire, Bull. Soc. Bot. de Franc. t. LV (1908) p. CLII. — A typo differt teleutosporis magis elongatis, tunica minus incrassata, verruculis tenuioribus.

Hab. in foliis *Asphodeli subalpini*, prope Gavarnie in Pyrenæis Galliæ.

194. **Puccinia phyllachoroidea** Speg., Fungi Chilenses (1910) p. 20, 2583
cum icone. — Teleutosporis linearibus gregariis minutis, 0,25-1,50 mm. long., 0,10-0,25 mm. cr., innatis, subsclerotiaceis, sordide ferrugineis, semper tectis; teleutosporis obovatis superne subtruncatis v. rotundatis, medio non constrictis, levibus, apice non v. leniter incrassatis, 30-40 \approx 20-22; pedicello persistenti, hyalino vel leniter colorato, 10-15 \approx 5-7.

Hab. in foliis *Iridaceæ* cujusdam, Cerro Carracol, Amer. austr.

195. **Puccinia Cipuræ** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 496. — Soris 2584
teutosporiferis hypophyllis, maculis rotundatis vel oblongis 2-3 mm. longis, obscure brunneis insidentibus, punctiformibus, ca. $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam, sæpe in greges rotundatos concentricè dispositis, compactis, atro-brunneis; teleutosporis oblongis vel oblongo-clavatis, apice rotundatis, vix vel parum incrassatis (ca. 3 μ .), medio leniter constrictis, basi sæpius attenuatis, levibus, hyalino-flavidis, 27-38 \approx 10-14; pedicello hyalino, brevi.

Hab. in foliis *Cipuræ paludosæ*, in Horto botanico Calcutta Indiæ (E. J. BUTLER).

196. **Puccinia Belamcandæ** Diet., Annales Mycol. vol. V (1907) 2585
p. 71. Stat. uredosp. *Uredo Belamcandæ* P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 158. — Maculis explanatis fuscidulis v. pallidis, interdum zona rufo-brunnea circumdatis; soris amphigenis, sparsis v. cæspitosis, pulvinatis, epidermide fissa velatis; uredosporis

ovoideis v. ellipsoideis, brunneis, 20-32 \times 18-25; teleutosoris amphigenis, epidermide fissa cinctis, firmis, nigris; teleutosporis clavatis, apice obtusatis, rarius rotundatis v. conoideo-tenuatis, basi cuneatis et in pedicellum tenuatis, septo leniter constrictis, 40-55 \times 16-23; membrana levi, brunnea, deorsum pallidiore, vertice 5-10 μ . incrassata; pedicello teleutosporam dimidiam subæquante.

Hab. in foliis *Belamcandæ sinensis*, Akimachi Tosa Japoniæ (uredosp.) (JOSHINAGA) et Komaba Japoniæ (et teleutosp.) (NAMBU).

197. **Puccinia capensis** Diet. in Hedw. XLIV (1905) p. (178). — Soris 2586
oblongis, interdum confluentibus, epidermide bullata diu tectis, denique nudis v. ea fissa cinctis, atris; teleutosporis variis, plerumque oblongis v. cuneiformibus, haud raro angulatis vel obliquis, apice truncatis, rotundatis v. conoideis, basi sæpe angustatis, septo modice v. vix constrictis, 30-60 \times 20-29, saturate flavo-brunneis v. castaneis, episporio levi, valido, apice leniter incrassato; pedicello firmo flavo-brunneo, usque ad 50 μ . longo.

Hab. ad scapos *Morææ tricuspida*, in promontorio Bonæ Spei Afr. merid. (MAC OWAN). — Adsunt quoque mesosporæ

198. **Puccinia expallens** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 496. — Te- 2587
leutosoris hypophyllis, maculis nullis vel obsoletis insidentibus, minutis, punctiformibus, ca. $\frac{1}{3}$ mm. diam., plerumque in greges rotundatos concentrice dispositis, compactis, griseo-brunneis; teleutosporis oblongis vel oblongo-clavatis, apice rotundatis, parum incrassatis (ca. 3 μ), medio vix vel leniter constrictis, basi rotundatis vel attenuatis, levibus, hyalino-flavidis, 30-42 \times 11-15; pedicello hyalino, brevi.

Hab. in foliis *Hypoxidis aureæ*, Dehra Dun, (E. J. BUTLER).

199. **Puccinia pachycephala** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 305. — 2588
Soribus hypophyllis, maculis brunneolis vel flavidis insidentibus, sparsis, minutis; uredosporis ellipsoideis vel subglobosis 22-27 \times 17-22, flavo-brunneis, echinulatis; teleutosoris nigris pulvinatis, nudis vel margine epidermide lacerata cinctis; teleutosporis clavatis, apice rotundatis, rarius truncatis vel conoideis, ad septum leniter constrictis, basi attenuatis, cellula superiore plerumque ovoidea vel subglobosa, inferiore triangulari vel oblonga, 42-60 \times 19-33, episporio castaneo, apice usque ad 18 μ . incrassato levi indutis, pedicello ca. 30 μ . longo, brunneolo, firmo suffultis.

Hab. in foliis *Veratri Maximowiczii*, pr. Urami Nikko
Syll. fung. XXI (XII-1911)

Japoniæ (S. KUSANO). — Affinis *P. atro-punctæ*, differt vero teleutosporis majoribus.

200. **Puccinia macrospora** Arthur, Mycologia I (1909) p. 244. Stat. æcid. *Æcidium macrosporum* Peck (1873) — Syll. VII, p. 829. — Uredosoris amphigenis, sparsis v. seriatis, oblongis, 0,5-1 mm. long., serius dehiscentibus; uredosporis obovato-ellipsoideis, latissimis, 40-60 \approx 26-37, tunica flavo-aurea, 2,5-3,5 μ . cr., spinulis 3-4 μ . alt. conspersa, poris 2-3 obsolete; teleutosoris hypophyllis, sparsis v. lineatis, demum nudis, pulvinatis, castaneis; teleutosporis clavatis, 61-67 \approx 16-23 pro more apice obtusis v. rotundatis, deorsum tenuatis, septo vix constrictis; tunica cinnamomeo-brunnea, 1,5-2,5 μ . cr., apice ad 9-16 μ . incrassata; pedicello subhyalino, sporam integram v. dimidiam æquante.

Hab. st. æcid. in foliis *Smilacis hispidae* in Amer. boreal. pluribus locis, st. uredo-teleutosp. in foliis *Caricis comosæ*, Lewes Del. Amer. bor. (H. S. JACKSON).

201. **Puccinia Merrillii** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 251. — 2589 — Maculis rotundatis, fuscidulis, zona rufo-brunnea cinctis; teleutosoris hypophyllis circinatim dispositis, firmis, ferrugineis; teleutosporis oblongis, apice haud incrassatis, rotundatis, interdum cristulatis, medio septatis paullo constrictis, citrinis v. subaurantiacis, levibus 35-60 \approx 17-21; pedicello medio inflato, longitudinaliter obscuriori subsulcato, flavido, 50-80 \approx 20-25.

Hab. in foliis *Smilacis vicariæ* Kth., Mindoro Mt. Halcon, insul. Philipp. (MERRILL).

202. **Puccinia Costi** (P. Henn.) Sydow, Ann. Myc. VI (1908) p. 141, 2590 *Uromyces Costi* Henn., Hedwigia (1895) pag. 320. — Syll. XIV, pag. 283. — *Uromyces Dichorisandræ* P. Henn. Hedwigia (1895) p. 91. — Teleutosoris hypophyllis, maculis flavis indeterminatis insidentibus, dense gregariis et sæpe magnam folii partem æque obtegentibus, minutis, punctiformibus, ca. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ mm. diam., subpulverulentis, primo flavo-brunneolis, dein obscure brunneis; teleutosporis ovatis, ellipsoideis vel oblongis, apice rotundatis, vix vel leniter incrassatis, medio vix vel parum constrictis, basi plerumque rotundatis, tenuiter stiatis, dilute flavidis, 20-30 \approx 16-23, episporio ca. 1 $\frac{1}{2}$ -2 μ . crasso; mesosporis numerosis subglobosis vel ovatis, apice magis incrassatis (usque ad 7 μ .), striatis, 18-25 \approx 16-22; pedicello hyalino, tenui, sporam circiter æquante vel parum superante.

Hab. in foliis *Costi pumili* in prov. Goyaz Brasiliæ (ULE).

203. **Puccinia Juncelli** Diet. Ann. Myc. VIII (1910) p. 306. — Uredoso- 2591
ris epidermide fissa cinctis, oblongis; uredosporis obovatis v. ellip-
soideis, 30-46 × 22-30, brunneis, breviter echinulatis, episporio
tenui, poris 4 æquatorialibus instructo vestitis; teleutosoris minutis
oblongis v. linearibus in maculas oblongas 4-6 mm. longas con-
fluentibus, foliicolis v. culmicolis, epidermide tectis, nigricantibus,
paraphysibus brunneis inclusis; teleutosporis clavatis v. oblongis
haud raro obliquis, apice truncatis v. conoideis et plus minusve
incrassatis, basi angustatis, ad septum non v. modice constrictis,
48-66 × 15-23, brunneis, pedicelle firmo mediocri suffultis.

Hab. in Juncello serotino Clk. (= Cypero serotino Rottb.),
Tosa Japoniæ.

204. **Puccinia fusoidea** Bagnis, Le Puccinie, Roma (1876) (Atti R. Acc. 2592
Linc.) p. 61, fig. 239. — Soris (non descriptis); teleutosporis elon-
gato-fusiformibus, angustis utrinque acutissimis, non constrictis,
cellulis conoideis; episporio levi, fusco, vertice incrassato; pedicello
elongato-filiformi, colorato.

Hab. in foliis Junci sp. ind. Safahych ad Nili ripas in Ægy-
pto. — Ex icone viderentur teleutosporæ 90-95 µ. longæ, et 8-
10 µ. crassæ.

205. **Puccinia tenuispora** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 137, 2593
tab. IV, fig. 33-34. — Uredosoris hypophyllis, e rotundato ellip-
soideis, sparsis v. lineariter confluentibus, flavo-brunneis, mox
nudis, epidermide rupta cinctis, compactis, in maculis purpureis
irregulariter confluentibus insidentibus; uredosporis flavidis v. pal-
lide flavo-brunneis, ellipsoideis v. obovatis, echinulatis, 1-2 po-
ris germinativis præditis, 20-25 × 15-22; teleutosoris obscure brun-
neis, ellipsoideis, sparsis vel congregatis, pulvinatis, compactis,
mox nudis, maculis purpureis insidentibus; teleutosporis oblongis
v. clavatis, flavo-ochraceis, levibus, apice rotundatis, raro trun-
catis v. conoideis, incrassatis usque ad 11 µ., basi rotundatis vel
attenuatis, septo constrictis, 30-50 × 14-20; pedicello hyalino, per-
sistenti, 30 µ. c. longo; mesosporis multis, clavatis, obovatis vel
oblongis, levibus, apice incrassatis, 22-32 × 13-16.

Hab. in foliis Luzulæ campestris et Luz. Oldfieldi,
Victoria et Tasmania Australiæ.

206. **Puccinia amianthina** Syd., Engler's Bot. Jahrb. 45. Bd. (1910) 2594
p. 260. — Teleutosoris hypophyllis, maculis pallidis indeterminatis
insidentibus, sparsis v. hinc inde paucis seriatim dispositis, rotun-
datis v. oblongis, $\frac{3}{4}$ -1 mm. longis, compactiusculis, atro-brunneis;

teleutosporis ovatis v. oblongis, apice rotundatis, non v. vix incrassatis, medio leniter constrictis, levibus, flavo-brunneis, 22-36 \approx 17-25 episporio 2,5-3 μ . cr.; pedicello hyalino, tenui, usque ad 70 μ . longo, sæpe oblique inserto; mesosporis paucis immixtis.

Hab. in foliis Bambusaceæ spec., Kisantu Congo Africae tropicalis.

207. **Puccinia Caricis-bracteosæ** Speg., Fungi Chilenses (1910) p. 18, 2595

cum icone. — Uredosoris sparsis, minutis, ellipsoideis, erumpentibus, melleis, 0,5 mm. long.; uredosporis obovatis v. globosis, papillosis mediocribus 20-24 \approx 18-20; teleutosoris conformibus cum uredosoris eodem tempore vigentibus; teleutosporis clavulatis, apice subtruncato-rotundatis, sæpe angulato-subrostratis, apice crasse tunicatis, medio non v. lenissime constrictis, fulvis, levibus, 45-55 \approx 14-16; pedicello concolori, persistenti, 10-15 \approx 5-7.

Hab. in foliis Caricis bracteosæ, prope Corral, Chile, Americae australis.

208. **Puccinia universalis** Arthur, Journ. of Mycol. XIV (1908) p. 21. 2596

— Pycnidiis plerumque epiphyllis, orbiculariter dispositis, numerosis, punctiformibus, flavo-melleis, subinconspicuis, subepidermicis, leniter depresso globosis 100-160 \approx 90-112, periphysibus 40-80 μ . l.; æcidiis (*Æcid. Dracunculi* Thüm., Syll. VII, p. 804); uredosoris epiphyllis sparsis, oblongis, 0,2-0,5 mm. long., mox nudis, cinnamomeis pulveraceis; uredosporis late ellipsoideis 20-26 \approx 15-19, tunica cinnamomeo-brunnea 1-1,5 μ . cr., minute subechinulata, poris germinativis 2 equatorialibus prædita; teleutosoris epiphyllis sparsis, rotundatis v. oblongis 0,1-0,3 mm. latis, 0,2-1,2 mm. long., mox nudis pulveraceis, epidermide rupta cinctis; teleutosporis clavato-oblongis, 35-52 \approx 12-16, tunica obscure castaneo-brunnea, subtus tenuiori 1,5-2 μ . cr., supra 7-12 μ . cr., levi; pedicello colorato, spora brevior.

Hab. æcidia in foliis Artemisiæ Dracunculi in Sibiria, A. dracunculoidis, canadensis, frigidæ, kansanæ in Amer. bor.; uredo- et teleutosporæ in foliis Caricis stenophyllæ, Amer. bor.

209. **Puccinia Caricis-macrocephalæ** Diet., Ann. Mycol. (1910) p. 306. 2597

— Soris maculis minutis brunneis insidentibus, hypophyllis sparsis punctiformibus, epidermide revulsa semitectis, uredosporiferis brunneis, teleutosporiferis atris; uredosporis ellipsoideis, obovatis v. subglobosis 30-35 \approx 24-30, brunneis, echinulatis; teleutosporis clavatis, apice rotundatis, truncatis vel conoideis, basi plerumque

cuneatis, ad septum constrictis, 50-85 \times 15-24, obscure castaneis, levibus, vertice modice v. usque ad 10 μ . incrassatis, pedicello longo firmo, superne plerumque fuscidulo suffultis.

Hab. in *Carice macrocephala*, Japonia.

210. **Puccinia Caricis-trichostylis** Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 2598 p. 584. — Maculis stramineis linearibus v. indeterminatis; uredosoris amphigenis, pallidis, epidermide rupta velatis; uredosporis globosis v. late ellipsoideis, plerumque 25-34 μ . latis, episporio hyalino, echinulato, 2,5-5 μ . cr.; teleutosoris hypophyllis minimis, castaneis, nudis; teleutosporis ellipsoideis, oblongis v. clavatis, apice rotundatis, conoideis v. truncatis, deorsum sæpius angustatis, ad septum subconstrictis, 35-45 \times 15-25, episporio levi, flavo-brunneo, subcrasso, apice vix v. modice incrassato; pedicello firmo, sporam subæquante v. brevior.

Hab. in foliis *Caricis trichostylis*, Mont. Godai, Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA).

211. **Puccinia Caricis-atropictæ** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 2599 t. XIX (1909) p. 303. — Maculis nullis; soris elliptico-linearibus minutis 0,5-1 mm. long., 0,25-0,30 mm. cr., sat prominulis sed epidermide crassa circinatim v. rimose fissa tectis; uredosporis obovatis, majusculis, 28-35 \times 20-25, episporio crasso, verrucoso vestitis, pedicello hyalino 25-35 \times 5-6 persistenti fultis, sæpe paraphysibus linearibus, marginalibus vix clavulatis, 50-60 \times 5-6, levibus cinctis; teleutosporis dense constipatis obscure ferrugineis antice sæpius truncato-subrotundatis deorsum cuneatis, medio vix constrictis, levibus, 40-60 \times 20-24, sensim in pedicellum chlorinulum 25 \times 5-7 productis, loculis subæquilongis.

Hab. in foliis vivis *Caricis atropictæ*, in uliginosis secus Carrenleofú Patagonia Amer. austr.

212. **Puccinia Caricis-bonariensis** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 2600 t. XIX (1909) p. 302 — *Æcidiis* adhuc ignotis (an *Æc. Modiolæ* Thüm.); teleutosoris sæpius hypophyllis linearibus tenuibus, 0,5-2 mm. long., 0,25-0,40 mm. lat., diu epidermide tectis dein vix rimose erumpentibus, ochraceo-ferrugineis compactis subsclerotiaceis; teleutosporis dense constipatis, loculo superiori conico subgloboso v. conoideo, infero cuneato paullo longiore, episporio levi, septo constrictulis, endoplasmate nubiloso fartis, 40-60 \times 12-14, pallide fulvis, pedicello persistente 20-30 \times 5 vix chlorino suffultis.

Hab. in foliis vivis *Caricis bonariensis*, in pratis circa La Plata Amer. austr.

213. **Puccinia Caricis-brunneæ** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 306. 2601

— Soris amphigenis, præsertim hypophyllis, oblongis vel linearibus, epidermide fissa diu velatis, cinnamomeis; uredosporis biformibus: aliis ellipsoideis vel globosis 15-22 \times 13-18, dilute brunneis, echinulatis, poris 4-8 sparsis præditis, aliis obovatis vel ellipsoideis 20-32 \times 15-21, episporio sublevi vel granulato poris 4 æquatorialibus perforato brunneo vestitis, pedicello hyalino, usque ad 50 μ . longo, fragili suffultis; teleutosporis (hucusque visis) paucis tantum maturis, oblongis apice conoideis vel rotundatis, modice incrassatis.

Hab. in foliis Caricis brunneæ, Mejiro pr. Tokio Japoniæ (S. KUSANO).

214. **Puccinia Caricis-Darwinii** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 2602

t. XIX (1909) pag. 302. — Æcidiis ignotis; soris, uredosporiferis cum teleutosporiferis eodem tempore vigentibus, omnibus parvis, 0,25-0,50 mm. long., 0,20-0,25 mm. lat., epidermide diu persistente velatis, dense seriatis sed non confluentibus subpulverulentis; uredosporis globosis 20-24 μ . diam., episporio crassiusculo minute papilloso hyalino vestitis, endoplasmate dense nubiloso fulvo fartis, teleutosporis dense constipatis, subclavatulis apice truncatis crasseque tunicatis, medio constrictulis, levibus pallide ferrugineis, loculo infero obconico nonnihil quam supero longiore, 45-60 \times 10-20, in pedicellum deorsum sensim attenuato 30-60 \times 7-9 producto.

Hab. in foliis vivis Caricis Darwinii, in herbosis Corcovado Patagoniæ Amer. austr.

215. **Puccinia Caricis-Gayanæ** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 2603

t. XIX (1909) p. 303. — Æcidiis ignotis; soris uredosporiferis cum teleutosporiferis commixtis, omnibus parvis, parum prominulis, ellipticis v. linearibus 0,30-0,50 mm. long., 0,25-0,30 mm. lat., compactiusculis; uredosporis globosis 20-24 μ . diam. episporio tenui densiuscule papilluloso, endoplasmate subaurantio nubiloso sæpe grosse 1-guttulato fœtis; teleutosporis dense constipatis, levibus, fulvis, cylindraceo-clavulatis, superne truncatis vel obtuse rotundatis, loculo superiore crasse tunicato et infero duplo brevior, deorsum leniter cuneatis atque in pedicellum 30-40 \times 7-8 subhyalinum persistentem productis.

Hab. in foliis vivis Caricis Gayanæ, in herbosis pr. Lago S. Martin, Patagonia Amer. austr.

216. **Puccinia Caricis-gibbæ** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 305. — 2604

Uredosporis hypophyllis, in maculis purpureis v. brunneis v. sine

maculis, minutis et partim minimis, epidermide pallida tectis; uredosporis obovatis, ellipsoideis, oblongis vel irregularibus 21-33 \times 14-19, episporio tenui incolorato verruculoso vel subtiliter echinulato præditis, poris germinationis 4 æquatorialibus difficillime conspicuis instructis; teleutosoris hypophyllis parvis rotundatis vel oblongis, pulvinatis, cinnamomeis v. castaneis, epidermide lacerata plerumque cinctis; teleutosporis oblongis, apice rotundatis v. angustatis, basi plerumque attenuatis, ad septum paullo constrictis, 22-50 \times 12-17, episporio dilute brunneolo levi, apice usque ad 8 μ . incrassato indutis, pedicello hyalino usque ad 30 μ . longo suffultis, statim germinantibus.

Hab. in foliis Caricis gibbæ pr. Tokyo et Akabane et Caricis brunneæ pr. Mama prov. Tokyo Japoniæ (S. KUSANO et N. NAMBU).

217. **Puccinia Caricis-japonicæ** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 306. 2605

— Uredosoris hypophyllis minimis, diu tectis; uredosporis ellipsoideis vel obovatis, 19-25 \times 17-21, flavo-brunneis, breviter echinulatis, poris 3 vel 4 instructis; teleutosoris hypophyllis, minutis oblongis vel punctiformibus, interdum secundum lineas longas aggregatis vel rarius in lineas confluentibus, nudis, obscure castaneis; teleutosporis clavatis, apice rotundatis vel truncatis, deorsum attenuatis, ad septum modice vel vix constrictis, 33-35 \times 10-18, levibus, flavo-brunneis vel flavidulis, apice valde incrassatis, pedicello firmo, ca. 25 μ . longo, hyalino vel brunneolo suffultis.

Hab. in foliis Caricis japonicæ et ejusdem var. chlorostachydis pr. Tokio Japoniæ (S. KUSANO). — Affinis *Pucciniæ Peckii*.

218. **Puccinia Caricis-polystachyæ** Diet., Ann. Mycolog. IV (1906) 2606

p. 306. — Uredosoris hypophyllis minutis sparsis, primo tectis, deinde nudis, pulverulentis, ochraceis; uredosporis obovatis v. rarius subglobosis, 25-36 \times 20-27, dilute brunneis, echinulatis, poris 4 æquatorialibus parvis et parum conspicuis instructis; teleutosoris hypophyllis sparsis, plerumque oblongis, margine epidermide fissa cinctis vel nudis, atro-brunneis, pulvinatis, firmis; teleutosporis oblongis, apice plerumque rotundatis, basi angustatis v. rarius rotundatis, ad septum modice constrictis, 32-48 \times 17-22, episporio levi dilute brunneo, apice 5-8 μ . incrassato indutis, pedicello hyalino, sporam fere æquante vel breviori persistenti suffultis.

Hab. in foliis Caricis polystachyæ, Oaxca Mexico (E. W. D. HOLWAY).

219. **Puccinia longispora** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 135, 2607 tab. IV, fig. 31. Uredosoris hypophyllis, minutis, ellipsoideis v. elongatis, lineariter confluentibus, diu tectis, brunneo-ferrugineis; uredosporis subglobosis, breviter ellipsoideis v. obovatis, flavo-brunneis, crasse tunicatis, echinulatis, poris germinativis 3 æquatorialibus præditis, 22-30 \approx 19-22; teleutosoris atris, compactis, lineariter elongatis, bullatis, epidermide diu tectis, dein ea rupta cinctis; teleutosporis pallide flavo-brunneis v. brunneo-fuliginis, elongatis, basi angustatis, levibus, medio constrictis, 50-80 \approx 14-19, apice saturatoribus rotundatis, quandoque attenuatis, usque ad 9-12 μ . incrassatis, pedicello flavido, brevi, firmo præditis.

Hab. in foliis Caricis cæspitosæ et C. vulgaris, Victoria Australiæ.

220. **Puccinia minutissima** Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 2608 (1907) p. 587. — Uredosoris hypophyllis, sparsis, rotundatis vel subrotundatis, 0,2-0,3 mm. cr., mox nudis, castaneo-brunneis, pulverulentis; uredosporis globosis vel late ellipsoideis, parvis, 16-20 \approx 13-16, tunica castaneo-brunnea, 1-1,5 μ . cr., minute echinulata, poris germinativis 2, conspicuis, in parte superiori positis; teleutosoris hypophyllis numerosis, sparsis, rotundatis v. oblongis, 0,2-0,3 mm. lat.; 0,2-0,7 mm. long, mox nudis, pulvinatis, nigro-brunneis; teleutosporis oblongo-clavatis, 42-64 \approx 15-22 septo leniter constrictis, apice rotundatis v. obtusis, subtus angustatis, tunica obscure castaneo-brunnea, concolori, levi, basi 1-1,5 μ . cr., apice 9-13 μ ., pedicello parvo, firmo, colorato.

Hab. in foliis Caricis filiformis, Amer. bor.

221. **Puccinia Miyakei** Syd., Ann. Mycol VII (1909) pag. 168. — 2609 Uredosoris hypophyllis, sine maculis, sparsis, minutis, rotundatis, $\frac{1}{3}$ mm. diam., epidermide fissa cinctis, brunneis; uredosporis globosis, subglobosis, ellipsoideis v. ovatis, laxè echinulatis, flavo-brunneis, 20-25 \approx 18-22, episporio c. 1 $\frac{1}{2}$ μ . cr., poris germinativis 3-4 æquatorialibus instructis; teleutosoris conformibus sed atris, compactis; teleutosporis oblongis v. clavatis, apice plerumque rotundatis, valde incrassatis, usque ad 12 μ ., medio non v. vix constrictis, basi rotundatis v. etiam attenuatis, levibus, dilute brunneis, apice obscurioribus, 25-38 \approx 11-18; pedicello hyalino, apice parum colorato, usque ad 20 μ . longo.

Hab. in foliis Caricis siderostictæ, Mount Mitake, Musashi Japoniæ.

222. **Puccinia Caricis-siderostictæ** Diet. Annales Mycolog. vol. V 2610

(1907) pag. 72. St. uredosp. *Uredo Caricis-siderostictæ* P. Henn. Bot. Jahrb. (1904) p. 598. — Maculis rotundatis v. effusis, fusco-atris; uredosoris epiphyllis sparsis vel gregariis, rotundatis, 0,3 mm. diam., epidermide fissa pallida velatis; uredosporis subglobosis, ellipsoideis vel ovoideis, læte brunneis, dein subcastaneis, verrucosis, 18-24 \times 15-20; teleutosoris hypophyllis, parcius epiphyllis, mediocribus, demum nudis, nigris, pulvinatis, firmis; teleutosporis clavatis, apice pro more truncatis v. rotundatis, basi tenuatis, septo vix constrictis, 42-58 \times 15-42, castaneis, levibus, apice valde usque ad 12 μ . incrassatis; pedicello hyalino usque ad 40 μ . longo.

Hab. in foliis *Caricis siderostictæ*, in Japonia: Urami, Nikko (KUSANO), Tochigi (NAMBU), Tosa (NAKANO).

223. **Puccinia ? Garrettii** Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXII (1905) 2611 p. 41. — Uredosporis et teleutosporis normalibus nondum inventis; mesosporis in soros amphigenos, sparsis, oblongos, castaneos, leviter pulverulentos dispositis, obovatis v. globoideis, 27-35 \times 21-26, continuis, tunica atro-brunnea, tenui, 1-1,5 μ . cr., subechinulata, poris 3-4, æquatorialibus; pedicello hyalino, semi-persistenti, sporas æquante v. semiæquante.

Hab. in foliis *Caricis Hoodii*, Salt Lake City Utah Amer. bor. (A. O. GARRETT). — An *Uromyces* ?

224. **Puccinia hyalina** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) pag. 99. 2612 St. uredosp.: *Uredo hyalina* Diet. — Syll. XVII, pag. 455. — Teleutosoris hypophyllis, sparsis, pulvinatis, nudis, rotundatis v. oblongis, primo rufo-brunneis, denique obscure castaneis v. germinatione sporarum griseis; teleutosporis fusiformibus v. oblongis, apice conoideis, rarius rotundatis, ad septum paullo v. non constrictis, basi angustatis v. rotundatis, episporio levi, melleo, apice usque ad 20 μ . incrassato, 32-55 \times 13-20; pedicello usque ad 60 μ . longo, plerumque brevior.

Hab. in foliis *Caricis* specierum duarum non det., Mont. Yanaze et Tochinoki, Tosa Japoniæ (YOSHINAGA).

225. **Puccinia sikokiana** Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1904) p. 584. 2613 — Teleutosoris rotundatis, 1-1,5 mm. diam., interdum confluentibus, pulvinatis, nudis, obscure brunneis; teleutosporis oblongis v. fusiformibus, apice rotundatis v. conoideis, basi attenuatis, ad septum plus minusve constrictis, castaneis, levibus, 40-68 \times 15-25, episporio apice usque ad 18 μ . incrassato.

Hab. in foliis *Caricis sikokianæ*, Nanatsubuchi Tosa Ja-

poniæ (T. YOSHINAGA). — Inter teleutosporas inventæ sunt paucae uredosporæ, 30 \approx 28.

226. **Puccinia quadriporula** Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 2614 (1907) p. 586. — Uredosoris hypophyllis sparsis, rotundatis vel oblongis 0,4-1 mm., mox nudis, subpulverulentis, cinnamomeo-brunneis; uredosporis late ellipsoideis vel globosis, 22-26 \approx 17-21, tunica cinnamomeo-brunnea, tenui, 1,5-2 μ ., minute et æqualiter echinulata, poris 4 æquatorialibus prædita; teleutosoris hypophyllis, sparsis, rotundatis v. oblongis, 0,4-1 mm. long., mox nudis, subpulvinatis, brunneo-nigris; teleutosporis clavato-oblongis, 42-48 \approx 16-21, supra plerumque rotundatis, infra rotundatis v. angustatis, tunica castaneo-brunnea concolori, subtenui, 1-1,5 μ . apice crassiori, 9-10 μ ., levi; pedicello leniter colorato, sporâ circiter dimidio brevior.

Hab. in foliis Caricis vulgaris et *C. spectabilis* in America boreali.

227. **Puccinia Breviculmis** Dietel., Annales Mycol. vol. V (1907) 2615 p. 72. St. uredosp. *Uredo breviculmis* P. Henn. — Syll. XVII, p. 455. — Teleutosoris hypophyllis, sparsis, parvis, oblongis vel rotundatis, epidermide fissa semivelatis v. cinctis, pulvinatis, firmis, cinnamomeis; teleutosporis clavatis v. fusiformibus, rarius cuneatis, basi tenuatis, apice rotundatis, conoideis vel truncatis, septo paullo constrictis, 36-55 \approx 10-18, episporio levi melleo apice incrassato indutis; pedicello firmo, hyalino, usque ad 70 μ . longo.

Hab. in foliis Caricis breviculmis, Tokio Jap. (NAMBU).

228. **Puccinia patruelis** Arthur, Mycologia I (1909) p. 245. — Pyc- 2616 nidiis amphigenis, 0,5-1 mm., punctiformibus melleis, dein brunneis, 90-125 \approx 80-100, periphysibus 30-35 μ . l.; æcidiis aggregatis in soros 1-4 mm., pseudoperidiis hyalinis, brevibus, margine lacertatis, cellulis 18-25 μ . long., rhomboideis pariete interiore striato, externo verrucoso; acidiosporis globoideis 16-21 \approx 13-16, minutissime verrucosis; uredosoris hypophyllis, sparsis, cinnamomeo-brunneis, 0,4-0,6 mm. long.; uredosporis ellipsoideis 19-26 \approx 13-19, tunica aureo-brunnea, modice echinulata, poris binis lateralibus supra-æquatorialibus; teleutosoris hypophyllis sparsis ovatis v. oblongis, 0,3-0,8 mm. long., subnudis, atro-brunneis; teleutosporis late clavatis v. spathulatis, 32-63 \approx 15-23, apice rotundatis, deorsum tenuatis, septo leniter constrictis, atro-castaneis, basi pallidioribus; tunica, 1,5-2 μ . cr., vertice 7-13 μ . crassa, pedicello dilute colorato, sporam vix æquante.

Hab. æcid. et pycn. in foliis *Agoseridis glaucæ*, Tolland, Colo; uredo- et teleutosp. in foliis *Caricis pratensis*, Tolland Colo, Amer. bor. (E. BETHEL).

229. **Puccinia Linosyridis-Caricis** Ed. Fischer, Ured. der Schweiz (1904) 2617 pag. 275, fig. 205. — Pycnidiis amphigenis, sphæroideis; æcidiis (*Æc. Linosyridis* Lagerh., Syll. IX, pag. 324). Uredo- et teleutosporæ ut in *Pucc. Caricis*.

Hab. æcidia in foliis *Linosyridis vulgaris*, uredo- et teleutosporæ in foliis *Caricis humilis*, in Helvetia.

230. **Puccinia Fuirenæ-pubescentis** R. Maire, Bull. trim. Soc. Myc. 2618 de France, vol. XXI (1905) p. 155, cum icone. — Soris folii-cauliculis, amphigenis, sæpius hypophyllis, macula brunnea minuta insidentibus, ellipticis v. elongatis, cinnamomeo-brunneis, diu epidermide tectis, pulveraceis, uredosporis subglobosis, ellipsoideis v. piriformibus, brunneis, 26-36 \times 20-25, episporio 2,5-3 μ . cr., minute aculeolato, poris 1-2 instructis; teleutosporis paucis immixtis, clavatis v. cylindræis, episporio tenui, pallide brunneo, levi instructis, 48-65 \times 20, apice papilla hyalina incrassatis; pedicello hyalino, usque ad 13 μ . cr., plus minusve persistenti.

Hab. in foliis caulibusque *Fuirenæ pubescentis*, Ajaccio Corsicæ.

231. **Puccinia xanthopoda** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 496. — 2619 Uredosoris hypophyllis, sparsis, oblongis, ca. $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ mm. longis, diu epidermide tectis, dilute brunneis; uredosporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, aculeatis, flavo-brunneis, 21-28 \times 18-24, episporio ca. 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso; teleutosoris (paucis tantum visis) culmiculis, oblongis, pulvinatis, atro-brunneis, 2 mm. circiter longis; teleutosporis clavatis, apice rotundatis, truncatis vel acutiusculis, valde incrassatis (usque ad 14 μ .), medio constrictis, basi attenuatis, levibus, dilute brunneis, 35-50 \times 11-18; pedicello crasso, flavo, persistenti, ca. 35-50 μ . longo.

Hab. in foliis *Scleriæ spec.*, Ranikhet Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

232. **Puccinia mysorensis** Sydow et Butl., Ann. Mycol. IV (1906) 2620 p. 434. — Uredosoris hypophyllis, maculis violaceis sæpe insidentibus, minutis, rotundatis v. ellipsoideis, $\frac{1}{2}$ mm. c. longis, epidermide diu tectis, dilute brunneis; uredosporis globosis, subglobosis v. ovatis, subtiliter echinulatis, flavis, 17-26 \times 12-20, episporio tenui 1 $\frac{1}{2}$ μ . c. cr.; teleutosoris hypophyllis, rotundatis v. oblongis, minutis, subinde confluentibus, epidermide tectis, compactis, atris;

teleutosporis oblongis v. oblongo-clavatis, apice leniter incrassatis (usque ad 5 μ .), acutiusculis, obtusis v. truncatis, medio constrictis, basi sæpius attenuatis, levibus, flavo-brunneis, 30-45 \times 10-18; pedicello persistenti, brunneolo, usque ad 60 μ . longo.

Hab. in foliis culmisque *Kyllingiæ tricipitis*, Hundsor, Mysore Indiæ orientalis (E. J. BUTLER).

233. **Puccinia flavipes** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 497. — Soris 2621
 uredosporiferis amphigenis, sparsis, minutis, oblongis, usque 1 mm. longis, epidermide diu tectis, dilute brunneis; uredosporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, echinulatis, dilute brunneis, 18-25 \times 11-20, episporio ca. 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso; teleutosporis immixtis oblongis vel elongatis, apice rotundatis, truncatis vel acutis, valde incrassatis (usque ad 10 μ .), medio non v. vix constrictis, basi attenuatis, levibus, flavidis vel flavo-brunneolis, 35-55 \times 10-18; pedicello flavido, ca. 20 μ . longo.

Hab. in foliis *Fimbristylidis miliaceæ*, Yelval, Mysore Indiæ orient. (E. J. BUTLER). — Affinis *Pucc. Fimbristylidis*.

234. **Puccinia Fimbristylidis** Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII 2622
 (1906) p. 28. — Uredosoris plerumque hypophyllis v. cauliculis, oblongis, 0,5-1 mm. long., mox nudis, flavis, pulverulentis; uredosporis late ellipsoideis v. globoideis, 15-20 \times 18-23, tunica flavo-brunnea, 1,5 μ . cr., sparse et regulariter echinulato-punctata, poris 2 æquatorialibus contraposis; prædita; teleutosoris plerumque hypophyllis et cauliculis, subepidermicis, epidermide brunnea tectis, irregulariter oblongis, 0,1-0,5 mm. long. v. punctiformibus, confluentibus, soris singulis rotundatis v. subrotundatis pseudostromate copioso obscure brunneo præditis; teleutosporis oblongis 34-50 \times 16-19, ad septum leniter constrictis, apice acutis v. obtusis, sæpe basi angustatis, tunica levi, brunneo-aurata, 1-1,5 μ . cr., apice 4-9 μ . incrassato; pedicello brevissimo, colorato.

Hab. in foliis caulibusque *Fimbristylidis polymorphæ*, F. Holwayanæ, Mexico, Porto Rico, Amer. bor.

235. **Puccinia angustatoides** Stone, Bull. Torr. Bot. Club, XXXVI 2623
 (1909) p. 548, cum icone. — Uredosoris hypophyllis, minutis, linearibus, 0,5-1 mm. lat., cinnamomeo-brunneis, pulverulentis, sparsis, epidermide diu tectis; uredosporis subglobosis vel obovoideis, echinulatis, ferrugineo-brunneis, 19-22 \times 10-17, poris germinativis 2 æquatorialibus præditis; teleutosoris hypophyllis, atro-brunneis, linearibus, 0,5-1,5 mm., sparsis, epidermide tectis; teleutosporis castaneo-brunneis, inæqualibus, clavatis, 40-70 \times 15-26, medio con-

strictis, apice valde incrassatis, 5-10 μ ., obtusis v. acuminatis, pedicello persistente, brunneo, 19-40 μ . longo.

Hab. in foliis *Rhynchosporæ corniculatæ*, Auburn Alabama Amer. bor.

236. **Puccinia Kusanoi** Diet. — Syll. XVI, p. 309. — var. **azuma** 2624
Kusano, Bull. Agricult. College Univers. Tokyo VIII (1908) p. 8, tab. VI, fig. 6, 12, 15. — A typo differt teleutosporis magis elongatis, 55-87 \approx 12-20, medio non v. minus constrictis.

Hab. in foliis *Sasæ ramosæ* ex *Bambusaceis*, in Japonia.

237. **Puccinia Sasæ** Kusano, Bull. Agricult. College Univers. Tokyo 2625
VIII (1908) p. 8, tab. VI, fig. 7-9. — Uredosoris hypophyllis, sparsis, pulverulentis, ferrugineis; paraphysibus hyalinis, apice incrassatis; uredosporis globosis v. subglobosis, 32-35 μ . cr., episporio tenui, brunneo, verruculoso-echinulatis, poris germinativis 5 æquatorialibus præditis; teleutosoris hypophyllis, sparsis, prominentibus, rotundatis, compactis; teleutosporis oblongis, apice rotundatis, non v. parum incrassatis, basi attenuatis, medio constrictis, verruculosis, brunneis, 37-80 \approx 14-20.

Hab. in foliis *Sasæ borealis*, Nikko Japoniæ (T. MAKINO).

238. **Puccinia mitriformis** S. Ito. Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. 2626
Univ. III (1909) p. 233, tab. XII, fig. 6. — Teleutosoris hypophyllis, majusculis, rotundatis, sparsis v. subgregariis, non confluentibus, nudatis, pulvinatis, prominentibus, compactis, crassis, fumoso-nigris v. brunneo nigris; teleutosporis oblongo-clavatis v. fusoides, apice maxime elongato-conicis (36-84 subinde usque ad 90 μ . long.) subacutis, basi subattenuatis ad septum non vel vix constrictis levibus, late flavo-aurantiis v. albo-flavidis, hyalinis v. summo apice pallidioribus, 80-130 \approx 18-23; pedicello hyalino, tenui, longissimo 100-240 v. quandoque usque ad 280 μ . longo, angusto, subdeciduo; mesosporis frequenter immixtis.

Hab. in folii *Sasæ paniculatæ*, in Japonia.

239. **Puccinia melanocephala** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 500. — 2627
Uredosoris amphigenis, maculis elongatis striiformibus ferrugineis insidentibus, sparsis, minutissimis, punctiformibus, ferrugineis; uredosporis subglobosis, ovatis vel piriformibus, aculeatis, brunneis, 22-40 \approx 18-25, episporio ca. 2 μ . crasso; paraphysibus numerosissimis, dilute flavis, apice capitato-incrassatis; teleutosoris conformibus, atris; teleutosporis clavatis, apice rotundatis, incrassatis (4-6 μ .), medio plerumque leniter constrictis, basi attenuatis, levibus, 35-45 \approx 14-20, brunneis, ad incrassationem obscurioribus, atro-

brunneis, paraphysibus immixtis; pedicello persistenti, crasso, flavo-brunneo, brevi, usque ad 15 μ . longo.

Hab. in foliis *Arundinariæ* spec., Wahjain, Khasi Hills Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

240. **Puccinia Phyllostachydis** Kusano, Bull. Agricult. College Uni- 2628
vers. Tokyo VIII (1908) p. 2, tab. VI, fig. 1-2, 10-11. — Uredosoris hypophyllis, sparsis, mox nudis, pulveraceis, ferrugineis; paraphysibus hyalinis, apice capitatis et tunica incrassata præditis; uredosporis 30-33 \times 23-25, episporio brunneo, verruculoso-echinulato, poris germinativis 4 raro 5 æquatorialibus præditis; teleutosoris hypophyllis, sparsis, prominentibus, rotundatis, compactis, 0,5 mm. cr., atro-brunneis v. nigris; teleutosporis oblongis, apice rotundatis, basi attenuatis, medio constrictis, apice non v. fere indistincte incrassatis, punctulatis, brunneis, 45-70 \times 15-20; pedicello persistenti, tenui, hyalino 150 μ . longo et ultra donatis.

Hab. in foliis *Phyllostachydis bambusoidis*, in Japonia. — *Pucc. Arundinariæ* Schw. affinis.

241. **Puccinia xanthosperma** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 437. — 2629
Teleutosoris hypophyllis, maculis flavidis demum griseolis insidentibus, sparsis vel seriatim dispositis, rotundatis, prominulis, minutis, ca. $\frac{1}{2}$ mm. diam., firmis, ferrugineo-brunneis; teleutosporis fusiformibus vel oblongo-clavatis, brevioribus plerumque utrinque plus minusve rotundatis, longioribus autem utrinque attenuatis, apice valde incrassatis (usque ad 10 μ .), medio vix v. parum constrictis, levibus, flavis, 42-58 \times 16-25; pedicello hyalino, persistenti, crassiusculo, usque ad 75 μ . longo.

Hab. in foliis *Bambusæ* spec., Mussoorie Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

242. **Puccinia invenusta** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 498. — Ure- 2630
dosoris amphigenis, præsertim hypophyllis, sparsis vel seriatim dispositis, oblongis, minutis, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ mm. longis, epidermide diutius tectis, flavo-brunneolis; uredosporis ovatis, ellipsoideis vel piriformibus, minute verruculosis, hyalino-flavidulis, 18-32 \times 12-18, episporio 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso, paraphysibus hyalinis clavatis apice sæpe capitatis immixtis; teleutosoris conformibus, atris; teleutosporis oblongis subinde clavatis, apice rotundatis v. attenuatis, parum incrassatis (usque ad 5 μ .), medio non vel leniter constrictis, basi attenuatis, levibus, brunneis, 26-40 \times 14-20; pedicello crasso, persistenti, brunneo, usque ad 60 μ . longo.

Hab. in foliis *Phragmitis Karkæ*, Pusa Indiæ orient. (E.

J. BUTLER). — Ab affini *Pucc. Magnusiana* soris minoribus, uredosporis subhyalinis etc. dignoscenda.

243. **Puccinia moriokaensis** S. Ito, Journ. Coll. of Agric. Tohoku 2631 Imper. Univ. III (1909) p. 224, tab. XII, fig. 1. — Teleutosoris amphigenis plerumque hypophyllis, mediocribus, oblongis v. sub-linearibus, sparsis v. gregariis, sæpe confluentibus, 2,5 mm. long., nudatis, pulvinatis, compactis, crassis, prominentibus, nigris; teleutosporis fusiformibus v. oblongo-clavatis, apice apiculatis, rarius truncatis v. rotundatis, incrassatis (6-12 μ .), basi tenuatis, ad septum non v. vix constrictis, levibus, castaneo-brunneis, apice saturatioribus, 44-70 \times 12-18, pedicellis persistentibus exilibus, prælongis, 80-100, sæpe usque ad 120 μ . long., hyalinis v. dilute flavido-brunneis.

Hab. in foliis *Phragmitis communis*, in Japonia. — *P. Magnusianæ* subaffinis.

244. **Puccinia okatamaensis** S. Ito, Journ. Coll. of Agric. Tohoku 2632 Imper. Univ. III (1909) p. 226, tab. XII, fig. 2. — Teleutosoris vagini-culmicolis, mediocribus v. majusculis, oblongis vel linearibus, sæpe confluentibus, gregariis, subinde 1,5 cm. long., nudatis, compactis, crassis, prominentibus, pulvinatis v. immersis, nigris; teleutosporis oblongis v. oblongo-fusoideis, apice incrassatis (7-10 μ .) apiculatis v. raro rotundatis, basi tenuatis, plus minus ad septum constrictis, levibus, cinnamomeis, 50-78 \times 11-20, episporio crassiusculo; pedicellis læte flavido-brunneis, conspicuis, crassis, persistentibus, 94 μ . long.

Hab. in vaginis culmisque *Phragmitis communis*, in Japonia. — A ceteris speciebus phragmiticolis sat diversa.

245. **Puccinia Epigeios** S. Ito, Journ. Coll. of Agric. Tohoku Im- 2633 per. Univ. III (1909) n. 2, p. 192, tab. X, fig. 8. — Uredosoris epiphyllis subinde hypophyllis, minutis, oblongis vel linearibus, sparsis v. gregariis in maculis decoloratis sitis, interdum confluentibus, epidermide laxa tectis v. nudatis, pulveraceis, aurantiis; uredosporis ellipsoideis, ovatis v. globosis, echinulatis, 24-36 \times 20-25, episporio tenui, flavido-brunneo v. hyalino; paraphysibus numerosis capitatis v. clavatis, hyalinis v. subhyalinis; teleutosoris epiphyllis rarius hypophyllis, interdum vaginicolis, anguste oblongis v. linearibus, sparsis v. gregariis, sæpe confluentibus et tunc 4 mm. long. et in vaginis usque ad 1,5 cm. long., nudis, pulvinatis, compactis, conspicuis, nigris; teleutosporis cylindricis, elongato-clavatis, apice (4-6 μ .) incrassatis, processibus corniformibus obtu-

sis ornatis, basi tenuatis, ad septum non v. vix constrictis, levibus, ferrugineis v. castaneis, apice saturatoribus, 36-92 \approx 14-20, episporio tenui; pedicellis brevissimis, brunneis, persistentibus.

Hab. in foliis vaginisque Calamagrostidis Epigeios var. densifloræ, in Japonia — *Pucc. coronatæ* subaffinis.

246. **Puccinia brevicornis** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. 2634 Univ. III (1909) n. 2, p. 191, tab. X, fig. 7. — Uredosoris amphigenis, plerumque hypophyllis; parvis, oblongis v. sublinearibus, in maculis flavidis decoloratis insidentibus, gregariis, sparsis v. lineariter dispositis, raro confluentibus, epidermide rupta cinctis, pulveraceis, aurantiacis; uredosporis ellipsoideis, globosis v. obovatis, echinulatis, 14-21 \approx 12-16, episporio crassiusculo, hyalinis v. subflavidis, paraphysibus interdum præsentibus, paucis, hyalinis, clavatis v. capitatis; teleutosoris hypophyllis raro epiphyllis, minutis, oblongis v. sublinearibus, dense sparsis, sæpe confluentibus, epidermide laxa tectis v. demum nudis, pulvinatis, compactis, conspicuis, nigris; teleutosporis cylindræis, oblongo-clavatis, apice (6-8 μ .) incrassatis, truncatis, processibus obtuse corniformibus brevibus præditis v. leviter undulatis, basi attenuatis ad septum non v. vix constrictis, levibus, castaneis apice saturatoribus, 40-74 \approx 12-24, episporio sat tenui; pedicello brevissimo, brunneo, persistente.

Hab. in foliis Calamagrostidis villosæ et C. canadensis, in Japonia.

247. **Puccinia Ishikawai** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. 2635 Univ. III (1909) p. 210, tav. XI, fig. 5. — Uredosoris amphigenis, minutis, oblongis, sparsis, in maculis brunneolis insidentibus, plerumque lineariter dispositis, quandoque confluentibus, nudis v. epidermide laxa tectis, subpulvinatis, aurantiacis; uredosporis globosis v. subglobosis raro late ellipsoideis, tenuiter echinulatis, 22-32 \approx 20-28, episporio hyalino v. flavido, paraphysibus copiosis, clavatis, crasse tunicatis, hyalinis, 40-80 \approx 11-16; teleutosoris hypophyllis, exiguis, oblongis v. linearibus, sparsis v. subgregariis, seriatis, interdum confluentibus, diu epidermide tectis, pulvinatis, griseis v. nigricantibus; teleutosporis clavatis, oblongo-clavatis v. cuneatis, apice truncatis, oblique acutatis v. undulatis, incrassatis (4-6 μ .), basi plerumque tenuatis, ad septum non v. vix constrictis, ferrugineis v. late brunneis, apice saturatoribus, 28-48 \approx 12-20, raro 22 μ . cr., episporio tenui; pedicellis brevibus, brunneis, subdeciduis.

Hab. in foliis Calamagrostidis Epigeios var. densifloræ in Japonia. — *Pucc. pygmææ* subaffinis.

248. **Puccinia pertenuis** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. Univ. III (1909) n. 2, p. 193, tab. X, fig. 9. — Teleutosoris hypophyllis raro epiphyllis, minutis, oblongis vel linearibus, dense sparsis in areis decoloratis, subinde confluentibus, nudatis v. epidermide laxa tectis, pulvinatis, compactis, conspicuis, nigris; uredosporis commixtis, ellipsoideis v. globosis, echinulatis, 16-24 \times 16-18, episporio tenui, læte flavido, paraphysibus brevibus obovato-clavatis, læte brunneis, 30-55 \times 20-26; teleutosporis cylindræis linearibus v. oblongis, clavatis, apice incrassatis, processibus numerosis obtusis breviusculis coronatis, basi tenuatis, ad septum leniter constrictis ferrugineis, apice saturatoribus, 40-72 \times 10-16, episporio tenuissimo; pedicellis brunneis, brevibus, subdeciduis.

Hab. in foliis Calamagrostidis arundinacæ var. nipponicæ, in Japonia. — *Pucc. coronatæ* et *P. Epigeios* subaffinis.

249. **Puccinia rangiferina** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. Univ. III (1909) n. 2, p. 194, tab. X, fig. 12. — Teleutosoris hypophyllis v. vaginicolis, minutis v. mediocribus, oblongis v. linearibus, sparsis v. gregariis, sæpe confluentibus epidermide rupta nudatis pulvinatis compactis conspicuis, nigris; teleutosporis cylindræis v. oblongo-clavatis apice incrassatis, processibus 2-9 elongatis interdum ramosis divergentibus, usque ad 31 μ . long. coronatis, basi tenuatis, non v. vix ad septum constrictis, levibus ferrugineis, apice saturatoribus, 71-102 \times 11-21, episporio tenui, pedicellis brevissimis subdeciduis.

Hab. in foliis vaginisque Calamagrostidis arundinacæ var. sciuroidis, in Japonia. — Corniculis longis et ramosis prædistincta species.

250. **Puccinia stichosora** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 100. — Soris amphigenis, præcipue hypophyllis, minutis, seriatim dispositis v. linearibus; uredosporis ellipsoideis v. piriformibus, rarius globosis, brunneis, echinulatis, 23-33 \times 17-25, paraphysibus capitatis dilute flavidulis intermixtis; teleutosporis ellipsoideis vel obovatis, haud raro obliquis, utrinque rotundatis v. basi angustatis, septo levissime constrictis, episporio æquali levi castaneo indutis, 28-38 \times 20-25; pedicello firmo, usque ad 40 μ . longo, fuscescenti.

Hab. in foliis Calamagrostidis sciuroidis, Tokyo Japoniæ (NAMBU).

251. **Puccinia Daniloï** Bubák, Ann. Mycol. III (1905) pag. 219. — *Syll. fung.* XXI (1-1912)

Maculis minutis, rubentibus, amphigenis; uredosoris cinnamomeo-castaneis, pulvereis; uredosporis globoso-piriformibus v. ellipsoideis 24-33 \approx 20-26, membrana concolori 3-4,5 μ . cr., minute crebreque verruculosa; poris 2, raro 3; pedicellis longis hyalinis, deciduis; teleutosoris nigris, pulvinatis, compactis; teleutosporis ellipsoideo-oblongis v. subclavatis, 33-55 \approx 20-26, cellula inferiori sæpius angustiore, apice rotundatis v. tenuatis, septo constrictis, castaneis, levibus, apice usque ad 13 μ . incrassatis, pallidioribus; pedicello ex hyalino flavido-brunneolo, ad 80 μ . longo, deciduo.

Hab. in foliis Erianthi Hostii Gris. (= Saccharum strictum Spr.) prope Danilovgrad Montenegro. — *Pucc. Cesatii* subaffinis.

252. **Puccinia Stipæ-sibiricæ** S. Ito, Journ. Coll. of Agric. Tohoku 2640 Imper. Univ. III (1909) p. 228, tab. XII, fig. 5. — Teleutosoris amphigenis sed sæpius epiphyllis, minutis, oblongis v. rotundatis, dense sparsis, seriatis, subinde confluentibus, nudatis, pulvinatis, conspicuis, brunneo-nigris; uredosporis sæpe commixtis, e globoso ellipsoideis, dense echinulatis, 16-22 \approx 15-18, episporio crasso (circ. 2 μ .), flavidis v. brunneolis, poris germinativis 4 sparsis; teleutosporis clavatis v. oblongo-clavatis, apice acute conicis v. rotundatis, incrassatis (6-12 μ .) rarius non incrassatis, ad septum plus minus distincte constrictis, castaneo-brunneis, apice dilutioribus, 30-58 \approx 16-22; pedicellis hyalinis v. subhyalinis, sporam æquantibus v. usque ad 80 μ . long., persistentibus; mesosporis subinde commixtis.

Hab. in foliis Stipæ sibiricæ, in Japonia. — *Pucc. Stipæ* subaffinis.

253. **Puccinia volgensis** Nawasch., Uebers. Leist. Bot. Russl. 1892 2641 St. Petersb. (1894) p. 146, f. 553. — Teleutosoris sparsis v. seriatim dispositis, oblongis, v. linearibus, usque ad 6 mm. long., epidermide lacerata cinctis, pulveraceis, obscure brunneis; teleutosporis late ellipsoideis, utrinque rotundatis, apice non incrassatis, medio non constrictis, levibus, ex hyalino melleis, tandem dilute brunneis, 35-58 \approx 30-45, episporio usque ad 12 μ . incrassato; pedicello hyalino, brevi, interdum laterali mesosporis globosis vel subglobosis, 30-36 μ . diam.

Hab. in foliis vivis Stipæ pennatæ pr. Saratow (NAWASCHIN), Stipæ barbatae in regione Transcaspica Rossicæ.

254. **Puccinia Arundinellæ** Barcl. — Syll. IX, p. 203 — Sydow et 2642 Butler, Ann. Mycol. V (1907) p. 498.

Hab. in foliis *Arundinellæ Wallicnii*, Wahjain, Assam et *A. brasiliensis*, Dehra Dun in Indiæ orient. (E. J. BUTLER). — Uredosporæ a cl. Barclay non descriptæ, sunt globosæ v. ellipsoideæ, flavido-brunneæ, aculeolis obtusis conspersæ, 18-26 \times 16-20. Teleutosporarum pedicelli (serius?) flavi.

255. **Puccinia Arundinellæ-anomalæ** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII 2643 (1905) p. 100. — Soris amphigenis; uredosoris oblongis, minutis, epidermide pallescente diu tectis; uredosporis oblongis, ovoideis v. ellipsoideis, 27-38 \times 18-26, episporio crasso, minute verrucoso, hyalino, poris numerosis parum distinctis instructo, contentu aurantiaco; paraphysibus nullis; teleutosoris oblongis v. linearibus, pulvinatis, nudis v. epidermide fissa cinctis, atro-fuscis; teleutosporis clavatis vel oblongis, utrinque rotundatis vel sæpius basi attenuatis, ad septum modice constrictis, episporio tenui, apice 5 μ . incrassato, levi, castaneo vestitis, 33-60 \times 18-24; pedicello hyalino, usque ad 85 μ . longo, persistenti suffultis.

Hab. in foliis *Arundinellæ anomalæ*, Tokyo Japoniæ (KUSANO).

256. **Puccinia Nakanishikii** Diet., in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV 2644 (1904) p. 585. — Uredosoris in maculis superne purpureis v. rubiginosis hypophyllis, linearibus, nudis, pulverulentis, castaneis; uredosporis ellipsoideis v. obovatis, castaneis, echinulatis, poris quatuor æquatorialibus instructis, 28-40 \times 21-26, paraphysibus capitatis brunneis, numerosis intermixtis; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis v. basi cuneatis, medio vix constrictis, castaneis, levibus, 30-37 \times 21-23, apice mediocriter, 3-7 μ ., incrassatis, pedicello brunneo suffultis.

Hab. in foliis *Andropogonis Nardi* var. *Gœringii*, Mont. Washio Tosa Japoniæ (K. NAKANISHIKI).

257. **Puccinia posadensis** Sacc. et Trott. *Puccinia andropogonicola* 2645 Speg., An. Mus. Nac. B. Aires t. XIX (1909 Dec.) p. 299, non Har. et Pat. — Maculis vix manifestis, indeterminatis, subpurpurascentibus; soris anguste linearibus 1-5 mm. long., 0,25-0,40 mm. cr., hinc inde laxè gregariis v. seriatis, primo omnino innatis, serius suberumpenti-prominulis sed plus minusve epidermide sublevata v. fissa tectis, subsclerotiaceis; teleutosporis antice crassissime tunicatis, rectis v. oblique subtruncatis, medio non v. rarius leniter constrictis, deorsum cuneatis, 40-50 \times 15-20, loculis subæqualibus non v. grosse uninucleatis, pedicello infuscato crassoque 5-10 \times 5-8, fultis.

Hab. in foliis, culmis vaginisque *Andropogonis condensati*, in pratis circa Posados Misiones Amer. austr.

258. **Puccinia andropogonicola** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris (1909 Majo) n. 2, p. 198. — Maculis amphigenis, fuscis, elongatis; uredosoris linearibus, pulverulentis, cinnamomeis, epidermide circumdatis, vix 1 mm. long.; uredosporis globoso-ellipsoideis, castaneis, echinulatis, $28 \approx 16-24$; paraphysibus numerosis, clavatis, sursum rotundatis, dilute castaneis, $40-50 \approx 16-20$, apice usque ad 8 μ . incrassatis; teleutosoris atris, compactis, $\frac{1}{3}$ mm. latis, sæpius approximatis et in lineas usque ad 1 cm. longas confluentibus, aparaphysatis; teleutosporis brunneis, vix constrictis, superne rotundatis v. obtuse mucronatis incrassatisque (usque ad 12 μ .), $40-50 \approx 24-28$, pedicello hyalino usque ad 150 μ . longo, æqualiter crasso (6-8 μ .) persistenti.

Hab. in foliis *Andropogonis*, Oubangui, Kaga Balidja, Congo Africae trop. — A *P. erythræensi* colore et pedicellis longissimis diversa.

259. **Puccinia Andropogonis-micranthi** Diet., Ann. Mycol. VII (1909) pag. 354, ex err. «*macranthi*». Cfr. Diet. Ann. Myc. VIII (1910) p. 307. — Uredosoris hypophyllis minimis punctiformibus v. oblongis, sparsis v. seriatim dispositis, epidermide fissa cinctis, cinnamomeis; uredosporis obovatis v. subglobosis, $23-30 \approx 19-25$, brunneis, echinulatis, paraphysibus numerosis capitatis hyalinis v. rarius apice dilute brunneolis, validis immixtis; teleutosporis intermixtis ellipsoideis utrinque rotundatis, medio non v. vix constrictis, episporio levi castaneo, apice non incrassato indutis, $25-35 \approx 20-25$, pedicello sporam fere æquante, hyalino, interdum oblique inserto instructis.

Hab. in foliis *Andropogonis micranthi* Khth. var. genuini Hack., Enichi-ji, Tosa Japonia (T. YOSHINAGA).

260. **Puccinia propinqua** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 499. — Uredosoris hypophyllis, sparsis vel seriatim dispositis, oblongis vel elongatis, usque ad 1 mm. longis, epidermide diutius tectis, flavo-brunneis; uredosporis globosis, subglobosis vel ovatis, subtiliter denseque verruculosis, dilute brunneis, 20-24 μ . diam., episporio, ca. 3-3 $\frac{1}{2}$ μ . crasso; teleutosoris conformibus, atro-brunneis; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, apice incrassatis (usque ad 7 μ .), medio leniter constrictis, levibus, brunneis, $26-35 \approx 20-25$; pedicello brevi; mesosporis subinde numerosis.

Hab. in foliis *Andropogonis spec.*, Ranikhet Indiae orient.

(E. J. BUTLER). — Affinis *Pucc. Cesatii* a qua uredosporis minoribus distinguitur.

261. **Puccinia prunicolor** Syd. et Butl., Ann. Myc. IV (1906) p. 435. 2649

— Soris teleutosporiferis hypophyllis, maculis purpureis v. atropurpureis insidentibus, seriatim ordinatis, interdum confluentibus, ellipticis, $\frac{1}{2}$ -1 mm. longis, primo tectis, dein epidermidem dirumpentibus; uredosporis immixtis obovatis vel subglobosis, breviter echinulatis, flavo-brunneis, 30-38 \approx 23-30; teleutosporis ellipsoideo-oblongis, utrinque rotundatis, apice vix vel parum incrassatis, medio parum constrictis, levibus, brunneis, 40-45 \approx 23-31, episporio 3-4 μ . crasso; pedicello persistenti, brunneo, crassiusculo, usque ad 100 μ . longo; paraphysibus congestis clavatis rubescentibus immixtis.

Hab. in foliis vaginisque *Andropogonis serrati*, Dehra Dun Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

262. **Puccinia pusilla** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 435. — Te- 2650

leutosoris hypophyllis, maculis indeterminatis flavis vel brunneolis insidentibus, sparsis, minutissimis, rotundatis, punctiformibus, non confluentibus, atris; uredosporis immixtis (non multis visis) ovatis, echinulatis, flavo-brunneolis, 17-23 \approx 14-18, episporio tenui; teleutosporis ellipsoideo-oblongis v. oblongis, utrinque rotundatis, apice vix incrassatis (2-3 μ), medio vix vel leniter constrictis, levibus, brunneis, 26-36 \approx 18-24, episporio ca. 2 μ . crasso; pedicello hyalino vel flavido, usque ad 50 μ . longo; paraphysibus numerosis, capitatis, hyalinis.

Hab. in foliis *Andropogonis assimilis*, Dehra Dun Indiæ orient. (E. J. BUTLER). — *Pucc. Duthicæ* Ell. et Tr., proxima differt soris et sporis minoribus, paraphysibus achrois.

263. **Puccinia Polliniæ-quadrinervis** Diet., Ann. Mycol. VII (1909) 2651

pag. 355. — Soris hypophyllis oblongis sparsis v. confluentibus, uredosoris cinnamomeis, teleutosoris obscure castaneis vel nigris; uredosporis globosis, 28-33 μ . diam., flavo-brunneis, dense verrucosis, poris numerosis instructis, paraphysibus non intermixtis; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis v. rarius basi attenuatis, ad septum paullo constrictis, episporio castaneo levi apice modice (vix ultra 6 μ .) incrassato indutis, 28-38 \approx 23-27, pedicello firmo hyalino usque ad 55 μ . longo suffultis, mesosporis unilocularibus obovatis v. globosis haud raris.

Hab. in foliis *Polliniæ quadrinervis*, Mt. Kiyotaki Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA).

264. *Puccinia æstivalis* Diet., Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1905) p. 585. 2652

— Soris in maculis flavis, rubiginosis v. purpureis hypophyllis, punctiformibus, dense gregariis, cinnamomeis v. castaneis; uredosporis globosis v. obovatis, 20-28 \approx 16-24, fuscis, episporio tenui echinulato, poris æquatorialibus 4-6; paraphysibus numerosis, capitatis v. clavatis dilute brunneis intermixtis; teleutosporis clavatis v. fusoides, apice plerumque rotundatis, basi tenuatis, dilute brunneolis, levibus, pedicello mediocri suffultis, 33-36 \approx 11-16, statim germinantibus.

Hab. in foliis *Polliniæ nudæ*, Tokio Japoniæ (N. NAMBU).

— Affinis sed distinguenda a *P. Polliniæ* Barcl.

265. *Puccinia erythropus* Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 101. 2653

— Maculis purpureis; soris epiphyllis, oblongis v. linearibus nudis, teleutosoris atris, firmis; uredosporis late ellipsoideis vel obovatis, 23-28 \approx 18-23, episporio brunneo, echinulato, apice plerumque incrassato, usque ad 9 μ ., poris æquatorialibus perforato; teleutosporis oblongis utrinque rotundatis, ad septum modice constrictis, 28-45 \approx 16-21, levibus, castaneis, apice vix ultra 4 μ . incrassatis, pedicello firmo usque ad 120 μ . longo, purpureo v. hyalino suffultis.

Hab. in foliis *Miscanthi sinensis*, Omaji-mura Tosa Japoniæ (YOSHINAGA). — Color purpureus, vere singularis, pedicelli, qui labilis est, forte non proprius fungi sed ex ipsa causa chemica pendet, quæ maculas foliorum purpureas gignit.

266. *Puccinia cognatella* Bub. Ann. Mycol. VII (1909) p. 378, cum 2654

fig. 1-11. — Uredosoris epiphyllis, in maculis elongatis flavis sparsis vel paucis confertis, elliptico-oblongis, 0,2-0,5 mm. long., flavis, mox nudatis; uredosporis globosis v. ovoideis, 19-29 \approx 17-21, membrana crassiuscula, verruculosa; paraphysibus nonnullis capitatis crasse tunicatis intermixtis; teleutosoris hypophyllis v. vaginicolis, breve lineatis, ad 1 mm. longis, subinde longe confluentibus, diu tectis, atro-brunneis; teleutosporis uni- v. bicellularibus; bicellularibus valde variis, oblongo-clavatis v. subtriangularibus v. cuneatis, membrana apice usque ad 4-9 μ . incrassata, ad septum subconstrictis, cellula superiori 19-30 \approx 19-25, inferiori 26-32 \approx 15-19 pallidiore; pedicello e flavido brunneo, ad 9 μ . longo; teleutosporis 1-cellularibus, 31-57 \approx 17-25, subtriangularibus, apice truncatis; pedicello brevissimo.

Hab. in foliis vaginisque *Poæ nemoralis* var. *umbrosæ* pr. Dobruska Bohemiæ.

267. **Puccinia cinerea** Arth., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) 2655 p. 583. — Uredosoris hypophyllis, sparsis, oblongis, parvis, 0,1-0,3 mm. lat., 0,5-1,5 mm. long., diu tectis, pulverulentis, flavo-aurantiacis, epidermide rupta cinctis; uredosporis late ellipsoideis, 23-29 \approx 18-23, tunica pallide brunnea, 1,5 μ . c. cr., minute et inconspicue echinulata, poris germinativis 5-6 sparsis; teleutosoris amphigenis, sparsis, oblongis, parvis 0,1-0,2 mm. lat., 0,5-1 mm. long., diu epidermide tectis, cinereis, stromate tenui circumdatis; teleutosporis oblongis v. oblongo-clavatis, mutua pressione irregularibus, 40-60 \approx 16-21, tunica obscure cinnamomeo-brunnea, 1-1,5 μ . cr., apice crassiore, 3-5 μ ., levibus; pedicello brevi, colorato.

Hab. in foliis *Poæ nevadensis* et *Poæ aridæ* in Amer. bor. — *Pucc. Poarum* Nielsen affinis.

268. **Puccinia Poæ-trivialis** Bubák, Ann. Mycol. III (1905) p. 220. — 2656 Uredosoris epiphyllis, sparsis, subrotundis v. oblongis, mox nudis, flavis, pulveraceis; uredosporis e globoso ellipsoideis 20-28 \approx 17-21, membrana aculeata, contentu aurantiaco; teleutosoris hypophyllis ellipticis v. oblongis subcircinantibus, diu tectis, nigris; teleutosporis in greges minutos paraphysibus brunneis circumvallatos dispositis, clavatis, oblongis v. fusoides, apice obtusis, deorsum pro more in stipitem sensim tenuatis, medio raro constrictis, 35-38 \approx 15-24, membrana levi, brunnea apice saturatiore et ad 4,5-11 μ . incrassata; pedicello brunneolo, brevi, non deciduo.

Hab. in foliis *Poæ trivialis*, Welwarn Bohemiæ.

269. **Puccinia Tripsaci** Diet. et Holw., Bot. Gaz. XXIV (1897) p. 27, 2657 Syd. Mon. Ured. I, p. 822, fig. 556. — Uredosoris amphigenis, plerumque hypophyllis, maculis flavidis pro more insidentibus, sparsis v. subinde confluentibus, oblongis v. linearibus, 1-3 mm. long., epidermide diu tectis, dein ea fissa cinctis, cinnamomeis; uredosporis globosis v. subglobosis, dense aculeatis, brunneis, 30-37 \approx 28-33, episporio crasso, 4 μ ., poris 4; teleutosoris conformibus obscure brunneis; teleutosporis ellipsoideis v. oblongo-ellipsoideis, apice plerumque rotundatis, leniter incrassatis usque ad 6,5 μ ., medio non v. vix constrictis, basi rotundatis, levibus, brunneis, 33-41 \approx 20-25, episporio crassiusculo; pedicello brunneolo, persistenti, crasso, usque ad 50 μ . longo.

Hab. in foliis vivis *Tripsaci dactyloidis*, in Mexico. —

A *Pucc. polysora* Underw. facile distinguenda.

270. **Puccinia Pattersoniæ** Syd., Monogr. Uredin. I, p. 820, fig. 555. 2658 — Teleutosoris amphigenis v. sæpe vaginicolis, sparsis v. seriatim

dispositis, oblongis v. linearibus, 1,5-3 mm. long., confluenso usque ad 1-1,5 cm. long., epidermide fissa cinctis, atris; teleutosporis oblongis v. oblongo-clavatis, apice rotundatis v. acutiusculis, rarius truncatis valde, usque ad 7-12 μ . incrassatis, medio constrictis, basi tenuatis, levibus, brunneis, 35-62 \approx 14-22; pedicello brunneolo, crasso, persistenti, usque ad 100 μ . longo.

Hab. in foliis vaginisque *Tripsaci dactyloidis*, Manhattan, Kansas Amer. bor. (FLORA W. PATTERSON). — A *Puccinia Tripsaci* et *P. polysora* rite distinguenda.

271. **Puccinia Spicæ-venti** F. Bucholtz, Die Pucciniaart. Ostseeprovinz 2659
Russlands, Dorp. (1905) p. 19. — Uredosoris hypophyllis, sparsis, ellipticis, flavo-brunneis; uredosporis ellipsoideis, verruculosis, flavis, 26-35 \approx 23-26, plerumque 29 \approx 23; paraphysibus multis claviformibus, apice capitatis, ad 17 μ . lat., intermixtis; teleutosoris sparsis minutis, mox nudis, atris; teleutosporis irregularibus, subclavatis, apice truncatis, vix incrassatis sed obscurioribus, levibus, medio leniter constrictis, basi plerumque in pedicellum attenuatis, 43-53 \approx 11-17.

Hab. in foliis *Aperæ Spicæ-venti*, Peterhof Rossia (A. BONDARZEW).

272. **Puccinia Moyanoi** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2660
(1909) p. 299. — Soris folio vix pallescente insidentibus pusillis 0,25-1 mm. long., 0,25-0,30 mm. lat., laxè seriatis v. subsparsis, erumpentibus, epidermide rimose hiante cinctis, pallide ferrugineis, non compactis, non vel vix prominulis, ægre perspicendis; uredosporis globosis v. ovoideis 24-26 μ . diam., episporio fulvello levi subtenui vestitis, endoplasmate non v. vix nubiloso farctis; teleutosporis ex elliptico subobovatis 40 \approx 20; loculis subæquilongis, episporio antice incrassato vestitis, sursum rotundatis deorsum vix cuneatis, medio constrictulis, fulvellis; pedicello fulvello 30-35 \approx 7-8; mesosporis quandoque immixtis.

Hab. in foliis vivis *Agrostidis Moyanoi* prope Lago San Martin, Patagonia, Amer. austr.

273. **Puccinia perminuta** Arth., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) 2661
p. 584. — Uredosoris amphigenis v. epiphyllis et cauliculis, sparsis, ovoideis, parvis, 0,1-0,3 mm. long., diu tectis, pallide flavis, pulveraceis; uredosporis globoideis v. late ellipsoideis, 15-18 \approx 16-22, tunica pallide flava, tenui, usque ad 1 μ . cr., echinualata, poris germinativis circ. 6, sparsis, inconspicuis; teleutosoris amphigenis v. epiphyllis et cauliculis, ovatis, parvis, 0,1-0,3 mm. long.,

sæpe confluentibus, epidermide tectis, nigrescentibus; stromate plerumque nullo; teleutosporis oblongis, 25-39 \approx 12-16, septo non v. leniter constrictis, utrinque obtusatis, tunica castaneo-brunnea, levi, tenui, 1-1,5 μ ., apice incrassata usque ad 5-10 μ ., concolori; pedicello brevissimo, colorato.

Hab. in foliis culmisque Agrostidis hiemalis et A. perennantis, Amer. bor. — A *Pucc. Agrostidis* Plowr. diversa.

274. **Puccinia prægracilis** Arth., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) 2662 p. 585. — Uredosoris amphigenis, sparsis, oblongis, flavis, 0,1-0,2 mm. lat., 0,2-0,3 mm. long., mox nudis, pallide flavis, pulverulentis; uredosporis late ovoideis, 16-19 \approx 18-21, tunica crassiuscula, 1 μ ., pallide flava, minute et crebre echinulata, poris circ. 6 sparsis, inconspicuis; teleutosoris, oblongis v. linearibus 0,1-0,3 mm. lat., 0,3-1 mm. long., irregulariter confluentibus, epidermide tectis, purpureo-nigris; stromate nullo; teleutosporis oblongis vel lineari-oblongis 30-40 \approx 12-13, ad septum non v. leniter constrictis, utrinque obtusis v. truncatis, apice appendicibus tuberculiformibus coronatis, tunica brunneo-aurata, levi, tenui, 1 μ ., supra crassiore usque ad 2-4 μ ., appendicibus exclusis, obscuriore; pedicello lato, brevissimo, concolori.

Hab. in foliis Agrostidis Thurberianæ, Glacier, Columbia britannica. — A *Pucc. coronata* probe diversa.

275. **Puccinia Cynosuroidis** (P. Henn.) Syd., Ann. Mycol. V (1907) 2663 p. 494, *Uromyces Cynosuroidis* P. Henn. — Sacc. XVII, p. 261. — Uredosoris amphigenis, maculis obsoletis fuscidulis insidentibus, sparsis vel seriatim dispositis, oblongis, ca. $\frac{1}{2}$ -1 mm. longis, cinnamomeis; uredosporis subglobosis, ovatis vel piriformibus, apice rotundatis incrassatis (usque ad 7 μ) obscurioribusque, aculeatis, castaneo-brunneis, 28-42 \approx 18-26, episporio ca. 2 μ . crasso; paraphysibus numerosis, flavidis, apice capitato-incrassatis; teleutosoris conformibus sed obscurioribus; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, apice non vel paullo incrassatis, medio vix constrictis, levibus, castaneo-brunneis, 25-35 \approx 18-24, episporio ca. 2 μ . crasso; pedicello flavido, crassiusculo, persistenti, ca. 35 μ . longo, subinde oblique inserto.

Hab. in foliis Eragrostidis cynosuroidis, pr. Port Said Ægypti et in Amer. bor. — Cl. Hennings habuit uredosporas castaneo-brunneas pro teleutosporis.

276. **Puccinia cacao** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) pag. 117, 2664 tab. XXX, fig. 259-260. ? *Uredo Rottboëlliae* Diet. — Syll. XVII,

p. 457. — Soris amphigenis sed plerumque hypophyllis, solitariis v. parce congregatis, minutis, ellipsoideis, bullatis, diu tectis, 0,5 mm. cr.; uredosporis brunneis vel castaneo-brunneis, ellipsoideis ovoideis v. oblongis, plerumque 3 poris germinativis ut plurimum æquatorialibus, episporio tenui, colorato, minute echinulato, 32-40 × 24-32; teleutosporis uredosporis intermixtis, sparsis, pallidis, oblongis, levibus, apice rotundatis v. attenuatis, medio constrictis, basi attenuatis, 32-35 × 21-22; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis et vaginis *Rottboëllia* compressæ, Victoria, Queensland, Australiæ. — *Pucc. Rottboëllia* Syd. teleutosporis apice incrassatis, pedicello firmo persistenti præditis, diversa. In *Rottboëllia* adest etiam *Uromyces Rottboëllia*.

277. **Puccinia microspora** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 101. 2665

— Maculis purpureis v. brunneis; soris amphigenis, præcipue hypophyllis, oblongis, v. linearibus, epidermide fissa cinctis; uredosporis obovatis v. globosis, interdum irregularibus, 22 μ . diam. v. usque ad 25 μ . long., episporio brunneo echinulato, paraphysibus capitatis hyalinis intermixtis; teleutosporis obovatis, cuneiformibus, vel irregularibus apice rotundatis, vix incrassatis, medio non vel levissime constrictis, basi plerumque cuneatis, septo sæpe obliquo v. verticali, 22-33 × 16-24, levibus, brunneis, apice obscurioribus; pedicello brevi, brunneo.

Hab. in foliis *Rottboëllia* compressæ var. japonicæ, Tokyo Japoniæ (NAMBU).

278. **Puccinia dactylidina** Bubák, Ann. Mycol. III (1905) p. 219. — 2666

Uredosporis amphigenis, $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ mm. long., oblongis v. ellipsoideis sparsis v. aggregatis, ferrugineo-brunneis, demum nudis, pulvereis; uredosporis subglobosis, 22-28 × 20-24, flavo-brunneis, aculeolatis; poris 8-10 parum conspicuis; teleutosporis sæpius hypophyllis, 150-250 μ . long., oblongis, æqualiter sparsis v. aggregatis, diu tectis, atris, compactis; teleutosporis variis, pro more clavatis, apice rotundatis v. subacutatis, ibique subincrassatis et saturatio-ribus, plus minus medio constrictis, 30-55 μ . long., cellula superiori 18-28 μ . cr., brunnea, inferiori 9-22 μ . cr. dilutiori; pedicello brevi flavido-brunneo, persistenti; paraphysibus brunneis soros cingentibus.

Hab. in foliis *Dactylidis glomeratæ*, in Bohemia et Hungaria. — Ab affinibus *Pucc. dispersa*, *P. triticina*, *P. bromina* etc. sat distincta.

279. **Puccinia culmicola** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 100. 2667

— Soris culmicolis; uredosoris diu tectis, linearibus; uredosporis ellipsoideis v. obovatis, 17-27 \approx 14-20, episporio æquali dilute brunneo asperulo, poris 4 æquatorialibus perforato; teleutosoris linearibus, confluentibus, nudis, atris; teleutosporis oblongis, cuneatis, fusiformibus v. interdum linearibus, apice truncatis, rotundatis v. tenuatis, basi plerumque angustatis, medio vix v. non constrictis, flavo-brunneis, apice obscurioribus, levibus, 30-53 \approx 9-19; pedicello usque ad 50 μ . longo suffultis.

Hab. in foliis *Brachypodii japonici*, Komaba Japoniæ (KUSANO).

280. **Puccinia Buchloes** Schofield in Webber App. Fl. Nebr. II ed. 2668 (1902) p. 48, non Syd. Monogr. Ured. I, p. 740 (1903) — Syll. XVII, p. 394 — quæ = *Pucc. kansensis* Ell. et Bart. — Syll. XIV, p. 394. — Hæc species descripta est in Syll. IX, p. 308, sub nom. *Pucc. vexans* Farlow, var. *Buchloes* Webb. Cfr. Holway, Ann. Mycol. III (1905) p. 20.

281. **Puccinia Avenæ-pubescentis** Bubák, Ann. Mycol. IV (1906) 2669 p. 107. — Uredosoris in maculis minutis, rubescentibus, oblongis, interdum confluentibus sitis, epiphyllis, ellipticis v. breve linearibus, parvis, internerviis, mox nudis, pulveraceis, aurantiacis; uredosporis ovoideo-piriformibus, subinde ellipsoideis v. oblongis 22-38 \approx 17,5-25, membrana 2-2,5 μ . cr., flavida, laxè aculeolata, contentu rubro-aurantio, poris 4; teleutosoris epiphyllis, raro hypophyllis, ellipsoideis v. oblongis, sæpe confluentibus et tunc 0,5 mm. longis, mox nudis v. epidermide circumtectis, firmis, pulvinatis, nigris; teleutosporis piriformibus, ellipsoideis v. oblongis, 38-55 \approx 17,5-22, apice late rotundatis, v. vix tenuatis, ibique 4-9 μ . incrassatis, basi rotundatis v. tenuatis, medio constrictis, castaneis, levibus; pedicello usque ad 75 μ . longo, firmo, brunneo.

Hab. in foliis *Avenæ pubescentis*, prope Tabor Bohemiæ. — *Pucc. Anthoxanthi* affinis.

282. **Puccinia varians** Diet, Ann. Mycol. VI (1908) p. 224. — Soris 2670 amphigenis, oblongis vel linearibus, sparsis v. gregariis, haud raro confluentibus, uredosoris cinnamomeis, teleutosoris nigris, pulvinatis; uredosporis subglobosis vel globosis, 21-28 \approx 20-27, episporio flavo-brunneo, subtilissime verruculoso, poris 2 vel 3 perforato præditis; teleutosporis forma variis, ellipsoideis, obovatis, oblongis v. fusiformibus, utrinque rotundatis, rarius apice conoideis v. basi attenuatis, ad septum vix constrictis, levibus, castaneis, 27-45 \approx 15-24, pedicello usque ad 70 μ . longo, firmo, dilute brunneo v. hya-

lino suffultis; sporis unilocularibus, oblongis v. obovatis intermixtis.

Hab. in foliis *Cynodontis Dactyli*, Kochi, Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA). — Affinis *Pucc. Miyoshianæ* et *Pucc. subnitenti* sed satis diversa.

283. ***Puccinia Trichloridis*** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2671 (1909) p. 298. — Soris linearibus tenuibus 1-5 mm. long., 0,25-0,40 mm. cr., subseriatis, epidermide disrupta cinctis, subsuperficialibus, compactiusculis atris; uredosporis globosis vel obovatis, 15-20 μ . diam., laxe papillosis subhyalinis; teleutosporis ellipsoideis utrinque rotundatis episporio apice non v. vix incrassatulo 30-50 \times 20-22, loculis grosse uniguttulatis, ferrugineis, pedicello 40-100 \times 5-6, hyalino v. apice chlorinulo fultis.

Hab. in foliis vivis *Trichloridis mendocinæ*, in pratis pr. Perico Salta nec non circa la Bioja et Mendoza Amer. austr.

284. ***Puccinia Trachypogonis*** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 2672 t. XIX (1909) p. 301. — Foliis infectis sæpius pallescentibus, hinc inde maculis vagis sordide fuscescentibus v. purpurascentibus notatis; uredosoris amphigenis, erumpentibus, pallidis e carneo aurantiacis subpulverulentis, linearibus v. ellipticis, 0,5-1,5 mm. long., 0,5 mm. lat.; uredosporis subglobosis 30 \times 25, episporio hyalino ubique crasso papillulato (an reticulato?), endoplasmate nubiloso aurantio; teleutosoris atro-ferrugineis sæpius utrinque truncatis, compactiusculis omnino denudatis; teleutosporis ellipsoideis v. obsolete obovatis utrinque rotundatis, 38-50 \times 25-28 ad septum medium non v. lenissime coarctatulis, obscure fuligineis, episporio levi ubique crasso superne non v. parcissime umbonatulato vestitis, pedicello persistente, 50-60 \times 5-6, deorsum sensim leniterque incrassatulo suffultis.

Hab. in foliis *Trachypogonis Montufari* in collibus aridis circa Catamarca et circa La Rioja Amer. austr.

285. ***Puccinia Spegazziniella*** Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 627. — 2673 *Puccinia subglobosa* Speg., An. Mus. Nac. B. Aires t. XIX (1909) p. 300, fig. 5, non Diet. et Holw. (1901). — Non maculifera v. totum folium vix dealbans; uredosoris turgidulis sed sæpius epidermide tectis, longitudinaliter anguste rimosis 0,25-1 mm. long., sæpius epiphyllis, sublateritiis; uredosporis globosis, 20-22 \times 20, ubique crasse tunicatis, nubiloso-farctis, levibus v. tenuissime subimperspicue verruculosis; teleutosoris amphigenis laxe gregariis non vel obsolete subseriatis erumpenti-superficialibus, subhemisphæricis v. ellipsoideis 2,5-3,5 mm. lat., atro-ferrugineis, nudis

compactiusculis; teleutosporis utrinque obtusis, ellipsoideo-subglobosis, crasse tunicatis, levibus, ad septum non constrictis, obscure fuligineis, 30-35 \approx 30, pedicello persistenti, pallido, 50 \approx 5-7 suffultis.

Hab. in foliis vivis Sporoboli asperifolii, in pratis circa Mendoza Amer. Austr.

286. **Puccinia Sesleriæ-cæruleæ** E. Fischer, Uredin. der Schweiz 2674 (1904) p. 259, cum fig. — Differt a *Pucc. Sesleriæ* Reich., teleutosporis levibus, longioribus, statu æcidiali absente vel non in *Rhamno saxatili*.

Hab. in *Sesleria cærulea*, in Helvetia.

287. **Puccinia Polypogonis** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2675 (1909) p. 300, *Uredo Polypogonis* Speg. — Syll. XVI, p. 361. — Maculis pallescentibus indeterminatis; uredosoris pulverulentis pallidis, 0,5-1 mm long., 0,25-0,30 mm. lat.; uredosporis non v. obsolete angulosis 20-24 μ . diam., pallide fulvis, episporio tenui non v. vix papillulato, grosse uniguttulatis; teleutosoris compactiusculis obscurioribus; teleutosporis non v. vix obovatis, 35-40 \approx 20, levibus, loculis subæquilongis ad septum leniter constrictis, episporio superne sat incrassato truncato-rotundato v. plus minusve umbonato, fulvis, pedicello persistente 50-60 \approx 5-8 suffultis.

Hab. in foliis vivis *Polypogonis monspeliensis*, in pratis prope Lago Muster Patagonia Amer. austr.

288. **Puccinia Pilgeriana** P. Henn., Engl. Jahrb. XL (1907) p. 226. 2676 — Soris hypophyllis, sparsis v. gregariis, pulvinatis, ferrugineis; uredosporis subglobosis v. ellipsoideis, 22-30 \approx 20-25, episporio castaneo, aculeato; teleutosporis clavatis, apice rotundato-obtusis, usque ad 6-7 μ incrassatis, medio 1-septatis constrictis, 30-44 \approx 20-23, episporio roseo-incarnato, levi; pedicello brunneolo c. 7 cr.

Hab. in foliis *Paspali*, Mattogrosso Cuyabù Brasiliæ (PILGER).

289. **Puccinia panicicola** Arth., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) 2677 p. 586. — Uredosoris amphigenis, numerosis, sparsis, ovatis, 0,1-0,3 mm. lat. 0,2-0,4 mm. long., mox nudis, pulverulentis, obscure cinnamomeo-brunneis; uredosporis late ellipsoideis v. obovoideis 26-30 \approx 23-25, tunica obscure cinnamomeo-brunnea, crassiuscula, 1,5 μ ., cr., crebre et crasse echinulata, verrucosa, poris germinativis 3-4, quandoque 2, æquatorialibus prædita.

Hab. in foliis *Panici mollis*, *P. hebetes*, Cuba, Mexico Amer. bor. (C. F. BAKER, E. W. D. HOLWAY). — *Pucc. esclavensi* proxima. Status teleutosp. observatus, teste Baker, sed Arthurio ignotus.

290. **Puccinia insolita** Syd., in De Willdem., Flora du Bas- et Moy. 2678 Congo t. III, fasc. I (1909) Extr. p. 11. — Uredosoris hypophyllis, maculis elongatis flavidis v. ferrugineis indeterminatis insidentibus, minutis, seriatim dispositis, pulverulentis, c. $\frac{1}{3}$ mm. diam., ferrugineis; uredosporis subglobosis, ellipsoideis v. ovatis, laxe echinulatis, flavo-brunneis, 25-35 \times 18-26, episporio 1,5-2 μ . cr.; teleutosporis immixtis, ovatis subinde breviter clavatis, apice rotundatis, leniter incrassatis (usque ad 5 μ .) et obscurioribus, medio vix v. leniter constrictis, basi attenuatis, sæpe cuneatis, brunneis, levibus, 25-35 \times 18-24; pedicello brevi, flavido.

Hab. in foliis Panici maximi, Kisantu et Yindu Congo Africæ trop. (VANDERYST).

291. **Puccinia panicophila** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2679 (1909) pag. 300. — Maculis nullis v. toto folio pallescente; soris sæpius hypophyllis, densiuscule gregariis sed non confluentibus, crasse pulvinatis, nudis, non pulveraceis nec sclerotiaceis, 0,5-1 mm. long., 0,35-0,50 mm. diam.; teleutosporis ferrugineis dense constipatis 22-26 \times 15-16, episporio ubique modice incrassato, endoplasmate nubiloso, loculis subæquilongis, infero vix cuneato, pedicello persistente 50-60 \times 5-6 suffultis.

Hab. in foliis vivis Panici insularis, in montuosis prope Cacheuta Amer. austr.

292. **Puccinia Oplismeni** H. et P. Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 436. 2680 — Teleutosoris sparsis vel seriatim dispositis, minutis, rotundatis vel oblongis, ca. $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ mm. longis, pulvinatis, atris; teleutosporis ellipsoideo-oblongis, oblongis vel clavato-oblongis, apice acutiusculis vel rotundatis, incrassatis (usque ad 8 μ .), medio parum constrictis, basi rotundatis vel sæpius attenuatis, levibus, brunneis, 28-38 \times 14-21; pedicello crasso, persistenti, brunneo, usque ad 80 μ . longo.

Hab. in foliis Oplismeni compositi, Mussoorie Indiæ or. (E. J. BUTLER).

293. **Puccinia Oryzopsidis** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 498. 2681 — Soris teleutosporiferis amphigenis, ellipticis vel oblongis, usque ad 2 mm. longis, pulvinatis, atro-brunneis; uredosporis (paucis tantum visis) globosis vel subglobosis, flavis, minute echinulatis, ca. 20-25 μ . diam.; teleutosporis ellipsoideis vel oblongis, utrinque rotundatis, apice incrassatis (7-9 μ .), medio non vel vix constrictis, flavo-brunneis, levibus, 34-46 \times 20-25, episporio 4 μ . crasso; pedicello hyalino, persistenti, usque ad 100 μ . longo.

Hab. in foliis *Oryzopsidis molinioidis*, Ranikhet Kumaon, Himalaya Indiae orient. (E. J. BUTLER). — A *Pucc. Micranthæ* probe diversa.

294. **Puccinia ishikariensis** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. Univ. III (1909) n. 2, p. 209, tab. XI, fig. 6. — Uredosoris epiphyllis oblongis v. linearibus, minutis, in areis brunneis, gregariis sæpe confluentibus internerviis, nudatis, pulverulentis brunneis; uredosporis globosis subglobosis v. piriformibus, echinulatis, spatio inter spinulas 3 μ ., flavidis v. brunneo-flavidis, 20-36 \times 14-28, episporio 2-3 μ . cr., poris germinativis 6-8, sparsis; paraphysibus numerosis, clavatis v. capitatis, flavidis, 50-80 \times 17-18; teleutosoris amphigenis, minutis, oblongis v. linearibus dense sparsis seriatis raro confluentibus, epidermide diu tectis dein nudatis, compactis, pulvinatis, griseis v. nigris, paraphysibus brunneis confertis circumdatis, uredosporis sæpius commixtis; teleutosporis cylindricis, cuneatis v. oblongo-clavatis, assymmetricis, apice incrassatis, 4-6 μ ., truncatis, rotundatis v. breviter apiculatis, basi tenuatis v. cuneatis, ad septum non v. vix constrictis, levibus, brunneo-aurantiis, loculo inferiore pallidiori, 36-60 \times 14-24, episporio tenui, pedicellis brevibus, brunneis, subdeciduis.

Hab. in foliis *Molinia japonicæ*, in Japonia.

295. **Puccinia Hierochloæ** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. Univ. III (1909) n. 2, p. 193, tab. X, fig. 10-11. — Uredosoris amphigenis sæpius epiphyllis v. vaginicolis, minutis, oblongis v. linearibus, dense v. laxè sparsis, sæpe confluentibus, epidermide laxa tectis v. nudatis, pulverulentis, aurantiacis, uredosporis e globoso ellipsoideis, echinulatis, 16-26,5 \times 12-18, episporio crassiusculo, hyalino v. flavido, paraphysibus interdum presentibus, clavatis v. capitatis, hyalinis 50-72 \times 10-15; teleutosoris amphigenis sæpius epiphyllis v. vaginicolis, minutis v. mediocribus, oblongis v. linearibus, sparsis v. gregariis sæpe confluentibus, 2-4 mm. long., epidermide laxa tectis dein nudatis, compactis conspicuis, nigris; teleutosporis cylindricis, oblongo-clavatis, apice incrassatis, processibus numerosis obtusis, longiusculis, plus minus divergentibus præditis, basi tenuatis, ad septum non v. vix constrictis, levibus, ferrugineis v. læte castaneis 30-80 \times 14-22, rarius usque ad 104 μ . long.; episporio tenui, pedicello brevissimo, brunneo subdeciduo.

Hab. in foliis vaginisque *Hierochloæ borealis* et *Stipæ sibiricæ*? in Japonia.

296. **Puccinia Glyceriæ** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. 2684

Univ. III (1909) n. 2, p. 200, tab. XI, fig. 2; *Pucc. Paniculariæ* Diet., non Arthur. — Uredosoris amphigenis plerumque epiphyllis minutis oblongis vel subrotundis in areis flavidis decoloratis gregariis v. sparsis subinde confluentibus, epidermide laxa mox rupta tectis, pulverulentis, aurantiacis; uredosporis globosis subglobosis v. læte ellipsoideis, echinulatis læte flavidis vel hyalinis 20-28 \approx 18-24, paraphysibus nullis; teleutosoris hypophyllis minutis v. mediocribus oblongis v. linearibus gregariis, subseriatim dispositis subinde confluentibus, raro 1 cm. long., diu epidermide tectis, pulvinatis compactis, nigris v. griseis; teleutosporis subcylindricis v. cylindricis, apice truncatis v. undulatis incrassatis, 5-6 raro 8 μ . cr., basi deorsum tenuatis v. angulatis ad septum non v. vix constrictis, levibus, flavido-brunneis 43-62 \approx 12-20, episporio tenui; pedicellis brevibus brunneis v. subhyalinis subdeciduis.

Hab. in foliis *Glyceriæ æquaticæ* et *G. tonglensis*, in Japonia. — Pro *Pucc. Paniculariæ* Arth. habuit cl. Dietel hanc speciem, quæ tamen est satis diversa.

297. **Puccinia fujiensis** S. Ito, Journ. Coll. of Agric. Tohoku Imper. Univ. III (1909) p. 210, tab. XI, fig. 7. — Teleutosoris hypophyllis, minutis, oblongis vel linearibus, sparsis vel subgregariis, sæpe confluentibus, epidermide semper tectis, conspicuis, nigricantibus, paraphysibus brunneis circumdatis; teleutosporis cylindricis v. oblongo-clavatis, apice truncatis v. oblique acutatis, leviter incrassatis (4-8 μ .), deorsum attenuatis v. angulatis, ad septum non vel vix constrictis, levibus, ferrugineis, 44-58 \approx 15-17, episporio tenui; pedicellis brevibus brunneis subdeciduis.

Hab. in foliis *Anthoxanthi japonici*, in Japonia. — A *Pucc. Anthoxanthi* et *P. boreali* satis distincta.

298. **Puccinia Boutelouæ** (Jennings) Holway, Ann. Mycol. III (1905) pag. 20, *Diorchidium Boutelouæ* Jenn. Bull. Texas Agr. St. IX, p. 25 (1890). — Soris punctiformibus usque ad 2 mm. diam., amphigenis, uredosoris aurantiis, demum albis; uredosporis e globoso ovoideis, 16-24 \approx 16-20, breviter spinulosis, contentu aurantiaco, membrana hyalina, demum totis hyalinis, poris inconspicuis, ut videtur pluribus; teleutosoris atris; teleutosporis læte cinnamomeo-brunneis, levibus, e globoso ellipsoideis, rarius vertice incrassatis, modo longitrorsum septatis (*Diorchidium*) 20-26 \approx 24-32, modo transverse septatis (*Puccinia*) 28-34 \approx 22-24; pedicello varie inserto, sæpius lateraliter, persistente, prope sporam dilute colorato, usque ad 80 μ . longo.

Hab. in foliis *Boutelouæ curtispiculæ*, Denton Texas (W. H. LONG) et *Boutelouæ* sp., Iguala Mexici. — Subaffinis *Pucc. Bartholomæi* sed probe distincta.

299. **Puccinia exasperans** Holw., Ann. Mycol. III (1905) p. 21. — 2687

Soris amphigenis, punctiformibus, e rotundato ellipsoideis, nudis, pulveraceis; uredosoris non visis; uredosporis teleutosporis intermixtis, flavido-brunneis, globosis, tenuiter tunicatis, breviter echinulatis, 18-24 μ . diam.; poris germinativis indistinctis, sparsis (? 8); teleutosoris nigris; teleutosporis cinnamomeo-brunneis, levibus, e globoso ellipsoideis, nonnullis septo verticali præditis, apice leniter incrassatis, 24-28 \times 16-24, pedicello hyalino usque ad 120 μ . longo.

Hab. in foliis *Boutelouæ* (*Ætheropogon*) *curtispiculæ* et *Bout. Pringlei*, Cuernavaca et Iguala Mexici (PRINGLE).

300. **Puccinia Elymi-sibirici** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku. Imper. Univ. III (1909) n. 2, p. 202, tab. XI, fig. 1. — 2688

uredosoris amphigenis plerumque epiphyllis minutis oblongis sparsis v. gregariis, interdum seriatis, nudis, pulverulentis, atro-aurantiacis; uredosporis globosis, subglobosis v. ovatis, verrucoso-echinulatis, 28-32 \times 20-22, flavido-brunneis, poris germinativis 4; paraphysibus nullis; teleutosoris hypophyllis, minutis oblongis, dense sparsis, diu epidermide tectis, nigricantibus; teleutosporis cuneatis cylindræis v. clavatis, apice truncatis et oblique acutatis v. rotundatis incrassatis (6-10 μ .), basi tenuatis, ad septum non v. vix constrictis, levibus, ferrugineis, 36-70 \times 18-22; pedicellis brevibus brunneis subdeciduis; paraphysibus brunneis, constipatis.

Hab. in foliis *Elymi sibirici* in Japonia. — A ceteris speciebus elymicolis satis distincta.

301. **Puccinia Diarrhenæ** Miyabe et Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. Univ. III (1909) n. 2, p. 190, tab. X, fig. 6. — 2689

Teleutosoris epiphyllis, minutis v. mediocribus, oblongis v. rotundatis, sparsis v. gregariis, quandoque confluentibus, epidermide laxa tectis, dein ea lacerata cinctis, subpulvinatis, compactis, nigro-fuliginæis; uredosporis sæpe immixtis obovatis, subglobosis v. globosis, verrucoso-echinulatis, pallide flavo-brunneolis v. hyalinis, 20-26,5 \times 16-23,5 episporio tenui (1-2 μ .); teleutosporis oblongo-clavatis, ellipsoideis vel fusiformibus, apice incrassatulis ibique processibus corniformibus vel subverruciformibus ornatis (corniculis 6-17 μ . long.), basi plerumque attenuatis, non v. vix ad septum constrictis, levibus, apice ferrugineis deorsum pallidioribus, 25-52 \times 10-

21; episporio sat tenui; pedicellis hyalinis v. sursum flavidis, sporam æquantibus, persistentibus.

Hab. in foliis Diarrhenæ japonicæ in Japonia. — *Pucc. Festucæ* Plowr. subaffinis.

302. *Puccinia Dactyloctenii* Pat. et Har., Bull. Soc. Myc. Fr. XXIV 2690 (1908) p. 13. — Teleutosoris amphigenis, ovatis v. oblongis, usque ad 1 mm. cr., sparsis, epidermide lacerata cinctis, mox nudis, pulvinatis, atris; teleutosporis rotundato-ellipsoideis, utrinque obtusis, levibus, tunica usque ad 6 μ . crassa præditis, non v. leniter medio constrictis, brunneis, 30 \approx 24; pedicello hyalino, basi attenuato, usque ad 70 μ . longo, apice 6 μ . cr., sæpius oblique inserto.

Hab. in foliis *Dactyloctenii ægyptiaci*, Chari, Baguirmi N., Fort-Lamy inter et Mondjafa (A. CHEVALIER). — *Pucc. Bartholomæi* affinis sed sporis magis rotundatis, latioribus distincta.

303. *Puccinia chloridina* Bacc., Funghi Eritrea, Ann. Bot. IV (1906) 2691 p. 269, tav. X, fig. 6. — Soris hypophyllis, atris, primitus punctiformibus, dein rotundis vel ellipticis, demum linearibus ac lineariter seriatis, cito denudatis; uredosporis minute verrucosis, 18-20 μ .; teleutosporis ovatis, castaneis 30 \approx 22 ad septum non constrictis, aparaphysatis, levibus, pedicello sæpe laterali vel transverso, 60-70 μ . longo, ad basim fuscidulo.

Hab. in foliis *Chloridis* sp., Ambatocam, Oculé-Cusai Erythrææ (PAPPI).

304. *Puccinia chloridicola* P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, 2692 Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) pag. 90. — Maculis striiformibus vel effusis, fuscis; uredosoris oblongis, amphigenis, flavo-fuscidulis; uredosporis subglobosis v. ellipsoideis verrucosis, subhyalinis, 13-20 \approx 14-21; teleutosoris striiformibus sæpe confluentibus, epidermide pallida velatis, atris; teleutosporis ellipsoideis v. ovoideis, obtusis, haud incrassatis, medio paullo constrictis, castaneis, 22-36 \approx 17-22.

Hab. in foliis culmisque *Chloridis* sp., Kisantu Congo Africæ trop. (VANDERYST).

305. *Puccinia Chætochloæ* Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIV (1907) 2693 pag. 585. St. uredosp.: *Uredo Chætochloæ* Arth., l. c., XXXIII (1906) pag. 518. — Uredosoris amphigenis, numerosis, ex oblongo lineari-oblongis, 0,1 mm. lat., 0,5-2 mm. v. ultra longis, rima longitudinali mox dehiscentibus, obscure cinnamomeo-brunneis; uredosporis late ellipsoideis, 29-42 \approx 21-29, tunica castaneo-brunnea, 1,5-2 μ . cr., sparse et crasse conoideo-echinulata, poris germina-

tivis 3 æquatorialibus; teleutosoris amphigenis, paucis, sparsis, oblongis v. linearibus, parvis, 0,1 mm. lat., 0,5-1 mm. long., demum rima longitudinali apertis; teleutosporis ellipsoideis, sæpe irregularibus, 32-37 \approx 23-26, utrinque rotundatis, septo non vel leniter constrictis, tunica castaneo-brunnea, concolori, tenui, 1-1,5 μ ., raro apice leniter incrassata, levi; pedicello colorato, brevi, sæpe oblique inserto.

Hab. in foliis *Chætochloæ macrospermæ*, Miami Florida Amer. bor. (E. W. D. HOLWAY et ERN. A. BESSEY).

306. **Puccinia Beckmanniæ** Mac Alp., *Rusts of Australia* (1906) p. 116, 2694 tab. II, fig. 12. — Uredosoris plerumque hypophyllis, aurantiacis, ellipsoideis, lineariter seriatis, erumpentibus, epidermide rupta cinctis; uredosporis aurantiacis, ellipsoideis, echinulatis, 3-4 poros germinativos æquatoriales ex uno latere gerentibus, 25-29 \approx 16-19; teleutosoris minutis, nigris, linearibus, hypophyllis, epidermide diu tectis deinde nudis, 0,5 mm. c. longis; teleutosporis flavo-brunneis, oblongo-clavatis, medio non v. modice constrictis, loculo superiori plerumque obscuriori, apice appendicibus usque ad 7 μ . præditis, 45-60 \approx 16-25, pedicello brevissimo v. nullo; mesosporis brunneis, oblongis v. oblongo-ellipsoideis, apice incrassatis appendicibus præditis v. non, 33-35 \approx 13-16.

Hab. in foliis *Beckmanniæ erucæformis*, Victoria Australiæ.

307. **Puccinia Arthraxonis** (P. Henn.) Syd. et Butler, *Ann. Mycol.* 2695 V (1907) p. 499, *Uromyces Arthraxonis* P. Henn. — *Syll.* XI, p. 181 (stat. uredosp.). — Uredosoris amphigenis, maculis sæpe purpureis insidentibus, sparsis vel aggregatis, ellipticis vel linearibus, $\frac{1}{2}$ -2 mm. longis, mox nudis, pulverulentis, flavis, 18-28 \approx 18-24, episporio crasso (usque ad 4 μ .); teleutosporis (paucis tantum visis) late ellipsoideis, utrinque rotundatis, apice incrassatis (usque ad 8 μ .), medio non vel vix constrictis, levibus, brunneis, 35-42 \approx 25-33; pedicello elongato, persistenti.

Hab. in foliis *Arthraxonis lanceolati*, Dehra Dun Indiæ orient., Kumaon Himalaya (E. J. BUTLER).

308. **Puccinia Apludæ** H. et P. Syd., *Ann. Myc.* IV (1906) p. 436. 2696 — Teleutosoris hypophyllis, maculis griseo-brunneis insidentibus, sparsis v. seriatim dispositis, minutis, rotundatis v. elongatis, $\frac{1}{2}$ -2 mm. longis, pulvinatis, nudis, atris; teleutosporis ellipsoideo-oblongis, oblongis v. oblongo-clavatis, apice rotundatis, leniter incrassatis (3-5 μ .), medio parum constrictis, basi rotundatis v. at-

tenuatis, levibus, brunneis, 32-40 \times 17-26; pedicello persistenti, crasso, flavo-brunneolo, usque ad 80 μ . longo.

Hab. in foliis *Apludæ aristatæ*, Dehra Dun (E. J. BUTLER).

309. **Puccinia apoda** Hariot et Pat., Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 2697 (1909) n. 2, p. 199. — Maculis amphigenis, rufulis, minutis, vix 1 mm., numerosis, undique sparsis; uredosoris pro more epiphyllis, erumpentibus, ellipsoideis, usque ad 250 μ .; paraphysibus clavatis, sursum obtusis, crasse tunicatis, ad centrum incurvis, fuscis, 40 \times 12 circumcinctis; uredosporis fuscis, ellipsoideis, minute verrucosis, 20-24 \times 16; teleutosoris hypophyllis, atris, densissime congestis, minutis, 80-100 \times 60, subcuticularibus; teleutosporis dense agglomeratis et substantia hyalina gelatinosa circumdatis, 20 \times 16, biformibus, aliis unicellularibus (mesosporis) ovato-cuneatis, levibus, apice rotundatis incrassatisque, sessilibus v. brevissime pedicellatis, numerosissimis, aliis bicellularibus, parcioribus, ovato-elongatis, medio constrictis, levibus, sessilibus.

Hab. in foliis *Penniseti setosi*, Baguirmi Congo Africae trop. — Teleutosp. fere sessilibus et in substantia gelatinosa quasi nidulantibus prædistincta species.

310. **Puccinia Bromi-japonici** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imp. Univ. III (1909) n. 2, p. 205, tab. XI, fig. 4. — Uredosoris epiphyllis minutis oblongis vel linearibus sparsis vel gregariis sæpe confluentibus flavido-brunneis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis dense echinulatis, flavis, 22-30 \times 18-25, episorio tenui, poris germinativis numerosis inconspicuis, paraphysibus nullis; teleutosoris hypophyllis v. vaginicolis, minutis oblongis v. linearibus, sparsis v. gregariis, sæpe confluentibus, epidermide diu tectis, pulvinatis compactis conspicuis, nigricantibus; paraphysibus brunneis stipatis circumdatis; teleutosporis oblongo-clavatis v. oblongis, apice incrassatis (8-10 μ .), obtuse acutatis v. rotundatis, raro truncatis, interdum papilla depressa pallidiori vix conspicua præditis, basi tenuatis vel rotundatis, ad septum plus minus constrictis, castaneis, 34-54 \times 20-30; pedicellis subhyalinis v. brunneis, brevibus, circiter 30 μ . long., persistentibus.

Hab. in foliis vaginisque *Bromi japonici* in Japonia. — A *Pucc. Symphyti-Bromorum* vere distincta.

311. **Puccinia alternans** Arthur, Mycologia I (1909) p. 248. — Py- 2699 cnidiis epiphyllis, aggregatis, subcutaneis, 60-96 \times 50-80; æcidiis sæpius hypophyllis, plerumque anulatim dispositis, cylindræis 0,4-0,8 μ . alt., pseudoperidiis hyalinis margine inflexo, laciniato.

cellulis rhomboideis 21-29 μ . long., tunicis transverse striatis, externa 9-12 μ . cr., interna 5-7 μ . cr., verruculosa; æcidiosporis globoideis 17-24 \approx 15-20, tunica hyalina, 1-1,5 μ . cr., minute plano-verruculosa; uredosoris amphigenis sparsis oblongo-linearibus, 0,2-0,8 mm. long., dein nudis, subpulverulentis, cinnamomeis; uredosporis ellipsoideis, 23-29 \approx 19-25, tunica cinnamomea, minute echinulata, 2-2,5 μ . cr.; poris 6 sparsis; teleutosoris amphigenis sparsis, lineari-oblongis, 0,4-1 mm. long., diu tectis, atro-brunneis; teleutosporis clavato-oblongis 31-61 \approx 13-19, apice obtusis, deorsum tenuatis, septo non vel vix constrictis, tunica castanea, 1-1,5 μ . cr., apice ad 3-5 μ . incrassata, pedicello subcolorato, brevissimo.

Hab. st. pycn. et æcid. in foliis *Thalictri Fendleri*, *T. occidentalis*, *T. sparsiflori*, *T. venulosi*; st. uredoteleut. in foliis *Bromi Porteri*, *B. Pumpelliani*, *B. Richardsoni* in Amer. bor. pluribus locis.

312. **Puccinia Dietrichiana** Tranzsch., Ann. Mycol. V (1907) p. 418. 2700
Stat. æcid.: *Æcidium Trollii* Blytt — Syll. VII, p. 670 (perperam ut st. æcid. *Puccinice Trollii*) — St. teleut. morphologice ut in *Puccinia persistenti* Plowr. — Syll. IX, p. 312.

Hab. in foliis *Tritici* (*Agropyri*) *canini*, in Rossia.

313. **Puccinia obliterated** Arthur, Mycologia I (1909) p. 25. — Py- 2701
cnidiis paucis, epiphyllis melleis 80-107 \approx 40-75; æcidiis pro more hypophyllis, aggregatis in maculis latis decoloratis; pseudoperidiis hyalinis, margine erosis, brevibus; cellulis rhombeis 16-24 μ . long.; æcidiosporis globoideis v. subangulosis, 18-25 \approx 15-19, membrana tenui, hyalina, 1 μ . cr., tenuissime verruculosa; uredosoris sæpius hypophyllis, sparsis, lineatis, mox nudis, pulverulentis, cinnamomeis; uredosporis globoideis v. late ellipsoideis, 19-29 \approx 16-23, tunica cinnamomea, 1,5-2,5 μ . cr., minute echinulato-verruculosa, poris 6-8 sparsis; teleutosoris sæpius epiphyllis, sparsis vel aggregatis, oblongis v. lineatis 0,5-2 mm. long., 0,1-0,3 mm. lat., serius nudatis, nigricantibus; teleutosporis clavatis v. clavato-oblongis 29-51 \approx 13-19, apice subrotundis, deorsum tenuatis, vix v. non constrictis, tunica atro-castanea, tenui, 1-1,5 μ . cr., apice usque ad 3-5 μ . incrassata, levi; pedicello colorato brevi.

Hab. st. pycn. et æcid. in foliis *Aquilegiæ cæruleæ*, *A. elegantulæ*, *A. flavescentis*, *A. formosæ*, *A. truncatæ* in Americæ bor. pluribus locis; st. uredoteleutosporicus in foliis *Agropyri biflori* et *A. canini*, Laggan Alb. Amer. bor. (HOLWAY).

314. **Puccinia Pattersoniana** Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII 2702 (1906) p. 29. — Uredosoris epiphyllis, oblongis, mox nudis; uredosporis ellipsoideis, 28-34 \times 21-26, tunica flavo-aurata, 3 μ . crassa, sparse et prominenter verrucosa, poris germinativis 3 (?), subæquatorialibus; teleutosoris epiphyllis, intercostalibus, oblongo-linearibus, mox nudis; teleutosporis oblongis, sæpe angulosis, 30-37 \times 16-22, ad septum non v. leniter constrictis, utrinque rotundatis v. obtusis; tunica brunneo-aurata, 1 μ . cr., humida levi, sicca crebre striata; pedicello angusto 5-7 μ . cr., sporam subæquante v. duplo longiore, subhyalino.

Hab. in foliis Agropyri spicati, Sandcoulee Montana, Amer. bor. (F. W. ANDERSON).

315. **Puccinia Kœleriæ** Arthur, Mycologia I (1909) p. 247. — Py- 2703
cnidiis sæpius epiphyllis, copiosis, in maculis decoloratis, 80-100 \times 45-65, melleis dein nigrescentibus; æcidiis hypophyllis in soros 1-3 mm. latos, aggregatis in maculis decoloratis, breve cylindraceis, 0,4-0,7 mm. alt., pseudoperidiis hyalinis, cellulis rhomboideis, pariete externo 5-7 μ . cr., transverse striato, interiore verrucoso, 1-3 μ . cr., æcidiosporis globoideis, 18-26 \times 13-20, tunica, 1-1,5 μ . cr., minutissime plano-verruculosa; uredosoris amphigenis in maculis decoloratis, oblongis v. linearibus 0,5-1,5 mm. long., mox nudis, pulveraceis, cinnamomeis, paraphysibus capitato-clavatis, 42-65 \times 10-16 circumvallatis; uredosporis ellipsoideis 23-34 \times 19-26, tunica 2-2,5 μ . cr., crebre echinulato-verrucosa cinnamomea; poris 4-6 sparsis; teleutosoris hypophyllis sparsis, oblongo-linearibus, 0,5-1,5 mm. long., diu tectis, griseo-nigris; teleutosporis oblongo-clavatis, 45-55 \times 15-21, apice obtusis, deorsum tenuatis, tunica castanea, 1 μ . cr., apice ad 3-5 μ . incrassata; pedicello brevi subcolorato.

Hab. st. pycn. et æcid. in foliis Mahoniæ Aquifolii, uredo-teleutosp. in foliis Kœleriæ cristatæ, in Americæ borealis pluribus locis.

316. **Puccinia paradoxica** Ricker, Journ. of Myc. XI (1905) p. 114. 2704
— Teleutosoris hypophyllis, angustis, linearibus, inconspicuis, epidermide nigricante tectis; teleutosporis brunneo-auratis, symmetricis, ellipsoideis, medio constrictis, conspicue verrucosis, 33-37 \times 22-29; pedicello brevi, hyalino, deciduo.

Hab. in foliis Melicæ Smithii, Chatam Station Mich. America bor. (C. F. WHEELER).

317. **Puccinia Heimerliana** Bubák, Ann. Mycol. V (1907) p. 40. — 2705

Uredosoris initio epidermide tectis, dein erumpentibus, flavo-brunneis, striiformibus, pulvereis; uredosporis ovoideis v. ellipsoideis, sæpe quoque globosis v. subglobosis, læte flavo-brunneis, spinulosis, $20-29 \approx 15-20$, tunica sæpe incrassata, vertice usque ad 5μ ., poris germinativis 3-5, sæpe conspicue prominentibus; teleutosoris ut uredosoris, nigricantibus, sæpius longitrorsum confluentibus, compactis; teleutosporis ellipsoideis v. ex oblongo fusoides, bicellularibus, $30-65 \approx 15-20$, vertice acutatis v. rotundatis, ibique usque ad $6-11 \mu$. incrassatis, pedicellum versus tenuatis vel rotundatis, ad septum leviter constrictis, brunneis, cellula superiore saturatiore, interdum unicellularibus ex oblongo fusoides, $28-52 \approx 11-22$, utrinque tenuatis, supra fortiter incrassatis; tunica utriusque formæ brunnea, levi; pedicello brunneo $30-55 \mu$. longo, basi usque ad 9μ . cr.

Hab. in culmis nudis, non in vaginis, *Melicæ ciliatæ*, in declivibus Vilmöss (= Funés) pr. Clausen (= Chiusa) Alto Adige, Trentino (Prof. A. HEIMERL).

318. **Puccinia diplachnicola** Diet., Ann. Mycol. VIII (1910) p. 308. — 2706

Uredosporis ellipsoideis vel subglobosis, $15-18 \approx 13-15$, episporio hyalino, dense verruculoso donatis; teleutosoris hypophyllis, singulis etiam epiphyllis, numerosis minutis punctiformibus subinde linearibus interdum confluentibus nudis, obscure brunneis, firmis; teleutosporis forma variis oblongis v. late ellipsoideis $27-37 \approx 13-20$, raro majoribus, utrinque rotundatis vel vertice conoideis, ad septum vix constrictis, apice paullo vel vix incrassatis, brunneis, levibus, pedicello longo tenui persistenti hyalino instructis.

Hab. in *Diplachne serotina* var. *aristata*, Tosa Japoniæ. -- *Pucc. australi* affinis.

319. **Puccinia leptospora** Ricker, Journ. of Mycol. XI (1905) p. 114. 2707

— Teleutosoris amphigenis, plerumque hypophyllis, conspicuis; teleutosporis apice brunneo-auratis, ibique incrassatis et coronatis, elongato-clavatis $84-112 \approx 16-20$, basi fragilibus; pedicello brevissimo, hyalino, fragili.

Hab. in foliis *Triseti Virletii*, Mexico (C. A. PURPUS).

320. **Puccinia Piperi** Ricker, Journ. of Myc. XI (1905) p. 114. — 2708

Uredosoris hypophyllis inconspicuis, linearibus, sæpe confluentibus, tectis; uredosporis ex ellipsoideo subglobosis, pallide flavis, echinulatis, $23-26 \approx 16,5-23$; teleutosoris conformibus; teleutosporis e clavato cylindratis, brunneo-auratis, $53-62 \approx 22-26$, apice plerumque applanatis v. quandoque rotundatis, non incrassatis, tunica

tenui, medio leniter constrictis, longitudinaliter subangulosis vel substriatis; pedicello fragili, brevi, hyalino.

Hab. in foliis *Festucæ pacificæ*, Oregon Amer. bor. (C. V. PIPER).

321. **Puccinia Kreageri** Ricker, Journ. of Myc. XI (1905) p. 114. — 2709

Uredosoris hypophyllis, inconspicuis, ferrugineis; uredosporis e globoso subglobosis, 22-27 μ ., pallide flavidis v. subhyalinis, tunica tenui, minute verrucosa, poris germinativis numerosis, sparsis; teleutosoris conformibus; teleutosporis oblongo-ovoideis 33-46 \approx 16-26, medio constrictis, basi rotundatis, flavido-brunneis, tunica apice obscuriore et usque ad 8,5 μ . cr., rotundatis v. acutatis; pedicello colorato, brevi, usque ad 15 μ ., fragili, 8-9 μ . cr.

Hab. in foliis *Festucæ subulatæ*, in America boreali (F. O. KREAGER).

322. **Puccinia Deschampsiae** Arthur, Bull. Torr. Bot. Club, (1910) 2710

p. 570. — Pycnidiis et æcidiis ignotis; uredosoris epiphyllis, sparsis, oblongis v. linearibus, 0,5-1 mm. long., epidermide rupta cinctis, flavidis; uredosporis obovoideis v. ellipsoideis, 26-29 \approx 19-21, tunica pallide flava, subtenui, 1,5 μ . c. cr., minute verrucoso-echinulata, poris germinativis 4 æquatorialibus prædita; paraphysibus numerosis, clavatis v. clavato-capitatis, 48-90 \approx 12-15, tunica pallide flava v. subhyalina; teleutosoris epiphyllis, sparsis, oblongis v. linearibus, usque ad 0,5 mm. longis, diu tectis, brunneis; teleutosporis oblongis v. oblongo-ellipsoideis, 32-48 \approx 18-23, apice rotundatis v. obtusis, basi rotundatis v. subangustatis, septo constrictulis; tunica cinnamomeo-brunnea, subtenui, apice 3-5 μ . incrassata, levi; pedicello brevi.

Hab. in foliis *Deschampsiae cæspitosæ*, Colorado Amer. bor. (F. E. CLEMENTS).

323. **Puccinia Æluropi** Ricker, Journ. of Myc. XI (1905) p. 114. — 2711

— Teleutosoris amphigenis, plerumque hypophyllis, ellipsoideis v. oblongis, sæpe confluentibus; mesosporis pallide flavis, ellipsoideis v. oblongis, minute verrucosis, poris numerosis, sparsis, 20-30 μ . diam.; teleutosporis e clavato ellipsoideis vel oblongis, apice obscure brunneo-auratis, rotundatis, incrassatis, usque ad 11 μ ., subconstrictis, 30-54 \approx 19-25; pedicello hyalino, sporam subæquante.

Hab. in foliis *Æluropi littoralis* et *Æ. macrostachyi*, in Caucaso, China, India.

324. **Puccinia atro-fusca** (Dudley et Thoms.) Holw. Journ. of Mycol. 2712

X (1904) p. 55. Ita vocandus est *Uromyces atro-fuscus* Dudley et Thomps. (1904) — Syll. XVII, p. 261 — teste Holway.

Puccinia alpina Bagnis, non Fuck. — **P. Asphodeli** Bagnis, non Du-
by — **P. Bellidis** Berk. — **P. difformis** Bon. — **P. exigua** Bagnis
— **P. Fabæ** Link — **P. fallens** Cke. — **P. favi** Ardst. — **P. Glau-**
cis van der Bosch. — **P. inquinans** Wallr. — **P. Lamyi** Fries —
P. mammillata Bagnis, non Schröt. — **P. minima** Bagnis — **P. mu-**
cronata Bagnis — **P. nerviphila** Grog. — **P. Œnanthes** Car. —
P. Oxyris Bagn. — **P. Populi-albæ** Riv. — **P. Scrophulariæ** Lib. —
— **P. suffulta** B. et Curt. — **P. tenuis** Bon. non Burr. — sunt
species v. dubiæ v. erroneæ, vix determinandæ. — Cfr. Syll. XX,
p. 639-640.

CALLIOSPORA Arthur in Botanical Gazette, vol. XXXIX, p. 390
(1905), North Amer. Fl. VII (1907) p. 159 (Etym. *callos* pulcri-
tudo et *spora*). — Teleutosori subepidermici, mox nudi. Teleuto-
sporæ bicellulares, septo transverso, tunica colorata, addito strato
externo hyalino, in aqua tumescente; pori germinativi bini in
quaque cellula, laterales. Pycnidia conica, subcutanea. Æcidia et
uredo non observata.

1. **Calliospora Diphsæ** Arthur, l. c. — Pycnidiis amphigenis, in gre- 2713
ges ramosos confertis, sæpe lineatis, bullatis v. hemisphæricis, le-
vibus, pallide brunneis, subcuticularibus, 100-175 μ . diam., peri-
physibus nullis; teleutosoris amphigenis et cauliculis, rotundatis v.
elongatis, 1-5 mm. long., mox nudis, nigricantibus, pulveraceis;
teleutosporis ellipsoideis, 45-50 \times 30-33, utrinque rotundatis, septo
non constrictis; tunica stratosâ, stratu interno obscure castaneo-
brunneo, 3-4 μ . cr., poris germinativis 2 in quaque cellula, late-
ralibus et oppositis, stratu externo pallide succineo, gelatinoso,
udo 3-4 μ . cr., sparse sed æqualiter verrucoso; pedicello dimidium
sporæ æquante v. longiore, hyalino, levi, supra firmo, basi sub-
bulboso udo tumescente et disrumpente.

Hab. in foliis *Diphsæ* *suberosæ*, Mexico.

2. **Calliospora Farlowii** Arthur, l. c. — Pycnidiis cauliculis v. nervi- 2714
colis, minutis, punctiformibus, flavo-brunneis, subcuticularibus, co-
noideis, 80-100 μ . diam., periphysibus 25-40 μ . long.; teleutosoris
cauliculis, linearibus, 2-3 mm. long., hypertrophias efficientibus,
confertis, sæpe confluentibus, mox nudis, cinnamomeo-brunneis,
pulveraceis; teleutosporis ellipsoideis 29-42 \times 18-24, utrinque ro-
tundatis, septo leniter v. non constrictis; membrana stratosâ, tu-

nica interna cinnamomeo-brunnea, 2-3 μ . cr., 2 poris germinativis lateralibus et oppositis prædita, externa gelatinosa, hyalina, etiam uda vix visibili, 1-1,5 μ . cr., minute verrucosa; pedicello hyalino, 6 μ . c. cr., brevi, deciduo.

Hab. in foliis caulibusque *Paroselæ domingensis*, Cuba et Mexico.

3. **Calliospora Holwayi** Arthur, l. c. — Pycnidiis epiphyllis, numerosis areas 2-7 mm. latas occupantibus, punctiformibus, flavo-auratis, dein brunneis, subcuticularibus, conoideis 80-125 μ . diam., periphysibus 45-65 μ . long.; teleutosoris epiphyllis sparsis, quandoque confluentibus, minutis, rotundatis, 0,3-0,7 mm. diam., theobromino-brunneis, subpulverulentis; teleutosporis ellipsoideis 40-51 \times 26-34, utrinque rotundatis, septo non v. leniter constrictis; tunica stratosata, tunica interna theobromino-brunnea, 3-4 μ . cr., 2 poris germinativis in quaque cellula lateralibus et oppositis, tunica externa hyalina, gelatinosa, uda 2-3 μ . cr., levi; pedicello hyalino, sporam subæquante, udo tumescente et disrumpente.

Hab. in foliis *Eysenhardtia amorphoidis* et *E. orthocarpæ*, Mexico.

4. **Calliospora Petalostemonis** Arth., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) pag. 588. — Pycnidiis plerumque hypophyllis, numerosis, sparsis, conspicuis, e flavo-aurato brunneis, subcuticularibus, conoideis, 80-110 μ . lat., periphysibus ostiolaribus 30-50 μ . long.; teleutosoris hypophyllis, sparsis, parvis, rotundatis 0,3-0,6 mm. cr., theobromino-brunneis, subpulverulentis; teleutosporis ellipsoideis 35-45 \times 23-29, utrinque rotundatis, ad septum non v. leniter constrictis, tunica stratosata, stratu interno castaneo-brunneo, 2-2,5 μ . cr., poris germinativis 2 in quoque loculo lateralibus et oppositis, externo gelatinoso, pallide flavo, subtenui 1-1,5 μ . minute et sparse verrucoso; pedicello colorato, 6 μ . c. diam., brevi et deciduo, in aqua immutabili.

Hab. in foliis *Petalostemonis oligophylli*, Pecos, New Mexico Amer. bor. (T. D. A. COCKERELL). — Ab *Uropyxide Petalostemonis* omnino diversa.

GOPLANA Raciborski. — Syll. XVI p. 318.

1. **Goplana mirabilis** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) p. 357. — Maculis rotundatis superne primo pallidis subtus albicantibus, dein arescentibus 0,5-1,5 cm. latis; mycelio primum epiphyllis dein etiam intracellulari; pseudoperidio presenti; teleutosporis levibus,

ovato-cylindræis, apice rotundatis, hyalinis v. flavidulis, tenue tunicatis, 32-65 \approx 9-11, rectis v. curvulis, basi septo tenui transverso limitatis, in folio mox germinantibus; sporidiolis late ovoideis, hyalinis, 10-14 \approx 8-12.

Hab. in foliis *Meliosmæ* sp., prope Buitenzorg in ins. Java.

2. **Goplana Aporosæ** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) p. 357, 2718 358. — Basidiis 50-62 \approx 7-9; sporidiolis hyalinis rotundato-ovoides, 7 μ . long. A *Gopl. Micheliæ* Rac., Syll. XVI, p. 319, differt præcipue pseudoperidio absenti.

Hab. in foliis *Aporosæ microcalycis*, prope Buitenzorg in ins. Java.

DIORCHIDIUM Kalchbr. — Syll. VII p. 736, IX p. 314, XIV p. 359, XVI p. 313, XVII p. 394.

1. **Diorchidium Koordersii** Th. Wurth, Hedwigia XLVII (1907) p. 74, 2719 et p. 128-129, c. icon. — Uredosoris hypophyllis, minutis, sparsis flavido-brunneis, mox nudis, circumcirca paraphysatis, paraphysibus incurvatis, 60 \approx 10, membrana introrsus usque ad 5 μ . incrassata, flavida; uredosporis ovoideis v. globulosis v. ellipsoideis, 19-30 \approx 19-26, minute aculeolatis, flavidis; poris 4?, indistinctis; teleutosoris minutis, sparsis, hypophyllis, raro epiphyllis, atro-brunneis, pulveraceis, paraphysatis; teleutosporis modo uredosporis sociatis, modo discretis, cuneatis, rotundatis vel obtuse polyedricis, bicellularibus, raro 1- v. 3-cellularibus, septo longitudinali, ad septum constrictis, 23-38 \approx 23-34; membrana brunnea, apice aliquid incrassata, minute inæqualiter verrucosa; poro in quaque cellula singulo, subapicali; pedicello hyalino, brevi, apice incrassato, facile deciduo.

Hab. in foliis *Derridis ellipticæ*, pr. Penoenggalan in ins. Java (KOORDERS).

2. **Diorchidium orientale** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 500. 2720 — Soris uredosporiferis epiphyllis, rotundatis vel oblongis, minutissimis, $\frac{1}{3}$ mm. longis, subinde confluentibus, epidermide diu tectis, flavo-brunneis; uredosporis elongato-ellipsoideis, subtilissime echinulatis, flavo-brunneis, 26-36 \approx 18-21, episporio tenuissimo; soris teleutosporiferis hypophyllis, sparsis vel aggregatis, rotundatis vel ellipticis, ca. $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ mm. diam., subinde confluentibus, atris; teleutosporis ellipsoideis, utrinque rotundatis, apice leniter incrassatis, levibus, obscure brunneis, 20-27 \approx 16-20, plorumque

exacte horizontaliter septatis et leniter constrictis; pedicello longiusculo, dilute flavo.

Hab. in foliis *Panici prostrati*, Chittagong Indiæ orient. (R. SEN., comm. E. J. BUTLER).

3. **Diorchidium levigatum** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 500. 2721

— Soris teleutosporiferis amphigenis, plerumque hypophyllis, maculis minutis pallidis insidentibus, sparsis vel paucis seriatim dispositis, minutis, rotundatis vel oblongis, ca. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ mm. longis, epidermide diutius tectis, primitus dilute brunneis, dein obscurioribus; teleutosporis plerumque verticaliter, raro oblique septatis, sæpe paullo altioribus quam latioribus, ad septum constrictis, quasi e duabus partibus lateraliter connexis compositis, apice vix v. parum incrassatis, levibus, flavo-brunneis, 21-30 \approx 18-28, episporio tenui; pedicello hyalino, tenui, sporam æquante.

Hab. in foliis *Oplismeni compositi*, Dehra Dun Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

CHRYSOMYXA Ung. — Syll. VII p. 759, IX p. 317, XI p. 209, XVI p. 319, XVII p. 396 et p. 460.

1. **Chrysomyxa Piperiana** (Arth.) Sacc. et Trott. *Melampsoropsis Pi-* 2722

periana Arth., North Amer. Flora VII (1907) p. 120. — Pycnidiiis et æcidiis ignotis; uredosoris hypophyllis, parvis, angulosis, congregatis v. solitariis, ceraceis, dein subpulverulentis; peridio nullo; uredosporis catenulatis, ex oblongo lanceolatis, 40-65 \approx 16-26, utrinque angustatis, acuminatis vel obtusis; tunica hyalina, crebre et grosse verrucosa, 1,5-2 μ . cr.; teleutosporis ignotis.

Hab. in foliis *Rhododendri californici*, Oregon, Washington Amer. bor.

2. **Chrysomyxa Dietelii** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 502. — Soris 2723

uredosporiferis hypophyllis, sine maculis, irregulariter sparsis, hemisphæricis, melleo-sulphureis vel stramineis, 250-350 μ . diam., peridio nullo; uredosporis catenulatis, forma variis, angulato-globosis subinde oblongis, verrucosis, subhyalinis, 17-30 \approx 12-18, subinde usque ad 35 μ . longis; soris teleutosporiferis hypophyllis, sparsis, subglobosis, minutissimis ca. 200 μ . diam., brunneolis; cellulis teleutosporarum in catenas longas conjunctis, oblongis, 17-26 \approx 7-9.

Hab. in foliis *Rhododendri arborei*, Kumaon Himalaya (leg. INAYAT, comm. E. J. BUTLER). — A *Chr. himalensi* omnino diversa.

3. **Chrysomyxa Ramischiae** Lagerh., Svensk Bot. Tidskrift III (1909) 2724 p. 26, fig. 1-3. — A *Chrysom. Pirolæ* differt generatione uredinea duplici, primaria vernali cum generatione teleutosporifera sæpe consociata; soris minutis, dense dispositis; secundaria æstivali soris majoribus sparsis cum soris teleutosporiferis non consociatis.
Hab. in foliis *Pirolæ secundæ*, in Suecia, Fennia, Rossia aliisque terris.
4. **Chrysomyxa urediniformis** J. Müller, Rostpilze, d. Rosa et Rubus 2725 (1886) p. 23-24, tab. II, fig. 10-11. — Soris hypophyllis 0,3-1 mm. diam., aureis, non epidermide tectis, aparaphysatis; sporis e piriformi globulosis, aureo-flavis, 21-27 \approx 17-20; teleutosporis (?) 1-cellularibus, 31 \approx 16-18, achrois, tunica sursum incrassatis, intus granulosis, vertice poro rotundo 4-5,5 μ . diam. præditis, levibus.
Hab. in foliis ramulisque *Rubi fruticosi*, in Germania. — Dubia species forte *Chr. albidæ* Kühn affinis v. status.
5. **Chrysomyxa Abietis** (Wallr.) Ung. — Syll. VII, p. 762. — Huc 2726 spectat, teste cl. Neger in litt., *Sphaeria navicularis* Wallr. — Syll. II, p. 442 (nomen).

COLEOSPORIUM Lévl. — Syll. VII p. 751, IX p. 317, XI p. 208, XIV p. 362, XVI p. 316, XVII p. 397, 460.

1. **Coleosporium Evodiæ** Diet., Ann. Mycol. VII (1909) p. 355. — 2727
Uredosoris hypophyllis, sparsis, aurantiacis pulverulentis, nudis; uredosporis globosis v. subglobosis 20-26 μ . latis, usque ad 30 μ . longis, dense verrucosis, aurantiacis; teleutosporis ignotis.
Hab. in foliis *Evodiæ meliæfoliæ*, Kodurutsu Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA).
2. **Coleosporium Microrhamni** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 308. 2728
— Soris hypophyllis sparsis vel irregulariter aggregatis, maculis flavidulis insidentibus, parvis, uredosporiferis aureis, postea expallescentibus nudis; uredosporis ellipsoideis vel subglobosis 19-27 \approx 17-21, episporio hyalino echinulato præditis, contentu aureo; soris teleutosporiferis ceraceis aurantiacis, interdum confluentibus, ca. 85 μ . altis; teleutosporis cylindraceis v. clavatis, 3-septatis, 15-25 μ . latis, usque ad 70 μ . longis.
Hab. in foliis *Microrhamni franguloidis*, Tokio Japoniæ (N. NAMBU).
3. **Coleosporium Begoniæ** Arth., North Amer. Fl. VII (1907) p. 86. 2729
— Uredosoris hypophyllis, sparsis, 0,5 mm. diam., mox nudis, e flavo albicantibus, pulveraceis; uredosporis ellipsoideis v. subglo-

bosis, plerumque subangulosis, 26-29 \times 15-19; tunica tenui, verrucoso-papillata; teleutosoris hypophyllis, in greges orbiculares vel angulosos 3-8 mm. diam., quandoque nervis limitatis, centrifuge evolutis, dense confertis, parvis usque ad 0,25 mm. latis, pulvinatis, e flavo-aurantiacis pallide flavis; teleutosporis tunica supra usque ad 15-20 μ . incrassata, oblongis, 38-58 \times 15-21, utrinque rotundatis v. obtusatis, subtus non v. anguste attenuatis, contentu e flavo-aurantiaco hyalino.

Hab. in foliis *Begoniæ* sp. Mexico.

4. **Coleosporium ribicola** (C. et E.) Arthur, North Amer. Fl. v. VII 2730 (1907) p. 86. Huc spectant *Uredo ribicola* C. et E. — Syll. VII p. 859 — *U. Jonesii* Peck — Syll. VII, p. 852. — Teleutosoris hypophyllis uredosoris conformibus, sparsis v. in parvos greges confertis et in maculis flavis conspicuis insidentibus, 0,5 mm. diam., e rubro flavo-aurantiacis v. pallide flavis; teleutosporis tunica supra 15-25 μ . incrassata, teretibus, 48-60 \times 17-22, utrinque rotundatis v. acutatis, contentu ex aurantiaco-flavo pallide flavo.

Hab. in foliis *Ribis inebriantis*, *leptanthi*, *longifolii*, *pumili*, *Purpusii*, Colorado, New Mexico Amer. bor.

5. **Coleosporium Steviæ** Arthur, Bat. Gaz. XL (1905) p. 197; North Amer. Fl. v. VII (1907) p. 90. — Uredosoris hypophyllis, irregulariter sparsis, 0,25-0,5 mm. cr., mox nudis, e flavido albis; uredosporis ex ellipsoideo flavis, plus minusve angulosis, 26-35 \times 18-23, tunica subtenui, 1,5-2 μ ., minute verrucosa; teleutosoris hypophyllis, irregulariter sparsis, sæpe confluentibus, 0,25-0,5 mm. diam., sublevatis, ex aurantiaco-flavo pallide flavis; teleutosporis tunica sursum 30-40 μ . cr., contentu ex aurantiaco-flavo subhyalino, cylindraceutis, 50-75 \times 12-19, utrinque rotundatis vel truncatis.

Hab. in foliis *Steviæ monardæfoliæ*, *reglensis*, *rhombifoliæ*, *salicifoliæ*, *trachelioidis*, *viscidæ* in Mexico.

6. **Coleosporium Terebinthinaceæ** (Schw.) Arthur, North Amer. Fl. VII (1907) p. 93. Huc ducenda est *Uredo Terebinthinaceæ* Schw. — Uredosoris hypophyllis, sparsis, 0,25-0,5 mm. diam., mox nudis, e flavo-aurantiaco albis; uredosporis globosis 16-27 \times 12-21, tunica 1,5-2 μ . cr., dense verrucosa; teleutosoris hypophyllis, sparsis, usque ad 0,5 mm. diam. e flavo-aurantiacis pallide flavis, subelevatis; teleutosporis tunica sursum usque ad 20-30 μ . cr., contentu e flavo-aurantiaco subhyalino, oblongis v. cylindraceutis, 48-64 \times 17-22, utrinque truncatis v. rotundatis.

Hab. in foliis *Parthenii integrifolii*, *Polymniæ maculatae*, *Silphii terebinthinacei* etc. in Amer. bor.

7. **Coleosporium occidentale** Arth., North Amer. Fl. VII (1907) p. 94. 2733

— Uredosoris hypophyllis, sparsis v. subgregariis, parvis, 0,25-0,5 mm. diam., mox nudis, e flavo albescentibus; uredosporis late ellipsoideis, 25-33 \times 16-22, tunica 1,5-2 μ . cr., verrucosa; teleutosoris hypophyllis, sparsis, parvis, 0,25 mm. cr.; sublevatis, e flavo-aurantiaco pallide flavis; teleutosporis tunica sursum 15-20 μ . cr., contentu flavo-aurantiaco subhyalino, oblongis v. clavato-oblongis, 50-72 \times 17-20, supra rotundatis v. truncatis, basi rotundatis v. obtusis.

Hab. in foliis *Senecionis hydrophiloidis*, Washington Amer. bor.

8. **Coleosporium (Uredo) Eupatorii** Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII 2734

(1906) p. 31; North Amer. Fl. v. VII (1907) p. 90. — Uredosoris plerumque hypophyllis, sparsis, rotundatis, parvis, 0,25 mm. lat., mox nudis, pulveraceis, e flavo albidis; uredosporis breviter ellipsoideis v. globoideis, 22-27 \times 15-20, tunica decolorata, 2-2,5 μ . cr., medietate tantum tuberculis deciduis longiusculis prædita; teleutosoris ignotis.

Hab. in foliis *Eupatorii macrophylli* et *Eupatorii Collini*, Cuba, Nicaragua, Amer. centr.

9. **Coleosporium arnicale** Arth., North Amer. Fl. VII (1907) p. 94. 2735

— Uredosoris hypophyllis, gregariis v. sparsis, latis, usque ad 1 mm. diam., mox nudis, flavo-aurantiacis; uredosporis ellipsoideis v. globosis, 22-33 \times 22-27, tunica 2-3 μ . cr., crebre et minute verrucosa et tuberculis deciduis prædita; teleutosoris ignotis.

Hab. in foliis *Arnicae canæ*, Washington Amer. bor.

10. **Coleosporium Dahliaë** Arthur, Bot. Gaz. XL (1905) p. 197; North 2736

Amer. Fl. v. VII (1907) p. 93. — Uredosoris hypophyllis, irregulariter sparsis, usque ad 0,5 mm. cr., mox nudis, e flavo albis; uredosporis irregulariter ellipsoideis, 24-30 \times 16-22, tunica subtenui, 2 μ ., crasse et crebre verrucosa; teleutosoris hypophyllis, irregulariter sparsis, quandoque confluentibus, 0,5 mm. c. cr., e nitide flavo-aurantiacis pallide flavis; teleutosporis tunica sursum 10-20 μ . incrassata, contentu e nitide aurantiaco-flavo pallide viridi-flavo, oblongis, 45-70 \times 18-21, utrinque rotundatis.

Hab. in foliis *Dahliaë variabilis*, in Mexico.

11. **Coleosporium Saussureæ** Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1905) 2737

p. 588. — Soris minutis, 0,25 mm. latis v. minoribus, sæpe circa

sorum centralem circulariter dispositis, hypophyllis; uredosporis ellipsoideis, $25 \approx 21$, dense verrucosis; teleutosporis cylindraceis, $75 \approx 15-20$.

Hab. in foliis *Saussureæ japonicæ*, Akinokawa, Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA).

12. **Coleosporium Laciniariæ** Arthur., North Amer. Fl. VII (1907) 2733 p. 90. — Uredosporis amphigenis, sparsis, latis, 1 mm. diam., mox nudis, e flavo sordide albis; uredosporis subellipsoideis v. globosis, $24-35 \approx 18-23$, tunica subtenui, $1,5 \mu.$, crebre et crasse verrucosa; teleutosporis amphigenis, quandoque cauliculis, sparsis, sæpe confluentibus, subelevatis, rubro-aurantiacis; teleutosporis tunica supra usque ad $30-40 \mu.$ cr., contentu aurantiaco-flavo dein hyalino, clavatis v. oblanceolatis, $58-77 \approx 16-21$, supra obtusis v. quandoque angustatis, deorsum distincte angustatis.

Hab. in foliis *Laciniariæ Chapmanii* et *graminifoliæ*, Florida et Alabama Amer. bor.

13. **Coleosporium Helianthi** (Schw.) Arthur, North Amer. Fl. v. VII 2739 (1907) p. 93, *Coleosporium Viguiæ* Diet. et Holway. — Syll. XIV, p. 362 — *Col. Verbesinæ* Diet. et Holw. — Syll. XVII, p. 397. — Huc ducendum est *Cæoma* (Uredo) *Helianthi* Schw. — Syll. VII, p. 850.

14. **Coleosporium Tussilaginis** (Pers.) Léveillé sec. Tulasne in Ann. 2740 Sc. nat. 4 ser. Bot. II, p. 136 (1854), *Uredo Tussilaginis* Pers., Schumacher, *Coleosporium Sonchi* Auct. — Sacc. Syll. VII p. 752 p. p. — *Æcidiis* (*Peridermium Plowrightii* Klebh.) cæteris similibus; æcidiosporis plerumque ovoideis, paucis angustatis, multis rotundatis, $15-35$ (plerumque $20-30$) $\approx 15-24$, tunica $2-2,5$ cr., verruculis minutis tecta; uredosporis rotundato-ovoides, subirregularibus, $23-28 \approx 17-21$, tunica crassiuscula, verrucis crassiusculis; teleutosporis prismaticis, usque ad $140 \mu.$ long. $18-28 \mu.$ cr., tunica apice $18-21 \mu.$ et ultra incrassata.

Hab. æcidia in foliis *Pini silvestris*, uredo- et teleutosporæ in foliis *Tussilaginis Farfaræ*, in Europa.

15. **Coleosporium Petasitidis** (DC.) Thümen, Myc. Univ. n. 541 (1876), 2741 *Uredo Petasitidis* Fl. franc. II, p. 236 (1805). *Coleosporium Sonchi* Auct., — Syll. VII, p. 752 p. p. — *Æcidiis* (*Peridermium Boudieri* Ed. Fisch., *P. Dieteli* Wagn.) ceteris omnino similibus; uredosporis sparsis primum epidermide tectis dein pulveraceis, aurantiacis; uredosporis ellipsoideis v. ovoideis, $21-32$ (raro usque ad 42) $\approx 14-21$; tunica tenui, hyalina verruculis crebris æqualibus ob-

sita; teleutosoris crustas minutas rubras efformantibus; teleutosporis prismaticis usque ad 100 μ . long., 18-24 μ . diam., tunica apice usque ad 14 μ . cr.

Hab. æcidia in foliis Pini silvestris, uredo- et teleutosporæ in foliis Petasitidis albi, nivei, officinalis, spurii etc., in Europa.

16. **Coleosporium Inulæ** (Knze) Ed. Fischer, Naturf. Gesell. Bern, Sitzb. 2742 28 April (1894); Bull. Soc. bot. Fr., 41, p. CLXIX (1894); Entwicklungsgesch. Untersuch. üb. Rostpilze, in Beitr. z. Kryptogamenfl. d. Schweiz, Bd. I, Hft I, Bern, 1898; *Uredo Inulæ* Kunze, an *Coleosporium Inulæ* Rabenhorst, Bot. Zeitg. (1851) p. 455. — *Æcidiis* (*Peridermium Klebahnii* Ed. Fisch.) peridio pustulato applanato 2 mm. circ. longo et usque ad 2 mm. prominenti præditis; æcidiosporis plerumque anguste ovoideis 32-42 \times 21-24, tunica 2 μ . cr., subæqualiter et crebre aculeis usque ad 3 μ . long. obsita, sed uno latere aculeis brevioribus et tunc tunicam punctulatam efficientibus; cellulis peridialibus elongato-hexagoniis 50-70 \times 20-25, exosporio fortiter incrassato aculeato, endosporio tenuiori, verruculoso; uredosoris hypophyllis, sparsis, aurantiacis; uredosporis plerumque ellipsoideis, 21-25 \times 18-21, tunica tenui, crebre regulariterque verrucosa; teleutosoris hypophyllis, subepidermicis, crustas rubras parvas efformantibus; teleutosporis 100 \times 18-24, membrana apice usque ad 18 μ . incrassata.

Hab. æcidia in foliis Pini silvestris, uredo- et teleutosporæ in foliis Inulæ ensifoliæ, I. hirtæ, salicinæ, Vaillantii, viscosæ, Helenii, etc. in Europa.

17. **Coleosporium Cacaliæ** (DC.) Fuckel, Jahrb. Nass. Ver. Naturh. 2743 XXIII-XXIV (1878) pag. 43, *Puccinia Cacaliæ* DC., Syn. plant. p. 46 (1806), *Coleosporium Sonchi* Auct. — Syll. VII, p. 752 p. p. — *Æcidiis* (*Periderm. Magnusianum* Ed. Fisch., *Perid. Magnusii* Wagn.) ceteris specierum proximarum similibus; uredosoris rotundatis, primum epidermide tectis, aurantiacis, pulveraceis; uredosporis ellipsoideis, 24-35 \times 21-24, tunica hyalina tenui, distincte aculeolato-verrucosa; teleutosporis hypophyllis crustas ceraceas rubescentes efformantibus, prismaticis, usque ad 140 μ . long., 18-25 μ . cr., tunica apice usque ad 28 μ . incrassata.

Hab. æcidia in foliis Pini silvestris et P. montanæ, in Europa Media, uredo- et teleutosporæ in foliis Adenostylidis albidæ, A. albifrontis, A. alpinæ, Cacaliæ hastatæ etc. in Europa.

18. **Coleosporium Sonchi-arvensis** (Pers.) Léveillé — Sacc. Syll. VII, 2744 p. 752, p. p. — *Æcidiis* (*Peridermium Fischeri* Klebh.); *æcidiosp.* e breviter ellipsoideo obtuse polygoniis, 25-32 \times 18-25, tunica hyalina usque ad 2 μ . cr., aculeolato-verrucosa; cellulis peridialibus tunica extus incrassata punctulata, intus tenuiori verruculosa; uredosporis rotundato-ovoideis subirregularibus, 18-25 \times 15-21, tunica tenui minute, crebre distincteque verruculosa; teleutosporis crustas applanatas rubras efformantibus, prismaticis usque ad 100 μ . long., 18-24 μ . cr., tunica apice usque ad 18 μ . cr.

Hab. *æcidia* in foliis Pini silvestris, uredo- et teleutosporæ in foliis Sonchi arvensis, asperi, fallacis, oleracei, palustris etc. in Europa.

19. **Coleosporium Melampyri** (Rebent.) Karsten, Myc. fenn. IV, p. 62 2745 p. p. (1879), *Uredo Melampyri* Rebent. Fl. Neomark. p. 355 (1804), *Col. Euphrasiæ* Auct. — Sacc. Syll. VII, p. 754 p. p. — *Æcidiis* (*Peridermium Soraueri* Klebh.) peridio pustuliformi præditis et illis specierum proximarum similibus; uredosporis ex ellipsoideo polygoniis 24-35 \times 21-28, tunica hyalina, tenui, verrucis crassiusculis tecta; teleutosporis rubris, ceraceis; teleutosporis prismaticis, usque ad 115 \times 21-28, tunica apice usque ad 28 μ . incrassata.

Hab. *æcidia* in foliis Pini silvestris et montanæ, Europa media, uredo- et teleutosporæ in foliis Melampyri cristati, nemorosi, pratensis, silvatici etc. in Europa.

20. **Coleosporium Datiscæ** W. Tranzsch. in Woronow, Contrib. ad 2746 mycofloram Caucasi, Tiflis (1910) p. 147 et in Mycotheca rossica fasc. I, n. 16 (1910). — Soris hypophyllis v. cauliculis, sparsis, uredosporiferis aurantiacis, siccis sulphureis, pulveraceis, epidermide fissa cinctis; teleutosporiferis (siccis) aurantiaco-badiis, ceraceis; uredosporis ellipsoideis v. subglobosis, 20-30 \times 15-20, episporio verrucoso achroo præditis; teleutosporis 65-90 \times 15-20, apice usque ad 23 μ . incrassatis, demum quadrilocularibus, contentu (sicco) luteo.

Hab. in foliis Datiscæ cannabinæ, in Caucaso occidentali Kutais et Batum (N. SREDINSKY, G. WORONOW).

21. **Coleosporium Campanumæ** Dietel., in Engl. Jahrb. XXXVII 2747 (1905) p. 106. — Uredosporis hypophyllis, sparsis, parvis v. mediocribus, aureis, denique albidis, uredosporis globosis v. late ellipsoideis 18-23 \times 14-18, subtiliter verrucosis; teleutosporis conformibus, crustaceis, sanguinolentis; teleutosporis cylindræis, usque ad 70 μ . long., 15-20 μ . latis.

Hab. in foliis *Campanumæ javanicæ*, Tosa Japoniæ (YOSHINAGA).

22. *Coleosporium Pæderiæ* Diet., Ann. Mycol. VII (1909) p. 355. — 2748

Uredosoris hypophyllis, sparsis, aureis, planis, nudis, pulverulentis; uredosporis oblongis v. ellipsoideis, 22-28 \times 13-21, verrucosis aureis; teleutosporis non visis.

Hab. in foliis *Pæderiæ tomentosæ*, Hane-mura Tosa Japoniæ (K. OGAWA).

23. *Coleosporium Salviæ* Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 106. 2749

— Maculis indeterminatis v. nullis; uredosoris hypophyllis, minutis, aureis, in sicco albidis, sparsis v. circinatim dispositis; uredosporis catenulatis, ellipsoideis vel oblongis, 22-30 \times 15-21, raro usque ad 35 μ . long., episporio hyalino-verrucoso indutis; teleutosporis ignotis.

Hab. in foliis *Salviæ japonicæ* var. *bipinnatæ*, Tokyo Japoniæ (NAMBU).

24. *Coleosporium brasiliense* Diet., Ann. Mycol. V (1907) p. 246. — 2750

Soris uredosporiferis hypophyllis et cauliculis, sparsis, epidermide convexa brunnea primo clausa, deinde apice aperta inclusis; uredosporis catenulatis ellipsoideis vel subglobosis, 28-37 \times 21-29, verrucosis; teleutosporis ignotis.

Hab. in foliis *Labiatae* cujusdam, Sao Paulo Brasiliæ (A. USTERI). — Teleutosporæ nondum cognitæ.

25. *Coleosporium Merrillii* P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 251. 2751

— Maculis fuscis effusis; uredosoris hypophyllis, sparse gregariis, pulvinatis, epidermide flavida tectis dein velatis; uredosporis subglobosis v. ellipsoideis, flavo-fuscidulis v. hyalinescentibus dense verrucosis, 13-25 \times 10-20; teleutosoris hypophyllis gregariis, compactis, ceraceis, rufo-brunneis, rotundato- vel oblongo-pulvinatis; teleutosporis clavatis, vertice rotundatis, 3-septatis haud constrictis pallidis, 50-100 \times 17-25.

Hab. in foliis *Orchidaceæ*, Luzon, Prov. Beuguet, Baguio, ins. Philipp. (MERRILL).

ROSTRUPIA Lagerh. — Syll. IX p. 316, XI p. 208, XIV p. 361, XVI p. 315.

1. *Rostrupia Miyabeana* S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. Univ. t. III (1909) p. 243, tab. XII, fig. 8. — 2752

Uredosoris amphigenis, plerumque epiphyllis, minutis v. ellipsoideis, sparsis vel gregariis in areis brunneo-decoloratis, nudatis pulverulentis, au-

rantiis; uredosporis globosis subglobosis v. late ellipsoideis, echinulatis, 18-28 \approx 14-16, episporio 1-2 μ . v. 3 μ . cr., hyalino v. subhyalino, paraphysibus nullis; teleutosporis hypophyllis v. vaginicolis, minutis, oblongis v. sublinearibus, sparsis v. subgregariis, diu epidermide tectis, subinde confluentibus, pulvinatis, nigris; paraphysibus brunneis soros in minutas areolas dividitibus; teleutosporis cylindricis v. oblongo-clavatis, apice leviter incrassatis (3-5 μ .) truncatis v. oblique acutatis, rarius rotundatis, basi attenuatis vel rotundatis, bi-quadriseptatis ad septa non vel vix constrictis, levibus, nigricanti-ferrugineis, apice saturatoribus, 32-52 \approx 15-24; pedicellis brevibus, brunneis, subdeciduis.

Hab. in foliis vaginisque *Brachypodii japonici* et *B. pinnati*, in Japonia.

PHRAGMIDIUM Lk. — Syll. VII p. 742, IX p. 315, XI p. 206, XVI p. 316, XVII p. 399.

1. **Phragmidium Potentillæ** (Pers.) Karst. — Syll. VII, p. 743. — 2753
var. **Alchemillæ** Ferraris, Reliq. Ces. in An. R. Ist. bot. Roma IX, fasc. 3 (1902) p. 208. — A typo differt præcipue pedicello basi incrassato nec æquali.

Hab. in foliis *Alchemillæ pentaphyllæ*, Sciolze Pedemontii in Italia bor. (CESATI).

2. **Phragmidium americanum** (Peck) Diet., Hedwigia XXXIV (1905) 2754 p. 124, tab. IV, fig. 5, Arthur in Torreyia IX (1909) p. 22, cum icone; *Phragmidium mucronatum* var. *americanum* Peck, 28 Rep. (1876) p. 86. — Dignoscitur præsertim teleutosporis 8-10 interdum 11-ocularibus, 90-110 \approx 25-30, apiculatis, saturate brunneis, septis valde approximatis; pedicello spora paullo longiore, crasse obclavato; uredosporis elliptico-ovoideis, muriculatis.

Hab. in foliis *Rosarum*, e. gr. *Rosæ blandæ*, *R. lucidæ*, *R. Sayi* in Maryland Amer. bor. (WARNE).

3. **Phragmidium retanjense** Bubák et Ranojevic, Ann. Mycol. VIII 2755 (1910) p. 374. — Uredosporis hypophyllis, parvis, 100-200 μ ., paraphysibus limitatis, aurantiacis; uredosporis globosis, ovoideis v. breviter ellipsoideis, 19-27 \approx 13-23, tunica crassiuscula, minute verruculosa, contentu aurantiaco; stipite brevi, 5,5-7,5 μ . cr.; paraphysibus validis, brevibus, clavato-incrassatis, fortiter curvatis; teleutosporis hypophyllis, minutis, sparsis, hinc inde confluentibus, brunneo-nigris; teleutosporis cylindræis, basi rotundatis, cellula apicali longiore, conoidea v. conico-rotundata, apiculo 3,5-10 μ . præ-

dita, 90-120 \times 32-38, pallide castaneo-brunneis, tenuiter tunicatis, verrucosis, plerumque 7-9-ocularibus raro 2-6-ocularibus; pedicello hyalino, apice flavido, 90-130 μ . longo, basi incrassato ibique contentu flavido-aurato prædito.

Hab. in foliis *Rosæ spreteæ*, Mt. Rtanj, 1400 m. alt. in Serbia. — *Phr. Rosæ-alpinæ* affinis.

4. **Phragmidium Rosæ-acicularis** Liro in *Uredinæ Fennicæ*, p. 428 2756 (1908). — *Æcidiis* aurantiacis, sæpe confluentibus et tunc 5-30 mm. longis; *æcidiosporis* globoso-ellipsoideis, 24-30 \times 15-22; *isoris* uredo- et teleutosporiferis plerumque hypophyllis, punctiformibus, 0,1-0,5 mm. diam.; teleutosporis 6-12-cellularibus, brunneis, 50-90 \times 22-24.

Hab. in foliis et ramis *Rosæ acicularis*, in Fennia.

5. **Phragmidium Rosæ-moschatæ** Diet., *Hedwigia* XLIV (1905) p. 132. 2757 — *Soris* in maculis flavis, minutis, sparsis, hypophyllis; *uredosporis* aurantiacis, teleutosporis nigris; *uredosporis* obovatis, ellipsoideis v. subglobosis, episporio tenui verrucoso vestitis, 23-26 \times 20-22; paraphysibus curvatis circumdatis; teleutosporis cylindratis utrinque rotundatis, apice papilla minuta v. elongata hyalina ornatis, grosse tuberculatis, obscure olivaceo-brunneis, 5-10-ocularibus, usque ad 125 \times 28-36; pedicello longo, deorsum incrassato, hyalino v. superne dilute olivaceo.

Hab. in foliis *Rosæ moschatæ*, Simla Himalaya (A. BARCLAY).

6. **Phragmidium Butleri** Syd., *Ann. Mycol.* V (1907) p. 501. — *Soris* 2758 *uredosporiferis* hypophyllis, maculis flavidis insidentibus, sparsis, minutis, aurantiacis; *uredosporis* globosis, subglobosis, ovatis vel ellipsoideis, verrucosis, flavidis, 18-28 \times 15-20, episporio 1 $\frac{1}{2}$ -2 μ . crasso, paraphysibus clavatis hyalinis curvatis circumdatis; *isoris* teleutosporiferis conformibus, atris; teleutosporis cylindratis, utrinque rotundatis, apice papilla minuta vel elongata hyalina ornatis, grosse tuberculatis, olivaceo-brunneis, 4-6-septatis (ut plurimum 5-septatis), 55-90 \times 24-28; pedicello hyalino v. dilute flavido, deorsum incrassato, usque ad 110 μ . longo.

Hab. in foliis *Rosæ macrophyllæ*, Kumaon Himalaya, Indiæ orientalis (leg. INAYAT, comm. E. J. BUTLER). — Ab affini *Phragm. Rosæ-moschatæ* differt teleutosporis magis atris et plerumque 7-septatis.

7. **Phragmidium montivagum** Arth., *Torreyia* IX (1909) p. 24, cum 2759 icone. — *Pycnidiis* amphigenis in greges dispositis, inconspicuis,

80-112 μ . diam., 30-35 μ . alt.; æcidiis hypophyllis v. petiolicolis 0,4-1,5 mm. latis, sæpe confluentibus, applanatis; paraphysibus conspicuis, marginalibus; æcidiosporis subglobosis vel ellipsoideis 16-19 \approx 21-26, episporio subhyalino, 1,5-2 μ . cr., verruculoso; uredosoris hypophyllis, numerosis, minutis, rotundatis; paraphysibus cylindræis v. clavatis, marginalibus; uredosporis obovato-oblongis, 19-23 \approx 16-19, episporio dilute flavo, 1-1,5 μ . cr., verrucoso-echinulato; teleutosoris hypophyllis, numerosis sparsis; teleutosporis cylindræis 64-96 \approx 24-29, verrucosis, 5-8-septatis, loculo terminali apiculo conoideo hyalino 7-10 μ . longo ornato; pedicello superne 7-9 μ . diam., infra incrassato, oblanceolato vel ellipsoideo, 15-30 μ . lato.

Hab. in foliis Rosæ Sayi, Wyoming Amer. bor. (AVEN NELSON).

8. **Phragmidium Rosæ-californicæ** Diet., Hedw. XLIV (1905) p. 131. 2760

— Æcidiis hypophyllis in maculis rubiginosis v. flavis; æcidiosporis subglobosis v. late ellipsoideis, interdum angulatis, 22-25 \approx 20-22, crasse tunicatis, verrucosis; paraphysibus latis clavatis circumdatis, uredosoris in maculis flavis, minimis, numerosis sparsis, uredosporis ellipsoideis v. subglobosis, episporio verrucoso subcrasso donatis, 20-22 \approx 17-20; teleutosoris minimis, sparsis; teleutosporis elongato-ellipsoideis, cylindricis vel fusoides, plerumque 6-10-ocularibus, rarius ultra, usque ad 105-125 \approx 28-35, opace brunneis, verrucosis, apice papilla hyalina, interdum elongata ornatis; pedicello hyalino basi incrassato instructis.

Hab. in foliis Rosæ californicæ, in California.

9. **Phragmidium Rosæ-lacerantis** Diet., Hedw. XLIV (1905) p. 336. 2761

— Æcidiis hypophyllis, circularibus, pulverulentis; æcidiosporis globosis, 25-30 μ . diam., v. ellipsoideis, 28-33 \approx 22-25, episporio 2,5 μ . cr., dense verrucoso; uredosoris hypophyllis, maculis flavis insidentibus, minutis; uredosporis piriformibus v. obovatis, 25-35 \approx 17-22, episporio verruculoso introrsum prominentiis hemisphæricis instructo; paraphysibus cylindricis arcuatis circumdantibus; teleutosoris hypophyllis, circa æcidia sæpius erumpentibus, nigris, usque ad 6 mm. lat., irregularibus, pulverulentis; teleutosporis sæpius cylindricis, utrinque rotundatis 5- usque ad 8-ocularibus, usque ad 115 \approx 30-40 (sine apiculo), vertice apiculo longo hyalino ornatis, episporio obscure brunneo, verrucis validis dense confertis instructo; pedicello longo, clavato hyalino.

Hab. in foliis Rosæ lacerantis, in Persia australi-orient.

10. **Phragmidium Rosæ-multifloræ** Diet., Hedw. XLIV (1905) p. 132. 2762

— *Æcidiis* in petiolis nervisque primariis foliorum tumores convexos efficientibus, pulvinatis, elongatis, magnis, rarius foliiculis circularibus; *æcidiosporis* ellipsoideis v. elongato-obovatis, rarius globosis, $21-34 \times 15-22$, episporio asperulo, 2μ . cr.; *uredosporis* ellipsoideis v. subglobosis, $20-25 \times 16-20$, episporio subtiliter verrucoso, sublevi; *teleutosporis* cylindricis, utrinque rotundatis, apice papilla conica flavo-brunnea ornatis, verrucosis, opaco-brunneis 5- usque ad 8-ocularibus, usque ad $112 \times 23-28$; pedicello gracili levi, deorsum incrassato, superne flavo-brunneo.

Hab. in foliis petiolisque *Rosæ multifloræ*, in Japonia (S. KUSANO).

11. **Phragmidium Rosæ-setigeræ** Diet., Hedw. XLIV (1905) p. 131. 2763

Soris hypophyllis minutis, sparsis; *uredosporis* ellipsoideis v. subglobosis, $22-26 \times 17-20$, episporio tenui, breviter echinulato; *teleutosporis* plerumque cylindricis v. basim versus paullo attenuatis, subimpellucide brunneis, verrucosis, apice papilla hyalina ornatis, plerumque 8-10-ocularibus, rarius ultra, usque ad $120 \times 25-32$; pedicello hyalino, longo, deorsum incrassato.

Hab. in foliis *Rosæ setigeræ* et *R. Carolinæ*, in Amer. bor.

12. **Phragmidium Rosæ-arkansanæ** Diet., Hedw. XLIV (1905) p. 333. 2764

— *Maculis* flavis v. nullis; *soris* hypophyllis sparsis, minutis, *uredosporis* aureis, *teleutosporis* nigris; *uredosporis* globosis v. late ellipsoideis $17-20,5 \mu$. diam., verrucosis, episporio æquali, $1,5 \mu$. cr., donatis, paraphysibus clavatis introrsum curvatis circumdatis; *teleutosporis* elongato-ellipsoideis, v. cylindraceutis, utrinque rotundatis et apice papilla hyalina minuta v. in apiculum cylindricum elongata ornatis, verrucosis, obscure brunneis, plerumque 5- usque ad 8-ocularibus, usque ad $90 \times 25-33$; pedicello hyalino inferne inflato.

Hab. in foliis *Rosæ arkansanæ*, in Amer. bor., non raro. 2765

13. **Phragmidium Rubi** (Pers.) Wint. — Syll. VII, p. 745. — Var.

Candicantium Vleugel, Svensk Bot. Tidskr. Bd. II (1908) p. 136, cum icone. — *Uredosporis* hypophyllis, minutis, tenuibus, sparsis; *uredosporis* ex ovoideo globulosis, $21-26 \times 18-21$, sæpius 23×18 ; paraphysibus clavatis circumdatis, membrana $2-3 \mu$. cr., muriculata, poris subquaternis; *teleutosporis* hypophyllis minutis, sparsis v. subconfluentibus, nigris; *teleutosporis* 5-8-cellularibus, plerum-

que 7-8-cellularibus, cylindræis, minute hyalino-papillatis, usque ad $112 \approx 31-42$, poris in quaque cellula subquaternis; pedicello sporam paullo superante, deorsum incrassato.

Hab. in foliis Rubi fruticosi varr. thyrsoidei, subvelutini, Grabowski, candicantis fm. rosacei, in Suecia, Norvegia, Germania.

14. **Phragmidium Rubi-saxatilis** Liro, in Uredinæ Fennicæ, p. 421 2766 (1908). — *Æcidiis* (*Cæoma*) amphigenis, sparsis, rotundatis, ca. $1\frac{1}{2}$ mm. diam., secus nervos productis et usque ad 5 mm. longis; *æcidiosporis* globosis vel late ellipsoideis, $15-23 \approx 14-20$, verrucosis, episporio $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{2}$ μ . crasso, poris germinationis 3-6 instructis; uredo- et teleutosoris punctiformibus, hypophyllis; teleutosporis ut in *Phragmidio Rubi*.

Hab. in foliis Rubi saxatilis, in Fennia. — Cl. Liro l. c. p. 580 nomen speciei mutavit in *Phr. perforans* (Dietr.) Liro.

15. **Phragmidium saxatile** Vleugel, Svenks Bot. Tidskr. Bd. II (1908) 2767 p. 137, cum icone. — *Cæomosoris* hypophyllis solitariis v. aggregatis, 0,5 mm. diam., paraphysibus cylindræis, æqualibus obvalatis; *cæomosporis* e globoso ellipsoideis, $23-29 \approx 20-26$, membrana 2-3 μ . cr., laxe grosseque muriculatis; poris circ. 7; uredosoris hypophyllis, minutis; uredosporis subellipsoideis, $23-29 \approx 21-23$, tunica 2,5 μ . cr., minute aculeolata; poris non visis; teleutosoris hypophyllis, minutis, sparsis, nigris, convexulis; teleutosporis 5-9- sæpius 6-7-cellularibus, $117 \approx 29-34$, membrana tenui, brunnea verrucis minutis hyalinis conspersa; poris in quaque cellula subquaternis; pedicello spora paullo longiore, hyalino, deorsum inflato.

Hab. in foliis Rubi saxatilis et R. castorei in Austria, Bohemia, Suecia, Fennia.

16. **Phragmidium Rubi-odorati** Diet., Hedwigia XLIV (1905) p. 131. 2768 — *Soris* hypophyllis, minutis, sparsis, nudis, uredosoris aureis, teleutosoris nigris; uredosporis ellipsoideis v. subglobosis $18-22 \approx 16-17$, verrucosis v. subaculeolatis; teleutosporis plerumque 7-10-ocularibus, $100 \approx 30-35$: verrucosis, cylindricis, utrinque rotundatis vertice apiculum obtusum usque ad 20 μ . longum gerentibus, opace brunneis; pedicello longo clavato hyalino.

Hab. in foliis Rubi odorati, in America boreali.

17. **Phragmidium gedeanum** (Rac.) Sacc. et Trott. *Hamaspora gedeanum* 2769 Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1907) p. 275. — Teleutosoris hypophyllis in maculis flavo-aurantiacis 0,5 mm. lat. insidentibus, paraphysibus cylindræis usque ad 80 μ . long., apice 6-8 μ . subin-

crassatis circumdatis; teleutosporis cylindraneo-fusoideis, 4-7-cellularibus, flavo-aurantiacis, inter se non conglutinatis nec vere columnatis, 110-140 \approx 16-22, cellulis mediis cuboideis, membrana hyalina levi, cellula suprema acuta in appendicem membranaceam 20 μ . longam producta; basidiis rectis 10-11 μ . cr., sporidiolis ovoideis 16 \approx 9.

Hab. in foliis Rubi alpestris, M. Gedeh in ins. Java. — A *Phragm.* (Ham.) *longissimo* differt teleutosporis in columnam non ita longam connatis et appendicula apicali brevioribus.

18. **Phragmidium Englerianum** Diet., Ann. Mycol. VII (1909) p. 353. 2770

— Uredosoris hypophyllis minutis, sparsis, flavis; uredosporis ellipsoideis v. globosis 25-32 \approx 21-27, episporio crasso inæquali poris c. 6 instructo, verrucisque acutatis ornato, achroo vestitis, paraphysibus curvatis circumdatis; teleutosoris hypophyllis dense gregariis, cæspitosis, filiformibus, flavidis; teleutosporis cylindratis, apice longe acutatis, plerumque 3- vel rarius 2-ocularibus, 75-130 \approx 15-19, episporio levi, hyalino vestitis, pedicello longissimo c. 12 μ . lato, a spora facile disjuncto, instructis.

Hab. in foliis Rubi Volkensii, in Kilimandscharo Africae (2900 m.) (A. ENGLER).

19. **Phragmidium arcticum** Lagerheim, apud Vleugel in Sart. Svensk 2771

Bot. Tidskr. (1908) p. 133-137 cum icone. — Cæomosoris sæpius hypophyllis, solitariis v. minute gregatis, 0,7 mm. diam., subinde elongatis; paraphysibus cylindricis, apice valde incrassatis obvallatis; cæomosporis e globoso ovoideis, 18-26 \approx 16-18, membrana pallida 2,5 μ . cr., grosse æqualiter verrucosa, poris usque ad 4; uredosoris hypophyllis, minutis, gregatis; uredosporis ovoideo-ellipsoideis, 21-26 \approx 16-18, membrana 1 μ . cr., tenuiter aculeolata, contentu flaveolo, granuloso; poris non observatis; teleutosoris hypophyllis, minutis sparsis v. subconfluentibus, nigris; teleutosporis 5-9-sæpius 6-7-cellularibus, cylindratis, minute hyalino-papillatis, 104 \approx 26-32, tunica brunnea, sat tenui, verruculis hyalinis conspersa; poris in quaque cellula subquaternis; pedicello sporâ longiore, hyalino, deorsum inflato.

Hab. in foliis Rubi arctici, in Fennia et Suecia.

20. **Phragmidium Yoshinagai** Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1906) p. 586. 2772

— Uredosoris hypophyllis, minutis v. mediocribus, sparsis, aureis, uredosporis, oblongis, piriformibus v. ellipsoideis usque ad 30 \approx 15-18, episporio achroo, tenui, verrucis acutiusculis minutis donato; teleutosoris nigris v. sordide brunneolis; teleutosporis 2-5-lo-

cularibus, cylindræis, ad septa paullo constrictis, 50-85 \approx 21-28, episporio levi, sordide brunneo apice interdum papilla ornato; pedicello mediocri v. brevi suffultis, maturis statim germinantibus.

Hab. in foliis Rubi moriformis, Nikko (SHIRAI), Tosa (YOSHINAGA) in Japonia.

21. **Phragmidium Rubi-Thunbergi** Kusano, Bot. Mag. Tokyo XVIII 2773 (1904) p. 148. — Maculis rubenti-flavidis; uredosoris hypophyllis, solitariis, sparsis v. aggregatis, minutis, pulveraceis, aurantiacis, paraphysibus clavatis, tenui-tunicatis, incurvis præditis; uredosporis obovato-ellipsoideis, episporio tenui, hyalino, minute echinulato contentuque aurantio præditis, 20-30 \approx 15-20; teleutosoris hypophyllis, sparsis v. hinc inde aggregatis, sæpe uredosoris intermixtis, minutis, rotundatis, e flavo-brunneo brunneo-nigris; teleutosporis 3-5- sæpius 4-cellularibus, utrinque rotundatis, apice papillatis, ad septa leniter constrictis, tunica levi, non vel vix apice incrassato, olivaceo-brunneo, episporio crasso pallide griseo, contentu aurantiaco, 49-85 \approx 22-30; pedicello crasse tunicato, non levi, 70 \approx 10, intus aurantio.

Hab. in foliis Rubi Thunbergii, Komaba Japoniæ (M. SHIRAI). — Teleutosporarum cellulae singulae poris binis præditæ.

22. **Phragmidium Nambuanum** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) p. 227. 2774 — Maculis violaceo-brunneis vel nullis; teleutosoris hypophyllis, parvis, sparsis, nigris; teleutosporis cylindræis apice obtusis, 6-usque ad 9-ocularibus, 85-105 \approx 29-35, obscure brunneis, verrucosis; pedicello crasso hyalino, inferne paullo incrassato instructis.

Hab. in foliis Rubi occidentalis var. japonici (N. NAMBU).

23. **Phragmidium orientale** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 501. — 2775 Soris uredosporis hypophyllis, sparsis vel aggregatis, minutissimis, pulverulentis, sulphureis; uredosporis globosis, subglobosis v. ova-tis, verrucosis, intus flavidis, 15-24 \approx 14-18, episporio hyalino ca. 2 μ . crasso; paraphysibus hyalinis, clavatis; teleutosporis adhuc ignotis.

Hab. in foliis Rubi elliptici, Ranikhet, Kumaon Himalaya (E. J. BUTLER). — Uredosori illos *Phragmidii* (Chrysom.) *albidi* omnino æmulantes.

24. **Phragmidium Jonesii** Diet., Hedwigia XLIV (1905) pag. 132. — 2776 Soris mediocribus, hypophyllis, nudis, uredosoris aurantiacis paraphysibus circumdatis, teleutosoris atris pulverulentis; uredosporis obovatis v. subglobosis, rarius oblongis, 19-27 \approx 15-20, episporio

verruculoso donatis; teleutosporis plerumque cylindricis vertice apiculatis, plerumque 7- usque ad 9-ocularibus, vix ultra $85 \approx 22-28$, episporio obscure brunneo granulato; pedicello hyalino, basi incrassato et plerumque asperulo, longo.

Hab. in foliis *Ivesiæ Baileyi*, Glencoe Nevada Amer. bor. (M. E. JONES).

PHRAGMIDIELLA P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) pag. 104 (Etym. a *Phragmidio*, cui affine genus). — Uredosori haud paraphysati; uredosporæ castaneo-obscuræ asperatæ; teleutosporæ 3-4-septatæ, constrictæ, pallidulæ. — Gen. inter *Phragmidium* et *Kühneolam* medium, paraphysibus absentibus in uredosoris, uredosporis obscurioribus, teleutosporis ad septum fortiter constrictis et habitatione in Begoniaceis diversum videtur.

1. **Phragmidiella Markhamiæ** P. Henn., l. c. p. 104. — Maculis fuscidulis rotundatis v. explanatis; uredosoris hypophyllis interdum epiphyllis sparsis v. gregariis, primo tectis, aparaphysatis, fuscidulis; uredosporis subglobosis v. ovoideis sæpe angulatis, atro-castaneis v. fuscis, aculeato-asperatis, $20-25 \mu$. c. cr.; teleutosoris hypophyllis, sparsis v. aggregatis, primo tectis, dein epidermide fissa pallida circumdatis, pulvinatis; teleutosporis subcylindræis v. subclavatis, apice rotundatis vix incrassatis v. subfurcatis, interdum papillatis, 3-4-septatis valde constrictis, deinde in cellulas subglobosas secedentibus, $60-85 \approx 13-20$, episporio pallido, levi; pedicello pallido varie elongato.

Hab. in foliis *Markhamiæ sansibarensis*, prope Makinguuni Usambara Africæ (ZIMMERMANN).

BÆODROMUS Arthur, Ann. Mycol. (1905) p. 19; North Amer. Fl. VII (1907) p. 125 (Etym. *bæos* brevis et *dromos* cursus, cyclus). — Pycnidia globosa subepidermica; teleutosporæ catenulatæ in soros compactos definitos lateraliter congestis; promycelium singulum e cellula apicali oriens, exiens, recurvatus, tetrasporus.

1. **Bæodromus californicus** Arthur, Ann. Mycol. III (1905) p. 19, 2778 fig. 2; North Amer. Fl. VII (1907) pag. 125. — Pycnidiis non visis; teleutosoris amphigenis et cauliculis, in greges plus minus distincte circulares dense confertis, 2-7 mm. diam., brunneo-aureis, cinnamomeo-brunneis, centrifuge evolutis; teleutosporis arcte confertis, 4-6-catenulatis, levibus, ellipsoideis v. obovatis, $28-37 \approx$

16-20; tunica pallide cinnamomeo-brunnea, 2-3 μ ., supra crassiore 5-8 μ .

Hab. in foliis caulibusque *Senecionis Douglasii*, in montibus San Bernardino, California (S. B. PARISH).

2. **Bæodromus Holwayi** Arthur, Ann. Mycol. (1905) p. 19, f. 1; North Amer. Fl. VII (1907) p. 125. — Pycnidiis epiphyllis in parvos greges dispositis et teleutosoris contrapositis, punctiformibus, flavo-auratis, dein brunneis, immersis, subepidermicis, globosis, 100-140 μ . diam.; setulis ostiolaribus 30 μ . long., agglutinatis; sporulis oblongis, 4-5 μ . circ. cr.; teleutosoris hypophyllis, dense confertis et circulariter dispositis, 3-5 mm. diam., flavo-brunneis dein castaneo-brunneis, centrifuge evolutis; teleutosporis arcte congestis, 5-8-catenulatis, levibus, breviter cylindraceis v. oblongis, 30-42 \approx 16-20, tunica flavo-brunnea, 1,5-2,5 μ . cr.

Hab. in foliis *Senecionis cinerarioidis*, Nevada de Teluca 3200 m. alt. Mexico (E. W. D. HOLWAY).

3. **Bæodromus Eupatorii** (Arthur) Arthur, North Amer. Fl. VII (1907) pag. 125, *Dietelia Eupatorii* Arthur, Bot. Gaz. 40 (1905) p. 197. — Pycnidiis amphigenis, numerosis, in parvos greges confertis, punctiformibus, flavo-auratis, subconspicuis, immersis, subepidermicis, subpiriformibus, 100-150 μ . latis; periphysibus 20-35 μ . long.; teleutosoris hypophyllis et cauliculis, in greges orbiculares confertis, 1-2,5 mm. diam., sæpe circum pycnidia dispositis, in caulibus hypertrophias 1 cm. long., efficientibus, in maculis decoloratis insidentibus, parvis, 0,2-0,3 mm. latis, rotundatis, subceraceis; teleutosporis late ellipsoideis, plus minusve angulosis et mutua pressione irregularibus, 24-36 \approx 20-25; tunica aureo-brunnea, levi, 1,5-2 μ . cr.

Hab. in foliis caulibusque *Eupatorii pazcuarensis*, in Mexico.

Pucciniastrum Otth — Syll. VII p. 762, IX p. 318, XIV p. 363, XVI p. 319.

1. **Pucciniastrum Celastri** Syd, Ann. Mycol. V (1907) pag. 503. — 2781 Uredosoris hypophyllis, maculis orbicularibus fuscis 2-4 mm. diam. insidentibus, plerumque paucis aggregatis, minutis, pseudoperidiis hemisphærice inclusis; uredosporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, verruculosis, subhyalinis, 20-25 \approx 16-22; teleutosporis nondum visis.

Hab. in foliis *Celastræ paniculatæ*, Kumaon Himalaya (leg. INAYAT, comm. E. J. BUTLER).

2. **Pucciniastrum Gaultheriæ** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 503. — 2782

Uredosoris hypophyllis, maculis irregularibus fuscis insidentibus, sparsis, minutis, pseudoperidio hemisphærico inclusis, flavo-brunneolis; uredosporis subglobosis, ellipsoideis vel oblongis, laxè aculeatis, hyalino-flavidis, 18-32 × 12-18, episporio 2-2 1/2 µ. crasso; teleutosporis nondum visis.

Hab. in foliis *Gaultheriæ nummularioidis*, Kumaon Himalaya (leg. INAYAT, comm. E. J. BUTLER).

3. **Pucciniastrum Corni** Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1904) p. 587. 2783

Uredosoris hypophyllis, sparsis, minutis, aureis, uredosporis obovatis v. ellipsoideis, rarius piriformibus, 18-25 × 12-16, contentu aurantiaco, episporio tenui minute verrucoso præditis, pseudoperidiis hemisphæricis 120 µ. latis, inclusis; teleutosporis sub epidermide dispersis v. laxè gregariis, 1-2-ocularibus, dilute brunneis, usque ad 25 × 20.

Hab. in foliis *Corni officinalis*, Meguro pr. Tokyo Japoniæ (N. NAMBU).

4. **Pucciniastrum arcticum** Tranzsch., Script. bot. Horti petrop. (1895) 2784

4, p. 300. St. ured.: *Uredo arctica* Lag. Hedw. (1889) p. 109. — Syll. IX, p. 331. — Teleutosoris hypophyllis, fuscis, parvis, planis; teleutosporis globosis v. mutua pressione rotundato-cubicis, in cellulas 2-4 longitudinaliter divisis, intercellularibus, 19-25 µ. d.

Hab. in foliis *Rubi arctici*, *R. saxatilis*, *R. stellati* in Lapponia, Rossia, Amer. bor. — Var. **americanum** Farlow, Notes in Fungi, Rhodora Jan. 1908, p. 16: a typo differt pseudoperidio conico-truncato cellulis spinosissimis coronato. — In foliis *Rubi occidentalis*, *R. neglecti*, *R. strigosi*, in America boreali.

5. **Pucciniastrum Agrimonie-Eupatorii** (DC.) Tranzschel, Scripta bot. 2785

Horti Univ. Petropol. IV, P. 2 (1895) p. 302, *Uredo Potentillarum* var. *Agrimonie-Eupatorii* DC., — Syll. VII, p. 839 (solus status uredosporus). — Teleutosoris pallide brunneis; teleutosporis intercellularibus et ob septa bina longitudinaliter et cruciatim disposita quadrilocularibus, 30 × 21-30.

Hab. in foliis *Agrimonie Eupatorii*, *A. dauricæ*, *A. odoratæ*, *A. parvifloræ*, *A. pilosæ*, in Europa et America bor. — Species verisimiliter heteroica; status teleutosporicus rarissime occurrit.

THECOPSORA Magn. — Syll. VII p. 764, XVI p. 321.

1. **Thecopsora Brachybotrydis** Tranzs., Ann. Mycol. V (1907) p. 551. 2786

— Uredosoris hypophyllis, maculis fuscis insidentibus, sparsis v. laxe gregariis, fuscescentibus, pseudoperidio hemisphærico magnitudinis valde variæ (180-380 μ . diam.) tectis; pseudoperidio ex hyphis centripetis composito, cellulis basilaribus oblongis, apicalibus rotundatis, fuscis uredosporis ovoideis vel ellipsoideis, sæpe angulatis, 17-20 \approx 14-17, episporio echinulato, achroo præditis; soris teleutosporiferis indeterminatis, hypophyllis, in iisdem maculis cum soris uredosporiferis, planis; teleutosporis in cellulis epidermidis evolutis, uni- usque ad quadrilocularibus, mutua pressione angulatis, circa 20-27 μ . diam.

Hab. in foliis *Brachybotrydis* paridiformis, pr. Gao-linzsy (ad viam ferream) Manshuriæ (P. SIUZEV).

TRIPHFRAGMIUM Lk. — Syll. VII p. 768, IX p. 318, XI p. 209, XVI p. 322, XVII p. 402,

1. **Triphragmium grande** Karst., Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. 2787

XXVII, 4 (1905) p. 14. — Teleutosoris elongatis, primitus epidermide tectis, magnis, fuscis, circiter 3 cm. longis; teleutosporis obtuse trigonis, tricellularibus, inferne 2-locularibus, verrucosis, brunneis, diam. 30-40 μ .; pedicello cylindræo, hyalino, longitudine sporæ.

Hab. ad caulem *Rumicis Acetosæ* (?) prope opp. Sortavala Fennicæ (O. LÖNNBOHM).

SPHÆROPHRAGMIUM Magn. — Syll. XI p. 209.

1. **Sphærophragmium Chevalieri** Hariot et Patouillard, Bull. Soc. My- 2788

col. de France XXV (1909) p. 108, cum icone. — Maculis amphigenis, orbicularibus, 6-8 mm. diam., sparsis, fuscis; soris epiphyllis, totam maculæ superficiem replentibus, subcuticularibus, tectis, dein late cupulato-apertis, obscure brunneis, pulverulentis, cuticula marginatis, 250-350 μ . diam.; teleutosporis tantum visis, primitus pallide fuscis, dein brunneis, subglobosis v. ovatis, nonnunquam cuneiformibus, aliquando constrictis, 6-8-locularibus, 24-48 \approx 24-32, tenuiter tunicatis, pilis nonnullis glochidiatis (8 μ . long.) sparse ornatis; loculis ovoideis tenuiter tunicatis 20 \approx 16; pedicello gelatinoso, hyalino 12 μ . circ. crasso, teleutosporis æquilongo.

Hab. in foliis *Anonacæ* (verisimiliter *Monodoræ*), Chari, Mbelé, Congo Africæ trop.

2. **Sphærophragmium Mucunæ** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 2789 p. 273. — Uredosoris hypophyllis, congregatis, rotundatis, parvis (150-240 μ . diam.), erumpentibus, paraphysibus cylindraceis, crasse tunicatis, acuminatis uni- v. biseptatis, 45-65 \times 7-10, limitatis; uredosporis irregulariter ovoideis plerumque asymmetricis 40-46 \times 20-24, crasse tunicatis, apice plerumque incrassatis, aculeis minutis seriatim dispositis tectis, brunneis, 4 poris germinativis æquatorialibus præditis; teleutosporis conformibus; teleutosporis, quandoque etiam in uredosoris efformatis, quadricellularibus raro tri- v. quinquelocularibus, verticaliter dispositis, brunneis, crasse tunicatis, 30-40 \times 24-30, verrucosis, verrucis 2-3-aculeolato-uncinatis; pedicello 25 \times 4, tenui-tunicato.

Hab. in foliis *Mucunæ* sp., prope Bunterzorg in ins. Java.

RAVENELIA Berk. — Syll. VII p. 770, IX p. 318, XI p. 210, XIV p. 363, XVI p. 323, XVII p. 403.

1. **Ravenelia indica** Berk. — Syll. VII, p. 772. — f. **Entadæ** Bacc., 2790 *Funghi Eritrea*, *Annali Bot.* t. IV (1906) p. 271, t. I, f. 5. — Uredosoris latis, angulatis, irregularibus; uredosporis ovalibus v. ellipticis 16 \times 11, sessilibus vel pedicello deciduo suffultis, fulvo-castaneis, episporio levi sed poris frequentibus cribroso; teleutosporis in capitula reniformia, ambitu rotunda, sessilibus, 90 \times 40; loculis fertilibus simplicibus cuneiformibus 7-8 transverse seriatis; cellulis cystoideis margine non excedentibus.

Hab. in leguminibus *Entadæ sudanicæ*, Amasen Erythrææ, 1800 m. alt. (PAPPI).

2. **Ravenelia Bakeriana** Diet., *Ann. myc.* (1908) p. 97. — Uredosoris 2791 *primariis* (*Uredo margine-incrassata* Henn. — Syll. XVII, p. 446). — In maculis fuscis arescentibus, margine flavo-areolatis usque ad 1 cm. vel supra latis, centro interdum depressis et pycnidiis numerosis tectis, in pagina inferiore tumores rotundatos vel circulares generantibus, amphigenis, obscure cinnamomeis; secundariis minutis sparsis hypophyllis, sub epidermide erumpentibus, folia non deformantibus; uredosporis ellipsoideis vel ovoideis, secundariis plerumque quadrangulis 30-48 \times 25-36, castaneis, episporio aculeato poros 3 gerente indutis, paraphysibus apice cochleatis obscure castaneis, basi hyalinis plerumque ramosis (tripartitis) circumdatis; teleutosoris hypophyllis, minutis, sparsis, obscure castaneis; capitulis teleutosporarum hemisphæricis, ambitu circularibus vel irregularibus, 50-85 μ . latis e numero vario sporarum compositis, ob-

scure castaneis, verrucis brunneolis confertis tectis, margine sæpe appendicibus cylindræis obtusis usque ad 10 μ . longis, brunneolis instructis, sporis (cellulis) magnis, usque ad 25 μ . latis, angulatis non septatis; cellulis cystoideis ovoideis hyalinis, in aqua diffluentibus, circulariter compositis; pedicello caduco.

Hab. in foliis *Lonchocarp*i sp., in horto bot. Goeldi, Pará Brasiliæ (C. F. BAKER).

3. **Ravenelia Cebil** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) 2792 p. 295. — Maculis parvulis flavescentibus indeterminatis; acervulis erumpenti-superficialibus, solitariis vel 3-8-gregariis, ferrugineis; uredosporis elongato-obovatis 30 \times 15, episporio superne valde incrassato levi inferne tenui non v. obsoletissime papilloso, sæpius grosse 1-2-guttulatis fulvellis, paraphysibus capitatis uncinato-incurvis concoloribus, pedicello 15 \times 5, capitulo 10 \times 15, cinctis; teleutosporis e globoso depressis 50-100 \times 40-60, e cellulis subcylindræis arcte connatis 12-15 μ . diam., ferrugineis compositis, inferne stipite brevissimo hyalino mox diffluente, cystibus 3-5 pusillis fibrillisque nonnullis collariato, suffultis.

Hab. in foliis *Piptadeniæ macrocarpæ*, in Parque Roca Tucumán Amer. austr.

4. **Ravenelia irregularis** Arth., North Amer. Fl. VII (1907) p. 142. 2793 Pycnidiis epiphyllis, in parvos greges confertis, inconspicuis, pallide flavis, punctiformibus, epidermicis, rotundato-conoideis, 60-90 latis; uredosporis hypophyllis primum in maculis decoloratis insidentibus, dein amphigenis et sparsis, rotundatis, parvis, subepidermicis, mox nudis, pulveraceis, leniter cinnamomeo-brunneis; paraphysibus nullis; uredosporis late ellipsoideis, 21-23 \times 17-19; tunica pallide-flava, 1 μ . c. cr., crebre subechinulato-verrucosa, poris germinativis 6 v. ultra sparsis, prædita; teleutosporis plerumque epiphyllis, sparsis, parvis, subepidermicis, nigro-brunneis, nitidis; teleutosporis apice obscure castaneo-brunneis, perimetro irregularibus, 4-7-cellularibus, 60-90 μ . diam., quaque spora 3-5 tuberculis semihyalinis 4-7 μ . long., irregulariter angulosis prædita; cystibus hyalinis subconfertis, in pedicellum decurrentibus; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis *Craccæ macranthæ*, Mexico.

5. **Ravenelia caulicola** Arth., North Amer. Fl. VII (1907) p. 143. — 2794 Pycnidiis ignotis; uredosporis plerumque cauliculis, sparsis, parvis, 0,2-0,3 mm. diam., quandoque subconfluentibus; paraphysibus nullis; uredosporis late ellipsoideis 19-25 \times 16-18; tunica pallide flava,

1-1,5 μ . cr., depresso et sparse echinulata, poris germinativis 6-10 sparsis prædita; teleutosoris plerumque cauliculis, numerosis, sparsis, sæpe confertis confluentibusque, subepidermicis, mox nudis, nigricantibus, nitidis; teleutosporis apice theobromino-brunneis, 4-8-cellularibus, 90-120 μ . diam., levibus; cystibus hyalinis, latis, pendulis et in pedicellum decurrentibus, udis tumescentibus et disrumpentibus; pedicello hyalino, persistenti, 45-90 μ . longo.

Hab. in foliis caulibusque Craccæ cinereæ, Bahamas Amer. bor.

6. **Ravenelia Ingæ** (P. Henn.) Arthur, North Amer. Fl. VII (1907) 2795 p. 132. Teste hoc auctore *Uredo Ingæ* P. Henn. — Syll. XVI, p. 352 — et *Uredo excipulata* Syd. — Syll. XVII, pag. 447 — sunt habendæ ut status uredosporiferi *Raveneliæ* specierum, quarum tamen st. teleutosporifer nondum innotuit.

Hab. in foliis Ingæ veræ et Ingæ Inicuil, in Indiis occid. Mexico et Amer. australi.

7. **Ravenelia pulcherrima** Arthur, Bot. Gaz. vol. XXXIX (1905) 2796 p. 395. — Uredosoris amphigenis, subconfertis v. sparsis, rotundatis, sparsis, 0,25-0,5 mm. diam., mox nudis, cinnamomeo-brunneis, paraphysibus numerosis intermixtis; uredosporis ellipsoideis v. oblongo-sphæroideis, 15-18 \approx 17-24, tunica tenui 1,5-2 μ . crassa, pallide flavo-aurata, minute et crebre echinulato-verrucosa, poris germinativis 6-8, sparsis, paraphysibus crassis capitatis spathulatis, 35-55 \approx 12-18, levibus, tunica tenui subhyalina, supra 3-10 μ . cr., castaneo-brunnea; teleutosoris amphigenis, parvis, sparsis v. confluentibus, subcuticularibus, nigro-brunneis; capitulis brunneo-theobrominis 6-7-cellularibus, 75-100 μ . diam., quaque spora 4-5 papillis vix conspicuis, 1-2 μ . altis, subhyalinis prædita; cystibus adpressis in inferiori parte capituli, paraphysibus nullis; pedicello brevi, hyalino deciduo.

Hab. in foliis Poincianæ pulcherrimæ, Mexico.

8. **Ravenelia Piscidiæ** Long, Journ. of Mycol. XII (1906) p. 234; 2797 Arthur, North Amer. Fl. VII (1907) p. 144. — Pycnidiis ignotis; uredosoris amphigenis, parvis, usque 1 mm. diam. subepidermicis, pulveraceis, pallide cinnamomeo-brunneis; paraphysibus paucis intermixtis, cylindræis, quandoque supra incurvatis 30-50 \approx 10-12, tunica levi, æqualiter crassa, supra castaneo-brunnea infra pallida; uredosporis ellipsoideis 17-29 \approx 15-17; tunica pallide cinnamomeo-brunnea, tenui, 1-1,5 μ . cr., minute et crebre echinulata, poris germinativis 7-10 sparsis prædita; teleutosoris amphigenis, minu-

tis, sparsis et coalescentibus, nigricantibus, subepidermicis; paraphysibus paucis vel nullis; teleutosporis apice obscure castaneo-brunneis, 4-6-cellularibus, 75-120 μ . diam., levibus; cystibus subtus capitulorum appplanatis; pedicello hyalino, brevi, angusto.

Hab. in foliis *Ichthyomethiæ Piscipulæ* (= *Piscidia erythrina*), Florida Amer. bor.

9. **Ravenelia ornata** H. et P. Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 437. — 2798

Soris teleutosporiferis hypophyllis, maculis minutis flavidis sæpe insidentibus, sparsis, minutissimis, punctiformibus, pulverulentis, atris; uredosporis immixtis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, subtiliter echinulatis, dilute brunneis, 14-18 μ . diam.; capitulis teleutosporarum globosis vel subglobosis, 65-100 μ . diam., castaneo-brunneis, ex 4-7-sporis in omni directione compositis, tota superficie verrucis prominentibus, hyalinis vel dilute brunneolis dense obtectis, sporis marginalibus præterea processu elongato usque ad 25 μ . longo, cylindraceo apice capitato-incrassato brunneo præditis; cystidiis hyalinis; pedicello brevi, hyalino.

Hab. in foliis *Abri pulchelli*, Dehra Dun Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

10. **Ravenelia Pithecolobii** Arthur, Bot. Gaz., vol. XXXIX (1905) 2799

p. 394; North Amer. Fl. VII (1907) p. 133. — Pycnidiis ignotis; uredosoris amphigenis, parvis, rotundatis v. oblongis, 0,3-1 mm. diam., subepidermicis, diu tectis, cinnamomeo-brunneis; paraphysibus nullis; uredosporis ellipsoideis v. late ovoideis, 24-32 \times 15-22, tunica flavo-aurata, 2-3 μ . cr., apice usque 3-5 μ . cr., sparse et papillose echinulata, 4-6 poris germinativis æquatorialibus prædita; teleutosoris amphigenis sparsis, parvis, rotundatis, primum bullatis, subepidermicis, diu tectis, castaneo-brunneis; paraphysibus nullis; teleutosporis supra castaneo-brunneis, 6-8-cellularibus, 70-90 μ . diam., 2-3 seriebus tuberculorum, 5-7 μ . long., acutis ornatis, pallide brunneis; cystibus apice adpressis, lateraliter confertis; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis *Pithecolobii dulcis* et *P. Unguis-Cati*, Florida et Mexico.

11. **Ravenelia oligotheles** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 2800

(1909) p. 296. — Maculis nullis; acervulis minutis 0,25-0,74 mm. diam., repando orbicularibus planiusculis, rarius confluentibus, epidermide disrupta cinctis, compactiusculis; teleutosporis eximie hemisphæricis 50-60 \times 35-40, 5-7 cellularibus, cellulis omnibus radiantibus, quandoque centrali præditis, unilocularibus, primo flavidis

serius opace fuligineis, aculeolis subconoideis $2-3 \times 0,75-1$ hyalinis ubique laxe vestitis, cystidiis nullis, pedicello brevi mox fatiscente suffultis.

Hab. in foliis vivis *Enterolobii* Timbouræ, prope Formosa Amer. austr. *Puccinia multiflora* Zer

12. **Ravenelia inconspicua** Arthur, Bot. Gaz. vol. XXXIX (1905) 2801 p. 395; North Amer. Fl. VII (1907) p. 141. — Pycnidiis ignotis; uredosoris hypophyllis, rotundatis, parvis, usque ad 0,5 mm. diam., subcuticularibus, mox nudis, pulveraceis, cinnamomeo-brunneis; paraphysibus copiosis intermixtis, clavatis v. subspathulatis, levibus, cinnamomeo-brunneis, infra pallidioribus, tunica 3-6 μ . cr.; stipite solido; uredosporis globosis v. late ellipsoideis $15-22 \times 15-20$, tunica 2-2,5 μ . cr., flavo-aurata, crebre verrucosa, poris germinativis circ. 10, sparsis; teleutosoris hypophyllis, minutis, sparsis, nigricantibus, nitidis, subcuticularibus; paraphysibus nullis; teleutosporis apice castaneo-brunneis, 6-8-cellularibus, 60-100 μ . diam., quaque cellula 4-6 tuberculis cylindræis $5-7 \times 3$ subcoloratis prædita; cystibus pendulis, adpressis, 6-10, inter se leniter unitis.

Hab. in foliis *Cæsalpinia* v. *Cassia* sp., Mexico.

13. **Ravenelia portoricensis** Arth. — Syll. XVII p. 405 — (status 2802 uredosp.); Arthur, North Americ. Fl. VII (1907) pag. 139. *Ravenelia Arthuri* Long, Journ. of Mycol. XII (1906) pag. 234. — Teleutosoris plerumque epiphyllis, sparsis, ovoideis vel oblongis, 0,5-1 mm. long., sæpe confluentibus, subepidermicis, mox nudis, nigro-brunneis, nitidis; teleutosporis apice castaneo-brunneis, 5-8 cellularibus, 75-110 μ . diam., levibus; cystibus hyalinis, globosis; pedicello brevi deciduo.

Hab. in foliis *Cassia* emarginatæ et *Cassia* spec., Jamaica et Porto Rico.

14. **Ravenelia Le-Testui** Maubl., Bull. Soc. Myc. de Fr. XXII (1006) 2803 p. 72. — Rami-foliicola; maculis nullis; uredosoris amphigenis, sparsis, per totam paginam folii disseminatis, primo tectis, rotundatis, minutis; paraphysibus pallide coloratis, rectis, 55 μ . long., apice clavatis v. nodulosis, rarius acutis; uredosporis oblongis v. subglobosis, flavis dein brunneis, aculeatis, $17-20 \times 12-15$; teleutosoris amphigenis, sæpe cauliculis et usque ad 1 cm. longis, atris; capitulis hemisphæricis 80-100- sæpius 85 μ . diam., levibus, obscure castaneis, e 30-50 sporis compositis; sporis cuneatis, $28-30 \times 14-16$, episporio apice valde incrassato, usque ad 8 μ .; pedicello

ex hyphis hyalinis composito, usque ad 76 μ . longo; cellulis appendicularibus globosis, hyalinis, 15 μ . lato.

Hab. in foliis vivis Cassiæ sp., Marral in Africa orient. lusitanica. — Affinis *Rav. macrocysti*.

15. **Ravenelia microspora** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) pag. 98. — 2804

— Soris minutis epiphyllis, circulos 1-1,5 mm. latos circa sorem centralem formantibus, minus copiose hypophyllis, sparsis, cuticula fissa cinnamomea semitectis; uredosporiferis cinnamomeis teleutosporiferis nigris; uredosporis obovatis v. ellipsoideis 12-14 \times 9-10,5 dilute flavo-brunneis, poris germinativis 4 æquatorialibus instructis, echinulatis, sine paraphysibus; capitulis teleutosporarum hemisphæricis, sporas unicellulares 8-10 in directione transversali gerentibus, 80-100 μ . latis, castaneis, papillis cylindræis v. verrucis sparsis dilute brunneis, ornatis, cellulis cystoideis globosis numerosis.

Hab. in foliis Cassiæ sp., Brasilia, Nossa Seuhora, S. Paulo (leg. A. USTERI).

16. **Ravenelia Lysilomæ** Arthur, Bot. Gaz. vol. XXXIX (1905) p. 392; 2805

North Amer. Fl. VII (1907) p. 146 (in gen. *Dendræcia*). — Pycnidii epiphyllis, in parvos greges congestis, punctiformibus, latiusculis, pallide flavo-brunneolis, subcuticularibus, hemisphæricodepressis, 80-130 μ . altis; teleutosoris epiphyllis, in maculis pallidis insidentibus, dein amphigenis, minutis, 0,25-0,5 mm. diam., rotundatis, castaneo-brunneis, subepidermicis; paraphysibus numerosis intermixtis, inconspicuis, cylindræis, 30-40 \times 7-10, pallide brunneo-auratis, tunica tenui v. raro crassa; teleutosporis apice castaneo-brunneis, 7-9-cellularibus, 80-120 μ . diam., levibus; cystibus ad capitulum adpressis, lateraliter unitis; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis *Lysilomæ tergeminæ*, Mexico.

17. **Ravenelia Sydowiana** Rick, Fungi austro-amer. VII et VIII, 2806

n. 151, Ann. Myc. v. V (1907) p. 337. — Maculis in pagina superiore flavidulis; teleutosoris hypophyllis et petiolicolis, erumpentibus, granulosis, nigris, splendidis, pseudoperidio mox evanido, 1-5 mm. latis; capitulis rotundatis, e 4-10 sporis compositis, brunneo-atris, 50-80 μ . diam.; sporis continuis, subcuneiformibus, ca. 15 μ . latis, 18 μ . longis; cystidiis circiter 4,25 μ . diam., hyalinis; pedicello hyalino, mediocri.

Hab. in foliis Leguminosæ spec., in Brasilia. — Differt a *Ravenelia atro-crustata* P. Henn. fructificatione hypophylla.

18. **Ravenelia mimosicola** Arth., North Amer. Fl. VII (1907) p. 137. 2807

— Pycnidiis ignotis; uredosoris amphigenis, numerosis, sparsis v. in greges circinatim dispositis, rotundatis, parvis, 0,3-0,8 mm. diam., subcuticularibus, mox nudis, cinnamomeo-brunneis; paraphysibus numerosis intermixtis, capitatis v. clavato-capitatis, parvis, 40-55 \times 8-12, levibus, tunica supra crassiore, cinnamomeo-brunnea, subtus pallidiore, stipite solido circulari; uredosporis late ellipsoideis v. leniter obovatis, parvis 18-22 \times 13-16, tunica pallide cinnamomeo-brunnea, tenui, 1 μ ., crebre et minute echinulato-verruculosa, poris germinativis 6-10, sparsis; teleutosporis amphigenis, numerosis, sparsis, irregularibus, usque 1 mm. diam., subcuticularibus, mox nudis, theobromino-brunneis, nitidis; paraphysibus nullis; teleutosporis supra castaneo-brunneis, 5-7-cellularibus, 60-80 μ . diam., quaque spora 5-7 seriebus papillarum semihyalinarum 1-4 μ . long., prædita; cystibus ovato-oblongis, udis tumescentibus disrumpentibusque; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis Mimosæ polyanthoidis et *M. stipitata* in Mexico.

19. **Ravenelia gracilis** Arthur, Bot. Gaz. vol. XXXIX (1905) p. 393; 2808

North Amer. Fl. VII (1907) p. 135. — Pycnidiis amphigenis, in parvos greges confertis, punctiformibus, prominentibus, fuscis, subcuticularibus, hemisphæricis, 60-100 μ . latis; uredosoris epiphyllis, sparsis, parvis, usque ad 0,25 mm. diam., rotundatis, mamillatis, subepidermicis, centro irregulariter dehiscentibus, subcupulatis; paraphysibus numerosis intermixtis v. periphæricis, cylindræis, 40-60 \times 7-10, subcontortis, tunica levi, tenui, hyalina v. subhyalina; uredosporis ellipsoideis vel obovato-oblongis, 30-40 \times 16-21, tunica 1,5-2,5 μ . cr., brunneo-aurata, æqualiter et crasse echinata, poris 4-6 æquatorialibus prædita; teleutosoris epiphyllis, sparsis, parvis, paraphysibus destitutis, subepidermicis; teleutosporis apice castaneo-brunneis, 5-7-cellularibus, 75-100 μ . diam., quaque spora 4-7 seriebus tuberculorum subhyalinorum 3-4 μ . alt. prædita; cystibus delicatis, apice adpressis, lateraliter confertis; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis Mimosaceæ indeterminatæ in Mexico.

20. **Ravenelia bahiensis** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 267. 2809

— Soris teleutosporiferis longe effusis, ramulos juniores deformantibus, atris confluentibus; capitulis teleutosporarum subhemisphæricis, castaneis, 40-60 μ ., e 5-8 sporis simplicibus subgloboso-angulatis v. conoideis, 18-23 \times 15-20 compositis, cellulas cystoideas

ovoideas v. subglobosas (5-8) hyalinas 15-18 \approx 10-15 gerentibus; pedicello hyalino, breviter 2-3-hyphoideo, 5 μ . c. cr.

Hab. in ramulis junioribus subflexuosis *Mimosæ remansoanæ*, Harms Bahia, Remanso Brasilæ.

21. **Ravenelia *Mimosæ-cæruleæ*** Diet., Beih. Bot. Centrbl. XX, Abt. II 2810 (1906) p. 375, tab. VI, fig. 26; Arthur, North Amer. Fl. VII (1907) p. 138. — Pycnidiis ignotis; uredosoris amphigenis, confertis, quandoque circinatis, 0,3-1 mm. diam., subcuticularibus, mox nudis, pallide cinnamomeo-brunneis; paraphysibus numerosis intermixtis, clavatis, 45-72 \approx 10-14, levibus, tunica 4-6 μ . cr. supra cinnamomeo-brunnea infra pallidiore, stipite solido; uredosporis globosis vel late ellipsoideis 19-23 \approx 17-19, tunica cinnamomeo-brunnea, uniformi, 1,5 μ . c. cr., moderate echinulato-verrucosa, poris germinativis 8 v. pluribus sparsis prædita; teleutosoris amphigenis, gregariis, 0,3-0,8 mm. diam., quandoque confluentibus, subcuticularibus, mox nudis, nigro-brunneis, nitidis; teleutosporis castaneo-brunneis, 4-6-cellularibus, 65-80 μ . diam, quaque spora 5-6 seriebus tuberculorum subhyalinorum rotundatorum v. subacutatorum 3-5 μ . longum prædita; cystibus 4-6, hyalinis, udis tumescentibus et disrumpentibus; pedicello brevi, hyalino, deciduo.

Hab. in foliis *Mimosæ cæruleæ*, in Mexico.

22. **Ravenelia *Mimosæ-albidæ*** Diet., Beih. Centralbl. XX, Abt. II 2811 (1906) pag. 375, tab. VI, fig. 25; Arthur, North Amer. Fl. VII (1907) pag. 138. — Pycnidiis ignotis; uredosoris amphigenis, numerosis, sparsis v. circinatis dispositis, quandoque confluentibus, rotundatis v. oblongis, 0,4-0,8 mm. diam., subcuticularibus, mox nudis pulverulentis, cinnamomeo-brunneis; paraphysibus numerosis intermixtis, spathulatis v. clavato-capitatis, 40-60 \approx 10-15, levibus, tunica supra 3-5 μ . cr., brunneo-aurata, stipite solido hyalino; uredosporis globosis v. late ellipsoideis, 21-26 \approx 15-20, tunica obscure cinnamomeo-brunnea, 1,5-2,5 μ . cr., crebre et æqualiter verrucosa, poris germinativis 8-10 sparsis prædita; teleutosoris amphigenis, numerosis, sparsis, irregularibus, parvis, sæpe confluentibus, subcuticularibus, mox nudis, nigro-brunneis, nitidis; paraphysibus nullis v. paucis immixtis; teleutosporis apice obscure castaneo-brunneis, 4-6-cellularibus, 70-90 μ . diam, quaque spora 5-7 seriebus tuberculorum subhyalinorum 4-7 μ . long., præditis; cystibus non cohærentibus, ovoideis, 6-8, udis tumescentibus et disrumpentibus; pedicello hyalino, brevi, deciduo.

Hab. in foliis *Mimosæ albidæ* et *M. albidæ* var. *floribundæ*, Mexico.

23. **Ravenelia Leucænæ-microphyllæ** Diet., Beih. Bot. Centralbl. XX 2812

Abt. II (1906) p. 375. — Pycnidiis ignotis; uredosporis teleutosporis immixtis (paucis observatis) late ellipsoideis, tunica pallide brunnea, tenui, minute echinulata, poris germinativis circ. 4 æquatorialibus; teleutosporis epiphyllis, sparsis, parvis, 0,2-0,5 mm. dm., subepidermicis, nigro-brunneis, nitidis; paraphysibus paucis, cylindræis subclavatis, 45-60 \approx 7-15, levibus, tunica tenui, supra paullo crassiore et obscuriore; teleutosporis apice castaneo-brunneis, 70-100 μ . diam., 6-10-cellularibus, levibus; cystibus hyalinis, cohærentibus, adpressis, udis disrumpentibus; pedicello hyalino deciduo.

Hab. in foliis *Leucænæ microphyllæ*, Mexico. — *Acacia angustissima*

24. **Ravenelia igualica** Arth., North Amer. Fl. VII (1907) p. 136. — 2813

Pycnidiis ignotis; uredosporis plerumque hypophyllis, sparsis, rotundatis, parvis, 0,2-0,3 mm. diam., subcuticularibus, mox nudis, cinnamomeo-brunneis; paraphysibus intermixtis, capitatis v. clavato-capitatis, 35-50 \approx 9-12, levibus, tunica apice 3-5 μ . incrassata ceterum 1-1,5 μ ., firme stipitatis, supra brunneo-auratis infra pallidioribus; uredosporis globosis v. late ellipsoideis, 16-19 \approx 14-16, tunica pallide cinnamomea, 1 μ . circ. cr., minute echinulato-verrucosa, 8-10 poris germinativis, sparsis prædita; teleutosporis plerumque hypophyllis, sparsis, irregularibus, parvis, 0,3-0,8 mm. diam., subcuticularibus, mox nudis, nigro-brunneis, nitidis; paraphysibus nullis; teleutosporis apice castaneo brunneis, 4-7-cellularibus, 60-90 μ . diam., quaque spora 5-7 seriebus tuberculorum subhyalinorum rotundatorum v. leniter acutatorum, 2-4 μ . long. præditis; cystibus pendentibus, hyalinis, ovoideis vel globoideis, udis ex inflato disruptis; pedicello brevi, hyalino, deciduo.

Hab. in foliis *Acaciæ siliculoidis*, Mexico.

25. **Ravenelia Acaciæ-pennatulæ** Diet., Beih. Bot. Centralbl. XX, 2814

Abt. II (1906) p. 371; Arthur, North Amer. Fl. VII (1907) p. 135. — Pycnidiis ignotis; uredosporis epiphyllis, sparsis, rotundatis, parvis, 0,2-0,4 mm. diam., subcuticularibus, mox nudis, cinnamomeo-brunneis, pulverulentis; paraphysibus intermixtis, parvis et inconspicuis, clavatis, 40-50 \approx 9-15, stipite angusto, tunica 1 μ . cr., apice crassiori (1-2 μ .), supra pallide flavo-auratis, subtus hyalinis; uredosporis ellipsoideis v. late oblongis, 20-30 \approx 15-22; tunica obscure cinnamomeo-brunnea, 1,5-2,5 μ . cr., crebre et crasse verru-

cosa, poris germinativis 8 in duas series medio æquidistantes dispositis prædita; teleutosoris epiphyllis, sparsis, rotundatis v. irregularibus, parvis, 0,3-0,5 mm. diam., subcuticularibus, mox nudis, nigro-brunneis, nitidis; paraphysibus, nullis; teleutosporis apice castaneo-brunneis, 5-7-cellularibus, 60-100 μ . diam., 7-9 seriebus papillarum subhyalinarum 1-2 μ . long. præditis; cystibus pendentibus, hyalinis, udis inflatis et disrumpentibus; pedicello brevi, hyalino, deciduo.

Hab. in foliis *Acaciæ cochliacanthæ* et *A. pennatulæ*, Mexico.

26. **Ravenelia Farlowiana** Diet. — Syll. XI, p. 211. — Teste Arthur, 2815 North Amer. Flora VII (1907) (Ured.) p. 146 huc spectat *Ravenelia Acaciæ-micranthæ* Diet., Beih. Bot. Centralbl. XX Abt. II (1906) p. 371.

27. **Ravenelia ornamentalis** (Kalchbr.) Diet, Beih. Bot. Centralbl. 2816 XX Abt. II (1906) p. 375, *Raven. Mac-Owaniana* Pazschke. — Syll. XI, p. 211. — Huc pertinet *Æcidium ornamentale* Kalchbr. — Syll. VII, p. 787.

28. **Ravenelia Emblicæ** H. et P. Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 437. 2817 — Soris uredosporiferis amphigenis, magis in parte folii superiore evolutis, maculis orbicularibus vel suborbicularibus rufo-sanguineis, 2-5 mm. diam., insidentibus, sparsis vel sæpius in greges minutos dispositis, rotundatis, primitus hemisphærico-prominentibus tectisque, tandem liberis et applanatis, compactiusculis, aurantiacis; paraphysibus numerosissimis apice capitato-vel clavato-incrassatis, dilute brunneis; uredosporis ellipsoideo-oblongis vel oblongis, apice rotundatis vel acutiusculis, pro ratione valde incrassatis, (usque ad 8 μ .), breviter echinulatis, dilute brunneis, 25-35 \times 12-18; teleutosporis

Hab. in foliis *Phyllanthi Emblicæ*, Dehra Dun, Indiæ orient. (E. J. BUTLER). — Teleutosporæ a coll. SYDOW non visæ, sed jam ab anno 1870 descriptæ et delineatæ a D. CUNNINGHAM in Annal Rep. of the Sanitary Commissioner etc. Calcutta 1871.

29 **Ravenelia Breyniæ** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 501. — Te- 2818 leutosoris hypophyllis, sine maculis, plerumque in greges minutos ca. 1 mm. latos, densissime dispositis, purpureo-brunneis, epidermide fissa cinctis; capitulis teleutosporarum planis, globosis vel subglobosis, e 5-9 sporis in omni directione compositis, castaneo-brunneis, 50-140 μ . diam.; sporis 1-cellularibus, marginalibus omnibus vel fere omnibus appendicula conica hyalina usque ad 12

μ . longa et 5 μ . lata præditis, apice valde incrassatis (usque ad 14 μ .), 30-50 μ . altis, 14-20 μ . latis, centralibus exappendiculatis minus incrassatis et brevioribus; cystidiis hyalinis facile diffluentibus; hyphis pedicelli non conjunctis.

Hab. in foliis *Breyniæ rhamnoidis*, Pusa Indiæ orient.
(E. J. BUTLER).

30. **Ravenelia Henningsiana** Diet., Beih. Bot. Centralbl. XX, A5t. II 2819 (1906) p. 388.

Hab. in foliis *Piptadeniæ* in Brasilia. — Hæc species et *R. zeylanica* Diet. conferentur ad calcem voluminis.

PLEORAVENELIA Long — Syll. XVII p. 407.

1. **Pleoravenelia deformans** Maubl., Bull. Soc. Myc. de France XXII 2820 (1906) p. 73, fig. 2. — Ramulos occupans et deformans; pycnidiis subcuticularibus, subsuperficialibus applanatis, 50-85 μ . diam., æcidiis (*Æc. Acaciæ* (Henn.) Magn.?) dense aggregatis conicis, basi infossis, diu clausis; pseudoperidii cellulis difformibus, 20-30 μ . diam., crasse tunicatis, æcidiosporis globoso-angulosis, tenuiter verrucosis, 18-28 μ . diam.; teleutosoris ut æcidiis; teleutosporarum capitulis, globoso-applanatis, levibus, castaneis, 60-114 μ . diam., teleutosporis in sectione diametrali 5-8, cuneatis, mediis septo obliquo divisis, 39-56 \times 16-18, episporio extus incrassato, vesiculis appendicularibus, hyalinis, sudglobois; pedicello hyalino, synnematico.

Hab. in ramis *Acaciæ*, prob. *A. arabicæ*, Mhalume ins. Africa orient. lusit. (LE TESTU). — Cladomanias genuinas generat.

NOTHORAVENELIA Diet. Ann. Mycol. (1910) p. 310 (Etym. *nothos* spurius et *Ravenelia*). — Uredosporæ solitariæ; teleutosori ut in gen. *Ravenelia* numerosi conjuncti, capitula formantes; capitulis cellulas cystoideas gerentibus, binis v. pluribus deinceps ex eisdem hyphis formatis, pedicello non instructis.

1. **Nothoravenelia japonica** Diet., l. c. p. 310. — Uredosoris hypo- 2821
phyllis minimis sparsis, paraphysibus curvatis circumdatis; uredosporis ellipsoideis c. 20 \times 17, episporio tenui hyalino breviter echinulato præditis; teleutosoris minutis sparsis obscure brunneis vel nigricantibus, hypophyllis, paraphysibus cinctis; capitulis plerumque irregulariter rotundatis v. oblongis, interdum margine lobatis, applanatis, magnitudine valde variis, usque 260 μ . latis, castaneis, levibus; sporis bilocularibus, 10-16 μ . latis, apice c. 10 μ . incrassatis, usque ad 20 in omni directione; cellulis cystoideis sub capitulo non emergentibus numerosis ovoideis v. citriformibus.

Hab. in foliis *Securinegæ fluggeoidis*, Tosa Japonia (T. YOSHINAGA).

UREDOPELTIS P. Henn., Fl. du Bas- et Moy.-Congo in Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. III (1908) p. 223 (Etym. *Uredo* et *pelta* scutum). — Teleutosori lenticulares v. discoidei, rotundati e sporis radiatim pluriseriatis consistentes. Teleutosporæ continuæ, versiformes, coloratæ. — Gen. *Raveneliæ* affine.

1. **Uredopeltis congensis** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo in 2822 Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. III (1908) p. 223, fig. 1-3. — Maculis rotundatis v. confluenti-effusis, brunneis v. atro-violascentibus; uredosoris hypophyllis, gregariis, subceraceis, flavido-brunneolis; uredosporis subglobosis, ellipsoideis v. ovoideis, brunneolis hyalinescentibus, aculeato-echinulatis, 15-22 \times 13-17; teleutosoris intermixtis singularibus, lenticularibus v. subpeltatis, rotundatis sæpe repandis, atris, firmis e plurimis seriebus radiatis sporarum consistentibus, 200-250 μ . c. cr.; teleutosporis versiformibus, fusoides, ovoideis, cuneatis, continuis (an basi pedicellatis?) sæpe acutis, 16-24 \times 7-12, brunneis.

Hab. in foliis Bignoniaceæ, e. g. *Markhamiæ*, Dembo Congo Africæ trop. (VANDERYST).

UREDINACEÆ INFERIORES

PERIDERMIIUM Lév. — Syll. VII p. 835, IX p. 326, XI p. 222, XVI p. 349, XVII p. 408.

1. **Peridermium consimile** Arth. et Kern, Bull. Torr. bot. Cl., XXXIII 2823 (1906) p. 427. — Pycnidiis amphigenis, numerosis, sparsis, conspicuis, punctiformibus, e flavo-melleis nigro-brunneis, subepidermicis, globoideis v. ampulliformibus, subimmersis, 110-150 μ . latis; æcidiis e mycelio limitato orientibus, plerumque hypophyllis, in maculis flavis plus minusve expansis foliorum miniatorum in duplicem seriem dispositis, lateraliter compressis, 0,5-1,5 mm. long., 0,5-0,8 mm. alt., apice dehiscentibus; peridio hyalino, tenui, dein margine lacerato, cellulis tunica intus incrassata, verrucosa, transverse striata, extus tenuiore, levi; æcidiosporis late ellipsoideis v. globoideis, 24-35 \times 16-23, tunica hyalina, inæqualiter crassiuscula, 1,5-2,5 μ ., moderate et dense verrucosa.

Hab. in foliis *Abietis* (Piceæ) *Marianæ*, *Abietis rubræ*, Amer. bor. — Nunc relatum ad *Melampsoropsidem Cassandræ*

(Peck et Cl.) Arth. in Clint. Conn. Agric. Exp. St. Rep. (1907) p. 386, seu *Uredo Cassandræ* Peck et Cl. — Syll. VII, p. 844.

2. **Peridermium boreale** Arth. et Kern., Bull. Torr. Bot. Cl., XXXIII 2824 (1906) p. 425. — Pycnidiis amphigenis, numerosis, sparsis, conspicuis, punctiformibus, flavo-melleis dein brunneo-nigrescentibus, subepidermicis, ampulliformibus v. globoideis, prominentibus, 95-140 μ . lat.; mycelio perennanti, ramulis et foliis plus minusve atrophicis, æcidiis hypophyllis, lateraliter compressis, duplici serie dispositis, erumpentibus, 0,5-2,5 mm. long, sæpe confluentibus, 0,5-12 mm. alt.; peridio hyalino v. apice rubescenti, cellulis angustis, tunica subtenui extus levi, 1,5-2,5 μ ., intus verrucosa 3-4 μ . cr.; æcidiosporis late ellipsoideis v. globosis, 23-32 \times 16-22, tunica hyalina crassiuscula, 2-4 μ ., dense et minutissime verrucosa; contentu e rubro-aurantiaco subhyalino.

Hab. in ramis Abietis (Piceæ) Parryanæ et A. Engelmanni, Amer. bor.

3. **Peridermium Piceæ-hondoensis** Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1905) 2825 pag. 591. — Pseudoperidiis in pagina superiore acuum seriatim dispositis, niveis, inflatis, irregulariter laceratis, cellulis pseudoperidiis rhomboideis v. oblongis usque ad 55 \times 15-28, dense verrucosis; sporis ellipsoideis, 19-24 \times 17-20, verrucosis.

Hab. in foliis Abietis (Piceæ) hondoensis, Mont. Fuji Japoniæ (S. KUSANO).

4. **Peridermium delicatulum** Arth. et Kern., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) p. 412. — Pycnidiis amphigenis, numerosis, sparsis, conspicuis, brunneis, rima longitudinali dehiscentibus, subcuticularibus, 0,3-0,4 mm. lat, 0,5-1 mm. long, depresso-conoideis 80-100 μ . altis; æcidiis amphigenis, e mycelio limitato orientibus, numerosis, in maculis decoloratis sparsis, rima longitudinali erumpentibus, 1-5 mm. long, peridio hyalino, delicato, parum eminente, cellulis isodiametricis, 20-25 μ . diam., tunica transverse striata, intus minute verrucosa 4-5 μ . cr., extus tenuiori; æcidiosporis ovoideis v. cuboideis, 21-28 \times 19-21, contentu nitide aurantiaco, tunica hyalina, minute verrucosa, 2,5-3 μ . cr.

Hab. in foliis Pini sp., St.-Augustine Florida Amer. bor. (E. W. D. HOLWAY).

5. **Peridermium fusiforme** Arth. et Kern., Bull. Torr. bot. Club, XXXIII (1906) pag. 421. — Pycnidiis ignotis; æcidiis cauliculis, hypertrophias fusoides efficientibus, 2-6 cm. cr., 5-25 cm. longis, numerosis, sparsis, elongatis et interdum tortuosis, 3-9 mm.

long., 1-2 mm. cr., distinctis v. raro confluentibus, pallide flavis, bullatis, depressis; peridio circumscissili, mox dejecto, 2 cellulas circ. crasso, cellulis rotundatis v. irregularibus, tunica crassa, radiatim striata; æcidiosporis obovatis v. ellipsoideis 24-33 \times 15-24, tunica hyalina, 3-5 μ . cr., uniformi, crebre verrucosa, area basali et sublaterali levi præditis, tuberculis 1 μ . circ. longis, tarde deciduis.

Hab. in ramis Pini Tædæ et Pini palustris, Amer. bor.

6. **Peridermium globosum** Arthur et Kern, Bull. Torr. bot. Club, 2828 XXXIII (1906) pag. 424. — Pycnidiis ignotis; æcidiis cauliculis, hypertrophias sphæroideas 2-3 cm. diam. efformantibus, plerumque confluentibus e pallide flavis albis; peridio circumscissili, extus verruculoso intus verrucoso, cellulis lanceolatis, angustis, radiatim dispositis, tunica crassa, radiatim striata, subtuberculata; æcidiosporis ellipsoideis 26-31 \times 16-22, tunica hyalina, parum verrucosa 2-3 μ . cr., area basali lateraliter subexpansa levi crassiori præditis.

Hab. in ramis Pini Strobi, Leone Rock Wisconsin Americæ borealis.

7. **Peridermium gracile** Arth. et Kern, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII 2829 (1906) p. 417. — Pycnidiis amphigenis, numerosis, sparsis, rima longitudinali 500-750 \times 190-350 dehiscens, depresso-conoideis, subcuticularibus, 60-75 μ . altis; æcidiis amphigenis, e mycelio limitato orientibus, numerosis, in maculis decoloratis, sparse insidentibus, rimula longitudinali erumpentibus, 0,3-0,5 mm. lat., lateraliter compressis 0,5-1,5 mm. long., 1-1,8 mm. alt., irregulariter erumpentibus; peridio hyalino, moderate firmo, 30-40 μ . long., tunica transverse striata, intus moderate verrucosa, 6-9 μ . crassa, extus tenuiori 4-6 μ .; æcidiosporis ellipsoideis, 23-39 \times 18-24, tunica hyalina, crebre et æqualiter verrucosa tuberculis latis deciduis prædita, 3,5 μ . cr.

Hab. in foliis Pini filifoliæ, Mexico, Amer. bor.

8. **Peridermium intermedium** Arth. et Kern, Bull. Torr. Bot. Club, 2830 XXXIII (1906) p. 416. — Pycnidiis amphigenis, sparsis, conspicuis, rima longitudinali 0,3-0,4 mm. lat., 0,5-0,75 mm. long. dehiscens, subcuticularibus, depresso conoideis, 65-80 μ . alt.; æcidiis amphigenis, e mycelio limitato orientibus, sparsis, in maculis decoloratis plus minusve expansis dispositis, rima longitudinali erumpentibus, lateraliter depressis, sublinguiformibus, 1,5-3 mm. lat., 0,8-1,5 mm. alt., rima apicali erumpentibus; peridio hyalino, subfirmo, cellulis 35-50 μ . long., paullo longioribus quam

latis, tunica transverse striata, intus crasse verrucosa, subcrassa 6-9 μ ., extus subæquali; æcidiosporis ellipsoideis 23-29 \times 16-20, tunica colorata, æqualiter et minute verrucosa, 2,5-3,5 μ . crassa.

Hab. in foliis Pini echinatæ, Amer. bor.

9. **Peridermium montanum** Arth. et Kern, Bull. Torr. Bot. Club, 2831
XXXIII (1906) p. 413. — Pycnidiis plerumque hypophyllis, subnumerosis, sparsis, conspicuis, subcuticularibus, rima longitudinali 0,3-0,5 mm. lat., 0,5-1 mm. long. dehiscentibus, depresse conoideis 55-65 μ . alt.; æcidiis e mycelio limitato orientibus, plerumque hypophyllis, subnumerosis in maculis plus minusve expansis dispositis, rima angusta erumpentibus, lateraliter depressis, 1-1,5 mm. latis, 0,5-0,8 mm. alt., irregulariter erumpentibus; peridio hyalino, delicato, cellulis 55-65 μ . long., tunica subuniformiter 3-5 μ . incrassata; æcidiosporis ex oblongo lineari-oblongis 32-45 \times 16-24, tunica hyalina, subtenui 2-3 μ . cr., crebre et crasse verrucosa.

Hab. in foliis Pini scopulorum, P. Murrayanæ, in America bor.

10. **Peridermium stalactiforme** Arth. et Kern, Bull. Torr. Bot. Cl., 2832
XXXIII (1906) pag. 419. — Pycnidiis ignotis; æcidiis cauliculis, sparsis, rotundatis v. irregularibus, 0,5-1,5 lat. v. 1-2 mm. long., distinctis v. interdum confluentibus, e pallide flavis albis, depressis, parum exertis; peridio hemisphærico v. tortuoso, lateraliter erumpente, 2 cell. circ. spisso, sæpe irregulariter erumpente et lacinias stalactiformes exerente; cellulis peridialibus rotundatis v. quandoque elongatis et parum acuminatis, tunica crassa, striata, lumine parvo; æcidiosporis ellipsoideis, 27-35 \times 16-21, tunica hyalina, 2,5-3,5 μ . cr., moderate verrucosa, lateraliter levi et paullo crassiori.

Hab. in ramis Pini Murrayanæ et Pini Jeffreyi, America bor.

11. **Peridermium kurilense** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 107. 2833
— Truncicola; pseudoperidiis vesiculosus, magnis, cortice luxurianti circumdatis; sporis ellipsoideis v. oblongis, 25-40 \times 17-27, verrucosis, partim levibus.

Hab. in ramis fusoido-incrassatis Pini pumilæ, in insula Kurile Japoniæ (K. YENDO). — Affine *Perid. Strobi* sed sporæ conspicue majores.

12. **Peridermium mexicanum** Arth. et Kern, Bull. Torr. Bot. Club, 2834
XXXIII (1906) pag. 422. — Pycnidiis ignotis; æcidiis cauliculis, gallas sphaeroideas irregulares 3-7 cm. latas efformantibus, plerumque in ramis junioribus et tortuosis dispositis, e pallide flavis

albis, bullatis, parum depressis; peridio hyalino circumscissili, 2 cellularibus circ. cr., extus subirregulariter ruguloso, intus rugoso, cellulis rotundatis v. irregulariter compressis, tunica crassa, radiatim striata; æcidiosporis ellipsoideis v. obovatis, 23-33 \times 13-22; tunica hyalina 2,3 μ . cr., crasse verrucosa, interdum area basali lateraliter subexpansa levi paullo crassiore, 3-4 μ ., præditis; tuberculis interdum deciduis.

Hab. in ramulis Pini patulæ et P. oocarpæ, Mexico Amer. bor.

13. **Peridermium fructigenum** Arth., Bull. Torr. Bot. Club XXXVII 2835 (1910) p. 578. — Pycnidiis squamuliculis, numerosis, inconspicuis, subcuticularibus, subcolumnaribus v. irregulariter conoideis 48-58 μ . diam., 35 μ . circ. altis; periphysibus nullis; æcidiis squamuliculis, numerosis, sæpe arcte coalitis, oblongis, 0,3-0,5 mm. lat., 0,7-1,5 mm. long., subepidermicis, mox nudis, siccis pallidis, epidermide rupta conspicuis; peridio irregulariter convexo, cellulis peridialibus ellipsoideis, laxis, sporis subconformibus sed paullo latioribus, rugosis, sæpe irregulariter compressis; æcidiosporis late ellipsoideis v. obovatis, 19-22 \times 13-16, tunica pallida, 2-2,5 μ . cr., minute et crebre verrucosa.

Hab. in strobilis Tsugæ canadensis, East Granby Conn. Amer. bor. (PERL. SPAULDING).

14. **Peridermium Laricis** (Kleb.) Arth. et Kern, Bull. Torr. Bot. Cl. 2836 XXXIII (1906) p. 436, *Æcidium Laricis* Kleb. — Æcidiis hypophyllis, sparsis v. lineari-aggregatis secus nervum primarium, minutis, pallide rubro-aurantiis, pustulatis, irregulariter laceratis; æcidiosporis globosis v. ovoideis, tunica hic tenui et levi, hinc incrassata.

Hab. in foliis Laricis europææ, in Germania, Gallia. — Est status æcidiosporicus *Melampsoridii betulini*.

15. **Peridermium giganteum** (Mayr) Tubeuf, Pflanzenkr. pag. 56 et 2837 p. 429. — Ramos hinc inde valde tumefaciens et excrescentias magnas subglobosas tuberoideas extus rugosas efficiens, praterea-que ramulos extremos, ut videtur cladomoniacos reddens; pseudoperidiis

Hab. in ramos Pini densifloræ et P. Thunbergii in Japonia (Doct. GRASMANN).

16. **Peridermium deformans** (Mayr) Tub. Pflanzenkr., p. 429, Mayr, 2838 Waldungen von Nordamer. (1890) tab. 10 (*Æcidium*).

Hab. in ramis Pini mitis, in America.

17. *Peridermium pseudo-balsameum* (Diet. et H.) Arth. et Kern., Bull. 2839 Torr. Bot. Cl. XXXIII (1906) p. 430. Ita vocandum est *Æcidium pseudo-balsameum* D. et H. — Syll. XVI, p. 346.
18. *Peridermium coloradense* (Diet.) Arth. et Kern., Bull. Torr. bot. 2840 XXXIII (1906) pag. 426. Ita nuncupandum *Æcidium coloradense* Diet. — Syll. XIV, p. 388.
19. *Peridermium conorum-Piceæ* (Rees) Arth. et Kern., Bull. Torr. 2841 bot. Cl. XXXIII (1906) p. 431. Ita vocandum *Æcidium conorum* Thüm. — Syll. VII, p. 836.

RÆSTELIA Rehent. — Syll. VII p. 833, XI p. 222, XVI p. 348, XVII p. 409.

1. *Ræstelia Betheli* Kern, Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 2842 p. 461. — Pycnidiis fructiculis et epiphyllis, numerosis, gregariis et in maculis decoloratis plus minusve irregulariter confertis, punctiformibus, subepidermicis, e flavo-melleis nigrescentibus, ampulliformibus 130-160 \approx 100-112, setulis ostiolaribus 45-65 μ . long.; æcidiis fructiculis et hypophyllis, in maculis decoloratis dense vel separatim aggregatis, cylindræis 0,2-0,3 cr., 3-8 mm. alt.; peridio albo-brunneo, sæpe profunde lacerato lacunculato, cellulis pseudo-peridii rhomboideo-linearibus 60-90 \approx 16-20, tunica extus 1-1,5 μ . cr. intus 4-6 μ . cr.; æcidiosporis globoideis 23-30 \approx 18-24, tunica castaneo-brunnea, 2,5-3 μ . cr., minute verrucosa, poris numerosis, sparsis.

Hab. in fructibus et foliis *Cratægi Cerronis* et *Crat. salignæ*, Colorado Amer. bor.

2. *Ræstelia Harknessiana* Ell. et Ev., North Amer. Fungi n. 2714 2843 et in Kern, Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) pag. 462. — Pycnidiis ignotis; æcidiis fructiculis, regulariter dispositis, cylindræis 0,5-0,8 mm. diam. 4-7 mm. long.; peridio brunneo-aurato, tenaci, non lacerato, cellulis rhomboideis, 90-112 \approx 58-74, tunica extus 4-6 μ . cr., intus 15-20 μ .; æcidiosporis globoideis 22-30 μ . diam., tunica vivide cinnamomeo-brunnea, 2-2,5 μ . cr., minute verrucosa, poris numerosis, sparsis.

Hab. in fructibus *Amelanchieris alnifoliæ*, Klamath River California, Amer. bor.

3. *Ræstelia harknessianoides* Kern., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV 2844 (1907) pag. 463, *R. Harknessiana* Ellis et Ev., Fungi Columb. n. 1293. — Pycnidiis fructiculis, numerosis, sparsis vel in greges conspicuos plus minusve confertis, punctiformibus, subepidermicis,

flavo-melleis dein nigricantibus, globoideis, latis, 160-220 \times 150-210, setulis ostiolaribus 65-80 μ . long.; æcidiis fructicolis, sparsis v. congregatis, cylindraceis 0,5-0,8 mm. diam., 2-4 mm. alt.; peridio flavo-albido, subtenaci, non lacerato, cellulis rhomboideis 65-100 \approx 45-55, tunica extus 5-8 μ . intus 27-35 μ . cr.; æcidiosporis globoideis 23-31 μ . diam., tunica pallide flava, 2-2,5 μ . cr., minute verrucosa, poris inconspicuis, sparsis.

Hab. in fructibus *Amelanchieris oreophilæ* et ? *Amel. alnifoliæ*, Colorado.

ÆCIDIOLUM Unger — Syll. VII, p. 773.

1. **Æcidium Erigerontis** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires, t. XIX 2846 (1909) p. 323. — Maculis amphigenis indeterminatis ad epiphyllum concaviusculis, ad hypophyllum convexulis atque carnosulis; pustulis centro macularum densiuscule gregariis, lenticulari-conoideis 75-90 μ . diam., epidermide velatis vix prominulis, porose dehiscentibus atque sporulas cirrose conglobatas emittentibus; sporulis pusillis, 2,5-3 \approx 1,5-2, eguttulatis.

Hab. in foliis vivis *Erigerontis sordidi* in pratis circa Jujuy Argentina Amer. austr.

2. **Æcidium Acaciæ** (Henn.) Sacc. et Trott. Cfr. infra ad *Æcidium* 2846 *Acaciæ*.

ÆCIDIUM Pers. — Syll. VII p. 774, IX p. 319, XI p. 213, XIV p. 369, XVI p. 325, 1121, XVII p. 410.

1. **Æcidium ugandense** Sydow, Engler's Bot. Jahrbüch. 45 Bd. (1910) 2847 p. 262. — Maculis orbicularibus v. irregularibus, indeterminatis, flavis v. flavo-brunneis, 3-10 mm. diam.; æcidiis hypophyllis, in greges orbiculares v. sæpe irregulares usque ad 1-2 cm. long., laxiuscule dispositis, sæpe nervos sequentibus, cylindraceis, albis, margine lacerato; cellulis contextu rhomboideis, 30-32 \approx 18-25; æcidiosporis angulato-globosis, verruculosis, hyalino-flavidis, 18-20 μ . diam.

Hab. in foliis *Turraëæ* sp., Kibwezo, Africa trop. Britannica (SCHEFFLER).

2. **Æcidium Aconiti-paniculati** Ed. Fischer, Die Uredin. der Schweiz 2848 (1904) p. 528, fig. 329. — Æcidiis hypophyllis, in greges rotundatos plus minusve rotundatos dispositis, cupulatis, margine revoluta, cellulis pseudoperidii laxè et inordinate aggregatis, tunica

extus 6-7 μ . cr., intus 2-3 μ .; æcidiosporis globosis subinde ellipsoideis 17-24 \times 28; tunica tenui, crebre et minute verruculosa.

Hab. in foliis *Aconiti paniculati*, pr. Guarda, Engadina. 2849

3. ***Æcidium Hellebori*** Ed. Fischer, Die Uredin. der Schweiz (1904) p. 526. — Pycnidiis amphigenis, immersis, 135-150 μ . cr.; æcidiis hypophyllis in greges rotundatos congregatis; peridiis cupulatis margine revoluta, laciniata; cellulis pseudoperidii tunica extus usque ad 10 μ . cr., intus usque ad 6 μ .; æcidiosporis catenulatis, globoso-angulatis, 18-24 \times 18-21, tunica tenui, crebre et minute verruculosa.

Hab. in foliis *Hellebori viridis*, M. Generoso, Canton Ticino (VOLKART).

4. ***Æcidium Semiaquilegiæ*** Diet, Ann. Mycol. V (1907) pag. 77. — 2850
Pycnidiis per totam inferiorem paginam foliorum æqualiter dispersis, hemisphæricis, sub cuticula orientibus; pseudoperidiis hypophyllis, laxe gregariis, folia obtegentibus, cupulatis, margine reflexo denticulato præditis; æcidiosporis subglobosis, ellipsoideis v. oblongis, 15-22 \times 11-16, episporio æquali, sublevi, in sicco subtiliter verruculoso.

Hab. in foliis *Semiaquilegiæ* (*Isopyri*) *adoxoidis*, Jokimura, Tosa Japoniæ (YOSHINAGA).

5. ***Æcidium Batesianum*** Barth. in Fungi Col. n. 1901. — Hypophyllum; maculis in pag. super. non conspicuis; pseudoperidiis pallide aurantiis, in soros angulosos 1-7 mm. diam. congregatis, plerumque profunde laceratis, fragilibus; æcidiosporis ex anguloso globosis v. subellipsoideis, 15-22 \times 15-17.

Hab. in foliis et petiolis *Delphinii albescentis*, Red Cloud, Nebraska Amer. bor. — Ab *Æcidio Delphinii* differt pseudoperidii colore et forma nec non forma magnitudineque sporarum.

6. ***Æcidium montanum*** Butler, Some Indian Forest Fungi, p. 30 c. 2852
ic. ad pag. 26 et 28, in Indian Forester (1905). — Maculis coccineis centro nigris v. nullis in epiphylo, pallide rubris in hypophylo; pycnidiis amphigenis, sæpius epiphyllis, gregariis, sepositis v. in centro *Æcidii*, nigris, immersis, ampulliformibus, 65 μ . supra folii superficiem emergentibus, 120 μ . lat., periphysibus 50-75 μ . long., sporulis exiguis mucosae cinctis; æcidiis numerosis in soros 6-18 mm. lat.; pseudoperidiis usque ad 4 mm. long., tubulosis; aurantiis, sursum albidis; æcidiosporis aurantiis irregulariter globosis, ovoideis v. angulosis, 17-35 \times 17-29, sæpius 23 \times 19, episporio minute ruguloso.

Syll. fung. XXI (1-1912)

Hab. in foliis *Berberidis Lycii*, *B. coriariæ* et *B. aristatæ* in Himalaya boreali-occid. — Folia sæpe atrophica v. deformata fiunt.

7. ***Æcidium Leveilleanum*** P. Magn., Ber. Deutsch. bot. Ges. (1892) 2853 pag. 323, *Uredo Berberidis* Lév. in Ann. Sc. Nat. Bot. V (1846) p. 268. — Soris hypophyllis, solitariis v. gregariis, pustulatis, epidermide tectis, poro dehiscens; pseudoperidii cellulis laxè imbricatis, eximie elongato-obclavatis, membrana crassissima præditis, levibus, sursum longe cuspidatis ibique membrana minus incrassata; æcidiosporis subglobosis v. globoso-angulosis, minute verrucosis, luteis.

Hab. ad folia *Berberidis buxifoliæ*, S. Carlos, Chili (GAY). — Cum *Æcidio Berberidis* nil commune habet.

8. ***Æcidium Berberidis-Thunbergii*** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVII 2854 (1905) pag. 159. — Maculis rotundatis bullatis, sanguineis, pycnidiiis haud conspicuis; æcidiis hypophyllis sparsis, pseudoperidiis aggregatis, cylindræis, c. 1 mm. long., albidis, contextu cellulis rotundato-polyedricis, reticulatis, hyalinis, 15-22 μ . diam.; sporis subgloboso-angulatis, hyalinis v. flavidulis c. 10-15 μ . cr.

Hab. in foliis *Berberidis Thunbergii* in provincia Tosa Japoniæ.

9. ***Æcidium Uvariæ-rufæ*** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 253. 2855 — Maculis rotundatis rufo-brunneis, margine flavo-fuscidulis; pycnidiiis punctiformibus atris; æcidiis hypophyllis sparse gregariis, cupulatis, flavido-fuscidulis, cellulis contextu polyedricis reticulatis; æcidiosporis subglobosis, angulatis, hyalino-fuscidulis, 17-18 μ . diam.

Hab. in foliis *Uvariæ rufæ*, Luzon, Maragondong Cavite in Ins. Philippinis (MERRILL).

10. ***Æcidium Hexalobi*** Hariot et Pat., Bull. Mus. Hist. nat. Paris, n. 2 2856 (1909) p. 84. — Maculis amphigenis, rufo-brunneis, carnosio-incrassatis, orbicularibus, 2-3 cm. diam., areola fusca cinctis; æcidiis hypophyllis dense gregariis, profunde immersis, margine dentato dein integro, circ. 150 μ . alt. 125 μ . lat., pseudoperidiis tubuliformibus, flavescentibus, cellulis elongato-hexagoniis, tabuliformibus, minute verrucosis, tenuiter tunicatis, 32-35 \times 16 compositis; æcidiosporis 14 μ . diam., pallide luteis, tenuiter tunicatis (1 μ . circ.), leviusculis, 5-6 sphaerulas globosas, hyalinas, distinctas, fere æquatorialiter dispositas, 2 μ . latas gerentibus, longissime et copiose catenulatis; pycnidiiis numerosissimis epiphyllis.

Hab. in foliis *Hexalobi grandiflori*, Chari; poste de la Nana, Congo Africæ trop.

11. *Æcidium Usterianum* Speg., Fungi Paulist., Rev. Mus. La Plata, 2857 t. XV (1908) p. 10. — *Æcidiis* hypophyllis, plerumque nervisequiis, erumpentibus albido-flavescentibus, parvulis, cylindraceo-poculiformibus, 200-400 μ . alt. 150-250 μ . diam., in maculis pallentibus indeterminatis v. nullis insidentibus; cellulis pseudoperidii ovatis v. rhomboideis, 25-35 \times 20-30, crassissime tunicatis, grosse denseque verrucosis; *æcidiosporis* subglobosis v. obsolete angulosis, 20-24 μ . cr. levibus, hyalinis, endoplasmate nubiloso v. guttulato aurantio farctis.

Hab. in foliis *Menispermaceæ*? cujusdam in Horto Botanico S. Paulo Brasiliæ (USTERI).

12. *Æcidium Cratævæ* Syd. Ann. Mycol. IV (1906) p. 440. — *Æ-* 2858 *ecidiis* hypophyllis, maculis magnis orbicularibus vel suborbicularibus 2-6 cm. longis, flavo-brunneis insidentibus, in greges totam maculam explentes laxè vel densiuscule dispositis, pycnidia in centro macularum evoluta, plerumque ambientibus, minutis, breviter cylindraceis, margine albido inciso; *æcidiosporis* angulato-globosis, subtiliter verruculosis, flavidis, 21-26 μ . diam.

Hab. in foliis *Cratævæ religiosæ*, Khanaighat, Sylhet, Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

13. *Æcidium Cannonii* Griff., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 2859 pag. 210. — Pycnidiis plerumque epiphyllis, minutis, rubro-brunneis; *æcidiis* hipophyllis, 1 mm. c. cr., centrifuge circum aream spermogoniam plerumque nascentibus; pseudoperidio apice aperto margine lacerato revoluta; sporis irregulariter polygoniis v. pressione simpliciter angulatis, 24-30 μ . cr., episporio 3 μ . cr., subhyalinis, minute rugosis, contentu sparse granuloso.

Hab. in foliis *Fouquieriæ splendentis*, Sabino Canon in montibus Santa Catalina Arizona, Amer. bor.

14. *Æcidium Ophiocauli* P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, 2860 Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907), p. 94. — Maculis flavis rotundatis; pycnidiis epyphyllis, gregariis; *æcidiis* oppositis, pseudoperidiis sparsis vel aggregatis, cupulatis, flavis, margine fimbriatis, contextu cellulis rotundato-polyedricis, reticulatis; *æcidiosporis* subgloboso-angulatis, flavido-hyalinescentibus, levibus, 15-18 μ . diam.

Hab. in foliis *Ophiocauli* (? *cissampeloidis*), Sonso, Congo (VANDERYST).

15. *Æcidium Eichelbaumii* P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 2861
pag. 105. — Maculis atro-fuscis, rotundatis, sine pycnidiis, æcidiis hypophyllis, gregarie dispositis, cupulatis, pallidis dein fuscidulis, cellulis pseudoperidii contextu rotundato v. elliptico-polyedricis, reticulatis, pallidis, 20-25 μ . cr.; sporis subgloboso-angulatis, hyalinis, 10-13 μ .
Hab. in foliis *Passifloræ* sp., Amani Usambara Africæ (EICHELBAUM).
16. *Æcidium sphæralceanum* (Speg.) Sacc. et Trott., *Æcidium Sphæralceæ* Speg. An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) p. 322, non Ell. et Ev. — Maculis nullis v. matrice vix pallescente; peridiis hypophyllis, hinc inde in pulvinulos bulloso-incrassatulos dense constipatis, cylindræis, longiuscule exsertis 0,5-1,5 mm. long. 0,4 mm. diam., ore erosulo-denticulatis, e flavido albescentibus; cellulis peridialibus elliptico-fusoideis, 30-60 \approx 18-24, hyalinis, tunica crassa verruculosa vestitis; sporis subglobosis 20-22 \approx 18-20, episorio hyalino 4-6 μ . cr., verruculoso-undulato obvolutis, endoplasmate nubiloso luteo-aurantio fartis.
Hab. in foliis vivis *Sphæralceæ* cisplatinæ prope Bahia Blanca Amer. Austr. — Ab *Æc. Modiolæ* Thm. æcidiosporis verrucosis peridiisque longioribus tenuioribusque recedit.
17. *Æcidium Warneckeanum* P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII 2863 (1905) p. 105. — *Æcidiis* ramicolis, ramos varie deformantibus, gallas ramosissimas corniformes vel xylariæformes usque ad 20 cm. longas, 10 cm. latas, fuscas efformantibus; æcidiis ubique gallas circumdantibus; pseudoperidiis immersis, cupulatis, margine pallidis, contextu cellulis subrotundato-polyedricis, hyalinis, c. 20 μ .; æcidiosporis subgloboso-angulatis, hyalino-fuscidulis, 10-13 μ . cr.
Hab. in ramis deformatis *Grewiæ* *carpinifoliæ*, Amani Usambara Africæ (WARNECKE, EICHELBAUM).
18. *Æcidium Elæocarpi* Raciborski Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 2864 p. 276. — Pycnidiis epiphyllis sublenticularibus, conoideis, 80-130 μ . cr.; æcidiis foliicolis v. caulicolis, pseudoperidio cylindræo profunde immerso, 700-900 \approx 350, basi conoideo-attenuato; æcidiosporis elongatis, flavo-brunneis, minute verrucosis, apice subconoideis, 44-60 \approx 18-24, regulariter stratis.
Hab. in foliis ramulisque *Elæocarpi* *longifolii* prope Buitenzorg in ins. Java. — In ramulis gallas 2-4 cm. long. 2-10 mm. cr. efformat. Forsan *Æcid. Puspa* Racib. ab hoc non differt. Cfr. *Pucc. Puspa* Rac.

19. *Æcidium Actinidiæ* Syd., Ann. Mycol. VII (1909) p. 169. — 2865

Maculis magnis, orbicularibus v. irregularibus, flavis v. flavo-brunneolis, 1-2 cm. latis; æcidiis hypophyllis, in greges rotundatos 3-6 mm. latis dense dispositis, breviter cupulatis, margine albido, inciso; æcidiosporis angulato-globosis, subtiliter verrucosis, flavidis, 16-22 μ . diam.

Hab. in foliis *Actinidiæ argutæ*, Mt. Myoko Echigo Japoniæ.

20. *Æcidium cardiospermophilum* Speg. An. Mus. Nac. Buenos Aires 2866

t. XIX (1909) p. 320. — Maculis amphigenis angulato-suborbicularibus, 1-2 mm. diam., ad epiphyllum arescenti-albescentibus, eximie determinatis, margine angustissimo calloso subfuscescente cinctis, planiusculis v. concaviusculis, ad hypophyllum bulloso-conve-xulis, carnosulis, aurantiellis, obsolete determinatis; peridiis hypophyllis dense gregariis primo subhemisphærico-prominulis dein poculatim apertis, acie integra, vix exerta aurantia; cellulis peridialibus elongato-angulosis, 25-30 \times 15-20, dense corrugatis crasse tunicatis; æcidiosporis subglobosis 16 μ . diam., episporio tenui, levi, endoplasmate granuloso luteo foetis.

Hab. in foliis vivis *Cardiospermi Coryndi* in sepibus prope Jujuy Argentinæ, Amer. Austr.

21. *Æcidium Byrsonimæ* Kern et Kellerm., Journ. of Mycol. XIII 2867

(1907) p. 24. — Pycnidiis amphigenis et cauliculis, æcidia præcedentibus, his intermixtis, conspicuis, subcuticularibus, demum castaneo-brunneis, conicis, 150-200 \times 75-85, ostioli periphysibus nullis; æcidiis amphigenis et cauliculis, hypertrophias valde extensas gignentibus, copiosis, 0,5-0,7 mm. diam., 1-1,5 mm. altis; pseudo-peridiis albis, margine eroso sæpe recurvato, cellulis rhomboideis, imbricatis, 35-50 μ . long., tunica externa 3-4 μ . cr., interna 5-7 μ . cr., grosse verrucosa, transverse striata; æcidiosporis angulosis, ovoideis v. oblongis, sæpe basi truncatis, sursum tenuatis, 39-57 \times 26-35, pallide flavis, grosse verrucosis, tunica crassa (3-5 μ .) inferius crassiori (5-15 μ .).

Hab. in foliis caulibusque *Byrsonimæ crassifoliæ* Lierre de las Minas, Guatemala.

22. *Æcidium Toddaliæ* Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya, v. IV, 2868

Pt. V (1909) p. 303. — Æcidiis in maculis flavis insidentibus, clausis spheroides, in utraque pagina conspicuis; maculis demum incrassatis, gallas 2-4 cm. diam. in pagina inferiore efformantibus;

æcidiis in pagina inferiore apertis, minutis, 0,5 mm. diam., sporis aurantiacis, verrucosis, irregulariter ovoideis, 50-57 \times 27-34.

Hab. in foliis *Toddaliæ aculeatæ*, Nuwara Eliya, Ceylon.

23. *Æcidium Paramignyæ* Racib. Bull. Ac. Sc. Cracovie (Febr. 1909) 2869 p. 277. — *Æcidiis* et pycnidiis hypophyllis in maculis rotundatis 2-5 cm. latis supra pallidis subtus flavidis insidentibus; pycnidiis globosis, immersis, 240 \times 200, ostiolo convexo lato; pseudoperidiis cylindræis, usque ad 380 μ . alt. 0,3 mm. cr., flavo-aurantiacis, margine lacinulatis; cellulis pseudoperidii depressis, 24-36 μ . long. tunica usque ad 20 μ . incrassata; æcidiosporis globosis, tenuiter tunicatis, minute punctatis, 18-24 μ . diam.

Hab. in foliis *Paramignyæ Blumei*, prope Buitenzorg in ins. Java.

24. *Æcidium Petchii* Sacc. et Trott., *Æcidium Paramignyæ* Petch, 2870 Ann. R. Bot. Gard. Paradeniya IV Pt. (Martio 1909) p. 302, non, ut videtur, homonymon Raciborskii. — *Æcidiis* hypophyllis, confertis, in maculis circularibus 1-2 cm. diam. pallide viridibus, late marginatis insidentibus, flavis, 0,2 mm. diam.; pseudoperidiis tubulosis, 0,2 mm. alt., apice apertis, albis, cellulis polygoniis, crasse verrucosis; sporis irregulariter ovoideis vel subglobosis, crasse verrucosis, 20-25 \times 17-19.

Hab. in foliis *Paramignyæ monophyllæ*, Kandy, Ceylon.

25. *Æcidium Rutæ* Hariot, Les Uredin. in *Encycl. scient.* (1908) 2871 p. 290. — Pycnidiis epiphyllis v. petiolicolis, in maculis obsoletis insidentibus, flavo-rubris, parvis, hemisphæricis; æcidiosporis globulosis, v. oblongis, regularibus, crasse tunicatis, flavis, minute verrucosis.

Hab. in foliis petiolisque *Rutæ chalepensis* in Gallia.

26. *Æcidium Zanthoxyli-schinifolii* Diet. Engl. Jahrb. XXXIV (1905) 2872 p. 589. — Pseudoperidiis in maculis flavis, brunneis v. nigrescentibus magnis et in petiolis tumefactis laxè gregariis, haud raro circulariter dispositis, minutis, margine integro caduco albido donatis; cellulis pseudoperidii grosse verrucosis, rotundato-polyedricis, c. 25 μ . diam.; æcidiosporis late ellipsoideis v. angulatis, episorio mediocri, dense verruculoso indutis, 27-33 \times 22-27,5.

Hab. in foliis petiolisque *Zanthoxyli schinifolii* in prov. Iwaki Japoniæ (S. KUSANO).

27. *Æcidium Stranvæsiæ* Syd. Ann. Mycol. V (1907) p. 505. — *Æ-* 2873 cidiis hypophyllis, maculis irregularibus fusco-purpureis insidenti-

bus, paucis in greges minutos dispositis; æcidiosporis angulato-globosis, subtiliter verruculosis, subhyalinis, 12-16 μ . diam.

Hab. in foliis *Stranvæsiæ glaucescentis*, Kumaon Himalaya (INAYAT, comm. E. J. BUTLER).

28. ***Æcidium Sorbi*** Arth. Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII (1909) p. 521. 2874

— Pycnidiis epiphyllis numerosis, gregariis, in areis decoloratis in parvos greges dispositis, conspicuis, subepidermicis, flavo-melleis dein brunneis, conoideis, 110-130 μ . diam., 70-80 μ . alt.; setulis ostiolaribus 30-45 μ . long.; æcidiis hypophyllis, numerosis, gregariis, 4-7 congregatis, in maculis plus minusve incrassatis dispositis, cupulatis, 0,2-0,4 mm. alt. 0,2-0,3 mm. lat.; peridio hyalino, margine suberecto, eroso, cellulis peridialibus rhomboideis 30-45 μ . long., tunica extus 10-13 μ . cr. transverse striata, levi, intus 3-5 μ . cr., substriata et moderate verrucosa; æcidiosporis late ellipsoideis, plerumque subangulatis 27-39 \times 23-27, tunica hyalina, 3-4 μ . cr., minute verrucosa.

Hab. in foliis *Sorbi occidentalis*, Vancouver Isl. Brit. Columbia, Canada, Amer. bor. (F. K. BUTTERS).

29. ***Æcidium patulum*** Syd. Ann. Mycol. V (1907) p. 506. — *Æcidiis* 2875

sæpius hypophyllis, petiolicolis vel fructicolis, in greges irregulares magnos $\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ cm. vel ultra latos vel elongatos dense dispositis, breviter cylindræis, albo-flavis, marginite revolutis, lacerto; contextu e cellulis angulatis hyalinis verrucosis 21-28 μ . longis, 18-22 μ . latis composito; æcidiosporis globosis, subglobosis vel ovatis, dense verruculosis, contentu hyalino-flavo, membrana hyalina, apice valde incrassata (usque ad 9 μ .), 18-25 \times 15-20.

Hab. in foliis, petiolis fructibusque *Cratægi coccineæ*, Khasi Hills, Assam Indiæ orient. — Ab *Æc. Blasdaleano* et *Æc. Purpusiorum* omnino diversum.

30. ***Æcidium Atylosiæ*** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya, v. IV, 2876

Pt. V (1909) p. 302. — Hypophyllum, 0,5 mm. circ. diam., rubro-aurantiacum, in parenchymate foliorum profunde immersum et pilis obtectum, gallas minutas secus nervos efformans; pseudoperidio nullo; sporis subglobosis v. sphæroideis, aurantiacis, membrana hyalina, levibus, 25-32 \times 24-28.

Hab. in foliis *Atylosiæ Candollei*, Hukgala, Ceylon.

31. ***Æcidium Cajani*** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya, IV, Pt. 2877

V (1909) p. 302. — Gallas minutas 1 mm. circ. crass. efformans, hypophyllas et ad nervos insidentes, petiolicolas et caulicolas, apice erumpentes, intus cavas et massam sporarum aurantiacam conti-

nentes; pseudoperidio nullo; sporis intus aurantiacis, episporio hyalino, minutissime verruculosus, subglobosis, 20-45 \times 20-23.

Hab. in Cajano indico, Peradeniya Ceylon.

32. *Æcidium Falcatæ* Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII (1906) 2878 p. 32. — Pycnidiis amphigenis, in parvos greges, punctiformibus, flavo-melleis, immersis, subepidermicis, sectione verticali globosis, 100-125 μ . diam.; æcidiis hypophyllis, gregariis, in greges satis latos circulares v. irregulares congestis; peridio brevi, cylindrico, margine sæpe recurvo, dein lacerato; æcidiosporis globosis, 19-25 \times 18-23; tunica subtenui, 2 μ . cr., crebre verruculosa.

Hab. in foliis Falcatæ comosæ et Apii tuberosæ, Jowa, Amer. bor.

33. *Æcidium fluxum* Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 2879 p. 590. — Pycnidiis plerumque epiphyllis, paucis, inconspicuis, subepidermicis, flavo-melleis, subglobosis, parvis, 75-90 μ . diam., 66-80 μ . alt.; setulis ostiolaribus 80-112 μ . long.; æcidiis plerumque hypophyllis, paucis, in greges determinatos separatim dispositis, brevibus, parvis, 0,1-0,2 mm. diam.; peridio decolorato, irregulariter lacerato, recurvo, cellulis peridialibus rhomboideis, 27-35 μ . long., tunica extus 5-7 μ . cr. transverse striata, levi, intus tenuiori, substriata, minute verrucosa; æcidiosporis globoideis, 20-25 μ . diam., tunica pallide flava, tenui, 1 μ . c. cr., irregulariter et parum prominenter verrucosa.

Hab. in foliis Amorphæ canescentis, Colorado Amer. bor. (H. L. SHANTZ). — Ab *Æc. Amorphæ* Cooke, ad *Uropyx. Amorphæ* spectante, certe diversum.

34. *Æcidium Petalostemonis* Kellerm. et Carlet. in Arthur, Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) p. 589. — Pycnidiis amphigenis, in greges indeterminatos sparse dispositis, inconspicuis, subepidermicis, globosis, 70-100 μ . diam., 90-100 μ . alt.; setulis ostiolaribus 30-45 μ . long.; æcidiis amphigenis, gregariis, in greges indeterminatos, irregulares, in maculis decoloratis plus minusve expansis dispositis, brevibus, 0,2 mm. c. lat.; peridio pallido, margine sublacerato, expanso v. subrecurvo, cellulis pseudoperidii rhomboideis, tunica extus 5-7 μ . cr., non conspicue striata, levi, intus 3-4 μ . cr., minute verrucosula; æcidiosporis late ellipsoideis v. globosis, 20-28 \times 18-24, tunica pallida, tenui, 1-1,5 μ . cr., æqualiter et minute verrucosa.

Hab. in foliis Petalostemonis candidi, P. purpurei, P. villosi, P. multiflori, in America bor.

35. *Æcidium Pisi-formosi* Syd. Ann. Mycol. VI, (1908) p. 18. — 2381

Pycnidiis numerosis amphigenis vel cauliculis, sæpius hypophyllis, per totam folii superficiem vel magnam ejus partem æque distributis, punctiformibus, melleis, plantam nutricem deformantibus; æcidiis eadem distributione qua pycnidiis, cupulatis, margine inciso, albido, revolutis; æcidiosporis angulato-globosis, flavidis, subtilissime verruculosis, 18-25 μ . diam.

Hab. in foliis caulibusque Pisi formosi in glareosis alpinis montium Totschal Persiæ borealis (BORNMÜLLER). — Ab æcidio *Uromyctis Fabæ* soris late et crebre effusis et deformatibus facile dignoscendum.

36. *Æcidium Platylobii* Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 199, 2882

tab. XXXVI, fig. 237, 238. — Pycnidiis melleis, minutis, sparsis, v. in opposito pariete æcidiorum congregatis; sporulis numerosis, hyalinis, cylindræis, 3 \approx 1; æcidiis in maculis pallidis in foliis v. in leguminibus plus minusve congregatis insidentibus, aurantiacis; pseudoperidiis cylindræis, albidis, margine dentato, usque ad 1 mm. long.; æcidiosporis aurantiacis v. subangulatis, minute verruculosis, 21-25 \approx 14-18.

Hab. in foliis et leguminibus Platylobii formosi, Victoria Australiæ.

37. *Æcidium caulicola* P. Henn., in Fl. du Bas-et Moy.-Congo, Ann. 2883

Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) p. 95. — Æcidiis longe effusis, caules circumdantibus et vix deformantibus; pycnidiis sanguineis; pseudoperidiis gregariis, cupulatis, margine fimbriatis, flavido-hyalinescentibus, cellulis contextu oblongis, polyedricis, 20-25 \approx 10-15, reticulatis; æcidiosporis angulato-subglobosis, hyalinis, 10-15 μ .

Hab. in caulibus Vignæ, Dembo Afric. (VANDERYST).

38. *Æcidium nigro-cinctum* Pat. et Har., Bull. Soc. Myc. Fr. (1906) 2884

p. 116. — Maculis amphigenis sparsis, orbicularibus, minutis, 1 mm. diam., atris; pseudoperidiis hypophyllis 4-12 gregariis, minimis, pallide fuscis, dentato-marginatis, cellulis elongatis, verruculosis, fuscidulis, 24-30 \approx 12-15; sporis subglobosis, minute punctatis, pallide fuscis, 20-24 μ . diam.

Hab. in foliis Vignæ, sp. Hanoi Tonchini (BALANSA).

39. *Æcidium Menyharthi* P. Henn., Bull. Herb. Boiss. t. VI (1906) 2885

p. 702. — Maculis flavidis rotundato-angulatis v. effusis; æcidiis hypophyllis; pseudoperidiis sparsis v. aggregatis, primo subhemisphæricis v. elongato-cylindricis, clausis, flavidis, dein apertis sub-

cupulatis, margine pallide fimbriatis, contextu cellulis rotundato-polyedricis v. subtriquetris, subreticulatis, hyalinis; æcidiosporis subglobosis vel ellipsoideo-angulatis, levibus, hyalino-flavidulis, 12-18 \times 10-14.

Hab. in foliis *Lonchocarp*i?, Boroma in territorio Sambesi Africae orient-australis (MENYHART).

40. *Æcidium Acaciæ* Magnus, Ber. deutsch. Bot. Ges. (1892) p. 47, 2886
tab. IV, fig. 12-16 (pycnid.). — Hujus speciei, nondum re vera ut *Æcidium* notæ!, pycnidium esset (*Æcidium* (*Phoma Acaciæ*) P. Henn. in Ber. Deut. Bot. Gesellsch. XIV (1891) pag. 368 in Sylloge omissa. Ecce diagnosim: Pycnidiis gregariis immersis epidermide velatis sed periphysibus filiformibus brevibus erumpentibus, pustulatis, pallidis; sporulis cylindræis v. ellipsoideis, hyalinis 3,5-5 \times 2.

Hab. in ramulis *Acaciæ* etbaicæ in distr. Mensa Erythrææ, ubi leget SCHWEINFURTH. — Species eximie cladomaniaca (cfr. icon. Magnusii l. c) fasciculos scopiformes ramulorum efficiens.

41. *Æcidium Brumptianum* Pat. et Har., Bull. Soc. Myc. Fr. XX 2887
(1905) p. 85. — Deformans, in ramulis tubercula galliformia e nucis magnitudine ad pugni volumen efficiens; æcidiis densissime constipatis, totam gallarum superficiem occupantibus; pseudoperidiis 1 mm. lat., breviter tubulosis, paullulum prominulis, margine subinciso recto, e cellulis polygoniis, 32 \times 20, brunneolis, crasse tunicatis (6-8 μ .), dense radiatim verrucosis; æcidiosporis fulvis, subglobosis, ovoideis unave fine acutatis, subtiliter punctulatis, 16-30 \times 8-20; tunica 3 μ . cr.

Hab. in ramulis *Acaciæ* cujusdam pr. Guégneur, Gallas Abyssiniæ (DR. BRUMPT).

42. *Æcidium torquens* Mc Alpine, Ann. Mycol. IV (1906) p. 325. 2888
— *Æcidiis* numerosis, confertis, quandoque confluentibus, ex orbiculari ellipsoideis, rubido-brunneis, primum bullatis dein erumpentibus, prominentibus, $\frac{3}{4}$ -1 mm. diam.; cellulis pseudoperidii ex angulato oblongis v. rhomboideis, margine striatis, supra omnino aculeatis; æcidiosporis brunneo-auratis, ex obovato ellipsoideis v. elongato-oblongis, crasse echinulatis, uno latere 3 por. germ. plerumque distinctis æquatorialibus præditis, quandoque sparsis, 28-40 \times 14-17, plerumque 30 \times 15.

Hab. in gemmis fructibusque deformatis *Acaciæ Farnesianæ* in Australia.

43. *Æcidium Rhamni-japonici* Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1905) 2889

p. 589. — Maculis flavis v. brunneis; pseudoperidiis in soros rotundatos v. secundum nervos elongatos usque ad 1 cm., hypophyllis, congestis v. etiam in pagina superiore foliorum erumpentibus, breviter cylindricis, margine brevi, paullulum revoluta v. recto, minute denticulato donatis; æcidiosporis globosis, ellipsoideis vel oblongis, 22-30 \approx 18-21, minute verrucosis.

Hab. in foliis *Rhamni japonicæ* v. *genuinæ* in prov. Iwate Japoniæ (N. NAMBU).

44. ***Æcidium Peucedani-raiblensis*** Maire, *Æsterr. Bot. Ztschr.* LVII 2890 (1907) p. 330, fig. 2. — *Æcidiiis* plerumque hypophyllis v. petiolicolis, matricem incrassantibus, in greges usque ad 1 cm. elongatos dispositis, pustuliformibus; pseudoperidiis immersis, sæpe breviter erumpentibus, albis, apice irregulariter laceratis, cellulis rectangularibus vel elongatis, rarius ellipsoideis, pariete interna verrucosa, externa sublevi; æcidiosporis contentu aurantio, globosis, ovoideis v. longe ellipsoideis, apice plus minus acutatis papillatisque, subpolyedricis, 23-36 \approx 15-21, episporio hyalino, minute æqualiter verruculoso; pycnidiis inter æcidia gregariis, melleis, subepidermicis, usque ad 150 μ . diam., penicillo ostiolarum breviusculo.

Hab. in foliis vivis *Peucedani raiblensis*, Passo di Fedaja Agri Trident.

45. ***Æcidium Thapsiæ-garganicæ*** Casu, *Atti R. Acc. Scienze Torino* 2891 v. XLII (1906-1907) extr. p. 6 cum tab. — *Æcidiiis* hypophyllis v. petiolicolis v. cauliculis; in foliis greges irregulares majusculos, in petiolis caulibusque greges elongatos efformantibus; soris citrino-flavescentibus, serius caulibus petiolorumque superficiem tegentibus; pseudoperidiis erumpentibus, margine non elevato; æcidiosporis globosis, rarius ellipsoideo-ovatis, vix et sparse verruculosis, flavescentibus citrinis, 34 μ . diam., rarius usque ad 24 v. 36 variantibus.

Hab. in foliis caulibusque *Thapsiæ garganicæ* in ins. S. Simone pr. Cagliari Sardinia. — Verisimiliter eadem species ac antèrius *Æc. punicum* Juel.

46. ***Æcidium punicum*** Juel, *Bull. Soc. Myc. Fr.* XVIII (1901) p. 267, 2892 fig. 9 et p. 268, fig. 9. — *Æc. Ferulæ* Pat. non Roussel. — *Æcidiiis* majusculis, 1 mm. diam., prominulis, anguste apertis, in greges numerosos hypophyllos congestis, pycnidiis contrappositis; pseudoperidiis interdum in lacinias elongatas secedentibus, cellulis superioribus brevibus, inferioribus longis et angustis; æcidiosporis

34-41 \approx 20-27, contentu aurantiaco, tunica crebre et minute punctata.

Hab. in foliis *Thapsiæ garganicæ*, Constantine Algeriæ et in Tunisia.

47. ***Æcidium Laserpitii-Sileris*** Maire, *Æsterr. Bot. Ztschr.* LVII 2893 (1907) p. 331, fig. 3. — *Æcidiiis amphigenis* v. *petiolicolis*, in greges oblongos usque ad 0,7 cm. long. dispositis, matricem incrassantibus, pustulatis; pseudoperidiis immersis, albidis, apice e cellulis subglobosis mox irregulariter disjunctis contextis, cellulis pseudoperidii applanatis, faciebus interna externaque ovatis v. rotundatis v. subquadratis, interne verrucosis, externe sublevibus; æcidiosporis contentu aurantio, subglobosis v. ovoideis v. oblongis, sæpe hyalino-papillatis, plus minus polyedricis, 21-30 \approx 14-21, episporio tenui, hyalino, minute verruculoso; pycnidiis melleis, inter æcidia sparsis, usque ad 150 μ . diam.; penicillo ostiolarum breviusculo.

Hab. in foliis vivis *Laserpitii Sileris* in M. Nuvolon agri Tridentini.

48. ***Æcidium Acanthopanacis*** Diet., *Engl. Jahrb.* XXXIV (1905) 2894 p. 589. — Pseudoperidiis hypophyllis in maculis usque ad 1 cm. latis, rotundatis pallidis v. nigrescentibus laxè gregariis, apertis, margine caduco donatis; æcidiosporis globosis v. rarius oblongis, 19-25 \approx 15-22, subtiliter verrucosis.

Hab. in foliis *Acanthopanacis spinosi*, Komaba Japoniæ (S. KUSANO).

49. ***Æcidium Barclayi*** Sacc. et Trott., *Æcidium Saniculæ* Barcl., *Uredin. Simla I* (1887) pag. 352, tab. XII fig. 1-2, non Carm. — *Æcidiiis amphigenis*, sed plerumque hypophyllis, in areis parvis pro more parum bullosis sitis, subinde petiolicolis et tunc leviter matricem incrassantibus, apice poro apertis, non stellatis; æcidiosporis 25-26 \approx 19-20, episporio minute punctato, 2-3 poros germinativos gerente; cellulis pseudoperidii 30 \approx 22.

Hab. in foliis *Saniculæ* sp. (S. europææ?), Simla Indiæ orient. — Ab *Æc. Saniculæ* Carm. omnino diversum.

50. ***Æcidium hydrocotylinum*** Spegazz., *An. Mus. Nac. Buenos Aires*, v. XIX (1909) p. 321. — Maculis repando-orbicularibus 2-5 mm. diam., obtusis, angulosis, lutescentibus, angustissime calloso-marginatis, areola pallescente plus minusve effusa cinctis, superne concaviusculis inferne convexulis; peridiis minutis vix exertis margine laceris, aurantiellis, 0,25-0,30 mm. diam., cellulis peridialibus

acute angulosis 25-40 \times 20-30, radiatim flexuoseque striatis, tunica crassissima hyalina vestitis; æcidiosporis subglobosis, 20 μ . diam., e mutua pressione obtuse angulosis, episporio tenui levissimo hyalino vestitis, endoplasmate concolore nubiloso, guttulis aurantiacis pluribus insperso repletis.

Hab. in foliis vivis *Hydrocotylis bonariensis* circa Lago Paz Patagoniæ, Amer. austr.

51. **Æcidium Cacaliæ** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) p. 229. 2897

Hab. in foliis *Cacaliæ Krameri* in Mont. Washio Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA). — Est species, quæ hucusque a Wintero aliisque mycologis ad *Uromyctem Cacaliæ* referebatur, quæ vero ad hunc, teste Ed. Fischer, non spectat. Cfr. Syll. VII p. 560.

52. **Æcidium Saussureæ-affinis** Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1905) 2898

p. 591. — Maculis purpureis v. atrofuscis c. 5 mm. lat.; pseudoperidiis hypophyllis, numerosis, confertis, cupulatis, margine denticulato, caduco; æcidiosporis polyedricis, 15-20 \times 13-16; cellulis pseudoperidii cuneatis, plerumque hexagonis, 20-25 μ . latis, verrucosis.

Hab. in foliis *Saussureæ affinis* in provincia Aomori Japoniæ.

53. **Æcidium Parthenii** Pat. et Har., Bull. Soc. Myc. Fr. XX (1905) 2899

p. 85. — Æcidiis per totam foliorum inferiorem partem regulariter dispositis, breviter tubuliformibus, margine revoluto incisoque e cellulis orbicularibus vel polygoniis, (pro more quadratis) isodiametricis, 20-25 μ . diam., minute verrucosis, tunica 3-4 μ . cr.; æcidiosporis globoso-angulatis, flavidis, leviusculis, intus granulosis, 15-20 μ . diam.; tunica 2-3 μ . inæqualiter incrassata.

Hab. in foliis *Pyrethri Parthenii*, Poligny, Jura Galliæ.

54. **Æcidium Compositarum** Mart. — Syll. VII, p. 798. var. **Myriactidis** 2900

Barcl., Uredin. Simla I, p. 373, tab. 15 fig. 15. — Maculis circularibus, 1,5 cm. diam., amphigenis, pallide flavis; pycnidiis epiphyllis secus maculæ marginem; æcidiis hypophyllis, dense congestis; æcidiosporis inæqualiter globosis vel ovoideis, flavis, 14 μ . diam., v. 17 \times 12, sæpius seriatis, tenui-tunicatis; pseudoperidii cellulis imbricatis, 34-42 \times 16-20.

Hab. in foliis *Myriactidis nepalensis*, Simla Ind. or.

55. **Æcidium Vanderystianum** P. Henn., in Fl. du Bas - et Moy. — 2901

Congo, Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) p. 95. — Maculis sparsis rotundatis, flavo-fuscidulis; æcidiis hypophyllis, pseudoperidiis sparsis v. aggregatis, fusco-brunneis, cupulatis, cel-

lulis contextu oblongo-polyedricis, 20-25 \approx 18, reticulatis; æcidiosporis subglobosis v. ellipsoideis, flavidis, 15-18 μ .

Hab. in foliis *Vernoniæ*, Kisantu, Congo, Africa tropic. (VANDERYST).

56. ***Æcidium Herrerianum*** Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII (1906) 2902 p. 520. — Pycnidiis hypophyllis, in parvos greges dispositis, 1 mm. vel ultra latos, æcidiis circumdatis, inconspicuis, subepidermicis, fere immersis, e flavo melleis obscure brunneis, ampulliformibus, 80-110 μ . lat. 80-100 μ . alt.; setulis ostiolaribus 40-55 μ . long.; æcidiis hypophyllis, gregariis, confertis, cylindræis, longis; peridio pallide flavo, margine erecto, lacerato, cellulis peridialibus rhomboedricis, 32-48 μ . long., tunica extus 10-15 μ . cr. transverse striata, intus tenuiori, 4-5 μ ., moderate verrucosa; æcidiosporis globoideis, interdum angulatis, latis, 27-33 \approx 23-26, tunica pallide cinnamomeo-brunnea, crassa, 3-4 μ ., moderate verrucosa.

Hab. in foliis *Senecionis saligni*, San Jaquin Tubancingo Mexico, Amer. bor. (A. L. HERRERA).

57. ***Æcidium Senecionis*** Ed. Fischer, Die Uredin. der Schweiz (1904) 2903 pag. 543 fig. 335. — *Æcidiis* hypophyllis in greges mediocres irregulariter congregatis, margine revoluto laciniato; cellulis pseudoperidii tunica extus 5-6 μ . cr. intus 3 μ ., verruculosa; æcidiosporis subpolygoniis 18-21 μ . cr., tunica tenui minute verrucosa vestitis.

Hab. in foliis *Senecionis Jacobææ*, *S. aquatici*, *S. erucifolii* in Helvetia. — Cfr. *Æc. Senecionis* Desm.

58. ***Æcidium Pluchææ*** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 252. -- 2904 Maculis fuscis, rotundatis; æcidiis hypophyllis sparsis, pseudoperidiis discretis v. aggregatis, cupulatis, pallidis, margine fimbriatis, contextu cellulis polyedricis hyalino-fuscidulis, reticulatis; æcidiosporis subgloboso-angulatis, 14-25 μ ., hyalino-fuscidulis.

Hab. in foliis *Pluchææ indicæ*, Panay, Hoilo in Ins. Philippinis (COPELAND).

59. ***Æcidium Oleariæ*** Mac Alpine, Rusts of Australia (1906) p. 197. 2905 — *Æcidiis* in foliis caulibusque congregatis, plerumque lineariter dispositis; pseudoperidiis rotundatis v. elongatis, margine laciniato; cellulis pseudoperidii hexagoniis, striatis, 35-42 μ . long.; æcidiosporis aurantiacis, ellipsoideis v. oblongis, granuloso-farctis, 22-26 \approx 14-17.

Hab. in foliis caulibusque *Oleariæ axillaris*, Victoria Australiæ.

60. ***Æcidium Cardui*** Arth. Bull. Torr. Bot. Club XXXIII (1906) 2906
p. 33. — Pycnidiis epiphyllis, in parvos greges, immersis, inconspicuis, punctiformibus, subepidermicis, globosis, 130-180 μ . diam.; æcidiis hypophyllis, in greges circinatim dispositis, 3-5 mm. diam., in maculis decoloratis insidentibus; peridiis brevibus, cylindræis, margine erecto eroso; æcidiosporis globoideis, parvis, 16-20 \approx 15-18; tunica subhyalina, tenui, 0,5-1 mm. cr., minute granulosa.
Hab. in foliis *Cardui Hookeriani*, Sandcoulee Montana, Amer. bor. (F. W. ANDERSON).
61. ***Æcidium Blumæ*** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 252. — 2907
Maculis rotundatis v. effusis, flavo-brunneis; æcidiis hypophyllis in villo nidulantibus, sparsis vel gregariis, pallidis, cupulatis, margine fimbriatis, contextu cellulis polyedricis reticulatis; æcidiosporis subgloboso-angulatis, levibus, subhyalinis, 10-15 μ .
Hab. in foliis *Blumæ balsamiferæ*, Luzon, Lepanto, Cervantes ad Macayan in Ins. Philippinis (MERRILL).
62. ***Æcidium Pluchæ-ovalis*** Syd., Deutsche Zentral-Afrika Exped. 2908
II Bd. (1907-1908) p. 97. — Maculis orbicularibus vel irregularibus, 3-8 mm. diam., flavo-brunneis; pycnidiis epiphyllis, melleis; æcidiis hypophyllis, in greges rotundatos v. ad nervos folii elongatos 2-5 mm. latos laxè dispositis, cylindræis, albis, margine profunde lacerato; contextu e cellulis valde variabilibus rhomboideis subinde valde elongatis et tunc subfusoides composito; æcidiosporis angulatis, apice incrassatis (usque ad 7 μ .), verrucosis, hyalinis, intus aurantiacis, 20-28 \approx 18-23.
Hab. in foliis *Pluchæ ovalis*, Ruanda Africae trop.
63. ***Æcidium Senecionis-bupleuroidis*** Syd., Deutsche Zentral-Afrika 2909
Exped. (1907-1908) II Bd. p. 97. — Maculis indistinctis, flavidis; pycnidiis amphigenis, gregariis, melleis; æcidiis hypophyllis, plerumque in annulum c. 5 mm. diam. amœne ordinatis, minutis, diu globoso-clausis, tandem breviter cupulatis, flavidis, margine haud revolutò vix inciso; æcidiosporis angulato-globosis, minutissime verrucosis, flavidis, 18-25 \approx 18-22.
Hab. in foliis *Senecionis bupleuroidis*, Lava prope M. Ninagongo Africae trop.
64. ***Æcidium Berkleyæ*** P. Henn. et Evans, in P. Henn., Engl. Bot. 2910
Jahrb XLI (1909) pag. 277. — Maculis rotundatis vel confluentibus, fuscis; æcidiis hypophyllis flavo-aurantiis in villo nidulantibus, pseudoperidiis aggregatis, cupulatis, contextu cellulis rotundato-v. oblongo-polyedricis, reticulatis c. 40-60 \approx 20-40; æcidio-

sporis subglobosis v. ellipsoideis margine striatulis, aurantiis, 20-30 \approx 18-25.

Hab. in foliis *Berkleyæ* sp., Pretoria, Transvaal Africae (EVANS).

65. *Æcidium Deckerræ* Pat. Addit. Cat. Champ. Tunisie in C. R. 2911
du Congrès des Soc. Savantes (1908), p. 244 (1909). — Maculis amphigenis, latis, orbicularibus, brunneo-violaceis; pseudoperidiis præcipue hypophyllis, dense gregariis, minutis, albidis, margine eleganter dentatis; æcidiosporis subglobosis, 18-22 μ . diam., tenuiter tunicatis, sublevibus, pallidissime luteolis; cellulis pseudoperidii elongato-subquadratis, hyalino-flavescentibus, crasse tunicatis, 28-36 \approx 20-28, inferne leviusculis, superne plicatulo-rugulosis.

Hab. in foliis *Deckerræ* (*Helminthia*) *aculeatæ* in Algeria.

66. *Æcidium Hedypnoidis* Pat., Bull. Soc. Myc. Fr. XXII (1906) 2912
p. 200. — Maculis nullis; æcidiis hypophyllis, rarius amphigenis, inæqualiter sparsis, interdum totius hypophylli superficiem obtinentibus, innato-emergentibus, albidis, margine dentato; æcidiosporis globulosis, plus minus angulosis, 18-20 μ . diam., tenuiter tunicatis, verruculosis, contentu granuloso flavo; pseudoperidii cellulis elongatis, quadraticis, imbricatis, pariete interiore levi, externa tenuiter plicato-rugulosa, subhyalina, 40 \approx 20; pycnidiis copiosis, intermixtis cum æcidiis.

Hab. in foliis vivis *Hedypnoidis polymorphæ*, Bejá in territorio algeriensi-tunetano.

67. *Æcidium Rubiæ* Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1905) p. 590. — 2913
Maculis flavescentibus v. fuscidulis rotundatis; pseudoperidiis hypophyllis, plerumque circulariter dispositis, primo epidermide vesiculosa circumdatis, margine ochraceo, in lacinias longas fisso, caduco præditis, cellulis pseudoperidii oblongis, 36 \approx 12, striatis; æcidiosporis ellipsoideis v. subglobosis, 20-27 \approx 16-22, episporio brunneo usque ad 5 μ . cr. verruculoso, poris c. 6 instructo vestitis.

Hab. in foliis *Rubiæ cordifoliæ* var. *Mungistæ* in pr. Aomori Japoniæ (NAMBU).

68. *Æcidium Molluginis* Wurth, Centrbl. f. Bakt. etc. II Abt. XIV 2914
(1905) p. 320, fig. 14. — Pycnidiis globulosis, parum prominulis, melleis, 133 \approx 123, ostioli periphysibus liberis, 70 μ . longis; æcidiis in maculis pallide flavis, hypophyllis in greges dispositis; pseudoperidiis cupulatis, margine albo emergente reflexo; cellulis seriatis, inæqualiter hexagonis, 24 \approx 17-21, tunica externa crassiori;

æcidiosporis seriatis e globoso obtuse pelyedricis, 17-24 μ . diam., membrana tenui, hyalina, minute verrucosa.

Hab. in foliis Galii Molluginis pr. Bern in Helvetia. — Teleutosporæ hucusque ignotæ.

69. **Æcidium Transvaaliæ** P. Henn. et Evans, in P. Henn., Engler's 2915 Bot. Jahrb. XLI (1908) p. 272. — Maculis fuscis, rotundatis vel effusis; pycnidiis gregariis punctiformibus, fuscis; æcidiis hypophyllis interdum epiphyllis, pseudoperidiis aggregatis cupulatis, flavido-pallidis, margine laceratis, contextu cellulis polyedricis reticulatis; sporis subglobosis vel ellipsoideis, angulatis, flavido-hyalinis, 20-28 \approx 17-22.

Hab. in foliis Pavettæ sp., White River Transvaal Africae (EVANS). — Ab *Æc. Pavettæ* Berk. et *A. flavido* Berk. ex Ceylon videtur diversum.

70. **Æcidium pulverulentum** Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII (1906) 2916 p. 521. — Pycnidiis epiphyllis, numerosis, gregariis, in greges parvos dispositis, conspicuis, punctiformibus, subcuticularibus, dein brunneo-nigrescentibus, hemisphæricis, 80-140 μ . diam., 40-50 μ . alt., setulis ostiolaribus præditis; æcidiis hypophyllis, numerosis, in greges indefinitos dispositis, parum confertis, cylindræis, immersis, parvis, 0,1 mm. diam., pulverulentis; peridio hyalino, evanido, cellulis peridialibus subtenuibus, 30-45 μ . long., tunica extus levi, intus parum crasse verrucosa; æcidiosporis angulato-globosis v. ellipsoideis, v. elongato-polyedricis, interdum supra expansis, 24-32 \approx 23-29, tunica e leviter cinnamomeo-brunnea subhyalina, 3-5 μ . cr., supra usque ad 7-13 μ . cr., conspicue et crasse verrucosa.

Hab. in foliis Randiæ sp., Mexico Amer. bor. (E. W. D. HOLWAY).

71. **Æcidium incomparabile** Syd., in De Wildem., Flore Bas- et Moy. 2917 Congo P. III, fasc. I (1909) extr. pag. 12. — Pycnidiis foliicolis, folia in tumores maximos transformantibus; tumoribus in sicco perduris, 0,5-1,5 cm. crassis, applanatis, variæ magnitudinis, 5 cm. usque ad 15 cm. longis visis; æcidiis profunde immersis, cupulatis, margine inciso; contextu e cellulis angulatis, 32-50 \approx 20-35 metientibus composito; æcidiosporis ovatis, subinde oblongis, angulatis, valde et dense verrucosis, subhyalinis, 18-32 \approx 13-18.

Hab. in foliis Plectroniæ Arnoldianæ, Kisantu, Congo (VANDERYST), Eala, Congo (PYNÆERT).

72. **Æcidium Posoqueriæ** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) pag. 98. — 2918
Syll. fung. XXI (I-1912)

Maculis in foliis maximis irregularibus fuscis, postea arescentibus; pycnidiis numerosis æqualiter tectis; pseudoperidiis secundum nervos dispositis, caules late ambientibus et curvantibus, basi immersis, cylindraceis, albis, margine lacerato vel lobato revoluto præditis; æcidiosporis polyedricis, oblongis v. subglobosis, 25-38 × 21-28, apice valde (6-17 μ .) incrassatis, verrucosis.

Hab. in foliis *Posoqueriæ latifoliæ*, Marco Pará Brasiiliæ (C. F. BAKER).

73. *Æcidium Wildemanianum* Sydow, in De Wildem., Flore Bas- et 2919
Moy. Congo, t. III, fasc. I (1909), extr. p. 13, *Æcidium Oldenlandiæ* P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy. Congo, Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) pag. 96, nec *Æc. Oldenlandiæ* (Massee) Sydow. — Maculis effusis, fuscis; æcidiis hypophyllis effuse aggregatis; pseudoperidiis fuscidulis, cupulatis, cellulis contextu polyedricis, reticulatis; æcidiosporis subglobosis hyalino-subfuscidulis, 12-16 μ . diam.

Hab. in foliis *Oldenlandiæ* sp., Boko Sainte-Berbe (VANDERYST).

74. *Æcidium Oldenlandiæ* (Massee) Sydow, Ann. Mycolog. IV (1906) 2920
p. 440 (= *Uredo Oldenlandiæ* Massee - Syll. XVI p. 355).

Hab. in foliis *Oldenlandiæ asperæ*, Mysore, Pusa Indiæ or. (E. J. BUTLER).

75. *Æcidium nobile* Syd., Ann. Myc. IV (1906) p. 440. — Maculis 2921
magnis, orbicularibus vel suborbicularibus, flavidis, 1-2 cm. diam.; pycnidiis epiphyllis, in centro macularum sæpius densiuscule aggregatis; æcidiis hypophyllis, in maculis laxè et subinde circulariter dispositis, cupulatis vel breviter cylindraceis, flavidis, margine recurvato laciniato; æcidiosporis angulato-globosis, subtiliter verrucosis, flavidis, 18-22 μ . diam.

Hab. in foliis *Coffeæ arabicæ*, Barguai, Saklespur, Mysore Indiæ orient. (E. J. BUTLER). — Adest sæpe socia *Hemileja vastatrix*, quæ vero cum *Æcidio* minime connexa videtur.

76. *Æcidium kisantense* P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, 2922
v. II, fasc. II (1907) pag. 91. — Maculis rotundatis, flavido-fuscidulis; æcidiis hypophyllis, pseudoperidiis concentricè dispositis, cupulatis, albidis, contextu cellulis rotundato-polyedricis, reticulatis; æcidiosporis subgloboso-angulatis, subhyalinis, 15-20 μ . diam.

Hab. in foliis *Rubiaceæ*, Kisantu, Congo Africæ trop. (VANDERYST).

77. *Æcidium Plantaginis-variæ* Mac Alp., Rusts of Australia (1906) 2923

pag. 195; tab. XXXIX, fig. 288. — Pycnidiis amphigenis sed plerumque epiphyllis, melleis, numerosis, 160-180 μ . diam., sporulis ellipsoideis, 4-5 μ . long.; æcidiis amphigenis, subgregariis v. gregariis; pseudoperidiis cupulatis, prominentibus, margine recurvo lobulato præditis; cellulis peridialibus ex oblongo rhomboideis v. polygoniis, margine striato, 35-40 μ . long.; æcidiosporis flavo-aurantiacis, ex ellipsoideo oblongis, minute echinulatis, 22-25 \times 16-23, quandoque usque ad 28 μ . long.

Hab. in foliis *Plantaginis variæ*, Victoria, New South Wales, Tasmania Australiæ.

78. ***Æcidium Triostei*** Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 2924 pag. 32. — Pycnidiis epiphyllis in parvos greges dispositis, punctiformibus, flavo-melleis, subepidermicis, in sectione verticali globosis, 90-130 μ . diam.; æcidiis hypophyllis in greges orbiculares 5 mm. diam. v. ultra dispositis; peridio primum hemisphærico, depresso, margine erecto, eroso; æcidiosporis globoideis, 18-22 μ . diam.; tunica tenui, 1 μ . cr., pallide flava, minute et crebre verrucosa.

Hab. in foliis *Triostei angustifolii*, Perryville Missouri Amer. bor. (C. H. DEMETRIO).

79. ***Æcidium guatemalense*** Kern et Kellerm., Journ. of Mycol. XIII 2925 (1907) p. 23. — Pycnidiis epiphyllis, gregariis in areis decoloratis, æcidiis contrapositis, copiosis, punctiformibus, demum atro-brunneis, globulosis, 100-115 \times 80-105, periphysibus ostioli 65 μ . long.; æcidiis hypophyllis, gregariis, numerosis, in areis decoloratis 0,5-1,5 cm. latis insidentibus, sæpius nervisequis, 200-300 μ . lat.; pseudoperidiis albis, margine erecto eroso; cellulis rhomboideis 15-25 μ . long., tunica æqualiter 2-4 μ . crassa, intus verruculosa, extus levi, transverse striata; æcidiosporis globosis 18-23 \times 16-18, tunica hyalina vix 1 μ . cr., tenuissime verruculosa.

Hab. in foliis *Heliotropii indici*, Zacapa Guatemala.

80. ***Æcidium Trigonotidis*** Syd. in Ann. Mycol. VII (1909) pag. 169. 2926 — *Æcidiis* hypophyllis, maculis flavidis insidentibus, in greges rotundatos vel irregulares, subinde totum folium v. magnam ejus partem occupantibus laxè et irregulariter ordinatis, cupulatis, flavidis, margine inciso, revolutis; æcidiosporis hyalino-flavidis, globosis v. subglobosis, dense minuteque verruculosis, 18-22 μ . diam.

Hab. in foliis *Trigonotidis peduncularis*, Takao, Musashi, Japonia.

81. ***Æcidium Botryospermi*** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) 2927 p. 159. — Maculis effusis fuscis; æcidiis hypophyllis, gregarie cæ-

spitosis, cupulatis, aureis, dein pallescentibus, margine fimbriatis; contextu cellulis polyedricis, pallidis, reticulatis, 20-30 \approx 15-25; sporis subgloboso-angulatis, intus aurantio-guttulatis, 12-20 μ . cr.

Hab. in foliis *Botryospermi tenelli*, Wakayama Japoniæ (H. NAKANISHIKI).

82. ***Æcidium Teucris-Scorodoniæ*** Hariot, Les Uredin. in Encyclop. scient. (1908) pag. 299. — *Æcidii* hypophyllis, copiosis, in greges plus minus confluentes dispositis, in maculis rubescentibus sitis, minutis, flavo-rufis, margine integro vix reflexo; *æcidiosporis* globulosis v. polyedricis, crasse tunicatis, pallide flavis, minute verruculosis. 2928

Hab. in foliis *Teucris Scorodoniæ* in Normandia.

83. ***Æcidium Scutellariæ-indicæ*** Diet., Ann. Mycol., VI (1908) p. 229. 2929 — *Pseudoperidiis* in maculis magnis indeterminatis, hypophyllis, numerosis, in anulos usque ad 7 mm. latos congestis vel irregulariter dispositis, margine albo reflexo lacerato præditis; *æcidiosporis* angulatis, oblongis vel rarius subglobosis, episporio æquali subtiliter verrucoso præditis, 20-27 \approx 15-23.

Hab. in foliis *Scutellariæ indicæ* var. *japonicæ*, Takmioto, Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA). — Ab *Æc. Scutellariæ* sororum dispositione diversa mox distinguendum.

84. ***Æcidium Scutellariæ*** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 504. — *Æcidii* hypophyllis, maculis minutis fuscis vel rufo-purpureis insidentibus, in greges minutos 2-3 mm latos laxè vel densiuscule dispositis, brevibus, cupulatis, margine reflexo, inciso, albido; *æcidiosporis* angulato-globosis, subtiliter verruculosis, flavidis, 16-21 μ . diam. 2930

Hab. in foliis *Scutellariæ angulosæ*, et *Sc. repentis*, Kumaon Himalaya (INAYAT, comm. E. J. BUTLER).

85. ***Æcidium iwatense*** Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1905) pag. 590. 2931 — *Pseudoperidiis* per totam inferiorem paginam foliorum dispersis, albis, margine irregulariter lobato donatis; *æcidiosporis* oblongis v. globosis, dense verrucosis, 15-20 \approx 12-15,5.

Hab. in foliis *Calaminthæ sinensis* in prov. Iwate Japoniæ, socia *Ured. iwatensi* (N. NAMBU).

86. ***Æcidium Ajugæ*** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 504. — *Pycnidii* epiphyllis; *æcidii* hypophyllis, maculis orbicularibus brunneis 2-8 mm. diam. insidentibus, in greges minutos irregulariter vel circinatim laxè dispositis, minutis, cupulatis, flavidis, margine re- 2932

voluta, inciso; æcidiosporis angulato-globosis, subtilissime verruculosis, flavidis, 20-25 μ . diam.

Hab. in foliis *Ajugæ* spec., Kumaon Himalaya (INAYAT, comm. E. J. BUTLER).

87. ***Æcidium leporinum*** Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. (1910) p. 578. — 2933

— Pycnidiis non visis; æcidiis hypophyllis, gregariis, in greges circulares 1-3 mm. diam. dispositis, in maculis pallidis subincrassatis insidentibus, 0,2-0,4 mm. altis; peridio cylindraceo erecto vel subincurvato, eroso, cellulis peridialibus fortiter connexis, infra rhomboideis, supra ovato-lanceolatis in sectione radiali visis, tunica extus sublevi, intus crassiori et prominenter verrucosa; æcidiosporis subangulosis late ellipsoideis vel subglobosis, 24-29 \approx 18-21; tunica flavidula, 2-2,5 μ . cr., infra 7-9 μ . incrassata, crebre et minute verrucosa.

Hab. in foliis *Macrosiphoniæ brachysiphonis*, Sierra Madre Mexico Amer. bor.

88. ***Æcidium Lysimachiæ-japonicæ*** Diet., Engl. Jahrb. XXXIV 2934

(1905) pag. 590. — Pseudoperidiis per totam inferiorem paginam foliorum æqualiter dispersis, cupulatis, margine albo revoluta denticulato præditis; æcidiosporis globoso-polyedricis, 15-18 μ . latis, levibus.

Hab. in foliis *Lysimachiæ japonicæ* in prov. Aomori Japoniæ (N. NAMBU).

89. ***Æcidium Osmanthi*** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 505. 2935

— Æcidiis in foliis, petiolis ramulisque evolutis eosque varie deformantibus, in foliis in epiphylo maculas usque ad 2 cm. latas profunde depressas efficientibus et gallas in hypophyllo crassas maximas formantibus; pseudoperidiis in ramulis petiolisque deformatis et in gallis foliorum dense aggregatis, profunde immersis, cupulatis; æcidiosporis quoad formam et magnitudinem valde variabilibus, globosis subinde anguste ellipsoideis, 18-29 \approx 12-18.

Hab. in foliis *Osmanthi fragrantis*, Kumaon Himalaya, (INAYAT, comm. E. J. BUTLER).

90. ***Æcidium Lepidagathis*** Syd., Ann. Mycol. V (1907) pag. 505. — 2936

Æcidiis hypophyllis, maculis brunneolis, zona flavida cinctis, orbicularibus, 3-5 mm. diam. insidentibus, in greges rotundatos maculam explentes laxè dispositis, cupulatis, brevibus, minutis, flavis, margine revoluta; æcidiosporis angulato-globosis, subhyalinis, subtilissime verruculosis, 13-17 μ . diam.

Hab. in foliis *Lepidagathis hyalinæ*, Dehra Dun, (E. J. BUTLER); Kumaon Himalaya (INAYAT, comm. E. J. BUTLER).

91. *Æcidium Justiciæ* P. Henn. in Fl. du Bas- et Moyen-Congo, 2937
Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) p. 96. — Maculis effusis, flavo-fuscis; æcidiis hypophyllis, effusis; pseudoperidiis sparse gregaris, cupulatis, flavo-fuscidulis, contextu cellulis rotundato-v. oblongo-polyedricis, reticulatis; æcidiosporis subglobosis v. ellipsoideis, hyalino-fuscidulis, 18-25 μ . diam.

Hab. in foliis *Acanthaceæ* (? *Justicia*), Kisantu, Mbolo Congo Afr. trop. (VANDERYST).

92. *Æcidium Æchmantheræ* Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 504. — 2938
Æcidiis hypophyllis, maculis orbicularibus brunneolis 3-5 mm. diam. insidentibus, in greges rotundatos maculam explentes laxè vel densiuscule dispositis, minutis, brevibus, cupulatis, margine albido, reflexo, inciso; æcidiosporis angulato-globosis, subtilissime verruculosis, hyalinis, 12-17 μ . diam.

Hab. in foliis *Æchmantheræ tomentosæ*, Kumaon Himalaya, Mussoorie (E. J. BUTLER); *Æchmanth. spec.*, Kumaon Himalaya (INAYAT, comm. E. J. BUTLER); *Æchmanth. gossypinæ*, Kumaon Himalaya (INAYAT, comm. E. J. BUTLER).

93. *Æcidium Blepharidis* Hariot et Pat., Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2939
1909, n. 2, p. 200. — Maculis sparsis, fuscis, orbicularibus, amphigenis, 6-10 mm. diam.; soris hypophyllis; pseudoperidiis tectis dein cupulatis, pallidis, e cellulis polygoniis, verruculosis, 28 \times 26 efformatis; æcidiosporis pallidis, levibus, globoso-angulosis, tenuiter tunicatis, contentu granuloso, 16-20 μ . diam.

Hab. in foliis *Blepharidis boerhaaviæfoliæ*, Baguirmi inter Mandjafa et Bousso, Congo Africæ trop.

94. *Æcidium Adathodæ* Syd., Ann. Myc. IV (1906) p. 440. — 2940
Æcidiis hypophyllis, maculis orbicularibus brunneolis insidentibus, in greges rotundatos 2-5 mm. diam. densiuscule dispositis, cupulatis, flavis, margine revolutò, laciniato; æcidiosporis angulato-globosis, subtiliter verruculosis, flavidis, 16-20 μ . diam.

Hab. in foliis *Adhatodæ Vasicæ*, Dehra Dun, Indiæ or. (E. J. BUTLER). — Cum *Chnoopsora Butleri* Diet. et Syd. minime connexum videtur.

95. *Æcidium acanthinum* Hariot et Pat., Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2941
1909, n. 2, pag. 200. — Maculis amphigenis, 1-2 cm. diam, fuscis, sæpe saturate brunneo cinctis; soris hypophyllis; pseudoperidiis numerosis, albidis, fimbriatis, e cellulis ovato-subquadratis

verruculosis, 28-32 \approx 16-20, pallidis efformatis; æcidiosporis pallide luteolis, levibus, globoso-angulosis 12 μ . diam., tenuiter tunicatis, contenu subochraceo; pycnidia desunt.

Hab. in foliis Acanthacearum e grege Ruelliearum: Mimulopsidis violaceæ, La Mpokou, Phaylopsidis Barteri, Chari, Ph. micranthi, Gribiugni, Congo Africae trop.

96. **Æcidium Evansii** P. Henn., Engler. Botan. Jahrb. XLI (1908) 2942 p. 272. — Maculis rotundatis, sparsis, flavidulis; æcidiis hypophyllis; pseudoperidis sparsis v. gregariis, cupulatis, margine fimbriatis, albidis vel flavidis, contextu cellulis polyedricis reticulatis; sporis subgloboso- v. ellipsoideo-angulatis, hyalinis vel flavidulis, 18-30 μ . diam.

Hab. in foliis Lippiæ asperifoliæ Rich., Pretoria, Transvaal (EVANS).

97. **Æcidium Spegazzinianum** Sacc. et Trott., *Æcidium verbenicola* 2943 Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) pag. 323, non Ell. et Ev. — Foliis infectis vage purpurascens v. cyanescens; peridiis hypophyllis sparsis v. hinc inde pauci-gregariis brevissime exertis, 0.30 mm. diam. margine erosulo-denticulatis; cellulis peridialibus subcrassiuscule tunicatis, 30 \approx 20, dense radiatim verruculoso-striatis, subhyalinis; sporis e globoso angulatis 16-18 μ . diam., episporio tenui hyalino levissimo, endoplasmate granuloso luteo donatis.

Hab. in foliis vivis Verbenæ teneræ in pratis prope Lezama, Buenos Aires Amer. austr.

98. **Æcidium disciforme** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 194. 2944 — Pycnidiis hypophyllis plerumque in foliis junioribus, melleis, applanatis, numerosis, minutis; sporulis hyalinis, ellipsoideis, 5-6 μ . long.; æcidiis amphigenis sed plerumque hypophyllis, bullatis, brunneis, cribriformibus, confluentibus, initio clausis, demum poro parvo irregulari pertusis, 1-1,5 mm. diam. distorsiones et hypertrophias efficientibus; æcidiosporis flavo-aurantiacis, subglobosis v. ellipsoideis, 16-20 μ . diam. v. 19-22 \approx 14-16.

Hab. in foliis Veronicæ gracilis et V. calycinæ, Tasmania, New South Wales Australiæ.

99. **Æcidium Rechargingeri** Bubák, Kryptog. exs. Mus. Palat. Vindob. 2945 (1906) n. 1137 et Ann. Naturh. Hofmus. Wien an. 1905 (1906) p. 321. — Maculis rotundatis vel irregularibus flavescens, 2-4 mm. latis, per paginam inferiorem foliorum dispersis; pseudoperidiis hypophyllis, dense aggregatis, parvis, 200-220 μ . diam., bre-

viter cylindræis, profunde immersis, margine angusto, dilacerato; cellulis firme conjunctis, exterioribus dense imbricatis, membrana interna 3-4 μ . cr.; æcidiosporis catenulatis, polygoniis, 15-18 \approx 13-15, episporio tenui, 1,5-2 μ cr., flavescente, subtilissime tuberculato.

Hab. in foliis *Ipomœæ* pedis-capræ in arenosis insulæ Samoensis Upoli (L. et C. RECHINGER). — Ab *Æc. Ipomœæ* Thüm. omnino diversum; in hoc æcidiosporæ 22-28 \approx 17,5-22, pseudoperidia cupuliformia 300-360 μ . diam. (FR. BUBÁK in litt.).

100. ***Æcidium congoanum*** P. Henn., Fungi in Etat. independ. du Congo, 2946 Mission E. Laurent, fasc. IV (1907) p. 356. — Maculis epiphyllis fusco-brunneis anguloso-rotundatis; pycnidiis convexis rufo-brunneis; æcidiis oppositis; pseudoperidiis gregariis cupulatis, margine fimbriatis, pallide flavidis vel fuscescentibus; sporis subglobosis vel ellipsoideis 15-20 \approx 12-16, flavido-fuscidulis.

Hab. in foliis *Convolvuli* sp. Congo Africæ (E. LAURENT). 2947

101. ***Æcidium solaninum*** Speg., var. *leve* Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) pag. 322. — A typo præcipue differt æcidiosporis episporio levissimo præditis.

Hab. in foliis vivis *Acnisti* parviflori in sepibus circa Tucumán, Argentina Amer. austr.

102. ***Æcidium Pascheri*** Bub. in Ann. Mycol. (1909) p. 377. — Maculis 2948 amphigenis, ad 2 cm. latis, rotundatis, sordide griseis, flavido-limbatis; pycnidiis epiphyllis in media macula congregatis, melleis; æcidiis hypophyllis in soros ad 1 cm. latos dense gregariis, depresse cupulatis, margine laciniato et reflexo; cellulis pseudoperidii verrucosis, in sectione radiali subrhombeis, externe 4-5 μ . incrassatis, interne concavis; æcidiosporis polygoniis vel globulosis, 22-27 μ . diam., v. breviter ovoideis 24-28 \approx 19-24, membrana hyalina inæqualiter crassa, levi; contentu aurantiaco.

Hab. in foliis *Scopoliæ* japonicæ in provincia Musashi Japoniæ. — Verisimiliter ad *Pucciniam* heteroicam quandam spectat.

103. ***Æcidium Pergulariæ*** Maubl., Bull. Soc. Myc. Fr. XX (1905) 2949 pag. 87. — Pycnidiis melleis epiphyllis; æcidiis hypophyllis, gregariis in greges secundum nervos elongatos congestis, mox apertis, margine tenui laciniato; cellulis pseudoperidii obtuse 4-6-angulatis, crasse tunicatis, dense papilloso-striatis, 25-35 \approx 15-20; æcidiosporis subglobosis v. angulatis, episporio subtiliter granulato, pallidis, 18-22 μ . diam.

Hab. in foliis *Pergulariæ africanæ*, Adja Oneré, Dahomey Africæ occid.

104. ***Æcidium Parsoniæ*** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya, v. IV, 2950 Pt. V (1909) pag. 302 — *Æcidii* hypophyllis in maculis circularibus circinatim dispositis, leviter bullatis, maculis primum flavis dein purpureis; *æcidii* flavo-aurantiacis 0,25-0,3 mm. diam., pseudoperidio albo distincte evoluto; cellulis pseudoperidii hyalinis, crasse tunicatis, verrucosis, polygoniis v. quadrangulis, sporis paulo majoribus; sporis ovoideis, minute et crebre verrucosis 15-20 \approx 11-14.

Hab. in foliis *Parsoniæ spiralis*, Weligama, Dikwella Ceylon.

105. ***Æcidium Dæmiæ*** Hariot et Pat., Bull. Mus. Hist. Nat. (1909) 2951 n. 2, p. 200. — Maculis amphigenis, supra brunneo-rufis infra pallidis, 1-2 cm. diam.; soris hypophyllis; pseudoperidiis numerosissimis sparsis, pallidis, primitus clausis convexisque dein cupulatis, e cellulis ovatis, verrucosis, pallidis, 20 \approx 12 efformatis; *æcidiosporis* pallidis, levibus, globoso-angulosis, tenuiter tunicatis, 12 μ . diam., contentu granuloso pallide fusco; pycnidiis minutis, brunneis, periphericis.

Hab. in foliis *Asclepiadaceæ* (*Dæmiæ extensæ* verisimiliter), Bangui, Congo Africæ trop.

106. ***Æcidium obesum*** Arth, Bull. Torr. Bot. Cl. (1910) p. 579. — 2952 Pycnidiis amphigenis, numerosis, in greges contrapositos confertis, 0,3-1 mm. diam., parvis, inconspicuis, punctiformibus, melleis dein brunneis, depresso globosis, 96-128 μ . diam., 58-77 μ . alt.; periphysibus 30-48 μ . long.; *æcidii* hypophyllis, in greges circulares 2-7 mm. latos dispositis; maculis pallidis subincrassatis; cellulis peridialibus imbricatis, obovato-lanceolatis in sectione radiali, tunica intus minute verrucosa, extus incrassata et crasse verrucosa; *æcidiosporis* globosis vel subellipsoideis, latis, 32-40 \approx 28-35; tunica hyalina, 5-8 μ . cr., intus irregulari ideoque cavitate angulato-stellata, crebre et prominenter verrucosa.

Hab. in foliis *Apocyni hypericifolii*, America bor. — Ab *Æcid. Apocyni* Schw. diversum.

107. ***Æcidium Rauwolfiæ*** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy. - Congo, 2953 in Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. III (1908) p. 225. — Maculis rotundatis, flavidis; *æcidii* hypophyllis, pseudoperidiis concentricè dispositis, cupulatis, margine fimbriatis, flavo-fuscidulis,

cellulis contextu polyedricis, reticulatis; æcidiosporis subgloboso-angulatis, flavidulis, 16-18 μ . cr.

Hab. in foliis *Rauwolfiæ* sp., Kisantu, Congo Africae trop. (VANDERYST).

108. *Æcidium ponderosum* H. et P. Syd., *Annal. Mycolog.* IV (1906) 2954 pag. 440. — *Æcidiis* ramicolis, tumores crassos duros lignosos irregulares plura cm. longos efficientibus, in tota superficie tumorum dense dispositis profundeque immersis, margine albido, lacero; æcidiosporis angulato-globosis, subtilissime verrucosis, subhyalinis, 18-25 μ . diam., episporio 2 $\frac{1}{2}$ -3 $\frac{1}{2}$ μ . crasso, apice incrassato (usque 5 μ .).

Hab. in ramis *Vallaris Heynei*, Dehra Dun Indiae orient. (E. J. BUTLER),

109. *Æcidium Elæagni-umbellatæ* Diet., *Engl. Jahrb.* XXXVII (1905) 2955 pag. 107. — Pseudoperidiis hypophyllis in maculis tumefactis usque ad 1 cm. latis irregularibus v. rotundatis dense gregariis, breviter cylindricis v. elongatis, albis, margine irregulariter lacero; cellulis pseudoperidii angulatis, 40-50 \approx 25-35, verrucosis; æcidiosporis globosis, polyedricis v. oblongis, 30-40 \approx 24-32, episporio hyalino, 5-6 μ . cr., dense verrucoso.

Hab. in foliis *Elæagni umbellatæ*, Akimachi, Tosa Japoniæ (JOSHINAGA). — Ab *Æcidio Elæagni* pseudoperidii cellulis majoribus, sporis crassius tunicatis et grossius verrucosis distincta species.

110. *Æcidium Elæagni-latifoliæ* Petch, *Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya* IV, Pt. V (1909) pag. 302. — Soris hypophyllis, gregariis, maculis distinctis circumdatis, minutis, circ. 0,2 mm. diam., pseudoperidio albo, massa sporarum pallide ochracea; cellulis peridialibus usque ad 30 \approx 20, polygoniis, hyalinis, crasse verrucosis; sporis irregulariter ovoideis vel globosis, verrucosis, fere hyalinis, leniter ochraceo tinctis, 18-21 \approx 13-17.

Hab. in foliis *Elæagni latifoliæ*, Peradeniya Ceylon.

111. *Æcidium Nakanishikii* P. Henn., *Engl. Jahrb.* XXXIV (1905) 2957 pag. 159. — Maculis plerumque marginalibus effusis, fusco-brunneis; æcidiis hypophyllis gregarie sparsis, cupulatis; cellulis pseudoperidii ex ovato oblonge polyedricis, subreticulatis, pallidis, 20-30 \approx 16-22; sporis subgloboso-angulatis, hyalino-flavidulis, 16-22 μ . crassis.

Hab. in foliis *Machili Thunbergii*, Provinc. Tosa Japoniæ (NAKANISHIKI).

112. *Æcidium hypsophilum* Spegazz., An. Mus. Nac. Buenos Aires 2958 t. XIX (1909) pag. 321. — Peridiis primo hemisphærico-clausis dein erumpentibus, poculiformi-dehiscentibus, margine recto revoluta integro vel eleganter crenulato; cellulis peridialibus sæpius hexagoniis 20-25 μ . diam., hyalinis, tunica crassiuscula dense radiatim striata obovolutis; æcidiosporis subglobosis e mutua pressione angulatis v. subcuboideis, 16-20 \approx 15-17, episporio tenuiculo levissimo hyalino tectis, endoplasmate concolore, guttulis paucis aurantiis ornato.

Hab. in foliis *Euphorbiæ chilensis* in aridis circa Puente del Inca, Argentina Amer. austr. — Planta infecta plus minusve chlorotico-pallescent atque carnosulo-incrassata. Species statum æcidiosporum *Uromycetis hypsophili* Speg. sistit

113. *Æcidium Euphorbiæ-Gerardianæ* Ed. Fischer, Die Ured. der Schweiz (1904) pag. 530, fig. 331. — Æcidiis hypophyllis, totam foliorum superficiem obtegentibus, cupulatis, margine non vel parum revolutis; cellulis pseudoperidii distincte seriatis, quadrangulis, tunica extus 10 μ . cr. intus 3-4 μ ., verrucosa; æcidiosporis subpolygoniis 16-21 μ . cr., tunica parum incrassata, crebre et minute verruculosa.

Hab. in foliis *Euphorbiæ Gerardianæ* Valesia Helvetiæ.

114. *Æcidium Argithamniæ* Arth., Bull. Torr. Bot. Club XXXIII 2960 (1906), p. 33. — Pycnidiis epiphyllis, paucis in greges orbiculares dispositis, non confertis, punctiformibus, flavo-melleis dein obscure brunneis, conspicuis, immersis, in sectione globoideis, 150-175 μ . diam.; æcidiis hypophyllis, in maculis decoloratis in greges orbiculares vel anulares dispositis, 2-5 mm. diam., non confertis, cylindraceis; brevibus, margine erecto, eroso vel lacerato; æcidiosporis globoideis, 18-21 \approx 15-18; tunica subdecolorata, tenui usque ad 1 μ . cr., minute verrucosa, simulate levibus.

Hab. in foliis *Argithamniæ Schiedeanae*, Trinidad Mexico Amer. bor. (C. G. PRINGLE).

115. *Æcidium Brideliæ* P. Henn. et Evans, in P. Henn., Engl. Bot. Jahrb. XLI (1908) pag. 272. — Maculis sparsis, rotundatis, ochraceis vel fuscis; æcidiis hypophyllis, subcoriaceis, pseudoperidiis paucis aggregatis, cupulatis, flavis vel fuscidulis; sporis subglobosis vel ellipsoideis, 14-20 \approx 10-16, flavido-hyalinis, granulatis.

Hab. in foliis *Brideliæ* sp., Elofent, Barberton Distr. Transvaal Afr. austr. (EVANS).

116. *Æcidium Breyniæ* Syd., Ann. Mycol. V (1907) pag. 506. — 2962

Pycnidiis numerosis hypophyllis, in maculis orbicularibus flavidis 3-6 mm. diam. densissime dispositis, atris; æcidiis hypophyllis, maculis magnis insidentibus, in greges magnos usque ad 2 cm. longos latosque dense dispositis, pycnidiis sæpius intermixtis, cupulatis, albidis, margine profunde inciso valde recurvato; æcidiosporis angulato-globosis, subtilissime verruculosis, subhyalinis, 20-26 μ . diam., episporio ubique tenui.

Hab. in foliis *Breyniæ rhamnoidis*, Pusa Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

117. *Æcidium phyllanthinum* Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 505. — 2963

Pycnidiis minutissimis hypophyllis, in greges minutos dispositis; æcidiis hypophyllis, maculis orbicularibus minutis flavidis insidentibus, in greges minutos 1-2 mm. latos orbiculares dispositis, cupulatis, albidis, margine revoluta, inciso; æcidiosporis angulato-globosis vel ellipsoideis, subtilissime verruculosis, subhyalinis, 18-25 15-22, episporio ubique tenui.

Hab. in foliis *Phyllanthi reticulati*, Kanaighat, Assam Indiæ or. (E. J. BUTLER). — Ab *Æcid. Phyllanthi* P. Henn. et *Æc. luzoniensi* P. Henn. distinctum videtur.

118. *Æcidium Acalyphæ* P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy. - Congo, 2964

Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) pag. 95. — Maculis rotundatis, fuscidulis; æcidiis hypophyllis aggregatis, pseudoperidiis cupulatis, flavido-fuscescentibus; æcidiosporis subgloboso-angulatis, e flavo hyalinescentibus, 10-15 \approx 10-12.

Hab. in foliis *Acalyphæ*, Boko Sainte Barbe, Congo Africæ trop. (VANDERYST).

119. *Æcidium Boehmeriæ* Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIV (1907) 2965

pag. 590. — Pycnidiis epiphyllis, paucis in parvos greges, 1 mm. diam., dispositis, flavo-melleis dein brunneis, punctiformibus, inconspicuis, globosis vel depresso-globosis, parvis, 70-90 μ . diam., 50-75 μ . alt.; setulis ostiolaribus usque ad 65 μ . longis; æcidiis hypophyllis, gregariis vel sæpe in greges 2-10 mm. diam. circinatim dispositis, in maculis latis decoloratis insidentibus, brevibus, parvis, 0,1 mm. c. diam., leviter pallide flavis; peridio decolorato, margine eroso, recurvo, cellulis peridialibus rhomboideis, parvis, 16-23 μ . long., tunica intus 3-4 μ . cr. moderate verrucosa, extus 5-6 μ . cr., striata, levi; æcidiosporis globoideis, sæpe angulatis, minutis, 10-13 μ . diam., tunica pallide flava, tenui, 0,5-1 μ . cr., minute verruculosa, simulate levi.

Hab. in foliis *Boehmeriæ cylindricæ*, Takoma Park Columbia Amer. bor.

120. *Æcidium luculentum* Syd., Ann. Mycol. V (1907) pag. 506. — 2966

Æcidiiis plerumque amphigenis vel subinde etiam ramicolis, tumores efficientibus; tumoribus vel tuberculis in foliis sparsis, semiglobosis, minutis, 1-3 mm. diam., lignosis, quoque tumore pseudoperidiis paucis (1-6) immersis prædito; tumoribus ramicolis plerumque majoribus, sæpe maximis (ca. 3 cm.) globosis vel subglobosis et pseudoperidiis numerosissimis præditis; cellulis pseudoperidii tabulari-polyedricis, flavido-hyalinis, ubique dense et grosse verrucosis, 50-70 × 28-40, pariete ubique fere eadem crassitudine; *æcidiosporis* catenulatis, angulatis, contentu flavido, membrana hyalina circiter 3-4 μ . crassa, apice valde incrassata (usque ad 15 μ .), ubique dense verrucosis, 38-52 × 26-35.

Hab. in foliis, rarius etiam in ramulis, *Loranthi longiflori* (ad ramos *Punicæ Granati*), Yelwal, Mysore Indiæ orient. (E. J. BUTLER). — A ceteris *Æcidiiis* loranthicolis bene distinctum videtur.

121. *Æcidium libertum* Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. (1910) pag. 580. 2967

Pycnidiis non visis; *æcidiiis* hypophyllis et totam paginam æque occupantibus; peridio breviter cylindræo, 0,3-0,4 mm. diam., margine subincurvato, lacerato; cellulis peridialibus cuboideis, tunica extus levi 5-7 μ . cr., intus tenuiori, 3-4 μ ., crebre verrucosa; *æcidiosporis* anguloso-globosis, 18-23 × 17-19; tunica pallide flava, tenui, 1 μ . cr., minute et crebre verrucosa.

Hab. in *Urtica chamædryoide*, Sapulpa Indian Terr. Amer. bor. (B. F. BUSH). — Ab *Æc. Urticæ* omnino diversum.

122. *Æcidium Dorsteniæ-Holstii* P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII 2968

(1905) pag. 105. — Maculis rotundatis, fuscidulis; *pycnidiis* hemisphærico-prominulis, brunneo-fuscis; *æcidiiis* oppositis hypophyllis, pseudoperidiis cæspitosis, cupulatis, margine pallide fimbriolatis, roseis v. flavidulis, contextu cellulis rotundato- v. oblongo-polyedricis, reticulato-verrucosis, 20-30 × 15-20, incarnato-fuscidulis; *æcidiosporis* subgloboso-angulatis, hyalino-fuscidulis, levibus, 10-15 μ . crassis.

Hab. in foliis *Dorsteniæ Holstii* Engl. Amani Usambara Africæ orient. (ZIMMERMANN).

123. *Æcidium Nanocnides* Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1905) p. 589. 2969

— Pseudoperidiis in foliis pallescentibus, purpurascentibus vel sordide fuscis, per paginam inferiorem æqualiter dispersis et cau-

licolis, hemisphæricis, margine integro instructis; æcidiosporis globosis, polyedricis v. ellipsoideis, 15-19 \approx 14-16, episporio tenui levissime verrucoso indutis.

Hab. in foliis caulibusque *Nanocnides japonicæ* in prov. Iwaki Japoniæ (S. KUSANO).

124. *Æcidium Mori* (Barcl.) Sydow et Butler, Ann. Mycol. V 2970 (1907) pag. 507, *Cæoma Mori* Barcl., Syll. IX, p. 334. — *Æcidii* hypophyllis, sæpe etiam amphigenis, præcipue (vel semper?) ad nervos evolutis ibique in greges irregulares vel elongatos dispositis; cellulis pseudoperidii oblongis vel rhomboideis, minute verrucosis, hyalinis, 16-23 \approx 8-16; æcidiosporis angulato-globosis vel ellipsoideis, subhyalinis, minutissime verrucosis vel sublevibus, 11-18 \approx 9-12.

Hab. in foliis *Mori* spec, Shillong, Assam Indiæ or. (BUTLER) et *Mori albæ* in Japonia. — Ab hac specie excludenda est forma in *Fico* a cl. Barclay serius relata (Add. Ured. 1891, pag. 225).

125. *Æcidium Laportæ* P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) 2971 pag. 159. — Maculis rotundatis, flavo-brunneis; pycnidiis hemisphæricis, rufo-brunneis; æcidiis oppositis, cupulatis, flavo-pallescentibus, margine fimbriatis, contextu cellulis rotundato-vel oblongo-polyedricis, c. 20-30 \approx 20, hyalinis; sporis subglobosis, angulatis, flavidulis 15-20 μ . diam.

Hab. in foliis *Laportæ* bulbiferæ, prov. Nikko Japoniæ (M. SHIRAI).

126. *Æcidium Girardinæ* Syd., Ann. Myc. IV (1906) pag. 441. — 2972 *Æcidiis* hypophyllis vel præsertim cauliculis, maculis flavidis insidentibus, in greges rotundatos vel irregulares variæ dimensionis dispositis, distorsiones præcipue in petiolis caulibusque sæpe valde elongatas, 1-5 cm. longas, crassas efficientibus, cupulatis, margine albo recurvato, lacerato; æcidiosporis angulato-globosis, flavidis, subtiliter verrucosis, 14-18 \approx 11-16.

Hab. in foliis, petiolis caulibusque *Girardinæ* heterophyllæ, Mussoorie Indiæ or. (E. J. BUTLER).

127. *Æcidium Eurotiæ* Tranzsch., Ann. Mycol. V (1907) pag. 547. 2973 — Pycnidiis epiphyllis et æcidiis hypophyllis per totum folium æqualiter sparsis; pycnidiis subepidermicis, globosis, circa 180 μ . diam., hyphis stromaticis apice clavatis et 7-8 μ . crassis usque ad 75 μ . exsertis; pseudoperidiis æcidiorum cylindræis, margine lacerato revoluto, albis, pariete cellularum pseudoperidii externo in-

crassato, levi, interno tenui, verrucoso; æcidiosporis angulatis, subglobosis vel ellipsoideis, $17-24 \approx 17-18$, episporio minute verruculoso, contentu in siccis achroo.

Hab. in foliis *Eurotiæ ceratoidis* C. A. M. prope pagum Kotiakovo, prov. Simbirsk, distr. Korsun Rossiaë (S. KORZINSKIJ).

— Forte cum *Uromycete Eurotiæ* metagenetice connexum.

128. *Æcidium Spinaciæ* Rostr., Bot. Tidsskr. XXVIII (1907) p. 216. 2974

— Maculis orbicularibus, 4-5 mm. latis, intense sanguineis; pseudoperidiis hypophyllis, niveis, margine crenulato; æcidiosporis globosis.

Hab. in foliis *Spinaciæ tetrandræ* Stev. ad Jangi Kurgan prope Samarkand Rossiaë.

129. *Æcidium Deeringiæ* Cke. et Mass. in Ann. Rep. Dept. Agric. 2975

Queesl. (1893) pag. 40; Mac Alpine, Rusts of Australia, p. 200, tab. 39, fig. 294. — Pycnidiis epiphyllis in maculis decoloratis insidentibus; æcidiis hypophyllis, in maculis pallidis subincrassatis orbicularibus, 2-3 mm. diam. confertis, subimmersis, margine albo, crenulato præditis; æcidiosporis subglobosis, minute echinulatis, 12 μ . diam.

Hab. in foliis *Deeringiæ celosioïdis*, Queensland Australia. — Ab æcidio *Urom. Deeringiæ* sporis minoribus diversum.

130. *Æcidium Stylochitonis* Hariot et Patouill., Bull. Mus. Hist. Nat. 2976

Paris (1909) n. 2, p. 200. — Maculis pallidis amphigenis, vix 1 cm. diam.; soris amphigenis, pallide fuscis; pseudoperidiis dense congestis, pallidis, cupulato-dentatis, e cellulis subquadrato-cuneiformibus, muricatis, crasse tunicatis, $25-32 \approx 20-24$ efformatis; æcidiosporis subachrois, leviusculis, subglobosis, tenuiter tunicatis, 16-20 μ . diam., contentu granuloso; pycnidiis subcentralibus, minutis, fuscis.

Hab. in foliis *Stylochitonis*, Chari, Congo Africae trop.

131. *Æcidium Hostæ* Diet. in Engl. Botan. Jahrb. XXXIV (1905) 2977

p. 588. — Maculis flavis circularibus, secundum nervos elongatis, usque ad 8 mm. latis; pseudoperidiis circum pycnidia amphigena confertis, hypophyllis, cupuliformibus, margine flavidulo revoluto denticulato præditis; æcidiosporis subglobosis vel ellipsoideis, mutua pressione sæpe angulatis, $20-26 \approx 17-21$, episporio tenui subtiliter verrucoso vestitis.

Hab. in foliis *Hostæ* (Funkia) Sieboldianæ in prov. Amori (N. NAMBU).

132. *Æcidium ornithogaleum* Bub., Ann. Myc. III (1905) p. 223. — 2978

Pycnidiis æcidiis intermixtis vel discretis, amphigenis, in greges crebros dispositis, minutis, globosis, 100-150 μ . diam., melleis, demum nigricantibus; sporulis 3-4 \approx 1,5-2, hyalinis; æcidiis globoso-applanatis, poroso-apertis; pseudoperidiis 200-300 μ . diam., sursum plus minus incompletis, cellulis non seriatis, polygoniis vel globoso-polygoniis, pariete externo 6-8 μ . cr., interno 3-4 cr., imbricatis; æcidiosporis seriatis, polygoniis, subglobosis vel ellipsoideis vel oblongis, 18-30 μ . lat., minute verruculosis, contentu aurantiaco.

Hab. in foliis *Ornithogali tenuifolii* pr. Hohenstadt Moraviæ.

133. ***Æcidium Urgineæ*** P. Henn. et Evans, in P. Henn., Engl. Bot. 2979 Jahrb. XLI (1908) pag. 272. — Maculis effusis, fuscis; æcidiis epiphyllis, gregariis, pseudoperidiis cupulatis, pallidis vel flavidulis, contextu cellulis polyedricis reticulatis; sporis subglobosis, angulatis, hyalino-fuscidulis, 17-23 μ .

Hab. in foliis *Urgineæ* sp., Ermigrati Marico Distr. Transvaal Africae merid. (EVANS).

134. ***Æcidium Merenderæ*** H. et P. Sydow, Ann. Myc. IV (1906) 2980 pag. 441. — Æcidiis amphigenis, maculis flavis indeterminatis insidentibus, in greges orbiculares v. elongatos, 2-10 mm. longos, dense dispositis, breviter cylindræis, albis, margine revolutis, lacerto; æcidiosporis angulato-globosis, subtilissime verruculosis, flavidis, 16-20 μ . diam.

Hab. in foliis *Merenderæ Aitchisoni*, Salt Range, Punjab Indiae or. (J. R. DRUMMOND).

135. ***Æcidium Dipcadi*** Hariot et Pat., Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 2981 (1909) n. 2 pag. 201. — Deformans; maculis amphigenis, latissimis, usque ad 4 cm. diam.; soris amphigenis; pseudoperidiis densissime congestis, numerosissimis, flavescentibus, cupulato-tubulosis, margine erosis, e cellulis polyedricis crasse æqualiterque tunicatis, plicatulo-muricatis, 25 \approx 16 efformatis; æcidiosporis lutescentibus, leviusculis, tenuiter tunicatis, contentu flavido, granuloso, 14-20 \approx 12-16.

Hab. in foliis *Dipcadi udellensis*, Chari, Congo Africae trop. — Ab æcid. *Pucciniæ Liliacearum* soris deformantibus latissime congestis et sporis minoribus differt.

136. ***Æcidium Chlorophyti*** Hariot et Patouillard, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris (1909) n. 2, p. 200. — Maculis amphigenis, pallidis, circ. 1 cm. diam.; soris hypophyllis orbiculariter centro præcipue

macularum sitis; pseudoperidiis albidis, dentatis, e cellulis subquadratis minute verruculosus, 36 \times 24 efformatis; æcidiosporis pallidis, sublevibus, globoso-ovatis, tenuiter tunicatis, 24-28 \times 20-25, contentu granuloso; pycnidiis amphigenis, centralibus, minutis pallidis.

Hab. in foliis Chlorophyti cujusdam, Chari, Congo Africae tropicalis.

137. **Æcidium Bulbines** P. Henn. et Evans, in P. Henn., Engl. Bot. 2983 Jahrb. XLI (1908) pag. 271. — Maculis amphigenis gregarie sparsis, rotundatis, fuscis; pycnidiis atro-fuscis, aggregatis, æcidiis concentricè circumdantibus, pseudoperidiis pallidis, pulvinatis dein subcylindraceis, contextu cellulis polyedricis, reticulatis hyalino-fuscescentibus; sporis subglobosis vel ellipsoideis, angulatis, hyalino-fuscescentibus, 15-22 μ .

Hab. in foliis *Bulbines* sp., Zeerust Marico Distr. Transvaal, Afr. merid. (EVANS). — Hoc *Æcidium* forsan ad *Uromycetem Bulbines* Thüm. spectare potest.

138. **Æcidium Antherici** P. Henn. et Evas, in P. Henn., Engl. Bot. 2984 Jahrb. XLI (1908) pag. 271. — Maculis oblonge effusis, flavidulis, æcidiis amphigenis sparsis, striiformibus, pseudoperidiis cylindraceis vel cupulatis, albidis, gregariis, contextu cellulis oblonge polyedricis, reticulatis hyalinis; sporis subgloboso-angulatis, hyalino-flavidulis, 15-20 μ .

Hab. in foliis *Antherici* sp., Bethal, Transvaal Afric. mer. (EVANS).

139. **Æcidium tataricum** Rostr., Bot. Tidsskr. XXVIII (1907) p. 216. 2985 — *Æcidiis* amphigenis, dense gregaris; pseudoperidiis flavis, profunde urceolatis, margine subtilissime dentatis; æcidiosporis rotundato-angulatis, 16-18 μ . diam.

Hab. in foliis *Ixiolirii tatarici* ad Bami, Transcaspia.

140. **Æcidium lampsanicola** Tranzsch., Trav. Mus. Bot. Ac. Imp. St. 2986 Petersb. livr. II (1906) pag. 12.

Hab. in foliis *Lapsanæ grandifloræ* in Tauria.

141. **Æcidium Bupleuri-sachalinensis** Miyake, Journ. Sapporo Agric. 2987 Coll. II (1906) pag. 109.

Hab. in foliis *Bupleuri sachalinensis* in Japonia.

142. **Æcidium Puerariæ** P. Henn — Syll. XVI p. 329. — *Uromyces Puerariæ* (P. Henn.) Diet. in Engl. bot. Jahrb. XXVII (1900) p. 282. — Observante cl. Sydow, Monogr. Ured. II, p. 350, est *Synchytrium Puerariæ* Kusano.

Syll. fung. XXI (II-1912)

Æcidium Cardui Sow. — **Æc. confluens** Sow. — **Æc. Corni** Sow. —
Æc. Fragariæ Sow. — **Æc. Populi** Horn. sunt species omnino du-
 biæ. Cfr. Syll. XIX pag. 24.

CÆOMA Lk. — Syll. VII p. 863, XI p. 227, XIV p. 407, XVI
 p. 365, XVII p. 458.

1. **Cæoma Androsæmi** D'Almeida et Da Camara, Bol. Soc. Brot. XXIV 2989
 (1909) pag. 10. — Maculis nullis vel badiis, indeterminatis, in
 foliorum pag. superiore dispositis; soris hypophyllis, minutis, plus
 minus rotundatis, aurantiacis, sparsis rarius aggregatis, primo te-
 ctis, dein nudis, pulverulentis pallescentibusque; cæomosporis ple-
 rumque globosis, raro oblongis, immaturis polygoniis, verruculo-
 sis, flavidis, 17-23 \approx 17-20.

Hab. in foliis **Androsæmi officinalis** in horto botanico
 Coimbra Lusitaniæ (A. MOLLER). — An potius forma uredosporica
Melampsorcæ Hypericorum?

2. **Cæoma Makinoi** Kusano, Bot. Mag. Tokyo (1903) pag. 15. - Syll. 2990
 XVII pag. 459. - Kusano, Bot. Mag. Tokyo XX (1906) pag. 47
 et tab. IV. — Soris epiphyllis, dense sparsis, subrotundis v. oblon-
 gis, 6-14 mm. long.; cæomosporis ovatis vel ellipsoideis, 20-42 \approx
 15-25, plerumque 31 \approx 23, contentu aurantiaco, episporio hyalino,
 tenuiter muriculato; pycnidiis amphigenis, colliculos granulares
 aurantiacos gignentibus, periphysibus filiformibus vel clavulatis,
 flocculosis; sporulis globulosis hyalinis.

Hab. in foliis vivis **Pruni Mume** in Japoniæ pluribus locis.

3. **Cæoma Rosæ-gymnocarpæ** Diet. Hedw. XLIV (1905) p. 335. — 2991
 Ramulis plantæ rubridis totis mycelio pervasis eoque plus mi-
 nusve deformatis; pycnidiis numerosis, haud raro confertis in
 utraque pagina foliorum deformatum, conoideis, prominulis;
 soris inferiorem paginam foliorum obtegentibus, convexis, irregu-
 laribus, nudis; cæomosporis catenulatis, ellipsoideis vel subglobosis
 22-40 \approx 18-28, episporio 3-4 μ . cr. densissime minuteque verrucu-
 loso indutis; paraphysibus nullis.

Hab. in ramulis foliisque **Rosæ gymnocarpæ** et **R. ca-**
lifornicæ (?) in California.

4. **Cæoma Apocyni** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) pag. 193, 2992
Æcid. Apocyni Cooke Handbook of Austral. Fung. (1902) p. 341,
 nec Schw. — Soris amphigenis, minutis, congregatis, brun-
 neis, bullatis; sporis flavidis, forma variabilibus, ellipsoideis, ovoi-

deis, piriformibus, oblongis v. angulatis, contentu minute granuloso, 25-34 \times 20-26, episporio hyalino grosse verrucoso 5 μ . crasso.

Hab. in foliis *Tabernæmontanæ orientalis*, Queensland Australiae.

5. **Cæoma Piperianum** (Arthur) Sacc. et Trott., *Melampsoropsis Pi-* 2993
periana Arthur, North Amer. Fl. VII pag. 120. — Uredosoris hypophyllis, minutis, angulosis, paucis aggregatis vel solitariis, ceraceis, demum subpulveraceis; pseudoperidio nullo; uredosporis catenulatis, oblongis v. lanceolatis, 40-65 \times 16-25, utrinque tenuatis, apicibus obtusis v. acutis; membrana hyalina, grosse et dense verrucosa, 1,5-2 μ . cr.; pycnidiis, æcidiis et teleutosporis ignotis.

Hab. in foliis *Rhododendri californici*, Oregon Washington Amer. bor. — Ignotis teleutosporis species adhuc dubia.

6. **Cæoma Theissenii** Syd, Ann. mycol. (1910) pag. 452. — Maculis 2994
epiphyllis, minutis, orbicularibus v. irregularibus, circ. 2-3 mm. diam., flavo-brunneis vel brunneis; soris hypophyllis, sparsis, solitariis v. 2-3 aggregatis, rotundatis v. irregularibus, $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam., flavis, peridio proprio nullo; sporis globosis vel angulato-globosis, dense verrucosis, hyalino-flavidis, 18-32 \times 18-25.

Hab. in foliis *Dalechampiæ* sp. Sao Leopoldo, Rio Grande do Sul Brasiliæ.

7. **Cæoma Anthurii** Har. - Syll. XI, p. 229. - var. **Alocasiæ** Raci- 2995
borski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) pag. 278. — A typo differt sporis et aculeis minoribus.

Hab. in foliis *Alocasiæ metallicæ* prope Buitenzorg in ins. Java.

8. **Cæoma occidentale** Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIV (1907) 2996
pag. 591. — Pycnidiis amphigenis, sparsis, minutis, inconspicuis, subcuticularibus, flavo-melleis, hemisphæricis, 65-100 μ . diam., 23-32 μ . alt.; æcidiis hypophyllis, in maculis flavis in duplicem seriem dispositis, e rotundato oblongis, 0,3-1 mm. vel ultra longis, 0,3-0,4 mm. latis, mox nudis, flavo-aurantiacis; peridio nullo; æcidiosporis catenulatis, late ellipsoideis, 27-32 \times 20-24, tunica hyalina 1,5-2,5 μ . cr., moderate et parum crebre verrucosis.

Hab. in foliis *Pseudotsugæ mucronatæ* (= *Douglasii*), Beaver River Valley, British Columbia Amer. bor.

9. **Cæoma strobilinum** Arthur, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII (1906) 2997
pag. 519. — Pycnidiis strobiliculis, subtus stratu corticali orientibus, compressis, stratosis, 130-160 μ . alt.; æcidiis strobiliculis, subcorticulis, plerumque totam superficiem tegentibus et hyper-

trophias efficientibus, squamis inter se coalescentibus et præmature rubro-brunneis; peridio nullo; æcidiosporis anguste ellipsoideis vel late lanceolatis, raro globosis v. obovoideis, interdum subtus attenuatis, $29-50 \approx 12-19$, tunica hyalina, $1,5 \mu$. c. cr., parum crasse verrucosa, basi area levi prædita.

Hab. in strobilis Pini palustris et P. Tædæ, Florida Amer. bor.

10. **Cæoma Violæ** Th. Lindfors, Svensk. Bot. Tidskr. IV (1910) p. 198, 2998
fig. 2. — Pycnidiis non observatis; cæomosoris sparsis, sæpius hypophyllis, cinnato-erumpentibus, initio strato peculiari cellularum hyalinarum tectis; sporis globoso-ellipsoideis, $19-27 \approx 18-20$, catenulatis, tunica hyalina, 3μ . cr., minutissime, dense verrucosis, contentu flavo; sporis inferioribus minoribus, levibus, hyalinis.

Hab. in foliis Violæ epipsilæ, Tarratal Lapponiæ,

11. **Cæoma Cernuæ** Th. Lindfors, Svensk. Bot. Tidskr. IV (1910) 2999
p. 201, fig. 4. — Pycnidiis rufo-brunneis, subcuticularibus, lenticularibus, farctis, sub cæomosoris sparsis; cæomosoris plerumque hypophyllis suborbicularibus, flavis; paraphysibus clavatis, distinctis, hyalinis circumdatis; cæomosporis e globoso ellipsoideis, leviter angulosis, $19-22 \approx 17-22$, tunica hyalina 3μ . cr., minute crebreque verruculosa.

Hab. in foliis Saxifragæ cernuæ in cacumine M. Njuonjes Lapponiæ. — A *Cæomate Saxifragarum* (DC.) Schlecht. imprimis paraphysibus distinctis dignoscenda species.

Cæoma aurantiacum Bon. — **C. cinctum** Nees — **C. fallax** Corda
sunt species omnino dubiæ. Conf. Syll. XIX, pag. 206.

UREDO Pers. — Syllog. VII p. 838, IX p. 327, XI p. 222, XIV p. 389, XVI p. 349, XVII p. 436.

1. **Uredo dianthicola** Hariot, Les Uredin. in Encyclop. scient. (1908) 3000
p. 305. — Soris amphigenis, sæpe in greges oblongos v. ellipticos confluentibus, ferrugineis; uredosporis flavo-brunneis, membrana crassa, ellipsoideis vel globulosis, verrucosis; poris binis v. ternis.

Hab. in foliis Dianthi Caryophylli culti Parisiis Galliæ.

2. **Uredo Dodonææ** Koord., Botan. Untersuch. (1907) pag. 201. — 3001
Maculis pallidis, inconspicuis, minutis; soris minutissimis, sparsis, hypophyllis, pallide flavescentibus; uredosporis subglobosis vel ovoideis $20-25 \approx 14-20$, episporio dense minuteque echinulato, subhyalino, intus aurantiaco-rufescentibus.

Hab. in foliis vivis *Dodonææ viscosæ* prope Kledung prov. Kedu ins. Java (KOORDERS).

3. **Uredo Strychni** P. Henn. in Fl. du Bas- et Moy. - Congo, Ann. 3002
Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) p. 93. — Maculis flavo-
fuscidulis, rotundatis; soris hypophyllis sparsis v. gregariis, diutius
epidermide tectis dein velatis, ochraceis; uredosporis subglobosis,
ellipsoideis, v. ovoideis, aculeato-echinatis, brunneo-fuscis, 18-24
≈ 15-20.

Hab. in foliis *Strychni* sp., Gongolo, Congo (VANDERYST).

4. **Uredo Viaticæ** Syd., Ann. Mycol. V (1907), p. 508. — Soris ure- 3003
dosporiferis hypophyllis, sparsis, minutissimis, punctiformibus,
pulverulentis, dilute cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobo-
sis vel ovatis, laxe sed crassiuscule verrucoso-aculeatis, dilute
brunneis, 17-25 ≈ 14-20, episporio crasso præcipue ad apicem ibi-
que 5 μ . circiter crasso.

Hab. in foliis *Viaticæ coniiifoliæ* (an *Vatica cordifo-*
lia?) Kumaon Himalaya (leg. INAYAT, comm. E. J. BUTLER).

5. **Uredo Stachyuri** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) pag. 108. — 3004
Maculis pallidis, superne violaceis v. brunneis; soris hypophyllis,
sparsis, minutis, primo epidermide velatis, denique badiis; uredo-
sporis obovatis, piriformibus v. ellipsoideis, 24-32 ≈ 16-20, episporio
tenui, incolorato, echinulato.

Hab. in foliis *Stachyuri præcoccis*, Mont. Janaze, Tosa
Japoniæ (YOSHINAGA).

6. **Uredo Scheffleri** Syd., Engler's Bot. Jahrb. XLV Band. (1910) 3005
p. 262. — Uredosoris hypophyllis, sine maculis, sparsis vel hinc
inde irregulariter aggregatis, farinoso-pulverulentis, flavo-lateritiis;
uredosporis subglobosis, ovatis vel piriformibus, parte superiore
aculeis majusculis, deorsum levibus v. sublevibus, hyalino-flavidis,
21-32 ≈ 18-23, episporio 1,5 μ . cr.

Hab. in foliis *Capparidis* v. *Mærnæ*, Kibwezi in Africa
tropic. Britannica (SCHEFFLER). — Verisimiliter ad *Hemileiam*
spectat.

7. **Uredo rhoïna** Syd., Deutsche Zentral-Afrika Exped. (1907-1908) 3006
II. Bd. pag. 97. — Uredosoris hypophyllis, sparsis v. hinc inde
aggregatis, minutissimis, pulverulentis, in tomento folii nidulanti-
bus, flavo-brunneis; uredosporis ellipsoideis vel oblongis, apice
leniter incrassatis (usque ad 5 μ .), verrucis acutis indistincte li-
neariter dispositis obsitis, flavo-brunneis, 20-35 ≈ 18-21, episporio
circ. 1,5 μ . cr.

Hab. in foliis *Rhois* sp. Ruanda Africae trop.

8. **Uredo Chrysophylli** Syd., Hedwigia XLIX (1909) p. 79. — Ma- 3007
culis minutis, orbicularibus, albidis, 1-3 mm. latis; soris uredosporiferis hypophyllis, paucis in quaque macula, minutissimis, epidermide rupta cinctis, fuscis; uredosporis subglobosis, ovatis vel piriformibus, laxe et breviter aculeatis, flavo-brunneis, 22-32 \approx 18-25, episporio 1 $\frac{1}{2}$ -2 μ . crasso.

Hab. in foliis *Chrysophylli* spec. Para Brasiliæ (C. F. BAKER). — Ab *Ur. chrysophyllicola* habitu et sporis omnino diversa.

9. **Uredo Reissekiæ** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 356. — Maculis 3008
orbicularibus, minutis, 1-3 mm. diam., fuscis, dein medio albicantibus; uredosporis hypophyllis, minutis, epidermide albida tectis; uredosporis subglobosis vel ellipsoideis, subtilissime echinulatis, hyalino-flavidis, 16-25 \approx 12-18, episporio tenui, ca. 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso.

Hab. in foliis *Reissekiæ cordifoliæ*, Venda das Pedras pr. Rio de Janeiro Brasiliæ (F. NOACK).

10. **Uredo Uguressæ** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya IV (1909) 3009
pag. 303. — Soris obscure aurantiis, minutis, usque ad 0,25 mm. diam., in maculis circularibus nigricantibus circulariter confertis; sporis brunneo-flavis, piriformibus v. ovoideis, spinulis late obtusis tectis, sed basi angustata levibus, 24-28 \approx 15-19.

Hab. in fructibus immaturis *Flacourtia Ramontchi* vulgo *Uguressa*, Galle Ceylon.

11. **Uredo Polygalæ** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 108. — 3010
Soribus hypophyllis, in maculis flavis indeterminatis, ochraceis, epidermide fissa circumdatis, minutis, sparsis vel circulariter dispositis; uredosporis obovatis v. ellipsoideis, 22-28 \approx 16-22, episporio brunneo echinulato 2 μ . cr., poris duobus perforato.

Hab. in foliis *Polygalæ japonicæ*, Koajiro, Sagami Japoniæ (YOSHINAGA).

12. **Uredo Erythrinæ** P. Henn., in Fl. du Bas-et Moy.-Congo, in 3011
Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. III (1908) pag. 224. — Maculis rotundatis vel confluenti-effusis, flavo-brunneis; soribus sparsis, pulvinatis, epidermide fusca velatis; uredosporis ellipsoideis vel ovoideis, aculeato-echinatis, hyalino-fuscidulis, 14-24 \approx 13-18.

Hab. in foliis *Erythrinæ* sp., Kisantu, Congo Africae trop. (VANDERYST).

13. **Uredo Æschynomenis** Arth. Botan. Gaz. XXXIX (1905) p. 392; 3012
North Amer. Fl. v. VII (1907) p. 104 (in gen. *Physopella*). —

Uredosoris plerumque hypophyllis, sparsis vel in maculis parvis rubidis confertis, subepidermicis, minutis, globosis, paraphysibus parvis circumdatis, poro centrali apertis; uredosporis late ellipsoideis vel globosis, 16-23 \times 14-18; tunica pallide flava, tenui, 1 μ ., minutissime verrucosa, poris germinativis minutis, sparsis, circ. 6 præditis; paraphysibus imbricatis, hyalinis, supra 10-14 μ . latis ibique tunica crassiori præditis; teleutosporis ignotis.

Hab. in foliis *Æschynomenis* americanæ in Mexico.

14. **Uredo Bossiæ** Mac Alp., *Rusts of Australia* (1906) pag. 206, 3013 tab. XXVIII, fig. 246. — Soris amphigenis v. plerumque hypophyllis, castaneo-brunneis, erumpentibus, epidermide rupta cinctis, compactis, sparsis v. congregatis, rotundatis, 1-1,5 mm. diam.; uredosporis ellipsoideis, minute echinulatis, brunneo-auratis, episporio 3 μ . c. cr., 24-31 \times 17-21.

Hab. in foliis *Bossiæ* prostratæ in Tasmania Australiæ.

15. **Uredo Sesbania** P. Henn. in *Fl. du Bas-et Moy.-Congo*, Ann. 3014 Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) p. 93. — Maculis flavido-fuscidulis effusis; soris hypophyllis sparsis, ferrugineis; uredosporis brunneis, echinatis, 18-24 μ . diam.

Hab. in foliis *Sesbania* sp., Boko-Sainte-Barbe, Congo, Afric. trop. (VANDERYST).

16. **Uredo Sissoo** Syd. et Butl., Ann. Mycol. IV (1906) pag. 422 et 3015 V (1907) pag. 508. — Uredosoris hypophyllis, maculis nullis vel obsoletis insidentibus, dense sparsis, minutis, mox nudis, pulverulentis, denique interdum confluentibus, primo aurantiaco-ferrugineis, tandem ferrugineis; uredosporis oblongo-ellipsoideis subinde clavatis, rectis vel leniter curvulis, dilute flavis, echinulatis, 25-38 \times 11-18, episporio tenui, ca. 1-1½ μ . crasso; paraphysibus numerosis, fasciculatis, elongato-clavatis vel subcylindræis, plus minusve curvulis, sursum haud capitatis, dilute flavis, usque ad 55 μ . longis, ca. 10 μ . latis,

Hab. in foliis *Dalbergiæ* Sissoo, Dehra Dun et Pusa Indiæ. (E. J. BUTLER).

17. **Uredo mucunicola** P. Henn., in *Fl. du Bas- et Moy.-Congo*, in 3016 Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. III (1908) p. 224, *Uredo Mucunæ* P. Henn., l. c. fasc. II (1907) p. 93. — Maculis fuscidulis effusis; soris hypophyllis gregariis vel sparsis, fusco-ferrugineis, epidermide fissa fuscidula tectis v. velatis; uredosporis subglobosis, flavido-hyalinis, echinatis, 14-20 μ . diam.; paraphysibus clavatis, curvulis, subhyalinis, 40 \times 12.

Hab. in foliis *Mucunæ prurientis*, Kisantu, Congo Afric. trop. (H. VANDERYST).

18. **Uredo purpurascens** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, 3017
Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) pag. 93. — Maculis gregariis rotundatis v. effusis, purpureis; soris sparsis v. gregariis, hypophyllis v. cauliculis, rotundatis, diutius epidermide flavida tectis; uredosporis ellipsoideis v. ovoideis, flavo-fuscidulis, aculeatis, 22-24 \times 12-15.

Hab. in foliis caulibusque *Vignæ* sp., Kisantu Congo, Afric. trop. (VANDERYST).

19. **Uredo Abri** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 252. — Ma- 3018
culis fuscidulis effusis soris hypophyllis gregarie sparsis, minutis, ferrugineis, epidermide fissa velatis; uredosporis subglobosis vel ellipsoideis, verrucosis, brunneis, 15-20 \times 13-18; paraphysibus clavatis, apice brunneis, incrassatis, 30-60 \times 8-12.

Hab. in foliis *Abri preicatorii*, Panay, Hoilo ins. Philipp. (COPELAND). — *U. Kærnbachii* P. Henn. distincta.

20. **Uredo Cajani** H. et P. Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 442. — 3019
Soris uredosporiferis hypophyllis, sparsis, minutis, in tomento folii nidulantibus, ferrugineis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, subtilissime echinulatis, flavidis, 20-28 \times 18-24.

Hab. in foliis *Cajani indici*, Pusa Indiæ (E. J. BUTLER).

21. **Uredo Canavaliæ** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, in 3020
Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. III (1908) p. 224. — Maculis rufo-brunneis, rotundatis v. effusis; pycnidiis epiphyllis rufo-brunneis, punctiformibus, gregariis; uredosporis hypophyllis sparsis v. aggregatis, pulvinatis dein cupulatis; uredosporis subglobosis vel ellipsoideis, brunneis, verrucosis, 20-25 μ . diam.

Hab. in foliis *Canavaliæ* sp., Dembo Congo Afr. trop. (VANDERYST).

22. **Uredo Raciborskii** Sacc. et Syd. — Syll. XVI, p. 352. — Hujus 3021
est homonyma *Uredo Raciborskii* Koorders, Botan. Untersuch. (1907) p. 201, fig. 23 II, *Uredo Pithecolobii* Racib. (1900), non P. Henn. (1895).

Hab. quoque in foliis vivis *Pithecolobii lobati* culti pr. Purworedjo insulæ Java (KOORDERS).

23. **Uredo Ulei** P. Henn., Hedwigia XLIV (1905) p. 58. — Ita vo- 3022
canda *Uredo Bauhinicæ* P. Henn. — Syll. XVII, p. 447 — non B. et C.

24. **Uredo gemmata** Pat. et Har., Bull. Soc. myc. Fr. (1905) p. 84. — 3023

Deformans, epiphylla, ramulicola v. fructicola, tubercula usque ad 2 cm. lata efficiens; soris pulvinatis, immarginatis, densissime constipatis, totam tuberculorum superficiem occupantibus; uredosporis flavis, ovoideo-elongatis, rarius subglobosis, dense verrucosis et quasi gemmatis, verrucis magnis hemisphæricis, 28-32 \times 16-22, tunica crassiuscula, 3 μ ., poris pluribus æquatorialibus perforata; pedicello hyalino, 40 \times 5; paraphysibus numerosis, longioribus, hyalinis, linearibus, apicem versus incrassato-rotundatis.

Hab. in foliis, ramulis et fructibus *Acaciæ* sp., Melbourne Australiæ (C. G. LLOYD).

25. **Uredo leguminicola** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires, t. XIX 3024 (1909) p. 317. — Maculis nullis; soris 5-10 mm. long., elliptico-linearibus, transversis, nudis, e carnosulo subpulverulentis, testaceis, primo epidermide tectis dein denudatis; uredosporis globosis, ellipsoideis v. obovoideis, 14-25 \times 14-18, episporio modicissime incrassato, minute papilloso hyalino tunicatis. endoplasmate guttulo flavidulo repletis, paraphysibus capitatis, apice crasse tunicatis, 40-60 \times 16-18, ped. 5 μ . cr., rubiginosis commixtis.

Hab. ad legumina non matura *Acaciæ lophanthæ* in Horto botanico bonaërensi, Amer. austr. (E. AUTRAN).

26. **Uredo Cabreriana** Kern. et Kellerm., Journ. of Mycol. XIII 3025 (1907) p. 25. — Uredosoris plerumque hypophyllis, in greges 2-4 mm. diam. orbiculariter dispositis v. sparsis, rotundatis, 0,5-1 mm. diam., subepidermicis, mox nudis, castaneo-brunneis, pulveraceis, erumpentibus; paraphysibus intermixtis, spathulatis v. quandoque capitatis, sæpe irregularibus, 40-80 \times 10-23, firmis, cavis; uredosporis late obovato-ellipsoideis, 27-34 \times 17-27, tunica 3-4 μ . cr., obscure castaneo-brunnea, supra crassiore, 5-7 μ ., crebre echinulata et tuberculis subconoideis 3-4 μ . alt. prædita, poris 3 raro 4 æquatorialibus.

Hab. in foliis *Buettneriæ lateralis*, Livingston Izabal Guatemala (KELLERMAN).

27. **Uredo nervicola** Tranzschel, Ann. Mycol. V (1907) pag. 551. — 3026 Soris hypophyllis, supra nervos foliorum totius plantæ evolutis, longe linearibus, seriatim confluentibus, interdum etiam inter nervos secundarios foliorum soris irregularibus interpositis, nudis, in sicco flavidis, aparamphysatis; sporis in pedicellis solitariis, non catenulatis, ovoideis vel ellipsoideis, 21-27 \times 16-20, episporio tenui, achroo, echinulato.

Hab. in foliis *Potentillæ fragarioidis* L. prope Irekte

(ad viam ferream) in montibus Chinganis Manshuriæ occidentalis (D. LITVINOV). — Præcipue ob soros nervisedos distinguenda species.

28. ? **Uredo Persicæ** Spegazz., Fungi Paulist., Rev. Mus. La Plata 3027 t. XV, p. 9. — Uredosoris hypophyllis erumpenti-pulverulentis, 75-150 μ . cr., fulvis in maculis nullis v. pallide flavis indeterminatis insidentibus, paraphysibus marginalibus plus minusve numerosis donatis; paraphysibus clavuliformibus, capite subhemisphærico levi ferrugineo crasse tunicato maiuscule nucleato 10-18 \times 8-14, deorsum abrupte in pedicellum triplo longiorem pallidiorem producto; uredosporis obovatis clavatis sessilibus v. brevissime pedicellatis, episporio fulvello superne sæpius acute rotundato crassissimo levi, deorsum minute denseque papilluloso, endoplasmate nubiloso sæpius grosse nucleato donatis.

Hab. in foliis Pruni Persicæ, vulgatissima autumnali tempore circa Sao Paulo Brasiliæ (USTERI).

29. **Uredo Rochæi** Puttemans, Revista polytechnica Sao Paulo (1906) 3028 n. 11, p. 272. — Maculis nullis, soris sparsis plus minus confluentibus, minimis, 0,1-1 mm. diam., primo epidermide tectis, dein erumpentibus; uredosporis subglobosis v. ovoideis v. subpiriformibus, intus flavido-fulvis, 15-22 \times 14-18, episporio 2 μ . crasso, hyalino, echinulato; pedicello hyalino, 8-14 \times 4-6.

Hab. in fructibus maturis Myrciariæ Jaboticabæ, Sao Paulo Brasiliæ (A. ROCHA).

30. **Uredo œnothericola** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 3029 (1909) p. 318. — Maculis amphigenis pallescentibus indeterminatis; soris in maculis sæpius 3-5-gregariis, 0,3-0,7 mm. diam. primo epidermide velatis serius omnino nudis deterrentibus, pulverulentis, atro-ferrugineis; uredosporis globosis, 20-24 μ . diam., papillulosis, obscure fulvis, endoplasmate dense nubiloso-guttulato fere reticulato fœtis, pedicello hyalino mox fatiscente 40-50 \times 5 sæpe suffultis.

Hab. in foliis vivis *Ænotheræ* mollissimæ, La Plata Amer. austr.

31. **Uredo Valerianæ-Wallichii** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 304. — 3030 Soris maculis pallescentibus insidentibus, epiphyllis, minus copiose etiam hypophyllis, solitariis vel paucis in formam circuli incompleti compositis, primo epidermide bullata velatis, deinde nudis pulveraceis, obscure brunneis, mox evanescentibus et maculam exsiccantem relinquentibus; uredosporis ovoideis, lageniformibus vel

subglobosis, basi in appendiculam breviter cylindraceam protractis, flavo-brunneis, in parte superiore verrucis acutiusculis ornatis, inferiore levibus, poris binis oppositis basalibus instructis, 30-43 \approx 18-27.

Hab. in foliis *Valerianæ Wallichii*, Simla pr. Himalaya (A. BARCLAY). — Ab uredine *Uromycetis Valerianæ* mox distincta.

32. **Uredo Laggeræ** Syd., Deutsche Zentral-Afrika Exped. 1907-1908, 3031 II Bd. (1910) p. 98. — Uredosoris hypophyllis, maculis minutis flavo-brunneis, c. 2-3 mm. diam., insidentibus, minutissimis, c. $\frac{1}{5}$ mm. diam., epidermide diutius tectis, flavo-brunneis; paraphysibus numerosis, clavatis, curvulis, hyalino-flavidis, usque ad 60 μ . long. c. 10-14 μ . cr.; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, brevissime echinulatis, dilute brunneis, 18-25 \approx 12-22, episporio 1,5 μ . cr.

Hab. in foliis radicalibus *Laggeræ alatae*, Ruanda Africae tropicalis.

33. **Uredo Inulæ-candidæ** Trotter, Bull. Soc. bot. it. (1905) p. 239. — 3032 Uredosoris hypophyllis, sparsis, solitariis v. confluentibus, flavo-aurantiacis; uredosporis irregulariter subglobosis vel ovoideis vel ellipsoideis, quandoque polygoniis, lutescentibus, 25-40 \approx 20-25, tunica crassiuscula, 3-5 μ ., pallidiore, distincte verrucosa.

Hab. in foliis *Inulæ candidæ* in M. Pelio prope Volo Græciæ. — Est probabiliter status uredosporicus *Coleosporii* cujusdam.

34. **Uredo Trixidis** Kern et Kellerm., Journ. of Mycol. XIII (1907) 3033 p. 26. — Uredosoris hypophyllis, sparsis, parvis, rotundatis, 0,3-0,5 mm. diam., mox nudis, dein subpulverulentis, obscure castaneo-brunneis, erumpentibus; peridio v. paraphysibus nullis; uredosporis late ellipsoideis, quandoque basi subangustatis, 25-30 \approx 19-24, tunica pallide castaneo-brunnea, 2-3 μ . cr., sparse et subinconspicue echinulata, poris germ. 2 distinctis contrappositis.

Hab. in foliis *Trixidis frutescentis*, San Lucas Sololá Guatemala (KELLERMAN).

35. **Uredo Guizotiæ** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, Ann. 3034 Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) p. 93. — Maculis fuscis irregularibus; soris hypophyllis, sparsis vel gregariis et confluentibus, ferrugineis, epidermide fissa velatis, uredosporis subglobosis vel subellipsoideis, fusco-brunneis, echinatis, 18-22 μ . diam.

Hab. in foliis *Compositæ* (*Guizotiæ?*), Kisantu Congo, Afr. trop. (VANDERYST).

36. **Uredo biocellata** Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII (1906) p. 517. 3035

— Uredosoris amphigenis, sparsis, rotundatis, latis, 0,75-1,5 mm., subepidermicis, paraphysibus v. peridio carentibus, mox nudis, pulverulentis, leviter theobromino-brunneis; uredosporis late ellipsoideis v. obovato-globoideis, 27-32 \times 23-27, tunica leviter castaneo-brunnea, 1,5-2 μ . cr., crasse echinulata, ad poros germinativos binos depressa, ibique cuticula inflata prædita, areolasque bullatas 18-25 μ . diam., subhyalinas formante, levi.

Hab. in foliis Plucheæ purpurascens, Florida Keys Amer. bor. (C. L. POLLARD).

37. **Uredo Plucheæ** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) 3036

p. 319. — Maculis nullis v. obsoletis pallescentibus, suborbicularibus; soris sæpius epiphyllis solitariis v. in maculis subcircinantibus, parvis 0,25-0,50 mm. diam., primo epidermide tectis dein erumpentibus pulvinatis, fusco-ferrugineis, deterrentibus; uredosporis (an mesosporis?) obovatis 30-35 \times 20-24, episporio ubique tenuiusculo papilloso vestitis, edoplasmate grosse 1-guttulato, ferrugineis, pedicello hyalino 15-25 \times 5-8 fultis.

Hab. in foliis vivis Plucheæ Quitoc in uliginosis prope Ledesma, Salta Amer. austr.

38. **Uredo Wilsoni** Arthur, Bull. Torr. Bot. Cl. (1910) pag. 577. — 3037

Uredosoris hypophyllis, sparsis, punctiformibus, 0,1-0,3 mm. cr., mox nudis, pulveraceis, castaneo-brunneis, epidermide rupta inconspicuis; paraphysibus numerosis, periphericis, teretibus, simulate conjunctis, tunica levi, colorata; uredosporis globosis v. late obovatis, 26-29 \times 21-25; tunica pallide castaneo-brunnea, 2-2,5 μ . crassa, crasse hyalino-verrucosa, poris germinativis 2, oppositis et æquatorialibus, subinconspicuis.

Hab. in foliis Anastrophie bahamensis, Hanna Hill Long Cay, ins. Bahama Americæ centr. (L. J. K. BRACE).

39. **Uredo Zollikoferiæ** Pat., Add. Cat. Champ. Tunisie in C. R. du 3038

Congrès des Soc. sav. 1908 (1909) p. 245. — Soris sparsis, minutis, fusco-brunneis, epidermide demum rupta cinctis; uredosporis subglobosis, brunneis, minute asperulis, 20-22 μ diam.; maculis nullis.

Hab. in foliis caulibusque Zollikoferiæ resedifoliæ, Laghonat Tunisiæ.

40. **Uredo Wedeliæ-bifloræ** Sydow, Ann. Mycol. IV (1906) p. 32. — 3039

Uredosoris hypophyllis, maculis nullis v. obsoletis insidentibus, sparsis, minutis, cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, echinulatis, flavo-brunneolis, 15-24 \times 14-21.

Hab. in foliis *Wedeliæ bifloræ*, San Ramon, ins. Philipp.
(E. B. COPELAND).

41. **Uredo Vernoniæ** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, in 3040
Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. III (1908) p. 224. — Maculis
rotundatis fuscis; soris hypophyllis sparsis v. aggregatis, pulvi-
natis, ferrugineis, epidermide pallida velatis; uredosporis subglo-
bosis. ovoideis v. ellipsoideis, echinatis, flavo-brunneis, 15-25 \times 13-20.

Hab. in foliis *Vernoniæ* sp., Kisantu Congo Afr. trop. (VAN-
DERYST).

42. **Uredo Artemisiæ-japonicæ** Diet. in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1905) 3041
p. 591. — Soris amphigenis, epidermide diu tectis, minutis; spo-
ris obovatis, ellipsoideis v. oblongis, sæpe irregulariter angulatis,
28-40 \times 15-25, episporio tenui, dilute brunneolo, echinulato.

Hab. in foliis *Artemisiæ japonicæ*, Tonohama, Tosa Ja-
poniæ (T. YOSHINAGA).

43. **Uredo autumnalis** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 108. — 3042
Maculis flavescentibus v. nullis; soris amphigenis. interdum præ-
cipue epiphyllis, sparsis v. in acervulos parvos congregatis, nudis,
ochraceis; uredosporis oblongis, globosis, ellipsoideis v. piriformi-
bus, 26-42 \times 18-25; episporio tenui pallidissimo vel incolorato,
echinulato.

Hab. in foliis *Chrysanthemi sinensis*, Chr. Decais-
neani et Chr. indici in Japoniæ variis locis (YOSHINAGA,
NAMBU). — Affinis *Uredini Artemisiæ-japonicæ*.

44. **Uredo Brownii** Syd., Ann. Myc. V (1907) p. 338. — Uredosoris 3043
epiphyllis, sine maculis, sparsis, rotundatis, ca. $\frac{3}{4}$ -1 mm. diam.,
hemisphærico-prominulis, diutius tectis, compactiusculis, aurantia-
co-fuscis; uredosporis globosis, subglobosis, ovatis v. piriformibus,
laxe breviterque echinulatis, 28-40 \times 22-30, episporio crasso (usque
ad $7\frac{1}{2}$ μ .) hyalino, in aqua intumescente, contentu flavo.

Hab. in foliis *Oleariæ angustifoliæ*, Bluf Southland No-
væ Zelandiæ (R. BROWN). — Ab *Uredine Oleariæ* Cke. diversa.

45. **Uredo amaniensis** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) p. 106. 3044
— Maculis rotundatis, gregarie sparsis, atro-fuscis; soris hypo-
phyllis sparsis, pulvinatis, epidermide cinerea fissa tectis; uredo-
sporibus subglobosis, ellipsoideis v. ovoideis, 20-32 \times 20-26, episporio
fusco, aculeato-asperato.

Hab. in foliis *Bidentis* sp., Amani Usambara Africae (EI-
CHELBAUM). — Ab *U. Bidentis* Henn. soris et sporibus asperatis
diversa.

46. **Uredo Heteropappi** P. Henn. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) p. 597. 3045
 — Maculis fuscidulis, rotundatis; soris plerumque hypophyllis, sparsis vel gregariis, rotundatis, 0,5-1 mm. diam., epidermide fissa velatis, flavido-pallescentibus; uredosporis ellipsoideis v. ovoideis, 20-30 \times 15-23, intus flavidis, dense verrucosis, hyalino-fuscidulis.
Hab. in foliis *Heteropappi hispidi*, Tosa Japoniæ (YOSHINAGA).
47. **Uredo Mildbrædii** Syd., Deutsche Zentral-Afrika Exped. 1907-1908, 3046
 II Bd. (1910) p. 97. — Uredosoris hypophyllis, maculis nullis v. obsoletis flavidis insidentibus, etiam in petiolis et inflorescentiis evolutis, minutis, pulverulentis, in tomento plantæ nutriciæ nidulantibus, flavo-brunneis; uredosporis globosis, subglobosis v. ovatis, valide sed laxiuscule aculeatis, hyalino-flavidis, 21-30 \times 18-25, episorio 1,5 μ . cr.
Hab. in foliis, petiolis et pedunculis floralibus *Pavettæ Oliverianæ*, Ruanda Africæ trop.
48. **Uredo Chasaliæ** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya, IV, Pt. 3047
 V (1909) p. 303. — Soris minutis circularibus, ochraceis, confertis, in maculis nigrescentibus insidentibus, hypophyllis, epidermide revoluta cinctis; sporis subglobosis v. ellipsoideis, grosse echinulatis, crasse tunicatis, 22-31 \times 17-23.
Hab. in foliis *Chasaliæ curvifloræ*, Hakgala Ceylon.
49. **Uredo Knoxiæ** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 252. — Ma- 3048
 culis fuscidulis v. indeterminatis; soris hypophyllis sparsis v. gregariis, rotundato-pulvinatis, pallidis, farinosis; uredosporis subglobosis, ellipsoideis v. ovoideis, granulato-verrucosis, flavo-hyalinescentibus, 13-20 \times 10-15.
Hab. in foliis *Knoxæ corymbosæ*, Luzon, Prov. Benguet, Bued River. insul. Philippin. (MERRILL).
50. **Uredo Fadogiæ** P. Henn., in Fl. du Bas. et Moy.-Congo, Ann. 3049
 Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) p. 94. — Maculis fuscidulis indeterminatis; soris hypophyllis in villo nidulantibus, sparse gregariis, flavidis; uredosporis ellipsoideis, ovoideis v. lunulatis, flavo-brunneis, aculeatis, 25-35 \times 20-25.
Hab. in foliis *Fadogiæ* sp., Boko, Sainte-Barbe, Congo Afr. trop. (H. VANDERYST).
51. **Uredo Laurentii** P. Henn., Etat indép. du Congo; Mission E. 3050
 Laurent, Fasc. IV (1907) p. 356. — Maculis fuscidulis v. obsoletis; soris hypophyllis, sparsis, minutis v. gregatim confluentibus,

farinosis, flavidis; sporis ovoideis, ellipsoideo-lunulatis v. subtriangularibus, aculeatis, flavo-fuscidulis, 20-40 \times 18-32.

Hab. in foliis Rubiaceæ cujusdam, Nouvelle-Anvers, Congo Africæ tropic. (LAURENT). — Teste auct. status *Hemilejæ*.

52. **Uredo agnostoica** Spegazz., Fungi Paulist., Rev. Mus. La Plata 3051 t. XV (1908) p. 8. — Uredosoris hypophyllis laxè gregariis, minutis (100-250 μ . cr.) maculis fuscescentibus indeterminatis insidentibus, erumpentibus, sed diu tectis, compactiusculis, rubiginosis; uredosporis e globoso obovatis verruculosus crassiuscule tunicatis, sessilibus, 30-40 \times 25-28, episporio fulvello vertice sæpius incrassato, endoplasmate nubiloso grosse guttulado.

Hab. in foliis coriaceis arbusculæ (Sapotaceæ?) prope Ipiranga Brasilæ (USTERI).

53. **Uredo asclepiadina** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 3052 (1909) p. 316. — Maculis obsoletissimis fuscescentibus suborbicularibus; soris pusillis hinc inde laxè gregariis, sæpius hypophyllis, erumpentibus, subpulverulentis, atro-fuscis; uredosporis globosis, 20-25 μ . diam., episporio subtenui non v. lenissime asperulo, ferrugineis, endoplasmate sæpius grosse 1-guttulado farctis.

Hab. in foliis vivis Asclepiadis campestris, in pratis circa Jujuy Amer. austr.

54. **Uredo Dregiæ** Petch, Ann. R. Bot. Gard. Peradeniya IV, Pt. V 3053 (1909) p. 303. — Maculas minutas obscuras hypophyllas efficiens; soris hypophyllis, pallide griseo-brunneis, confertis, circularibus v. linearibus, epidermide revoluta cinctis; sporis pallide brunneis v. fere hyalinis, ovoideis v. piriformibus, crasse tunicatis, spinulis rudibus, sparsis præditis, 30-37 \times 20-22, sporis paucis sphæroideis 23-25 μ . diam. intermixtis.

Hab. in foliis Dregiæ volubilis, Peradeniya, Ceylon.

55. **Uredo sonsensis** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, Ann. 3054 Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) pag. 94. — Maculis flavo-fuscis minutis sparsis v. confluenti-effusis; soris hypophyllis, gregariis, flavidis, farinosis; uredosporis ellipsoideis, ovoideis, subtriquetris v. lunulatis, flavidis, aculeato-echinatis, 20-30 \times 15-20.

Hab. in foliis Asclepiadaceæ sp., Sonso, Congo, Afr. trop. (VANDERYST).

56. **Uredo manilensis** Syd. Ann. Mycol. VIII (1910) p. 36. — Soris 3055 uredosporiferis hypophyllis, maculis brunneolis indistinctis insidentibus, minutis, ca. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ mm. diam., sparsis vel sæpius in greges orbiculares 2-4 mm. diam. concentrice dispositis, epidermide

fissa cinctis vel semivelatis, subpulverulentis, flavo-brunneis; uredosporis globosis, subglobosis vel ovatis, valide aculeatis, flavo-brunneis, 21-28 \approx 20-25, episporio ca. 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso.

Hab. in foliis Tabernæmontanæ coronariæ, Manila, ins. Philipp. (E. D. MERRILL).

57. **Uredo Brideliæ** Koord., Botan. Untersuch. (1907) p. 201. — Ma- 3056
culis minutis flavescentibus; soris hypophyllis, sparsis; uredosporis 30-32 \approx 17-18, ovoideis, utrinque rotundatis v. obtusis; episporio punctulato.

Hab. in foliis vivis Brideliæ lanceolatæ prope Purworedjo in insula Java (KOORDERS).

58. **Uredo Spirostachydis** Arthur, Bull. Torr. Bot. Cl. (1910) p. 576. 3057
— Uredosoris cauliculis, sparsis, plus minusve rotundatis, 0,4-0,8 mm. diam., mox nudis, plerumque pulvinatis v. subpulverulentis, cinnamomeo-brunneis, epidermide rupta conspicuis; uredosporis ellipsoideis v. oblongis, 23-29 \approx 18-21; tunica obscure brunneo-aurata, crebre echinulata, 2-2,5 μ . crassa, poris germinativis 6-8, sparsis.

Hab. in foliis Spirostachydis occidentalis, Yuma Ariz. Amer. bor.

59. ? **Uredo paulistana** Speg., Fungi Paulist., Rev. Mus. La Plata t. XV, 3058
(1908) p. 10. — Uredosoris laxè gregariis, erumpenti-prominulis, compactiusculis, 80-120 μ . cr., sordide flavescentibus, in maculis nullis v. epiphyllis fusco-pallescentibus; uredosporis? catenulatis?, e globoso cuboideis 20 μ . cr., pallide fulvis, episporio crassiusculo minute denseque verruculoso, endoplasmate grosse uninucleato.

Hab. in foliis vivis Acalyphæ? cujusdam prope Sao Paulo Brasiliæ (USTERI).

60. **Uredo Premnæ** Koord., Botan. Untersuch. (1907) p. 200, fig. 23 3059
III. — Maculis nullis v. inconspicuis; soris hypophyllis, sparsis, minutissimis, primo tectis, dein erumpentibus, flavescentibus; uredosporis ovoideis v. subglobosis, 17,5-24 \approx 17,5-18, hyalinis, pallide flavescentibus, episporio dense aculeato-asperato.

Hab. in foliis vivis Premnæ tomentosæ prope Koliwiro prov. Kedu in insula Java (KOORDERS).

61. **Uredo Raciborskiana** Sacc. et Trott., *Uredo Viticis* Raciborski, 3060
Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) p. 279 (ex errore *Viteri!*) non Juel. — Syll. XIV, pag. 398. — Soris hypophyllis, rotundatis, plerumque 60-150 μ . diam., raro usque ad 300 μ . flavis, immersis dein prominentibus, peridio v. paraphysibus nullis; uredosporis breviter

pedicellatis, ovoideis, tenuiter tunicatis, minute aculeolatis, apice rotundatis, flavo-aurantiacis, 19-25 \times 14-18.

Hab. in foliis *Viticis leucoxyli* prope Buitenzorg in insula Java.

62. **Uredo convestita** Syd. in De Wildem., Flore Bas- et Moy.-Congo, 3061 t. III, fasc. I (1909) Extr. p. 13. — Uredosoris hypophyllis, maculis nullis v. indistinctis insidentibus, sparsis v. in greges minutos rotundatos 1-2 mm. latos aggregatis, diu epidermide tectis, flavo-brunneis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, subtiliter echinulatis, flavo-brunneolis, 20-28 \times 14-20, episporio 1,5-2 μ . c. crasso.

Hab. in foliis *Clerodendri* sp., Kisantu Congo Africae trop. (VANDERYST).

63. **Uredo Hygrophilæ** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 31. — Ure- 3062 dosoris amphigenis, præcipue epiphyllis, sine maculis, sparsis, solitariis, minutis, $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ mm. diam., pulverulentis, epidermide lacera- rata cinctis, brunneis; uredosporis ovatis vel piriformibus, apice subinde lenissime incrassatis, aculeatis, fuscis, 28-39 \times 19-25.

Hab. in foliis *Hygrophilæ salicifoliæ*, Davao, ins. Philippin. (E. B. COPELAND).

64. **Uredo Beloperones** Arth., Bull. Torr. Bot. Club (1910) p. 576. 3063 — Uredosoris amphigenis et cauliculis, sparsis, quandoque circinatis, rotundatis v. elongatis, latis, 0,5-2 mm. cr., mox nudis, subpulvinatis, pulverulentis, theobromino-brunneis, epidermide rupta conspicuis; uredosporis late ellipsoideis v. obovoideis, 26-31 \times 21-26, tunica cinnamomeo-brunnea, 2-2,5 μ . cr., hilo plerumque conspicuo, æqualiter echinulata, poris germinativis 2 oppositis et æquatorialibus.

Hab. in foliis et caulibus *Beloperones californicæ*, Colorado California Amer. bor. (S. B. PARISH).

65. **Uredo Asystasiæ** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 3064 p. 106. — Maculis flavo-fuscidulis expansis; soris hypophyllis explanatis subfarinosis; uredosporis subglobosis ovoideis v. ellipsoideis, hyalino-fuscidulis, minute granulatis, 6-8 μ . diam.

Hab. in foliis *Asystasiæ gangeticæ*, Amani Usambara Africae (ZIMMERMAN).

66. **Uredo megalospora** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 3065 (1909) p. 318. — Maculis nullis v. folium totum plus minusve dealbans; soris amphigenis vel sæpius epiphyllis, erumpenti-superficialibus, hemisphæricis, 0,5-1 mm. diam. omnino nudis; ure-

dosporis (an mesosporis?) quandoque ellipsoideis quandoque subclavulatis, 40-50 \times 15-16, episporio superne vix incrassatulo ibique parce papilluloso vestitis, endoplasmate sæpius grosse 1-guttulato repletis, pedicellis hyalinis 60-80 \times 10, cylindraceis, in strato proligero crassiusculo subcarnosulo subcoalescentibus suffultis.

Hab. in foliis vivis Lycii cujusdam in rupestribus Las Flechas prope San Juan Amer. austr.

67. **Uredo pallidiuscula** Spegazz., Fungi Paulist., Rev. Mus. La Plata 3066 t. XV (1908) p. 9. — Maculis nullis, uredosoris hypophyllis sparsis, pulverulentis, minutis (120-200 μ . cr.), pallide ferrugineis; uredosporis globosis, melleis, 24-28 μ . cr., episporio tenui minute laxaque papilloso, subhyalino, endoplasmate pallide ferrugineo, grosse uni-nucleato.

Hab. in foliis Labiatæ (Colei?) cujusdam in hortis, Sao Paulo Brasiliæ (USTERI).

68. **Uredo iwatensis** Diet., Engl. Jahrb. XXXIV (1904) p. 592. — 3067 Soris epiphyllis, epidermide vesiculosa diu tectis, sparsis, cinnamomeis; uredosporis obovatis v. subglobosis, 18-22 \times 16-18, flavo-brunneis, echinulatis; poris binis.

Hab. in foliis Calaminthæ sinensis, Morioka, Iwate Japoniæ (N. NAMBU).

69. **Uredo Castaneæ** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) p. 252. — 3068 Maculis rotundatis v. effusis, fuscidulis; soris hypophyllis gregariis minutis, farinosis, epidermide fissa velatis; uredosporis ovoideis v. ellipsoideis, e flavido hyalinis, echinatis, 12-20 \times 8-12.

Hab. in foliis Castaneæ vulgaris cult., Luzon, Lepanto, Balili ins. Philipp.(MERRILL). — Vix *Pucciniastrum Castaneæ* Diet.

70. **Uredo Rhei-undulati** Diet., Ann. Mycol. IV (1906) p. 304. — 3069 maculis pallidis, rotundatis, interdum confluentibus centro insidentibus, parvis, amphigenis, albido-ochraceis, planiusculis, margine epidermide cinctis; uredosporis obovatis vel ellipsoideis 23-31 \times 16-22, episporio tenui breviter echinulato, dilute brunneo, poris 3-4 parum conspicuis perforato indutis.

Hab. in foliis Rhei undulati, in horto bot. Tokyo Japoniæ (N. NAMBU).

71. **Uredo Grayiæ** Arth., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) p. 591. 3070 — Uredosoris amphigenis, sparsis, sæpe confluentibus, rotundatis, 0,5-1 mm. diam., mox nudis, pulverulentis, theobromino-brunneis; uredosporis ellipsoideis v. obovato-ellipsoideis, 32-42 \times 19-23, tunica obscure castaneo-brunnea, infra parum attenuata, subcrassa, 2-2,5

$\mu.$, supra parum incrassata 2,5-3,5 $\mu.$, verruculosa, basi levi, poris germinativis 8 in 2 zonis transversis dispositis.

Hab. in foliis *Grayiæ spinosæ*, Fallon Nevada Amer. bor. (L. L. HARTER).

72. **Uredo Quercus-myrsinifoliæ** P. Henn. Bot. Jahrb. (1904) p. 598. 3071

— Maculis fuscidulis v. ferrugineis, gregariis v. sparsis, angulatis; soris hypophyllis sparsis v. aggregatis, rotundatis, pallide ferrugineis, epidermide fissa velatis; uredosporis ovoideis, ellipsoideis v. subglobosis, asperatis, hyalino-fuscidulis, sæpe pedicellatis, 15-23 \times 14-20, paraphysibus clavatis vel capitellatis, brunneis, 20-25 \times 10-12.

Hab. in foliis *Quercus myrsinifoliæ*, Mont. Takawo Musashi Japoniæ (KUSANO).

73. **Uredo Moraceæ** P. Henn., in Flore du Bas- et Moy.-Congo, in 3072

Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. III (1908) p. 224. — Maculis rotundatis effusis, rufo-brunneis v. subviolascentibus; soris hypophyllis gregariis, punctatis, epidermide flavidula tectis; uredosporis ellipsoideis vel ovoideis, aculeato-asperatis, hyalino-flavidulis, 18-25 \times 15-17.

Hab. in foliis *Moraceæ* sp., Dembo Congo, Afr. trop. (VANDERYST).

74. **Uredo Pouzolziæ** H. et P. Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 443. 3073

— Uredosoris hypophyllis, maculis flavescens indeterminate insidentibus, sparsis, minutis, rotundatis, epidermide diu tectis, ochraceis; uredosporis subglobosis v. sæpius ovatis aut elongatis, echinulatis, subhyalinis, 18-28 \times 10-16, episporio 2 $\mu.$ c. cr.

Hab. in foliis *Pouzolziæ pentandræ*, Nilgiri Hills Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

75. **Uredo Behnickiana** P. Henn. Hedw. XLIV (1905) pag. 169. — 3074

Maculis nullis; soris hypophyllis superficialibus, minutis, aggregato-effusis, aurantio-farinosus; sporis globosis, rarissime subovoideis, intus oleoso-guttulatis, aurantiis, 15-25 $\mu.$ diam.; episporio aculeato-verrucoso, 2 $\mu.$ cr.

Hab. in foliis vivis *Oncidii dasystelis* in horto Bot. Berolinensi culti.

76. **Uredo Anthurii** Hariot, Les Uredin. in Encyclop. scient. (1908) 3075

p. 308. — Soris amphigenis, sæpius epiphyllis, sparsis v. subconcentricis, hemisphæricis in macula orbiculari lata aurantio-flava utrinque conspicua; uredosporis globuloso-ellipsoideis, utrinque obtusis, membrana crassa, echinulata imprimis in parte superiori, flavis.

Hab. in foliis *Anthurii*, in horto Bot. Musei Parisiensis.

77. **Uredo assamensis** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 509. — Soris 3076
 uredosporiferis plerumque hypophyllis, maculis minutis oblongis
 brunneis insidentibus, sparsis vel hinc inde aggregatis, epidermide
 diutius tectis, cinnamomeis; uredosporis globosis vel subglobosis,
 aculeatis, flavo-brunneis, 20-28 μ . diam., episporio ca. 2 $\frac{1}{2}$ μ . cr.

Hab. in foliis *Floscopæ scandentis*, Kanaighat, Assam
 Indiæ orient. (E. J. BUTLER). — Ab *Ured. Floscopæ*, peruviana,
 diversa videtur.

78. **Uredo pedicellata** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) p. 279 3077
 — Soris hypophyllis v. bracteicolis, raro epiphyllis, minutis, rotun-
 datis, 60 μ . cr., flavo-brunneis, subepidermicis et prominulis; ure-
 dosporis globosis v. raro breviter ovoideis, 21-24 μ . diam., flavo-
 brunneis, minute aculeolatis, 2-3 poris germinativis æquatorialibus
 præditis; pedicello 35-48 μ . longo.

Hab. in foliis bracteisque *Commelinæ* varr. spec. in Buiten-
 zorg, Java.

79. **Uredo Geitonoplesii** Mac Alp, Rusts of Australia (1906) p. 203. 3078
 — Soris hypophyllis in maculis vinosis insidentibus, in parvos
 greges dispositis, minutis, ellipsoideis, sero erumpentibus; uredo-
 sporis flavidis v. flavo-brunneis, ellipsoideis v. ovoideis, minute
 echinulatis, 19-27 \approx 17-19.

Hab. in foliis *Geitonoplesii cymosi*, Victoria Australiæ.

80. **Uredo Schellhammeræ** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 203. 3079
 — Uredosoris epiphyllis, flavo-brunneis, rotundatis v. ellipsoideis,
 compactis, sparsis v. congregatis, quandoque confluentibus, mox
 nudis et epidermide rupta cinctis, $\frac{1}{2}$ mm. diam. v. usque ad 1 mm.
 longis; uredosporis flavo-auratis, ellipsoideis usque ad obovatis,
 minute echinulatis, poris germinativis plerumque binis præditis,
 22-26 \approx 15-20.

Hab. in foliis *Schellhammeræ undulatæ*, New South
 Wales Australiæ.

81. **Uredo davaoensis** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 31. — Uredo- 3080
 soris amphigenis, plus minusve sparsis, rotundatis, ca. $\frac{1}{2}$ -1 mm.
 diam., epidermide elevata diutius tectis, pulverulentis, cinnamo-
 meis; uredosporis globosis vel subglobosis, echinulatis, flavo-brun-
 neis, 17-25 μ . diam., episporio tenui.

Hab. in foliis *Cyanotidis* spec., Devao, ins. Philippin. (E.
 B. COPELAND).

82. **Uredo pulchra** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 508. — Uredosoris 3081

amphigenis, maculis decoloratis insidentibus, sparsis, oblongis, ca. $\frac{1}{3}$ - $\frac{3}{4}$ mm. longis, epidermide plumbea diutius tectis, cinnamomeis; uredosporis globosis vel subglobosis, echinulatis, brunneis, 21-30 μ . diam., episporio 3-4 μ . crasso.

Hab. in foliis Gladioli spec., Kumaon Himalaya (INAYAT, comm. E. J. BUTLER).

83. **Uredo Marantaceæ** P. Henn. in Flore du Bas- et Moy.-Congo, 3082
Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) pag. 92. — Maculis oblongo-rotundatis vel striiformiter confluentibus, fuscidulis; soris amphigenis, oblongis v. striiformibus, epidermide fissa velatis, ferrugineis; uredosporis subglobosis, ellipsoideis v. ovoideis, brunneo-fuscis, aculeatis, 20-40 \approx 20-30.

Hab. in foliis Marantaceæ sp., Kisantu, Sonso Congo, Afric. trop. (VANDERYST).

84. **Uredo philippinensis** Sydow, Ann. Mycol. IV (1906) pag. 32. — 3083
Uredosoris hypophyllis, sparsis, ellipsoideis, epidermide diutius tectis, usque ad 1 mm. longis, cinnamomeo-brunneis; uredosporis plerumque globosis v. subglobosis, minute breviterque echinulatis, flavo-brunneis, 12-18 μ . diam.

Hab. in foliis Cyperi polystachyi, Davao, ins. Pilippin. (E. B. COPELAND).

85. **Uredo Cyperi-tagetiformis** P. Henn. Bot. Jahrb. (1904) p. 598. — 3084
Maculis fuscidulis, effusis; soris hypophyllis, sparsis v. gregariis, minutis, rotundatis, ferrugineis, epidermide velatis; uredosporis subglobosis vel ellipsoideis vel ovoideis, fusco-brunneis, aculeato-verrucosis, 25-37 \approx 20-28.

Hab. in foliis Cyperi tagetiformis, Kamodamura Tosa Japoniæ (YOSHINAGA).

86. **Uredo Dichromenæ** Arth., Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIII (1906) 3085
p. 31. — Uredosoris hypophyllis, sparsis, oblongis, 0,2-0,5 mm. long., epidermide bullata tectis, cingulo hypharum distincto præditis; uredosporis ellipsoideis vel late ovoideis, 22-35 \approx 18-23, tunica flavida, 1,5-2 μ . cr., sparse echinulata, poris germinativis indistinctis.

Hab. in foliis Dichromenæ ciliatæ et D. radicans, Jamaica, Porto Rico, Amer. centr.

87. **Uredo Rhynchosporæ** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, 3086
Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) pag. 94. — Maculis rotundatis v. effusis, fuscidulis; soris hypophyllis, oblongis vel confluentibus, epidermide fuscidula tectis; uredosporis subglo-

bosis, ovoideis v. ellipsoideis, flavido-brunneis, echinatis, 15-23 v. 14-20.

Hab. in foliis *Rhynchosporæ* sp., Kisantu Congo Afr. trop. (VANDERYST).

88. **Uredo Lipocarphæ** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 509. — Uredosporis amphigenis, maculis minutis brunneis insidentibus, sparsis vel hinc inde aggregatis, oblongis, minutis, epidermide diutius tectis, cinnamomeis; uredosporis globosis, subglobosis vel ellipsoideis, subtiliter echinulatis, brunneis, 17-24 v. 14-20, episporio ca. 2½-3 µ. crasso.

Hab. in foliis *Lipocarphæ sphacelatæ*, Yelval, Mysore, Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

89. **Uredo Scirpi-nodosi** Mac Alp., Rusts of Australia (1906) p. 202, tab. XXVIII, fig. 241. — Soris bullatis, elongatis, lineariter dispositis, erumpentibus, 1,5-2 mm. long.; uredosporis brunneis, subglobosis, ellipsoideis v. oblongis, magnitudine variabilibus, 25-32 µ. diam. v. 27-36 v. 19-25, episporio echinulato, usque ad 3 µ. cr.

Hab. in *Scirpo nodoso*, Victoria Australiae.

90. **Uredo Kyllingiae-brevifoliae** Diet., in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1905) p. 591. — Soris hypophyllis, minutis, maculis purpureis insidentibus, diu tectis; uredosporis ovoideis, ellipsoideis v. oblongis, 20-33 v. 15-22, episporio echinulato vestitis.

Hab. in foliis *Kyllingiae brevifoliae*, Kochi Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA).

91. **Uredo Yoshinagai** Diet., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 109. — Soris amphigenis minutis, oblongis, epidermide straminea fissa semivelatis, albidis (in sicco); sporis obovatis v. ellipsoideis, 29-38 v. 19-28, episporio hyalino, apice usque ad 13 µ. crasso, echinulato.

Hab. in foliis *Arundinellæ anomalæ*, Akatomachi, Tosa Japoniæ (YOSHINAGA).

92. **Uredo Nakanishikii** P. Henn., Engl. Jahrb. XXXVII (1905) p. 158. — Maculis plerumque striiformibus, subferrugineis; soris hypophyllis, sparsis v. aggregatis, interdum striiformi-confluentibus v. oblongis, pulvinatis, epidermide pallida tectis dein erumpentibus, subferrugineis; sporis globosis, raro ovoideis v. ellipsoideis, 18-22 v. 15-20, episporio brunneo vel castaneo, minute verrucoso.

Hab. in foliis *Arundinellæ anomalæ*, Wakayama Japoniæ (NAKANISHIKI).

93. **Uredo inflexa** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. Univ. 3092 III (1909) p. 247, tab. XII, fig. 12. — Uredosoris hypophyllis, minutis, rotundatis v. oblongis, in maculis decoloratis sparsis vel subgregariis, subinde confluentibus, nudatis, pulverulentis, brunneo-flavis; uredosporis late ellipsoideis, subglobosis v. piriformibus 28-40 \times 20-26; paraphysibus numerosis, curvatis, clavatis, late flavidis, 40-45 \times 5-9.

Hab. in foliis *Sasæ* spec., in Japonia.

94. **Uredo Isachnes** H. et P. Sydow, Ann. Mycol. IV (1906) p. 424. 3093 — Uredosoris plerumque epiphyllis, sparsis, minutis, oblongis, epidermide fissa cinctis vel semitectis, pulverulentis, dilute ferrugineo-brunneis; uredosporis globosis, subglobosis, ovatis vel ellipsoideis, subtiliter echinulatis, dilute brunneis, 21-35 \times 18-25, episporio ca. 2 μ . crasso.

Hab. in foliis *Panici Isachnes*, Poona Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

95. **Uredo ignobilis** H. et P. Syd., Ann. Mycol. IV (1906) p. 444. — 3094 Uredosoris hypophyllis, sparsis vel aggregatis, minutissimis, pulverulentis, ochraceis; uredosporis globosis, subglobosis vel ovatis, subtiliter echinulatis, flavo-brunneis, 18-27 \times 17-25, episporio ca. 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso.

Hab. in foliis *Sporoboli diandri*, Pusa Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

96. **Uredo jozankensis** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. Univ. III (1909) p. 245, tab. XII, fig. 10. — 3095 Uredosoris hypophyllis, minutissimis, oblongis v. ellipsoideis, in maculis atro-brunneis sparsis, non confluentibus, rarius seriatis, diu epidermide tectis, dein nudatis et pulverulentis, aurantiacis; uredosporis globosis, subglobosis v. piriformibus, echinulatis, 15-20 \times 14-17, poris germinativis inconspicuis, episporio flavo; paraphysibus clavatis, apice leviter incrassatis (2-3 μ .), ochraceo-flavis, 28-40 \times 9-14.

Hab. in foliis *Melicæ nutantis* in Japonia. — A *Pucc. Melicæ* (uredo) præsertim differt præsentia paraphysium.

97. **Uredo Ischæmi** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 509. — 3096 Uredosoris amphigenis, sparsis, minutis, oblongis, diu tectis, albo-flavis; uredosporis globosis, subglobosis v. ovatis, echinulatis, hyalino-flavidis, 15-20 \times 12-16, episporio tenui, 1-1 $\frac{1}{2}$ μ . circiter crasso.

Hab. in foliis *Ischæmi timorensis*, Chittagong (R. SEN, comm. E. J. BUTLER). — Ab *Uromycete Vossicæ* diversa.

98. **Uredo operta** Syd. et Butl., Ann. Mycol. V (1907) p. 509. — 3097

Uredosoris amphigenis, sparsis, minutissimis, diu tectis, stramineis; uredosporis subglobosis, ellipsoideis vel ovatis, flavo-brunneis, apice incrassatis (ca. 2-4 μ .) et obscurioribus, præcipue ad apicem aculeatis, 22-36 \approx 18-28; paraphysibus capitatis, subhyalinis, curvulis.

Hab. in foliis Coicis Lacrymæ-Jobi, Wynaad, Malabar, Indiæ or. (E. J. BUTLER).

99. **Uredo Panici-prostrati** H. et P. Syd., Ann. Mycol. IV (1906) 3098

p. 444. — Uredosoris amphigenis, sparsis, minutis, rotundatis v. oblongis, epidermide fissa cinctis, pulverulentis, brunneis; uredosporis globosis, subglobosis vel ovatis, subtiliter echinulatis, brunneis, 20-28 \approx 18-15, episporio ca. 2 μ . crasso.

Hab. in foliis Panici prostrati, in collibus Nilgiri Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

100. **Uredo Paspali-scrobiculati** H. et P. Syd., Ann. Myc. IV (1906) 3099

p. 444. — Uredosoris plerumque epiphyllis, sparsis, minutis, rotundatis vel oblongis, epidermide diutius tectis, ca. $\frac{1}{2}$ mm. longis, brunneis; uredosporis globosis, subglobosis vel late ellipsoideis, echinulatis, maturis tandem amœne castaneo-brunneis, 26-40 \approx 24-28, episporio ca. 2 μ . crasso.

Hab. in foliis Paspali scrobiculati, Kanaighat, Sylhet, Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

101. **Uredo Polliniæ-imberbis** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Im- 3100

per. Univ., III (1909) pag. 246, tab. XII, fig. 11. — Uredosoris hypophyllis, minutis, rotundatis v. oblongis in maculis brunneis, sparsis v. gregariis subinde confluentibus, nudatis, pulverulentis, inconspicuis, aurantiis; uredosporis globosis, subglobosis v. piriformibus, dense echinulatis, flavis v. flavo-brunneis, 20-26 \approx 16-24; episporio tenui, poris germinativis 5-9 raro 11, irregulariter positus; paraphysibus numerosis, irregularibus, apice incrassatis (6-8 μ .), 30-40 \approx 10-14, læte flavis.

Hab. in foliis Polliniæ imberbis var. Willdenowianæ in Japonia.

102. **Uredo Sclerochloæ** P. Hariot, Les Uredin. in Encyclop. Scient. 3101

(1908) p. 310. — Soris parvis, amphigenis, longitudinaliter dispositis, sparsis v. congregatis, quandoque confluentibus, flavidis; uredosporis subglobosis v. sphæroideis, minute verruculosi, 20-24 \approx 18-20 pallide flavis, tunica crassa, poris germinativis indistinctis; paraphysibus nullis.

Hab. in foliis *Sclerochloæ duræ*, Puy-de-Dôme prope Clermont-Ferrand Galliæ.

103. **Uredo Stenotaphri** Syd, Ann. Mycol. VII (1909) pag. 544. — 3102

Uredosoris sparsis v. lineatim dispositis, sine maculis, ellipticis v. oblongis, minutis, usque ad 0,5 mm. longis, epidermide fissa cinctis, mox nudis, pulverulentis, ferrugineis; uredosporis subglobosis, ellipsoideis v. ovatis, aculeatis, brunneis, 26-38 × 22-28, episporio c. 1,5-2 μ . cr.

Hab. in foliis *Stenotaphri glabri* in Africa or. lusitanica (C. W. HOWARD).

104. **Uredo Themedæ** Diet., Ann. Mycol. VI (1908) p. 228. — Ma- 3103

culis indeterminatis flavidulis; soris amphigenis oblongis vel linearibus, epidermide rubiginosa tectis, uredosporis late ellipsoideis, usque ad 34 μ . longis et 30 μ . latis, episporio crassissimo inæquali verrucoso incolorato vestitis.

Hab. in foliis *Themedæ Forskalii* var. *japonicæ*, Tosa Japoniæ (T. YOSHINAGA).

105. **Uredo kerguelensis** P. Henn, Deutsche Südpolar-Exped., Bd. 3104

VIII (1906) Extr. p. 4. — Maculis flavidis; soris ellipsoideo-pulvinatis, sparsis, epidermide tectis, dein erumpentibus, flavo-fuscidulis; paraphysibus clavatis v. capitulatis, hyalino-fuscidulis, 40-80 × 10-18; uredosporis ellipsoideis, ovoideis vel subglobosis, 18-26 × 15-20, episporio flavo-fuscidulo, granulato-aculeato.

Hab. in foliis *Festucæ kerguelensis*, socia *Leptosphaeria kerguelensi* P. Henn., in insulis Kerguelen in mari polari australi (E. WERTH).

106. **Uredo anthoxanthina** Bubák, Ann. mycol. III (1905) p. 223. — 3105

Uredosoris in maculis rubellis epiphyllis, elliptico-oblongis, sparsis v. gregariis, subinde confluentibus, mox nudis, pulveraceis, aurantiacis; uredosporis globoso-ovoideis, 18-26 × 16-20, contentu aurantiaco; poris numerosis (6-8); paraphysibus copiosis, curvulis, clavatis v. capitatis, usque ad 60 μ . longis, supra 10-15 μ . cr., dilute flavidis, crasse tunicatis intermixtis.

Hab. in foliis *Anthoxanthi odorati* in pratis, Riesengebirge Germaniæ (KABÁT) et in Helvetia (FISCHER).

107. **Uredo Spartinae-strictæ** Pat. et Har. Bull. Soc. mycol. Fr. (1905) 3106

p. 84. — Soris epiphyllis longe linearibus, usque ad 1 cm., pallide fulvis, epidermide fissa marginatis; uredosporis ovoideis vel subglobosis melleis, minute verrucosis, poris 2-3 subæquatorialibus, tunica 3 μ . cr., 26-32 × 20-24, pedicello hyalino brevi suffultis.

Hab. in foliis *Spartinæ strictæ* pr. La Croisic in sinu Le Trait Galliae boreali-occid. (MÉNIER).

108. **Uredo andropogonicola** Speg., An. Mus. Nac. B. Aires t. XIX 3107 (1909) p. 315. — Maculis nullis v. obsoletis fuscescentibus; soris hypophyllis, linearibus, 0,5-1,5 mm. long., 0,2-0,3 mm. cr., fuscis, erumpentibus, subcompactiusculis; uredosporis obovatis, 25-30 \approx 18-20, episporio sursum modice incrassato papilloso vestitis, sæpius continuis sed non raro ad tertium inferum septatis, rarissime septis duobus divisis, endoplasmate non v. grosse 1-guttulato foetis, ad marginem acervulorum fere semper paraphysibus capitato-clavulatis, 30-50 \approx 15-18, e hyalino fulvis obvallatis.

Hab. in foliis vivis *Andropogonis condensati* pr. Tucumán Amer. austr. — An *Pucc. andropogonicolæ* Speg. status mesosporicus?

109. **Uredo Andropogonis-hirti** R. Maire, Bull. trim. Soc. Mycol. de France, vol. XXI (1905) p. 162, cum icone. — Uredosoris sæpius hypophyllis, maculis minutis brunneis insidentibus, sparsis v. aggregatis confluentibusque, oblongis v. elongatis, cinnamomeis, paraphysatis; uredosporis subglobosis v. ellipsoideis v. piriformibus, sparse verrucosis, brunneis, 25-32 \approx 20-26, poris 6-7 irregulariter sparsis; episporio 1,5-2 μ . cr., paraphysibus intermixtis claviformibus rectis v. curvatis, 30-42 \approx 11-13 (apice), primo hyalinis dein brunneis, membrana crassissima instructis.

Hab. in foliis *Andropogonis hirti* prope Olympiam Elis Græciæ, nec non *Andropogonis pubescentis* pr. Hyères Galloprovinciæ.

110. **Uredo Eriochloæ** Syd., Ann. Mycol. IV (1906) pag. 444. — 3109 Uredosoris amphigenis, sparsis, rotundatis vel oblongis, minutissimis, $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ mm. longis, epidermide diutius tectis, flavo-brunneis; uredosporis forma et magnitudine variabilibus, subglobosis, piriformibus, ovatis vel oblongis, sæpe angulatis, laxè aculeatis, brunneis, 24-33 \approx 20-28, episporio ca. 1 $\frac{1}{2}$ μ . crasso.

Hab. in foliis *Eriochloæ polystachyæ*, Burhagah, Saran Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

111. **Uredo eriochloana** Sacc. et Trott., *Uredo Eriochloæ* Spegazzini, 3110 An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX (1909) p. 819, non Syd. — Maculis amphigenis irregularibus, parvis sed copiosis, confluentibus, pallescentibus; soris sparsis v. laxè seriatis, suborbicularibus, 250-400 μ . diam., sæpius epiphyllis, epidermide disrupta cinctis, subpulverulentis, pallide ferrugineis; uredosporis ovatis vel globosis,

tunica dense papillulosa vestitis, 25-30 \approx 20-24, flavidis, non vel grosse 1-guttulatis.

Hab. in foliis vivis *Eriochloæ* annulatæ in uliginosis Iibcuy Argentinæ Amer. austr.

112. **Uredo cenchrophila** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 3111 (1909) pag. 316. — Maculis pallescentibus indeterminatis sæpius confluentibus; soris hypophyllis, elliptico-linearibus, 0,5-1 mm. long., 0,25-0,40 mm. cr., sæpe lineatis, diu epidermide tumefacta tectis, serius operculatim v. rimose dehiscentibus, subpulverulentis, testaceis; uredosporis globosis v. obovatis, 35-40 \approx 30-35, episporio crassissimo laxè minuteque papilluloso vestitis, ferrugineis, endoplasmate nubiloso grosse 1-guttulato repletis.

Hab. in foliis vaginisque *Cenchri* myosuroidis in pratis circa Tucumán Amer. austr.

113. **Uredo cenchricola** P. Henn. in Fl. du Bas- et Moy.-Congo, in 3112 Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. III (1908) p. 223. — Maculis effusis, fuscidulis; soris sparse gregariis, hypophyllis, minutis, oblongis v. rotundatis, ferrugineis, epidermide tectis; uredosporis ovoideis v. ellipsoideis, brunneis, aculeatis, 28-38 \approx 18-25.

Hab. in foliis *Cenchri* sp, Dolo, Congo Africæ trop. (VANDERYST).

114. **Uredo Coleanthi** P. Hariot, Les Urédin. in Encycl. Scient. 3113 (1908) pag. 310. — Soris minutis sparsis v. confluentibus, flavo-ferrugineis; uredosporis flavidis, subglobosis, ovoideis v. ellipsoideis, 24-32 \approx 12-20, minute echinulatis, tunica crassa 2-3 poris germinativis prædita.

Hab. in vaginis *Coleanthi* subtilis in stagno Hardouinais prope Merdvignac Côte-du-Nord, Gallia (F. CAMUS).

115. **Uredo Bromi-pauciflori** S. Ito, Journ. Coll. Agric. Tohoku Imper. 3114 Univ. III (1909) pag. 246, tab. XII, fig. 13. — Uredosoris epiphyllis minutis, oblongis vel sublinearibus, sparsis vel gregariis, sæpe confluentibus, nudatis, pulverulentis, brunneo-flavis; uredosporis globosis v. late ellipsoideis, echinulatis, flavis v. brunneo-flavis, 20-32 \approx 20-28, episporio tenui, poris germinativis 6-8 raro 10; paraphysibus numerosis, clavatis, hyalinis, apice non incrassatis, 44-86 \approx 14-22.

Hab. in foliis *Bromi* pauciflori in Japonia. — A *Pucc. coronata* (uredo) poris germinativis pluribus differt.

116. **Uredo Arthraxonis-ciliaris** P. Henn., Hedwigia XLVII (1908) 3115 pag. 251. — Maculis flavidis oblongis effusis; uredosoris hypo-

phyllis, oblongis, interdum striiformibus, flavo-brunneolis, epidermide pallida fissa velatis; uredosporis subglobosis vel ellipsoideis interdum ovoideis, flavo-brunneis, minute aculeatis, 16-25 \times 10-22, paraphysibus clavatis, flavido-brunneis, sæpe curvulis, 30-60 \times 10-30.

Hab. in foliis *Arthraxonis ciliaris*, Luzon, Prov. Benguet, Kabayon insul. Philipp. (MERRILL).

117. **Uredo Ophiuri** Syd. et Butl., Ann. Mycol. IV (1906) p. 445 — 3116

Uredosoris hypophyllis, maculis nullis v. indeterminatis insidentibus, minutis, punctiformibus, epidermide diu tectis, brunneolis; uredosporis globosis, subglobosis v. ellipsoideis, subtiliter echinulatis, brunneis, 22-40 \times 20-30; episporio 1,5 μ . cr.

Hab. in foliis *Ophiuri corymbosi*, Dehra Dun Indiæ orient. (E. J. BUTLER).

118. **Uredo Airæ-flexuosæ** Liro in Uredineæ Fennicæ (1908) p. 573. 3117

— Soris uredosporiferis hypophyllis; uredosporis globosis, minute verruculosis, episporio 2 μ . crasso.

Hab. in foliis *Airæ flexuosæ* in Fennia.

119. **Uredo Holwayi** Arth., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIII (1906) 3118

p. 518. — Pycnidiis hypophyllis, numerosis, sparsis, inconspicuis, subcuticularibus, pallido-flavis, dein brunneis, subcolumnaribus, 80-112 μ . lat., 40-70 μ . altis; uredosoris e mycelio limitato orientibus, hypophyllis, in duplicem seriem, in maculis flavidis plus minusve extensis dispositis, subepidermicis, rotundatis v. ovatis, 0,1-0,3 mm. lat., brunneo-flavis, poro parvo centrali dehiscentibus; peridio hemisphærico, hyphis adpressis, supra liberis formato; uredosporis pedicellatis, late ellipsoideis v. obovatis, 21-26 \times 15-19, tunica subhyalina, 1,5-2,5 μ . cr., grosse echinulata, supra levi; poris germinativis inconspicuis, contenu flavo-aurantiaco.

Hab. in foliis *Tsugæ Mertensianæ*, Glacier, British Columbia Amer. bor. (E. W. D. HOLWAY).

120. **Uredo vogesiaca** (Syd.) Sacc. et Trott, *Milesina vogesiaca* Syd., 3119

Ann. Mycol. VIII (1910) p. 491, Myc. Germ. n. 878. -- Uredosoris hypophyllis, plus minusve dense sparsis, subepidermicis, minutis, rotundatis, pustuliformibus, primo flavidis, dein brunneolis, postremo centro poro apertis et uredosporas in cirros albidos expellentibus; uredosporis ellipsoideis, ovatis v. oblongis, levibus, hyalinis, 20-40 \times 15-22, raro usque ad 50 μ . long., poris germinativis nullis; teleutosporis paucis tantum visis et ægre perspiciendis, pluricellularibus, ut videtur, et intracellularibus.

Hab. in frondibus *Aspidii lobati* prope Fischboedle regionis montis Hohneck Vogesorum Germaniæ. — Donec teleutosporæ genuinæ innotescant ad interim ut *Uredo* habetur.

121. **Uredo orientalis** Raciborski, Bull. Acad. Sc. Cracovie (1909) 3120 p. 279. — Uredosoris amphigenis subepidermicis, ad nervos plerumque congregatis, mox crebre confertis, 45-200 μ . diam., diu epidermide tectis, dein erumpentibus; pseudoperidio et paraphysibus nullis; uredosporis breviter pedicellatis, globosis v. ovoideoangulatis, crasse tunicatis, levibus, poris germinativis nullis, contentu aurantiaco, 22-28 \times 17-22, apice subrotundatis.

Hab. in foliis deformatis *Blechni orientalis* prope Buitenzorg in ins Java.

122. **Uredo Murariæ** P. Magn., Ber. Deutsch. bot. Gesellsch. XX (1902) 3121 p. 611. — Pseudoperidiis minute cellulosis, plerumque sub foliorum stomatibus nidulantibus, poro apertis, demum latius dehiscens; cellulis pseudoperidii inordinate (non seriatim) dispositis; cetera ut uredo *Melampsorellæ Feurichii*.

Hab. in foliis *Asplenii Rutæ-murariæ* in Germania (MAGNUS, DIEDICKE). — Status verisimiliter *Melampsorellæ* speciei.

123. **Uredo mebelensis** P. Henn., in Flore du Bas- et Moy.-Congo, 3122 Ann. Mus. du Congo, v. II, fasc. II (1907) pag. 94. — Maculis sparsis, rotundatis, flavo-brunneis; soris hypophyllis rotundatoaggregatis, flavido-farinosis; uredosporis subglobosis, echinatis, hyalinis, flavidulis, 18-22 μ . diam.

Hab. in foliis indeterminatis, Mbela Congo Afric. trop. (VANDERYST).

124. **Uredo inquirenda** Arth., Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) 3123 p. 592. — Uredosoris amphigenis, in greges circinatim dispositis, sparsis, rotundatis, 0,5 mm. lat., subepidermicis, mox nudis, obscure cinnamomeo-brunneis, pulverulentis; uredosporis ovoideis v. obovatis, 28-36 \times 18-23, tunica cinnamomeo-brunnea, subtenui, 1-1,5 μ . cr., apice paullo crassiori 1,5-2,5 μ ., æqualiter et crasse echinulata, poris 8, in 2 zonas distributis; pedicello plus minusve persistenti, angusto, sporam æquante vel ea longiore; paraphysibus nullis.

Hab. in foliis plantæ indeterminatæ « Washington Vine » dictæ, Auburn Alabama Amer. bor. (GEO. F. ATKINSON).

125. **Uredo cupulata** Ell. et Ev. in Millsp. Field Columb. Mus. II, 3124 n. 1 (1900) p. 16, tab. LIV. — Maculis rubido-brunneis, irregularibus, 3-5 mm. diam.; soris amphigenis, approximatis, inferne

copiosioribus, pro more ellipticis, tunica (epidermica?) mox dehiscente inclusis et tunc cupuliformibus, (pezizoideis); uredosporis ellipsoideis v. ovoideis 16-22 \approx 12-20 v. globosis 16-20 μ . diam., pallide flavis, parce paraphysatis, episporio tuberculato-echinulato.

Hab. in foliis plantæ non indicatæ, in ins. Antillis. — Verisimiliter matrix et locus specialis lapsu prætermissa. — Tabula non adest in meo exemplari.

Uredinis species omnino dubiæ, citatæ in Syll. XX, p. 1065, sunt sequentes: **Uredo conglutinata** H. Karst. — **U. globoso-fusca** Bon.

Genus verisimiliter excludendum.

MAPEA Pat., Bull. Soc. Myc. France XXII (1906) p. 46 (Etym. a *mape* nom. vulg. *Inocarpus edulis*). — Sori erumpentes, applanati, orbiculares, lati, ceracei, radiatim plicati, ambitu sinuoso-lobati, undique fertiles. Sporæ (uredosporæ?) ovoideæ, fusciculæ, verruculosæ, stipitatæ. — Teste cl. v. Höhnel, Fragm. myc. VII Mitteil. 1909, genus hoc nil esset nisi *Marasmius* quidam abortivus; illud tamen ob singularitatem formæ retulimus; sporæ essent conidia, ut revera occurrunt non raro in pilei superficie *Marasmii*.

1. **Mapea radiata** Pat., l. c. p. 46. — Soris sparsis v. approximatis, 3125 5-7 mm. diam., ceraceis, ochraceis, plicatis, epidermide lacerata cinctis; sporis globoso-ovoideis, pallide fulvis, verruculosis 16-18 \approx 10-12, crassiuscule tunicatis; pedicellis filiformibus, 20-25 μ . longis e stromate pseudoparenchymatico, hyalino oriundis.

Hab. in fructibus *Inocarpus edulis*, Roruru Polynesiae gallicæ.

PHYCOMYCETÆ De Bary (*)

Syll. VII p. 181, IX p. 335, XI p. 239, XIV p. 432, XVI p. 383, XVII p. 494.

Fam. 1. Mucoraceæ NEES em. DE BARY.

MUCOR Mich. — Syll. VII p. 190, IX p. 335, XI p. 239, XIV p. 432, XVI p. 383, XVII p. 494.

1. **Mucor corticola** Hagem, Ann. Mycol. VIII (1910) p. 277, fig. 8. 3126
— Cæspitulis griseis v. griseo-cyaneis; sporangiophoris erectis, usque ad 2 cm. alt., sympodialiter parce ramosis, ramis lateralibus 600-1500 \approx 10-15, sæpius inflexis, sporangio terminatis; sporangiis globosis 50-60 μ . diam., tunica facile decidua; columella ovoidea, 30-36 \approx 27-33, hyalina; sporis ovoideis v. ellipsoideis, 5-7 \approx 3,5-5; zygosporis ignotis.

Hab. in cortice putri, rarius ligno Coniferarum et ad terram in Dania.

2. **Mucor sphærosporus** Hagem, Vidensk. Selsk. Skrift. I, n. 7 (1907) 3127 p. 22, fig. 4, Lendner Mucor. de la Suisse (1908) p. 92. — Coloniis flavo-brunneis v. brunneis; hyphis sporangiferis altitudine variabilibus 1-2 mm. v. usque ad 10 mm. long., monopodialiter ramosis (v. sympodialibus et corymbosis sec. Lendner); sporangiis globosis 60-90 μ . diam., flavo-brunneis et membrana diffluenti præditis; columellis ovoideis basi attenuatis 40-65 \approx 30-55, tunica plerumque pallide flavo-brunnea, crassa; sporis subglobosis, magnitudine variabilibus, 3,5-7,5 μ . diam., plus minusve flavescentibus; chlamydosporis et oidiosporis numerosis; zygosporis ignotis.

(*) De Phycomycetis conferenda sunt imprimis opera recentiora egregia coll. E. J. BUTLERI, H. E. PETERSEN et v. MINDEN (Chytridiaceæ) nec non O. HAGEN et A. LENDNER (Mucoraceæ).

Hab. ad terram humosam et in mycorrhizis *Pini montanæ*, rarissima species, Scandinavia.

3. **Mucor lausoniensis** Lendner, *Mucor de la Suisse* (1908) p. 75 et 1328
Bull. Herb. Boiss. t. VIII (1908) n. 1. — Sporangiphoris erectis, parce ramosis, lateraliter subracemosis 5-10 mm. long., 10-14 μ . lat.; sporangiis 40-45 μ diam., basi sæpe applanatis, in aqua non dissilientibus; columellis ovoideis v. sphaeroideis, 30 μ . diam. vel 50 \times 40; sporis ovoideis magnitudine variabilibus 4 \times 2 usque ad 12 \times 6, plerumque 8 \times 6, hyalinis, in massa flavescentibus; chlamydosporis raris, in mycelio v. in sporangiophoris orientibus, 16 \times 14, levibus, intus granulosis; zygosporis ignotis.

Hab. in Agaricineo putri prope Lausanium (Lausanne) Helvetiæ.

4. **Mucor rigidus** M. Léger, *Rech. struct. Mucorinées, Poitiers* (1896) 3129
 pag. 71, t. X, f. 64. — Mycelio ramoso; sporangiophoris erectis, rigidulis, usque ad 6 cm. altis, initio apice vesicula (sporangio) flava terminatis; sporangiis dein brunneis, usque ad 600 μ . diam.; sporis et columella ut in *M. Mucedine*; zygosporis et chlamydosporis nullis visis.

Hab. in *Hirneola Auricula-Judæ* sub vitro, in Gallia. — Præsertim magnitudine minore a *Mucore Mucedine* dignoscitur.

5. **Mucor rubescens** M. Léger *Rech. struct. Mucorinées, Poitiers* (1896) 3130
 p. 69, t. X, f. 58-63. — Mycelio ramoso, *M. Mucedinis* ad instar, hinc inde sporangiophora valde ramosa emittente; sporangiis sphaericis in ramis acrogenis, 200 μ . diam., ob sporas inclusas rubescentibus; sporis ovoideis 5-6 μ . longis, coacervatis rubris; zygosporis copiosis, minutis, globosis, 60-80 μ . diam., episporio nigricante, verruculoso.

Hab. in musto cerevisiæ exsiccato in Gallia. — Imprimis colore rubente sporarum dignoscenda species.

6. **Mucor Rouxii** (Calm.) Wehmer, *Ctrbl. Bakt.* VI (1900) p. 364 Len- 3131
 dner *Mucor. Suisse*, p. 96 (*Rouxianus*). — Cæspitulis laxis, rubroaurantiis; sporangiophoris minutis, 1 mm. alt. 7-14 μ . cr., rectiusculis, ramosis, raro simplicibus, 2-3 sporangia gerentibus; sporangiis subglobosis, 50 μ . diam., levibus, flavidis, diaphanis; columella libera, globoso-depressa, 23 \times 20 ad 32 \times 28, levi, hyalina; sporis oblongis, rarius subrotundis, levibus, nitidis, 5 \times 2,8, diaphanis, contentu heterogeneo, subcontracto; chlamydosporis copiosis, magnitudine ludibundis, 12-100 μ . diam., flavidis v. brunneolis, tunica levi, usque ad 7 μ . cr.; zygosporis ignotis.

Hab. in fermento sinensi pro fermentatione *Oryzæ* in China, Gallia, alibique. Cfr. Syll. XI, p. 242.

7. **Mucor javanicus** Wehmer, in Centralbl. f. Bakt. 2 Abt. VI (1900) 3132 p. 610. — Sporangiphoris cæspites densos, 2-3 cm. altos, formantibus, griseo-flavidis, erectis, sympodice ramosis, usque ad 6 sporangia ferentibus, ad 1 cm alt., 10 μ . cr.; sporangiis flavidis v. brunneolis, minutis, sphaericis, levibus, rarius echinulatis, inferioribus 50-100 μ . diam., super. vix 18 μ . diam.; columellis sphaericis v. ovoideis, inferior 35, superior 10 μ . diam. levibus, diaphanis; sporis hyalinis sphaericis v. ovoideis, 5-7 \approx 4-5 vel 4-7 μ . diam.; chlamydo-sporis diaphanis, luteolis, in mycelio orientibus; hyphis 12-14 μ . diam.

Hab. in fermento sinensi et javanico Ragi dicto.

8. **Mucor spinescens** Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) pag. 89, 3133 fig. 31; Bull. Herb. Boiss. t. VIII (1908) p. 79. — Hyphis sporangiferis ramosis, raro simplicibus, apice attenuatis, 1 mm. alt., 10 μ . latis, ramis alternis brevibus recurvatis; sporangiis globosis 60-64-68 μ . diam.; sporis sphaeroideis, hyalinis, flavescentibus, 7-8 μ . diam., raro 5-6 μ .; columellis ovoideis v. piriformibus v. elongatis, apice sæpe cornutis.

Hab. in nucibus Brasiliæ dictis, Helvetia. — *M. Janseni* et *M. plumbeo* affinis.

9. **Mucor Regnieri** Lucet et Cost. in Arch. de Paras. IV (1901) p. 362 3134 c. ic., Guég. Champ. paras. p. 29, t. II, f. 4, *Lichtheimia Regnieri* Luc. et Cost. C. R. Ac. Sc. (1903) p. 515. — Mycelio griseo-brunneolo pallido; hyphis sporangiferis corymboso-ramosis v. subumbellatis; pedicellis sursum inflatis et sub sporangio coarctatis; sporangiis globulosis, 30-38 μ . diam., griseolis, cum collario basilaris obsoleto diffluis; columella ovoideo-piriformi v. trochiformi, pallide brunnea æque ac pedicelli apice, 23-35 \approx 11; sporis pro more sphaericis, hyalinis, 2,5-3,7 μ . diam. v. ovoideis 4-8 \approx 3, subinde polyedricis; zygosporis ignotis.

Hab. saprophytice in cute vulnerata porriginosa equi in Gallia. — Cuniculis inoculata valde pathogena species.

10. **Mucor Truchisi** Luc. et Cost., in Arch. de Parasitol. IV (1901) 3135 p. 362, Guéguen Champ. par. d. homme, p. 30, f. 5. — Cæspitulis pallide griseis; sporangiphoris ramosis, in formam corymbi v. umbellæ digestis, radiis inæqualibus; pedicellis sub columella coarctatis; sporangiis sphaericis, membrana hyalina, levi præditis, 35 μ . diam., diffluentibus sed collarium distinctum relinquentibus;

columella piriformi plerumque 25 μ . diam.; sporis ovoideis v. suboblongis, hyalinis, 4 \approx 2,5, subinde paullo minoribus v. usque 4,5 \approx 3; zygosporis ignotis.

Hab. saprophytice in cute porriginosa equi in Gallia. — Cuniculis inoculatus vere pathogenus.

11. **Mucor pirelloides** Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) pag. 83, 3136 fig. 28 et Bull. Herb. Boiss. t. VIII (1908) pag. 199. — Hyphis sporangiferis erectis, basi ramosis, 35 mm. alt., 30 μ . latis; sporangiis terminalibus sphæroideis, in aqua dissilientibus, 70-150 μ . diam.; columellis ovoideis v. piriformibus v. panduriformibus, 52 \approx 42; ramulis ramosis, spiraliter in apice recurvatis, sporangiolo piriformi terminatis 100 \approx 60; sporis ellipsoideis, hyalinis, 10 \approx 6.

Hab. in fimo equino, cobayno et cuniculino, Helvetia.

12. **Mucor tenuis** Bainier, in Ann. Sc. nat. XV (1883) p. 353, t. XIX, 3137 fig. 1-17, non Link, qui forte pertinet ad *M. piriformem*. — Ab affini *M. racemoso* differt sporangiophoris sæpius simplicibus; zygosporis pro more ut azygosporis evolutis; his ad ramulos e substrato erecte surgentes recemose digestis et pedicello brevi suffultis, in quoque sporangiophoro 5-12, globosis, brunneo-rubris, verruculis spinulosis brevibus conspersis; gemmis (chlamydosporis) vix perspicue spinulosis.

Hab. in fimo equino in Gallia.

13. **Mucor Praini** Chod. et Nechitsch, Inst. bot. Univ. Genève (1904) 3138 fasc. V c. ic., Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) p. 98, fig. 35. — Hyphis sporangiferis ramosis, cultis usque ad 4 cm. long., sympodialibus; sporangis globosis, levibus, subpellucidis, e flavo brunneis, 35 μ . diam. v. usque ad 70-90 μ .; sporis ellipsoideis v. subsphæroideis, levibus, hyalinis, 10 \approx 6-8 vel 4 \approx 3; columellis nunc sphæroideis, nunc subelongatis vel abbreviatis, hyalinis levibus, 54 \approx 54 v. 20-25 μ . diam.; chlamydosporis hyalinis, tunica crassa præditis, levibus, forma variabilibus, usque ad 24 μ . diam.; oidiosporis forma variabilibus, 10-40 μ . cr.; zygosporis ignotis.

Hab. in substantiis organicis, Sikkim et cultus Genève.

14. **Mucor strictus** Hagem, Vidensk. Selsk. Skrift. I, n. 7 (1907) 3139 p. 18, fig. 1; Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) p. 97. — Hyphis sporangiferis erectis, 1-4 cm. alt., 25-40 μ . latis, confertis, simplicibus v. ramosis sympodialibus; sporangiis albis dein nigris 200-300 μ . diam., minute aculeolatis, tunica sæpe diffluenti; columella plerumque ovoidea v. basi attenuata, raro globosa, tunica levi, 100-160 \approx 80-140; sporis variabilibus plerumque regulariter cy-

lindraceis 5-7 \approx 2,5-3,5, raro globosis v. ovoideis 3,5-7,5 μ . diam.; zygosporis ignotis; chlamydosporis ignotis.

Hab. ad terram in silvis Coniferarum, Christiania Scandinaviæ.

15. **Mucor silvaticus** Hagem, Vidensk. Selsk. Skrift, I, n. 7 (1907) 3140 p. 31, fig. 11-12; Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) pag. 74, fig. 26. — Coloniis albo-griseis; hyphis sporangiferis rectis v. curvulis, apicem versus parce sympodialiter ramosis, 1-1,5 cm. long., 10 μ . c. cr.; sporangiis sphæroideis, 45-70 μ . diam., tunica diffuenti præditis; columella sphæroidea, raro ovoidea, 25-50 μ . diam., levi, hyalina; sporis breviter cylindraceis, apice subrotundatis, 3,5-5 \approx 2,5-3,5; chlamydosporis numerosis ovoideis plerumque 16-24 μ . cr.; zygosporis nigris opacis, late et depresso verrucosis; azygosporis numerosis plerumque binis raro solitariis.

Hab. ad terram humosam in silvis Coniferarum prope Christiania Scandinaviæ et prope Perrignier Sabaudia. — Species heterothallica.

16. **Mucor christianiensis** Hagem, Ann. Mycol. VIII (1910) p. 268, 3141 fig. 2-3. — Cæspitulis griseis laxis; sporangiophoris sparsis 1,5-2,5 cm. alt., vix 6-10 μ . cr., mox decumbentibus, primo simplicibus, dein monopodialiter ramosis, ramis paucis reclinatis; chlamydosporis intercalaribus copiosis, initio oblongis dein doliiformibus et subglobosis, cito liberatis; sporangiis minutis, 40-60 μ . diam., maturis flavis, tunica fragili, secedendo collarium angustum in columellæ basi relinquente; columella ovoidea, 30-45 \approx 25-30; sporis late ovoideis v. subglobosis, 6-9 \approx 5-7; zygosporis ignotis.

Hab. ad terram hortensem in Horto Bot. Christianiæ Norvegiæ.

17. **Mucor saturninus** Hagem, Ann. Mycologici VIII (1910) p. 265, 3142 fig. 1. — Cæspitulis griseo-nigricantibus, subinde cyaneo-nigris; sporangiophoris, modo 1-2 mm. long., modo usque ad 3 mm. long., 20-25 μ . cr., initio erectis, mono- v. sympodialiter ramosis, cyaneo-griseis (saturninis); sporangiis initio cereo-flavis dein saturninis, demum subnigris, variæ magnitudinis, 45-180 μ . diam., membrana spinulosa, persistente (fragili in majoribus); columella ellipsoidea, in majoribus 60-100 \approx 50-90, in minoribus 35-70 \approx 25-50; sporis ellipsoideis, 6-8 \approx 4-6, rarius globulosis, 4-4,5 μ . diam.; zygosporis ignotis.

Hab. ad terram humosam, rarius in Norvegia.

18. **Mucor genevensis** Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) pag. 80, 3143 fig. 27 et Bull. Herb. Boiss. tom. VIII, n. 1 (1908). — Hyphis

sporangiferis parce ramosis, 2 cm. alt., 10-15 μ . latis; sporangiis globosis, 66 μ . diam., raro usque ad 80 μ ., in aqua dissilientibus; tunica hyalina v. leviter flava; columella spherica v. ellipsoidea, 30-36 μ . diam. v. $36 \approx 24$; sporis ovoideis, elongatis, sæpe plano-gibbosis, 9-10 \approx 3-4; chlamydo-sporis ellipsoideis, 14 \approx 12; zygosporis globosis, episporio verrucoso, fusco.

Hab. ad terram prope Jussy Sabaudia et in Helvetia

19. **Mucor lamprosporus** Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) p. 92, 3144 fig. 33; Bull. Herb. Boiss. t. VIII (1908) fig. 33. — Hyphis sporangiferis ramosis 3 cm. altis, ramis alternis recurvatis, sporangium minutum gerentibus; sporangiis terminalibus spheroidis 60 μ . diam. (v. usque ad 90 μ .), in aqua dissilientibus; columellis spheroidis v. ovoideis 28 \approx 20; sporangiis lateralibus minutis, 30-40 μ . diam., deciduis; sporis in utroque sporangio spheroidis, lucidis, plerumque 10 μ . diam. (7-12 μ .).

Hab. ad terram in silvis Vuache Sabaudia.

20. **Mucor Janseni** Lendner, Bull. Herb. Boiss. 2 sér., VII (1907) 3145 p. 251; Mucor. de la Suisse (1908) p. 88, fig. 30. — Hyphis sporangiferis ramosis, ramis alternis, 2-6 mm. alt.; sporangiis spheroidis, cyaneo-nigris, 50-70 μ . diam., in aqua non dissilientibus; tunica basi columellæ inserta; columellis spheroidis, v. conoideis, griseo-cyaneis vel fuligineis, 34 \approx 30; sporis spheroidis 5-6 μ . diam. (raro 3-4 μ .) griseo-cæruleis.

Hab. ad terram in casula Jansen ad cacumen Mt. Bianco (4810 m. alt.).

21. **Mucor dimorphosporus** Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) p. 93, 3146 fig. 34; Bull. Herb. Boiss. t. VIII (1908) p. 78. — Hyphis sporangiferis ramosis, 2 cm. altis, ramis alternis rarius recurvatis; sporangiis spheroidis usque ad 80 μ . diam. v. basi depressis (60 \approx 58), in aqua dissilientibus; columellis ovoideis 24 \approx 20 v. 50 \approx 40; sporis normalibus hyalinis, flavescentibus, spheroidis, 8-10 μ . diam. v. ellipsoideis 8 \approx 6 v. 10 \approx 8 aut anormalibus, 30 \approx 8-10, difformibus; chlamydo-sporis ovoideis.

Hab. ad terram in casula Jansen ad cacumen Mt. Bianco (4810 m. alt.).

22. **Mucor griseo-cyaneus** Hagem, Vidensk. Selsk. Skrift. I n. 7 (1907) 3147 p. 28, fig. 9; Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) p. 86, fig. 29. — Coloniis griseo-cyaneis v. nigro-cyaneis; hyphis sporangiferis erectis, ramosis, usque ad 2-3 cm. long., 8-12 μ . cr., sympodialibus v. monopodialibus et racemosis, apice quandoque circinnatis; spo-

rangiis globosis, maturis cyaneo-griseis 60-80 μ . diam., membrana non diffuente cyaneo-nigra, incrustata; columella plerumque globosa, raro subovoidea, 30-45 μ . diam., contentu hyalino, tunica levi; sporis ovoideis v. late ellipsoideis, 4-6 \times 2,5-4; chlamydo-sporis ovoideis v. subglobosis 12-14 μ . diam. v. raro usque ad 22 μ . long.; zygosporis ignotis.

Hab. ad terram humosam prope Christiania Scandinaviæ et pr. Genève Helvetiæ. — *Muc. circinelloidi* affinis.

23. **Mucor dispersus** Hagem, Ann. Mycol. VIII (1910) p. 272, f. 4-6. 3148

— Cæspitulis laxis v. subnullis; sporangiophoris majoribus 2-3 cm. altis et vix 6-9 μ . cr., racemose monopodialiter ramosis, ramis reclinatis sporangio terminatis, minoribus 1-2 mm. altis, simplicibus, apice relinatis, sporangio minori terminatis; sporangiis terminalibus majorum 50 μ . diam., tunica fragili et columella 17-19 \times 18-21 præditis; sporangiis lateralibus et minorum 15-45 μ . diam., tunica persistente et spinulosa præditis, subinde tantum 2-4-sporis; sporis subrotundis v. oblongis, 11-13 μ . diam., interdum subangulosis; zygosporis ignotis.

Hab. ad terram supra saxa syenitica pr. Tönsberg Norvegiæ, semel.

24. **Mucor repens** (Bain.) Sacc. et Trott. Ita vocanda *Glomerula repens* Bain. — Syll. XVII, p. 510 — seu *Mucor Glomerula* Lendn. Muc. Suisse (1908) p. 69.

Hujus generis species dubiæ, quarum icones citantur in Syll. XIX, p. 123-133 et 1274 sunt: **Mucor arcuatus** Martius — **M.** (Chionyphe) **Carteri** Berk. — **M. chlorosporus** (Bon.) Fisch. — **M. cupressiformis** Scop. (an Stemonites?) — **M. flocculentus** Balbis (an Physarum?) — **M. fragilis** (Tode) — **M. limbiflorus** (Tode) — **M. Stilbum** (Tode) — **M. syphiliticus** Hallier — **M. oogenes** Spring — **M. trigeminus** (Spring.) Sacc. et Trav.

CIRCINELLA Van Tiegh. — Syll. VII p. 215, XVII p. 501.

1. **Circinella mucoroides** Saito, Centralbl. f. Bakter. II Abt. XVII Bd. 3150

(1906) p. 159. — Cæspitulis laxis, atro-griseis, 4 cm. alt.; sporangiophoris rectiusculis, stipatis, nunc apice sterilibus, nun sporangio terminatis, continuis; ramulis alternis lateralibus biseriatis, brevibus sporangio terminatis, septatis ramuloque spiniformi simplici ascendente auctis; sporangiis minutis, globosis, 60-68 μ . diam. nutantibus, brunneolis, minute aculeolatis, membrana non fragili, sed ad medium secedente et partem inferiorem (collarium) relinquente,

brunneola, incrustata; columella cylindraceo-rotundata, levi, brunneola, 28-48 \approx 24-40; sporis globosis griseolis, coacervatis griseo-brunneis, 7-8 μ . diam.; zygosporis et gemmis ignotis.

Hab. in caryopsidibus decoctis Oryzæ et gelatina in Japonia. — *Circ. spinosæ* affinis.

2. **Circinella minor** Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) pag. 102, 3151 fig. 36, Bull. Herb. Boiss. 2 ser. t. V (1905) p. 199. — Hyphis lateraliter ramusculos sporangiferos verticillatos 2-4 patentibus et ramum terminalem adscendentem nudum v. apice ramusculos præcedentibus similes, simul cum ramusculo ultimo simplici v. radiculifero gerentem; sporangiis sphæroideis; columella sphærica v. ovoidea, levi; sporis sphæroideis, levibus, 6-7 μ . diam. v. usque ad 8 μ .

Hab. in fimo cobayno et cuniculino, Genève Helvetiæ.

RHIZOPUS Ehrenb. — Syll. VII p. 212, XI p. 240, XIV p. 435, XVI p. 385, XVII p. 502.

1. **Rhizopus Tamari** Saito, Centralbl. f. Bakter. etc., II Abt., XVII 3152 (1906) p. 158. — Cæspitibus amplis usque ad 5 cm.; sporangiophoris 400 μ . alt.; sporangiis nigricantibus 48-144 μ . diam.; columella 48-120 μ . alt., 38-112 μ . lata; sporis nunc globosis 6-8 μ . diam., nunc ovoideis 6-12 \approx 4-8; gemmis 20-30 μ . diam.

Hab. in decocto Sojæ (Soyakoji) in Japonia — A *Rhiz. japonico* var. *angulisporo* imprimis dignoscitur notis chemyco-physiologicis nempe peculiari actione in sacchara varia. Cfr. Saito l. c.

2. **Rhizopus japonicus** Vuill. — Syll. XVII, p. 503. — var. *angulisporus* Saito, Centralbl. f. Bakt. etc. II Abt. XVIII (1906) p. 102. — Cæspitulis laxis, nigris; hyphis valde ramosis, rhizoidibus brunneis, ramosis, continuis; sporangiophoris erectis, 200-700 \approx 12, brunneis cum rhizoidibus ex uno nodo exeuntibus, subinde hinc inde inflatis; sporangiis albis demum obscure brunneis, 44-80 μ . diam., tunica valde fragili, crystallogena; columella sessili, depresso globosa 20-56 μ . diam.; sporis magnitudine ludibundis, atro-brunneis, striatis et pro more ovoideo-angulosis, 12-18 \approx 8; gemmis raris, hyalinis, globosis vel ovoideis, 16-40 \approx 16-28; zygosporis ignotis.

Hab. in caryopsidibus Oryzæ, coctione cerevisiæ, Sojæ decocto etc. in Japonia. — Cæspituli usque ad 5 cm. alti.

3. **Rhizopus Batatas** Nakazawa, Centralbl. f. Bakter. etc. II Abt., 3154 XXIV Bd. (1909) p. 486 cum icon. — Cæspitibus primum griseis

dein nigro-brunneis, laxis, 2-3 cm. alt.; hyphis sporangiferis simplicibus v. ramosis (0,7-5 mm.) stolonibus et rhizinis præditis; stolonibus primum hyalinis dein plerumque brunneo-nigris; sporangiis primum candidis dein e brunneo nigro-brunneis, globosis, plerumque 110-120 μ . diam. (100-300 μ .), levibus, maturis diffluentibus; columella distincte apophysata, levi, plerumque globosa, 42-100 μ . diam.; sporis irregularibus, rugosis, e griseo obscure brunneis, 4,4-12,3 \approx 3,5-5,2; gemmis s. chlamydo-sporis pallide brunneis, 12-60 μ . diam.; zygosporis non visis.

Hab. in liquido fermentescibili ex tuberibus Ipomœæ Batatas, « Koji » dicto, Hachijo Japoniæ. — Adsunt in « Koji » etiam *Aspergillus Batatas* Saito et *Rhizopus chinensis* Saito.

4. **Rhizopus oligosporus** K. Saito, Centralbl. Bakt. II Abt. XIV 3155 (1905) p. 623, cum tab. — Cæspitibus laxis, depressis, albo-niveis; hyphis hyalinis, sæpe asperulis, rhizoidibus paucis, sæpe brunneolis, rarius septatis præditis; sporangiophoris 600-1000 \approx 10-18, erectis, rectis v. inclinatis, plerumque simplicibus, brunneolis, sæpe asperatis; sporangiis albis, demum nigris, globosis, 180 μ . diam., impellucidis, membrana verruculosa, fragili; columella globosa v. subdepressa, sæpe collariata, 120 μ . diam.; sporis globosis vel ovoideis, interdum varie cohærentibus, griseo-brunneolis, levibus, 7-10 μ . diam.; gemmulis copiosis, e globoso ovoideis, hyalinis, tenuiter v. crasse tunicatis, valde refringentibus; zygosporis ignotis.

Hab. in farina oryzina, cui fermentationem affert, Kôbe Japoniæ, sed ex Shan-tung Sinarum importatus.

5. **Rhizopus niger** (Ciagl. et Hew.) Godoelst in Guég. Champ. paras. 3156 d. homme et des anim., p. 33, fig. 10, *Mucor niger* Ciaglinski et Hewelke in Zeitschr. f. Klin. Med. XXII (1893). — Cæspitulibus albis; sporangiophoris erectis simplicibus 3-6 fasciculatis, continuis, rhizoidibus ramosis basi præditis; sporangiis globosis, nigris; columella initio cylindræa, duplo triplove longiore quam lata, demum hemisphærica et post dehiscen-tiam umbelliformi; sporis ovoideis, griseis, coacervatis nigris.

Hab. in lingua humana, quæ tunc nigra fit, in Germania.

6. **Rhizopus nodosus** Namyslowski in Bull. Acad. Cracov. (1906) p. 682, 3157 Lendn. Mucor. de la Suisse, p. 122, f. 45, *Mucor norvegicus* Hagem in Vidensk. Selsk. Skrift. I (1907) p. 39, f. 15, *Mucor nodosus* (Nam.) Hagem, in Ann. Mycol. VIII (1910) p. 280. — Cæspitulibus initio albis, bombacinis, dein ochraceis; sporangiophoris ascendentibus 1-2 mm. altis, 12-28 μ . cr., apicem versus hinc inde

1-2-nodoso-inflatis et in ramulos 2-5 verticillatos divisus; sporangiis in his ramulis acrogenis, globosis, 100-200, plerumque 130 μ . diam.; sporis ovato-oblongis, inæqualibus, longitudinaliter striatis, 6-9 \times 4-6, brunneis; chlamydo-sporis 16-32 μ . diam.; zygosporis 120-140 rarius usque ad 180 μ . long., e globoso ovoideis.

Hab. in limo glaciali ex Alpibus helveticis et inde cultus in pane, nec non in Norvegia et Polonia.

7. **Rhizopus speciosus** (Oudem.) Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) 3158 pag. 125. Ita vocandus *Mucor speciosus* Oudem. Arch. Néerland. Sc. nat. 2 série, vol. VII. Overdr. Ned. Kr. Arch. 3 série, II, 3, p. 720, tab. V, f. 1-4. — Syll. XVII, p. 495 — teste Lendn. l. c.

ABSIDIA Van Tiegh. — Syll. VII p. 214, IX p. 337, XI p. 240, XIV p. 435, XVI p. 386, XVII p. 504. — Plures species *Tieghemellæ*, *Mucoris*, *Mycocladii* an hoc genus trahendæ sunt, teste Lendner, Mucor. de la Suisse, passim.

1. **Absidia spinosa** Lendner, Bulletin Herb. Boissier 2 ser., VII 3159 (1907) pag. 250; Mucor. de la Suisse (1908) pag. 132, fig. 46, *Abs. cylindrospora* Hag., Vidensk. Selsk. Skrift. I (1907) p. 45, fig. 21. — Hyphis sporangiferis, 2-3 fasciculatis, erectis sporangio piriformi, 34 \times 28 terminatis ad verticem septatis; columella basi conica, 20 μ . lata, sursum in tubum cylindricum, apice sphæroideo-inflatum desinente, appendiculata; sporis ovoideo-elongatis v. cylindræis, 4-5 \times 2; zygosporis sphæroideis v. doliiformibus, nigris, verrucosis, fuleris hamosis ex unico ramusculo fertili circinatum ortis, altero semper nudo.

Hab. ad terram in hortis, Conches prope Genève Helvetiæ et Christiania Scandinaviæ.

2. **Absidia glauca** Hagem, Vidensk. Selsk. Skrift. I (1907) n. 7, 3160 p. 43, fig. 19-29; Lendner, Mucor. de la Suisse (1908) pag. 136, fig. 49. — Coloniis primum albis dein plus minusve cyaneo-viridibus; stolonibus sympodialiter ramosis, axibus primariis compluribus cm. long., validis et usque ad 25-30 μ . cr., repentibus et hyphis rhizoideis præditis; hyphis sporangiferis rectis, simplicibus v. plerumque binis, 100-600 \times 5-10, lateraliter ramosis et apice sporangio præditis; sporangiis piriformibus 44-60 \times 40-50 membrana diffluenti minute granuloso-incrustata tectis; columella sub-hemisphærica submamillata apice apiculo basi plerumque constricto aucta, 20-30 \times 25-35; sporis globosis 2,5-3,5 μ . diam., flavidis v. hyalinis; heterothallica; zygosporis globosis, magnitudine

variabilibus, plerumque 100 μ . diam., opacis, nigris; exosporio late et depresso verrucoso.

Hab. ad terram humosam in Scandinavia et Helvetia.

3. **Absidia ramosa** (Lindt) Lendner, Mucor. de la Suisse, pag. 144, 3161

Mucor ramosus Lindt, in Arch. für experim. Pathol. u. Pharm. XXI (1886) p. 275, non Bull. — Ab *Absidia corymbifera* (Cohn 1884) Sacc. et Trott. quæ *Abs. Lichtheimii* (Luc. et Cost. 1901) Lendn. l. c. pag. 143 (= *Mucor corymbifer* Cohn — Syll. VII p. 202). — dignoscitur columella non spinulosa, 57 \approx 40; sporis ex ovoideo subcylindræis 4,78 \approx 2,8, flavido-brunneolis (non sphaeroideis 3 \approx 2, hyalinis).

Hab. intra auriculam hominis et in muco nasali equorum in Germania. — Var. **Rastii** Lendner l. c. pag. 145, fig. 53: cæspitulis griseo-ardesiæis 1 cm. alt., sporis sæpe irregularibus; sporangiis multo copiosioribus. — Var. **Zurcheri** Lendner, l. c. cæspitulis usque ad 4 cm. altis, albicantibus; sporis regularibus. Utraque var. ex cubiculis alumnorum RAST et ZURCHER, Genevæ.

ZYGORRHINCHUS Vuill. — Syll. XVII p. 500.

1. **Zygorrhynchus Vuilleminii** Bolesl. Namyslowski, Ann. Mycol. (1910) 3162

p. 152, cum icon. — Hyphis sporangiferis 5-8 μ . latis, ramosis; sporangiis globosis, novellis in aqua non dissilientibus, mature-scentibus dissilientibus, 30-45 μ . diam. v. usque ad 60 μ .; sporangiis terminalibus robustioribus præaliis; columellis latioribus quam altis, ovoideis, 12-30 μ . lat. v. usque ad 35 μ .; sporis hyalinis, ellipsoideis, 4 \approx 2, sæpe guttulatis; chlamydo-sporis levibus, ovoideis v. elongatis, magnitudinis variæ, zygosporis globosis, episporio verruculoso, brunneo, 40-45 μ . diam v. usque ad 60 μ .; azygo-sporis v. zygosporis anomalis non raris.

Hab. ad terram montis Czarnohoræ Carpatiorum, 500 m. alt. — A *Zygor. Moelleri* episporio verruculis minoribus et pro more congruenter aggregatis dignoscitur.

SPINELLUS Van Tieghem — Syll. VII p. 205, IX p. 336.

1. **Spinellus chalybeus** (Dozy et Molkenb.) Vuill. Ann. Myc. II (1904) 3163

p. 61-69 et 494, *Ascophora chalybea* Dozy et Molk. in Tijdschr. v. Nat. Ges. Deel XII (1846) p. 282, tab. VI. — Cæspitulis laxis; mycelio repente, ramoso; sporangiophoris erectis elongatis, parce septatis, rigidiusculis, chalybeis; sporangiis globosis atro-cæruleis; sporis oblongo-fusoideis, majusculis, intus granulosus, 20 \approx 4-5.

Hab. in lamellis *Inocybes rimosæ* in dumis Hollandiæ. — Cæspites 18-30 mm. alt. In Syll. XIX, p. 859 ut synonym. *M. fusigeri* perperam indicatur. Cfr. Vuill. l. c.

TIEGHEMELLA Berl. et De-Toni — Syll. VII p. 215, XVII p. 504.

1. **Tieghemella hyalospora** Saito K., Centralbl. f. Bakter. etc. II Abt. 3164 XVII (1906) p. 103. — Cæspitulis laxis, griseis, 2 cm. alt.; hyphis hyalinis varie ramosis; rhizoidibus sparsis, subsimplicibus, hyalinis, raro septatis; sporangiophoris rectis v. inclinatis, 4-8 μ . cr., atro-griseis dendroideo-ramosis; sporangiis globosis, griseis, rectis, 24-40 μ . diam., membrana fragili, verrucosa, basi collariata; columella apophysata, globosa, levi, griseola, 10-32 μ . diam.; sporis hyalinis, ovoideis, raro globosis, 8-10 \times 6 vel 4-10 μ . diam.; gemmis copiosis globoso-polygoniis, hyalinis, 30-60 μ . diam.; zygosporis ignotis.

Hab. in caryopsidibus *Oryzæ* et decoctis gelatinosis in Japonia.

2. **Tieghemella japonica** Saito K. in Journ. of the Coll. of Science, 3165 imper. University Tokyo, XIX (1903) art. 19, pag. 6, tab. I (unica). — Cæspitulis laxis, griseis; mycelio hyalino v. nigricante, ramoso, rhizoidibus subsimplicibus hyalinis, eseptatis; sporangiophoris 90-100 \times 4-8, erectis, brunneis, pro more simplicibus, interdum sympodialiter ramosis et tunc subinde inflatis; sporangiis globosis v. leviter oblongis, griseis v. brunneis, 20-22 μ . diam., maturis erectis atro-brunneis, tunica fragili; columella hemisphærica 15-20 \times 10-15, late sessili, membrana levi, brunnea, subinde appendiculata; sporangiis hinc inde deminutis; sporis atro-brunneis, oblongis v. sphericis, 5 \times 3 v. 3 \times 3; gemmulis copiosis, hyalinis, levibus, globosis v. ovoideis; zygosporis nullis.

Hab. in substantiis variis in cella cerevisiæ et facile culta, in Japonia. — Cæspituli 1-2 cm. alti. Affinis *Tiegh. Orchidis*.

SPORODINIA Link — Syll. VII p. 206, XVII p. 505.

1. ? **Sporodinia penicillioides** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires 3166 t. XIX (1909) p. 281. — Hyphis sterilibus repentibus ramulosis septulatis, hinc inde prolifero-torulosis; hyphis fertilibus erectis basi non v. vix incurvulis sæpiusque 1-septatis, ceterum rectis, continuis, 3-4 mm. longis, 10-15 μ . crassis, apice abrupte patentimque bifidis, ramulis iterum 4-5-ies dichotomis, ramulis extremis e cylindræo-subconoideis, 15 \times 6, apice capitulatim conidiiferis;

conidiis e cylindraceo-subellipsoideis, 4-6 × 3, catenulatis, levibus, hyalinis.

Hab. in stercore felino putrescente, socio *Pilobolo*, La Plata Amer. austr.

CHÆTOSTYLUM Van Tiegh. — Syll. VII p. 208, IX p. 337.

1. **Chætostylum Fresenii** Van Tiegh. — Syll. VII, p. 208. — Hæc 3167 species, teste Sumstine, esset dicenda: *Bulbothamnidium pulchrum* (Preuss) Sumstine, Mycologia II (1910) p. 143 et ejus synonyma essent *Ascophora pulchra* Preuss, *Mucor Mucedo* Fres. non L., *Bulbothamnidium elegans* Klein, *Thamnidium chætocladioides* Bref., *Th. Fresenii* Schr. — Var. **variabile** Sumstine l. c. pag. 144. — Hyphis sporangiferis simplicibus, non ramosis, erectis, candidis, 5-15 mm. altis; sporangiis magnis, candidis, viridi-flavis, sphaericis; columella cylindrica; sporis variæ magnitudinis, ellipsoideis, 6-12 μ .

Hab. in bubula (carne bovis) in Pennsylvania Amer. bor.

PILAIRA Van Tiegh. — Syll. VII p. 188.

1. **Pilaira Saccardiana** Morini, Mem. R. Ac. Sc. Ist. Bologna ser. VI, 3168 t. III (1906) p. 397, cum tab. — Hyphis sporangiferis raro emergentibus ex trophocisti rudimentali, sæpe absente, exilibus, unum v. binos ramos emittentibus; sporangiis subnigris, globulosis, leviter depressis, 90-130 μ . diam., zona inferiori non cutinisata, anulum latum in membrana sporangioli efficiente; columella breviter conica, intense violacea; sporis ovoideis, hyalinis, 7-10 μ . long., tunica levi, pallide violacea.

Hab. in fimo in Italia sup.

PILOBOLUS Tode — Syll. VII p. 184, XVII p. 505.

1. **Pilobolus Borzianus** Morini, Mem. Ac. Sc. Ist. Bologna ser. VI, 3169 t. III (1906) p. 386, cum tab. — Hyphis sporangiferis binis vel rarius ternis ex unica trophocisti nascentibus, 2,4-5 mm. alt., trophocisti ovoidea, parum evoluta; vesicula hyposporangiali globulosa v. breviter ovoidea, fere hyalina, 200-360 μ . long; sporangiis globosis valde depressis, intense atro-cæruleis, 160-250 μ . lat.; columella semiglobosa v. breve conica, apophysi nulla; sporis intense flavis, sphaeroideis, 16-23 μ . diam.; zygosporis nigris, globosis, 180 μ . diam., membrana valde crassa et levi.

Hab. in fimo in Italia boreali. — Var. **geminatus** Morini, l.

c. ser. VI, t. VI (1909) t. I, f. 6-8: a typo differt sporangiophoris constanter geminatis. In similibus locis.

MORTIERELLA Coëm. — Syll. VII p. 221, IX p. 337. XI p. 240, XVI p. 387, XVII p. 506.

1. **Mortierella Raphani** Dauphin, Ann. Sc. nat., Bot. VIII (1908) p. 30. 3170 fig. 30. — Sporangiophoris nunc solitariis, nunc 5-6-aggregatis, deorsum paullo tenuatis, medio 10-12 μ . cr., sursum quoque tenuatis, 360-400 μ . long.; sporangio terminali, 35-40 μ . diam., intus sporas c. viginti e globoso ovoideas, 8-12 μ . diam. fovente; sporangiophoro subinde prope apicem verticillato-ramoso; stylosporis globosis, echinulatis, 10-20 μ . diam.

Hab in radicibus Raphani sativi in Gallia.

2. **Mortierella Van-Tieghemi** Bachm. — Syll. XVI, p. 387. — var. 3171 **Cannabidis** Dauphin, Ann. Sc. nat. Bot. VIII (1908) p. 28, fig. 28. — A typo dignoscitur sporangiophoris brevioribus, 200-250 μ . long.; ramis quoque brevioribus, 20-25 μ . long.; sporis e globoso ovoideis, 7-8 μ . diam.; stylosporis fortiter echinulatis, minoribus, 15-20 μ . diam., sæpius racemosis.

Hab. ad semina Cannabidis sativæ in Gallia.

3. **Mortierella canina** Dauphin, Ann. Sc. nat., Bot. VIII (1908) p. 29, 3172 fig. 29. — Mycelio dichotome ramoso, intus granuloso, hyalino; sporangiophoris e mycelio 4-5 fasciculatim nascentibus, basi inflatis, 350-400 μ . long., medio 14-16 μ . cr., sursum sensim tenuatis ibique 1,5-2 μ . cr.; sporangiis terminalibus globosis, 30 μ . diam., sporas 10-15 irregulariter sphæroideas, 8-9 μ . diam., hyalinas foventibus; sporangiophoris subinde sub apice parce ramulosis; stylosporis subglobosis, leviter depressis 15-16 μ . diam., fortiter aculeatis.

Hab. in stercore canino, sociis *Mucoris* speciebus, in Gallia. — Inter *M. simplicem* et *M. polycephalam* media.

CUNNINGHAMELLA Matr. — Syll. XVII, p. 508.

1. **Cunninghamella elegans** Lendner, Bullet. Herb. Boissier. 2 ser., 3173 tom. VII (1907) p. 250 et Mucor. de la Suisse (1908) pag. 159, fig. 58-59. — Hyphis conidiophoris dichotomo-ramosis, plus minus septatis, apice capitato-inflatis; capitibus minute verrucosis, 60 μ . diam.; conidiis ellipsoideis, 16 \approx 12-14 v. usque ad 22 \approx 14; membrana breviter echinulata; ramis solitariis vel verticillatis, apice

capitato-inflatis; capitellis 8-10 μ . diam., conidia sphaerica griseo-lutea gerentibus.

Hab. ad terram in hortis, Conches prope Genève Helvetiæ et Vuache Sabaudia.

SAITOMYCES P. L. Ricker, Journ. of Mycol. (1906) p. 61 (Etym. ab inventore SAITO), *Actinocephalum* Saito, Bot. Mag. Tokyo, XIX (1905) n. 216, p. 3, non *Actinocephalus* Kütz. (1843). — Mycelium inæquale, ramosum citra substratum expansum. Hyphæ sporangiferæ erectæ, basi rhizoidibus destitutæ, pro more verticillato-ramosæ, ramis capitulato-inflatis, vesiculæ globosæ. Sporangia conidiomorpha, monosperma in processibus acrogena. Zygosporæ et chlamydosporæ ignotæ. *Syncephalastro* et *Chætocladio* affine genus.

1. **Saitomyces japonicus** (Saito) Ricker, l. c., *Actinocephalum japonicum* Saito, l. c. p. 3 cum tab. — Cæspitulis griseis; vesiculis 25-55 μ . diam.; sporangiis monospermis, globosis, 20 μ . diam., v. ovoideis 21 \approx 18, hyalinis, echinulatis. 3174

Hab. ad gelatinam in cella ad cerevisiam Saké adhibita, in Japonia.

PIPTOCEPHALIS De Bary — Syll. VII p. 225, IX p. 338, XI p. 241, XVI p. 387, XVII p. 508.

1. **Piptocephalis sphærocephala** Mangin, in Journ. de Bot. XIII (1899) pag. 376, c. ic. — Miuta; sporangiophoris long. striatis, 4 μ . crassis, sursum repetito dichotomis, apicibus vesiculis globosis, 5 μ . diam., verruculosis terminatis; sporis primariis cylindraceis apice rotundatis, 15 \approx 1,5 in quinque articulos (sporas) cuboideo-cylindraceas 3,3 \approx 1,5 dilabentibus. 3175

Hab. in culturis variis arte factis, Paris Gallia. — Affinis *P. fusisporæ* et *P. sphaerosporæ* a quibus sporis tereti-cuboideis dignosci videtur.

2. **Piptocephalis monospora** Mangin, in Journ. de Bot. XIII (1899) p. 376, c. ic. — Minuta; sporangiophoris repetito dichotomis, levibus, 3 μ . cr., vesiculis globosis, 3,5-4 μ . diam., levibus terminatis; sporis primariis ovoideis, basi tenuatis, 3 \approx 1,5, intus monosporis. 3176

Hab. cum præcedente. — Ambæ species iterum inquirendæ.

SYNCEPHALIS Van Tiegh. — Syll. VII p. 227, XIV p. 435, XVII p. 508.

1. **Syncephalis bispora** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie (1909) 3176* p. 347, fig. 1-2. — Mycelio in Mucorineis parasitico, 2-10 μ . cr., hyalino, continuo; conidiophoris rectis, deorsum sensim incrassatis, 400-600 \approx 20-30, apice in vesiculam conidiophoram 40-50 μ . diam., subglobosam terminatis; conidiis primariis cylindræis utrinque rotundatis, dense stipatis, vesiculam obtegentibus, sterigmatate tenui 10-12 \approx 1-1,5 suffultis, demum in articulos duos secedentibus, articulis ellipsoideis, hyalinis, crasse tunicatis, 12-14 \approx 5-6.
- Hab.* parasitica in *Circinella spinosa* ad fimum caprinum, Kagok insulæ Javæ.

SYNCEPHALASTRUM Schröt. — Syll. VII p. 232, XI p. 242.

1. **Syncephalastrum javanicum** Raciborski, Bull. Ac. Sc. Cracovie 3177 (1909) p. 347, fig. 3. — Mycelio continuo araneoso, conidiophora usque ad 2 mm. alta gignente; conidiophoris sympodialiter ramosis, ramis deorsum curvis, apice in vesiculam globosam 90-160 μ . diam., conidiophoram inflatis; conidiis primariis conico-cylindræis, stipatis, vesiculam obtegentibus, dein in 8 conidia ovoidea v. globosa, utrinque obtusa, 4-7 \approx 3-5, levia, griseo-nigricantia, coacervata nigra secedentibus; sterigmatibus nullis; zygosporis ignotis.
- Hab.* in potione vitiata, ex saccharo, Klidang insulæ Javæ.
2. **Syncephalastrum cinereum** Bainier, Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII 3178 (1907) p. 212, tab. XXIII. — Cæspitulis griseis; hyphis fertilibus basi rhizoidibus ramosis præditis, lateraliter ramosis et apicibus in vesiculam griseo-cyanescentem basi septo separatam inflatis, ramulis 6-30 μ . cr.; vesicula 22-70 μ . diam., punctata; sporangiis cylindricis radiantibus, utrinque rotundatis, intus 5-10 sporas globulosas 1-seriatis 2,8-5,6 μ . diam. foventibus.
- Hab.* in seminibus germinantibus *Delphinii Staphisagriæ* in Gallia. — Sporangia ex icone 8-guttulata et demum 7-8-septata videntur; an potius mucedinea?
3. **Syncephalastrum fuliginosum** Bainier, Bull. Soc. Myc. Fr. XXIII 3179 (1907) p. 223. — Cæspitulis nigricantibus; hyphis fertilibus, non septatis, lateraliter ramosis, apice in vesiculam fuligineo-ochraceam inflatis; ramis sursum sensim incrassatis; vesiculis globosis, 45-80 μ . diam., punctatis; sporangiis confertim radiantibus, cylindræis, utrinque rotundatis, intus 5-10 sporas ovoideas, 8,4 \approx 5,5 foventibus.

Hab. in seminibus *Delphinii Staphysagriæ* germinantibus in Gallia. — Hyphæ steriles rhizoidibus ramosis præditæ.

THAMNOCEPHALIS Blakeslee Bot. Gaz. XL (1905) pag. 165 (Etym. *thamnos* cespes et *cephale* caput). — Mycelii hyphæ, tenues, continuæ, anastomoticæ. Conidiophora erecta, rhizoidibus sæpe quaternis, radiantibus, crassiusculis suffulta, cylindrica, continua, dein septata, apice breviter dichotome ramosa; ramuli duo patentès vesiculam globosam conidiophoram gerentes. Præterea conidiophora apice supra ramulos fertiles in plures ramos steriles dichotomicè dividitur. Conidia globosa in papillis vesicæ solitaria.

1. **Thamnocephalis quadrupedata** Blakeslee, Bot. Gaz. XL (1905) 3180 p. 165, t. VI, fig. 6-11. — Characteres generis; mycelii hyphis 3 μ . cr.; conidiophoris 0,7 mm. altis, roseo-brunneolis, basi 15, apice 8 μ . cr.; vesicula 13-19 μ . diam.; sporis sphaericis, flavidis, 5,5 μ . diam., crasse tunicatis, tenuissime muriculatis.

Hab. ad *Sphagna* in terra fimetosa (in culturis), Cambridge Mass. Amer. bor.

Fam. 2. Entomophthoraceæ SCHRÖT.

EMPUSA Cohn — Syll. VII p. 281, IX p. 349.

1. **Empusa Sciaræ** Olive, Botan. Gaz. XLI (1906) p. 192, tab. XIV. 3181 — Hyphis vegetativis mycelium ramosum septatum serius superne in cellulas paucas, sæpius 3-5 nucleatas partitum formantibus; hyphis radialibus ramosis; conidiophoris 3-5, in quoque apice summo conidium ovoideum, 1-nucleatum, 18-25 \approx 12-16, basi papilla rotunda præditum ferentibus; zygosporis ignotis.

Hab. in corpore *Sciaræ* (ex Dipteris) ad fimum equinum in laboratorio, Madison Wis. Amer. bor.

ENTOMOPHTHORA Fres. — Syll. VII p. 282, IX p. 351, XIV p. 437, XVI p. 388, XVII p. 510.

1. **Entomophthora Cimbicis** Bubák, Ann. Mycol. IV (1906) p. 105. — 3182 Sporis perdurantibus *Cimbicis* chrysalides pulvere læte flavo omnino implentibus et mumificantibus, globosis vel breve ellipsoideis, 26-48 \approx 24-32, flavicantibus, membrana tenui, 1-1,5 μ . cr., minute verruculosa.

Hab. in chrysalidibus *Cimbicis* sp., intra lignum nidulantibus, Nebovidy pr. Kolin Bohemiæ.

2. **Entomophthora Carpentieri** A. Giard, *Fragm. biolog. in Bull. Sc. 3183* de la France et Belg. (1888) p. 296, *Guég. Champ. paras. p. 60* (sine diagnosi).

Hab. parasitica in *Agriotis* et *Elateris* spp., in Gallia. — Animalcula mycelio speciei cum herbis agglutinantur capite adpresso; rhizoides ex articulis insecti in binos fasciculos exsiliunt.

3. **Entomophthora ? arrenoctona** A. Giard, l. c., *Guéguen, Champ. 3184* paras. p. 61. — Conidiophoris inter articulos corporis lineariter exsurgentibus, apice incrassatis, albo-flavidis, parallelis; conidiis irregulariter ovoideis v. subglobosis.

Hab. in *Tipulæ paludosæ* individuis masculis in Gallia. — Cfr. quoque Giard, *Sur quelques types remarq. Champ. entomoph. 1889*, p. 213, fig. 2.

4. **Entomophthora Syrphi** A. Giard, l. c. (sine diagn.), *Guég. Champ. 3185* paras. p. 61.

Hab. in corpore *Syrphidum*, e. g. *Melanostomæ melinæ* et *Syrphi gracilis* ad flores *Plantaginis*, *Molinæ* etc. in Gallia. — Cfr. *Guég. l. c.*

5. **Entomophthora scatophaga** Giard, l. c., *Guéguen, Champ. paras. 3186* p. 62. — Ab *Empusa Muscæ* differt sporis majoribus læte flavis.

Hab. in corpore *Scatophagæ merdarie* (Dipter.), *Valenciennes* Galliæ. Animalcula abdomine et artubus adhærent, non vero haustello ut *Empusa Muscæ*.

6. **Entomophthora Cyrtoneuræ** Giard, l. c., *Guéguen, Champ. paras. 3187* p. 63. — In margine articularum abdominis crustas pallide flavas formans; hyphis mycelicis intra corpus paucis intransibus, intermixtis chlamydosporis 14-20 μ . diam.

Hab. in *Cyrtoneura hortorum* (Dipt.) in Gallia. — Animalcula abdomine fructibus *Umbelliferarum* adhærentia inventa sunt. *Ent. muscivoræ* (= *Calliphoræ* Giard) affinis.

7. **Entomophthora Richteri** (Bres. et Staritz) Bubák, *Ann. Mycol. IV 3188* (1906) pag. 105. Huc ducendæ sunt *Massospora Richteri* Bres. et Star. — *Syll. XI*, p. 587 — et *Entomophthora Lauxaniæ* Bubák — *Syll. XVII*, p. 510.

MASSOSPORA Peck — *Syll. IV* p. 10, *IX* p. 355, *XI* p. 587.

1. **Massospora Cleoni** C. Wize, *Pilze des Cleon. punctiv., Cracovie 3189* (1905) p. 716, fig. 2 (*Bull. Acad. Crac.*). — Hyphis hyalinis se-

ptatis 40-60 \approx 12 intra corpus insecti; azygosporis (?) aurantio-
miniatis, 25-30 μ . diam., globosis, episporio crasso echinulato, spi-
nis episporii 3-5 μ . longis.

Hab. in larvis et chrysalidibus Cleoni punctiventris ad
terram, compluribus eodem loco emortuis, Ukraina Rossiaë.

Fam. 3. Chytridiaceæ DE BARY et WOR.

OLPIDIUM A. Braun — Syll. VII p. 310, IX p. 362, XI p. 246,
XIV p. 438, XVI p. 389, XVII p. 511.

1. **Olpidium simulans** De Bary et Woron., Ber. naturf. Gesell. Frei- 3190
burg i. B. III (1863) p. 29, t. II, f. 11-16. — Sporangiiis oblon-
go ellipsoideis, pro more singulis intra cellulas matricis ampliatis,
eas omnino implentibus et forma imitantibus, rarius pluribus et
tunc minoribus et mutua pressione angulosis, tubulum ejectionis
unum v. plures non prominentes exhibentibus; zoosporis ellipsoi-
deis v. globosis, 5 μ . diam., 1-ciliatis v. verisimiliter etiam 2-ci-
liatis, hyalinis; sporis perdurantibus ignotis.

Hab. in cellulis epidermidis foliorum juvenilium Taraxaci
officinalis, socio *Synchytrio Taraxaci*, Freiburg i. B. Germa-
niæ. — Species incerta.

2. **Olpidium laguncula** Petersen, Oefv. Kgl. Danske Vid. Selsk. För- 3191
handl. (1905) n. 5, p. 446, cum icone. — Sporangiiis maturis forma
et magnitudine variabilibus, aliis sphæroideis, aliis piriformibus et
collo plus minusve elongato præditis; tunica levi, tenui; ceteris
characteribus ignotis.

Hab. in Dumontia filiformi prope Odde sund, Jutland. —
Magnitudo sporangiorum usque ad 45 \approx 33, tubulus usque ad 45
 μ . longus.

3. **Olpidium ellipticum** (Dang.) Sacc. et Trav. — Syll. XX, p. 217. — 3192
Minutularia elliptica Dangeard, Le Botaniste II (1891) pag. 241,
t. XIV, fig. 29-31. — Parasiticum; sporangiis singulis v. pluribus
in quaque cellula matricis, globosis, 10 μ . diam.; zoosporis globu-
losis longe 1-ciliatis.

Hab. in articulis algæ indet., probabiliter Conjugatæ in Gal-
lia. — In matrice deformationem nullam generat.

OLPIDIOPSIS Cornu — Syll. VII p. 299, IX p. 362, XI p. 247, XIV p. 439.

1. **Oipidiopsis ucranica** C. Wize, Pilze des Cleonus punctiv., Cracov. 3193 (1905) pag. 715, fig. 1. (Bull. Acad. Cracov.). — Oogoniis rotundis 35 μ . diam.; oosporis aurantiacis, 20-30 μ . diam., episporio crasso, reticulato; nucleis oosporarum nunc singulis 15 μ . diam., nunc pluribus 5 \approx 3.

Hab. in larvis Cleoni punctiventris, Ukraina Rossiaë.

2. ? **Olpidiopsis echinata** Henn. E. Peters., Ann. Mycol. VIII (1910) 3194 p. 540, fig. 18 a. — Zoosporangiis ut in Olpidiopside v. Pseudolpidio Saprolegniæ, 90-100 \approx 67, collo singulo v. binis ternis munitis; zoosporis non visis; sporis perdurantibus diam. circ. 28-67 μ ., ex actu sexuali ut in Olpidiopside gignentibus; cellulis antheridialibus 1-2, diam. circ. 22 μ ., membrana hyalina levi instructis, oogonialibus plus minus globosis, in statu maturitatis spinis conicis plus minus evolutis (2-3 μ . long.), hyalinis, dense munitis.

Hab. in apicibus hypharum Saprolegniæ dioicæ et monoicæ, North Sealand Daniæ.

SIROLPIDIUM H. E. Peters., Contrib. conn. Phycom. mar. (1905) p. 478 in Oversigt over det k. Danske Videnskab. Selskabs Forhandl. (1905) n. 5. (Etym. *seira* catena et *Olpidium*). — Chytridinea endophyta sine mycelio et rhizinis; zoosporangia olpidioidea ex zoosporis orientia v. a divisione apparatus zoosporangiformis, (thallus, mycelium primitivum) initio catenulata; status immobilis ignotus.

1. **Sirolpidium Bryopsidis** (de Bruine) Peters., l. c. p. 480, c. ic. *Olpidium Bryopsidis* De Bruyne — Syll. XI, p. 246.

PSEUDOLPIDIUM Fisch. — Syll. XI p. 246.

1. **Pseudolpidium Pythii** Butl., Mem. Dep. Agric. India, I (1907) 3196 pag. 127, t. VII, f. 9-16. — Sporangiiis singulis v. pluribus, ex inflationibus hyphæ matricis formatis, ovoideis, 35 μ . long., tubulo unico dehiscentiæ, variæ longitudinis; zoosporis elongatis, inæquilateris, biciliatis, cilio altero ex apice angusto frontali, altero laterali-posteriori; sporis perdurantibus ovoideo-globosis, circ. 30 μ . diam., tunica brunnea, subtenui, spinulis brevibus tenuibus conspersa.

Hab. parasiticum in Pythio monospermo, P. rostrato, P. vexanti et P. intermedio, Antibes Galliaë.

2. **Pseudolpidium gracile** Butl., Mem. Dep. Agric. India I (1907) 3197

p. 129, t. VI, f. 1-8. — Sporangiiis singulis v. pluribus ex inflationibus hypharum efformatis, sphaericis, circ. 52 μ . diam., per tubos singulos v. plures longiusculos exterius dehiscentibus; zoosporis generis; sporis perdurantibus sphaericis, flavidis, tenuiter tunicatis, spinulis acicularibus longis crebro obductis.

Hab. parasitice in *Pythio intermedio*, Antibes Galliae.

3. **Pseudolpidium ? glenodinianum** (Dang.) Fisch. in Rabenh. Krypt. 3198 Fl. Pilze IV, p. 36, *Olpidium glenodinianum* Dangeard, Journ. de Bot. II, p. 6, t. V, f. 6-10. — Sporangiiis singulis v. 2-4, rarius pluribus, globosis v. ellipsoideis, tunica levi, hyalina et contentu quoque hyalino praeditis, dehiscentiae tubulo papillato brevi; zoosporis subinde 100 in quoque sporangio, initio globosis, dein oblongis, subreniformibus, ciliis lateralibus binis praeditis; altero sursum altero introrsum verso, minute guttulatis; sporis perdurantibus nondum visis.

Hab. parasiticum in *Glenodinio cincto* ex *Peridineis*, in Gallia.

4. **Pseudolpidium ? deformans** Serbinow, Scripta Horti Petrop. XXIV 3199 (1907) pag. 25 et 154, t. I, f. 1-12, IV, f. 16-28. — Thallo ex zoosporis confluentibus formato, amœboide; sporangiiis globosis, 35 μ . diam. v. oblongo-ellipsoideis 47 \approx 15-27; zoosporis globoso-ellipsoideis, 3-4,7 μ . diam. sed sat versiformibus, lateraliter 2-ciliatis, ex collo ejectionis prominulo, 15 \approx 8, exeuntibus; sporis perdurantibus ignotis.

Hab. in ramulis lateralibus *Draparnaldiae glomeratae* in Rossia. — Cellulae matricis hypertrophice deformantur.

PLEOTRACHELUS Zopf — Syll. VII p. 315, XIV p. 440, XVI p. 389. -- Ad hoc gen. sec. Cl. Petersen spectant etiam *Chytridium* (*Olpidium*) *Sphacelariarum* Kny, *Chyt.* (*Olpidium*) *tumefaciens* Magn.

1. **Pleotrachelus Wildemani** Henn. E. Peters., Ann. Mycol. VIII (1910) 3200 p. 553, fig. 25 c. — Zoosporangiiis globosis, 60-80 μ . diam., membrana levi, fusca, collis 30-40 μ . longis munita; aliis characteribus ignotis.

Hab. in rhizinis Musci cujusdam immersi, quas tumefacit, in paludibus Velling Skov (Jyll) Daniae.

2. **Pleotrachelus inhabilis** Petersen, Oefv. Kgl. Dansk. Vid. Selsk. 3201 Förh. (1905) n. 5, p. 456, cum icon. — Zoosporangiiis in tetrasporis v. in tetrasporangiiis matricis solitariis v. pluribus evo-

lutis, forma variabilibus; zoosporis subellipsoideis, 2-3 μ . diam., tunica incolore, levi, tenui, jodii ope violacea; tubulis plerumque 2-3; sporangiis magnitudine variabilibus, 60 \approx 30 v. 45 \approx 39.

Hab. in tetrasporangiis Polysiphoniæ violaceæ et Pol. elongatæ in Dania.

3. **Pleotrachelus Pollagaster** Petersen, l. c., pag. 462, cum icone. — 3202

Sporangiis forma et magnitudine variabilibus, maturis irregulariter lobulatis et hinc inde subventricosis; tunica levi, hyalina, tenui, jodii ope violacea; tubulis longitudine variabilibus, solitariis v. pluribus, 10 usque ad 100 μ . long.; sporangiis magnis 112 \approx 104, mediis 35 \approx 43, minimis (olpidioideis) 2 μ . diam.

Hab. in Ceramio rubro, Frederikshavn Daniæ.

4. **Pleotrachelus lobatus** Petersen, l. c., p. 460, cum icone. — Zoo- 3203

sporangiis forma et magnitudine variabilibus, plerumque oblongis, cylindræis, quandoque ellipsoideis v. sphæroideis, nonnullis plerumque ad apicem lobulatis, solitariis v. congregatis; 24 μ . cr., usque ad 192 μ . long.; tunica hyalina, levi, plus minusve incrassata, sero jodii ope obscure violacea; tubulis solitariis v. pluribus, longitudine variis, nonnullis etiam apice divisis.

Hab. in cellulis vegetativis v. in tetrasporangiis Callithamnii corymbosi, C. Hookeri, Spermothamnii Turnerii in Dania.

5. **Pleotrachelus minutus** Petersen, l. c., p. 451, cum icone. — Spo- 3204

rangiis maturis forma variabilibus sphæroideis v. cylindrico-elongatis 16 \approx 12 v. 24 \approx 16; tubulis 1-3; reactione acidi osmici ope distincta; tunica levi tenui; tubulo 4 μ . longo.

Hab. in cellulis paululum hypertrophicis Chordæ Fili ex Algis ad insulas Hirsholmene Daniæ.

6. **Pleotrachelus Olpidium** Petersen, l. c., pag. 455 cum icone, an — 3205

Pleotrach. Andreei Lagh.? — Zoosporangiis plus minusve sphæroideis, tunica levi, hyalina præditis, 9-30 μ . diam., solitariis v. binis in quaque cellula matricis; hypertrophia nulla; tubulis 1-3, 9-24 μ . long.; sporis immobilibus solitariis, in sporangiis, zoosporangiis omnino similibus sitis, 9 μ . c. diam., tunica crassa levi præditis.

Hab. in Ectocarpo confervoide, in ins. Feroé, in Ectocarpo sp., Acinetospora sp. in Dania.

7. **Pleotrachelus Rosenvingii** Petersen, l. c., pag. 453, cum icone. — 3206

Zoosporangiis forma et magnitudine variabilibus, plerumque do-liiformibus et tunc solitariis in quaque cellula matricis v. 2 et ultra congregatis et tunc sphæroideis; 20 68 \approx 28-41 v. 10-31 \approx

18-36; tunica levi tenui, hyalina v. flavidula, jodii ope distincta v. nulla; tubulis 1-3, brevibus 4-6 \approx 4-5, perpendiculariter insertis; zoosporis ellipsoideis v. piriformibus 2-3 μ . long., cilio valido præditis.

Hab. in cellulis hypertrophicis, v. non, *Pylaiellæ littoralis* Julianehaab (Groenlandiæ), Frederikshavn Dania.

8. **Pleotrachelus paradoxus** Petersen, l. c., p. 459, cum icone. — Zoo- 3207
sporangiis forma variabilibus, irregularibus, sphæroideis v. oblongis in sporangio hospite singulis v. pluribus; tunica hyalina, tenui, levi, jodii ope violacea; tubulis 1 v. pluribus, per poros sporangii hospitis exeuntibus.

Hab. in sporangiis hypertrophicis et tunica incrassatis *Rhizophidii* discincti, Christianssund Norvegiæ.

ECTROGELLA Zopf — Syll. VII p. 315.

1. **Ectrogella perforans** Petersen, Oefv. kgl. Dansk. Vid. Selsk. För- 3208
handl. n. 5 (1905) pag. 466, cum icone. — Zoosporangiis maturis lenticulari-sphæroideis, solitariis v. 2-3 in matrice confertis, 20-25 μ . diam., tunica tenui, levi, hyalina, jodii ope leniter violacea; tubulis 1-4 unilateralibus, 4-7 μ . long.; zoosporis ellipsoideis, 1-2 μ . long. cilio longo, anteriori præditis; sporis immobilibus tunica parum incrassata præditis et in sporangiis crassius tunicatis (zoosporangiis conformibus) nidulantibus.

Hab. in *Licmophora* Lyngbyei et in *Synedra* ulna var. in Dania. — In *Synedra* zoosporangia longiora et angustiora, tubuli usque ad 8 et longiores.

PLEOLPIDIUM A. Fischer — Syll. XIV p. 35.

1. **Pleolpidium tuberculorum** Vuill. in Bull. Soc. Sc. Nancy, X (1909) 3209
p. 30-50. Huc spectat *Cladochytrium tuberculorum* Vuill. — Syll. XIV, p. 449 — sed ex ipso auct. *Cladochytrium* hoc nil est nisi *Pleolpidii* species (nunc *P. tuberculorum* vocata) in zoocystibus *Pythii* parasitica.
2. **Pleolpidium cuculus** Butl., Mem. Dep. Agric. India I (1907) p. 127, 3210
tab. VII, f. 22-25. — Sporangii jugiter terminalibus, sporangia matricis imitantibus, globosis vel piriformibus, 20 μ . diam.; zoosporis clavatis, latere crassiore longe 1-ciliatis, ex papilla parietis exeuntibus; sporis perdurantibus globosis, in apice inflato hyphæ matricis efformatis, solitariis, tunica crassiuscula, flavido-brunnea præditis, 12-17 μ . diam.

Hab. parasiticum in *Pythio intermedio* in Anglia et Africa australi.

3. **Pleolpidium irregulare** Butl., l. c., pag. 121, t. VIII, f. 1-12. — 3211

Sporangiis terminalibus v. intercalariis in matricis hypharum inflationibus globosis v. oblongis nidulantibus, circ. 23 μ . diam. 1-papillatis; zoosporis obclavulatis apice posteriore rotundato longe 1-ciliatis, vivide oscillantibus; sporis perdurantibus copiosis, 11-15 μ . diam., in inflationibus subglobosis hyphæ matricis generatis, subsphæricis, tunica flavo-brunnea, levi v. tenuiter spinulosa.

Hab. parasiticum in *Pythio vexanti*, Kew Britanniae. — Verisimiliter *Chytridium simulans* Dang. non differt.

4. **Pleolpidium inflatum** Butl., l. c., p. 126, t. VII, f. 17-21. — Spo- 3212

rangiis sphaericis, ovoideis v. piriformibus, cum hypha valde inflata includente usque ad 85 μ . diam., 1- v. pluripapillatis; zoosporis copiosissimis elongatis, inæquilateris, biciliatis, cilio altero anterieus, altero posterius positus; sporis perdurantibus non visis.

Hab. parasiticum in *Pythio intermedio*, Antibes Galliae.

5. **Pleolpidium Blastocladiae** v. Minden, Krypt. Fl. Brandenb. V (1911) 3213

p. 253. — Sporangiiis sporangia matricis imitantibus sed minoribus et ea substituentibus, vertice fatiscentibus et post evacuationem collabascantibus; zoosporis non visis; sporis perdurantibus exacte globosis, exosporio brunneo dense tenuiter spinuloso, in matricis inflationibus ellipsoideis, basi tenuatis apice rotundatis, crasse tunicatis nidulantibus.

Hab. in *Blastocladia Pringsheimii* parasitice, Hamburg Germaniae et in Amer. bor. (THAXTER).

SYNCHYTRIUM De Bary — Syll. VII p. 288, IX p. 357, XI p. 247, XIV p. 441, XVI p. 390, XVII p. 512.

1. ? **Synchytrium Cruciferarum** Speg., Anal. Mus. Nac. Buenos Aires 3214

t. XIX (1909) p. 286. — Maculis nullis; acervulis superficialibus subglobosis, 150 μ . diam., verruculosis, pallide flavescantibus, nervisequiis, sparsis v. hinc inde laxe gregariis; sporis perdurantibus in cellulis hypertrophicis solitariis, globosis, 40-60 μ . diam.; episporio tenui, levi, hyalino v. leniter fumoso, endoplasmate concolore vix nubiloso.

Hab. in foliis vivis *Cardamines* cujusdam, Crucecita prope Mendoza Amer. austr. — An oogonia *Cystop. candidi* in eadem planta vigentis?

2. ? **Synchytrium abnorme** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 3215

(1909) p. 285. — Verruculis hemisphæricis 0,25-0,75 mm. diam., sæpius epiphyllis atque confluentibus, non raro fere totum folium obtegentibus; sporis primo globosis pallide fulvis, crasse tunicatis, 70 μ . diam., guttulis aureis oleosis paucis farctis, mox erumpentibus, conoideo-calyciformibus, 120 \times 10, margine supero exerto fimbriato, laciniis denticulatis, tunica deorsum crassa radiatim rugulosa, sursum sensim attenuata atque levi.

Hab. in foliis vivis *Cerastii vulgati* in herbosis prope La Plata Amer. austr. — Species dubia; an cecidium *Anguillulæ* cujusdam?

3. **Synchytrium Puerariæ** Miyabe, Bot. Mag. Tokyo XIX (1905) 3216 p. (199) et Centralbl. Bakt. II Abt. XIX (1907) p. 539, Duggar Fung. Diseas. p. 137, f. 41, *Æcidium Puerariæ* P. Henn. — Sporangiorum soris globosis vel subglobosis, 1-1,3 mm. diam.; sporangiis mutua pressione polygoniis, 19-34 μ . diam., aurantiacis, tunica hyalina; zoosporis ovoideis, 10 \times 6, flavicantibus.

Hab. in foliis *Puerariæ Thunbergianæ* in Japonia.

4. **Synchytrium collapsum** Syd., Ann. Mycol. V (1907) pag. 510. — 3217 Verrucis amphigenis, minutis, solitariis, compositis; sporis perdurantibus solitariis in cellula matricali et eam plerumque omnino expletibus, globosis subinde ellipsoideis, contentu aureo-flavo, exsporio brunneo ca. 3-6 μ . crasso, endosporio hyalino ca. 3-5 μ . crasso, 90-150 μ . diam.

Hab. in foliis *Clerodendri spec.*, Wahjain, Assam Indiæ orient. (E. J. BUTLER). — Ex grege *Synchytrii aurei*.

5. **Synchytrium Solani** Masee, Diseas. cultiv. Plants (1910) p. 99- 3218 101, fig. 20-21. — Tubera deformans, verrucoso-leprosa et hinc inde tumentia reddens et nigrificans; excrescentiis usque ad 1-2 cm. diam.; sporis perdurantibus matrice immersis, in quaque cellula pro more singulis, maturis profundioribus, globosis, 40-70 μ . diam., tunica duplici, externa fere chitinsa, brunnea, levi, demum diffractis; zoosporis late piriformibus, 3-4 μ . diam., 1-ciliatis.

Hab. in tuberibus *Solani* tuberosi quod maxime vexat in Britannia et Germania. Auctores plures speciem hanc ut *Chryso-phlyctis endobiotica* sumunt, sed cl. Masee iterum distinguit.

6. **Synchytrium Echii** Speg., Anal. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 3216 (1909) p. 285. — Maculis amphigenis obsoletis indefinitis palle-scentibus; verruculis hypophyllis sparsis v. hinc inde gregariis, non raro confluentibus, superficialibus, subhemisphæricis, 250 μ . diam., papillulosis, e cellulis epidermicis hypertrophicis ellipsoideis

efformatis, testaceis; sporis perdurantibus, tantum adhuc notis, in cellulis solitariis globosis, primo hyalinis 18-40 μ . diam., serius lateritiis et 40-70 μ . diam., dense minuteque verruculosus, guttula maxima oleosa flava fœtis.

Hab. in foliis vivis *Echii plantaginei* in pascuis circa La Plata Amer. austr.

7. **Synchytrium Rytzii** Syd., Ann. Mycol. V (1907) p. 510. — Verrucis 3220 amphigenis vel petiolicolis, minutis, solitariis, compositis; sporis perdurantibus solitariis in cellula matricali valde amplificata, eam non expletibus, globosis subinde late ellipsoideis, contentu aureo-flavo, exosporio brunneo ca. 3 μ . crasso, endosporio hyalino, ca. 3-6 μ . crasso, 58-93 μ . diam.

Hab. in foliis petiolisque *Anisomelis ovatæ*, Dehra Dun, Indiæ or. (E. J. BUTLER). — Affine *S. Wurthii*.

8. **Synchytrium Picrosiæ** Speg., Anal. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 3221 (1909) p. 286. — Maculis nullis v. effusis fumoso-subpurpurascensibus indefinitis; verruculis hinc inde laxè gregariis, hemisphæricoprominulis, 150-250 μ . diam., fusco-purpureis, rugulosis, per ætatem perforatis vacuis; cystidiis globosis, 3-5-aggregatis in quaque verrucula, membrana fusca anhistâ vestitis, 100-150 μ . diam., aliis macrosporis, ceteris microsporis; macrosporis 3-8 in quoque cystidio, globosis, 35-40 μ . diam., membrana hyalina tenui levi, vestitis, endoplasmate dense minuteque granuloso guttulato luteo fartis; microsporis 20-50 in quoque cystidio, e globoso obtuse angulosis, 20-26 μ . diam., tunica tenui levi hyalina, endoplasmate dense granuloso, luteo repletis.

Hab. in foliis vivis *Picrosiæ longifoliæ* in pratis circa La Plata Amer. austr.

9. **Synchytrium Achyroclines** Speg., Anal. Mus. Nac. Buenos Aires 3222 t. XIX (1909) p. 285. — Maculis nullis v. minutis obsoletissime pallescentibus; verruculis superficialibus, pusillis, 150-200 μ . diam., tomento absconditis, rugosis, flaccidulis; sporis in cellulis epidermidis hypertrophicis, solitariis, subglobosis ovatis v. irregularibus, 40-70 μ . diam., episporio levi, tenui, hyalino, endoplasmate minute granuloso fulvo; sporis perdurantibus non inventis.

Hab. in foliis vivis *Achyroclines saturejoidis* in pratis circa La Plata Amer. austr.

10. **Synchytrium Scirpi** Davis, Journ. of Mycol. (1905) p. 154, cum 3223 iconib. — Maculis minutis, rufo-brunneis gallas.(seu distorsiones) parum elavatas, vix 50 μ . supra foliorum superficiem; sporis per-

durantibus amphigenis, sparsis v. aggregatis, inter cellulas epidermidis singulatim nidulantibus, globosis, ovoideis v. ellipsoideis v. cuboideis, 60-110 \times 50-75, episporio atro-brunneo; endosporio pallide brunneo, 3-5 μ . cr., contentu granuloso, acidi osmici ope nigricante.

Hab. in foliis Scirpi atrovirentis, Kenosha Co. Wisconsin Amer. bor.

11. **Synchytrium Athyrii** Lagerh., in Vestergr. Microm. rar. N. 909; 3224 v. Minden, Kryptog. Flora Brandenb. V, p. 302. — Gallis simplicibus, sæpius confertis, tantum in cellulis epidermidis sitis; epidermidis cellulis valde incrassatis, piliformi-productis, clavatis, membrana nitide brunnea, secernibili præditis et sporam perdurantem unicam v. 2-3 valde laxas globosas hyalinas includentibus.

Hab. in foliis et petiolis Athyrii Filicis-feminæ, ubi soros urediniformes brunneos efficit, in Norvegia.

12. **Synchytrium pluriannulatum** (B. et C.) Farlow, Notes on Fungi 3225 in Rhodora (1908) p. 12. — Ita vocandus *Uromyces pluriannulatus* Berk. et C. — Syll. VII, p. 580.

13. **Synchytrium aureum** Schröt. — Syll. VII, p. 290. — Quoad ejus 3226 scissionem in varias species biologicas et de aliis *Synchytrii* speciebus europæis cfr. W. Rytz in Centralbl. f. Bakter. etc. II Abt., XVIII (1907) pag. 635, cum tabulis et icon. Sec. cl. RYTZ *S. aureum* s. str. habitat in *Lysimachia nummularia*, *Potentilla reptante*, *Valeriana dioica*, *Hyperico perforato*, *Epilobio montano* (?), *Myosotide palustri* - *Synchytrii aurei* indicant Auctores 125 matrices diversas!

14. **Synchytrium Wurthii** W. Rytz, Centralbl. f. Bakter. etc. II Abt. 3227 XVIII (1907) pag. 807, fig. 10. — A *Synch. aureo* differt soris ex sporis perdurantibus in matrice viva evolutis et sporis mox germinantibus; zoosporis pluries singulo anno exorientibus.

Hab. in foliis, petiolis caulibusque *Gymnopetali cochinchinensis*, Salatiga, Java.

15. **Synchytrium Galii** Rytz, Centralbl. f. Bakter. II Abt. XVIII 3228 (1907) p. 803. — Morphologice cum *S. infestante* omnino concordat.

Hab. in Galio aspero var. anisophyllo (et ? *Viola calcarata*) in Helvetia.

16. **Synchytrium alpicola** Rytz, Centralbl. f. Bakter. etc. II Abt., 3229 XVIII (1907) p. 801, fig. 7. — Morphologice cum *S. infestante* omnino concordat.

Hab. in Hippocrepide comosa, Loto corniculato (et ? Anthyllide vulneraria) in Helvetia.

17. **Synchytrium Saxifragæ** Rytz, Centralbl. f. Bakter. etc., II Abt. 3230 XVI (1906) p. 512, XVIII (1907) p. 643, tab. extr. fig. 4. — A *Synch. aureo* s. str. differt præcipue verrucis minus copiosis, soris minoribus, 90-165 μ . diam. (in *aureo* 129-287 μ .), sporangiis minoribus 15-21 μ . diam. (in *aureo* 17-31 μ .).

Hab. in Saxifraga aizoides, S. stellari, S. moschata, S. androsacea, Androsace Chamæjasme, Hutchinsia alpina, Leontodontis sp., Viola biflora, Ranunculo montano (?) in Helvetia.

18. **Synchytrium infestans** Rytz, Centralbl. f. Bakter. II Abt. XVIII 3231 (1907) p. 651, fig. 6. — A *Synch. aureo* s. str. differt præcipue verrucis ex parenchymate hyperplastico, sporis 1-4 congregatis nec solitariis et minoribus, 78-138 μ .; a *S. Drabæ* Lüdi etiam diversum.

Hab. in Hutchinsia alpina et Thlaspi rotundifolio, in Helvetia.

19. **Synchytrium vulgatum** Rytz, Centralbl. f. Bakter. II Abt. XVIII 3232 (1907) p. 805, fig. 8-9. — A *S. aureo* s. str. differt sporis minoribus, 78-105 μ . diam. et cellula nutrice majori quam spora.

Hab. in Campanula Scheuchzeri, Phyteumate hemisphærico, (formæ in Homogyne alpina, Chrysanthemo Leucanthemo var. montano), in Helvetia.

RHIZOPHIDIUM Schenk — Syll. VII p. 298, IX p. 362, XI p. 248, XIV p. 443, XVI p. 390, XVII p. 512. — Ad gen. *Rhizophidium* sec. Petersen spectat etiam *Chytridium Polysiphoniæ* Cohn.

1. **Rhizophidium gelatinosum** J. Lind, Ann. Myc. III (1905) p. 427, c. 3233 ic. — Sporangiiis 1-cellularibus, globosis, 20-30 μ . diam., basi stipitiformi brevi præditis, in alga superficialibus, superne 8 anulis minutis præditis; anulis collo destitutis, serius evolutis, 4-6 μ . diam., media ætate papilliformibus; sporangiis strato gelatinoso 3 μ . cr., obductis; rhizoidibus non observatis.

Hab. in cellulis Acrosiphoniæ (Cladophoræ) pallidæ in Gotlandia Sueciæ (D.r SVEDELIUS).

2. **Rhizophidium olla** Petersen, Oefv. kgl. Selsk. Förhandl. n. 5 (1905). 3234 — Rhizina unica aciculiformi apice verisimiliter ramosa; sporangiis primum subsphæroideis demum urceolatis; membrana crassa, levi, flavidula, jodii ope immutata v. flavescenti; sporangiis operculatis, 12-27 \approx 12-42, ceteris characteribus ignotis.

Hab. in Pylaiella littoralis, Groenlandia.

3. **Rhizophidium distinctum** H. E. Petersen, Oefv. kgl. Vid. Selsk. För- 3235
handl. n. 5 (1905) p. 484, cum icon. — Sporangiiis sphæroideis
v. hemisphæricis et basi depressis, 8-30 μ . diam.; membrana ple-
rumque crassa 1-2 μ . v. ultra, quandoque pluries stratosa, stratu
externo jodii ope flavescenti; zoosporis 1-5 μ . cr.; ostiolis regu-
laribus. inæqualiter sparsis, sine operculo.

Hab. exemplaria minora in *Spongomorpha vernali* in
Dania, majora in *Acrosiphonia incurva* in Norvegia.

4. **Rhizophidium septocarpoides** H. E. Peters., Ann. Myc. VIII (1910) 3236
p. 552, fig. 24 d. — Zoosporangiis brevissime pedunculatis, piri-
formibus, parte basali angustiori, membrana hyalina, levi munita,
8-16 μ . longis, mycelio intramatrici parce ramoso; ceteris cha-
racteribus ignotis.

Hab. in *Closteriis* in lacu Sorte Sö Daniæ.

5. **Rhizophidium minutum** Atkins., Botan. Gazette XLVIII (1909) 3237
p. 328, cum icon. — Zoosporangiis obpiriformibus, 5-6 μ . latis,
apice papilla lata præditis, basi filamentis brevibus radiciformibus
munitis; zoosporis ovoideis, 2,5 μ . diam., uniguttulatis, cilio sim-
plici attenuato auctis.

Hab. in *Spirogyra* varianti pr. Ithaca N. Y. Amer. bor.

6. **Rhizophidium brevipes** Atkins., Botan. Gazette XLVIII (1909) 3238
p. 325, cum icon. — Zoosporangiis ovoideis 21-24 μ . diam., apice
pori loco papillatis; apparatu rhizoideo rudimentali, ex tubulis
simplicibus brevibus obtusis constituto; zoosporis ovoideis, unigut-
tulatis, uniciliatis, 3 μ . diam.

Hab. in tunica gametangii *Spirogyræ* variantis prope
Ithaca N. Y. Amer. bor.

7. **Rhizophidium carpophilum** Zopf, Nova Acta Acad. Leop. XLVII 3239
(1885) p. 200, t. IX, f. 8-16. — Sporangiiis sæpius pluribus, in
cellula matricis sessilibus, globosis, tenuiter tunicatis, maturis lato
foramine apertis et tunc disciformibus, ramis usque ad 20 μ . diam.,
2-40 zoosporas continentibus, basi rhizoidibus in oosphæram cel-
lulæ nutricis penetrantibus, ramulosis præditis; zoosporis globoso-
ellipsoideis, 4-5 μ . diam., longe 1-ciliatis, excentrice grosse 1-gut-
tatis; sporis perdurantibus ignotis.

Hab. in oogoniis *Saprolegniæ ferocis*, *S. asterophoræ*,
Achlyæ polyandræ, Hamburg, Halle Germaniæ.

EURYCHASMA P. Magn., Hedwigia XLIV (1905) p. 348, H. E. Pe-
tersen, Oefv. kgl. Danske Vid. Selsk. Forhändl. (1905) n. 5, p. 469

(Etym. *eurys* latus et *chasme* hiatus). — Chytridinea, endophytica mycelio et rhizinis carens. Sporangia primitus subrotunda, olpidoidea, dein plus minus irregulariter tumentia et scissuram in cellula matricis efficientia et per eam plus minus penetrantia. Zoosporæ per papillam unicam v. plures fatiscentes sporangii exeuntes.

1. **Eurychasma Dicksonii** (Wright) Magn. l. c. Ita vocandum *Rhizophidium Dicksonii* (Wright) Magnus, l. c., Petersen, l. c., c. ic. — Syll. IX, p. 362. 3240
2. **Eurychasma sacculus** Petersen, l. c., p. 477, cum icon. — Sporangii illis *Eurych. Dicksonii* subconformibus, magnitudine variis, extus 48 usque ad 184 μ . altis, intus 40 usque ad 192 μ .; tunica hyalina, levi, jodii ope obscure violacea. 3241

Hab. in cellulis superficialibus v. etiam profundis et plus minusve hypertrophicis Halosacci ramentacei et Rhodymenia palmatae, in Groenlandia.

PHLYCTIDIUM A. Braun — Syll. VII p. 308, IX p. 360.

1. **Phlyctidium Chlorogonii** Serbinow, Scripta Horti bot. Petrop. XXIV (1907) v. Minden Krypt. Fl. Brand. V, pag. 315. — Sporangii sessilibus, singulis v. sociatis, globosis, dein maturis papilla ejectionis rostellata præditis et tunc phialiformibus, basi haustorio globoso-ellipsoideo fultis, 6-8 μ . diam.; zoosporis globosis, 1-5 μ . diam., longe 1-ciliatis, nucleolatis; sporis pedunculatis ignotis. 3242

Hab. in Chlorogonio euchloro in Rossia.

CHYTRIDIUM A. Br. — Syll. VII p. 304, IX p. 358, XI p. 250, XIV p. 446, XVII p. 513.

1. **Chytridium gibbosum** Scherffel, Hedwigia (1902) p. 105. — Sporangii sessilibus sacciformibus, gibbosis, operculo convexo dehiscentibus, vesicula infrasporangiali intramatrix rhizoides gignente præditis; zoosporis 1-ciliatis, globosis, guttulatis, saltitantibus. 3243

Hab. in Cladophoræ sp., Budapest Hungariæ.

PHLYCTOCHYTRIUM Schröt. — Syll. XIV p. 36.

1. **Phlyctochytrium stellatum** H. E. Peters., Ann. Mycol. VIII (1910) p. 550, fig. 22 a-b, d, fig. 23. — Habitu vegetativo ut in *Phlyct. Schenkii*; zoosporangiis ex parte intramatrix orientibus; zoosporis zoosporangia formantibus, tumescentibus et vesicam lateralem procreantibus; zoosporis per orificium prope partem extramatri-

calem v. per hanc ipsam liberatis, sed zoosporis non examinatis; membrana zoosporangii hyalina, levi; sporis (v. angiiis) perdurantibus singulis, membrana echinata, hyalina instructis, in parte intramatrici orientibus.

Hab. in *Spyrogyra* in Dania.

2. **Phlyctochytrium æquale** Atkins., *Botan. Gazette* XLVIII (1909) 3245 p. 338, cum icon. — Zoosporangio globoso, sessili, 6 μ . circ. diam., basi subsporangiali æqualiter crassa, rhizinis longis ramulosis prædita.

Hab. in *Spirogyra insigni* prope Ithaca N. Y. Amer. bor.

3. **Phlyctochytrium planicorne** Atkins., *Botan. Gazette* XLVIII 3246 (1909) p. 337, cum icon. — Zoosporangio ellipsoideo 6 \times 8, apice 4 cornibus ornato; cellula inferiori 3 μ . lata, rhizinis angustis ramosis radiantibus prædita.

Hab. in cellulis *Spirogyræ* variantis prope Ithaca N. Y. Amer. bor. — Socium frequens *Lagenidii americani*.

MONOCHYTRIUM Griggs Rob. F., *The Ohio Naturalist* X (1910) pp. 44-54, cum 2 tab. (Etym. *monos* unicus et *chytrion* ollula). — Mycelium nullum, plasmodium rotundatum. Sporæ perdurantes, globosæ, ortæ a copulatione zoosporarum intra cellulas matricis, binucleatæ, exosporio crasso pæne levi non echinulato; zoosporangia a zoosporis sine copulatione formata, unum a quoque plasmodio, sine membrana, sine collo; zoosporæ numerosissimæ, moto ignoto.

1. **Monochytrium Stevensianum** Griggs Rob. F., l. c. Char. generis. 3247

Hab. intra cellulas foliorum v. petiolorum *Ambrosiæ artemisiifoliæ*, Raleigh North Carolina Amer. bor. (STEVENS et HALL). — Sporæ perdurantes 30-50 μ . diam.; zoosporangia circ. 70 μ . cr.; zoosporæ 2,5 μ .

ZYGORHIZIDIUM Loewenthal, *Arch. f. Protistenk.* V (1905) p. 228 (Etym. *zygos* jugum et *Rhizidium*). — Fungus ex zoosporis formatus, extramatrix, rhizoidibus cum vesicula tantum intramatrix, globosus vel piriformis, 4 ad 15 μ . long.; 1-paucinucleatus v. in individuis majoribus plurinucleatus; demum in zoosporangium operculo plano dehiscens mutatus; zoosporangiis pro magnitudine a 4 ad 40 zoosporas gignentibus. Præterea adest multiplicatio per zygosporas. — A *Rhizidio* imprimis operculo zoosporangii et sexualitate distinguitur.

1. **Zygorhizidium Willei** Loewenthal, l. c., pag. 228. — Characteres 3248 generis.

Hab. parasitice in cellulis algæ *Cylindrocystis Brebissonii* in Germania.

PHYSODERMA Wallr. — Syll. VII p. 317, IX p. 363, XI p. 250, XIV p. 447, XVII p. 513.

1. **Physoderma Muscari** Poirault, Bull. mens. Assoc. franç. Avanc. d. Sc. (1905) p. 325. — Maculis elongatis, leviter depressis, vinosis dein nigricantibus; mycelio fugaci, nucleum invadente et hypertrophiam demumque scissionem efficiente; sporangiis plurinucleatis; hyphis dendritice ramosis forte haustorii vices agentibus (Ex Bot. Centralbl. 1906).

Hab. in foliis *Muscari comosi* in insulis Lérins Galliæ.

2. **Physoderma (Microphlyctis) polysporum** Schröt. in v. Minden Krypt. Flora Brandenb. V, p. 409, Krieger Fungi Saxon. exs. n. 540. — Sporis perdurantibus læte flavis, subinde brunneolis, globosis vel mutua pressione angulosis, 7-9 μ . diam., innumeris, cellulas parenchymatis matricis implentibus.

Hab. in calamis *Heleocharidis palustris*, in quibus maculas atro-brunneas 1-6 mm. longas, 0,5-1 mm. latas gignit, Königstein Germaniæ. — A *Phys. Heleocharidis* sporis multo minoribus et crebrioribus dignoscitur.

3. **Physoderma Agrostidis** Lagerheim, in Vestergr. Micr. var. n. 510. v. Minden in Kryptogamenfl. Brandenb. V, p. 404. — A *Physodermate* (Cladochytrio) *graminis* sporis perdurantibus minoribus nempe 13-21 \approx 17-25 videtur differre; mycelio non observato.

Hab. in foliis, quibus maculas oblongas brunneas affert, *Agrostidis albæ* in Suecia.

CLADOCHYTRIUM Now. — Syll. VII p. 295, XI p. 250, XIV p. 448, XVI p. 393, XVII 514.

1. **Cladochytrium Myriophylli** Rostr., Mykol. Meddelelser IX (1904) p. 305, cum icone, et Rev. mycol. (1905) p. 164, t. 259, f. 3-6. — Nodulos 1 cm. latos in matricis caule generans; sporis perdurantibus copiosis in nodulis nidulantibus, ellipsoideis, rarius globulosis, subinde globoso-polyedricis, 25-40 \approx 20-35, membrana 4 μ . cr.; sporangiis ejusdem magnitudinis endosporas copiosas, globulosas, hyalinas, 8 μ . diam. continentibus.

Hab. in caule *Myriophylli verticillati* in Zelandia sept.

— Nonnullis notis ad *Urophlyctin* accedit et quoad locum systematicum dubia species.

2. **Cladochytrium cæspitis** Griff. et Maubl., Bull. Soc. Myc. Fr. (1910) 3253 pag. 320, tab. XV. — Mycelio in matrice effuso, ramoso, hyalino granulosoque, primum e filamentis tenuibus, 3-5 μ . cr. composito, dein irregulariter inflato; sporis perdurantibus e vesiculis filamentorum enatis, in quaque cellula plus minus numerosis, globosis v. ellipsoideis, 15-45 \times 12-30, membrana crassa, levi, hyalina v. chlorina; zoosporangiis raris, sphaericis 20-25 μ . diam., membrana tenui; zoosporis globosis, nudis, cilio simplici ornatis, 4-5 μ . diam.

Hab. in vaginis et radicibus Lolii perennis, Fontainebleau Galliae. — E grege *Physodermais* et *Ph. Gerhardtii* affine.

NOWAKOWSKIELLA Schröt. — Syll. XVII p. 514.

1. **Nowakowskiella ramosa** Butl., Mem. of the Dep. Agr. India (1907) 3254 p. 137, t. X, f. 3-10. — Mycelio copioso intra et extra-matricali, ramosissimo, irregulari, hyphis 1-4,5 μ . cr., serius crasse tunicatis, anastomosantibus; sporangiis terminalibus v. intercalaribus, sphaeroideis v. piriformibus, 25-45 μ . diam., apophysi inflata pro more auctis, operculo dehiscentibus; zoosporis sphaericis, 1-ciliatis, grosse 1-guttatis, in massam v. singulatim expulsis; sporis perdurantibus crassiuscule tunicatis, flavidis, 18-25 μ . diam.

Hab. saprophytice in caule putri Trititici vulgaris, Dehra Dun Indiae orient.

CATENARIA Sorok. — Syll. IX p. 360.

1. **Catenaria pygmæa** Serbinow, Scripta Hort. bot. Petrop., XXIV 3255 (1907) p. 161, t. III, f. 1-15. — Sporangiiis singulis, globoso-ellipsoideis, cellulæ matricis formam induentibus, pro more utrinque haustorio firmo dichotome ramoso cellulas matricis proximas penetrante auctis; zoosporis globosis, 1,5 μ . diam., 1-guttatis, cilio triplo quadruplove longiore præditis, ex papilla sporangii exeuntibus et in globulos coadunatis; sporis perdurantibus intramatricalibus, globosis, tunica hyalina et guttula centrali præditis.

Hab. in cellulis Mougeotiae sp. ex Algis in Fennia. — Species in genere dubia.

RHIZOPHAGUS Dang., Le Bot. sér. VII (1900-1901) p. 285 (Etym. *rhiza* radix et *phago* manduco). — Mycelium ex hyphis ramosis continuis, cellulas matricis penetrantibus et fasciculos rhizoidum

hinc inde emittentibus conflatum. Vesicæ (zoosporangia Dang.) irregulariter globosæ v. clavatæ, plurinucleatæ sed zoosporas non foventes. Sporæ perdurantes intercalares v. terminales, globosæ, membrana levi et guttulis pluribus præditæ. — Teste Cl. Minden (Krypt. Fl. Brand. V, p. 421) forte ad Peronosporaceas pertinet genus.

1. **Rhizophagus populinus** Dangeard, l. c. t. VII-XI. — Characteres 3256 generis.

Hab. in radicibus junioribus Populi in Gallia occid. — Profunde penetrat et plantas necat.

CÆNOMYCES Deckenbach, in Script. bot. horti bot. Univ. Petrop. (1902) et Rev. mycol. (1905) p. 21, tab. CCXLIV, f. 1-3 (Etym. *cainos* novus et *myces*). — Mycelium valde evolutum, septatum; hyphæ tenues, hinc inde intercalariter inflatæ, steriles; vesicæ terminales in zoosporangia mutatae, ab hypha septo separatae. Zoosporangia piriformia, in rostrum longissimum subhorizontale desinentia. Zoosporæ perexiguæ, 1-ciliatæ.

1. **Cænomyces consuens** Deckenb., ll. cc. — Zoosporangiis piriformibus, acrogenis, intus luteo-aurantiis, 15-22 μ . diam. in rostrum 120-150 μ . longum productis, extramatrixalibus; zoosporis ellipsoideis v. piriformibus, 1,5 μ . diam., cilio unico recto præditis; mycelii hyphis 1,5-2 μ . cr.

Hab. in filamentis vivis Calotrichis parasiticæ et *C. confervicolæ* pr. Balaclava in Ponto Eusino seu Mari Nigro.

SPOROPHLYCTIS Serbinow, Acta Horti bot. Petrop. IV (1907) 116, 116 (Etym. *spora* et *phlyctis* bulla, pustula). — Sporangia sacciformia e vesica centrali ellipsoidea enascentia; sporæ non ciliatæ, in sporangio germinantes. Ab affinibus generibus *Rhizophlycti* et *Polyphago* dignoscitur multiplicatione agamica, sporarum ope, a *Rhizophlyctide* zoosporarum formatione intra vesiculam post protoplasmatis exitum, a *Polyphago* cellulæ vegetativæ forma constante et oosporarum formatione in una ex cellulis conjugantibus.

1. **Sporophlyctis rostrata** Serbinow, l. c. — Vesica centralis 30-34 μ 3253 12-19; sporangia 25-30 μ . diam.; sporæ 4,8-6,3 μ . diam.; sporæ perdurantes 30-31 μ 23.

Hab. parasitica in *Draparnaldia glomerata*, St. Petersburg in Rossia.

SACCOMYCES Serbinow, Acta Hort. bot. Petrop. IV (1907) p. 162, t. XI, f. 22-33 (Etym. *saccos* et *myces*). — Mycelium intramatricale, haustorium breve ex sporangio enascens, distincte lobatum v. vesiculosum formans; sporangia e vesica centrali enascentia, sacciformia. Inter semiendogenum *Rhizophidium* et exogenum *Polypogonum* medium genus.

1. **Saccomyces Dangeardi** Serbinow, l. c., *Rhizophidium Euglenæ* Dang. 3258* p. p. — Sporangia 15-20 × 8-10; zoosporæ 2 µ. diam.; sporæ perdurantes 10 µ. diam.

Hab. in cellulis quiescentibus *Euglenæ* viridis et sanguineæ in Rossia.

MACROCHYTRIUM v. Minden, in Centralbl. Bakter. II Abt., VIII (1902) p. 824 (Etym. *macros* magnus et *chytrion* urceolus, ob sporangia majuscula). — Sporangia solitaria, ratione magna, contentu hyalino, basi septata et rhizoidibus fasciculatis ramulosis prædita vertice operculo convexo dehiscentia. Zoosporæ innumeræ, globulosæ, guttulatæ, apice uno longe ciliatæ. Sporæ perdurantes ignotæ

1. **Macrochytrium botryoides** v. Minden, l. c. et in Krypt. Fl. Brand. 3259 V, p. 364, fig. 30 et p. 386. — Characteres generis; sporangia circ. 900 × 750, verticaliter ellipsoidea.

Hab. in fructibus variis putrescentibus, imprimis Piri Mali, diu aqua immersis, Breslau, Hamburg Germaniæ.

UROPHLYCTIS Schröt. — Syll. VII p. 303, XVII p. 515.

1. **Urophlyctis punctiformis** Spegazz., An. Mus. Nac. Buenos Aires 3260 t. XIX (1909) pag. 284. — Verruculis subglobosis, 250 µ. diam., amphigenis, fere totum folium occupantibus sed semper separatis et distinctis, levibus; sporis e fronte discoideis, 75-100 µ. diam. e latere sublenticularibus 50 µ. cr., fuligineis, levibus, guttulis oleosis aurantiis fœtis.

Hab. in foliis vivis *Hypochæridis* variabilis et *Picrosiae longifoliæ*, La Plata Amer. austr. — Verruculis non confluentibus minutis regularibus distincta.

2. **Urophlyctis Magnusiana** Neger, Ann. Mycol. IV (1906) p. 280. — 3261 Tuberculis 0,3 mm. diam., globulosis, acervulatis, raro sparsis; sporis perdurantibus sæpius copiosissimis, supra 100, raro tantum 20-30, pro more cellulam singulam implentibus, hemisphæricis, brunneo-flavis, 38-40 µ. diam., tubulis eorum partem planam cum cellula hyalina conjungentibus, non raris.

Hab. in caulibus, foliis, calycibus Euphrasiæ Odontitis, quam hypertrophice deformat, Tegernsee Baviariæ.

3. **Urophlyctis Urgineæ** (Pat. et Trab.) Maire, Bull. Soc. Bot. Fr. 3262 LIV (1907) p. CLXXXIV. — Ita vocandum *Cladochytrium Urgineæ* Pat. et Trab. — Syll. XIV, p. 449 — = *Physoderma Debeauxii* Bubák — Syll. XVII, p. 514.
4. **Urophlyctis plurianulata** (B. et C.) Farlow, Notes on Fungi I, in 3263 Rhodora (1908) p. 13. — Ita vocandum *Uromyces pluriannulatus* B. et C. — Syll. VII, p. 580.
5. **Urophlyctis Asphodeli** (Debray) Maire, Bull. Soc. Bot. Fr. LIV 3264 (1907) p. CLXXXIII. — Ita vocandum *Cladochytrium Asphodeli* Debray — Syll. XIV p. 448.
6. ? **Urophlyctis Oliveriana** P. Magnus, Berichte Deut. bot. Gesellsch. 3265 (1903) p. 248 (*Urophlyctites*). Cfr. F. W. Oliver in The new Phytologist, II (1903) pag. 49-53. — Tuberculis hypophyllis, pariete crasso præditis, vix emergentibus, cavis, sporas (?) subglobosas, 16 μ . diam., superficie colliculosas continentibus; sporis (ut videtur) in apice hypharum tenuium ex pariete int. tuberculorum egredientium orientibus.

Hab. fossilis ad folia Alethopteridis aquilinæ in formatione carbonifera in Britannia.

7. ? **Urophlyctis Stigmariaæ** Weiss, New Phytologist III (1904) p. 63 3266 (fossilis). — Cellulis hypertrophicis cylindræis in foveolis corticis exterioris nidulantibus; sporis intra cellulas hypertrophicas globosis, majusculis, tenuiter tunicatis.

Hab. fossilis in radicibus Stigmariaæ «Lower Coat Measures» in Britannia. — Stirps vere dubia.

MYZOCYTIUM Schenk — Syll. VII p. 279, XIV p. 450.

1. **Myzocytiium irregulare** H. E. Peters., Ann. Myc. VIII (1910) p. 538, 3267 fig. 16 a et d. Syn. *Myzocyt. proliferum* Schenk p. p. — Zoosporangiis irregularibus plerumque duobus, rarissime pluribus (in Desmidiaceis latioribus), irregulariter conjunctis; collibus plus minus longis, in quoque sporangio singulis, sæpe intra membranam hospitis inflatis; ceterum ut in *M. prolifero*.

Hab. in Desmidiaceis latis, Cosmariis etc. in Dania.

LAGENIDIUM Schenk — Syll. VII p. 278, IX p. 348, XI p. 248, XIV p. 450, XVII p. 516.

1. **Lagenidium americanum** Atk., Bot. Gazette XLVIII (1909) p. 336, 3268

cum icon. — Mycelio inæquali, curvato, ramulo irregulari instructo, 3-8 μ . lato; zoosporangiis irregularibus, sæpe ramulosis; ostiolo tubiformi tenuissimo æquali, 2 μ . lato; prosperangiis ramulosis e sectionibus mycelii formatis; zoosporangiis vesiculososis, sæpe deciduis, ciliis ornatis, ut cœnobio Pandorinæ natantibus, postremo divisis, zoosporas formantibus; zoosporis fabæformibus, lateraliter biciliatis, 4-6 \approx 5-7.

Hab. in zygosporis Spirogyræ, Ithaca N. Y. Amer. bor.

PONTISMA Petersen, Kgl. Oefv. Danske Vid. Selsk. Förhandl. n. 5, p. 482 (Etym. *pontisma* res in mare jacta). — Chytridinea endophytica rhizinis destituta; sporangiis compositis, lagenidioideis; zoosporis e zoosporangio exeuntibus sine membrana.

1. **Pontisma lagenioides** Petersen, l. c., p. 482, cum icon. — Zoosporangiis subramosis, forma et longitudine variabilibus, 24 \approx 16 usque ad 105 \approx 9-12; tubulis plus minusve elongatis, usque ad 145 μ ., reactione jodica positiva; zoosporis ellipsoideis 2-3 μ . cr., ciliis binis præditis.

Hab. in cellulis exilibus Ceramii rubri et C. stricti (!) in Dania.

Fam. 4. Saprolegniaceæ PRINGSH.

SAPROLEGNIA Nees — Syll. VII p. 268, IX p. 345, XI p. 244, XIV p. 453, XVII p. 518.

1. **Saprolegnia rhætica** Maurizio, Flora (1894) II, p. 122, t. III et t. IV, fig. 1-4. — Cæspitulis laxis, 1-1,5 cm. long.; hyphis diffusis, tenuibus, non ramosis; sporangiis terminalibus, raro intercalaribus, primariis minutis clavatis, demum versiformibus; oogoniis minutis, plerumque globosis, modo terminalibus modo intercalaribus et (ubi e conidiis generatis) catenulatis v. parce racemosis, 48-61 μ . diam., tunica tenui hyalina; oosporis in quoque oogonio 1-5, subinde 12, globosis, 19-27 μ . diam.

Hab. in aquis algis et animalculis refertis, Grigioni, Engadina super., 1100-2400 m. alt. in Helvetia. — Species inter *Sapr. hypogynam* et *S. moniliferam* media. Diagnosis systematica deest; cfr. fusam descriptionem l. c.

2. **Saprolegnia paradoxa** H. E. Peters., Ann. Myc. VIII (1910) p. 520,

fig. 1 *d* et *e*. — Hyphis erectis parce ramosis, 20-60 μ . diam.; zoosporangiis proliferis, diam. partium terminalium hypharum; membrana hypharum sæpe crassa, usque ad 8 μ ., ut in speciminibus veteribus Achlyæ; oogoniis terminalibus v. lateraliter sessilibus, membrana crassa, c. 4 μ ., dilute lutea v. hyalina et foraminibus multis munita, instructis; diam. oogoniorum 50-100 μ .; oosporis 5-20, diam. c. 25 μ . ramis antheridialibus simplicibus, singulis, brevibus, sub oogoniis terminalibus et ex pedunculo oogoniorum racemose dispositorum gignentibus.

Hab. in ramis dejectis ex palude quadam ad Gurre Sö (Nordsjaelland) Daniæ.

3. **Saprolegnia semidioica** Henn. E. Peters., Ann. Mycol. VIII (1910) 3272 p. 519 fig. 1 *f*. — Fila 20-30 μ . cr.; zoosporangiis terminalibus innovantibus; oogoniis terminalibus globosis, 60-70 μ . c. diam., foraminibus munitis; oosporis (centricis?) circ. 6-15, c. 22 μ . diam., antheridiis ramosis v. simplicibus sub oogoniis orientibus, monoico modo; filis antheridialibus et ad oogonium supra insertionem filorum aliorum antheridialium et ad alia oogonia crescentibus.

Hab. in Culicibus Muscisque emortuis, in palude quadam ad Söbjaerg Sö in incultis Borris (Jylland) Daniæ.

4. **Saprolegnia diclina** Humphrey, Trans. Amer. Phil. Soc. XVII 3273 (1892) p. 109, t. 17, f. 50-57, *Sapr. dioica* De Bary (1888) non Pringsh. (1860) nec Schröt., nec Syll. fung. (ex errore typ. sub «divisa»). — Hyphis tenuibus, brevibus; zoosporangiis subcylindraceis; oogonis terminalibus, rarius in ramis lateralibus acrogenis, typice sphaericis, vix punctatis; ramis antheridialibus longis, flexuosis, tenuissimis, ex origine diclina; antheridiis ad quodque oogonium, ovoideo-clavatis, sæpe copiosissimis; oosporis pro more 10-12, rarius 20 aut pluribus, nonnumquam 4-6, sæpius c. 25 μ . diam.

Hab. in aquis Americæ borealis, vere frequens.

ACHLYA Nees — Syll. VII p. 274, IX p. 346, XI p. 245, 658, XVII p. 518.

1. **Achlya decorata** H. E. Peters., Ann. Mycol. (1910) p. 522, f. 3 *a* 3274 et *e*, ? *Achl. racemosa* var. *spinosa* Cornu. — Oogoniis globosis, dense racemose dispositis, sine foraminibus, spinis conicis non v. parum coloratis plus minus cuspidatis munitis; diam. oogon. sine emerg. 30-45 μ ., cum emerg. 45-70 μ .; ovo singulo; antheridiis (1-2) ut in *Achlya racemosa*.

Hab. in ramulis dejectis *Fraxini excelsioris*, Ermelunden Sjaelland Daniae.

2. **Achlya hypogyna** Coker et Pemberton, Botan. Gazette XLV (1908) 3275 pag. 194, fig. 1-6. — Hyphis tenuibus, sursum sensim tenuatis, basi 35 μ . cr., apice 8 μ . cr., optime vegetis usque ad 1 cm. alt.; zoosporangiis subcylindræis, parcis; oogoniis pro more ramis brevibus suffultis, racemose digestis, rarius subsolitariis, rarissime intercalaribus, globosis, rarius oblongis, membrana in lobulos breves rotundatos expansa, senio flava; oosporis 1-7, pro more 3-5, centralibus, 24-36 μ . diam.; atheridiis e ramulis oogonialibus, sub ipsis oogoniis nescentibus.

Hab. in aqua rivuli, Chapel Hill in Carolina super. Amer. bor. — Affinis *Achlyæ racemosæ*.

3. **Achlya caroliniana** W. C. Coker, Botan. Gazette vol. L (1910) 3276 p. 331, cum icon. — Hyphis subvalidis basi 48 μ . apice 20 μ . circ. crassis, cultis usque ad 1,5 cm. longis; zoosporangiis irregulariter cylindræis, 20-30 μ . circ. diam., operculis pluribus dehiscentibus; oogoniis copiosis, sphaeroideis, levibus, hyalinis; ramulis oogonialibus plerumque simplicibus v. etiam basi uno v. duobus ramulis incurvatis etiam oogoniatis præditis; oosporis plerumque 1-2, raro 3, rarissime usque ad 8, sphaeroideis, 18,5-26 μ . v. plerumque 22 μ . diam.; antheridiis nullis sed tubulis antheridialibus hypogynis basilaribus ut in *Ach. hypogyna*.

Hab. in culturis ex stagno pr. Chapel Hill N. C. Amer. bor. — Spectat ad sect. *Racemosarum* gen. *Achlyæ*, ad quam pertinent *Ach. racemosa* cum var. *stelligera* et *Ach. hypogyna*, quæ sectio his notis dignoscitur: ramulis oogoniferis brevibus, oogoniis terminalibus subracemosis; oosporis paucis, plerumque 1-2; antheridiis absentibus v. origine suboogoniali.

4. **Achlya oblongata** De Bary. — Syll. IX, p. 346. — var. **globosa** 3277 Humphr., Trans. Amer. Philosoph. Soc. XVII, 3 (1892) p. 122, tab. 19, fig. 90-91. — Oogonii ramulis brevissimis; oogoniis globosis; oosporis usque ad 25, plerumque 10-15, cetera typi.

Hab. in aquis dulcibus, Philadelphia et Auburn Amer. bor. (KELLER, ATKINSON).

5. **Achlya Hoferi** Harz C. O., Allg. Fischerei Ztg. (1906) pag. 365, 3278 *Achlyæ oligacanthæ* De Bary valde proxima, videtur differre antheridiorum defectu, oogoniis majoribus et plerumque elongatis et oosporis majoribus et copiosioribus.

Hab. in pinna dorsali piscis vivi *Cyprinus rex-cypri-*

norum dicti, quem valde et profunde vexat, in Germania. — Fungillus facile per contagium propagatur.

6. **Achlya De-Baryana** Humphrey, Saprolog. Unit. Stat. p. 117 — Syll. 3279 XIX, p. 6. — Huc spectat *A. polyandra* De Bary et Auct. pl., non Hild. — *A. polyandra* Hild. (1867), teste Humphr. l. c. p. 119 congruit cum *A. gracilipede* De Bary (1888) — Syll. IX, p. 346 — quæ valde affinis, tamen videtur differre ramis lateralibus ex oogonii pedicello tantum orientibus non ex ejusdem hypha primaria.
7. **Achlya prolifera** Nees — Syll. VII, p. 274. — Huc ducenda est 3280 *Achlya capitulifera* A. Braun in Cohn, Entw. mikrosk. Algen u. Pilze, tab. 17, fig. 21-25. — Syll. XIX, p. 5.

APHANOMYCES De Bary — Syll. VII p. 276, XVI p. 393.

1. **Aphanomyces coniger** H. E. Peters., Ann. Myc. VIII (1910) p. 525, 3281 tab. III, fig. *b* et *f*. — Mycelio ramoso, 5-15 μ . diam.; oogoniis sine foraminibus, membrana fusca processibus paucis conicis munita; ovo uno; oogoniis cum processibus 30-40 μ . diam.; processibus usque ad 8 μ . long.; oosporis 16-70 μ . diam.; antheridiis in ramis ramulisque partim androgynis partim e mycelio distante orientibus.

Hab. cum cellulis antheridialibus in cutibus Phryganæe fuscae in lacu Grib Sö Daniæ. — Habitus *Aphan. levis*.

PYTHIUM Pringsh. — Syll. XII p. 270, IX p. 347, XI p. 244, XIV p. 455, XVI p. 895, XVII p. 518.

1. **Pythium Indigoferæ** Butl., Mem. Dept. Agr. India I (1907) p. 73, 3282 t. II, f. 3-7. — Mycelio in foliis parco, denso in cultura aquea; hyphis magnitudine variis, c. 8 μ . diam., processibus lateralibus rotundis v. cylindratis, 12 μ . diam.; sporangiis raris, ramosis, sæpe minutis, lateraliter dehiscentibus; zoosporis 4-20; oogoniis in ramulis brevibus acrogenis v. in processibus inflatis lateralibus, 18-20 μ . diam.; antheridiis nunc filamentosis et singulis sub oogonio, ex ejusdem hypha enatis, rarius ex hypha aliena, nunc ex processibus lateralibus et tunc sæpe pluribus; pedicello antheridii subrecto, oogonii fortiter curvo; oosporis 14-16 μ . diam., rarius 13-18 μ .; germinatione rapida ex hypha, non ex zoospora.

Hab. epiphyticum in foliis Indigoferæ arrectæ in horto bot. Calcutta nec non cultum ad caules ejusdem sub aqua. — Affine *P. gracili* et *P. monospermo*.

2. **Pythium undulatum** H. E. Peters., Ann. Mycol. VIII (1910) p. 531, 3283

fig. 8 *a* et *d*, fig. 9. — Mycelio intramatrici difficili distinguendo; mycelio extramatrici ex hyphis non ramosis, longis, plus minus undulatis, diam. c. 3-6 μ . constantibus; zoosporangiis terminalibus, ellipsoideis, interdum parva papilla apicali instructis, circ. 130 \times 50; zoosporis duobus ciliis lateralibus munitis, diam. long. 15-20 μ ., in vesica ut in Pythio exeuntibus; hyphis in et per zoosporangia evacuata penetrantibus et zoosporangia nova formantibus; colore membranæ mycelii et zoosporangiorum leviter fusco; apparatu sexuali non viso.

Hab. in foliis et petiolis, rarius in gemmis, *Nymphææ* *albæ* et *Nupharis* *lutei*, in Dania.

3. **Pythium diacarpum** Butl., Mem. Dept. Agr. India I (1907) p. 80, 3284 t. II, f. 8-17. — Mycelio lentissime evoluta, intra et extra-matrici; hyphis tenuissimis, vix 1,5 μ . cr., rectis v. curvulis, parce ramosis; sporangiis sphericis, circ. 30 μ . diam., acrogenis fere æqualiter altis, numquam a substrato remotis; tubis emissariis sporangium pluries superantibus, sæpe spiralibus v. undulatis, denique hyphæ diametro duplo crassioribus, tuborum apice vesiculoso-inflato, demum aperto; zoosporis majusculis mox quiescentibus, indeque zoosporam alteram (diplanetice) generantibus.

Hab. saprophytice in plantis dejectis pr. Friburgum i. Br. Germaniæ.

4. **Pythium palmivorum** Butler, Mem. Dept. Agr. India I (1907) p. 82, 3285 t. IV, f. 2-10 et Memories of the Pusa Instit. Bull. n. 9 (1908). — Maculas siccas, brunneas, profundas in vaginis fol. generans; mycelio intercellulari, haustoriis vero intra cellulas penetrantibus; hyphis latis, interdum irregulariter inflatis, 7 μ . diam., ramosis, haustoriis digitatis; sporangiis obverse piriformibus, raro subrotundis, acrogenis, 50 \times 35; zoosporis 8-10 μ . diam.; oosporis sphericis, 35-45 μ . diam., membrana 4 μ . cr.

Hab. parasitica in vaginis foliorum *Borassi* *flabelliferi*, *Cocos* *nuciferæ* et probab. *Areçæ* *Catechu*, Godavery Indiæ or. — Species valde noxia. In nonnullis notis cum *Phytophthora infestante* cognata.

5. **Pythium Daphnidarum** H. E. Peters., Ann. Myc. VIII (1910) p. 530, 3286 fig. 8 *b* et *g*. — Mycelio intramatrici glomerato hyphas extramaticales (breves) plus minus clavatas emittente; diam. hyph. c. 3-5 μ .; zoosporangiis ut in sectione *Aphragmio*; zoosporis in vesica exeuntibus duobus ciliis lateralibus ut in Pythio munitis; oogoniis et antheridiis intramatricibus; oogoniis diam. circ. 30 μ .,

globosis, membrana tenui instructis, ovum unum, diam. c. 22 μ . continentibus; antheridio uno ex hypha originis dubiæ.

Hab. in *Daphnia hyalina*, *D. cucullata* et *Bosmina Coregoni* in lacubus Fure Sö, Esrom Sö et Hald Sö Daniæ.

6. **Pythium rostratum** Butl., Mem Dept. Agr. India I (1907). — 3287

Hyphis crassiusculis, usque ad 6-8 μ ., apicem versus tenuatis, irregulariter ramosis; sporangiis globosis terminalibus 28 μ . diam. v. ovoideis intercalaribus, 34 \approx 23, tubis emissariis majusculis, diametrum sporangii æquantibus, plerumque lateralibus; oogoniis 21 μ . lat. et paullo longioribus, oospora farctis; antheridiis plerumque singulis et ex hypha oogoniophora orientibus; oosporis sphericis, levibus, sæpius 20 μ . diam.

Hab. saprophytice ex humo Horti Villa Thuret, Antibes Galliæ. — Ab affini *P. De-Baryano* differt sporangii tubulis multo longioribus, oospora oogonium omnino implente etc.

PYTHIACYSTIS R. E. Smith, Bot. Gaz. XLII (1906) p. 215 (Etym. *pytho* putrefacio et *cystis* vesica). — Parasitica in plantis vivis v. saprophytica in aquosis. Mycelium tenue, septatum, sympodialiter ramosum, sporangiis copiosis terminalibus donatum. Mycelium aquaticum, typice sterile, raro conidia et sporangia gerens, hyphis crassis et robustis continuis, copiose ramosis compositum. Sporangia subrotunda v. ovoidea, intus zoosporis biciliatis, mox mobilibus et per porum terminalem exeuntibus fœta. Conidia sporangiis similia, directe germinantia. Propagatio sexualis non observata. — A gen. *Pythio* formatione zoosporarum, a *Pythiopside* toto habitu differt; inter *Saprolegniaceas* et *Peronosporaceas* genus medium.

1. **Pythiacystis citrophthora** R. E. Smith, l. c., pag. 215, Duggar, 3288

Fungus Dis. of Plants (1910) p. 144, cum icon. — Sporangia limoniformia, 30-90 \approx 20-60, plerumque 50 \approx 35, apice subpapillata, hyalina, hyphis tenuibus ramosis racemosis suffulta; zoosporæ longe, plerumque ex uno latere, biciliatæ.

Hab. in fructibus Citri Limonis in California et in Italia boreali (Padova). — Fructus affecti brunneo-maculantur et odorem peculiarem subresinaceum fundunt. In America morbus (*brown rot of the lemon* dictus) satis diffusus et gravis; in Italiam post c. 1885 non videtur se diffudisse.

PYTHIOMORPHA H. E. Peters., Ann. Myc. VIII (1910) p. 528 (Etym. *Pythium* et *morphe* forma). — Mycelium ramosum, membrana

chlor. zinc. jodato rubro-violaceo colorata; propagatio adhuc cognita zoosporis, duobus ciliis lateralibus munitis, vesica non cinctis exeuntibus efficitur.

1. **Pythiomorpha gonapodyoides** H. E. Peters., l. c., fig. 7-8. — My- 3289
celio intramatrici irregulariter ramoso, tumentiis et parietibus undulatis instructo; mycelio extramatrici hyphis erectis non ramosis diam. 4-5 μ . constante; zoosporangiis terminalibus ovalibus 44 \times 22; zoosporis, ut in Saprolegnia, non vesica cinctis, exeuntibus, ellipsoideis, duobus ciliis lateralibus munitis, diam. 10 μ .; hyphis in et per zoosporangia evacuata penetrantibus et nova sporangia repetite formantibus; oogoniis et antheridiis non observatis; chlor. zinc. jodato hyphis colorem rubro-violaceum contrahentibus.

Hab. in fructibus dejectis submersis Piri Mali et in ramulis dejectis Alni sp., in Dania.

RESTICULARIA Dang. — Syll. IX p. 348.

1. **Resticularia Boodlei** Fritsch Ann. of Bot. XVII (1903) pag. 649, 3290
t. 29, fig. 1-18. — Mycelio intramatrici, 5-8 μ . cr., hinc inde septato v. continuo, noduloso, raro ramoso, mycelio extramatrici 1,5-5 μ . cr., copiose ramoso; infectionis hyphis copiose evolutis; sporis perdurantibus numerosis imprimis ad ramos laterales hypharum extrorsum directarum orientibus, sæpe in catenulas superimpositis et tunc tenuius tunicatis, sed crassioribus, 12-15 μ . diam.

Hab. in filamentis Tolypotruchis in Anglia. — Sporangia et zoosporæ ignotæ.

SYNCHÆTOPHAGUS Apstein, in Wissensch. Meeresunters Abt. Kiel, XII (1910) p. 163-166, c. fig. (Etym. *Synchæta* ex Rotatoriis et *phagos* devorator). — Zoosporæ ex animalculi superficie per tubulum emergentem intra corpus penetrantes et mycelium varie ramoso-sinuosum totam animalis cavitatem occupans exerentes; mycelii plasmate denique hinc inde præsertim in ramulis, globuloso-condensato et zoosporas formante. — Genus ulterius inquirendum.

1. **Synchætophagus balticus** Apstein, l. c. — Characteres generis. 3291
Zoosporæ 5-8 μ . diam.

Hab. in corpore *Synchætæ* monopodis in mare Baltico. — Cl. Apstein, in Mitteil. des Deutsch. Seefischerei-Vereins. n. 10 (1910), exhibet notas quasdam novi generis et speciei fungilli,

quam *Cycloptericola marina* nuncupat, in stomacho piscis *Cyclopteri Lumpi* in mari Baltico lecti. Fungillus prima ætate præbet protosporas globosas, 22 μ . diam, intus granulosas, ex quibus oritur mycelium filiforme usque ad 100-125 μ . longum, sporas globosas proferens. Ulteriores notæ desiderantur.

Fam. 5. Peronosporaceæ DE BARY.

CYSTOPUS Lév — Syll. VII p. 233, IX p. 340, XI p. 242, XIV p. 458, XVI p. 396, XVII p. 519.

1. **Cystopus Swertiæ** (Berl. et Kom.) Sacc. et Trott., *Albugo Swertiæ* 3292 (Berl. et Kom.) Wils., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) p. 72, *Cystopus Convolvulacearum* Speg. var. *Swertiæ* Berl. et Kom. in Berl. Saggio Monogr. Peronosp. Portici (1903) pag. 100. — Soris sparsis, ovoideo-rotundatis, parvis, 1,5 mm. long., confluenso longioribus v. sinuosis, hypophyllis, albido-lutescentibus, demum epidermide rupta pulverulentis, inflatulis; conidiophoris clavatis parallele dense stipatis; conidiis e globoso cuboideis, medio anulo interno incrassato distinctissimo præditis, 12-16 \approx 11-13, hyalinis; oogoniis globuloso-ovoideis, membrana tenui præditis; oosporis globosis, perinio amœne denseque reticulato-papillulato, 45-50 μ . diam., luteis.

Hab. in foliis vivis *Swertiæ* cognatæ, Amur Mancuriæ rossicæ (KOMAROFF).

2. **Cystopus Trianthemæ** (Wils.) Sacc. et Trott. *Albugo Trianthemæ* 3293 Wils., Bull. Torr. Bot. Club XXXV (1908) p. 361. — Soris hypophyllis, rotundis v. irregularibus, rarius confluentibus, immersis prominentibusque, subflavidis, 1-10 mm. lat.; conidiophoris cylindraceis, 60 \approx 10; conidiis subflavis breviter cylindraceis, 8-10 μ ., terminalibus majoribus, 12-14 \approx 9-11, membrana hyalina, ad medium anulo cincta; oosporis in foliis hospitis globosis, 60-80 μ . diam., episporio brunneo regulariter vel irregulariter reticulato, areolis 4 μ . diam.

Hab. in foliis *Trianthemæ* Portulacastri, Las Cruces New Mexico Amer. bor. (E. O. WOOTON).

3. **Cystopus Bliti** (Biv.) De Bary — Syll. VII, p. 236. — f. **Achyranthis** P. Henn., in Fl. du Bas- et Moy. Congo, in Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) p. 85.

Hab. in foliis *Achyranthis asperæ*, Kisantu Congo, Afr. trop. (VANDERYST). — Nisi matrice vix ulla nota a typo dignoscitur.

4. **Cystopus occidentalis** (Wilson) Sacc. et Trott., *Albugo occidentalis* 3295
Wilson, Bull. Torr. Bot. Club XXXIV (1907) pag. 80, fig. 9. — Soris hypophyllis, subrotundis v. irregularibus, rarius confluentibus, superficialibus, prominentibus, subflavidis, 1-3 mm. cr.; conidiophoris cylindræis, c. $40 \approx 12$; conidiis flavidis, breviter cylindræis, 14-20 \approx 8-16, membrana hyalina, ad medium anulo cincta; oosporis in hospitis foliis, globosis, luteo-brunneis, regulariter tenuiterque reticulatis, 50-60 μ . diam., areolis pentagonis v. hexagonis, 2 μ . c. cr.

Hab. in foliis *Bliti capitati*, Box Cañon Colorado et *Chenopodii rubri*, Montana, Amer. bor.

5. **Cystopus Frælichiae** (Wils.) Sacc. et Trott., *Albugo Frælichiae* Wils., 3296
Bull. Torr. Bot. Club, XXXV (1908) p. 362, *Albugo Cladothricis* Wils., Science II, 27 (1908) p. 207. — Soris hypophyllis v. cauliculis, superficialibus prominentibusque, albis v. subflavidis, subrotundis v. irregularibus, 1-3 mm. latis; conidiophoris subfusiformibus, elongatis, 70-85 \approx 12-18; conidiis subflavidis, breviter ellipsoideis, terminalibus minoribus, globosis, 12-20 \approx 10-18, membrana subflavida, ad medium anulo cincta; oosporis in foliis hospitis brunneis, globosis, 45-80 μ . diam.; episporio irregulariter v. regulariter reticulato, areolis 7 μ . diam.

Hab. in foliis *Frælichiae gracilis*, Denton Texas Amer. bor. (W. H. LONG).

6. **Cystopus Gomphrenæ** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 3297
(1909) p. 283, *Cyst. Bliti* Speg. olim, non Biv. — Conidiis eximia cuboideis, 16-18 μ . diam., tenuiter tunicatis, hyalinis, levibus; oosporis globosis, 75-90 μ . diam., fusco-ferrugineis, opacis, levissimis.

Hab. in foliis vivis *Gomphrenæ perennis* prope S. Juan et Mendoza, nec non in foliis *G. umbellatæ* in Salta et Jujuy, Amer. austr.

PHYTOPHTHORA De Bary — Syll. VII p. 237, IX p. 341, XVI p. 396.

1. **Phytophthora Thalictri** Wils. et Davis, Bull. Torr. Bot. Cl. XXXIV 3298
(1907) p. 392. — Hypophylla; maculas foliorum in hypophyllo suborbiculares v. irregulares subglaucas, in epiphyllo nigricantes brunneo-marginatas generans; conidiophoris fasciculatis ex stomatibus exeuntibus, subsparsis, continuis, laxis, subflexuosis, 300-

400 \approx 5-7, plerumque 1-2 ramos gerentibus; inflationibus subconidialibus anguste conicis, vix ramum duplum æquantibus; conidiis ellipsoideis, apice papillatis, 20-27 \approx 13-17; oosporis ignotis.

Hab. in foliis *Thalictri purpurescantis*, Wisconsin Amer. bor. (WILSON). — Affinis *Ph. infestanti*.

2. **Phytophthora Faberi** Maubl., in L'Agricult. prat. des Pays chauds, 3299 n. 79 (1909) p. 315, *Phytophthora Theobromæ* Lesl. C. Coleman, Ann. Mycol. VIII (1910) pag. 621, c. ic. — Maculis irregulariter brunneis; mycelio ramoso, primum continuo demum septato; sporangiophoris 150-200 μ . longis; haustoriis non visis; sporangiis plerumque ovoideis sed magnitudine variabilibus, 42-80 \approx 25-30; oogoniis intramatricialibus; antheridiis nullis v. raris; oosporis plerumque parthenogenetice ortis, cavitatem oogonialem late occupantibus, sphæroideis, elongatis v. irregularibus 22-45 μ . diam.

Hab. parasitice in fructibus *Theobromæ Cacao*, *Heveæ brasiliensis*, *Artocarpici incisæ* in India or.

3. **Phytophthora Syringæ** Klebahn, Krankheiten des Flieders, Berlin 3300 (1909) p. 18, *Phlæophthora Syringæ* Klebahn, in Centralbl. Bakt. II, Abt. XV (1905) p. 336. — Mycelio intercellulari, ramoso, continuo, haustoriis filiformibus cellulas penetrantibus; sporangiis ovoideis v. ellipsoideis, 40-75 \approx 30-42, sympodialiter evolutis; zoosporis ovoideis, asymmetricis, lateralter 2-ciliatis, brevior 16-18 μ . longo, sursum tenuato, longior 23-30 μ . longo, retrorsum verso; oogoniis et antheridiis in matricis contextu nidulantibus; oosporis singulis in quoque oogonio globosis, rarius ovoideis, 18-36 \approx 17-25, membrana crassa, flavida, levi.

Hab. in foliis ramulis, gemmis, floribusque *Syringæ vulgaris*, cui maxime noxia, in Germania.

4. **Phytophthora Cactorum** (C. et Leb.) Schröt. - Syll. VII, p. 328. 3301 — var. **Arecæ** L. C. Coleman, Ann. myc. VIII (1910) p. 620. — A typo differt oosporis majoribus, nempe 23-36 μ . diam.; sporangiis interdum intercalaribus; mycelio inter- et intracellulari, serius tantum septato; haustoriis sparsis, subdigitatis, subinde dichotome ramosis.

Hab. ad basim foliorum in fructibus et pedunculis *Arecæ Catechu* in Mysore occid., Canara bor. et merid., Malabar austr. et Cochin Indiæ orient.

KAWAKAMIA Miyabe, Bot. Mag. Tokyo XIX (1905) p. (88) (Etym. a cl. T. KAWAKAMI, qui fungum scrutatus est). — Ab affini gen.

Phytophthora dignoscitur conidiis prominenter rostratis et pedicello velut appendice in conidio persistente.

1. **Kawakamia Cyperi** (Miyabe et Ideta) Miyabe, l. c., *Peronospora* 3302
? *Cyperi* M. et I. in Ideta Lehrb. d. Pflanzenkr. in Japan p. 122, f. 20. — Matricis calamis initio læte flavis demum rubro-brunneis, flaccescentibus; conidiis $68 \approx 32$, rostro $15 \approx 9$, facile secedente præditi, serius evolutis et areas calami affectas cæspitulis albo-araneosis obtegentibus.

Hab. in calamis *Cyperi* tagetiformis in Japonia et Sinis ubi spontanea et Texas Amer. bor. ubi importata et valde noxia. — Conidia in exempl. americanis paullo longiora. Cfr. Patterson, Charles et Veihmeyer in U. S. Dep. of Agric. Bull. 171 (1910).

PLASMOPARA Schröt. — Syll. VII p. 239, IX p. 342, XI p. 243, XIV p. 360, XVII p. 520.

1. **Plasmopara Melampyri** Bucholtz, in Korrespondenzbl. d. Naturf.-Vereins Riga LII (1909) p. 166. — Mycelio haustoriis saccatis v. piriformibus præditi, densiusculo, non tamen pannoso, inter foliorum pilos effuso, sordide griseo; conidiophoris in ramos primarios parcos rectos diviso, ramulis ultimis non dilatatis et extensis (ut *Pl. densa*), sed potius *Peronosporæ* ad instar formati; conidiis ovoideis, acutatis, majusculis, $29-33 \approx 17-22$; germinatione et oosporis hucusque ignotis.

Hab. in foliis *Melampyri nemorosi* pr. Arensburg Rossia.

2. **Plasmopara Wildemaniana** P. Henn., in Fl. du Bas-et Moy.-Congo, in Ann. Mus. du Congo v. II, fasc. II (1907) p. 85. — Maculis rotundato-effusis, fuscidulis; cæspitulis niveo-floccosis, hyphis conidiophoris fasciculatis, rigidis c. 400-450 μ . altis, basi c. 10-13 μ . cr., ramosis, ramis lateraliter ramulosis, apice ($6-8 \approx 2$) acutiusculis; conidiis subglobosis v. late ellipsoideis, hyalinis, 8-10 μ ., oosporis haud conspicuis.

Hab. in foliis *Acanthaceæ* sp. (*Justicia?*), Kisantu Congo Afr. trop. (VANDERYST).

3. **Plasmopara Humuli** Miyabe et Takahashi, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. (1906) pag. 149 (*Peronoplasmopara*). — Descriptio desideratur.

Hab. in *Humulo Lupulo* cui valde noxia in Japonia.

SCLEROSPORA Schröt. — Syll. VII p. 238, IX p. 341, XIV p. 461, XVII p. 520.

1. **Sclerospora Farlowii** Griff., Bull. Torr. Bot. Club, XXXIV (1907) 3306 p. 207. — Maculis irregularibus decoloratis, griseo-nigris, margine saturatioribus, in foliis vaginis et culmis, raro in inflorescentiis, insidentibus; oosporis subglobosis, 28-45 μ . diam., obscure fuscis, sæpe nigris et opacis, in parenchymate immersis, sepositis portiunculis mycelii adhærentis præditis.

Hab. in Chloride eleganti, Cochise, Arizona Amer. bor.

PERONOSPORA Corda — Syll. VII p. 244, IX p. 342, XI p. 243, XIV p. 458, XVI p. 397, XVII p. 521.

1. **Peronospora Ononidis** G. W. Wilson, Ann. Mycol. (1910) p. 185. 3307 Hypophylla sparsa; conidiophoris 200-500 \times 7-9, 6-8-ies ramosis, ramis angulato-divergentibus, rectis v. sæpius recurvatis, pænul-timis et ultimis subæqualibus, rectis v. lateralibus sæpius recurvatis, 8-14 \times 2-3; conidiis late ellipsoideis, 21-25 \times 15-20, pallide violaceis; oosporis globosis, c. 32-38 μ . diam., episporio aureo-brunneo, densissime minuteque tuberculato, tuberculis c. 1 μ . cr.; oogoniis fugacibus.

Hab. in foliis Ononidis repentis in Germania (SYDOW, Myc. March. n. 1441; Phyc. Prot. n. 111), Ononidis spinosæ in Dania (ROSTRUP, Myc. univ. n. 616).

2. **Peronospora Calandrinia** Speg., An. Mus. Nac. B. Aires t. XIX 3308 (1909) p. 283. — Maculis nullis; hyphis conidiiferis hypophyllis, valde laxis, erectis, 200-350 \times 10-15, deorsum simplicibus sursum non v. obsolete dichotomis, ramulis ultimis 20-50 \times 5-6, rectiusculis, obtusiusculis, minute laxaque papillulosis; conidiis ut hyphis hyalinis, ellipsoideis utrinque rotundatis, 15-20 \times 12-15, levibus, acrogenis v. pleurogenis.

Hab. in foliis vivis Calandrinia portulacoidis in excelsis andinis Aconcaguae (4000 m. alt.) prope las Cuevas, Mendoza Amer. austr. — Insertione conidiorum abnormis et a *Per. Claytonia* toto cælo diversa.

3. **Peronospora andina** Speg., An. Mus. Nac. Buenos Aires t. XIX 3309 (1909) p. 282, fig. 3. — Cæspitulis conidiiferis plerumque hypophyllis folium plus minusve deformantibus, dense constipatis, crispulo-lanuginosis, cinerescentibus; hyphis erectis 1-2 mm. long., 10 μ . cr., in dimidio infero simplicibus, superne plus minusve alterne ramosis, ramulis ultimis subdichotomis, incurvulis, acutis; conidiis levibus, 25 \times 15, antice rotundatis, postice rostrato-acutatis, primo hyalinis serius fumosis, intus dense minuteque granulosis.

Hab. in foliis vivis *Euphorbiæ rhytispermæ*, pr. Mendoza Amer austr. — A *Peronospora Euphorbiæ* longissime recedens ne quidem comparanda.

4. **Peronospora effusa** (Grev.) Rabenh. — Syll. VII, pag. 256. — 3310
Hujus forma est *Peronospora Spinaciæ* Laubert, Gartenfl. XV (1906) p. 461.

MYCELOPHAGUS Mangin, C. R. Ac. Sc. Paris CXXXVI (1903) p. 471
(Etym. *mycelium* et *phago* edo). — In mycorrhizis *Castanææ* parasiticus et eas necans. Hyphæ apicibus inflatæ, ibique (raro!) sporas modo tenuiter modo crasse tunicatas gerentes, oosporas *Peronosporarum* imitantes, tunica *callosæ* characteres præbente. — Genus omnino dubium et a mycologis recentioribus non memoratum.

1. **Mycelophagus Castanææ** Mangin, l. c. p. 471. — Char. generis. 3311
Hypharum apices usque ad 20 μ . inflantur.

Hab. in radicibus *Castanææ vescæ* in Galliæ pluribus locis. — Esset causa pathogena morbi *de l'encre* dicti, qui tamen alii myceti certe adscribendus est.

MUSEO
INSTITUTO DE BOTANICA
"SPEGAZZINI"
BIBLIOTECA

Registro No. 49

Ubicación

Proced. Leg. Spegazzini.

Fecha

APPENDIX

(Species omissæ et emendationes).

1. **Tricholoma cyclophilum** (Lasch) Sacc. et Trott., *Agaricus cyclophilus* Lasch in Kl. Herb. viv. myc. n. 309, Linnæa III (1828) p. 429. 3312
— Pileo compacto, obtuso, subalutaceo v. isabellino, 6-12 cm. lat., medio 12 mm. cr., fibrillulis innatis prædito; lamellis vix adnexis postice rotundatis, confertis subangustis pallidis, subcavis passim furcatis, demum luridis; stipite basi leviter bulboso, lanato 5-8 cm. long., 18-25 mm. cr. albido v. pileo subconcolori, bulboso, fibroso; carne alba; sapore grato, subdulci, odore Ireos florentinæ.
Hab. in nemorosis in Marchia Brandenburg. — Plerumque gregarium v. subcæspitosum; sæpius usque ad 500 specimina circum magnum formant. Ex ipso auctore l. c. forte var. *Tr. personati*.
2. ? **Armillaria lutincola** Lasch in Kl. Herb. viv. myc. (1853) n. 1707, 3313
Flora 1855, p. 200 (*Agaricus*). — Cæspitosa, fusca; pileo subcarnoso, glabro; lamellis adnatis, dentibus ad anulum lacerum lineatim decurrentibus; sporis ovoideis; stipite e farcto cavo, sæpe excentrico.
Hab. ad latera viarum cavarum solo lutoso pr. Driesen Germaniæ, autumnno.
3. **Naucoria semiorbicularis** Bull. — Syll. V, p. 844. — var. **robusta** 3314
Herpell, Hedwigia 49 (1909) p. 167. — Gregaria et omnibus partibus robustior; stipite usque ad 8 mm. cr., ruguloso-squamuloso intus canaliculo 5 mm. diam. prædito; sporis apiculatis 12-15 × 7-8.
Hab. ad terram in Germania.
4. **Laschia favosa** (Fr. Brig.) Sacc. et Trott., *Pistillaria ? favosa* Fr. 3315
Brig., in Annali dell' Accad. degli aspiranti naturalisti. Napoli III ser. 1 vol. (1861) p. 26, tab. I, f. 5-8. — Solitaria, minima, obovata, subcompressa, nudo oculo punctata, per lentem reticulato-favosa, flavo-viridis, in stipitem brevissimum basi tenuata.
Hab. ad corticem vetustum Ficus Caricæ, Neapoli (O. G. Costa). — Carnosa, simplicissima, vix 0,5 mm. diam., tubo optico visa perbelle ejusdem superficies cellulis sexangularibus, veluti apum favis, exornata apparet; cellulae vero stipitem versus gra-

datim oblongæ, strictæ intus rugis 6-10 dentiformibus insignitur. Arefacta fit pallida, persistens. Videtur minima species hujus generis probabil. e subgen. *Favolaschiæ* saltem ex icone; sed dubia manet, potissimum quia genus sit ut plurimum extraeuropæum.

5. **Tilletia pulcherrima** Ell. et Gallow., in Clint. Proc. Bost. Soc. N. 3316 H., XXXI (1904) p. 441. Cfr. supra p. 519. — Soris ovaria elliptico-elongata sæpeque curvata inter glumas dilatatas posita occupantibus, 3-4 mm. long.; cellulis hyalinis sterilibus crasse tunicatis, sæpius sporâ minoribus; sporis subsphæricis v. sphæricis maturitate opacis, episporio plus minus manifesto hyalino præditis, 20-30 μ . diam., squamuloso-spinulosis, spinulis hyalinis v. opacis, acutis v. truncatis, areas polygonales formantibus.

Hab. in ovariis Panici obtusi, P. virgati, P. sanguinalis, Illinois, Mississippi, Nebraska et Arizona Americæ borealis.

6. **Sorosporium Borrichiæ** Ell. et Ev. (Cfr. supra pag. 515). — Glo- 3317 merulis seu sporis compositis globosis, 30-80 μ . diam., multicellularibus, cellulis seu sporis globosis, minutis, 3 μ . diam., levibus, atro-brunneis, conglobatis fere nigris.

Hab. in floribus Borrichiæ argenteæ, quos omnino occupat et destruit, in insula Cozumel Antillarum. — Tabula citata LII non adest in meo exempl.

7. **Ravenelia zeylanica** Diet., in Beih. Bot. Centralbl. XX, 2. Abt., 3318 pag. 399 (1906) — Cfr. et in Hedw. XXXIII, tab. 2, fig. 6. — Soris per cuticulam erumpentibus eaque margine cinctis, amphigenis sed in hypophyllo magis copiosis, minutis, acervulatis, sæpe concentricè dispositis; uredosoris luteo-brunneis, uredosporis ellipsoideis vel obovatis, 24-34 \times 17-23, pallide brunneis, aculeolatis, poris germinativis 4 æquatorialibus præditis; paraphysibus nullis; teleutosoris atris; capitulis modicè curvatis, ambitu circularibus v. elongatis, typicè non ultra 105 μ . latis; sporis plerumque 6-7, margine tantum tenuiter verruculosis vel etiam omnino levibus, 15-20 μ . latis, episporio apicè usque ad 8 μ . crasso; cellulis cystoideis confertis, sporas numero æquantibus, ovoideis, aqua tumescentibus.

Hab. in foliis Gleditschiæ sp., in ins. Ceylon. — Species cum *R. sessili* jam conjuncta sed distinguenda. Sporæ in quoque capitulo usque ad 40.

8. **Ravenelia Henningsiana** Diet., in Beih. Bot. Centralbl. XX, 2. Abt., 3319 pag. 388 (1906). — Soris in maculis luteis vel brunneolis insidentibus, sparsis, epiphyllis, subepidermicis, minutis, uredosoris ochra-

ceis, teleutosoris brunneo-atris, epidermide anguste rupta velatis; uredosporis oblongis, obovatis vel piriformibus vel etiam clavatis, 24-33 \times 14-20, episporio tenui, pallide brunnea, breviter et laxe aculeolatis, poris germinativis 4 æquatorialibus; paraphysibus nullis; capitulis hemisphæricis, curvis, ambitu subcircularibus, plerumque 70-100 μ . latis, separatis minoribus; teleutosporis 4-6, unilocularibus, usque ad 25 μ . latis; episporio castaneo-brunneo, apice parce incrassato, verrucis minutis, brunneis, usque ad 3 μ . altis, prope marginem capitulorum magis copiosis, superne fere nullis ornatis; cellulis cystoideis ovoideis, deorsum prominulis, haud magnis, sporas numero æquantibus; pedicello deciduo, non viso.

Hab. in foliis *Piptadeniæ* sp., Tijuca, Rio de Janeiro Brasiliæ (E. ULE).

9. **Trametes malicola** Berk. et Curt. in Journ. Acad. N. S. Philad. 3320 III (1856) p. 209. — Imbricata, lignea; pileis dimidiatis, postice decurrentibus, subvillosis, subzonatis, ligneo-umbrinis; poris mediis, dissepimentis crassis, subtomentosis.

Hab. ad truncos Piri Mali in Amer. bor. — Cl. Schweinitz habuit pro *Tram.* (*Fomes*) *populina* sed, observante cl. Berk., certe differt poris latioribus, colore saturatiore.

10. **Trametes cingulata** Berk. in Hook. Journ. of Bot. VI (1854) 3321 p. 164. — Pileo tenui, suberoso, reniformi, crebre zonato, subtiliter pubescente; stipite laterali disciformi; poris minutis punctiformibus, acie integra obtusa. = *Polyp. DeCaraci* Hk. x *Obol.* V


Hab. ad ligna emortua, Soane river Indiæ orient. (HOOKER). — Pileus albidus, flavido-zonatus, 6-12 cm. lat., 2-3 mm. cr.; pori 200-250 μ . diam.

11. **Corticium Bresadolianum** Sacc. et Trott. Ita dicatur *C. Bresadolæ* Sacc. et Trott., supra p. 389, n. 1498; nam adest homonymon anterius; cfr. supra p. 391, n. 1505.

12. **Peniophora argentinensis** Speg., supra p. 413, n. 1590, transferatur ad suum genus, supra p. 409, post n. 1570.

13. **Lloydia papyracea** (Jungh.) Bres., supra p. 388, n. 1491, transferatur ad ceteras gen. species *Lloydiaellæ*, supra p. 405.

14. **Hymenochæte Pini** (Pat.) Sacc. et Trott., supra, p. 404, transferenda est ad suum genus, supra p. 388.



REPERTORIUM

FUNGORUM IN VOL. XXI DESCRIPTORUM

secundum matrices (vegetabilia et animalia)

Obs. — Ga. *Gasteromycetæ* — Hy. *Hymenomycetæ* — Phyc. *Phycomycetæ* —
Ur. *Uredinaceæ* — Ust. *Ustilaginaceæ*.

- Abies — Hy. 46, 124, 215, 217, 228, 244,
307, 509, 758, 782, 895, 899, 1041,
1163, 1395, 1503, 1546, 1616, 1761,
1765, 1772. — Ur. 2334, 2823-2825.
Abrus — Ur. 2798, 3018.
Acacia — Hy. 83. — Ga. 1879. — Ur.
2183-2185, 2311-2317, 2813-2815,
2820, 2846, 2886-2888, 3023, 3024.
Acalypha — Ur. 2339, 2575, 2964, 3058.
Acanthaceæ — Ur. 2217, 2937, 2941.
Acantholimon — Ur. 2243.
Acanthopanax — Ur. 2894.
Acer — Hy. 344, 693, 1525, 1528.
Achillea — Ur. 2485.
Achlya — Phyc. 3239.
Achyranthes — Phyc. 3294.
Achyrocline — Phyc. 3222.
Acinetospora — Phyc. 3204.
Acnistus — Ur. 2947.
Aconitum — Ur. 2848.
Aconodia — Ur. 2409.
Acrosiphonia — Phyc. 3233, 3235.
Acrostichum — Hy. 1751.
Actinidia — Ur. 2865.
Adathoda — Ur. 2332, 2940.
Adenostyles — Ur. 2238, 2258, 2743.
Adinandra — Hy. 1737.
Æchmanthera — Ur. 2938.
Æchmea — Hy. 1641.
Æluropus — Ur. 2711.
Æschinomene — Ur. 3010, 3012.
Agaricaceæ — Phyc. 3128.
Agoseris — Ur. 2616.
Agrimonia — Ur. 2388, 2785.
Agriotes — Phyc. 3183.
Agropyrum — Ur. 2299, 2700-2702.
Agrostis — Phyc. 3251. — Ur. 2288,
2660-2662.
Aira — Ust. 2052. — Ur. 3117.
Ajuga — Ur. 2932.
Albuca — Ust. 1954.
Alchemilla — Ur. 2114, 2423, 2753.
Alethopteris — Phyc. 3265.
Allium — Ur. 2260, 2265.
Alnus — Hy. 164, 344, 742, 1296, 1322,
1397, 1535, 1550, 1560, 1745, 1757,
1776, 1787.
Alocasia — Ur. 2995.
Alopecurus — Ur. 2308.
Alsine — Ur. 2113.
Ambrosia — Phyc. 3247.
Amelanchier — Ur. 2377, 2813-2844.

- Ammochloa* — Ust. 2059.
Amorpha — Ur. 2879.
Amphipogon — Ust. 1981.
Amphistelma — Ur. 2566.
Ananas — Hy. 725.
Anaphalis — Ur. 2236.
Anastrophia — Ur. 3037.
Anchietea — Hy. 1721.
Andromeda — Hy. 1628.
Andropogon — Ust. 1987-1998, 2023, 2033, 2034. — Ur. 2294, 2305, 2644-2650, 3107, 3108.
Androsace — Ur. 2554. — Phyc. 3230.
Androsæmum — Ur. 2989.
Angelica — Ur. 2436, 2438, 2441.
Anisomeles — Phyc. 3220.
Anona — Hy. 1039.
Anonaceæ — Ur. 2788.
Anthemis — Ur. 2468.
Anthericum — Ur. 2984.
Anthistiria — Ust. 1979, 2020, 2026.
Anthoxanthum — Ur. 2685, 3105.
Anthurium — Ur. 3075.
Anthyllis — Phyc. 3229.
Aotus — Ur. 2361.
Apera — Ur. 2659.
Apium — Ur. 2445, 2878.
Apluda — Ur. 2298, 2304, 2696.
Apocynum — Ur. 2952.
Aporosa — Ur. 2718.
Aposeris — Ust. 2077.
Aquilegia — Ur. 2701.
Arctostaphylos — Hy. 1628.
Areca — Phyc. 3285, 3301.
Arenaria — Ur. 2112.
Argithamnia — Ur. 2960.
Arisæma — Ur. 2275.
Aristida — Ust. 1978, 2009, 2028, 2089.
Arjona — Ust. 2083.
Armeria — Ur. 2242.
Arnica — Ur. 2735.
Aronicum — Ur. 2488.
Arrhenatherum — Ur. 2189.
Artemisia — Ur. 2489, 2596, 3041.
Arthraxon — Ur. 2695, 3115.
Artocarpus — Hy. 278. — Phyc. 3299.
Arundinaria — Ur. 2627.
Arundinella — Ust. 2095. — Ur. 2642-2643, 3090, 3091.
Asclepiadaceæ — Ur. 2951.
Asclepias — Ur. 3052, 3054.
Asimina — Hy. 1092.
Asperula — Ur. 2521-2522.
Asphodelus — Ur. 2582.
Aspidium — Hy. 1740. — Ur. 3119.
Asplenium — Ur. 2329, 3121.
Astragalus — Ur. 2152-2154.
Astrantia — Ur. 2574.
Asystasia — Ur. 2544, 3064.
Athyrium — Phyc. 3224.
Atriplex — Ur. 2252.
Atropis — Ur. 2303.
Atylosia — Ur. 2876.
Avena — Ur. 2669.
Axinophyllum — Ur. 2500.
Baccharis — Ur. 2458.
Bambusa — Hy. 277, 432, 442, 1539, 1639, 1722, 1746. — Ur. 2629.
Bambusaceæ — Ur. 2594.
Batatas — Phyc. 3154.
Bauhinia Ur. — 2167-2182, 3022.
Beckera — Ust. 1977.
Beckmannia — Ur. 2694.
Begonia — Ur. 2729.
Belamcanda — Ur. 2585.
Bellidiastrum — Ust. 2073.
Beloperone — Ur. 3063.
Berberis — Hy. 742. — Ur. 2393, 2852-2854.
Berkeleya — Ur. 2910.
Betula — Hy. 164, 933, 1057, 1150, 1280, 1435, 1438, 1454.
Bidens — Ur. 3044.
Bignonia — Hy. 1714. — Ur. 2389, 2542.
Bignoniaceæ — Ur. 2541, 2547, 2822.
Blastocladia — Phyc. 3213.
Blechnum — Ur. 3120.
Blepharis — Ur. 2939.
Blitum — Phyc. 3295.
Blumea — Ur. 2907.
Boehmeria — Ur. 2965.
Boisduvalia — Ur. 2430.
Borassus — Ust. 2093. — Phyc. 3285.

- Borrichia — Ust. 2038, 3317.
 Bos — Phyc. 3167.
 Bosmina — Phyc. 3286.
 Bossiæa — Ur. 2361, 3011, 3013.
 Botryospermum — Ur. 2927.
 Bouteloua — Ur. 2686-2687.
 Brachybotrys — Ur. 2786.
 Brachycome — Ur. 2465.
 Brachypodium — Ur. 2667, 2752.
 Breynia — Ur. 2818, 2962.
 Bridelia — Ur. 2961, 3056.
 Brodiaëa — Ur. 2579.
 Bromus — Ur. 2698-2699, 3114.
 Brunella — Ur. 2534.
 Bulbine — Ur. 2983.
 Bupleurum — Ust. 2066. — Ur. 2987.
 Büttneria — Ur. 3025.
 Byrsonima — Ur. 2867.

 Cacalia — Ur. 2478, 2487, 2743, 2897.
 Cæsalpinia — Ur. 2801.
 Cajanus — Ur. 2877, 3019.
 Calamagrostis — Ur. 2633, 2634-2638.
 Calamintha — Ur. 2931, 3067.
 Calandrinia — Ust. 1949. — Phyc. 3308.
 Calea — Ur. 2499.
 Callirhoa — Hy. 1720.
 Callithamnion — Phyc. 3203.
 Calluna — Hy. 1551, 1568.
 Calocephalum — Ur. 2464.
 Calophyllum — Hy. 1097.
 Calothrix — Phyc. 3257.
 Calotis — Ur. 2463.
 Campanula — Phyc. 3232.
 Campanumæa — Ur. 2747.
 Canavalia — Ur. 2363, 3020.
 Canis — Phyc. 3172.
 Cannabis — Phyc. 3171.
 Cantharellus — Hy. 587.
 Capparis — Ur. 3003.
 Cardamine — Phyc. 3214.
 Cardiospermum — Ur. 2866.
 Carduus — Ur. 2906.
 Carex — Hy. 45, 868. — Ust. 2015,
 2094. — Ur. 2282-2284, 2549, 2595-
 2617.
 Carlina — Ur. 2479.

 Carpinus — Hy. 1353, 1563.
 Cassia — Hy. 1244. — Ur. 2801-2804.
 Castanea — Hy. 1518. — Ur. 3068. —
 Phyc. 3311.
 Castilleja — Ur. 2362.
 Cattleya — Ur. 2328.
 Cecidia (gallæ) — Hy. 229.
 Cedrela — Hy. 1151, 1349. — Ur. 2186.
 Celastrus — Ur. 2781.
 Celtis — Ur. 2255.
 Cenchrus — Ur. 3111, 3112.
 Centaurea — Ur. 2490.
 Cephalandra — Ur. 2401.
 Ceramium — Phyc. 3202, 3269.
 Cerastium — Phyc. 3215.
 Ceratonia — Hy. 1745.
 Ceropteris — Ur. 2331.
 Chætochloa — Ur. 2693.
 Chærophyllum — Ur. 2434-2435, 2440.
 Chamæcyparis — Hy. 1424. — Ur. 2385.
 Chamissoa — Hy. 1719.
 Chasalia — Ur. 3047.
 Cheilanthes — Ur. 2331.
 Chloris — Hy. 1636. — Ur. 2691, 2692.
 — Phyc. 3306.
 Chlorogonium — Phyc. 3242.
 Chlorophyton — Ur. 2982.
 Chorda — Phyc. 3204.
 Chrysanthemum — Hy. 1569. — Ur.
 3042. — Phyc. 3232.
 Chrysophyllum — Ur. 3005.
 Cimbex — Phyc. 3182.
 Cinchona — Hy. 1742, 1769.
 Cineraria — Ur. 2469.
 Cinnamomum — Hy. 1605, 1621.
 Cipura — Ur. 2584.
 Circinella — Phyc. 3176*.
 Cirsium — Hy. 1500.
 Cistus — Hy. 1562.
 Citrus — Phyc. 3288.
 Cladophora — Phyc. 3243.
 Cladrastis — Ur. 2144-2146.
 Claytonia — Ust. 1948.
 Cleonus — Phyc. 3189, 3193.
 Clerodendron — Ur. 2326, 3061. — Phyc.
 3217.
 Clitoria — Ur. 2159-2160.

- Closterium* — Phyc. 3236.
Cnidium — Ur. 2444.
Cobaya — Phyc. 3136, 3151.
Cocos — Hy. 267, 503, 1154, 1315. — Phyc. 3285.
Coffea — Hy. 421, 910, 1748. — Ur. 2921.
Coix — Ur. 3097.
Coleanthus — Ur. 3113.
Coleus — Ur. 3066.
Cologania — Ur. 2166.
Colutea — Ur. 2156,
Commelina — Ur. 2259, 3077.
Commiphora — Ur. 2107.
Comptonia — Ur. 2360.
Coniferæ — Hy. 230, 744, 1112, 1153, 1409, 1513, 1645, 1660, 1783. — Phyc. 3126, 3139, 3140.
Conjugatæ — Phyc. 3192.
Conoclinium — Ur. 2496.
Convolvulus — Ust. 2069. — Ur. 2557, 2946.
Cordyline — Hy. 1354.
Coriariæ (substantiæ) — Hy. 138.
Corium — Hy. 1774.
Cornus — Hy. 1745. — Ur. 2783.
Corylus — Hy. 1273.
Cosmarium — Phyc. 3267.
Cosmus — Ust. 2074.
Costus — Ur. 2590.
Cracca — Ur. 2387, 2793-2794.
Cratægus — Ur. 2381, 2384, 2842, 2875
Cratæva — Ur. 2858.
Crepis — Ust. 2076. — Ur. 2507, 2509-2512.
Crotalaria — Ur. 2165.
Croton — Ur. 2337.
Cruciferæ — Ur. 2396.
Cryptocarya — Phyc. 3133.
Cryptogramme — Ur. 2330, 2331.
Cryptomeria — Hy. 1217, 1330, 1453.
Cucumis — Ust. 2003.
Cucurbitaceæ — Ur. 2399.
Cupressus — Hy. 815.
Cutandia — Ust. 1968.
Cyanotis — Ur. 3080.
Cyclopterus — Phyc. 3291.
Cylindrocystis — Phyc. 3248.
Cynara — Hy. 1364.
Cynodon — Ur. 2670.
Cyperaceæ — Ust. 2018.
Cyperus — Ust. 2014, 2016, 2017. — Ur. 2591, 3083, 3084. — Phyc. 3302.
Cyprinus — Phyc. 3273.
Cyrtoneura — Phyc. 3187.
Cytisus — Hy. 1046. — Ur. 2143.

Dactylis — Ur. 2666.
Dactyloctenium — Ur. 2690.
Dæmia — Ur. 2951.
Dahlia — Ur. 2736.
Dalbergia — Ur. 2163, 3015.
Dalechampia — Ur. 2994.
Danthonia — Ust. 1958, 1982. — Ur. 2302.
Daphnia — Phyc. 3286.
Datisca — Ur. 2746.
Deckerra — Ur. 2911.
Deeringia — Ur. 2577, 2975.
Delphinium — Ur. 2851. — Phyc. 3178, 3179.
Derris — Ur. 2719.
Deschampsia — Ust. 2051, 2052. — Ur. 2710.
Desmidiaceæ — Phyc. 3267.
Desmodium — Ur. 2147.
Deyeuxia — Ust. 2053.
Dianthus — Ur. 2110, 2411, 2998.
Diarrhena — Ur. 2689.
Dichroa — Ur. 2320.
Dichromena — Ur. 3085.
Dioscorea — Ust. 2086.
Dipcadi — Ur. 2981.
Diphysa — Ur. 2713.
Diplachne — Ur. 2706.
Dipterocarpus — Hy. 1069.
Dissotis — Ur. 2422.
Distichlis — Ust. 2021.
Dodonæa — Ur. 2999.
Dolichos — Ur. 2130, 2131, 2426.
Dombeya — Ur. 2370.
Dorstenia — Ur. 2968.
Dracæna — Hy. 265.
Draparnaldia — Phyc. 3199, 3258.

- Dregia — Ur. 3053.
 Dumontia — Phyc. 3191.

 Echinocephalum — Ur. 2235.
 Echinops — Ur. 2481.
 Echium — Phyc. 3219.
 Ectocarpus — Phyc. 3205.
 Elæagnus — Ur. 2358, 2568, 2955, 2956.
 Elæocarpum — Ur. 2864.
 Elater — Phyc. 3183.
 Elephantopus — Ur. 2494.
 Eleutheranthera — Ur. 2462.
 Elionurus — Ust. 1966, 1967.
 Elymus — Ur. 2688.
 Encephalartus — Hy. 252, 1381.
 Entada — Ur. 2790.
 Enterolobium — Ur. 2800.
 Enodia — Ur. 2727.
 Epilobium — Phyc. 3226.
 Equus — Phyc. 3134, 3135, 3136, 3137, 3161.
 Eragrostis — Ust. 2036, 2050. — Ur. 2663.
 Erianthus — Hy. 173. — Ur. 2639.
 Erica — Hy. 1562, 1567, 1568.
 Erigeron — Ur. 2845.
 Eriobotrya — Ur. 2323.
 Eriochloa — Ur. 2301, 3109, 3110.
 Eriophorum — Hy. 1753.
 Eriostemon — Ur. 2418.
 Ervum — Ur. 2125.
 Erythrina — Ur. 2161, 3009.
 Erythronium — Ur. 2266.
 Eucalyptus — Hy. 736, 1337, 1437, 1676. — Ga. 1926.
 Euchlæna — Ust. 1960*.
 Eugenia — Hy. 274.
 Euglena — Phyc. 3258*.
 Eupatorium — Ur. 2359, 2451-2453, 2734, 2780.
 Euphorbia — Ur. 2139, 2195, 2196-2211, 2345-2353, 2571, 2958, 2959. — Phyc. 3309, 3310.
 Euphrasia — Phyc. 3261.
 Eurotia — Ur. 2251, 2576, 2973.
 Evolvulus — Ur. 2556.
 Evonymus — Ur. 2344.

 Excoëcaria — Ur. 2369.
 Eysenhardtia — Ur. 2715.

 Fadogia — Ur. 3049.
 Fagopyrum — Ust. 2004.
 Fagus — Hy. 282, 304, 420, 434, 1029, 1037, 1062, 1071, 1267, 1273, 1306, 1358, 1439, 1529, 1535, 1537, 1538, 1558, 1560, 1736, 1739.
 Falcata — Ur. 2878.
 Felis — Phyc. 3166.
 Festuca — Ur. 2291, 2708, 2709, 3104.
 Ficus — Hy. 456, 909, 3315.
 Filices — Hy. 741, 1517.
 Fimbristylis — Ust. 1955. — Ur. 2621, 2622.
 Flacourtia — Ur. 3007.
 Flemmingia — Ur. 2267.
 Floscopa — Ur. 3076.
 Fouquieria — Ur. 2859.
 Frasera — Ur. 2227.
 Fraxinus — Hy. 1544, 1735, 1745, 1757, 1762. — Phyc. 3274.
 Freesia — Ur. 2270.
 Fritillaria — Ur. 2264.
 Frœlichia — Phyc. 3296.
 Fuchsia — Ur. 2431.
 Fuirena — Ur. 2618.
 Fungi — Hy. 1752.
 Funkia — Ur. 2977.

 Gagea — Ur. 2263.
 Galega — Ur. 2150.
 Galium — Ur. 2191, 2523, 2914. — Phyc. 3228.
 Gaultheria — Ur. 2782.
 Genista — Ust. 1950.
 Geotonoplesium — Ur. 3078.
 Geranium — Ur. 2101, 2414-2416.
 Gesneriaceæ — Ur. 2548.
 Gilia — Ust. 2084.
 Girardinia — Ur. 2972.
 Gladiolus — Ur. 3081.
 Glaux — Ur. 2555.
 Gleditschia — Hy. 55. — Ur. 3318.
 Glenodium — Phyc. 3198.
 Glœocystidium — Hy. 1752.

- Glyceria — Ust. 1980, 2000, 2078. —
 Ur. 2306, 2307, 2684.
 Glycine — Ur. 2132.
 Gnaphalium — Ur. 2236, 2456.
 Gompholobium — Ur. 2361.
 Gossypium — Hy. 1432.
 Gouania — Ur. 2427, 2428.
 Graminaceæ — Hy. 224, 225, 440, 441,
 538, 555, 868, 1487.
 Graya — Ur. 3070.
 Grewia — Ur. 2863.
 Guizotia — Ur. 3034.
 Gymnolomia — Ur. 2466, 2498.
 Gymnopetalum — Phyc. 3227.

 Halanthium — Ur. 2249.
 Halimocnemis — Ur. 2249.
 Halosaccus — Phyc. 3241.
 Hardenbergia — Ur. 2164.
 Hedypnois — Ur. 2912.
 Hedysarum — Ur. 2148.
 Heleocharis — Ur. 2280. — Phyc. 3250.
 Heliotropium — Ur. 2563, 2925.
 Helleborus — Ur. 2849.
 Hepaticæ — Hy. 1640.
 Heteropappus — Ur. 3045
 Hevea — Phyc. 3299.
 Hewittia — Ur. 2220.
 Hexalobius — Ur. 2856.
 Hibbertia — Ur. 2390.
 Hibiscus — Hy. 1452. — Ur. 2404.
 Hickoria — Hy. 840.
 Hieracium — Ur. 2513.
 Hierochloa — Ur. 2683.
 Hippocrepis — Phyc. 3229.
 Hippomane — Hy. 1163.
 Homo — Phyc. 3156, 3161.
 Homogyne — Ur. 2237, 2258. — Phyc.
 3232.
 Hordeum — Ust. 1963, 2055.
 Hoslundia — Ur. 2537.
 Hosta — Ur. 2977.
 Humulus — Phyc. 3305.
 Hutchinsia — Phyc. 3230, 3231.
 Hydrocotyles — Ur. 2896.
 Hygrophila — Ur. 3062.
 Hymenachne — Ust. 2096.
 Hymenocallis — Ust. 2081.
 Hymenolepis — Hy. 1751.
 Hyoseris — Ur. 2514, 2515.
 Hypericum — Ur. 2100, 2336. — Phyc.
 3226.
 Hyphæne — Hy. 877.
 Hypnum — Hy. 437.
 Hypochæris — Ust. 2061. — Ur. 2519.
 — Phyc. 3260.
 Hypoestis — Ur. 2543.
 Hypoxis — Ur. 2587.

 Ichthyomethia — Ur. 2797.
 Ilex — Hy. 520, 1399, 1461, 1780.
 Imperata — Ust. 2012.
 Indigofera — Ur. 2157, 2158. — Phyc.
 3282.
 Inga — Ur. 2795.
 Inocarpus — Ur. 3125.
 Inocybe — Phyc. 3163.
 Insecta — Ga. 1832.
 Inula — Ur. 2742, 3032.
 Ipomœa — Ur. 2218, 2219, 2234, 2945.
 Iresine — Ur. 2253.
 Iridaceæ — Ur. 2583.
 Ischæmum — Ust. 2029. — Ur. 3096.
 Iseilema — Ust. 1961, 1962.
 Isoëtes — Ust. 2002.
 Isopyrum — Ur. 2850.
 Ivesia — Ur. 2776.
 Ixia — Ur. 2271.
 Ixiolirium — Ur. 2985.

 Jacksonia — Ur. 2361.
 Jacquinia — Hy. 1085.
 Jambosa — Hy. 1737.
 Jasminum — Hy. 1142. — Ur. 2240.
 Jatropha — Ur. 2194.
 Juglans — Hy. 255, 1735.
 Juniperus — Hy. 1087, 1141, 1303, 1448.
 — Ur. 2373, 2384.
 Juncellus — Ur. 2591.
 Juncus — Hy. 440, 1524. — Ust. 2040.
 — Ur. 2239, 2277-2279, 2592.
 Justicia — Ur. 2217, 2937. — Phyc.
 3304.

- Kahnia* — Hy. 1687.
Knoxia — Ur. 3048.
Kœleria — Ur. 2703.
Kyllingia — Ur. 2620, 3089.
- Labiatae* — Ur. 2750.
Laciniaria — Ur. 2738.
Lactarius — Hy. 203.
Lactuca — Ur. 2516, 2517.
Lagascea — Ur. 2461.
Lagenophora — Ust. 2048.
Laggera — Ur. 3031.
Lantana — Ur. 2550, 2551.
Lapeyrousia — Ur. 2272.
Laportea — Ur. 2980.
Lapsana — Ur. 2986.
Larix — Hy. 307, 507. — Ur. 2340, 2342, 2343, 2836.
Laserpitium — Ur. 2190, 2290, 2893.
Lathyrus — Ust. 2063. — Ur. 2155.
Launæa — Ur. 2504, 2506.
Laurus — Hy. 1175, 1745.
Leersia — Ur. 2285.
Leguminosæ — Hy. 280. — Ur. 2806.
Leontodon — Phyc. 3230.
Lepidagathis — Ur. 2936.
Lepidosperma — Ust. 2041, 2042.
Lepistemon — Ur. 2558, 2559.
Lepus — Phyc. 3136, 3151.
Leucæna — Ur. 2812.
Leuceria — Ur. 2492.
Leucobryum — Hy. 1549.
Libocedrus — Hy. 1081.
Licmophora — Phyc. 3208.
Ligusticum — Ur. 2439.
Lilium — Ur. 2264.
Linosyris — Ur. 2617.
Lipocarpa — Ur. 3087.
Lippia — Ur. 2213, 2552, 2553, 2942.
Lithophragma — Ust. 2082. — Ur. 2448.
Lloydia — Ur. 2581.
Lobelia — Hy. 880.
Lœselia — Ur. 2564.
Lolium — Ust. 2001. — Phyc. 3253.
Lonchocarpus — Ur. 2791, 2885.
Loranthus — Ur. 2449, 2966.
Lotus — Ur. 2139. — Phyc. 3229.
- Lucuma* — Ur. 2224.
Ludwigia — Ur. 2429.
Lupinus — Ur. 2118, 2119, 2120-2124.
Luzula — Ur. 2593.
Lychnis — Ur. 2108, 2410.
Lycium — Ur. 3065.
Lygeum — Ust. 2024. — Ur. 2289.
Lysiloma — Ur. 2805.
Lysimachia — Ur. 2934. — Phyc. 3226.
- Machilus* — Ur. 2957.
Maclura — Ga. 1935.
Macrochloa — Ust. 1986.
Macropanax — Ur. 2324.
Macrosiphonia — Ur. 2933.
Mahonia — Ur. 2703.
Malpighiaceæ — Ur. 2405.
Mangifera — Hy. 1165, 1168.
Manihot — Ur. 2193.
Marantaceæ — Ur. 3082.
Markhamia — Ur. 2777, 2822.
Medicago — Hy. 1602.
Megapterium — Ur. 2106.
Melampyrum — Ur. 2745. — Phyc. 3303.
Melanostoma — Phyc. 3185.
Melanthera — Ur. 2235.
Melica — Ur. 2189, 2190, 2290, 2704, 2705, 3095.
Melicocca — Hy. 1187.
Melilotus — Ust. 2062. — Ur. 2138.
Meliosma — Ur. 2368, 2717.
Melothria — Ur. 2400.
Menispermaceæ — Ur. 2857.
Merendera — Ur. 2980.
Mertensia — Ust. 2068.
Mesosphærium — Ur. 2539.
Meum — Ur. 2442.
Microchloa — Ust. 1964, 1965.
Microrhamnus — Ur. 2728.
Mimosa — Ur. 2807-2811.
Mimulopsis — Ur. 2941.
Mimusops — Ur. 2223.
Miscanthus — Ur. 2653.
Molinia — Ur. 2534, 2682.
Monocotyledoneæ — Hy. 1375.
Monodora — Ur. 2788.
Moraceæ — Ur. 3072.

- Moræa — Ur. 2586.
 Moringa — Ur. 2424.
 Morus — Hy. 1743. — Ur. 2979.
 Mougeotia — Phyc. 3255.
 Mucuna — Ur. 2789, 3016.
 Muehlenbeckia — Ur. 2245.
 Muhlenbergia — Ust. 2054. — Ur. 2297.
 Musa — Hy. 708, 865. — Ga. 1902. —
 Ur. 2256.
 Muscari — Phyc. 3249.
 Musci — Hy. 363, 705, 1640. — Phyc.
 3200.
 Mutisia — Ur. 2457.
 Myosotis — Phyc. 3226.
 Myrciaria — Ur. 3028.
 Myriactis — Ur. 2900.
 Myriophyllum — Phyc. 3252.
 Myrtaceæ — Ur. 2117, 2421.

 Nabalus — Ur. 2508.
 Nanocnide — Ur. 2978.
 Neurachne — Ust. 1981.
 Nicotiana — Hy. 1177.
 Nocca — Ur. 2501.
 Nothoscordium — Ur. 2265.
 Nuphar — Phy. 3283.
 Nymphæa — Phyc. 3283.

 Œnanthe — Ur. 2437.
 Œnothera — Ur. 2106, 3029.
 Oldenlandia — Ur. 2525, 2919, 2920.
 Olea — Ur. 2364.
 Olearia — Ur. 2905, 3043.
 Oncidium — Ur. 2327, 3074.
 Onobrychis — Ur. 2149.
 Ononis — Phyc. 3307.
 Ophiocaulon — Ur. 2860.
 Ophiurus — Ust. 1969. — Ur. 3116.
 Oplismenus — Ur. 2680, 2721.
 Orchidaceæ — Ur. 2751.
 Oreodoxa — Hy. 1106.
 Ornithogalum — Ur. 2268, 2580, 2978.
 Orobus — Ur. 2155.
 Oryctanthus — Ur. 2187.
 Oryza — Phyc. 3150, 3153, 3155, 3164.
 Oryzopsis — Ur. 2681.

 Osmanthus — Ur. 2935.
 Ostericum — Ur. 2432.
 Otopappus — Ur. 2497.
 Oxypetalum — Ur. 2565.

 Pæderia — Ur. 2748.
 Palmæ — Hy. 1108, 1532, 1711.
 Pandanus — Hy. 263, 1070, 1637.
 Panicularia — Ust. 1980.
 Panicum — Ust. 1973-1976, 2010, 2011,
 2027, 2030, 2046, 2049, 2096, 2097,
 3316. — Ur. 2309, 2310, 2677-2679,
 2720, 3093, 3098.
 Pappophorum — Ust. 1983.
 Paramignya — Ur. 2869-2870.
 Parkia — Hy. 1194.
 Parosela — Ur. 2714.
 Parsonia — Ur. 2950.
 Parthenium — Ur. 2467, 2732.
 Paspalum — Ust. 1956, 2031. — Ur.
 2676, 3098, 3099.
 Passiflora — Ur. 2335, 2861.
 Patrinia — Ur. 2528.
 Pavetta — Hy. 1737. — Ur. 2915, 3046.
 Payena — Ur. 2222.
 Pelargonium — Ur. 2417.
 Pellæa — Ur. 2331.
 Peltandra — Ur. 2276.
 Peniophora — Hy. 1752.
 Pennisetum — Ust. 1959, 1960, 1976,
 1999, 2023. — Ur. 2697.
 Perezia — Ur. 2491.
 Pergularia — Ur. 2949.
 Persica — Hy. 1360.
 Petalostemon — Ur. 2716, 2880.
 Petasites — Ur. 2741.
 Petrosimonia — Ur. 2249.
 Petunia — Ust. 2067.
 Peucedanum — Ur. 2188, 2890.
 Phaca — Ur. 2151.
 Phæopappus — Ur. 2454.
 Phaseolus — Ur. 2133.
 Phayloopsis — Ur. 2941.
 Phegopteris — Ur. 2371.
 Phellopterus — Ur. 2443.
 Phœnix — Ust. 2092.
 Phragmites — Ur. 2630-2632.

- Phryganea — Phyc. 3281.
 Phryma — Ur. 2549.
 Phyllanthus — Ur. 2366, 2817, 2963.
 Phyllostachys — Ust. 2025. — Ur. 2628.
 Phyteuma — Ur. 2282. — Phyc. 3232.
 Picrosia — Phyc. 3221, 3260.
 Pinus — Hy. 46, 126, 129, 172, 187, 201, 208, 233, 238, 298, 324, 343, 400, 499, 504, 508, 511, 516, 580, 603, 664, 699, 740, 795, 815, 854, 973, 1020, 1047, 1048, 1093, 1109, 1111, 1118, 1129, 1215, 1226, 1249, 1317, 1318, 1388, 1400, 1455, 1485, 1488, 1499, 1510, 1511, 1519, 1520, 1543, 1555, 1557, 1566, 1599, 1606, 1734, 1754, 1777, 1778. — Ga. 1941, 1946. — Ur. 2740-2745, 2826-2834, 2837-2841, 2997. — Phyc. 3127.
 Piperaceæ — Ur. 2578.
 Piptadenia — Ur. 2792, 2819, 3319.
 Pirola — Ur. 2724.
 Pirus — Hy. 1773, 3320. — Ur. 2381, 2382, 2385. — Phyc. 3259, 3289.
 Piscidia — Ur. 2797.
 Pistacia — Hy. 1559, 1745. — Ur. 2102.
 Pisum — Ur. 2881.
 Pithecolobium — Hy. 32. — Ur. 2799, 3021.
 Plantago — Ur. 2241, 2923.
 Platanus — Hy. 450, 1181, 1591.
 Platylobium — Ur. 2361, 2882.
 Plectronia — Ur. 2917.
 Pluchea — Ur. 2904, 2908, 3035, 3036.
 Poa — Ur. 2189, 2286, 2287, 2654-2656.
 Podolepis — Ur. 2460.
 Pogonatum — Hy. 1462.
 Pogostemum — Ur. 2538.
 Poinciana — Ur. 2796.
 Pollia — Ust. 1953.
 Pollinia — Ur. 2651, 2652, 3100.
 Polygala — Ur. 3008.
 Polyonemum — Ur. 2253.
 Polygonum — Ust. 1957, 2005-2008. — Ur. 2441, 2442, 2572-2574.
 Polymnia — Ur. 3732. ✓ 2
 Polypogon — Ur. 2675.
 Polyporus — Hy. 1386, 1531.
 Polysiphonia — Phyc. 3201.
 Polytrichum — Hy. 1658.
 Populus — Hy. 97, 258, 636, 648, 662, 855, 869, 1078, 1234, 1245, 1350, 1353, 1505, 1523, 1545, 1614, 1633, 1760, 1767, 1771. — Ur. 2338. — Phyc. 3256.
 Porophyllum — Ur. 2502.
 Porteranthus — Ur. 2380.
 Posoqueria — Ur. 2918.
 Potentilla — Ur. 3026. — Phyc. 3226.
 Pouzolzia — Ur. 3073.
 Premna — Ur. 3059.
 Primula — Ur. 2225, 2226.
 Priva — Ur. 2212.
 Prosopis — Hy. 1144.
 Prunus — Hy. 1282, 1355, 1387, 1526, 1527, 1756, 1787. — Ur. 2990, 3027.
 Pseudotsuga — Ur. 2996.
 Psidium — Hy. 256.
 Psychotria — Ur. 2526.
 Pteris — Hy. 970, 1517, 1770. — Ur. 2372.
 Ptilosia (Picris) — Ur. 2503.
 Pueraria — Phyc. 3216.
 Pylaiella — Phyc. 3206, 3234.
 Pyrethrum — Ur. 2899.
 Pythium — Phyc. 3196, 3197, 3210, 3211, 3212.
 Quercus — Hy. 189, 209, 245, 259, 324, 344, 345, 560, 580, 625, 745, 840, 951, 971, 1047, 1054, 1074, 1078, 1079, 1155, 1174, 1230, 1261, 1267, 1281, 1290, 1293, 1297, 1353, 1393, 1451, 1512, 1544, 1589, 1607, 1615, 1738, 1744, 1767, 1781. — Ur. 3071.
 Randia — Ur. 2916.
 Ranunculus — Ur. 2099, 2287, 2288, 2291, 2391, 2392. — Phyc. 3230.
 Raphanus — Phyc. 3170.
 Rauwolfia — Ur. 2953.
 Redfieldia — Ust. 2056.
 Reissekia — Ur. 3006.
 Rhamnus — Ur. 2889.
 Rheum — Ur. 3069.

- Rhizophidium* — Phyc. 3207.
Rhododendron — Hy. 344, 1622. — Ga.
 1946. — Ur. 2722, 2723, 2993.
Rhodymenia — Phyc. 3241.
Rhus — Ur. 2102-2105, 3004.
Rhynchosia — Ur. 2131.
Rhynchospora — Ust. 2019. — Ur. 2623,
 3086.
Ribes — Ur. 2341, 2730.
Rivina — Ur. 2412, 2413.
Robinia — Hy. 55, 1308, 1324, 1782.
Rosa — Hy. 1501. — Ur. 2754-2765,
 2991.
Rottboellia — Ust. 1957, 2022. — Ur.
 2664, 2665.
Roystonia — Hy. 864.
Rubia — Ur. 2524, 2913.
Rubiaceæ — Ur. 2325, 2922, 3050.
Rubus — Ur. 2115, 2116, 2319, 2725,
 2766-2775, 2784.
Ruellia — Ur. 2216, 2545, 2941.
Rumex — Ur. 2246-2248, 2787.
Russula — Hy. 203.
Ruta — Ur. 2871.
- Sagittaria* — Ust. 2091.
Salix — Hy. 188, 869, 1273, 1277, 1355,
 1498, 1516, 1550, 1590, 1735, 1745,
 1762. — Ur. 2340-2344.
Salsola — Ur. 2249, 2250.
Salvia — Ust. 1947. — Ur. 2529-2533,
 2749.
Sanicula — Ur. 2895.
Santolina — Ur. 2484.
Sapium — Ur. 2192,
Sapotaceæ — Ur. 3051.
Saprolegnia — Phyc. 3194, 3239.
Sasa — Ur. 2624-2626, 3092.
Sassafras — Hy. 1292.
Saussurea — Ur. 2480, 2737, 2898.
Saxifraga — Ust. 2065. — Ur. 2446,
 2447. — Phyc. 3230.
Scatophaga — Phyc. 3186.
Schellhammera — Ur. 3079.
Schœnoplectus — Hy. 1784.
Sciara — Phyc. 3181.
Soilla — Ur. 2269.
- Scirpus* — Hy. 461, 868, 887, 1753. —
 Ur. 2281, 3088. — Phyc. 3223.
Scleria — Ur. 2619.
Sclerochloa — Ur. 2296, 3101.
Scopolia — Ur. 2948.
Scorzonera — Ur. 2493.
Scutellaria — Ur. 2929, 2930.
Sebastiana — Ur. 2570.
Secale — Hy. 878.
Securinega — Ur. 2821.
Sedum — Ur. 2420.
Semiaquilegia — Ur. 2850.
Senecio — Ur. 2231, 2486, 2487, 2733,
 2778, 2779, 2902, 2903, 2909.
Sequoja — Hy. 46, 1162, 1325, 1329.
Seriola — Ur. 2518.
Sesbania — Ur. 3014.
Seseli — Ur. 2189, 2290.
Sesleria — Ur. 2674.
Sessea — Ur. 2300.
Setaria — Ust. 1971, 1972, 2032.
Sidalcea — Ur. 2402.
Sideritis — Ur. 2536.
Sieglingia — Ust. 1982.
Silphium — Ur. 2239, 2732.
Silybum — Hy. 1602.
Siphocampylos — Ur. 2229.
Smilax — Ur. 2318, 2588 *bis*, 2589.
Soja — Ur. 2132. — Phyc. 3152, 3153.
Solanum — Hy. 1715. — Ur. 2561, 2562.
 — Phyc. 3218.
Solaria — Ur. 2261.
Solidago — Ur. 2470-2472.
Sonchus — Ur. 2744.
Sophia — Ust. 2085.
Sorbus — Ur. 2381, 2382, 2874.
Sorghum — Ust. 1970, 2044.
Sparganium — Hy. 1784.
Spartina — Ur. 3106.
Spartium — Ur. 2142.
Spermacoce — Ur. 2527.
Spermolepis — Hy. 1070.
Sphæralcea — Ur. 2403, 2862.
Sphagnum — Hy. 284, 318, 404, 555,
 705, 707, 757, 842, 1661. — Phyc.
 3180.
Spilanthus — Ust. 2072.

- Spinacia — Ur. 2974. — Phyc. 3310.
 Spiræa — Ur. 2380.
 Spirogyra — Phyc. 3237, 3238, 3244,
 3245, 3246, 3268.
 Spirostachys — Ur. 3057.
 Spongomorpha — Phyc. 3235.
 Sporobolus — Ust. 2058, 2080. — Ur.
 2293, 2673, 3094.
 Stachyurus — Ur. 3002.
 Statice — Ur. 2244.
 Stellaria — Ur. 2111.
 Stenotaphrum — Ur. 3102.
 Sterculiaceæ — Ur. 2370.
 Stereospermum — Ur. 2365.
 Stevia — Ur. 2731.
 Stigmara — Phyc. 3266.
 Stigmatophyllum — Ur. 2407.
 Stipa — Ust. 1984, 1985, 1986, 2035,
 2088. — Ur. 2295, 2640, 2641, 2683.
 Stranvæsia — Ur. 2873.
 Streptanthus — Ur. 2394.
 Strobilanthes — Hy. 802. — Ur. 2215.
 Strychnos — Ur. 3000.
 Stylidium — Ur. 2450.
 Stylochiton — Ur. 2976.
 Styphonia — Ur. 2103.
 Swertia — Phyc. 3292.
 Symplocos — Hy. 1623, 1624.
 Synchronæta — Phyc. 3291.
 Synedra — Phyc. 3208.
 Syringa — Phyc. 3300.
 Syrphus — Phyc. 3185.
- Tabernæmontana — Ur. 2992, 3055.
 Taraxacum — Ur. 2520. — Phyc. 3190.
 Tecoma — Ur. 2546.
 Teramnus — Ur. 2162.
 Terminalia — Hy. 32.
 Tessaria — Ur. 2459.
 Tetranthera — Hy. 1741, 1749.
 Teucrium — Ur. 2535, 2928.
 Thaliotrum — Ur. 2699. — Phyc. 3298.
 Thapsia — Ur. 2891, 2892.
 Thea — Hy. 1447, 1601.
 Thelymitra — Ur. 2257.
 Themeda — Ur. 3103.
- Theobroma — Hy. 467, 1604. — Phyc.
 3299.
 Thesium — Ur. 2569.
 Thlaspi — Ur. 2395. — Phyc. 3231.
 Thrincoia — Ust. 2075.
 Thuja — Hy. 183.
 Thymus — Ur. 2540.
 Tilia — Hy. 446, 995, 1563. — Ga. 1942.
 Tillandsia — Hy. 1635.
 Tipula — Phyc. 3184.
 Toddalia — Ur. 2419, 2868.
 Tolypothrix — Phyc. 3290.
 Tordylium — Ust. 2064.
 Tournefortia — Ur. 2228.
 Trachypogon — Ur. 2672.
 Trianthea — Phyc. 3293.
 Triaspis — Ur. 2406.
 Trichloris — Ur. 2671.
 Trichopterygis — Ust. 2045.
 Tridax — Ur. 2455.
 Trifolium — Ur. 2140, 2141.
 Trigonotis — Ur. 2926.
 Triosteum — Ur. 2924.
 Tripsacum — Ur. 2657, 2658.
 Trisetum — Ur. 2288, 2707.
 Tristachya — Ust. 2037.
 Tritoleia — Ur. 2262.
 Triticum — Hy. 878. — Ust. 2090. —
 Ur. 2700. — Phyc. 3254.
 Tritonia — Ur. 2273.
 Triumphetta — Ur. 2408.
 Trixis — Ur. 3033.
 Tsuga — Hy. 696, 1100. — Ur. 2835,
 3118.
 Turræa — Ur. 2847.
 Tussilago — Ur. 2740.
 Typha — Hy. 1784.
- Ulmus — Hy. 190, 273, 498, 1389, 1502,
 1505, 1528. — Ga. 1924.
 Urginea — Ur. 2979.
 Urtica — Ur. 2967.
 Uvaria — Ur. 2855.
- Vaccinium — Hy. 1625-1628.
 Valeriana — Ur. 3030. — Phyc. 3226.
 Vallaris — Ur. 2954.

- Veratrum — Ur. 2337, 2238, 2588.
Verbascum — Ur. 2214.
Verbena — Ur. 2943.
Verbesina — Ur. 2482, 2483.
Vernonia — Ur. 2321, 2473-2476, 2901.
3040.
Veronica — Ust. 2070, 2071. — Ur. 2944.
Viatica — Ur. 3001.
Viburnum — Hy. 1362.
Vicia — Hy. 1629. — Ur. 2126-2129,
2195.
Vigna — Ur. 2134-2137, 2883, 2884,
3017.
Viola — Ur. 2397, 2398. — Phyc. 3228,
3230.
Vitex — Ur. 3060.
Vitis — Hy. 1718, 1767.
Vittadinia — Ur. 2477.
- Voacanga — Ur. 2567.
- Watsonia — Ur. 2274.
Wedelia — Ur. 2232, 2238, 3039.
Wulffia — Ur. 2230.
Wurmbea — Ust. 2087.
- Xanthosia — Ur. 2433.
- Yucca — Hy. 906.
- Zaluzania — Ur. 2495.
Zanthoxylon — Ur. 2872.
Zizania — Ust. 2079. — Ur. 2292.
Zizyphus — Ur. 2367.
Zollikoferia — Ur. 3038.
Zornia — Ur. 2425.
-

INDEX ALPHABETICUS

specierum in volumine XXI descriptarum

additis synonymis (*cursive impressis*)

- abiegnus (Cortinarius) 198.
abietinella (Lenzites) 126.
abietinellum (*Glæophyllum*) 126.
Abietis (Chrysomyxa) 717.
abnorme (*Corticium*) 446.
abnorme (Septobasidium) 446.
? *abnorme* (Synchytrium) 838.
abnormis (Leptonia) 143.
Abri (Uredo) 792.
abruptibulbus (*Agaricus*) 205.
abruptus (Agaricus) 205.
abscissum (Lycoperdon) 485.
Absinthii (Puccinia) 645.
Acaciæ (Æcidium) 752.
Acaciæ (*Æcidium*) 745.
Acaciæ (*Æcidium*) 762.
Acaciæ (*Phoma*) 762.
Acaciæ-micranthæ (*Ravenelia*) 744.
Acaciæ-pennatulæ (Ravenelia) 743.
Acalyphæ (*Æcidium*) 780.
Acalyphæ (Melampsora) 602.
acanthinum (*Æcidium*) 774.
Acantholimonis (Uromyces) 542.
Acanthopanacis (*Æcidium*) 764.
acer var. (Lactarius) 90.
acerinum (Stereum) 388.
acerinus (*Aleurodiscus*) 388.
acerrimus (Lactarius) 81.
achrous (Uromyces) 548.
Achyranthis for. (Cystopus) 858.
Achyroclines (Synchytrium) 840.
acidus (Boletus) 249.
acidus (Panæolus) 230.
Aconiti-paniculati (*Æcidium*) 752.
aceris (Clavaria) 426.
Actinidiæ (*Æcidium*) 757.
aculeatus (Polyporus) 260.
acutisporus (Hygrophorus) 71.
acutoides (Cortinarius) 199.
Adami (*Polyporus*) 311.
Adathodæ (*Æcidium*) 774.
Adenostylis (*Æcidium*) 570.
Adenostylis (Uromyces) 570.
Adenostylis f. (Uromyces) 576.
adscriptum (Tricholoma) 25.
adustulum (*Steccherinum*) 370.
adustulum (Hydnum) 370.
Æchmantheræ (*Æcidium*) 774.
Ægerita (Peniophora) 410.
Ægerita (*Sclerotium*) 410.
Æluropi (Puccinia) 712.
æmulans (Puccinia) 638.
æquale (Phlyctochytrium) 845.
æquinoctialis (Puccinia) 660.
æruiginosa (*Stropharia*) 211.
Æschynomenis (Uredo) 790.
Æsculi (Dædalea) 353.
Æsculi (*Polyporus*) 353.
Æsculi-flavæ (*Boletus*) 353.
æstivalis (Puccinia) 694.
affine (Exobasidium) 420.
affinis (Clathrus) 462.

- affinis* (*Hirneola*) 442.
affinis (*Merulius*) 442.
africana (*Lycogalopsis*) 494.
africanum (*Catastoma*) 483.
africanum (*Sorosporium*) 512.
Agallocha (*Skierka*) 609.
agaricinum (*Hydnum*) 375.
agariella (*Psilocybe*) 219.
agglutinatus (*Lactarius*) 83.
agnostoica (*Uredo*) 799.
agraria (*Psilocybe*) 230.
Agrimoniæ (*Uropyxis*) 614.
Agrimoniæ-Eupatorii (*Pucciniastrum*) 733.
Agrimoniæ-Eupatorii var. (*Uredo*) 733.
Agrostidis (*Physoderma*) 846.
Airæ-cæspitosæ (*Tilletia*) 517.
Airæ-flexuosæ (*Uredo*) 812.
Ajugæ (*Æcidium*) 772.
alabamensis (*Boletus*) 242.
alabamensis (*Ceratomyces*) 242.
alabamensis (*Coriolus*) 312.
alabamensis (*Polystictus*) 312.
albatum var. (*Tricholoma*) 34.
albellus (*Boletus*) 238.
albertensis (*Melampsora*) 602.
albida (*Russula*) 91.
albida var. (*Russula*) 93.
albida (*Trametes*) 339.
albida (*Ustilago*) 498.
albido-cinerea (*Psathyrella*) 233.
albido-cyaneus (*Cortinarius*) 192.
albido-gilva (*Clitocybe*) 36.
albido-incarnata (*Inocybe*) 160.
albido-lamellata (*Inocybe*) 168.
albido-ochracea (*Inocybe*) 162.
albido-ochraceus (*Agaricus*) 162.
albidula (*Inocybe*) 153.
albidum (*Corticium*) 390.
albidus (*Boletus*) 251.
albo-brunnea (*Psilocybe*) 219.
albo-carnea (*Cyphella*) 422.
albo-cremeum (*Corticium*) 391.
albo-fuscus (*Coriolus*) 376.
albo-fuscus (*Irpex*) 376.
albo-grisea (*Mycena*) 57.
albo-lanaripes (*Armillaria*) 23.
albo-roseus (*Hygrophorus*) 72.
Albucæ (*Ustilago*) 498.
album (*Geopetalum*) 67.
albus (*Merulius*) 361.
albus (*Pleurotus*) 67.
Alchemillæ var. (*Phragmidium*) 724.
Alchemillæ-alpinæ (*Uromyces*) 534.
aleuriosmus (*Cortinarius*) 186.
algerica (*Puccinia*) 656.
algeriensis (*Uromyces*) 579.
aliena (*Puccinia*) 625.
alienus (*Marasmius*) 111.
Allenii (*Omphalia*) 61.
Allescheri (*Tricholoma*) 25.
Allium (*Marasmius*) 115.
allochrous (*Pleurotus*) 66.
allochrous var. (*Pleurotus*) 66.
Alluaudi (*Ganoderma*) 303.
alneus (*Xerocarpus*) 410.
Alni (*Melampsora*) 605.
Alni (*Melampsorium*) 605.
Alni f. (*Septobasidium*) 446.
Alocasiæ var. (*Cæoma*) 787.
Alopecuri (*Uromyces*) 593.
alpestris (*Clitocybe*) 44.
alpestris (*Uromyces*) 560.
alphitochroa (*Psalliota*) 209.
alphitochrous (*Agaricus*) 208.
alpicola (*Synchytrium*) 841.
alpina (*Omphalia*) 59.
alpina (*Puccinia*) 713.
alpina subsp. (*Russula*) 93.
alpina (*Sphacelotheca*) 508.
alpinum (*Uromycladium*) 594.
Alsines (*Uromyces*) 533.
alternans (*Puccinia*) 708.
altissima (*Leptonia*) 142.
altissimus (*Boletus*) 242.
altocedronensis (*Fomitoporella*) 330.
altocedronensis (*Polyporus*) 275.
altocedronensis (*Poria*) 330.
altocedronensis (*Spongiporus*) 275.
alutaceo-fulvus (*Cortinarius*) 197.
alutaceo-villosus (*Polystictus*) 308.
alvearis var. (*Collybia*) 51.
Alwisii (*Boletus*) 247.
amaniensis (*Peniophora*) 405.
amaniensis (*Poria*) 325.
amaniensis (*Puccinia*) 620.
amaniensis (*Uredo*) 797.
amarus (*Polyporus*) 271.
ambiens (*Polyporus*) 267.
ambiens (*Spongipellis*) 267.
ambifaria (*Clitocybe*) 45.
ambiformis (*Clitocybe*) 44.
ambigua (*Dedalea*) 353.
ambigua (*Lenzites*) 124.
ambiguum (*Scleroderma*) 490.

- ambiguus* (*Agaricus*) 70.
ambiguus (*Geaster*) 479.
ambiguus (*Pleurotus*) 70.
ambrosia (*Nolanea*) 146.
ambrosia (*Rhodophyllus*) 146.
Amelanchieris (*Gymnosporangium*) 611.
americana (*Hemileja*) 599.
americanum (*Lagenidium*) 850.
americanum (*Phragmidium*) 724.
americanum var. (*Phragmidium*) 724.
americanum var. (*Pucciniastrum*) 733.
americanum (*Tylostoma*) 475.
americanus (*Boletus*) 241.
americanus (*Clathrus*) 462.
? *americanus* (*Uromyces*) 584.
amethystea var. (*Clitocybe*) 135.
amethysteum (*Entoloma*) 135.
amethystina (*Russula*) 99.
amethystinoides (*Clavaria*) 429.
amianthina (*Puccinia*) 679.
amici (*Amanita*) 2.
ammophila (*Psilocybe*) 221.
amœnus (*Uromyces*) 570.
amphidymus (*Uromyces*) 592.
Amphistelmæ (*Puccinia*) 667.
ampla (*Auriculariopsis*) 423.
ampla (*Cyphella*) 423.
amplectens (*Inonotus*) 275.
amplectens (*Polyporus*) 275.
amurensis (*Uromyces*) 543.
anceps (*Tulasnella*) 452.
andina (*Peronospora*) 862.
andina (*Physalacria*) 441.
andinum (*Asterostroma*) 389.
Andreei (*Pleotrachelus*) 836.
Andromedæ (*Exobasidium*) 420.
andropogonicola (*Puccinia*) 691.
andropogonicola (*Puccinia*) 692.
andropogonicola (*Uredo*) 810.
Andropogonis-aciculati (*Ustilago*) 506.
Andropogonis-annulati (*Uromyces*) 592.
Andropogonis-finitimi (*Ustilago*) 507.
Andropogonis-hirti (*Uredo*) 810.
Andropogonis-macranthi (*Puccinia*) 692.
Andropogonis-micranthi (*Puccinia*) 692.
Androsæmi (*Cæoma*) 786.
anebus (*Polyporus*) 264.
Angelicæ (*Æcidium*) 630.
Angelicæ-œdulis (*Puccinia*) 629.
Angelicæ-mamillata (*Puccinia*) 630.
angelicus var. (*Cyathus*) 466.
anguina (*Psathyrella*) 234.
Syll. fung. XXI (III-1912)
- angulatum* (*Corticium*) 392.
angulisporus var. (*Rhizopus*) 822.
angustatoides (*Puccinia*) 684.
angusticeps (*Psathyrella*) 232.
Angustifoliæ (*Puccinia*) 647.
angustifolium (*Hebeloma*) 170.
anisopilus (*Polyporus*) 264.
annamiticus (*Strobilomyces*) 253.
? *annulata* (*Jansia*) 461.
annulatus (*Phallus*) 461.
anomalus (*Hymenogaster*) 496.
anthemophilus (*Uromyces*) 550.
Antherici (*Æcidium*) 785.
Anthistiria (*Ustilago*) 503.
anthoxanthina (*Uredo*) 809.
anthracophilum (*Corticium*) 391.
anthracophilum (*Hebeloma*) 169.
Anthurii (*Cæoma*) 787.
Anthurii (*Uredo*) 803.
apalosarca (*Collybia*) 127.
apiocarpum var. (*Lycoperdon*) 484.
Apludæ (*Puccinia*) 707.
Apludæ (*Uromyces*) 591.
Apocyni (*Æcidium*) 786.
Apocyni (*Cæoma*) 786.
apoda (*Puccinia*) 708.
Aporosæ (*Goplana*) 715.
Aposeridis (*Entyloma*) 523.
appendiculata (*Pholiota*) 151
? *appendiculata* (*Ustilago*) 504.
appendiculatum (*Cæoma*) 545.
appendiculatum (*Hypholoma*) 217.
applanata (*Graphiola*) 526.
applicatus (*Pleurotus*) 69.
approximans (*Agaricus*) 207.
apricans (*Aleurodiscus*) 403.
apricans (*Corticium*) 403.
aquigena (*Galera*) 182.
aquigenus (*Agaricus*) 182.
Aquilegiæ-viridifloræ var. (*Puccinia*) 665.
aquosipes (*Collybia*) 47.
araneosa (*Tomentella*) 413.
araneosus (*Hypochnus*) 413.
aratum (*Stereum*) 386.
aratus (*Calathinus*) 68.
aratus (*Pleurotus*) 68.
arborea (*Clavaria*) 432.
archyropus (*Marasmius*) 115.
arctica (*Calvatia*) 480.
arctica (*Uredo*) 733.
arcticum (*Phragmidium*) 729.
arcticum (*Pucciniastrum*) 733.

- arcuatifolia* (Pholiota) 149.
arcuatus (Mucor) 821.
arculariformis (Polyporus) 265.
arcularius (Polyporus) 259.
Arecæ var. (Phytophthora) 860.
Arenariæ (Uromyces) 533.
arenarius (Geaster) 478.
arenarius (Xerocoprinus) 223.
arenivagus (Marasmius) 114.
arenosus var. (Polyporus) 259.
argæus (Uromyces) 573.
argentinensis (*Cyphellomyces*) 491.
argentinensis (Favolus) 355.
argentinensis (Peniophora) 412, 866.
argentinensis (Phellorina) 491.
argentinus (Lysurus) 463.
argentinus (Mutinus) 460.
argillaceum (Ganoderma) 299.
argillaceum (*Glæocystidium*) 410.
argillaceus var. (Cortinarius) 191.
argillosa (Clavaria) 433.
Argithamniæ (*Æcidium*) 779.
argyraceum (Tricholoma) 34.
argyrotectus (Agaricus) 207.
Ariæ (*Melampsora*) 605.
Arisæmæ (Uromyces) 581.
Aristidæ-lanuginosæ (Sphacelotheca) 509.
aristidicola (Urocystis) 525.
aristidicola (Ustilago) 503.
Ari-virginici (Uromyces) 582.
? *Arjonæ* (Urocystis) 524.
armeniaca (Russula) 100.
Armeriæ (*Cæoma*) 571.
Armeriæ (Uromyces) 571.
armillatum (Tylostoma) 493. 473
Arniciæ-scorpoidis (Puccinia) 645.
Arniciæ-scorpoidis (Uredo) 645.
arnicale (Coleosporium) 719.
Arnoldi var. (Clitocybe) 45.
? *arrenoctona* (Entomophthora) 832.
Artemisiæ-japonicæ (Uredo) 797.
Arthraxonis (Puccinia) 707.
Arthraxonis (Uromyces) 707.
Arthraxonis-ciliaris (Uredo) 811.
Arthuri (*Ravenelia*) 739.
Arthuri (Uromyces) 534.
Arthuri (Ustilago) 503.
Arundinellæ (Puccinia) 690.
Arundinellæ (Ustilaginoidea) 527.
Arundinellæ-anomalæ (Puccinia) 691.
arvalis (Naucoria) 177.
Aschersoniana (Ustilago) 501.
asclepiadina (Uredo) 799.
ascophorus (Marasmius) 115.
asperula (Clavaria) 430.
asperula (Lepiota) 17.
asperulans (Clavaria) 430.
asperulatum (*Amauroderma*) 307.
asperulatum (Ganoderma) 307.
asperulispora (Clavaria) 433.
asperulus (*Leptoporus*) 268.
asperulus (Polyporus) 268.
Asphodeli (*Cladochytrium*) 850.
Asphodeli Duby (Puccinia) 672.
Asphodeli Bagnis (Puccinia) 713.
Asphodeli (Urophlyctis) 850.
Asphodeli-subalpini var. (Puccinia) 672.
aspideoides (Lactarius) 87.
Asplenii-Wichuriæ (Hyalopsora) 599.
assamensis (Uredo) 804.
assumptus (Cortinarius) 197.
asterella (Clavaria) 431.
asterigma (Tomentella) 416.
asterigma (Tomentella) 419.
asterinoides (Meliola) 657.
Astragali (*Æcidium*) 545.
Astragali (Uromyces) 545.
astragalina (Flammula) 174.
Astrantia-Vivipari (Puccinia) 669.
Asystasiæ (Uredo) 801.
ater (Coprinus) 227.
aterrima (Uredo) 565.
Athyrii (Synchytrium) 841.
Atkinsonianus (Boletus) 236.
Atkinsonianus (*Ceratomyces*) 236.
Atkinsonianus (Cortinarius) 195.
Atkinsonii (Boletus) 241.
atra (Trametes) 344.
atracta (Clitocybe) 37.
atramentosa (Mycena) 58.
atramentosus (Agaricus) 58.
atratoides (Collybia) 50.
Atriplicis (Uromyces) 574.
atro-fusca (Puccinia) 712.
Atropidis (Uromyces) 591.
atro-purpurea (Russula) 94.
atro-purpureum (*Lycoperdon*) 489.
atro-purpureus (Agaricus) 94.
atro-rubens (Russula) 99.
atro-sanguineus (Agaricus) 234.
Atylosiæ (*Æcidium*) 759.
aurantiaca (Tomentella) 416.
aurantiacum (*Cæoma*) 788.
aurantiacum (*Gymnosporangium*) 614.

- aurantiacus (Boletus) 244.
 aurantiacus (Crepidotus) 184.
aurantiacus (*Ithyphallus*) 460.
 aurantio-lutea (Russula) 95.
 aurantium (Tremellodendron) 451.
 aurasiacum (Tylostoma) 469.
 auratile (Hydnum) 366.
 aureo-fulva (Ceracea) 456.
 aureo-lamellata (Inocybe) 166.
 aureolus (Cortinarius) 199.
 aureum (Synchytrium) 841.
 auriculatus (Favolus) 357.
auriculatus (*Pseudofavolus*) 357.
 auriculiformis (Polyporus) 265.
auriculiformis (*Poria*) 265.
 australiana (Bovistella) 481.
 australianum (Tylostoma) 476.
 australis (Clathrus) 462.
 austro-americanus var. (Boletus) 251.
 autumnalis (Uredo) 797.
 avellanea (Poria) 328.
avellaneum (*Amauroderma*) 305.
 avellaneum (Ganoderma) 305.
avellaneus (*Geaster*) 479.
 Avenæ-pubescentis (Puccinia) 699.
 Axinophylli (Puccinia) 649.
 azonus (Lactarius) 80.
 azuma var. (Puccinia) 685.
- badia (Puccinia) 658.
 badia (Tremella) 455.
 Bagliettoanum (Septobasidium) 445.
Bagliettoanus (*Hypochnus*) 445.
 baguirmiensis (Lentinus) 117.
bahamense (*Prosopodium*) 662.
 bahamensis (Puccinia) 662.
 bahiensis (Ravenelia) 741.
 Bakeri (Coprinus) 226.
 Bakeri (Fomes) 293.
 Bakeri (Inocybe) 159.
Bakeri (*Pyropolyporus*) 293.
 Bakeriana (Ravenelia) 735.
 balabacense (Ganoderma) 303.
 Ballouii (Hydnum) 370.
Ballouii (*Steccherinum*) 370.
 balticus (Synchætophagus) 857.
 Bambusæ (Cantharellus) 105.
 Bambusæ (Cintractia) 512.
Bambusæ (*Crinipellis*) 113.
 Bambusæ (Marasmius) 113.
 Bambusæ (Physalacria) 441.
 bambusicola (Discocyphella) 423.
- barbatus* (*Cycloporellus*) 321.
 barbatus (Polystictus) 321.
 Barclayi (Æcidium) 764.
 Barlæ (Lepiota) 12.
Barlæ (*Lepiota*) 17.
 Barretii (Ganoderma) 303.
 basidiosus (Hygrophorus) 79.
bataanense (*Amauroderma*) 307.
 bataanense (Ganoderma) 307.
 bataanensis (Polystictus) 322.
 Batatas (Rhizopus) 822.
 Batesi (Pistillaria) 440.
 Batesianum (Æcidium) 753.
Bauhinia Bk. et C. (*Uredo*) 792.
Bauhinia Henn. (*Uredo*) 550.
 Bauhinia (Uromyces) 550.
Bauhinia (*Uromyces*) 550.
 bauhinicola (Uromyces) 550.
 Bäumleriana (Puccinia) 639.
 Bäumlerianus (Uromyces) 541.
 bavianum (Ganoderma) 295.
 Beccarianum (Tylostoma) 472.
 Beckeræ (Ustilago) 503.
 Beckmanniæ (Puccinia) 707.
 Begoniæ (Coleosporium) 717.
 Behnickiana (Uredo) 803.
 Belamcandæ (Puccinia) 672.
 Belamcandæ (Uredo) 672.
belgradensis (*Tilletia*) 519.
 Bellidiastri (Entyloma) 522.
 Bellidis (Puccinia) 713.
 bellipes (Marasmius) 111.
 bellula (Amanita) 4.
 Beloperones (Uredo) 801.
benguetensis (*Coltricia*) 312.
 benguetensis (Polystictus) 312.
 Benkei (Puccinia) 624.
 Bensleyæ (Lactarius) 89.
 bentista (Lepiota) 13.
 Berberidis (Crepidotus) 184.
Berberidis (*Uredo*) 754.
 Berberidis-Thunbergii (Æcidium) 754.
 Berkeleyana var. (Sphacelotheca) 508.
 Berkeleyi (Boletus) 254.
Berkeleyi (*Trametes*) 353.
 Berkeleyi (Tylostoma) 471.
 Berkheyæ [non Berkleyæ] (Æcidium) 767.
 Bessei (Puccinia) 671.
 Besseyi (Galera) 182.
 Betheli (Gymnosporangium) 610.
 Betheli (Ræstelia) 751.
Betula (*Ocellaria*) 448.

- Betuli (Stictis)* 448.
 betulina (Flammula) 172.
betulina (Fomitoporella) 331.
betulina Melampsora 605.
 betulina (Poria) 331.
 betulina (Psathyrella) 232.
 betuliformis (Lenzites) 124.
 betulinum (Melampsorium) 605, 750.
 bicinctus (Uromyces) 555.
 bicollariata var. (Amanita) 1.
 bicolor Masee (Boletus) 246.
 bicolor Raddi (Boletus) 252.
bicolor (Crinipellis) 112.
 bicolor (Hexagonia) 347.
 bicolor (Lenzites) 125.
 bicolor (Marasmius) 112.
 bicolor var. (Naucoria) 179.
 bicolor (Polyporus) 264.
bicolumnata (Laternea) 462.
 bicolumnatus (Clathrus) 462.
biennis (Thelephora) 405.
 biformis (Clavaria) 434.
 bilobum var. (Ganoderma) 295.
 biocellata (Uredo) 796.
 bipindiensis (Hexagonia) 348.
Birnbaumii (Agaricus) 180.
Birnbaumii (Bolbitius) 180.
bispora (Favolaschia) 358.
 bispora (Laschia) 358.
 bispora (Syncephalis) 830.
 bisporigera (Amanita) 5.
 bisporum (Uromycladium) 594.
Bistortarum (Ustilago) 498.
 bivelatus (Agaricus) 205.
 bivolvata (Amanita) 2.
 Blackfordiæ (Hydnum) 365.
 Blackfordiæ (Russula) 101.
 Blastocladia (Pleolpidium) 838.
 Blepharidis (Æcidium) 774.
 blepharistoma (Auricularia) 442.
blepharistoma (Hirneola) 442.
 Bliti (Cystopus) 858.
Bliti (Cystopus) 859.
 Bloxami (Entoloma) 138.
 Blumeæ (Æcidium) 767.
 Boehmeriæ (Æcidium) 780.
bogoriense (Septobasidium) 445.
 bogoriense (Tolyposporium) 516.
bogoriensis (Pluteus) 52.
 bogoriensis (Ustilaginoidea) 528.
 Jokensis (Puccinia) 657.
 Boltoni (Agaricus) 204.
 Bonæ-Spei (Uromyces) 581.
 bonariensis (Ustilago) 503.
 Bonatii (Coprinus) 225.
 boninensis (Jansia) 461.
boninensis (Mutinus) 461.
 Boodlei (Resticularia) 857.
 Borassi (Graphiola) 527.
 boreale (Peridermium) 747.
 borealis (Collybia) 51.
 borealis (Russula) 93.
borealis (Uromyces) 544.
 borealis (Uromyces) 573.
 Borrichiæ (Sorosporium) 515, 865.
 Borzianus (Pilobolus) 827.
 Bossiæ (Uredo) 790.
 botryoides (Clavaria) 426.
 botryoides (Macrochytrium) 849.
 Botryospermi (Æcidium) 771.
 Boudieri (Amanita) 3.
Boudieri (Lepiota) 21.
 Boudieri (Peridermium) 720.
 Boudieri (Polysaccum) 493.
 Boueana (Hexagonia) 348.
Bouei (Funalia) 321.
 Bouei (Polystictus) 321.
 Boughtoni (Hypholoma) 213.
Bourdotii (Calathinus) 64.
 Bourdotii (Clavaria) 435.
 Bourdotii (Coniophora) 412.
 Bourdotii var. (Corticium) 401.
Bourdotii var. (Glæocystidium) 401.
 Bourdotii (Pleurotus) 64.
Boutelouæ (Diorchidium) 704.
 Boutelouæ (Puccinia) 704.
 Brachybotrydis (Thecopsora) 734
 Brachycomes (Puccinia) 638.
 brachyorrhiza (Clavaria) 435.
 Brændlei (Cortinarius) 191.
 Brandegeeanum (Holocotylon) 494.
 brasiliense (Coleosporium) 723.
 brasiliense (Tricholoma) 32.
 brasiliensis (Baumanniella) 440.
 brasiliensis (Boletus) 249.
brasiliensis var. (Clathrus) 463.
 brasiliensis var. (Lepiota) 21.
 brasiliensis (Tomentella) 416.
 brasiliensis var. (Tremella) 455.
 brasiliensis (Uromyces) 566.
 Bresadolæ (Armillaria) 22.
Bresadolæ (Clavaria) 436.
 Bresadolæ Bourd. (Corticium) 391.
Bresadolæ (Corticium) 389, 866.

- Bresadolæ (Tylostoma) 472.
 Bresadolæ (Uromyces) 561.
 Bresadolianum (Corticium) 866.
 breviata (Naucoria) 177.
 brevicornis (Puccinia) 688.
 Breviculmis (Puccinia) 682.
Breviculmis (Uredo) 682.
Brevieri (*Exobasidium*) 444.
 brevipes var. (Lycoperdon) 484.
brevipes (*Pileolaria*) 531.
 brevipes (Rhizophidium) 843.
 brevipes (Tylostoma) 473.
 brevis (Lactarius) 88.
 breviseta (Mycena) 58.
 Breyniæ (Æcidium) 780.
 Breyniæ (Ravenelia) 744.
 Briardi (Uromyces) 537.
 Brideliæ (Æcidium) 769.
 Brideliæ (Uredo) 800.
Brittonii (*Amauroderma*) 306.
 Brittonii (Ganoderma) 306.
 Britzelmayri (Boletus) 236.
 Britzelmayri (Russula) 98.
 Bromi-japonici (Puccinia) 708.
 Bromi-pauciflori (Uredo) 811.
 Brownii (Uredo) 797.
 brumosa (Clitocybe) 41.
 Brumptianum (Æcidium) 762.
 Brunaudiana (Mycena) 56.
 Brunellæ (Æcidium) 658.
 Brunellarum-Molinæ (Puccinia) 658.
 brunnescens (Collybia) 49.
brunnescens (*Geopetalum*) 65.
 brunnescens (Inocybe) 154.
 brunnescens (Pleurotus) 65.
 brunneus (Cortinarius) 197.
 Bryanti (Coprinus) 227.
 bryophilus (Lactarius) 88.
Bryopsisidis (*Olpidium*) 834.
 Bryopsisipis (Sirolpidium) 834.
 Bubakianum (Æcidium) 630.
 Bubakii (Lycoperdon) 485.
 Buchloës (Puccinia) 699.
 Bucknalli (Inocybe) 163.
 bulbillosum (Tylostoma) 476.
 Bulbines (Æcidium) 785.
 bulbosa (Inocybe) 161.
 bulbosus var. (Boletus) 251.
 bulgarica (Ustilago) 502.
 Bullii var. (Pluteus) 133.
Bupleuri (Corticium) 410.
 Bupleuri (Entyloma) 520.
 Bupleuri-sachalinensis (Æcidium) 785.
 Burnhami (Hygrophorus) 75.
 Butleri (Auricularia) 441.
 Butleri (Chnoospora) 600.
 Butleri (Phragmidium) 725.
 Butleri (Puccinia) 651.
 Byrsonimæ (Æcidium) 757.
 byssinellum (Corticium) 392.
 byssiseda (Omphalia) 62.
byssoides (*Coniophorella*) 411.
 byssoides (Peniophora) 411.
byssoides (Corticium) 411.
 Cabreriana (Uredo) 793.
 Cacaliæ (Æcidium) 765.
 Cacaliæ (Coleosporium) 721.
 Cacaliæ (Puccinia) 642.
Cacaliæ (Puccinia) 721.
 cacao (Puccinia) 697.
 cacheutensis (Puccinia) 634.
 cacheutensis (Ustilago) 502.
 Cactorum (Phytophthora) 860.
 cælestina (Nolanea) 147.
 cærulescens (Hypholoma) 212.
cæsia (*Peniophora*) 410.
cæsia (*Sebacina*) 450.
 cæσιο-cinereum (Corticium) 392.
 cæσιο-coloratus (Polyporus) 262.
 cæσιο-cyaneus (Cortinarius) 186.
 cæσιο-pallens (Cortinarius) 192.
 cæσιο-simulans (Polyporus) 279.
cæσιο-simulans (*Tyromyces*) 279.
 cæsius (Polyporus) 282.
cæsius (*Polyporus*) 311.
 cæspitis (Cladochytrium) 847.
 cæspitosa (Clitocybe) 45.
 cæspitosa (Psathyrella) 232.
 cæspitosa (Trametes) 341.
 cæspitosum (Hydnum) 375.
 cæspitosum (Hypholoma) 214.
 cæspitosus var. (Geaster) 479.
 cæspitum (Marasmius) 107.
Cagnii (*Favolaschia*) 359.
 Cagnii (Laschia) 359.
 Cajani (Æcidium) 759.
 Cajani (Uredo) 792.
Caladii (Uredo) 582.
Caladii (Uromyces) 582.
 Calandrinæ (Peronospora) 862.
 calandrinicola (Ustilago) 497.
 calcata (Odontia) 379.
 calcea (Poria) 325.

- calceolus (Calathinus)* 68.
calceolus (Pleurotus) 68.
calceus (Geaster) 478.
calceus (Polyporus) 325.
Caldwellii (Pleurotus) 70.
Caleæ (Puccinia) 649.
californica (Locellina) 152.
californica (Omphalia) 61.
californica (Psilocybe) 218.
californicus (Bæodromus) 731.
caliginosus (Fomes) 294.
Calkinsii (Polyporus) 280.
Calkinsii (Tyromyces) 280.
callichroa var. (*Dictyophora*) 459.
Calliphoræ (Entomophthora) 832.
callistea (Puccinia) 667.
callisteus (Polystictus) 308.
Calocephali (Puccinia) 637.
calocephus (Pluteus) 132.
salopogon var. (*Pleurotus*) 69.
calosperma (Puccinia) 670.
Calotidis (Puccinia) 637.
calyptratoides (Amanita) 7.
calypthroderma (Amanita) 2.
campanella (Collybia) 46.
campaniforme (Stereum) 386.
campanulata var. (*Mycena*) 63.
campanulatum (Hypholoma) 214.
Campanumæ (Coleosporium) 722.
campestre (Hypholoma) 215.
camphoratus (Lactartus) 89.
canalipes (Cantharellus) 107.
canalipes (Dictyolus) 107.
Canarii (Oudemansiella) 127.
Canavaliæ (Cerotelium) 607.
Canavaliæ (Uredo) 792.
Candicantium var. (*Phragmidium*) 727.
candida (Ægerita) 410.
candida (Laschia) 359.
candida Copel. (Lepiota) 13.
candida Morg. (Lepiota) 20.
candida (Peniophora) 410.
candidum (Tricholoma) 25.
candidus (Pluteus) 133.
candidus (Pluteus) 133.
Candollei (Montagnites) 234.
canina (Mortierella) 828.
Cannabidis var. (*Mortierella*) 828.
Cannonii (Æcidium) 755.
cantharelliformis (Hygrophorus) 75.
capensis (Puccinia) 673.
capillaris (Collybia) 50.
capillaris (Mycena) 55.
capitata (Guepinia) 455.
capitatum var. (*Lycoperdon*) 484.
capitulifera (Achlya) 854.
capnoides (Hypochnus) 419.
Caraganæ (Uromyces) 547.
Carbo (Ustitago) 511.
carbonaria (Flammula) 170.
cardinalis (Agaricus) 60.
cardiospermophilum (Æcidium) 757.
Cardui Arth. (Æcidium) 767.
Cardui Sow. (Æcidium) 786.
carecti (Lepiota) 14.
Carestianum f. (*Septobasidium*) 446.
Caricis-atropictæ (Puccinia) 677.
Caricis-bonariensis (Puccinia) 677.
Caricis-bracteosæ (Puccinia) 676.
Caricis-brunneæ (Puccinia) 678.
Caricis-Darwinii (Puccinia) 678.
Caricis-Gayanæ (Puccinia) 678.
Caricis-gibbæ (Puccinia) 678.
Caricis-japonicæ (Puccinia) 679.
Caricis-macrocephalæ (Puccinia) 676.
Caricis-Phrymæ (Puccinia) 663.
Caricis-polystachyæ (Puccinia) 679.
Caricis-sempervirentis (Uromyces) 584.
Caricis-siderostictæ (Puccinia) 680.
Caricis-siderostictæ (Uredo) 681.
Caricis-trichostylis (Puccinia) 677.
carneola (Kneiffia) 410.
carneola (Peniophora) 410.
carneo-sanguinea (Mycena) 54.
carneum (Æcidium) 545.
carneus (Uromyces) 545.
carnoso-tenax (Clitopilus) 140.
caroliniana (Achlya) 853.
carpathicus (Panus) 122.
Carpentieri (Entomophthora) 832.
Carpini (Melampsora) 605.
Carpini (Melampsoridium) 605.
carpopilum (Rhizophidium) 843.
Carteri (Chionyphe) 821.
Carteri (Mucor) 821.
cartilagineus (Armillaria) 52.
cartilagineus (Polyporus) 282.
cartilagineus (Polyporus) 282.
caseosus (Leptoporus) 268.
caseosus (Polyporus) 268.
Cassandræ (Melampsoropsis) 746.
Cassandræ (Uredo) 747.
Castagnei (Puccinia) 632.
castanea (Inocybe) 164.

- Castaneæ (Mycelophagus) 863.
 Castaneæ (Uredo) 802.
 castaneipes (Typhula) 438.
 castaneo-lamellata (Inocybe) 168.
 castaneo-velutinus (Marasmius) 111.
 castaneus (Uromyces) 543.
castletonensis (*Fuscoporella*) 336.
 castletonensis (Poria) 336.
 caucasica (Bresadolia) 353.
caudicinus (*Polyporellus*) 267.
 caulicola (*Æcidium*) 761.
 caulicola (Ravenelia) 736.
 cauna (Cyathus) 465.
 Cavaræ (Clavaria) 436.
 Cavaræ (Septobasidium) 446.
cavipes (*Agaricus*) 162.
 cavipes (Inocybe) 162.
 cavipes (Russula) 92.
 cebennense (Corticium) 393.
 Cebil (Ravenelia) 736.
 Cedrelæ (Fomes) 293.
Cedrelæ (*Pyropolyporus*) 293.
Cedrelæ (Uredo) 555.
 Cedrelæ (Uromyces) 555.
 Celastri (Pucciniastrum) 732.
 cellare (Asterostroma) 389.
 cellaris (Clarkeinda) 202.
 Celtidis (Uromyces) 575.
 Cembræ (Boletus) 243.
 cenchricola (Uredo) 811.
 cenchrophila (Uredo) 811.
 Centaureæ (Puccinia) 646.
Centaureæ-vallesiacæ (*Puccinia*) 646.
 Cephalandræ (Puccinia) 618.
 Cerasi (Sirobasidium) 448.
 Ceratonisë (Septobasidium) 446.
 cervinus (Pluteus) 133.
 chærophyllina (Puccinia) 628.
 Chætochloæ (Puccinia) 706.
Chætochloæ (Uredo) 706.
chætocladioides (*Thamnidium*) 827.
 chætophora (Peniophora) 410.
chætophorus (*Hypochnus*) 410.
 chalcedonicus (Boletus) 252.
 chalybea (Ascophora) 825.
 chalybeus (Spinellus) 825.
 Chamæcyparissi (Puccinia) 644.
 chariense (Hydnum) 374.
chariensis (*Mycoleptodon*) 374.
 chartaceum (Lachnocladium) 436.
 Chasaliæ (Uredo) 798.
 Cheesmani (Coprinus) 225.
 Cheesmani (Cyphella) 422.
Cheilanthis (*Cæoma*) 600.
 Cheilanthis (Hyalopsora) 600.
 Chevalieri (Cyathus) 465.
 Chevalieri (Sphærophragmium) 734.
Chevalleri (*Amanita*) 8.
 Chevalleri (Amanitopsis) 8.
 chilense (Lycoperdon) 486.
 chlamydopus (Agaricus) 208.
 chlora var. (Russula) 93.
 chloridicola (Puccinia) 706.
 chloridina (Puccinia) 706.
 chlorina (Poria) 326.
 chlorinus (Merulius) 360.
 chlorocephala (Mycena) 53.
 Chlorogonii (Phlyctidium) 844.
 chlorolivacea (Nolanea) 146.
 Chlorophyti (*Æcidium*) 784.
 chlorospora (Lepiota) 13.
 chlorosporus (Mucor) 821.
 choleraæ (Urocystis) 526.
 choleraæ-asiaticæ (Urocystis) 526.
 chordalis (Peniophora) 405.
Chrysanthemi (*Corticium*) 409.
 Chrysanthemi (Peniophora) 409.
 chrysea (Naucoria) 174.
 Chrismantiæ var. (Russula) 93.
 Chrysophylli (Uredo) 789.
 christianensis (Mucor) 819.
 christianiensis var. (Paxillus) 201.
Chudæi (*Coriolus*) 318.
 Chudæi (Lepiota) 12.
 Chudæi (Polystictus) 318.
 Chudæi (Sphacelotheca) 509.
 Chudæi (Tylostoma) 470.
 Chuling (Polyporus) 282.
 cibarius (Cantharellus) 103.
 Cimbicis (Entomophthora) 831.
 Cinchonæ (Septobasidium) 445.
 Cinchonæ (Tulasnella) 452.
 cinchonensis (Fomes) 286.
cinchonensis (*Fomitoporia*) 335.
 cinchonensis (Polyporus) 281.
 cinchonensis (Poria) 335.
cinchonensis (*Pyropolyporus*) 286.
cinchonensis (*Tyromyces*) 281.
 cinctum (Cæoma) 788.
 Cinerariæ (Puccinia) 639.
 cinerea (Dædalea) 351.
 cinerea (Puccinia) 695.
 cinereifolius (Clitopilus) 140.
 cinereo-atra (Clavaria) 434.

- cinereoconia (*Amanita*) 7.
 cinereo-fuscus (*Panæolus*) 231.
 cinereoides (*Clavaria*) 431.
 cinereo-umbrina (*Poria*) 327.
 cinereo-violaceus (*Cortinarius*) 191.
cinerescens (*Hypochnus*) 419
 cinerescens (*Lepiota*) 11.
 cinerescens (*Tomentella*) 419.
 cinereum (*Syncephalastrum*) 830.
 cinericola (*Eccilia*) 148.
cingulata (*Armillaria*) 34.
 cingulata (*Trametes*) 866.
 cingulatum (*Tricholoma*) 34.
 cinnabarina (*Hymenochæte*) 388.
cinnamomea (*Pocillaria*) 119.
 cinnamomeus (*Lentinus*) 119.
 Cinnamomi (*Exobasidium*) 419.
 Cipuræ (*Puccinia*) 672.
 cirrato-pilosa (*Cyphella*) 422.
 citrinus (*Hygrophorus*) 78.
 citripes (*Clavaria*) 434.
 citrophthora (*Pythiacystis*) 856.
 citrophylla var. (*Collybia*) 46.
Cladothricis (*Albugo*) 859.
 Cladrastidis (*Uromyces*) 543.
 clathratum (*Simblum*) 464.
 clavæformis (*Clavaria*) 430.
 clavatus (*Agaricus*) 234.
 clavatus (*Craterellus*) 382.
 clavulatus var. (*Ceriumyces*) 354.
 clavuligerum (*Corticium*) 401.
clavuligerum (*Glæocystidium*) 402.
 Claytoniæ (*Ustilago*) 497.
Clemensiæ (*Amauroderma*) 306.
Clemensiæ (*Coriolus*) 318.
Clemensiæ (*Ganoderma*) 306.
Clemensiæ (*Inonotus*) 272.
Clemensiæ (*Lenzites*) 123.
Clemensiæ (*Polyporus*) 272.
Clemensiæ (*Polystictus*) 318.
 Cleoni (*Massospora*) 832.
 Clitoriæ (*Uromyces*) 548.
 Clusianus var. (*Pluteus*) 133.
 Clusianus (*Polyporus*) 257.
 Clusii var. (*Cortinarius*) 197.
Clusii (*Russula*) 94.
 coætanea (*Puccinia*) 655.
 coccinea (*Laschia*) 359.
 coccinea v. H. et L. (*Peniophora*) 405.
 coccinea Bres. (*Peniophora*) 409.
coccinea (*Thelephora*) 409.
 Coffeæ (*Coprinus*) 227.
 Coffearum (*Nyctalis*) 103.
 coffeicola (*Septobasidium*) 446.
 coffeicolor (*Auricularia*) 442.
coffeicolor (*Hirneola*) 442.
 cognatella (*Puccinia*) 694.
 Coleanthi (*Uredo*) 811.
 coleosporioides (*Cronartium*) 606.
coleosporioides (*Uredo*) 606.
 collapsum (*Synchytrium*) 839.
 collocandus (*Cortinarius*) 191.
 Cologaniæ (*Uromyces*) 549.
coloradense (*Æcidium*) 751
 coloradense (*Peridermium*) 751.
 colorascens (*Lactarius*) 87.
 coloratus (*Hygrophorus*) 75.
 columellifera (*Cintractia*) 511.
 columnatus (*Clathrus*) 463.
 Coluteæ (*Uromyces*) 546.
 comedens (*Uromyces*) 571.
 commixtum (*Corticium*) 393.
 commixtus (*Claudopus*) 149.
commixtus (*Crepidotus*) 149.
 comorense (*Ganoderma*) 300.
comorensis (*Fomes*) 300.
 comosa (*Clavaria*) 431.
 compactus (*Lactarius*) 82.
complicatum (*Hydnellum*) 371.
 complicatum (*Hydnum*) 371.
Compositarum (*Æcidium*) 570.
 Compositarum (*Æcidium*) 765.
 compressa (*Puccinia*) 662.
 compressum (*Lycoperdon*) 488.
 Comptoniæ (*Cronartium*) 606.
 comptus (*Uromyces*) 569.
concentricus (*Coriolus*) 312.
 concentricus (*Polystictus*) 313.
concha (*Agaricus*) 66.
 concha (*Pleurotus*) 66.
 conchyliata (*Clavaria*) 434.
 concinna (*Puccinia*) 648.
 concolor (*Coprinus*) 226.
 concolor (*Puccinia*) 665.
 condensa (*Flammula*) 172.
 condiscipulata (*Omphalia*) 63.
 confertifolia (*Clitocybe*) 39.
 confertifolia (*Naucoria*) 179.
confertifolius (*Agaricus*) 39.
 confertus (*Coprinus*) 225.
 confluens (*Æcidium*) 786.
 confusum (*Sorosporium*) 512.
 congensis (*Cintractia*) 510.
 congensis (*Skierka*) 609.

- congensis* var. (*Uredinopsis*) 610.
congensis (*Uredopeltis*) 746.
congensis (*Ustilaginoidea*) 528.
congensis (*Ustilago*) 505.
conglobata (*Trametes*) 341.
conglobata (*Tremella*) 454.
conglutinata (*Uredo*) 814.
congoanum (*Æcidium*) 776.
congoensis (*Uromyces*) 551.
coniger (*Aphanomyces*) 854.
conissans (*Clitopilus*) 222.
conissans (*Psilocybe*) 222.
conjugata (*Clavaria*) 436.
conjuncta (*Clavaria*) 426.
connatus (*Lentinus*) 116.
conorum (*Æcidium*) 751.
conorum-Piceæ (*Peridermium*) 751.
cono-truncatus (*Coprinus*) 229.
consimile (*Peridermium*) 746.
consobrinum (*Stereum*) 388.
consobrinus (*Xerocarpus*) 388.
conspicabilis (*Polyporus*) 256.
constrictum f. (*Gymnosporangium*) 617.
consuens (*Cænomyces*) 848.
contiguus (*Polyporus*) 328.
convestita (*Uredo*) 801.
convivarum (*Pleurotus*) 64.
Convolvulacearum var. *Swertia* (*Cystopus*) 858.
Convolvuli (*Entyloma*) 521.
Copelandi (*Corioloopsis*) 294, 322.
Copelandi (*Polystictus*) 322.
coprophilum (*Hebeloma*) 171.
coprophilum (*Lycoperdon*) 488.
coracinus (*Polyporus*) 265.
coralloides (*Ithyphallus*) 460.
corbariensis (*Marasmius*) 115.
cordisporus (*Coprinus*) 228.
coriacea (*Tremella*) 454.
Corni (*Æcidium*) 786.
Corni (*Pucciniastrum*) 733.
cornuta (*Ustilago*) 501.
coronatus (*Uromyces*) 588.
coroniferum (*Corticium*) 402.
coroniferum (*Glæocystidium*) 402.
Coronilla (*Corticium*) 390.
corrosus (*Inonotus*) 275.
corrosus (*Polyporus*) 275.
corrugatus (*Cortinarius*) 187.
corrugatus (*Paxillus*) 201.
corrugatus (*Uromyces*) 538.
corruscans (*Fuscoporella*) 337.
corruscans (*Poria*) 337.
corsica (*Peniophora*) 406.
corticola (*Hygrophorus*) 74.
corticola (*Limacium*) 74.
corticola (*Mucor*) 815.
costaricensis (*Fuscoporella*) 337.
costaricensis (*Poria*) 337.
Costi (*Puccinia*) 674.
Costi (*Uromyces*) 674.
cothurnata (*Amanita*) 6.
cothurnatus (*Agaricus*) 208.
Courtetiana (*Tilletia*) 517.
Courtetianus (*Lentinus*) 121.
crassa (*Stropharia*) 211.
Cratævæ (*Æcidium*) 755.
cremeo-album (*Corticium*) 393.
crenato-lobatus var. (*Polystictus*) 308.
crenulata (*Laschia*) 359.
crepidicola (*Entyloma*) 522.
Crepidis-blattarioidis (*Puccinia*) 652.
Crepidis-grandifloræ (*Puccinia*) 652.
Crepidis-japonicæ (*Puccinia*) 652.
Crepidis-japonicæ (*Uredo*) 652.
Crepidis-montanæ (*Æcidium*) 652.
Crepidis-montanæ (*Puccinia*) 652.
cretaceus (*Agaricus*) 208.
crispa (*Clavaria*) 436.
cristata (*Clavaria*) 428.
cristata (*Lepiota*) 12.
cristata (*Thelephora*) 384.
cristatum (*Merisma*) 384.
cristulata (*Odontia*) 380.
cristulatus (*Uromyces*) 562.
crocea (*Coniophora*) 410.
crocea (*Peniophora*) 410.
croceicolor (*Cortinarius*) 196.
croceo-lamellatus (*Agaricus*) 184.
croceo-lamellatus (*Crepidotus*) 184.
croceophyllus (*Hygrophorus*) 76.
croceus (*Cantharellus*) 104.
croceus (*Lactarius*) 83.
crocidens (*Hydnum*) 365.
Crucheti (*Puccinia*) 651.
Cruciferæ (*Puccinia*) 617.
Cruciferarum (? *Synchytrium*) 838.
crucigerum (? *Tricholoma*) 30.
crucigerus (*Agaricus*) 30.
crustacea (*Laschia*) 326.
crustacea (*Poria*) 326.
crustacea (*Thelephora*) 384.
cryptarum (*Agaricus*) 37.
cryptarum (*Clitocybe*) 37.

- Cryptogrammes (Hyalopsora) 600.
 Cryptomeriæ (Polystictus) 312.
 crystallina (Peniophora) 406.
 cubensis (*Earliella*) 324.
 cubensis (*Fomitoporia*) 334.
 cubensis (Galera) 181.
 cubensis (Pholiota) 150.
 cubensis (Polystictus) 324.
 cubensis (Poria) 334.
 cubensis (Stropharia) 209.
 cucullata (Laschia) 358.
 cucullatus (*Merulius*) 358.
 cuculus (Pleolpidium) 837.
 Cucumeris (Ustilago) 507.
 culmicola (Puccinia) 698.
 cuneata (Puccinia) 623.
 cuneata (Trametes) 345.
 cuneatiformis (*Coriolus*) 319.
 cuneatiformis (Polystictus) 319.
 cuneatus (*Coriolellus*) 345.
 cuneiforme (Tricholoma) 30.
 cupressiformis (Mucor) 821.
 cupricolor (Lycoperdon) 488.
 cupulata (Uredo) 813.
Currani (*Coriolus*) 319.
Currani (Ganoderma) 302.
Currani (Polystictus) 319.
 curta var. (*Clavaria*) 428.
 curvipes (Omphalia) 61.
Cutandiæ-memphiticæ (Ustilago) 501.
 cyanescens (Russula) 102.
 cyanothrix (Mycena) 55.
 cyclogramma (Lenzites) 123.
 cyclophæa (Trametes) 343.
 cyclophilum (Tricholoma) 864.
 cyclophilus (*Agaricus*) 864.
 cyclophorum (Tylostoma) 476.
 cylindraceo-campanulata (Omphalia) 62.
 cylindraceo-campanulatus (*Marasmius*) 62.
 cylindripes (Cortinarius) 189.
 cylindrospora (*Absidia*) 824.
 cylindrospora (Typhula) 439.
 Cynosuroidis (Puccinia) 697.
Cynosuroidis (*Uromyces*) 697.
 Cyperi (Kawakamia) 861.
Cyperi (? *Peronospora*) 861.
 Cyperi-polystachyi (Cintractia) 510.
 Cyperi-tagetiformis (Uredo) 805.
 Cypriani (Russula) 99.
 Cyrtoneuræ (Entomophthora) 832.
 cystidiophora (Exidiopsis) 451.
 cystidiophora (*Glæotulasnella*) 453.
 cystidiophora (*Tulasnella*) 453.
 cystopiformis (*Uromyces*) 568.
 Cytisi (Polyporus) 262.

Dactylidis (*Uromyces*) 585, 587.
 dactylina (Puccinia) 698.
 Lactyloctenii (Puccinia) 706.
 dædaliformis var. (Polystictus) 314.
 Dæmiæ (*Æcidium*) 777.
 Dahlia (Coleosporium) 719.
 Dangeardi (*Saccomyces*) 849.
 Daniloii (Puccinia) 689.
 Danthoniæ (*Uromyces*) 591.
 Daphnidarum (Pythium) 855.
 dapsilis (Polyporus) 257.
 Dartmouthi (Boletus) 251.
 dasypus (Marasmius) 110.
 Datiscæ (Coleosporium) 722.
 Daulnoyæ (Cortinarius) 200.
 davaoensis (Uredo) 804.
 Davisii (Bovistella) 482.
 Davisii (Clitopilus) 141.
 Davisii (Gymnosporangium) 611.
 Davisii (Hygrophorus) 77.
 De-Baryana (Achlya) 854.
Debeauvii (*Physoderma*) 850.
 debilipes (Inocybe) 165.
 deceptivus (Cortinarius) 196.
decipiens (*Boletus*) 254.
 decipiens (Corticium) 394.
 decipiens var. (Hygrophorus) 72, 78.
 decipientoides (Inocybe) 160.
 Deckerræ (*Æcidium*) 768.
decolorans (*Corticium*) 410.
 decolorans (Russula) 93.
 decolorosum (Hydnum) 365.
 decorata (Achlya) 852.
 decoratus (Cortinarius) 187.
 decoratus (*Uromyces*) 549.
Decorsei (*Coriolus*) 313.
 Decorsei (Polystictus) 313.
 Decorsei (Tolyposporium) 516.
 decurrens var. (Entoloma) 138.
 decurrens (Polystictus) 309.
 decussata (Trametes) 342.
 Deeringiæ (*Æcidium*) 783.
 deflexa (*Clavaria*) 436.
 deformans (Peridermium) 750.
 deformans (Pleoravenelia) 745.
 deformans (? *Pseudolpidium*) 835.
deglubens (*Inocybe*) 166.
 delagoënsis (*Uromyces*) 581.

- Delavayana (Puccinia) 657.
delectans (*Coriolus*) 314.
delectans (*Marasmius*) 110.
delectans (*Polystictus*) 314.
delicatula (*Polioma*) 657.
delicatula (Puccinia) 657.
delicatulum (*Peridermium*) 747.
delicatum (*Lycoperdon*) 488.
delicatus (*Lactarius*) 81.
Demangei (*Collybia*) 47.
Demangei (*Lepiota*) 16.
Demetrionis (*Poria*) 330.
Demetrionis (*Fomitoporella*) 330.
deminuta (*Inocybe*) 154.
deminuta (Puccinia) 656.
deminutivum (*Entoloma*) 137.
depallens (*Russula*) 94.
dependens (*Fomes*) 292.
dependens (*Pyropolyporus*) 292.
depilata (*Stropharia*) 211.
densa (*Cintractia*) 511.
densilamellatum (*Tricholoma*) 32.
dentato-crenatus (*Agaricus*) 234.
dentatus (*Agaricus*) 234.
denticulata (*Mycena*) 54.
Deschampsiae (Puccinia) 712.
desertorum (Puccinia) 664.
Desmazierii (*Lycoperdon*) 487.
desquamans (*Inocybe*) 158.
destinata (*Lepiota*) 12.
destinatus (*Agaricus*) 12.
destruens (*Irpex*) 376.
destruens (*Urocystis*) 525.
detritica (*Peniophora*) 406.
diacarpum (*Pythium*) 855.
Dialerii (*Agaricus*) 206.
Dialerii (*Fomes*) 293.
Dialerii (*Psalliota*) 206.
diamesa (*Thelephora*) 382.
dianthicola (*Uredo*) 788.
Dianthi-japonici (Puccinia) 621.
Diarrhenæ (Puccinia) 705.
Diaziana (Puccinia) 643.
Dichorisandræ (*Uromyces*) 674.
Dichroæ (*Endophyllum*) 597.
Dichromenæ (*Uredo*) 805.
dichroum (*Hydnum*) 374.
Dicksonii (*Eurychasma*) 844.
Dicksonii (*Rhizophidium*) 844.
dielina (*Saprolegnia*) 852.
dictyoides (*Septobasidium*) 445.
dictyoporus (*Leucoporus*) 260.
dictyoporus (*Polyporus*) 260.
Dictyospermæ (*Uromyces*) 558.
Dieteli (*Chrysomyxa*) 716.
Dieteli (*Peridermium*) 720.
Dietelianus (*Uromyces*) 551.
Dietrichiana (Puccinia) 709.
Diettrichii (*Pluteus*) 132.
difformis (Puccinia) 713.
diffusa (Puccinia) 616.
digitalis (*Mycena*) 57.
digitatus (*Uromyces*) 555.
dimorphosporus (*Mucor*) 820.
dimorphum (*Septoglæum*) 448.
dioica (*Saprolegnia*) 852.
Dioscoreæ (*Urocystis*) 525.
Dipcadi (*Æcidium*) 784.
Diphysæ (*Calliospora*) 713.
diplachnicola (Puccinia) 711.
diplospora (*Sphacelotheca*) 509.
disciforme (*Æcidium*) 775.
disclusa (*Naucoria*) 178.
discoideus (*Uromyces*) 555.
discolor (*Boletus*) 242.
discolor (*Dictyopus*) 242.
discolor (*Hygrophorus*) 74.
discolor (*Ithyphallus*) 460.
discolor (*Limacium*) 74.
discolor (*Mutinus*) 460.
discolor (*Phallus*) 460.
discordabilis (*Psilocybe*) 220.
dispersus (*Mucor*) 821.
disputabilis (*Cortinarius*) 188.
dissimulabilis (*Mycena*) 53.
Dissotidis (Puccinia) 625.
distans (*Stropharia*) 211.
Distichlidis (*Cintractia*) 511.
distinctum (*Rhizophidium*) 843.
distinguenda (Puccinia) 628.
distorta (Puccinia) 660.
divaricata (*Calocera*) 498.
divaricata (*Pterula*) 458.
divergens (Puccinia) 642.
Dodonææ (*Uredo*) 788.
Dolichi (Puccinia) 626.
Dolicholi (*Uromyces*) 539.
domesticus (*Merulius*) 361.
domicola (*Panus*) 122.
dominicensis (*Bovistella*) 482.
Dorsteniæ-Holstii (*Æcidium*) 781.
Dracænæ (*Pleurotus*) 65.
Dracunculi (*Æcidium*) 676.
Dregiæ (*Uredo*) 799.

- droogensis* (Puccinia) 616.
drymonia (Lepiota) 9.
drymonia (Stropharia) 209.
dryophila (Collybia) 50.
dryophila (Fomitoporia) 334.
dryophila (Poria) 334.
dubia (Heterochæte) 449.
dubiosum (Lachnocladium) 437.
duella (Inocybe) 168.
dulcidula (Clitocybe) 38.
dulcidulus (Agaricus) 38.
duriuscula (Inocybe) 156.
duroides (Pholiota) 151.
durum (Gymnosporangium) 610.
durus (Uromyces) 577.
Duthiei (Ustilago) 505.
- Earleæ* (Fomitoporia) 331.
Earleæ (Poria) 331.
Earlei (Cyathus) 469.
Earlei (Lenzites) 125.
Earlianum (Hydnellum) 371.
Earlianum (Hydnum) 371.
Eastwoodiæ (Boletus) 237.
Eastwoodiæ (Suillellus) 237.
Eberhardti (Favolus) 354.
Eberhardti (Laschia) 358.
eburneolus (Hygrophorus) 72.
ecaudata var. (Psilocybe) 221.
Echii (Synchytrium) 839.
echinata (Clavaria) 436.
echinata (? Olpidiopsis) 834.
echiniceps (Hypholoma) 213.
echinocephala (Amanita) 1.
echinosperma (Clitocybe) 45.
echinulata (Mycena) 56.
Ecklonii (Uromyces) 580.
edule (Gleophyllum) 126.
edulis (Lenzites) 126.
effusa (? Dædalea) 352.
effusa (Peronospora) 863.
effusa (Ustilago) 506.
effusus (Coriolus) 314.
effusus (Polystictus) 314.
effusus (Uromyces) 583.
effusus (Uromyces) 583.
egranulosum (Tylostoma) 471.
egregia (Puccinia) 641.
Eichelbaumii (Æcidium) 756.
Eichelbaumii (Corticium) 394.
Eichelbaumii (Hydnum) 374.
Eichelbaumii (Polyporus) 271.
Eichelbaumii (Poria) 326.
Eichelbaumii (Puccinia) 671.
Eichlerianum (Corticium) 410.
ejuncida (Leptonia) 144.
Elæagni (Puccinia) 668.
Elæagni-latifoliæ (Æcidium) 778.
Elæagni-umbellatæ (Æcidium) 778.
Elæocarpi (Æcidium) 756.
elæodes (Hypochnus) 419.
elata (Lepiota) 16.
elata (Naucoria) 175.
elatum f. (Tylostoma) 476.
elatus (Crinipellis) 112.
elatus (Marasmius) 112.
elatus (Uromyces) 535.
electrinus (Cortinarius) 189.
elegans (Agaricus) 234.
elegans (Bulbothamnidium) 827.
elegans (Cunninghamella) 828.
elegans (Hexagonia) 349.
Eleutherantheræ (Puccinia) 637.
eleutherophyllus (Agaricus) 67.
eleutherophyllus (Pleurotus) 67.
Elionuri (Ustilago) 501.
Elionuri-candidi (Ustilago) 501.
ellipsospora (Broomeja) 479.
elliptica (Minutularia) 833.
ellipticum (Olpidium) 833.
elliptosperma (Amanita) 3.
Ellisianum (Hydnum) 372.
Ellisianum (Phellodon) 372.
Ellisianus (Polyporus) 281.
Ellisianus (Tyromyces) 281.
Elmeri (Elfvigia) 295.
Elmeri (Ganoderma) 295.
Elmeri (Polyporus) 279.
Elmeri (Tyromyces) 279.
Elmerianum (Amauroderma) 305.
Elmerianum (Ganoderma) 305.
Elmerianus (Inonotus) 274.
Elmerianus (Polyporus) 274.
elongata (Amanita) 6.
elongata (Clavaria) 430.
elongatipes (Pleurotus) 64.
eludens (Agaricus) 207.
Elvni-sibirici (Puccinia) 705.
Emblicæ (Ravenelia) 744.
emetica (Russula) 93.
Emilii (Amanita) 1.
emodensis (Cyathus) 466.
emodensis (Nidula) 466.
encephala (Næmatelia) 455.

- encephala* (*Tremella*) 455.
Englerianum (*Phragmidium*) 729.
Entadæ f. (*Ravenelia*) 735.
enteromorphum (*Sorosporium*) 512.
enudatum (*Tricholoma*) 32.
Epigejos (*Puccinia*) 687.
epimyces (*Stropharia*) 212.
epodius (*Marasmius*) 115.
Eragrostidis (*Tilletia*) 517.
eremophila (? *Tilletia*) 519.
ericina (*Peniophora*) 407.
Erigerontis (*Æcidium*) 752.
erinaceus (*Hygrophorus*) 76.
eriocephala (*Collybia*) 48.
Eriochloæ Syd. (*Uredo*) 590.
Eriochloæ (*Uredo*) 810.
Eriochloæ Speg. (*Uredo*) 810.
Eriochloæ (*Uromyces*) 590.
eriochloana (*Uredo*) 810.
Eriophori (*Kriegeria*) 448.
Eriophori (*Platyglœa*) 448.
Eriostemonis (*Puccinia*) 624.
erubescens (*Inocybe*) 157.
Ervi (*Æcidium*) 537.
Ervi (*Uromyces*) 537.
erythræa (*Phacopsora*) 607.
Erythrææ f. (*Puccinia*) 663.
erythrina (*Clavaria*) 436.
Erythrinaæ (*Uredo*) 790.
Erythrinæ (*Uromyces*) 548.
Erythronii (*Uromyces*) 578.
erythropus (*Puccinia*) 694.
escharoides (*Puccinia*) 622.
etuberosa var. (*Collybia*) 51.
Eucalypti (*Tubaria*) 183.
Eugeniæ (*Geopetalum*) 67.
Eugeniæ (*Pleurotus*) 67.
Eupatorii (*Bæodromus*) 732.
Eupatorii (*Coleosporium*) 719.
Eupatorii (*Dietelia*) 732.
eupatorium (*Cronartium*) 605.
Euphorbiæ (*Puccinia*) 669.
Euphorbiæ (*Uromyces*) 559.
Euphorbiæ - amygdaloidis (*Melampsora*)
 604
euphorbiæcola (*Trichobasis*) 559.
euphorbiæcola (*Uredo*) 559.
Euphorbiæ-Corniculati (*Uromyces*) 541.
Euphorbiæ-Cyparissiæ (*Melampsora*) 604.
Euphorbiæ-dulcis (*Melampsora*) 604.
Euphorbiæ-exiguæ (*Melampsora*) 604.
Euphorbiæ-Gerardianæ (*Æcidium*) 779.
Euphorbiæ-Gerardianæ (*Melampsora*) 603.
Euphorbiæ-Pepi (*Melampsora*) 604.
Euphorbiæ-serratae var. (*Uredo*) 561.
Euphorbiæ-strictæ (*Melampsora*) 604.
euphorbiicola (*Uromyces*) 559.
Euphrasiæ (*Coleosporium*) 722.
eurhiza (*Armillaria*) 52.
eurhiza (*Collybia*) 52.
europæus (*Favolus*) 357.
Eurotiæ (*Æcidium*) 782.
Eurotiæ (*Puccinia*) 670.
Eurotiæ (*Uromyces*) 574.
evanescens (*Catathelasma*) 8.
Evansii (*Æcidium*) 775.
Evansii (*Puccinia*) 670.
Evansii (*Ustilago*) 502.
evestigatus (*Cortinarius*) 193.
Evodiæ (*Coleosporium*) 717.
Evonymi-Incanæ (*Melampsora*) 603.
exalbidum (*Hebeloma*) 169.
examinata (*Psathyra*) 222.
examinatus (*Agaricus*) 222.
exanulatus (*Boletus*) 239.
exasperans (*Puccinia*) 705.
excavata (*Uredo*) 561.
excavatus (*Uromyces*) 560, 562, 563.
excipulata (*Uredo*) 737.
excoriata (*Inocybe*) 161.
excoriatum (*Lycoperdon*) 489.
exerta (*Cintractia*) 511.
exigua (*Puccinia*) 713.
exiguum (*Gymnosporangium*) 613.
eximia var. (*Solenia*) 363.
expallens (*Calocera*) 457.
expallens (*Corticium*) 394.
expallens var. (*Hygrophorus*) 73.
expallens (*Puccinia*) 673.
expansa (*Flammula*) 172.
explanata (*Inocybe*) 154.
expromptus (*Panæolus*) 231.
exsignata (*Psathyra*) 230.
exsignatus (*Panæolus*) 230.
extans (*Clavaria*) 430.
extensa (*Pileolaria*) 530.
extensus (*Uromyces*) 530.
extenuatus (*Paxillus*) 201.
exterum (*Gymnosporangium*) 612.
extractus (*Boletus*) 240.
exumbonatus var. (*Lactarius*) 90.
Fabæ (*Puccinia*) 713.
Faberi (*Phytophthora*) 860.

- Fadogiæ (Uredo) 798.
 fagicola (Polyporus) 263.
 fagineti (Cortinarius) 198.
 Fagopyri (Sphacelotheca) 508.
 Falcatae (Æcidium) 769.
 fallax (Cæoma) 788.
 fallax (Clitocybe) 42.
 fallax (Inocybe) 158.
fallax (Omphalia) 42.
 fallens (Puccinia) 713.
 farcta (Clitocybe) 43.
 farcta (Inocybe) 157.
farctus (Agaricus) 43.
 farinaceum (Helicobasidium) 444.
 farinella (Mycena) 58.
farinellus (Agaricus) 58.
 farinipes (Russula) 98.
farinosus (Polyporus) 282.
 Farlowiana (Ravenelia) 744.
 Farlowii (Calliospora) 713.
 Farlowii var. (Dictyophora) 459.
 Farlowii (Necium) 601.
 Farlowii (Sclerospora) 862.
fastigiata (Psalliota) 206.
 fastigiatus (Agaricus) 206.
 faveolum (Lycoperdon) 489.
 favi (Puccinia) 713.
 favorabilis (Inocybe) 159.
 favosa (Laschia) 864.
favosa (? Pistillaria) 864.
 Favreæ (Clavaria) 429.
Favreæ (Ramaria) 429.
 felix (Marasmius) 110.
 felleus (Boletus) 251.
 Feltgeni (Cantharellus) 106.
 fenerivense (Hydnum) 374.
 fenestratus (Geaster) 479.
 ferruginascens (Flammula) 173.
 ferruginea (Hydnoc hæte) 375.
 ferruginea (Lenzites) 126.
 ferrugineo-album (Hydnum) 369.
 ferrugineo-griseus (Cortinarius) 199.
 ferrugineo-velutina (Poria) 328.
ferrugineum (Glæophyllum) 126.
 ferruginosa (Tomentella) 418.
ferruginosa (Tomentellina) 418.
Ferulæ (Æcidium) 763.
 Feurichii (Entyloma) 520.
 fibrillosa (Volvaria) 129.
 fibrosipes (Cortinarius) 186.
Ficariæ (Æcidium) 586.
ficicola (Androsaceus) 111.
ficicola (Marasmius) 111.
 Fiebrigii (Uromyces) 551.
 filicinum (Corticium) 394.
filicinum (Glæosporium) 444.
 filicinum (Herpobasidium) 444.
 filiferum (Tolyposporium) 516.
 filiformis (Agaricus) 234.
 filium (Corticium) 395.
 fimbriata (Peniophora) 407.
fimbriatum (Hericium) 373.
 fimbriatum (Hydnum) 373.
 Fimbristylidis (Puccinia) 684.
 Fimbristylis-miliacæ (Ustilago) 498.
 fimicola (Collybia) 49.
 Fioriana (Hexagonia) 347.
 Fiorianus (Uromyces) 556.
 firmipes (Anellaria) 232.
 Fischeri (Peridermium) 722.
 Fischeri (Puccinia) 632.
 Fischerianus (Uromyces) 529.
 Fischeri-Eduardi (Uromyces) 558.
 flabelliformis (Polystictus) 308.
 flaccidus (Hypochnus) 414.
 flagellatum (Sorosporium) 512.
 flava (Naucoria) 176.
 flavescens (Agaricus) 234.
 flavescens (Corticium) 395.
 flavescens (Lepiota) 16.
 flavicomus (Coprinus) 224.
 flavida (Eccilia) 147.
 flavido-lilacina (Inocybe) 155.
 flavifolium (Entoloma) 137.
 flavipes (Boletus) 248.
 flavipes (Hygrophorus) 73.
 flavipes (Puccinia) 684.
flaviporum (Amauroderma) 304.
 flaviporum (Ganoderma) 304.
 flaviporus (Boletus) 243.
 flavo-aurantius (Hypochnus) 413.
 flavo-brunnea (Leptonia) 143.
 flavo-brunnescens (Clavaria) 427.
 flavo-fusca (Clitocybe) 43.
flavo-marginata (Fomitoporia) 333.
 flavo-marginata (Poria) 333.
 flavo-nitens (Hygrophorus) 79.
 flavo-virens (Tomentella) 416.
 flavula (Clavaria) 428.
 flectens (Uromyces) 541.
 Flemmingiæ (Uromyces) 579.
 flexipes (Boletus) 246.
 flexipes (Ganoderma) 302.
 flexuosa var. (Clavaria) 428.

- floccocephala* (*Amanita*) 6.
floccosa (*Stropharia*) 210.
floccoso-farinaceus (*Coprinus*) 224.
floccosum (*Lycoperdon*) 489.
floccosus (*Agaricus*) 234.
flocculenta (*Auriculariopsis*) 423.
flocculenta (*Cyphella*) 423.
flocculentum (*Corticium*) 423.
flocculentus (*Mucor*) 821.
flocculosum (*Hypholoma*) 216.
flocculosum var. (*Hypholoma*) 217.
floralis (*Uromyces*) 551.
floridana (*Fomitoporella*) 329.
floridana (*Poria*) 329.
floridanum (*Tylostoma*) 470.
floridensis (*Bovistella*) 481.
floriforme (*Gymnosporangium*) 613.
fluxum (*Æcidium*) 760.
focicola (*Polyporus*) 309.
focicola (*Polystictus*) 309.
fœderata (*Stropharia*) 211.
fœtens (*Arachnion*) 493.
fœtentula (*Russula*) 99.
fœtida (*Clavaria*) 435.
foliacea (*Clavaria*) 425.
foliacea (*Sparassis*) 425.
formatus (*Polyporus*) 257.
formosa (*Gyrophila*) 184.
formosus (*Crepidotus*) 184.
formosus (*Uromyces*) 533.
fornicatus (*Geaster*) 479.
fracticeps (*Galera*) 182.
fracticia (*Armillaria*) 22.
Fragariæ (*Æcidium*) 786.
fragile (*Hypholoma*) 216.
fragilipes (*Uromyces*) 590.
fragilis (*Clitopilus*) 142.
fragilis (*Collybia*) 49.
fragilis var. (*Lactarius*) 89.
fragilis var. (*Lactarius*) 90.
fragilis (*Leptoporus*) 268.
fragilis (*Mucor*) 821.
fragilis (*Polyporus*) 268.
fragrans (*Hydnum*) 367.
fragrantissima (*Clavaria*) 427.
Fremonti (*Uromyces*) 532.
Fresenii (*Chætostylum*) 827.
Fresenii (*Thamnidium*) 827.
Friesiana (*Poria*) 328.
Friesii (*Polyporus*) 270.
Friesii (*Thelephora*) 410.
Frœlichii (*Albugo*) 859.
Frœlichii (*Cystopus*) 859.
fructigenum (*Peridermium*) 750.
frustatoria (*Clitocybe*) 40.
Fuchsiæ (*Puccinia*) 627.
fuciformis (*Epithele*) 414.
fuciformis (*Hypochnus*) 414.
fuciformis (*Isaria*) 414.
fuciformis (*Tremella*) 455.
fugacissima (*Exidiopsis*) 452.
fugacissima (*Sebacina*) 452.
Fuirenæ-pubescentis (*Puccinia*) 683.
fujiensis (*Puccinia*) 704.
fulgens (*Æcidium*) 542.
fulgens (*Uromyces*) 542.
fuliginea (*Exidiopsis*) 451.
fuligineo-cinereus (*Agaricus*) 63.
fuligineo-cinereus (*Pleurotus*) 63.
fuligineo-nigrescens (*Omphalia*) 59.
fuligineum (*Hydnum*) 368.
fuliginosum (*Syncephalastrum*) 830.
fulvellum (*Tylostoma*) 474.
fulvo-cærulescens (*Cantharellus*) 107.
fulvo-cæruleum (*Hydnum*) 369.
fulvo cinerea (*Corioloopsis*) 323.
fulvo-cinereus (*Polystictus*) 323.
fulvo-cinnamomeus (*Cortinarius*) 198.
fulvo-melleus (*Inonotus*) 274.
fulvo-melleus (*Polyporus*) 274.
fulvo-umbrinus (*Coriolus*) 314.
fulvo-umbrinus (*Polystictus*) 314.
fulvus (*Fomes*) 270.
fulvus (*Polyporus*) 294.
fumidiceps (*Polyporus*) 278.
fumidiceps (*Tyromyces*) 278.
fumosa (*Puccinia*) 666.
funalis (*Cladoderris*) 385.
funerarius (*Boletus*) 240.
fuscella (*Omphalia*) 59.
fuscella (*Omphalia*) 59.
fuscidula (*Volvaria*) 128.
fuscipes (*Armillaria*) 23.
fuscocano-tomentosus (*Agaricus*) 234.
fusco-ferrugineus (*Lentinus*) 117.
fusco-purpureus (*Fomes*) 294.
fusco-squameus (*Agaricus*) 14.
fusco-succinea (*Auricularia*) 442.
fusco-succinea (*Exidia*) 442.
fusco-velutinus (*Polyporus*) 269.
fusco-velutinus (*Xanthochrous*) 269.
fusco-violaceus (*Cortinarius*) 192.
fuscum var. (*Merisma*) 384.
fuscus (*Agaricus*) 234.

- fuscus* (*Zygodemus*) 417.
fusiforme (*Peridermium*) 747.
fusipes (*Collybia*) 46.
fusipes (*Ixoconomus*) 246.
fusipes (*Tylostoma*) 475.
fusispora (*Peniophora*) 410.
fusisporus (*Hypochnus*) 410.
fusoidea (*Puccinia*) 675.
- Gageæ (*Uromyces*) 577.
galeatus (*Agaricu-*) 234.
Galegæ (*Uredo*) 544.
Galegæ (*Uromyces*) 544.
Galii (*Synchytrium*) 841.
Galii (*Uromyces*) 557.
Galzini (*Corticium*) 395.
Galzini (*Irpex*) 376.
Galzini (*Sebacina*) 450.
Gandour (*Hiatula*) 58.
Gandour (*Leucocoprinus*) 58.
Gardneri (*Hysterangium*) 495.
Garrettii (? *Puccinia*) 681.
Gaultheriæ (*Pucciniastrum*) 733.
gedeana (*Hamaspora*) 728.
gedeanum (*Phragmidium*) 728.
Geitonoplesii (*Uredo*) 804.
gelatinosa (*Laschia*) 359.
gelatinosum (*Rhizophidium*) 842.
Gelmii (*Melampsora*) 603.
geminatus var. (*Pilobolus*) 827.
gemma (*Laschia*) 360.
gemmata (*Lepiota*) 16.
gemmata (*Uredo*) 792.
genevensis (*Mucor*) 819.
geniculispora (*Lepiota*) 20.
Genistæ (*Uromyces*) 545.
geochroum (*Corticium*) 395.
geogena f. (*Zygodemus*) 417.
geophilus (*Hypochnus*) 414.
geophylla (*Inocybe*) 166.
Geranii-pilosi (*Puccinia*) 622.
Gesneriacearum (*Puccinia*) 662.
gibbosum (*Chytridium*) 844.
Gibbsiæ (*Lentinus*) 121.
gigantea (*Lepiota*) 9.
giganteum (*Peridermium*) 750.
giganteus (*Coprinus*) 223.
giganteus (*Uromyces*) 566.
gigantulum (*Tricholoma*) 24.
gigas (*Cyphella*) 421.
gigaspora (*Clavaria*) 428.
Giliæ (*Urocystis*) 524.
- gilvescens* (*Poria*) 327.
Girardiniæ (*Æcidium*) 782.
glabella (*Puccinia*) 627.
glaberrima (*Dædalea*) 353.
glabra (*Hexagonia*) 342.
glabra var. (*Sphacelotheca*) 509.
glabra (*Trametes*) 342.
glabrescens (*Bovistella*) 481.
glabriceps (*Amanita*) 6.
glabrum (*Corticium*) 411.
glandulifera (*Tomentella*) 415.
glandulosus (*Boletinus*) 253.
glauca (*Absidia*) 824.
Glaucis Arthur (*Puccinia*) 664.
Glaucis van der Bosch (*Puccinia*) 713.
glaucophylla (*Clitocybe*) 39
glebarum (*Agaricus*) 51.
glebarum (*Collybia*) 51.
glenodinianum (*Olpidium*) 835.
glenodinianum (? *Pseudolpidium*) 835.
glischra (*Lepiota*) 15.
globoso-fusca (*Uredo*) 814.
globosum (*Æcidium*) 612.
globosum (*Gymnosporangium*) 612.
globosum (*Peridermium*) 748.
globularis (*Lepiota*) 19.
globulifera (*Puccinia*) 648.
globuligera (*Thecaphora*) 516.
globuligerum (*Tolyposporium*) 516.
gloiocyaneus (*Bolbitius*) 179.
Glomerula (*Mucor*) 821.
glutinosus (*Cantharellus*) 103.
glutinosus (*Hygrophorus*) 79.
Glyceriæ (*Puccinia*) 703.
Glyceriæ (*Uromyces*) 592.
glycyosmus (*Lactarius*) 90.
Gnaphalii (*Puccinia*) 635.
Gnaphalii (*Uredo*) 635.
gnaphaliicola (*Puccinia*) 635.
Godeyi (*Inocybe*) 166.
Gæthartii (*Polyporus*) 263.
gogoensis (*Lentinus*) 121.
gomphidioides (*Hygrophorus*) 76.
Gomphrenæ (*Cystopus*) 859.
gonapodioides (*Pythiomorpha*) 857.
Götzenii (*Cantharellus*) 104.
Gouaniæ (*Puccinia*) 626.
gracile (*Peridermium*) 748.
gracile (*Pseudolpidium*) 834.
gracilior (*Clavaria*) 433.
gracilipes (*Agaricus*) 59.
gracilipes (*Omphalia*) 59.

- gracilis* var. (Boletus) 251.
gracilis var. (Cortinarius) 199.
gracilis var. (Ithyphallus) 460.
gracilis var. (Lactarius) 90.
gracilis (Ravenelia) 741.
gracilis (Solenia) 362.
greca (Melampsora) 604.
graminiperda (Isaria) 414.
graminis (Capitularia) 587.
graminis (Hypholoma) 216.
graminis (Uromyces) 587.
grammicum (Corticium) 395.
grammopodium (Tricholoma) 208.
grande (Triphragmium) 734.
grandis (Cyphella) 422.
grandis (Pluteus) 130.
granularis (Pluteus) 131.
grata (Russula) 91.
gravabile (Tricholoma) 27.
graveolens (Russula) 102.
Grayiæ (Uredo) 802.
grenadensis (Fomes) 292.
grenadensis (Pyropolyporus) 292.
Griffithsii (Ustilago) 500.
grisea (Galera) 180.
grisea (Sebacina) 450.
grisea (Thelephora) 450.
grisellus (Boletus) 249.
griseo-cyaneus (Mucor) 820.
griseo-fuscescens (Hydnum) 374.
griseo-isabellina (Galera) 183.
griseo-roseus (Boletus) 244.
griseo-roseus (Ceratomyces) 244.
griseum (Entoloma) 136.
griseus (Theleporus) 361.
guatemalense (Æcidium) 771.
guatemalensis (Uromyces) 552.
Guegueni (Lepiota) 21.
guepinioides (Pseudohydnum) 375.
Guzotiæ (Uredo) 795.
guttato-marmorata (Clitocybe) 35.
Gymnolomiæ (Puccinia) 648.
gyrosa (Tremella) 455.

hæmatites (Puccinia) 620.
hæmatopus (Boletus) 252.
Halenia (Puccinia) 665.
halophilus (Agaricus) 208.
hanoiensis (Coniophora) 412.
hanoiensis (Flammula) 172.
Hardenbergiæ (Uromyces) 549.
Hardii (Stropharia) 209.

Harioti (Geaster) 477.
Harknessiana (Ræstelia) 751.
Harknessiana (Ræstelia) 751.
harknessianoides (Ræstelia) 751.
Hartigi (Fomes) 294.
Hartigi (Polyporus) 294.
Hausknechtii (Uromyces) 560.
Hautefeuillei (Marasmius) 108.
Hazslinszkii (Uromyces) 544.
Hectoris (Omphalia) 60.
Hederaceæ (Puccinia) 617.
Hedypnoidis (Æcidium) 768.
Hedysari (Uromyces) 544.
Hedysari-obscuri (Puccinia) 544.
Hedysari-obscuri (Uromyces) 544.
Heimerliana (Puccinia) 710.
Heimerlianus (Uromyces) 538.
Heinricherii var. (Nidula) 466.
Heleocharidis (Uromyces) 583.
Helianthi (Cœoma) 720.
Helianthi (Coleosporium) 720.
helicoides (Clavaria) 433.
Helioscopiæ (Melampsora) 604.
heliotropicus (Cortinarius) 190.
Heliotropii (Puccinia) 666.
Hellebori (Æcidium) 753.
hellenica (Puccinia) 643.
helveola (Lepiota) 17.
helvetica (Grandinia) 401.
helveticum (Corticium) 400.
helvinus (Lactarius) 87.
helvola (Hemileja) 598.
Hemmendorffii (Uromyces) 552.
Henningsiana (Ravenelia) 745, 865.
Henningsianum (Hydnum) 374.
Henningsii (Agaricus) 33.
Henningsii (Bovistella) 482.
Henningsii (Corticium) 400.
Henningsii (Pluteus) 133.
Henningsii (Psilocybe) 219.
Henningsii (Tricholoma) 33.
Henschallii (Hexagonia) 349.
hepatica (Thelephora) 388.
hepaticum (Stereum) 388.
hepaticus (Lactarius) 91.
Hericium (Agaricochæte) 79.
Herrerianum (Æcidium) 766.
hesperidea (Lepiota) 21.
heterodermus (Uromyces) 579.
heterogenea (Inocybe) 160.
Heteropappi (Uredo) 798.
heterophylla (Russula) 93.

- hettematica* (Inocybe) 164.
hettematicus (Agaricus) 165.
 Hewittiæ (Uromyces) 566.
hexagoniformis (Coriolus) 315.
 hexagoniformis (Polystictus) 315.
 Hexalobi (Æcidium) 754.
 Hibbardæ (Lactarius) 88.
 Hibbertiæ (Puccinia) 615.
 Hibisci (Puccinia) 619.
 Hierochloæ (Puccinia) 703.
 hirtellum (Tricholoma) 34.
 hirticeps (Collybia) 50.
 hispidula (Auricularia) 442.
hispidula (Exidia) 442.
 Hoferi (Achlya) 853.
 Höhneliana (Thelephora) 382.
 Hollandianus (Pleurotus) 68.
Hollickii (Coriolus) 365.
 Hollickii (Polystictus) 315.
 hololanigerum (Hypholoma) 215.
 holophæus (Lentinus) 116.
 holoporus (Irpex) 377.
holoporus (Polyporus) 377.
 holorubella (Clavaria) 425.
 Holstii (Polystictus) 309.
Holstii (Polystictus) 310.
Holtermanni (Favolaschia) 358.
 Holtermanni (Laschia) 358.
 Holwayi (Bæodromus) 732.
 Holwayi (Calliospora) 714.
 Holwayi (Entyloma) 522.
 Holwayi (Uredo) 812.
 Hometi (Lactarius) 86.
Hometi var. (Lactarius) 86.
Homogynes (Æcidium) 570.
 Homogynes (Uromyces) 570.
 Homogynes fm. (Uromyces) 576.
hondurensis (Coriolus) 315.
 hondurensis (Polystictus) 315.
 Hookerianus (Polyporus) 259.
 hordeicola (Ustilago) 500.
 Horiana (Doassansia) 526.
Hornemanni (Agaricus) 211.
 horribile (Tricholoma) 24.
 horrida (Wiesnerina) 385.
 Hoslundia (Puccinia) 659.
 Hostæ (Æcidium) 783.
 Housei (Boletus) 248.
Housei (Ceriomyces) 248.
 humidicola (Cortinarius) 196.
 humile (Septobasidium) 445.
humulis (Clavaria) 438.
humulis (Pterula) 438.
Humuli (Peronoplasmopara) 861.
 Humuli (Plasmopara) 861.
hyalina (Glæotulasnella) 453.
 hyalina (Puccinia) 681.
 hyalina (Tulasnella) 453.
hyalina (Uredo) 681.
 hyalospora (Tieghemella) 826.
 hydnoidea var. (Lenzites) 125.
 hydrocotylinum (Æcidium) 764.
 hydrophilus (Fomes) 287.
hydrophilus (Pyropolyporus) 287.
 Hydropiperis (Sphacelotheca) 508.
 hygrometricus (Marasmius) 115.
hygrophanus (Phyllotus) 66.
 hygrophanus (Pleurotus) 66.
 Hygrophilæ (Uredo) 801.
 hymenochætoides (Puccinia) 660.
 Hymenolepidis (Platyglæa) 447.
 Hyoseridis-radiatæ (Puccinia) 653.
 Hyoseridis-scabræ (Puccinia) 653.
 hypericinus (Uromyces) 529.
 hypochnoides (Helicobasidium) 443.
hypochnoides (Stypinella) 443.
 hypodites (Cintractia) 512.
 hypogyna (Achlya) 853.
 hypothejus (Hygrophorus) 73.
 hypsophilum (Æcidium) 779.
 hypsophilus (Uromyces) 779.

igniarius (Polyporus) 294.
ignitus (Agaricus) 139.
 ignitus (Clitopilus) 139.
 ignobilis (Inocybe) 163.
 ignobilis (Uredo) 807.
 ignorabile (Tricholoma) 31.
 igualica (Ravenelia) 743
 illicicola (Volvaria) 128.
 Illicis (Tremella) 455.
 illecebrosum (Tricholoma) 31.
 illepidus (Cortinarius) 200.
imbricatus (Phyllotus) 63.
 imbricatus (Pleurotus) 63.
immarcescens (Clitocybe) 26.
 immarcescens (Tricholoma) 26
immutabilis (Boletus) 254.
 immutabilis (Flammula) 174.
 immutabilis (Gyrodon) 254.
 impromiscua (Mycena) 56.
 improspicua (Naucoria) 178.
 inæquale (Corticium) 401.
inæquale (Glavocystidium) 401.

- inæquale* (Hydnum) 367.
inattenuata (Naucoria) 177.
Inayati (Puccinia) 651.
Inayati (Uromyces) 590.
Inayati (Ustilago) 500.
incana (Trametes) 353.
incanus (Panæolus) 230.
incarnato-fuscescens (Leptonia) 142.
incerta (Omphalia) 60.
incertus (Cortinellus) 60.
incomparabile (Æcidium) 769.
incongruens (Agaricus) 54.
incongruens (Mycena) 54.
inconsequens (Cortinarius) 194.
inconspicua (Peniophora) 410.
inconspicua (Ravenelia) 739.
inconspicuum (Corticium) 410.
inconspicuum (Gymnosporangium) 610.
inconspicuum (Helicobasidium) 444.
inconsuetum var. (Tricholoma) 31.
incorporata (Clitocybe) 41.
incrustans (Corticium) 396.
incrustans (Helicobasidium) 443.
incrustans (Sebacinia) 384.
incrustatum (Ganoderma) 295..
indecisus (Boletus) 236.
indecisus (Boletus) 240.
indepremsum (Tricholoma) 32.
indica (Hemileja) 598.
indica (Ravenelia) 735.
Indigoferæ (Pythium) 854.
infestans (Synchytrium) 842.
inflata (Puccinia) 620.
inflatum (Pleolpidium) 838.
inflexa (Uredo) 807.
inflorescentiæ (Ustilago) 498.
infrequens (Geaster) 478.
infrequens (Puccinia) 658.
infumatus (Agaricus) 234.
infundibuliformis (Cantharellus) 105.
infundibuliformis var. (Favolus) 357.
infundibuliformis (Lepiota) 17.
Ingæ (Ravenelia) 737.
Ingæ (Uredo) 737.
inhabilis (Pleotrachelus) 835.
inodorum (Hydnum) 367.
inolens (Tilletia) 518.
inquinans (Puccinia) 713.
inquirenda (Uredo) 813.
inscripta (Inocybe) 156.
inserenda (Naucoria) 178.
insignis (Lloydia) 405.
insignis (Mitremyces) 477.
insignis (Uromyces) 570.
insolita (Puccinia) 702.
instratum (Hypholoma) 213.
insuavis (Agaricus) 165.
insuavis (Inocybe) 165.
insularis (Trametes) 342.
insularis (Uromyces) 547.
integra (Russula) 96.
intermedia (Lepiota) 15.
intermedia (Typhula) 439.
intermedium (Peridermium) 748.
intermedius (Paxillus) 201.
intestinalis (Urocystis) 526.
intricata (Inocybe) 156.
intricatissima (Clavaria) 432.
intricatissimum var. (Stereum) 387.
intumescens (Puccinia) 668.
intumescens var. (Puccinia) 669.
Inulæ (Coleosporium) 721.
Inulæ (Uredo) 721.
Inulæ-candidæ (Uredo) 795.
inurbanus (Cortinarius) 198.
inutilis (Agaricus) 145.
inutilis (Nolanea) 145.
invenusta (Inocybe) 167.
invenusta (Puccinia) 684.
invenustus (Agaricus) 167.
involutus (Agaricus) 234.
Ipomææ (Æcidium) 565.
Ipomææ (Uromyces) 565.
Iresines (Uromyces) 575.
irpicoides (Bjerkandera) 275.
irpicoides (Polyporus) 275.
irpicoides var. (Poria) 325.
irregulare (Myzocyttium) 850.
irregulare (Pleolpidium) 838.
irregularis (Lactarius) 85.
irregularis (Ravenelia) 736.
isabellina (Dædalea) 350.
isabellinus (Hygrophorus) 78.
isabellinus (Lactarius) 86.
Isachnes (Uredo) 807.
Ischæmi (Uredo) 807.
ischæmonoides (Ustilago) 506.
Iseilematis (Ustilago) 500.
ishikariensis (Puccinia) 703.
Ishikawai (Puccinia) 688.
Isoëtis (Ustilago) 507.
isospora f. (Montagnites) 234.
italicum (Gyrophragmium) 494.
iwatense (Æcidium) 772.

- iwatensis* (Uredo) 802.
Jaapii (*Hypochnus*) 417.
Jacksoniæ (*Cronartium*) 606.
jaliscana (*Puccinia*) 650.
jamaicensis (*Fomitoporia*) 332.
jamaicensis (*Gyroporus*) 252.
jamaicensis (*Inonotus*) 274.
jamaicensis (*Polyporus*) 274.
jamaicensis (*Poria*) 332.
jamaicensis (*Suillus*) 252.
jamaicensis (*Trametes*) 341.
jamaicensis (*Uromyces*) 552.
Janseana (*Flammula*) 52.
Janseni (*Mucor*) 820.
janthinospora (*Coniophora*) 412.
janthinospora (*Gyrophana*) 412.
japonica (*Bovistella*) 481.
japonica (*Nothoravenelia*) 745.
japonica (*Tieghemella*) 826.
japonicum (*Actinocephalum*) 829.
japonicus (*Irpex*) 377.
japonicus (*Irpiciporus*) 377.
japonicus (*Pleurotus*) 71.
japonicus (*Rhizopus*) 822.
japonicus (*Saitomyces*) 829.
japonicus var. (*Uromyces*) 593.
Jasmini var. (*Fomes*) 290.
Jasmini (*Phellinus*) 290.
jatrophicola (*Uromyces*) 557.
javanica (*Cintractia*) 509.
javanica (*Farysia*) 527.
javanica (*Favolaschia*) 358.
javanica (*Heterochæte*) 449.
javanica (*Laschia*) 358.
javanica (*Tuburcinia*) 523.
javanicum (*Exobasidium*) 419.
javanicum (*Syncephalastrum*) 830.
javanicus (*Hymenogaster*) 495.
javanicus (*Mucor*) 817.
Johnsoniana (*Fomitoporella*) 329.
Johnsoniana (*Pholiota*) 150.
Johnsoniana (*Poria*) 329.
Jonesii (*Phragmidium*) 730.
Jonesii (*Uredo*) 718.
jonides (*Hydnum*) 365.
Jordianus (*Uromyces*) 545.
Jordianus (*Uromyces*) 558.
jozankensis (*Uredo*) 807.
Juglandis (*Pleurotus*) 63.
jujuyensis (? *Lepiota*) 15.
Juncelli (*Puccinia*) 675.
juncicola (*Corticium*) 396.
juncicola (*Uromyces*) 582.
Junci-effusi (*Uromyces*) 583.
juncophilum (*Tolyposporium*) 515.
juniperina (*Dædalea*) 350.
juniperina (*Fuscoporia*) 338.
juniperina (*Poria*) 338.
juniperinus (*Agaricus*) 350.
juniperinus (*Inonotus*) 273.
juniperinus (*Polyporus*) 273.
Justiciæ (*Æcidium*) 774.

kajanensis (*Pluteus*) 132.
kamerunensis (*Ustilago*) 499.
kansensis (*Puccinia*) 699.
Karstenii (*Exobasidium*) 420.
Karstenii (*Peniophora*) 410.
Kauffmani (*Hydnum*) 372.
Kellermani (*Galera*) 181.
Kellermani (*Ustilago*) 499.
kerquuelensis (*Uredo*) 809.
Killingiæ-brevifoliæ (*Uredo*) 806.
kisantense (*Æcidium*) 770.
kisantuensis (*Clavaria*) 427.
kisantuensis (*Uromyces*) 538.
Kisslingii (*Pisolithus*) 492.
Kisslingi (*Polysaccum*) 492.
Klebahnii (*Peridermium*) 721.
Kmetii (*Eichleriella*) 451.
Kmetii (*Hirneolina*) 451.
Kmetii (*Radulum*) 451.
Knoxia (*Uredo*) 798.
Kœleriæ (*Puccinia*) 710.
Koordersii (*Diorchidium*) 715.
Kreageri (*Puccinia*) 712.
krjukowensis (*Elasmomyces*) 467.
kurilense (*Peridermium*) 749.
Kusanoi (*Coriolellus*) 345.
Kusanoi (*Dædalea*) 350.
Kusanoi (*Hydnum*) 375.
Kusanoi [non Kusoni] (*Irpex*) 375.
Kusanoi (*Melampsora*) 601.
Kusanoi (*Puccinia*) 685.
Kusanoi (*Trametes*) 345.
kwangensis (*Hymenochæte*) 389.
kwangensis (*Uromyces*) 565.

laccata (*Clitocybe*) 44.
lucer (*Polyporus*) 311.
lachnoderma (*Calvatia*) 480.
Laciniariæ (*Coleosporium*) 720.
laciniata (*Sebacinia*) 384.
lactea (*Mycena*) 56.

- lactea* (*Trametes*) 353.
lactescens (*Boletus*) 250.
lacteum (*Corticium*) 408.
lacteum var. (*Corticium*) 388.
lacticularia (*Mycena*) 53.
lactifluus (*Lactarius*) 91.
Lactucæ-debilis (*Puccinia*) 653.
Lactucæ-denticulatæ (*Puccinia*) 654.
lacunosum (*Corticium*) 411.
laticolor (*Corticium*) 410.
laticolor (*Mycocleptodon*) 374.
lætissima (*Clavaria*) 436.
lævatum (*Hebeloma*) 170.
Lagasceæ (*Puccinia*) 637.
lagenioides (*Pontisma*) 851.
Lagenophoræ (*Thecaphora*) 516.
Laggeræ (*Uredo*) 795.
lagoensis (*Puccinia*) 667.
laguncula (*Olpidium*) 833.
lamaoënsis (*Fomes*) 287.
lamaoënsis (*Pyropolyporus*) 287.
lamaoënsis (*Trametes*) 341.
laminata (*Fomitoporia*) 336.
laminata (*Poria*) 336.
lamprosporus (*Mucor*) 820.
lampsanicola (*Æcidium*) 785.
Lamyi (*Puccinia*) 713.
lanata (*Clitocybe*) 135.
lanata (*Naucoria*) 176.
Langloisiana (*Fomitoporella*) 329.
Langloisiana (*Poria*) 329.
Langloisii (*Fomitoporia*) 334.
Langloisii (*Hypochnus*) 415.
Langloisii (*Poria*) 334.
Lantanæ (*Puccinia*) 663.
lanuginosus (*Lactarius*) 84.
Laportæ (*Æcidium*) 782.
lapponicus (*Uromyces*) 545.
largiuseculus (*Cortinarius*) 188.
laricina (*Lenzites*) 124.
laricinus (*Hygrophorus*) 75.
Laricis (*Æcidium*) 750.
Laricis (*Peridermium*) 750.
Laricis-Nigricantis (*Melampsora*) 603.
Laricis-Purpureæ (*Melampsora*) 603.
Laricis-Reticulatæ (*Melampsora*) 602.
larignus (*Boletus*) 237.
Laserpitii-Graminis (*Uromyces*) 556, 587.
Laserpitii-Sileris (*Æcidium*) 764.
lateritium (*Hydnum*) 365.
latipileus (*Polystictus*) 310.
latisporus (*Polyporus*) 258.
latissimus (*Fomes*) 284.
latiusculum (*Tricholoma*) 26.
latum (*Corticium*) 393.
Launææ (*Puccinia*) 650.
Lauræ (*Hygrophorus*) 72, 78.
Laurentii (*Uredo*) 798.
lausoniensis (*Mucor*) 816.
Lauxaniæ (*Entomophthora*) 832.
lavandula (*Clavaria*) 431.
lectus (*Hygrophorus*) 76.
Leersiæ (*Testicularia*) 516.
Leersiæ (*Ustilago*) 516.
leguminicola (*Uredo*) 793.
leiosporum (*Tylostoma*) 469.
lembosporum (*Corticium*) 396.
lentata (*Clitocybe*) 41.
lentinoides (*Crepidotus*) 184.
lentofragilis (*Clavaria*) 425.
Lepidagathis (*Æcidium*) 773.
lepidocarpus (*Irpex*) 378.
lepidocarpus (*Xylodon*) 378.
Lepidospermæ (*Tolyposporium*) 515.
lepiotoides var. (*Agaricus*) 208.
lepiphylla (*Clitocybe*) 38.
Lepistemonis (*Puccinia*) 665.
leporinum (*Æcidium*) 773.
leptodermus (*Uromyces*) 593.
leptopodium (*Scleroderma*) 490.
leptospora (*Puccinia*) 711.
Le-Rati (*Mitremyces*) 476.
Le-Testui (*Puccinia*) 641.
Le-Testui (*Ravenelia*) 739.
Leucænæ-microphyllæ (*Ravenelia*) 743.
leuceriana (*Puccinia*) 646.
leucericola (*Puccinia*) 646.
leucochrius (*Pleurotus*) 69.
leve var. (*Æcidium*) 776.
Leveilleana (*Cintractia*) 510.
Leveilleanum (*Æcidium*) 754.
Leveillei (*Auricularia*) 423.
Leveillei (*Hirneola*) 423.
levidensis (*Mycena*) 53.
levigatum (*Diorchidium*) 716.
levipila (*Cyphella*) 422.
levis (*Auricularia*) 388.
levis (*Uromyces*) 558.
libertum (*Æcidium*) 781.
Libocedri (*Gymnosporangium*) 614.
Libocedri (*Phragmidium*) 614.
Lichtheimii (*Absidia*) 825.
lignea (*Trametes*) 343.
ligneus (*Fomes*) 284.

- lignophila* (*Amanita*) 7.
ligusticicola (*Puccinia*) 630.
lilacino-lamellata (*Inocybe*) 155.
lilacino-lamellatus (*Agaricus*) 155.
lilascens (*Corticium*) 396.
Liliacearum (*Æcidium*) 578.
Lilii (*Cœoma*) 578.
Lilii (*Uromyces*) 578.
Lilloi (*Dictyophora*) 459.
limbiflorus (*Mucor*) 821.
Limonii (*Uromyces*) 572.
Limonii (*Uromyces*) 571.
Lindavianum (*Corticium*) 400.
lineata (*Ustilago*) 523.
lineatum (*Entyloma*) 523.
linguiformis (*Polyporus*) 263.
Linosyridis-Caricis (*Puccinia*) 683.
Lipocarpæ (*Uredo*) 806.
Lippiæ (*Uromyces*) 564.
lippiicola (*Puccinia*) 664.
lippiivora (*Puccinia*) 663.
lipsiense (*Ganoderma*) 304.
lipsiensis (*Boletus*) 304.
Lithophragmæ (*Puccinia*) 632.
Lithophragmæ (*Urocystis*) 524.
litigiosus (*Gomphidius*) 202.
Lloydianus (*Geaster*) 477.
Lloydii (*Coriolus*) 316.
Lloydii (*Fomitoporia*) 335.
Lloydii (*Polystictus*) 316.
Lloydii (*Poria*) 335.
Lloydii (*Tylostoma*) 474.
lobatum (*Ganoderma*) 304.
lobatus (*Pleotrachelus*) 836.
lobatus (*Polyporus*) 304.
Lolii (*Ustilago*) 507.
longipes (*Boletus*) 248.
longipes var. (*Cantharellus*) 103.
longipes (*Hypholoma*) 212.
longipes (*Pleurotus*) 70.
longipes var. (*Tylostoma*) 472.
longiseta (*Mycena*) 57.
longispora (*Puccinia*) 680.
longisporum var. (*Stereum*) 388.
longissima (*Ustilago*) 507.
longistriatus (*Marasmius*) 107.
loranthicola (*Puccinia*) 633.
Loti (*Puccinia*) 541.
Loti (*Uromyces*) 541.
Lucandi (*Lepiota*) 19.
lucidum (*Ganoderma*) 301.
luctuosus (*Pluteus*) 131.
luculentum (*Æcidium*) 781.
Lucumæ (*Uromyces*) 567.
Ludoviciana (*Fuscoporella*) 336.
Ludoviciana (*Poria*) 336.
Ludovicianus (*Polyporus*) 269.
Ludovicianus (*Xanthochrous*) 269.
Ludwigia (*Æcidium*) 627.
Ludwigia (*Puccinia*) 627.
lugubris (*Coprinus*) 229.
Lupini (*Uredo*) 537.
Lupini (*Uromyces*) 537.
Lupini (*Uromyces*) 536, 537.
lupinicola (*Uromyces*) 535.
luridatum (*Tricholoma*) 27.
luridescens (*Polyporus*) 267.
luridescens (*Spongipellis*) 267.
luridipes (*Clitocybe*) 39.
lusitanica (*Amanita*) 4.
lusitanica var. (*Polyporus*) 344.
lutea (*Pholiota*) 150.
luteo-badius (*Boletus*) 239.
luteo-citrinum (*Tricholoma*) 31.
luteola (*Volvaria*) 128.
luteo-maculans (*Entyloma*) 521.
luteo-maculans (*Tricholoma*) 28.
luteolospermum (*Tricholoma*) 28.
luteolus (*Agaricus*) 128.
luteolus (*Cantharellus*) 104.
luteolus (*Xerotus*) 123.
luteoporus (*Boletus*) 243.
luteo-rubescens (*Clitocybe*) 39.
lutescens var. (*Amanitopsis*) 8.
lutescens (*Tremella*) 455.
luteus (*Lactarius*) 86.
lutincola (? *Armillaria*) 864.
lutincolus (*Agaricus*) 864.
luzonense (*Stereum*) 386.
luzonensis (*Favolus*) 356.
luzonensis (*Fomes*) 283.
luzonensis (*Hexagona*) 356.
luzonensis (*Polyporus*) 266.
luzonensis (*Spongipellis*) 266.
luzonensis (*Trametes*) 340.
lychnidicola (*Uromyces*) 532.
Lychnidis-Miqueliana (*Puccinia*) 621.
Lycii (*Corticium*) 410.
Lycii (*Peniophora*) 410.
lycoperdoides (*Tremella*) 455.
Lygei (*Clitocybe*) 511.
Lygei (*Uromyces*) 586.
Lygei (*Ustilago*) 511.
Lysilomæ (*Ravenelia*) 740.

- Lysimachiae-japonicae* (*Æcidium*) 773.
 Mac-Alpinianum (*Tylostoma*) 471.
macida (*Collybia*) 49.
 Mac-Owani (*Tylostoma*) 475.
Mac-Owaniana (*Ravenelia*) 744.
macrocephalus (*Boletus*) 235.
Macrochloæ (*Ustilago*) 504.
macrogemmatum (*Lycoperdon*) 488.
macrorrhiza (*Armillaria*) 24.
macrorrhizum (*Tricholoma*) 24.
macrospora var. (*Corticium*) 397.
macrospora var. (*Mycena*) 56.
macrospora (*Puccinia*) 674.
macrospora (*Tomentella*) 417.
macrosporum (*Æcidium*) 674.
macrosporum (*Corticium*) 396.
macrosporum (*Hydnum*) 366.
macrosporus (*Boletus*) 243.
macrosporus (*Podaxon*) 468.
macrosporus (*Polyporus*) 263.
maculans (*Lepiota*) 20.
maculata (*Collybia*) 47.
maculatum (*Catastoma*) 483.
maculatus (*Boletus*) 252.
maculatus var. (*Lactarius*) 90.
maderensis (*Cyclomyces*) 354.
magellanica var. (*Ustilago*) 507.
magniceps (*Agaricus*) 208.
magnificus (*Agaricus*) 208.
magnificus (*Pleurotus*) 63.
Magnusiana (*Urophlyctis*) 849.
Magnusianum (*Peridermium*) 721.
Magnusii (*Peridermium*) 721.
Magocsyanum (*Entyloma*) 520.
Maireanus (*Uromyces*) 579.
major (*Puccinia*) 652.
majoricensis (*Puccinia*) 659.
majus (*Entyloma*) 523.
majus var. (*Tylostoma*) 472.
Makinoi (*Cæoma*) 786.
Malbranchei (*Solenia*) 362.
malicola (*Trametes*) 866.
Malvacearum (*Puccinia*) 619.
mamillata (*Annularia*) 130.
mamillata (*Puccinia*) 713.
mamillatus (*Cantharellus*) 105.
mammosum (*Lycoperdon*) 486.
mammosum (*Tylostoma*) 472.
mammosus (*Geaster*) 479.
manaosense (*Lachnocladium*) 437.
Manihotis-Catingæ (*Uromyces*) 557.
manilensis (*Agaricus*) 205.
manilensis (*Lepiota*) 10.
manilensis (*Uredo*) 799.
Marantaceæ (*Uredo*) 805.
marasmioides (*Mycena*) 52.
marcescibile (*Hypholoma*) 214.
marculentus (*Coprinus*) 229.
marginalis var. (*Boletus*) 251.
marginatus var. (*Cantharellus*) 106.
marginatus var. (*Dictyolus*) 106.
marginata (*Uredo*) 735.
marginella (*Mycena*) 54.
marginella (*Mycena*) 54.
marginellus (*Agaricus*) 54.
marina (*Cyclopterocola*) 858.
maritimum (*Uromycladium*) 595.
maritimus (*Agaricus*) 208.
Markhamiæ (*Phragmidiella*) 731.
Marquesii (*Puccinia*) 654.
mauritiana var. (*Dictyophora*) 460.
mauritiana (*Lepiota*) 20.
mauritanus (*Ithyphallus*) 460.
maxima (*Mycena*) 52.
maximus var. (*Polyporus*) 255.
Maxoni (*Ceratomyces*) 252.
Maxoni (*Favolus*) 356.
Maxoni (*Fomitoporia*) 332.
Maxoni (*Hexagona*) 356.
Maxoni (*Poria*) 332.
Maxoni (*Suillus*) 252.
Mayeri-Ludovici (*Mycena*) 57.
Mayorii (*Æcidium*) 659.
Mayorii (*Puccinia*) 659.
mbelensis (*Uredo*) 813.
mbelensis (*Uromyces*) 547.
mebelensis (*Uredo*) 813.
mebelensis (*Uromyces*) 547.
mediocre (*Entoloma*) 134.
megalospora (*Uredo*) 801.
megaphyllum (*Tricholoma*) 29.
Mei (*Æcidium*) 631.
Mei-mamillata (*Puccinia*) 631.
Mei-Mutellinæ (*Æcidium*) 631.
Melampyri (*Coleosporium*) 722.
Melampyri (*Plasmopara*) 861.
Melampyri (*Uredo*) 722.
melanocephala (*Puccinia*) 685.
melanocyclum (*Tylostoma*) 473.
melanoplaca (*Puccinia*) 657.
melasmioides (*Puccinia*) 665.
Meleagriis (*Æcidium*) 578.
Meliloti (*Entyloma*) 519.

- Meliosmæ (Phacopsora) 608.
melleo-flava (*Corioloopsis*) 324.
melleo-flavus (*Polystictus*) 324.
melleopora (*Fomitoporella*) 330.
melleopora (*Poria*) 330.
melliolens (*Russula*) 93.
melospora (*Uredo*) 534.
melosporus (*Uromyces*) 534.
 Melothriæ (*Puccinia*) 618.
membranaceus (*Dictyolus*) 106.
Menyharthi (*Æcidium*) 761.
mephiticus (*Hygrophorus*) 76.
Merenderæ (*Æcidium*) 784.
Merisma (*Trametes*) 339.
Merrillii (*Agaricus*) 203.
Merrillii (*Cintractia*) 510.
Merrillii (*Coleosporium*) 723.
Merrillii (*Fomes*) 287.
Merrillii (*Puccinia*) 674.
Merrillii (*Pyropolyporus*) 287.
Merrittii (*Polyporus*) 278.
Merrittii (*Tyromyces*) 278.
meruliceps (*Panus*) 122.
merulinus (*Phallus*) 460.
mesomorpha (*Puccinia*) 661.
mesopoda forma (*Ganoderma*) 295.
metapodius (*Hygrophorus*) 73.
mexicana (*Bubakia*) 601.
mexicana (*Fuscoporella*) 337.
mexicana (*Melampsora*) 601.
mexicana (*Pileolaria*) 530.
mexicana (*Poria*) 337.
mexicanum (*Peridermium*) 749.
Meyeri-Ludovici (*Agaricus*) 57.
michailowskoensis (*Marasmius*) 109.
Michelianum (*Septobasidium*) 446.
Microchloæ (*Ustilago*) 500.
Microchloæ (*Ustilago*) 500.
microcystideus (*Fomes*) 286.
microcystideus (*Phellinus*) 286.
micromegethus (*Agaricus*) 208.
micropoda (*Stropharia*) 210.
Microrhamni (*Coleosporium*) 717.
microspermus (*Lentinus*) 120.
microspora (*Clitocybe*) 44.
microspora (*Corditubera*) 491.
microspora (*Lepiota*) 19.
microspora (*Puccinia*) 698.
microspora (*Ravenelia*) 740.
microsporus var. (*Marasmius*) 115.
microthele (*Cyphella*) 423.
Mikhnoi (*Irpex*) 378.
Mikhnoi (*Xylodon*) 378.
Mila (*Agaricus*) 234.
Mildbrædii (*Uredo*) 798.
Mildbrædii (*Ustilago*) 505.
millefoliatus (*Cortinarius*) 194.
mimica (*Inocybe*) 154.
mimica (*Peniophora*) 409.
mimicus (*Polystictus*) 322.
mimicus (*Pycnoporus*) 322.
Mimosæ-albidæ (*Ravenelia*) 742.
Mimosæ-cæruleæ (*Ravenelia*) 742.
mimosicola (*Ravenelia*) 741.
Mimusopsidis (*Uromyces*) 566.
miniato-floccosus (*Coprinus*) 230.
miniatus (*Paxillus*) 201.
minima (*Galera*) 182.
minima (*Puccinia*) 713.
minimum (*Hydnum*) 375.
minor (*Circinella*) 822.
minor var. (*Mitremyces*) 476.
minus (*Entoloma*) 137.
minusculus (*Lactarius*) 89.
minuta (*Clavaria*) 436.
minuta (*Inocybe*) 164.
minutellum (*Hypholoma*) 217.
minutissima (*Puccinia*) 680.
minutissimum (*Corticium*) 397.
minutum (*Rhizophidium*) 843.
minutus (*Pleotrachelus*) 836.
mira (*Clavaria*) 433.
mirabilis (*Agaricochæte*) 80.
mirabilis (*Agaricus*) 234.
mirabilis (*Geaster*) 477.
mirabilis (*Goplana*) 714.
mirabilis (*Hexagonia*) 349.
mirabilis (*Mycena*) 54.
mirabilis (*Psilopezia*) 404.
Miramar (*Boletus*) 254.
Miramar (*Gyrodon*) 254.
mirificus (*Clitopilus*) 139.
miseranda (*Collybia*) 49.
Missionis (*Lepiota*) 10.
mitissimus (*Lactarius*) 90.
mitriformis (*Puccinia*) 685.
mixta (*Tilletia*) 515.
mixtum (*Sorosporium*) 515.
Miyabeana (*Puccinia*) 629.
Miyabeana (*Rostrupia*) 723.
Miyabei (*Bovistella*) 482.
Miyabei (*Gymnosporangium*) 614.
Miyakei (*Puccinia*) 680.
modesta (*Russula*) 100.

- modestum (Entoloma) 137.
 Molleriana (Peniophora) 410.
 mollicellum (Tricholoma) 28.
mollis (*Microporus*) 308.
 mollis (Polystictus) 308.
mollissima (*Thelephora*) 384.
 Molluginis (*Æcidium*) 768.
moluccensis (*Favolus*) 357.
Mompa (*Helicobasidium*) 445.
 Mompa (*Septobasidium*) 445.
 monospora (*Piptocephalis*) 829.
 monspessulanus (*Uromyces*) 561.
 monstrosus (*Agaricus*) 234.
monstruosus (*Fomes*) 294.
 montanum (*Æcidium*) 753.
 montanum (*Peridermium*) 749.
 montanum (*Tricholoma*) 31.
montanus (*Cerioporus*) 260.
 montanus (*Polyporus*) 260.
 montanus (*Uromyces*) 536.
 montivaga (*Puccinia*) 654.
 montivagum (*Phragmidium*) 725.
 Moraceæ (*Uredo*) 803.
 Morgani (*Geaster*) 478.
 Morgani (*Hydnum*) 370.
Morgani (*Steccherinum*) 370.
 Mori (*Æcidium*) 782.
Mori (*Ceoma*) 782.
 Moringæ (*Puccinia*) 625.
 moriokaensis (*Puccinia*) 687.
 Morrisii (*Amanita*) 4.
 Morrisii (*Boletus*) 244.
 Morrisii (*Cortinarius*) 195.
 Morrisoni (*Puccinia*) 623.
 moschata var. (*Collybia*) 47.
 Moyanoi (*Puccinia*) 696.
Mucedo (*Mucor*) 827.
 mucida (*Poria*) 325.
 mucidus (*Lactarius*) 84.
 muciflua (*Collybia*) 50.
 mucoroides (*Circinella*) 821.
 mucronata (*Puccinia*) 713.
mucronatum (*Phragmidium*) 724.
 Mucunæ (*Sphærophragmium*) 735.
Mucunæ (*Uredo*) 791.
 mucunicola (*Uredo*) 791.
 Muehlenbergiæ (*Tilletia*) 518.
 Muehlenbergiæ (*Uromyces*) 589.
 Muellerianum (*Tolyposporium*) 515.
 multicomum (*Hydnum*) 375.
 multifolia (*Fiammula*) 172.
 multipedata (*Psathyra*) 222.
 multiporum (*Gymnosporangium*) 611.
 multizonata (*Thelephora*) 385.
 Murariæ (*Uredo*) 813.
 muricellata (*Inocybe*) 164.
 murinum (*Entoloma*) 136.
 murinus (*Pluteus*) 131.
 Musæ (*Hypholoma*) 215.
 Musæ (*Pholiota*) 152.
Musæ (*Pholiotina*) 152.
 Musæ (*Uromyces*) 576.
 Musarum (*Naucoria*) 176.
 Muscari (*Physoderma*) 846.
Muscorum (*Hypochnus*) 411.
 Mussoni (*Puccinia*) 661.
 mussooriensis (*Uromyces*) 589.
 mutabile var. (*Hysterangium*) 495.
 mutabilis (*Boletus*) 251.
 mutabilis (*Coprinus*) 228.
 mutabilis (*Dædalea*) 351.
 mutatoria (*Inocybe*) 157.
 mutisiicola (*Puccinia*) 635.
 Myriactidis var. (*Æcidium*) 765.
 Myriophylli (*Cladochytrium*) 846.
 myriopodum (*Hydnum*) 373.
Myrtilli (*Exobasidium*) 421.
 mysorensis (*Puccinia*) 683.
 Nabali (*Puccinia*) 651.
 Nakamishikii (*Æcidium*) 778.
 Nakanishikii (*Puccinia*) 691.
 Nakanishikii (*Uredo*) 806.
 Nambuana (*Ochropsora*) 605.
Nambuuanum (*Coleosporium*) 605.
 Nambuuanum (*Phragmidium*) 730.
 Nanoenides (*Æcidium*) 781.
 nanus (*Agaricus*) 234.
 nanus (*Boletus*) 250.
 Nardi (*Ustilago*) 505.
 nasuta var. (*Dictyophora*) 459.
naucina (*Lepiota*) 208.
 naucinoides (*Lepiota*) 12.
 nauseosa (*Armillaria*) 22.
navicularis (*Sphæria*) 717.
 Nawaschini (*Ustilago*) 498.
 neophana (*Lepiota*) 19.
 nervicola (*Uredo*) 793.
 nerviphila (*Puccinia*) 713.
Nesæ (*Puccinia*) 627.
 neurodermus (*Pluteus*) 133.
 neurophyllum (*Hebeloma*) 169.
 nevadense (*Ganoderma*) 298.
 niam-niamensis (*Hexagonia*) 347.

- nicaraguensis* (*Fuscoporia*) 338.
nicaraguensis (*Poria*) 338.
Nicotianæ var. (*Ganoderma*) 302.
nidificans (*Uromyces*) 574.
niger (*Agaricus*) 234.
niger (*Mucor*) 823.
niger (*Rhizopus*) 823.
nigra (*Hirneola*) 442.
nigra (*Tomentella*) 417.
Nigræ f. (*Puccinia*) 646.
nigrella (*Psilocybe*) 218.
nigrescens (*Auricularia*) 442.
nigrescens (*Peziza*) 442.
nigrescens var. (*Polystictus*) 320.
nigrescens var. (*Stictis*) 448.
nigrescens (*Trametes*) 344.
nigrescentipes (*Russula*) 100.
nigricans (*Hymenochæte*) 389.
nigricans (*Platyglœa*) 448.
nigricans (*Protocoronospora*) 421.
nigricans (*Stereum*) 389.
nigricans (*Telephora*) 389.
nigripes (*Calocera*) 458.
nigro-albus (*Cyathus*) 465.
nigro-cincta (*Hexagonia*) 349.
nigro-cinctum (*Æcidium*) 761.
nigro-cinereus (*Corioloopsis*) 323.
nigro-cinereus (*Polystictus*) 323.
nigro-zonata (*Lenzites*) 127.
nigro-zonatum (*Glœophyllum*) 127.
nigrum (*Stereum*) 387.
nimbifera (*Naucoria*) 179.
nitidiuscula (*Inocybe*) 157.
nitidula (*Trametes*) 345.
nitidum (*Ganoderma*) 299.
nitidus (*Lactarius*) 86.
nitrosus (*Hygrophorus*) 73.
nivea (*Lepiota*) 11.
nivea (*Puccinia*) 658.
nivea (*Solenia*) 362.
niveo-cremeum (*Corticium*) 397.
niveus (? *Cantharellus*) 106.
nivosellus (*Polyporus*) 280.
nivosellus (*Tyromyces*) 280.
Noacki (*Polyporus*) 270.
Noacki (*Puccinia*) 633.
Noacki (*Xanthochrous*) 270.
Noackianus (*Polyporus*) 266.
Noackianus (*Melanopus*) 266.
nobile (*Æcidium*) 770.
nobilis (*Boletus*) 235.
nobilis (*Clitocybe*) 36.
Noccæ (*Puccinia*) 649.
nodosus (*Mucor*) 823.
nodosus (*Rhizopus*) 823.
nodulosperma (*Clavaria*) 428.
Noharæ (*Irpex*) 377.
Noharæ (*Irpiciporus*) 377.
nominabilis (*Lactarius*) 81.
Nordenskjöldii (*Uromyces*) 538.
norvegicus (*Mucor*) 823.
notabile (*Uromycladium*) 596.
notabilis (*Agaricus*) 61.
notabilis (*Omphalia*) 61.
notabilis (*Uredo*) 596.
Nothoscordi (*Uromyces*) 578.
nucleatus (*Craterellus*) 382.
nudipes (*Lepiota*) 18.
nuptialis (*Marasmius*) 108.
Nuttallii (*Hydnellum*) 371.
Nuttallii (*Hydnum*) 371.

obconicus (*Hygrophorus*) 77.
obconicus (*Lentinus*) 120.
obducens (*Tomentella*) 411.
obesa (*Ungulina*) 294.
obesum (*Æcidium*) 777.
obesus (*Fomes*) 294.
obesus (*Polystictus*) 310.
oblectabilis (*Inocybe*) 166.
oblectanea (*Clavaria*) 432.
obliquiformis (*Fomitoporia*) 333.
obliquiformis (*Poria*) 333.
obliterata (*Puccinia*) 709.
oblitus (*Agaricus*) 15.
oblongata (*Achlya*) 853.
obovatus (*Polyporus*) 311.
obovatus (*Polystictus*) 311.
obscurata (*Clitocybe*) 39.
obscurior var. (*Lactarius*) 90.
obsкуро-umbonata (*Lepiota*) 15.
observabilis (*Inocybe*) 163.
obtusisporus (*Panæolus*) 231.
obtusus (*Cortinarius*) 199.
occidentale (*Cæoma*) 787.
occidentale (*Coleosporium*) 719.
occidentale (*Tylostoma*) 471.
occidentalis (*Albugo*) 859.
occidentalis (*Cystopus*) 859.
occidentalis (*Polyporus*) 266.
occidentalis (*Polystictus*) 314.
occidentalis (*Spongipellis*) 266.
occulta (*Puccinia*) 616.
occulta (*Urocystis*) 526.

- occultum (Hydnum) 368.
occultus (*Agaricus*) 130.
 occultus (*Pluteus*) 130.
 ochraceo-virens (*Clavaria*) 428.
 ochraceus (*Panus*) 122.
 ochreate (*Amanita*) 5.
ochroleuca (*Coniophora*) 410.
 ochroleuca (*Peniophora*) 410.
 ochroleuca (*Trametes*) 341.
ochroleucum (*Sistotrema*) 342.
ochrotinctellus (*Coriolus*) 316.
 ochrotinctellus (*Polystictus*) 316.
 octosporum (*Corticium*) 390.
 odorabilis (*Clitocybe*) 41.
 odoratissima (*Pholiota*) 151.
 odoratissimum (*Hebeloma*) 169.
 odorativus (*Claudopus*) 148.
 odoratum (*Lachnocladium*) 436.
œdipus (*Uromyces*) 543.
 (*Enanthes* Carest. (*Puccinia*) 713.
 (*Enanthes* (Diet.) Miyake (*Puccinia*) 629.
Enanthes (*Uredo*) 629.
 œnothericola (*Uredo*) 791.
ohiensis (*Fomitoporia*) 333.
 ohiensis (*Poria*) 333.
 okatamænsis (*Puccinia*) 687.
 olæodes (*Tomentella*) 419.
 Oldenlandiæ (*Æcidium*) 770.
Oldenlandiæ (*Æcidium*) 770.
Oldenlandiæ (*Uredo*) 770.
 oldenlandiicola (*Puccinia*) 656.
 Oleæ (*Cystopsora*) 607.
 Oleariæ (*Æcidium*) 766.
 olens f. minor (*Amanita*) 2.
 oleosum (*Corticium*) 402.
oleosum (*Glœocystidium*) 404.
 Oliganthæ (*Puccinia*) 655.
 oligosporus (*Rhizopus*) 823.
 oligotheles (*Ravenelia*) 738.
 olivacea (*Coniophora*) 413.
 olivacea (*Exidia*) 451.
 olivaceo-marginata (*Mycena*) 56.
 olivaceo-stramineus (*Cortinarius*) 186.
 olivaceo-violascens (*Russula*) 101.
 olivaceus (*Cantharellus*) 107.
 Oliveriana (? *Urophlyctis*) 850.
Oliveriana (*Urophlyctites*) 850.
 olivicolor (*Russula*) 101.
 olla (*Rhizophidium*) 842.
 Olpidium (*Pleotrachelus*) 836.
 omphaliæformis var. (*Collybia*) 48.
omphalinus (*Androsaceus*) 112.
omphalinus (*Marasmius*) 112.
 Oncidii (*Hemileja*) 599.
Onobrychidis (*Puccinia*) 544.
Onobrychidis (*Uredo*) 544.
 Onobrychidis (*Uromyces*) 544.
 Ononidis (*Peronospora*) 862.
 oogenes (*Mucor*) 821.
 opalinus (*Marasmius*) 108.
 operta (*Uredo*) 808.
 operta (*Ustilago*) 502.
 Ophiocauli (*Æcidium*) 755.
 Ophiuri (*Uredo*) 812.
 opimatus (*Cortinarius*) 191.
 Oplismeni (*Puccinia*) 702.
 orbispora (*Clitocybe*) 44.
 orcelloides (*Clitopilus*) 141.
 oregonense (*Ganoderma*) 298.
 orientale (*Diorchidium*) 715.
 orientale (*Phragmidium*) 730.
 orientalis (*Uredo*) 813.
 orientalis (*Uromyces*) 547.
orinocensis (*Physalacria*) 441.
ornamentale (*Æcidium*) 744.
 ornamentalis (*Ravenelia*) 744.
 ornata (*Ravenelia*) 738.
 ornatipes (*Clavaria*) 432.
 ornatula (*Puccinia*) 617.
 ornatus (*Coprinus*) 228.
 ornithogaleum (*Æcidium*) 783.
 Ornithogali-thyrsoïdis (*Puccinia*) 671.
Orobi (*Æcidium*) 546.
Orobi (*Uredo*) 546.
 Orobi (*Uromyces*) 546.
Orobi-tuberosi (*Æcidium*) 546.
 oroleucum (*Ganoderma*) 302.
 Orthobasidium (*Ordonia*) 447.
 Oryzæ (*Urocystis*) 526.
 Oryzopsidis (*Puccinia*) 702.
 Osmanthi (*Æcidium*) 773.
 ostiolatum (*Lycoperdon*) 484.
ostreiformis (*Polyporus*) 345.
 ostreiformis (*Trametes*) 345.
 oubanguiense (*Lycoperdon*) 486.
 ovalis (*Uromyces*) 585.
 ovarium (*Sorosporium*) 513.
ovipara (*Clitocybe*) 95.
 ovirensis (*Uromyces*) 567.
 Oxycocci (*Exobasidium*) 420.
 Oxyris (*Puccinia*) 713.
 pachycephala (*Puccinia*) 673.
 pachycephalus (*Boletus*) 246.

- pachycephs (Uromyces) 565.
 pachyphlœus (Fomes) 283.
 Pæderiæ (Coleosporium) 723.
 palensis (Polyporus) 261.
 pallescens (Clavaria) 434.
 pallida (Aseroë) 464.
 pallida (Bresadolina) 385.
pallida (Thelephora) 385.
 pallide-alutaceus (Lentinus) 120.
 pallidispora (Clitocybe) 38.
 pallidiuscula (Uredo) 802.
pallidocervinus (Polyporus) 313.
pallidocervinus (Polystictus) 313.
 pallido-cinerescens (Solenia) 362.
pallido-flava (Dædalea) 353.
pallido-fulvellus (Coriolus) 313.
 pallido-fulvellus (Polystictus) 313.
 pallido-maculata (Puccinia) 632.
pallidula (Gonatobotrys) 402.
 pallidum var. (Tylostoma) 472.
 pallidus var. (Cantharellus) 105.
 Palmarum (Polyporus) 279.
Palmarum (Tyromyces) 279.
 palmatosporus (Cortinarius) 187.
 Palmeri (Lentinus) 118.
Palmeri (Pocillaria) 118.
 palmivorum (Pythium) 855.
 paludestris (Lactarius) 81.
paludicola (Agaricus) 145.
 paludicola (Nolanea) 145.
 paludosa (Russula) 91.
 paludosella (Naucoria) 175.
 palumbina (Odontia) 379.
 Pammelii (Entyloma) 523.
 pamparum (Clavaria) 435.
pampeana (Clavaria) 435.
 Pancicii (Tilletia) 518.
 Pandani (? Cyphella) 423.
 Pandani var. (Polyporus) 268.
 panicicola (Puccinia) 701.
 Panici-prostrati (Uredo) 808.
 panicophila (Puccinia) 702.
 Panizzii (Clitocybe) 36.
 pannosus (Uromyces) 553.
 papillata (Tomentella) 417.
papillosa (Dendrothele) 401.
 papillosum (Corticium) 401.
 Pappiana (Ustilago) 499.
 Pappophori (Ustilago) 504.
 papyracea (Lloydia) 388, 866.
papyracea (Thelephora) 388.
 papyraceum (Stereum) 387.
 paradoxa (Flammula) 255.
 paradoxa (Saprolegnia) 851.
 paradoxa (Puccinia) 710.
 paradoxus (Agaricus) 234.
 paradoxus (Pleotrachelus) 837.
 paradoxus (Strobilomyces) 253.
 paradoxus (Uromyces) 532.
 paraensis (Puccinia) 626.
 Paramignyæ (Æcidium) 758.
Paramignyæ (Æcidium) 758.
 parasitica (Leptonia) 144.
parasitica (Phylloporia) 325.
 Parsoniæ (Æcidium) 777.
 Parthenii (Æcidium) 765.
 Parthenii (Puccinia) 639.
Parthenii (Uredo) 639.
parthenius (Coriolus) 316.
 parthenius (Polystictus) 316.
 parviducta (Psilocybe) 220.
parvipes (Russula) 98.
parvula (Volvaria) 208.
 parvulus Masee (Boletus) 247.
 parvulus (Paul.) Lév. (Boletus) 252.
Pasadenæ (Uredo) 600.
 Pascheri (Æcidium) 776.
 Paspali (Sorosporium) 513.
 Paspali-scribiculati (Uredo) 808.
 Passifloræ (Melampsora) 601.
 patens (Scleroderma) 491.
 Patouillardi (Inocybe) 155.
 Patouillardi (Lepiota) 17.
 Patouillardi (Polystictus) 311.
 patruelis (Puccinia) 682.
 Pattersonæ (Agaricus) 204.
 Pattersoniæ (Puccinia) 695.
 Pattersoniana (Puccinia) 710.
 patuloides (Clitocybe) 36.
 patulum (Æcidium) 759.
 patzcuarensis (Uromyces) 531.
 paulistana (? Uredo) 800.
 paupercula (Puccinia) 647.
 Payenæ (Uromyces) 566.
 Peckii (Lactarius) 82.
 pectinatoides (Russula) 100.
 pectinatus (Fomes) 290.
 pedicellata (Uredo) 804.
pedunculatum (Tylostoma) 472.
Pellææ (Uredo) 600.
pellæicola (Hyalopsora) 600.
Pelletieri (Clitocybe) 255.
 Pelletieri (Phylloporus) 255.
 pellicula (Irpech) 378.

- pellicula* (*Poria*) 378.
pellitus (*Boletus*) 252.
pellitus (*Pluteus*) 133.
pellucidula (*Nolanea*) 146.
penaiensis (*Panaeolus*) 230.
penicillata (*Rovstelia*) 612.
penicillata (*Thelephora*) 384.
penicillioides (? *Sporodinia*) 826.
Peniophoræ (*Platyglæa*) 448.
pennsylvanicus (*Polyporus*) 264.
pentagonus (*Mutinus*) 461.
percognitus (*Cortinarius*) 187.
pereffusa (*Pomitoporia*) 335.
pereffusa (*Poria*) 335.
peregrinum (*Entyloma*) 521.
perelegans var. (*Flammula*) 174.
perennis (*Polystictus*) 309.
pereziicola (*Puccinia*) 646.
perfecta var. (*Pholiota*) 152.
perforans (*Ectrogella*) 837.
perfuscus (*Agaricus*) 206.
pergamenus (*Marasmius*) 108.
Pergulariæ (*Æcidium*) 776.
peritricha (*Exidiopsis*) 452.
peritricha (*Sebacina*) 452.
Perlebiæ (*Uromyces*) 553.
perminuta (*Puccinia*) 696.
permixta (*Lepiota*) 21.
permunda (*Amanita*) 4.
peronatus (*Agaricus*) 234.
peronatus (*Volvopolyporus*) 282.
perpusillus (*Coriolus*) 319.
perpusillus (*Polystictus*) 319.
perscrutata (*Psathyrella*) 233.
Persicæ (? *Uredo*) 794.
persicus (*Uromyces*) 545.
persimplex (*Psathyra*) 223.
persistens (*Hygrophorus*) 72.
personatum (*Ganoderma*) 297.
pertenuis (*Coriolus*) 316.
pertenuis (*Favolus*) 356.
pertenuis (*Hexagonia*) 356.
pertenuis (*Inonotus*) 273.
pertenuis (*Polyporus*) 273.
pertenuis (*Polystictus*) 316.
pertenuis (*Puccinia*) 689.
pertinens (*Cortinarius*) 188.
pertractus (*Hygrophorus*) 73.
Petalostemonis (*Æcidium*) 760.
Petalostemonis (*Calliospora*) 714.
petasiformis (*Agaricus*) 229.
petasiformis (*Coprinus*) 229.
Petasitidis (*Coleosporium*) 720.
Petasitidis (*Uredo*) 720.
Petchii (*Æcidium*) 758.
Petersii (*Coniophora*) 412.
Petersii (*Coniophora*) 412.
Petrii (*Tylostoma*) 474.
Petuniæ (*Entyloma*) 520.
Peucedani-raiblensis (*Æcidium*) 763.
pezizoides (*Agaricus*) 234.
pezizoides (*Corticium*) 400.
pezizoides (*Cytidia*) 400.
Phacæ f. (*Uromyces*) 545.
Phacæ-frigidæ (*Æcidium*) 545.
Phacæ-frigidæ (*Uromyces*) 545.
Phæopappi (*Puccinia*) 634.
phæopora (*Hexagonia*) 346.
phæosticta (*Lepiota*) 18.
phæosticta (*Puccinia*) 661.
phæoxanthus (*Agaricus*) 204.
phalloides (*Dictyophora*) 459.
phaseolicola (*Uromyces*) 539.
Phegopteridis (*Uredinopsis*) 609.
philippinensis (*Agaricus*) 207.
philippinensis (*Fomes*) 283.
philippinensis (*Funalia*) 321.
philippinensis (*Polystictus*) 321.
philippinensis (*Uredo*) 805.
Phillyreæ f. (*Septobasidium*) 446.
phlebophora (*Pholiota*) 152.
Phrymæ (*Æcidium*) 663.
Phrymæ (*Puccinia*) 663.
Phylacteris (*Lloydia*) 405.
Phylacteris (*Thelephora*) 405.
phyllachoroidea (*Puccinia*) 672.
Phyllanthi (*Phacopsora*) 608.
phyllanthinum (*Æcidium*) 780.
phyllodiæ (*Uromyces*) 555.
phyllodiorum (*Melampsora*) 555.
phyllodiorum (*Uromyces*) 555.
phyllophilus (*Marasmius*) 110.
Phyllostachydis (*Puccinia*) 686.
Phyteumatis (*Æcidium*) 584.
pianhyensis (*Uromyces*) 569.
Piceæ-hondoensis (*Peridermium*) 747.
Picosiæ (*Synchytrium*) 840.
pictilis (*Boletus*) 246.
pictilis (*Ixocomus*) 246.
pila (*Catastoma*) 483.
pila (*Disciseda*) 483.
pila (*Hydnangium*) 495.
Pilgeriana (*Puccinia*) 701.
piloleus (*Agaricus*) 234.

- Piloselloidearum (Puccinia) 652.
 pilosporus (Agaricus) 208.
 pilosus Raddi (Agaricus) 234.
 pilosus Val.-Ser. (Agaricus) 234.
 Pini (Hymenochæte) 404, 866.
 Pini (Platyglœa) 448
Pini (Veluticeps) 404.
 pinicola (Lenzites) 124.
 pinicola (Saccoblastia) 442.
 pinicola (Tremella) 454.
 Pinorum (Merulius) 361.
Pinuum var. (Polyporus) 294.
piperata (Leia) 373.
 piperatum (Hydnum) 373.
 Piperi (Puccinia) 711.
 Piperiana (Chrysomyxa) 716.
Piperiana (Melampsoropsis) 716, 787.
 Piperianum (Cœoma) 787.
 pirelloides (Mucor) 818.
 piriforme (Lycoperdon) 487.
 Piscidiæ (Ravenelia) 737.
 Pisi-formosi (Æcidium) 761.
 Pithecolobii (Ravenelia) 738.
Pithecolobii (Uredo) 792.
 plana (Clarkeinda) 202.
 planicorne (Phlyctochytrium) 845.
 planiuscula (Clitocybe) 40.
planiusculus (Agaricus) 40.
 Plantaginis (Uromyces) 571.
 Plantaginis-variæ (Æcidium) 770.
 platensis (Pholiota) 152.
 platicus (Lactarius) 81.
 Platylobii (Æcidium) 761.
 pleurostoma var. (Cryptoporus) 282.
 pleurotopsis f. (Elasmomyces) 467.
 Plowrightii (Peridermium) 720.
 Plucheæ (Æcidium) 766.
 Plucheæ (Uredo) 796.
 Plucheæ-ovalis (Æcidium) 767.
 plumbagineus (Cyathus) 464.
 plumbeum (Entoloma) 135.
 plumulosa (Volvaria) 129.
 plurianulata (Urophlyctis) 850.
 plurianulatum (Synchytrium) 841.
plurianulatus (Uromyces) 841, 850.
 pluteoides (Inocybe) 162.
 Poæ (Uromyces) 585.
 Poæ-alpinæ (Uromyces) 585.
 Poæ-trivialis (Puccinia) 696.
 Pobeguini (Hexagonia) 346.
 Podolepidis (Puccinia) 636.
 Pogonati (Craterellus) 381.
 Poinsettiae (Uromyces) 559.
 polaris (Psathyrella) 234.
 politulus (Cortinarius) 190.
 politus (Uromyces) 572.
 Pollagaster (Pleotrachelus) 836.
 Polliniæ-imberbis (Uredo) 808.
 Polliniæ-quadrinervis (Puccinia) 693.
polyandra (Achlya) 854.
 polychromus (Polyporus) 271.
Polycnemi (Puccinia) 574.
 Polycnemi (Uromyces) 575.
 Polygalæ (Uredo) 790.
 Polygomi-alpini (Puccinia) 669.
 Polygomi-alpini (Sphacelotheca) 508.
 Polygomi-sachalinensis (Puccinia) 669.
 Polygomi-vivipari (Sphacelotheca) 508.
 polymorpha (Dædalea) 352.
 Polypogonis (Puccinia) 701.
Polypogonis (Uredo) 701.
polyspora (Microphlyctis) 846
 polysporum (Physoderma) 846.
 polytrichum (Lycoperdon) 489.
polytropus (Fomes) 264.
 ponderosum (Æcidium) 778.
 populeti (Pleurotus) 64.
 Populi (Æcidium) 786.
 Populi-albæ (Puccinia) 713.
 populinus (Rhizophagus) 848.
 portoricensis (Ravenelia) 739.
 posadensis (Agaricus) 203.
 posadensis (Puccinia) 691.
 Posoqueriæ (Æcidium) 769.
 Potentillæ (Phragmidium) 724.
Potentillarum (Uredo) 733.
 Pouzolziæ (Uredo) 803.
 Pozzii (Puccinia) 630.
 præandina (Puccinia) 635.
 præcox (Flammula) 173.
 præfinitum (Hebeloma) 171.
 præguttulatus (Polyporus) 261.
 prægracilis (Puccinia) 697.
 prælongum (Ganoderma) 297.
 prærimosus (Agaricus) 208.
 præsignis (Cortinarius) 197.
 prætermisum (Corticium) 401.
 prætextus (Uromyces) 550.
 Praini (Mucor) 818.
pratensis (Uromyces) 585.
 praticola (Entoloma) 136.
 Premnæ (Uredo) 800.
Primulæ (Uromyces) 567.
Primulæ-integrifoliæ (Uredo) 567.

- Primulæ-integrifoliæ* (Uromyces) 567.
princeps (Puccinia) 659.
principale (Entoloma) 133.
Privæ (Uromyces) 563.
proëminens (Uromyces) 559.
prolifer var. (Polystictus) 309.
prolifera (Achlya) 854.
proliferum (Myzocyttium) 850.
propinqua (Puccinia) 692.
propinquus (Uromyces) 530.
proportionalis (Lactarius) 85.
prostratus (Leucoporus) 259.
prostratus (Polyporus) 259.
pruinatus (Polyporus) 264.
pruinella (Clavaria) 427.
pruinosa (Clitocybe) 43.
pruinulosus (Calathinus) 69.
pruinulosus (Pleurotus) 69.
Pruni (Merulius) 360.
prunicola (Fomitoporia) 331.
prunicola (Poria) 331.
prunicolor (Puccinia) 693.
pseudericus (Hygrophorus) 77.
pseudo-balsameum (Æcidium) 751.
pseudo-balsameum (Peridermium) 751.
pseudo-cibarius (Cantharellus) 103.
pseudo-conchatus (Fomes) 283.
pseudo-crispus (Clathrus) 462.
pseudo-directa (Omphalia) 62.
pseudo-flava (Clavaria) 429.
pseudo-flavescens var. (Lycoperdon) 481.
pseudo-integra (Russula) 92.
pseudo-mixtilis (Inocybe) 167.
pseudo-nycthemerus (Coprinus) 229.
pseudo-papilionaceus (Panæolus) 231.
pseudo-pectinata (Russula) 101.
pseudo-perennis (Polystictus) 310.
pseudo-plicatus (Coprinus) 224.
pseudo-princeps (Favolus) 355.
pseudo-princeps (Hexagona) 355.
pseudo-scabella (Inocybe) 160.
pseudo-senex (Fomes) 292.
pseudo-senex (Pyropolyporus) 292.
pseudo-sinuosa (Poria) 326.
pseudo-volvatus (Boletus) 242.
Psychotriæ (Puccinia) 657.
Pteridis (Uredinopsis) 610.
Ptilosiæ (Puccinia) 650.
pubescens (Agaricus) 234.
pubescens (Russula) 96.
pudorinum (Mycoleptodon) 374.
Puerariæ (Æcidium) 785.
Puerariæ (Æcidium) 839.
Puerariæ (Synchytrium) 839.
Puerariæ (Synchytrium) 785.
Puerariæ (Uromyces) 785.
pulchellus (? Ceriomyces) 354.
pulcherrima (Clitocybe) 43.
pulcherrima (Ravenelia) 737.
pulcherrima (Tilletia) 519, 865.
pulcherrima (Tilletia) 519.
pulcherrimus (Lentinus) 120.
pulchra (Ascophora) 827.
pulchra (Uredo) 804.
pulchrifolia (Flammula) 173.
pulchrum (Bulbothamnidium) 827.
pulvereum (Entoloma) 138.
pulverulenta (Amanitopsis) 8.
pulverulentum (Æcidium) 769.
pulverulentum (Ganoderma) 297.
pulvinulata (Thelephora) 382.
Pumilionum (Hymenogaster) 496.
punctata (Ustilago) 498.
punctiformis (Uromyces) 540.
punctiformis (Urophlyctis) 819.
punctipes (Boletus) 247.
punctiporus (Polyporus) 257.
punicus (Hypochnus) 414.
punicum (Æcidium) 763.
purpurascens (Uredo) 792.
purpureum (Stereum) 387.
purpureo-fuliginosum (Tricholoma) 31.
pusilla var. (Pholiota) 152.
pusilla (Puccinia) 693.
pusilla (Russula) 102.
pusillissima (Omphalia) 62.
pusillus (Agaricus) 208.
pusillus (Ceriomyces) 353.
pusillus (Inonotus) 273.
pusillus (Pleurotus) 70.
pusillus (Polyporus) 273.
Puspa (Æcidium) 621, 756.
Puspa (Puccinia) 620.
putidum (Hydnum) 363.
pygmæa (Catenaria) 847.
pygmæa (Lanopila) 479.
pygmæa (Locellina) 153.
pygmæum (Tylostoma) 471.
pygmæus (Agaricus) 234.
pygmæus (Cyathus) 465.
Pythii (Pseudolpidium) 834.
pyxidatus (Agaricus) 234.
quadriporula (Puccinia) 682.

- quadrupedata (Thamnocephalis) 831.
 Queletianus (Polyporus) 258.
quercinum fm. (Corticium) 403.
 Quercus-myrsinifoliae (Uredo) 803.

ravemosa (Achlya) 852.
 Raciborskiana (Uredo) 800.
 Raciborskii (Uredo) 792.
Raciborskii (Uredo) 792.
 radiata (Mapea) 814.
 radiato-rugosum (Hydnum) 369.
 radiato-scruposus (Polystictus) 311.
 radiato-velutinus (Polyporus) 270.
radiato-velutinus (Xanthochrous) 270.
radicans (Boletus) 238.
 radicans (Scleroderma) 491.
radicata (Collybia) 52.
 radicata var. (Lepiota) 10.
 radicata (Peniophora) 411.
radicatum (Corticium) 411.
 radicumformis (Agaricus) 235.
Rajap (Pluteus) 52.
 Ramischiae (Chrysomyxa) 717.
 ramosa (Absidia) 825.
 ramosa (Nowakowskiella) 847.
Ramosii (Amauroderma) 305.
 Ramosii (Ganoderma) 305.
Ramosii (Hapalopilus) 276.
 Ramosii (Polyporus) 276.
 ramosipes (Lentinus) 118.
ramosissimum (Corticium) 410.
 ramosus (Mucor) 825.
 rangiferina (Puccinia) 689.
Ranunculacearum (Æcidium) 586.
Ranunculi (Puccinia) 616.
 Ranunculi-Distichophylli (Uromyces) 586.
 Ranunculi-Festucæ (Uromyces) 587.
Ranunculi--parnassifolii fm. (Æcidium) 586.
 Raphani (Mortierella) 828.
 rapula (Agaricus) 235.
 rarus (Marasmius) 113.
 Rastii var. (Absidia) 825.
 Raunkiærii (Puccinia) 621.
 Rauwolfiæ (Æcidium) 777.
 Ravenelii (Dictyophora) 460.
Ravenelii (Ithyphallus) 460.
Ravenelii (Mitremyces) 476.
 Reae (Leptonia) 144.
 Readeri (Tylostoma) 470.
 Readeri (Ustilago) 499.
 Reai (Hygrophorus) 78.
 recedens (Boletus) 244.
 Rechingeri (Æcidium) 775.
 Rechingeri (Fomes) 284.
 recognita (Psilocybe) 221.
 recollectus (Clitopilus) 139.
recutitifformis (Agaricus) 5.
 recutitifformis (Amanita) 5.
 Redfieldiæ (Tilletia) 518.
 reflexa var. (Inocybe) 166.
reflexa (Pocillaria) 119.
 reflexus (Lentinus) 119.
 regia (Volvaria) 129.
 regius (Uromyces) 553.
Regnieri (Lichtheimia) 817.
 Regnieri (Mucor) 817.
 Reichei (Uromyces) 577.
 Reissekiæ (Uredo) 789.
 reniformis (Favolus) 356.
reniformis (Fomes) 304.
reniformis (Hexagona) 356.
 renovatus (Uromyces) 537.
repens (Glomerula) 821.
 repens (Mucor) 821.
 reptans (Claudopus) 148.
 resinosa (Hexagonia) 347.
 resinosum var. (Ganoderma) 302.
resinosus (Favolus) 347.
resplendens (Gyrophila) 28.
resupinatus var. (Polyporus) 328.
 retanjense (Phragmidium) 724.
 reticulata (Tremella) 455.
 reticulatum (Hydnum) 364.
 reticulatum (Septobasidium) 445.
reticulatus (Sarcodon) 364.
 retirugus (Cantharellus) 106.
 retispora var. (Clitocybe) 44.
 revolutus (Coprinus) 225.
 rhætica (Saprolegnia) 851.
 Rhamni-japonici (Æcidium) 762.
 Rhei-undulati (Uredo) 802.
 rhodoleucus (Agaricus) 235.
 rhodopepla (Lepiota) 18.
 rhodophæa (Tomentella) 418.
 rhodophyllus (Pleurotus) 67.
 rhodosporus (Clitopilus) 140.
 rhoïna (Uredo) 789.
 rhombispora (Inocybe) 162.
 rhombispora (Psilocybe) 221.
 rhomboidosperma (Deconica) 222.
 Rhynchosporæ (Uredo) 805.
 Ribesii-Grandifoliæ (Melampsora) 602.
 ribicola (Coleosporium) 718.
ribicola (Uredo) 718.

- Richteri* (*Entomophthora*) 832.
Richteri (*Massospora*) 832.
Rickerii (*Ustilago*) 502.
Riekiana (*Uropyxis*) 615.
Riekianus (*Polyporus*) 282.
Riekii (*Polyporus*) 270.
Riekii (*Tylostoma*) 470.
Rickii (*Xanthochrous*) 270.
Ridleyi (*Boletus*) 237.
Ridleyi (*Polystictus*) 311.
rigensis (*Puccinia*) 627.
rigidipes (*Hypholoma*) 211.
rigidus (*Mucor*) 816.
rimosellus (*Lactarius*) 88.
rimosus (*Coprinus*) 226.
rimulatum (*Lycoperdon*) 487.
rivalis (*Clavaria*) 432.
Rivinae (*Aecidium*) 598, 621, 622.
Rivinae (*Endophyllum*) 598.
Rivinae (*Puccinia*) 622.
rivulosum (*Ganoderma*) 301.
robiniophila (*Trametes*) 340.
Robinsoniae (*Fomes*) 291.
Robinsoniae (*Pyropolyporus*) 291.
Robinsonii (*Uromycladium*) 595.
robusta var. (*Naucceria*) 864.
Roccati (*Cladoderris*) 386.
Rochæi (*Uredo*) 794.
rochesterensis var. (*Dictyophora*) 460.
Rodwayi (*Tolyposporium*) 515.
Rogersi (*Omphalia*) 60.
Romagnolii (*Boletus*) 251.
Romellii (*Pluteus*) 130.
Romellii (*Russula*) 96.
Rompelii (*Phylloporus*) 255.
Rompelii (*Puccinia*) 624.
rosacea (*Clavaria*) 434.
Rosæ-acicularis (*Phragmidium*) 725.
Rosæ-arkansanæ (*Phragmidium*) 727.
Rosæ-californicæ (*Phragmidium*) 726.
Rosæ-gymnocarpæ (*Cæoma*) 786.
Rosæ-lacerantis (*Phragmidium*) 726.
Rosæ-mosehatae (*Phragmidium*) 725.
Rosæ-multifloræ (*Phragmidium*) 727.
Rosæ-setigeræ (*Phragmidium*) 727.
rosea var. (*Dictyophora*) 460.
rosea (*Grandinia*) 379.
rosea (*Puccinia*) 634.
rosea (*Russula*) 95.
Roseana (*Uropyxis*) 614.
Rosenvingii (*Pleotrachelus*) 836.
roseo-alba (*Poria*) 291.
roseo-albo-citrina (*Eccilia*) 148.
roseo-albus (*Fomes*) 294.
roseo-candidus (*Pluteus*) 132.
roseo-cinereus (*Fomes*) 291.
roseo-cinereus (*Pyropolyporus*) 291.
roseo-cremeum (*Corticium*) 398.
roseum (*Aecidium*) 634.
roseum (*Hydnum*) 375.
roseus (*Agaricus*) 95.
Rossii (*Puccinia*) 631.
rostrata (*Sporophlyctis*) 848.
rostratum (*Pythium*) 856.
Rothæ (*Colus*) 463.
Rothæ (*Pseudocolus*) 463.
Rottboëlliae (*Uredo*) 697.
Rottboëlliae (*Ustilago*) 499.
Roumegueri (*Peniophora*) 410.
Rouxianus (*Mucor*) 816.
Rouxii (*Mucor*) 816.
Royleani (*Ustilago*) 499.
Roystoniae (*Hypholoma*) 215.
rubella (*Russula*) 94.
rubellus (*Agaricus*) 235.
ruber (*Boletus*) 252.
ruber (*Hygrophorus*) 78.
rubescens (*Boletus*) 240.
rubescens var. (*Cortinarius*) 191.
rubescens var. (*Inocybe*) 155.
rubescens (*Mucor*) 816.
Rubi (*Gerwasia*) 597.
Rubi (*Phragmidium*) 727.
Rubiæ (*Aecidium*) 768.
rubicunda (*Russula*) 97.
rubicundus (*Ithyphallus*) 460.
rubiginosa (*Tomentella*) 419.
rubiginosus (*Hypochmus*) 419.
rubinellus (*Boletus*) 249.
Rubi-odorati (*Phragmidium*) 728.
rubipes (*Cortinarius*) 195.
Rubi-saxatilis (*Phragmidium*) 723.
Rubi-Thunbergi (*Phragmidium*) 730.
rubra var. (*Lenzites*) 125.
rubra var. (*Russula*) 102.
rubra (*Russula*) 94.
rubripes (*Cortinarius*) 193.
rubritinctus (*Coriolus*) 320.
rubritinctus (*Polystictus*) 320.
rubro-fibrillosus (*Hygrophorus*) 71.
rubro-læsa (*Inocybe*) 159.
rubro-læsus (*Agaricus*) 159.
rubro-maculatus (*Agaricus*) 235.
rubro-maculatus (*Polyporus*) 262.

- rubro punctatus (Boletus) 252.
 rubro-punctus (Hygrophorus) 79.
 rubro-striatus (Agaricus) 235.
 rubro-violacea (Tremella) 454.
 rudis (Pannus) 123.
 rudis (Polyporus) 269.
rudis (Xanthochrous) 269.
 Ruelliae (Uromyces) 564.
 rufescens var. (Inocybe) 166.
 rufescens (Lepiota) 14.
 rufipes (Cantharellus) 105.
 rufipes (Clavaria) 430.
 rufipes (Lepiota) 18.
 rufo-aureus (Boletus) 247.
 rufulus (Lactarius) 83.
 rufum (Arachnion) 493.
 rufum var. (Tylostoma) 472.
 rufus (Lactarius) 90.
 rugocephalum (Hypholoma) 212.
 rugosa (Physalacria) 441.
 rugosiceps (Boletus) 248.
 rugosus (Uromyces) 534.
 Russula (Lactarius) 80.
 russuloides (Elasmomyces) 467.
 russuloides (Paxillus) 200.
 Rutæ (Æcidium) 758.
 rutilans (Cortinarius) 193.
 Rytzii (Synchytrium) 840.
- Sabinæ (Gymnosporangium) 611.
 Saccardiana (Pilaira) 827.
saccata (Calvatia) 484.
 saccatum (Lycoperdon) 484.
Sacchari (Ustilago) 509.
saccharina (Tremella) 456.
 saccharinus (Dacryomyces) 456.
 sacculus (Eurichasma) 844.
 sæpiaria (Lenzites) 125.
sæpiarius (Crinipellis) 112.
 sæpiarius (Marasmius) 112.
Sainsonii (Agaricus) 123.
 sakanensis (Tremella) 451.
 Salero (Tricholoma) 35.
 salignus (Pleurotus) 66.
 Salsolæ (Uromyces) 573.
 Salviæ (Coleosporium) 723.
 Salviæ f. (Ustilago) 497.
 Sancti-Johannis (Chnoospora) 600.
Sancti-Johannis (Melampsora) 600.
 sanguinea (Peniophora) 411.
 sanguineo-fulvum (Hydnum) 368.
sanguineum (Corticium) 411.
- sanguinolenta (Poria)* 327.
Saniculæ (Æcidium) 764.
 Santolinæ (Puccinia) 644.
 saponaceum (Tricholoma) 31.
 Sapurema (Polyporus) 260.
 sarcoides (Fistulina) 254.
 sardous (Boletus) 251.
 Sarrazini (Polyporus) 264.
 Sasæ (Puccinia) 685.
 Sasakii (Hypochnus) 415.
 saturninus (Mucor) 819.
 Saussureæ (Coleosporium) 719.
 Saussureæ-affinis (Æcidium) 765.
 Saussureæ-alpinæ (Puccinia) 643.
 saxatile (Phragmidium) 728.
 Saxifragæ (Synchytrium) 842.
 scabellus (Marasmius) 115.
 Scabiosæ f. (Puccinia) 646.
 scabra (Bovistella) 482.
 scabra (Thelephora) 381.
 scamba (Flammula) 174.
 scatophaga (Entomophthora) 832.
 Scheffleri (Uredo) 789.
 Scheffleri (Ustilago) 507.
 Schellhammeræ (Uredo) 804.
 Schenckiana (Tilletia) 517.
 Schiffneri (Marasmius) 109.
 Schimperiana (Puccinia) 663.
 Schinzianum (Entyloma) 520.
Schinzianum (Exobasidium) 520.
 Schinzianus (Uromyces) 554.
 Schœnanthi (Uromyces) 588.
 Schœnanthi (Ustilago) 505.
 Scholzii (Hemileja) 598.
Scholzii (Uredo) 598.
 Schraderi (Stropharia) 209.
Schræterianus (Uromyces) 532.
 Schweinfurthiana (Sphacelotheca) 509.
Schweinfurthiana (Ustilago) 509.
 Sciaræ (Empusa) 831.
 Scirpi (Synchytrium) 840.
 Scirpi-nodosi (Uredo) 806.
 Sclerochloæ (Uredo) 808.
 Sclerochloæ (Uromyces) 589.
 sclerotiorum (Merulius) 361.
 scopiforme (Septobasidium) 446.
 Scrophulariæ (Puccinia) 713.
Scrophulariæ (Uromyces) 564.
 scutatus (Coriolus) 317.
 scutatus (Polystictus) 317.
 Scutellariæ (Æcidium) 772.
 Scutellariæ-indicæ (Æcidium) 772.

- scutellatus* (*Uromyces*) 560, 563.
sebacea (*Saccoblastia*) 443.
sebacea (*Thelephora*) 384.
Sebastianæ (*Puccinia*) 668.
segetum (*Ustilago*) 507.
segregatus (*Agaricus*) 206.
selectum (*Tricholoma*) 30.
Sellæ (*Psilocybe*) 220.
Semiaquilegiæ (*Æcidium*) 753.
semidioica (*Saprolegnia*) 852.
semiinsculpta (*Puccinia*) 640.
semilanceatus (*Panæolus*) 231.
semiorbicularis (*Naucoria*) 864.
senecionicola (*Puccinia*) 645.
senecionicola (*Uromyces*) 568.
Senecionis (*Æcidium*) 766.
Senecionis-bupleuroidis (*Æcidium*) 767.
Senecionis-scandentis (*Puccinia*) 644.
separans (*Lycoperdon*) 485.
septimum (*Lycoperdon*) 488.
septocarpoides (*Rhizophidium*) 843.
Sequoiaæ (*Ganoderma*) 296.
Sequojæ (*Trametes*) 344.
sericatum (*Entoloma*) 135.
sericellum (*Entoloma*) 138.
sericeo-nitens (*Russula*) 97.
serissima (*Russula*) 97.
serotina (*Inocybe*) 156.
serotina (*Omphalia*) 60.
serotinoides (*Pleurotus*) 66.
serotinus (*Hygrophorus*) 79.
Serpylli (*Puccinia*) 660.
Serrei (*Thelephora*) 383.
servata (*Inocybe*) 153.
Sesbaniaæ (*Uredo*) 791.
Seseli (*Æcidium*) 556, 587.
Seseli-graminis (*Uromyces*) 556, 587.
Sesleriaæ-cæruleæ (*Puccinia*) 701.
Sesseæ [non *Sessæ*] (*Uromyces*) 590.
sessilis (*Crepidotus*) 185.
Setariaæ (*Sorosporium*) 513.
Setariaæ-aureæ (*Ustilago*) 502.
Seurati (*Hexagonia*) 346.
sevocata (*Clitocybe*) 42.
Shaferi (*Fuscoporella*) 338.
Shaferi (*Poria*) 338.
shikokianus (*Uromyces*) 543.
Shiraiana (*Ustilago*) 512.
sibutiana (*Clavaria*) 435.
sibutiana (*Puccinia*) 665.
Sidalcææ (*Puccinia*) 619.
Sieglingiaæ (*Ustilago*) 501.
sigillatus (*Agaricus*) 229.
sigillatus (*Coprinus*) 229.
sikokiana (*Puccinia*) 681.
Silphii var. (*Æcidium*) 570.
Silphii (*Uromyces*) 570.
silvaticus (*Mucor*) 819.
Silveiræ (*Ganoderma*) 301.
silvester (*Merulius*) 361.
similans (*Lentinus*) 119.
similans (*Pocillaria*) 119.
similis (*Inocybe*) 160.
similis (*Leptonia*) 142.
similis (*Le-Ratia*) 468.
simillimus var. (*Polystictus*) 309.
simplaria (*Clitocybe*) 45.
simplex (*Boletus*) 252.
simplex (*Coleopuccinia*) 598.
simplex (*Uromycladium*) 594.
simulans (*Galera*) 181.
simulans (*Geaster*) 478.
simulans (*Olpidium*) 833.
simulans var. (*Tylostoma*) 472.
singularis (*Æruginospora*) 46.
sinopica (*Clitocybe*) 45.
Sissoo (*Uredo*) 791.
situata (*Clitocybe*) 37.
Smallii (*Polyporus*) 280.
Smallii (*Tyromyces*) 280.
smaragdina (*Le-Ratia*) 468.
Smilacis (*Blastospora*) 596.
Smithii (*Geaster*) 477.
sociabilis (*Lepiota*) 9.
sociale (*Hebeloma*) 171.
Sojæ (*Uromyces*) 539.
Solani var. (*Corticium*) 414.
Solani (*Hypochnus*) 414.
Solani (*Synchytrium*) 839.
solanium (*Æcidium*) 776.
Solariaæ (*Uromyces*) 577.
solenioides (*Hydnum*) 374.
solida var. (*Collybia*) 48.
solidaginicola (*Puccinia*) 640.
Solidaginis-microglossæ (*Puccinia*) 640.
Solidaginis-mollis (*Puccinia*) 640.
solifugus (? *Hygrophorus*) 74.
sollerensis (*Volvaria*) 127.
Sonchi (*Coleosporium*) 720, 721.
Sonchi-arvensis (*Coleosporium*) 722.
sonsensis (*Uredo*) 799.
Sophiæ (*Urocystis*) 524.
Soraueri (*Peridermium*) 722.
Sorbi (*Æcidium*) 759.

- Sorbi (*Ochrospora*) 605.
sordescens (*Diplonema*) 411.
sordidella (*Peniophora*) 411.
sordidum (*Corticium*) 411.
sordidus (*Hypochnus*) 411.
sororia (*Naucoria*) 174.
sororius var. (*Polyporellus*) 267.
sororius (*Polyporus*) 267.
Sowerbei (*Thelephora*) 385.
Sowerbyi (*Geaster*) 479.
spadicea (*Thelephora*) 383.
spanista (*Lepiota*) 14.
sparsibarbis (*Collybia*) 52.
sparso-aculeatum (*Hydnum*) 366.
sparsus (*Uromyces*) 532.
Spartii-juncei (*Uromyces*) 542.
Spartinæ-strictæ (*Uredo*) 809.
spathulata (*Laschia*) 357.
spathulatus (*Favolus*) 357.
specialis (*Agaricus*) 167.
specialis (*Inocybe*) 167.
speciosus (*Cortinarius*) 185.
speciosus (*Lactarius*) 82.
speciosus (*Mucor*) 824.
speciosus (*Rhizopus*) 824.
speciosus (*Uromyces*) 567.
spectabile (*Entyloma*) 523.
spectandus (*Hygrophorus*) 71.
Spegazzinianum (*Æcidium*) 775
Spegazziniella (*Puccinia*) 700.
Spegazzinii (*Clathrus*) 462.
Spegazzinii (*Laternea*) 462.
Spegazzinii (*Lepiota*) 11, 21.
Spegazzinii (*Uredo*) 576.
Spegazzinii (*Uromyces*) 576.
Spermolepidis (*Polyporus*) 268.
Spermolepidis (*Ungulina*) 268.
Sphæralceæ (*Æcidium*) 756.
Sphæralceæ var. (*Puccinia*) 619.
sphæralceanum (*Æcidium*) 756.
sphærale (*Lycoperdon*) 487.
sphærocephala (*Piptocephalis*) 829.
sphærospora (*Annularia*) 129.
sphærospora (*Clitocybe*) 37.
sphærospora (*Peniophora*) 407.
sphærospora (*Phæocyphella*) 424.
sphærosporus (*Agaricus*) 208.
sphærosporus (*Cyathus*) 466.
sphærosporus (*Hypochnus*) 413.
sphærosporus (*Mucor*) 815.
sphagnicola (*Stropharia*) 210.
sphagnophila (*Naucoria*) 176.
sphagnophila (*Russula*) 99.
Spicæ-venti (*Puccinia*) 696.
spiculisperma (*Clavaria*) 426.
spiculosa (*Thelephora*) 381.
Spilanthi (*Entyloma*) 521.
Spinaciæ (*Æcidium*) 783.
Spinaciæ (*Peronospora*) 863.
spinescens (*Mucor*) 817.
spinosa (*Absidia*) 824.
spinosa var. (*Achlya*) 852.
spinulosum (*Corticium*) 403.
spinulosus (*Aleurodiscus*) 403.
Spirostachydis (*Uredo*) 800.
Spissii (*Polyporus*) 258.
spongiosum (*Hydnum*) 372.
spretus (*Lentinus*) 117.
squalida (*Russula*) 94.
squamosa (*Stropharia*) 211.
squamosodisca (*Inocybe*) 158.
squamosus (*Polyporus*) 255.
squamulifer (*Hygrophorus*) 73.
squamulosus subsp. (*Cantharellus*) 103.
squamulosus (*Clitopilus*) 141.
squarrosa (*Stropharia*) 211.
stabulorum (*Fomes*) 286.
stabulorum (*Phellinus*) 286.
Stachyuri (*Uredo*) 789.
stagnicola (*Tubaria*) 183.
stalactiforme (*Peridermium*) 749.
Statices-pycnanthæ var. (*Uromyces*) 572.
Steidleri var. (*Næmatelia*) 455.
Steidleri var. (*Tremella*) 455.
stellare (*Lycoperdon*) 489.
Stellariæ (*Uromyces*) 533.
stellatum (*Phlyctocytrium*) 844.
Stenotaphri (*Uredo*) 809.
sterilis (*Cortinarius*) 189.
Sterlingii (*Inocybe*) 165.
Stevensianum (*Monocytrium*) 845.
Steviæ (*Coleosporium*) 718.
stichosora (*Puccinia*) 689.
Stigmariæ (? *Urophlyctis*) 850.
Stilbum (*Mucor*) 821.
stillativus (*Polyporus*) 256.
Stipæ (*Urocystis*) 525.
Stipæ-sibiricæ (*Puccinia*) 690.
Stiparum (*Ustilago*) 504.
stipitaria (*Collybia*) 48.
stipitarius (*Agaricus*) 115.
stipitatum (*Lycoperdon*) 490.
stipitatus var. (*Fomes*) 283.
stoloniferum (*Hysterangium*) 495.

- stramineus (Polyporus) 266.
stramineus (*Spongipellis*) 266.
 Stranvæsiæ (*Æcidium*) 758.
stratosa (*Leaia*) 373.
 Streptanthi (*Puccinia*) 616.
 striatellus (*Uromyces*) 561.
 striatula (*Collybia*) 51.
 striatus (*Boletus*) 252.
 stricta (*Typhula*) 439.
 strictus (*Mucor*) 818.
 strigosa (*Sebacina*) 450.
strigosus (*Hypochnus*) 411.
 striolatus (*Uromyces*) 563.
 Strobilanthis (*Uromyces*) 564.
 strobiliformis (*Whetstonia*) 492.
 strobilinum (*Cæoma*) 787.
 strumosa (*Ustilaginoidea*) 528.
 Strychni (*Uredo*) 788.
 Stuhlmanni (*Hexagonia*) 347.
 Stylidii (*Puccinia*) 633.
Stylidii (*Uredo*) 633.
 Stylochitonis (*Æcidium*) 783.
 suave (*Entoloma*) 136.
 suaveolens var. (*Marasmius*) 115.
 suaveolens (*Nolanea*) 146.
 subacceptanda (*Nolanea*) 145.
 subacerinum (*Corticium*) 403.
subacerinus (*Aleurodiscus*) 403.
 subacus (*Eccilia*) 147.
 subacuta (*Trametes*) 340.
 subæmula (*Inocybe*) 159.
 subæquale (*Tricholoma*) 27.
 subagraria (*Psilocybe*) 217.
subalbellus (*Gyroporus*) 252.
 subalbellus (*Suillus*) 252.
 subalpinum (*Tricholoma*) 25.
 subalpinus (*Lactarius*) 85.
 subangulata (*Puccinia*) 671.
 subannulata (*Armillaria*) 22.
 subaureus (*Boletus*) 241.
 subavellanea (*Peniophora*) 408.
 subbutyracea (*Collybya*) 47.
 subcandelaris (*Cortinarius*) 200.
subcaperata (*Hexagonia*) 355.
 subcaperatus (*Favolus*) 355.
 subcarnosus (*Cortinarius*) 197.
subchartaceus (*Coriolus*) 317.
 subchartaceus (*Polystictus*) 317.
 subchioneus (*Polyporus*) 278.
subchioneus (*Tyromyces*) 278.
 subcinereum (*Tricholoma*) 33.
 subcompacta (*Russula*) 97.
 subconfragosa (*Dædalea*) 351.
 subcoprophila (*Psilocybe*) 221.
subcoriacea (*Cerrenella*) 377.
 subcoriaceus (*Irpex*) 377.
 subcoronatum (*Corticium*) 398.
 subcostatum (*Entoloma*) 134.
 subcremea (*Peniophora*) 408.
 subcrispus (*Agaricus*) 235.
subcrocata (*Corioloopsis*) 324.
 subcrocatus (*Polystictus*) 324.
 subcyathiformis (*Clitocybe*) 4?.
subdealbatus (*Microporellus*) 309.
 subdealbatus (*Polystictus*) 309.
 subdehiscens (*Armillaria*) 23.
 subdryophila (*Collybia*) 46.
subectypus (*Coriolus*) 318.
 subectypus (*Polystictus*) 318.
 subelegans (*Polyporus*) 261.
 subendothejus (*Fomes*) 285.
 suberebia (*Pholiota*) 150.
suberebius (*Agaricus*) 151.
 suberosa (*Dædalea*) 351.
 suberoso coriaceum (*Hydnum*) 373.
 subexcentricum var. (*Hydnum*) 365.
 subextensus (*Fomes*) 288.
subextensus (*Pyropolyporus*) 288.
 subfalcata (*Clavaria*) 435.
 subfastigiata (*Clavaria*) 429.
 subferreus (*Fomes*) 284.
 subflava (*Clavaria*) 429.
 subfoetens (*Russula*) 95.
 subfornicatum (*Ganoderma*) 296.
 subfusca (*Tilletia*) 519.
 subfusca (*Tomentella*) 419.
subfuscus (*Hypochnus*) 419.
subgambosum (*Tricholoma*) 52.
 subgilva (*Clitocybe*) 38.
subglabrescens (*Corioloopsis*) 323.
 subglabrescens (*Polystictus*) 323.
 subglebulosa (*Peniophora*) 408.
subglobosa (*Puccinia*) 700.
 subhyalina (*Collybia*) 48.
 subiculosus var. (*Geaster*) 477.
 subignitus (*Clitopilus*) 139.
 subignobilis (*Inocybe*) 163.
 subimmundum (*Tricholoma*) 26.
 subimperialis (*Armillaria*) 21.
 subincrustatum (*Ganoderma*) 296.
 subinfucatus (*Cortinarius*) 193.
 sublanatus (*Cortinarius*) 191.
subleve (*Corticium*) 411.
 sublevis (*Uromyces*) 563.

- sublevis* (Peniophora) 411.
subligans (Psathyrella) 233.
sublilacinus (Coriolus) 317.
sublilacinus (Polystictus) 317.
sublinterus (Fomes) 291.
sublinterus (Pyropolyporus) 291.
sublivida (Heterochæte) 449.
sublividum (Entoloma) 134.
subluteum (Tricholoma) 26.
subluteus (Boletus) 251.
submaculata (Psilocybe) 218.
submerdaria (Stropharia) 211.
submicropus (Clitopilus) 140.
submurina (Lenzites) 124.
submurina (Trametes) 339.
submutabile (Corticium) 398.
submyrtilinus (Cortinarius) 194.
subnitens (Agaricus) 203.
subnivosa (Trametes) 343.
subobliqua (Poria) 328.
subobtusata (Psathyra) 223.
subochracea var. (Solenia) 363.
subochraceum (Lachnocladium) 437.
subornata (Inocybe) 168.
subpallidus (Boletus) 245.
subpallidus (Ceriomyces) 245.
subpectinatus (Fomes) 290.
subpectinatus (Pyropolyporus) 290.
subpendulus (Polyporus) 277.
subpendulus (Tyromyces) 277.
subperforatum (Ganoderma) 301.
subphacorrhiza (Typhula) 439.
subpictilis (Polystictus) 264.
subpileata (Lloydia) 405.
subpileatum (Stereum) 405.
subplanus (Clitopilus) 141.
subporiæformis (Polystictus) 312.
subpratense (Lycoperdon) 487.
subpunctipes (Boletus) 239.
subpurpurascens (Favolus) 357.
subpurpurascens (Hexagona) 357.
subramosus var. (Cantharellus) 105.
subrandidum (Tricholoma) 29.
subrenatum (Amauroderma) 304.
subrenatum (Ganoderma) 304.
subresinosus (Fomes) 285.
subrigida (Hexagona) 349.
subrigidus (Favolus) 349.
subrubidus (Hapalopilus) 261, 276.
subrubidus (Polyporus) 276.
subrufescens (Marasmius) 114.
subscalaris (Crepidotus) 185.
subscambum (Hebeloma) 174.
subscutellata (Trametes) 345.
subsepticus (Pleurotus) 69.
subsimplex (Calocera) 457.
subsordida (Russula) 94.
subsplachnoides (Marasmius) 114.
subsquamosus (Agaricus) 235.
subsquamosus var. (Cortinarius) 187.
substipitatus (Coriolus) 318.
substipitatus (Polystictus) 318.
substriatus (Uromyces) 536.
subsulphurea (Collybia) 48.
subtemulenta (Naucoria) 177.
subtenuis (Hexagonia) 348.
subterraneus (Coprinus) 228.
subterraneus (Polyporus) 276.
subterraneus (Rigidiporus) 276.
subtestaceum (Corticium) 398.
subtestaceus (Polyporus) 268.
subtilis (Hypochnus) 411.
subtilis (Peniophora) 411.
subtomentosus (Boletus) 251.
subtornatum (Ganoderma) 300.
subtropica (Chlorocyphella) 424.
subuda (Psilocybe) 220.
subungulatus (Fomes) 286.
subvelatum (Lycoperdon) 489.
subvelutina (Russula) 95.
subvelutinus (Lactarius) 87.
subverniceps (Coriolus) 320.
subverniceps (Polystictus) 320.
subvirens (Hygrophorus) 74.
sudanicus (Boletus) 235.
suevicum (Tricholoma) 34.
suffulta (Puccinia) 713.
suffultum (Septobasidium) 445.
sulcatipes (Hydnum) 365.
sulcatus (Coriolus) 320.
sulcatus (Paxillus) 200.
sulcatus var. (Polystictus) 320.
Sullivantii (Stropharia) 212.
sulphurea (Dædalea) 352.
sulphurellum (Corticium) 399.
sulphureo-floccosa (Lepiota) 10.
sulphureo-ochracea (Grandinia) 379.
sulphurescens (Tricholoma) 28.
sulphurina (Peniophora) 411.
sulphurinus (Hypochnus) 411.
summissa (Nolanea) 145.
Sumstinei (Lactarius) 85.
superfixus (Uromyces) 554.
superfluous (Uromyces) 593.

- superincurvata (Mycena) 56.
 surinamensis (Fomes) 285.
 Sutliffæ (Marasmius) 109.
Swainsonii (Agaricus) 123.
Swertiae (Albugo) 858.
 Swertiae (Cystopus) 858.
 Sydowiana (Ravenelia) 740.
 Sydowii (Tilletia) 519.
 Symploci-japonicæ (Exobasidium) 420.
 slyphiliticus (Mucor) 821.
Syringæ (Phlæophthora) 860.
 Syringæ (Phytophthora) 860.
 Syrphi (Entomophthora) 832.
- tabacina (Naucoria) 179.
 tabacina (Tomentella) 418.
tabacinus (Hypochnus) 418.
 tabidus (Lactarius) 90.
tabularis (Agaricus) 208.
 tahitensis (Pleurotus) 65.
 tahitensis (Pterula) 438.
 Tamari (Rhizopus) 822.
Tanacetii (Puccinia) 646.
 Tanakæ (Irpex) 378.
Tanakæ (Irpiciporus) 378.
 tangensis (Cintractia) 510.
 tataricum (Æcidium) 785.
 Taraxaci-bithynici (Puccinia) 654.
Taylori (Corioloopsis) 324.
 Taylori (Polystictus) 324.
telinolens (Agaricus) 90.
 telinolens (Lactarius) 90.
 Tembuti (Sorosporium) 514.
 tenella (Lepiota) 11.
 tenerella (Galera) 182.
 tenerrima (Typhula) 440.
 tenuatus (Marasmius) 115.
 tenuiceps (Russula) 92.
 tenuiceps (Tricholoma) 30.
 tenuicutis (Uromyces) 588.
 tenui-marginata (Inocybe) 166.
 tenuipes (Secotium) 467.
 tenuis (Auricularia) 442.
tenuis (Exidia) 442.
 tenuis (Mucor) 818.
 tenuis (Puccinia) 713.
 tenuis (Ustilago) 506.
 tenuispora (Puccinia) 675.
 tenuisporum (Tricholoma) 29.
 tenuissimus (Fomes) 288.
tenuissimus (Pyropolyporus) 288.
 Tepperi (Ustilago) 503.
- Tepperianum (Uromycladium) 596.
Tepperianus (Uromyces) 596.
 Terebinthinaceæ (Coleosporium) 718.
Terebinthinaceæ (Uredo) 718.
 tergeminus (Boletus) 252.
 termitophilus (Podaxon) 469.
termitum (Pluteus) 52.
 terrester (Pleurotus) 65.
 terrestris (Ceriomyces) 354.
 Tessariæ (Puccinia) 636.
Tessariæ (Uredo) 636.
 tessellatum (Lycoperdon) 489.
 testaceo-flava (Clavaria) 427.
 testaceo-fulvum (Hydnum) 368.
 testaceo-viridis var. (Clavaria) 427.
 Teucree-Scorodonie (Æcidium) 772.
 texanus (Fomes) 290.
texanus (Inonotus) 272.
 texanus (Polyporus) 272.
texanus (Pyropolyporus) 290.
 texense (Holocotylon) 494.
texensis (Uromyces) 564.
 Teyleri (Mitremyces) 476.
 Thalictri (Phytophthora) 859.
Thapsi (Æcidium) 564.
Thapsi (Uredo) 564.
 Thapsi (Uromyces) 564.
 Thapsiæ-garganicæ (Æcidium) 763.
 Theæ (Hypochnus) 414.
 Theissenii (Cæoma) 787.
 Theissenii (Russula) 96.
Thelymitræ (Æcidium) 576.
 Thelymitræ (Uromyces) 576.
 Themeda (Uredo) 809.
 Theobromæ (Hypochnus) 415.
 Theobromæ (Marasmius) 114.
Theobromæ (Phytophthora) 860.
 thermophila (Lenzites) 125.
 Thesii-decurrentis (Puccinia) 668.
Thesii-decurrentis (Uredo) 668.
Thrinicie (Cylindrosporium) 522.
 Thrinicie (Entyloma) 522.
 Thümenii (Puccinia) 632.
 Thwaitesii (Septobasidium) 445.
 tibetensis (Psilocybe) 218.
tijbodensis (Hymenochæte) 405.
Tilie (Stictis) 448.
 tiliophilus (Polyporus) 281.
tiliophilus (Tyromyces) 281.
 timorensis (Pterula) 437.
 tingitanus (Uromyces) 572.
 tlemcenensis (Boletus) 236.

- todayense (Lycoperdon) 486.
 Toddalæ (Puccinia) 624.
 Toddaliæ (Æcidium) 757.
 togoensis (Cintractia) 510.
tomentella (Kneiffia) 411.
tomentelloides (Corticium) 400.
 tomenticeps (Boletus) 238.
 tomentos-marginatum (Corticium) 392.
 tomentosulus (Pluteus) 130.
 tomentosus (Boletus) 252.
 torquens (Æcidium) 762.
 Torrenteræ (Leptonia) 143.
 torulosus (Fomes) 294.
torulosus (Polyporus) 294.
 totmoda (Clitocybe) 38.
 Tournefortiæ (Uromyces) 568.
 Toxicodendri (Uromyces) 531.
 Trabuti (Corticium) 390.
 Trabuti (Marasmius) 113.
 trachodes (Chitoniella) 203.
 Trachypogonis (Puccinia) 700.
 trachypus (Polyporus) 259.
trachypus (Polyporus) 260.
 trachyspora (Bovistella) 483.
 trametea var. (Dædalea) 351.
 Transalpinæ (Puccinia) 646.
 transformans (Puccinia) 666.
 transformata (Leptonia) 143.
 transforme (Tricholoma) 24.
 transnumerata (Leptonia) 144.
 Transvaaliæ (Æcidium) 769.
 Tranzschelii (Uromyces) 560.
traumatica (Gloxotulasnella) 453.
traumatica (Tulasnella) 453.
 Traversiana (Puccinia) 631.
tremellinum (Corticium) 455.
 tremelloides (Gymnosporangium) 612.
 trepidula (Psathyrella) 233.
Treubianus (Pluteus) 52.
 Treubii (Clathrella) 463.
Trianthemæ (Albugo) 858.
 Trianthemæ (Cystopus) 858.
 trichifer (Geaster) 477.
 Trichloridis (Puccinia) 700.
 tricolor (Agaricus) 235.
 tricolor (Fomes) 289.
tricolor (Pyropolyporus) 289.
 Tridacis (Puccinia) 635.
 Trifolii-repentis (Æcidium) 542.
 Trifolii-repentis (Uromyces) 542.
 trigeminus (Mucor) 821.
 trigonospermum (Corticium) 402.
 Trigonotidis (Æcidium) 771.
Trinii var. (Inocybe) 155.
 Triostei (Æcidium) 771.
 triplex (Cyathus) 466.
 Tripsaci (Puccinia) 696.
triscapus (Clathrus) 462.
 Tristachydis (Sorosporium) 514.
 triste var. (Entoloma) 138.
 tristiculus (Boletus) 239.
 Tritici (Urocystis) 526.
Tritici (Ustilago) 507.
 trivialis (Inocybe) 166.
 trivialis (Lactarius) 90.
 Trixidis (Uredo) 795.
 Trollii (Æcidium) 709.
 tropica (Mohortia) 447.
tropicalis (Abortiporus) 277.
 tropicalis var. (Odontia) 380.
 tropicalis (Polyporus) 277.
 tropicum (Ganoderma) 307.
 tropicus (Boletus) 238.
tropicus (Polyporus) 307.
 troyanus (Fomes) 289.
troyanus (Pyropolyporus) 289.
 Truchisi (Mucor) 817.
 truncata (Clavaria) 432.
 truncata (Jansia) 461.
 truncata (Thelephora) 384.
 truncatulus (Uromyces) 530.
 truncigena (Russula) 102.
 trutinatus (Pleurotus) 70.
tsugina (Fomitoporia) 332.
 tsugina (Poria) 332.
 tuberculata (Stropharia) 211.
 tuberculatus (Uromyces) 559.
tubercolorum (Cladochytrium) 837.
 tubercolorum (Pleolpidium) 837.
 tuberosa (Punctularia) 404.
 tuberosum (Ganoderma) 299.
 tuberosum (Hydnum) 366.
 tuberigena var. (Naucoria) 177.
 tuberoideum (Scleroderma) 490.
 tuberosa (Collybia) 51.
 tuberosa (Thelephora) 383.
tuberosa (Thelephora) 385.
 tubiformis (Cantharellus) 105.
 tucumanensis var. (Pterula) 438.
 tucumanensis (Typhula) 439.
 tulasnelloideum (Corticium) 399.
 tumefaciens (Sorosporium) 514.
 tumidosa (Clitocybe) 35.
 tumidulum (Hebeloma) 170.

- tunetanus (Boletus) 245.
 turbidatum (Entoloma) 134.
 turbinatum (Lycoperdon) 488.
turbinatus (Leucoporus) 256.
 turbinatus (Polyporus) 256.
 turbo (Polystictus) 310.
 turmaria (Clitocybe) 35.
 Turneri (Sorosporium) 514.
 Tussilaginis (Coleosporium) 720.
Tussilaginis (Uredo) 720.
 Typhæ (Dacryopsis) 456.
- ucranica (Olpidiopsis) 834.
 uda (Protodontia) 457.
 udicola (Corticium) 399.
 ugandense (Æcidium) 752.
 Uguressæ (Uredo) 790.
 Ulei (Uredo) 792.
 uliginosa (Thelephora) 384.
 ulmarius (Agaricus) 235.
 Ulmi (Lycoperdon) 490.
 Ulmi (Merulius) 361.
 umbilicatus (Boletus) 245.
umbilicatus (Geaster) 478.
 umbilicatus (Polyporus) 259.
umbilicatus (Polyporus) 259.
 umbonatus (Bolbitius) 180.
 umbonatus (Pleurotus) 67.
 umbraculum (Agaricus) 235.
 umbraticola (Clavaria) 436.
umbrina (Thelephora) 384.
 umbrinella (Inocybe) 158.
 umbrinellus (Polystictus) 311.
 umbrino-marginata (Clitocybe) 42.
 umbrosa (Lepiota) 18.
 uncialis (Naucoria) 178.
 Underwoodii (Hydnum) 364.
 Underwoodii (Polyporus) 265.
Underwoodii (Sarcodon) 364.
undulata (Fomitoporia) 336.
 undulata (Lenzites) 126.
 undulata (Poria) 336.
 undulata (Thelephora) 385.
 undulatellus (Lentinus) 121.
 undulatum (Hydnum) 375.
 undulatum (Pythium) 854.
undulatus (Agaricus) 126.
 undulatus (Uromyces) 562.
 unguiformis (Polyporus) 277.
unguiformis (Tyromyces) 277.
 unicolor (Boletus) 238.
unicolor (Dedalea) 254.
 unicolor (Eccilia) 147.
unicolor (Peniophora) 411.
 unifactum (Tricholoma) 33.
 uniporus (Uromyces) 584.
 universalis (Puccinia) 676.
 Urbanianus (Uromyces) 556.
 urediniformis (Chrysomyxa) 717.
 Urgineæ (Æcidium) 784.
Urgineæ (Cladochytrium) 850.
 Urgineæ (Urophlyctis) 850.
 usambarense (Lycoperdon) 487.
usambarensis (Agaricus) 55.
usambarensis (Aleurodiscus) 404.
 usambarensis (Mycena) 55.
 usambarensis (Naucoria) 175.
 usambarensis (Poria) 327.
 ustalis (Puccinia) 616.
 Usteri (Puccinia) 619.
 Usteri (Uromyces) 534.
 Usterianum (Æcidium) 755.
 Usterianus (Uromyces) 535.
 utahensis (Puccinia) 616.
 Uvæ-ursi form. (Exobasidium) 421.
 Uvariæ-rufæ (Æcidium) 754.
- Vaccinii* (Exobasidium) 420.
 Vaccinii-Myrtilli fm. (Exobasidium) 421.
 Vaccinii-uliginosi (Exobasidium) 420.
Vaccinii-uliginosi (Exobasidium) 421.
 vaginata (Amanitopsis) 8.
 valens (Agaricus) 235.
 valens (Lepiota) 11.
 valens (Uromyces) 584.
 Valerianæ-Wallichii (Uredo) 794.
 validipes (Cortinarius) 192.
 Vanderbiltianus (Boletus) 250.
 Vanderysti (Pterula) 438.
 Vanderysti (Puccinia) 618.
 Vanderysti (Uromyces) 548.
 Vanderysti (Ustilago) 506.
 Vanderystianum (Æcidium) 765.
 Vanhoeffenii (Psilocybe) 219.
 Van-Tieghemi (Mortierella) 828.
 variabile var. (Chætostylum) 827.
variabilis (Claudopus) 149.
variabilis (Crepidotus) 149.
 varians (Puccinia) 699.
 variata (Russula) 94.
 variicolor (Bolbitius) 179.
 vatricosoides (Inocybe) 161.
 velatipes (Amanita) 3.

- Velenovskii* (Tilletia) 519.
vellereus (Lactarius) 86.
veluticeps (Collybia) 48.
velutina (Laschia) 442.
velutina (Peniophora) 410.
velutinus (Geaster) 479.
velutinus (Polystictus) 320.
velutipes (Collybia) 48.
velutipes (Leucoporus) 259.
velutipes (Polyporus) 259.
venenatum (Tricholoma) 26.
venosulum (Stereum) 387.
venosum (Hydnum) 375.
ventricosa (Armillaria) 24.
ventricosus (Lentinus) 24.
venulosa (Reticularia) 404.
vepallidum (Tricholoma) 27.
Veratri (Uromyces) 576.
Verbasci (Ecidium) 564.
Verbasci (Uromyces) 564.
verbenicola (Ecidium) 775.
Verbesinæ (Coleosporium) 720.
verbesinicola (Puccinia) 643.
vermifera (Peniophora) 408.
vermiflua (Pholiota) 152.
vernalis (Leucoporus) 258.
vernicosus (Cyathus) 466.
vernifera (Clitocybe) 40.
Vernoniæ (Dietelia) 597.
Vernoniæ (Endophyllum) 597.
Vernoniæ (Uredo) 797.
vernoniphila (Puccinia) 641.
veronicicola (Entyloma) 521.
verpoides (Heliomyces) 116.
verrucipilea (Clitocybe) 41.
verrucosa (Russula) 98.
verrucosus (Craterellus) 381.
verruculosa var. (Sphacelotheca) 509.
verruculosus (Uromyces) 532.
verruculosus (Uromyces) 554.
versatilis (Clavaria) 426.
versatilis (Funalia) 322.
versatilis (Ramaria) 426.
versicolor (Cortinarius) 194.
verticalis (Solenia) 362.
Vestergreni (Uromyces) 554.
vestida (Porillaria) 118.
vestidus (Lentinus) 118.
vestita (Omphalia) 62.
vestita (Psathyra) 222.
vestitus (Uromyces) 557.
versans (Puccinia) 699.
viarum (Coprinus) 224.
Viaticæ (Uredo) 788.
vicinalis (Clitocybe) 40.
Vignæ (Uromyces) 540.
Vignæ-luteolæ (Uromyces) 540.
vignicola (? Uromyces) 540.
Vignieræ (Coleosporium) 720.
Vilfæ (Ustilago) 519.
villosa (Hymenochæte) 389.
villosa (Solenia) 363.
villosa (Trabecularia) 400.
villosa-volva (Volvaria) 129.
villosum (? Corticium) 400.
villosum (Stereum) 389.
villosus (Polystictus) 311.
vinicolor (Naucoria) 175.
vinosus (Marasmius) 109.
violacea var. (Nolanea) 147.
violacea (Ustilago) 497.
violaceo-maculatus (Polyporus) 256.
violaceospermus (Pleurotus) 64.
violaceum (Hydnum) 363.
violaceum (Sarcodon) 363.
violaceus (Boletus) 255.
violaceus (Geaster) 479.
violaceus (Polyporus) 255.
violascens (Cortinarius) 190.
violascens var. (Polyporus) 268.
virescens var. (Boletus) 251.
viridans (Entoloma) 138.
viride (Corticium) 389.
viridella (Russula) 98.
viridis (Geaster) 479.
viridis var. (Polystictus) 309.
viridula (Stropharia) 211.
viridula (Thelephora) 384.
viscosissimus (Hygrophorus) 72.
Viticis [non *Vitevi*] (Uredo) 800.
vitreata (Mycena) 53.
Vittadinæ (Puccinia) 642.
Væltzkowii (Poria) 326.
vogesiaca (Milesina) 812.
vogesiaca (Uredo) 812.
volgensis (Puccinia) 690.
Volkartiana (Puccinia) 664.
volutus (Coprinus) 227.
volvatus (Cryptoporus) 282.
volvulatum (Tylostoma) 476.
Vuilleminii (Zygorrhynchus) 825.
vulgata (Mycena) 55.
vulgatum (Synchytrium) 842.
vulneratus (Polyporus) 264.

- Warneckeana (Ustilago) 506.
 Warneckeanum (Aecidium) 756.
 Warneckeanum (Stereum) 387.
 Watsoniæ (Uromyces) 581.
 Weberbaueri (Puccinia) 666.
 Wedeliæ (Uromyces) 569.
 Wedeleliæ-bifloræ (Uredo) 796.
 Weisseanum (Corticium) 403.
 Wettsteinii (Corticium) 400.
Wettsteinii (Cytidia) 400.
 Whitei (Phallogaster) 464.
 Wildemani (Pleotrachelus) 835.
 Wildemania (Plasmopara) 861.
 Wildemanianum (Aecidium) 770.
 Wildemanianum (Sorosporium) 513.
 Willei (Zygorhizidium) 846.
 Williamsianum (Ganoderma) 300.
 Williamsii (Fomes) 289.
Williamsii (Pyropolyporus) 289.
 Williamsii (Trametes) 342.
Wilsonii (Inonotus) 272.
 Wilsonii (Polyporus) 272.
 Wilsonii (Uredo) 796.
 Winkleriana (Pterula) 438.
 Winteri (Uromyces) 562.
 Wrightii (Auricularia) 442.
Wrightii (Hirneola) 442.
Wrightii (Lycoperdon) 485.
 Wrightii (Polyporus) 261.
 Wolfiæ-stenoglossæ (Uromyces) 568.
 Wurthii (Synchytrium) 841.
 xanthodermus (Agaricus) 208.
 xanthogalactus (Lactarius) 84.
 xanthopoda (Puccinia) 683.
 Xanthosiæ (Puccinia) 628.
 xanthosperma (Clavaria) 431.
 xanthosperma (Puccinia) 486.
 xylogenus (Mutinus) 461.
 xylophila (Lepiota) 14.
 Yoshinagai (Phragmidium) 729.
 Yoshinagai (Uredo) 806.
 Zaluzaniæ (Puccinia) 647.
 Zanthoxyli-schinifolii (Aecidium) 758.
Zenkeri (Farolaschia) 360.
 Zenkeri (Laschia) 360.
 Zenkerianus (Lentinus) 119.
 Zeyheri (Uromyces) 580.
 zeylanica (Ravenelia) 865.
 zeylanicum (Exobasidium) 419.
Zimmermanni (Agaricus) 69.
 Zimmermanni (Pleurotus) 69.
 Zippelii (Clavaria) 439.
 Zizyphi-vulgaris (Phacopsora) 608.
Zizyphi vulgaris (Uredo) 608.
 Zollikoferiæ (Uredo) 796.
 zonulatum (Hydnum) 375.
 Zorniæ (Puccinia) 625.
Zorniæ (Uredo) 625.
 Zurcheri var. (Absidia) 825.

INDEX ALPHABETICUS GENERUM

Abortiporus Murr.
= *Polyporus* 277.
Absidia 824.
Achlya 852.
Actinocephalum Saito
= *Saitomyces* 829.
Æcidium 752.
Æcidium 752.
Æruginospora 46.
Agaricochæte 79.
Agaricus 203, 234.
Amanita 1.
Amanitopsis 8.
Amauroderma Murr.
= *Ganoderma* 304-307.
Androsaceus Pat.
= *Marasmius* 111.
Anellaria 232.
Anularia 129.
Aphanomyces 854.
Arachnion 493.
Armillaria 21, 864.
Aseroë 464.
Asterostroma 389.
Asterostromella 381.
Auricularia 441.
Auriculariopsis 423.

Bæodromus 731.
Baumanniiella 440.
Blastospora 596.
Bolbitius 179.
Boletinus 253.
Boletus 235.
Bovistella 481.
Bresadolia 353.
Bresadolina 385.
Broomeja 479.
Cænomyces 848.
Cæoma 786.

Calathinus Pat.
= *Pleurotus* 68, 69.
Calliospora 713.
Calocera 457.
Calvatia 480.
Cantharellus 103.
Catastoma 433.
Catathelasma 8.
Catenaria 847.
Ceracea 456.
Ceratomyces Corda 353.
Ceratomyces Batt., Murr.
= *Boletus*, *Suillus* 236-252.
Cerotelium 606.
Cerrenella Murr.
= *Irpex* 377.
Chætostylum 827.
Chitoniella 203.
Chlorocyphella 424.
Chlorophyllum Masee.
= *Lepiota* 13.
Chlorospora Masee.
= *Schulzeria* 46.
Chnoospora 600.
Chrysomyxa 716.
Chytridium 844.
Cintractia 509.
Circinella 821.
Cladochytrium 846.
Cladoderris 385.
Clarkeinda 202.
Clathrella 463.
Clathrus 462.
Claudopus 148.
Clavaria 425.
Clitocybe 35.
Clitopilus 139.
Coleopuccinia 598.
Coleosporium 717.
Collybia 46.

- Coltricia* Murr.
 = *Polystictus* 312.
Colus 463.
Coniophora 411.
Coprinus 223.
Corditubera 491.
Coriolellus Murr.
 = *Trametes* 345.
Corioloopsis Murr.
 = *Polystictus* 322-324.
Coriolus Quél.
 = *Polystictus* 312-320.
Corticium 389, 866.
Cortinarius 185.
Cortinellus Roze
 = *Omphalia* 60.
Craterellus 381.
Crepidotus 184.
Crinipellis Pat.
 = *Marasmius* 112, 113.
Cronartium 605.
Cryptoporus 282.
Cunninghamella 828.
Cyathus 464.
Cycloporellus Murr.
 = *Polystictus* 321.
Cycloptericola 858.
Cyphella 421.
Cystopsora 607.
Cystopus 858.
Cytidia 380, 400.

Dacryopsis 456.
Dædalea 350.
Deconica 222.
Dendrothele v. Höhn.
 = *Corticium* 404.
Dermocybe (*Cortinarius*) 192.
Dictyolus Quél.
 = *Cantharellus* 106, 107.
Dictyophora 459.
Dictyopus Quél.
 = *Boletus* 242.
Diorchidium 715.
Discocyphella 423.
Doassansia 526.

Harliella Murr.
 = *Polystictus* 324.

Eccilia 147.
Ectrogella 837.
Elasmomyces 467.
Elfvingia Karst., Murr.
 = *Ganoderma* 295.
Empusa 831.
Endophyllum 597.
Entoloma 133.
Entomophthora 831.
Entyloma 519.
Epithele 381, 414.
Eurychasma 843.
Exidia 451.
Exidiopsis 451.
Exobasidium 419.

Farysia 527.
Favolaschia
 = *Laschia* 358-360.
Favolus 354.
Fistulina 254.
Flammula 171.
Fomes 283.
Fomitoporella Murr.
 = *Poria* 329.
Fomitoporia Murr.
 = *Poria* 331.
Funalia Pat.
 = *Polystictus* 321.
Fuscoporella Murr.
 = *Poria* 336.
Fuscoporia Murr.
 = *Poria* 338.

Galera 180.
Ganoderma 295.
Geaster 477.
Geopetalum Earle
 = *Pleurotus* 65, 67.
Gervasia 597.
Glaeopeniophora 381.
Glaeophyllum Karst., Murr.
 = *Lenzites* 126.
Glaeotulasnella 380, 453.
Goldfrinia Maire
 = *Hygrophorus* 71.
Gomphidius 202.
Goplana 714.
Grandinia 379.

- Graphiola 526.
 Guepinia 455.
Gymnochilus Earle
 = *Hypholoma* 214, 215.
Gymnosporangium 610.
Gyrodon 254.
Gyrophana Pat.
 = *Coniophora* 412.
Gyrophragmium 494.
Gyroporus Murr.
 = *Suillus* 252.

Hapalopilus Murr.
 = *Polyporus* 276.
Hebeloma 169.
Helicobasidium 443.
Heliomyces 116.
Hemileja 598.
Herpobasidium 444.
Heterochæte 449.
Hexagonia 346.
Hexagona Murr.
 = *Favolus* 354.
Hexagonia Poll.
 = *Favolus* 354.
Hiatula 58.
Hirneola 442.
Hirneolina 451.
Holocotylon 493.
Hyalopsora 599.
Hydnangium 495.
Hydnochæte 375.
Hydnum 363.
Hydrocybe (*Cortinarius*) 199.
Hygrophorus 71.
Hymenochæte 388, 404.
Hymenogaster 495.
Hypholoma 212.
Hypochnus 413.
Hysterangium 495.

Inocybe 153.
Inoloma (*Cortinarius*) 190.
Irpex 376.
Irpiciporus Murr.
 = *Irpex* 377.
Ithyphallus 460.
Ixoconus Quél.
 = *Boletus* 246.

Jansia 461.

Kawakamia 860.

Lachnocladium 436.
Lactaria
 = *Lactarius* 80.
Lactarius 80.
Lagenidium 850.
Lanopila 479.
Laschia 358, 864.
Leaia Bank.
 = *Hydnum* 373.
Lentinus 116.
Lenzites 123.
Lepiota 9.
Leptonia 142.
Le-Ratia 468.
Lloydiella 388, 405, 866.
Locellina 152.
Lycogalopsis 494.
Lycoperdon 484.
Lysurus 463.

Macrochytrium 849.
Mapea 814.
Marasmius 107.
Massospora 832.
Melampsora 601.
Melampsorium 605.
Merulius 360.
Microporellus Murr.
 = *Polystictus* 309.
Microporus Pat.
 = *Polystictus* 306.
Minutularia Dang.
 = *Olpidium* 833.
Mitremyces 476.
Mohortia 447.
Monochytrium 845.
Montagnites 234.
Mortierella 828.
Mucor 815.
Mutinus 460.
Mycelophagus 868.
Mycena 52.
Mycoleptodon Har.
 = *Hydnum* 374.
Myxacium (*Cortinarius*) 199.
Myzocyium 850.

- Næmatelia* 455.
Næmatoloma Pat.
 = *Hypholoma* 212.
Naucoria 174, 864.
Necium 601.
Nidula 466.
Nolanea 145.,
Nothoravenelia 745.
Nowakowskiella 847.
Nyctalis 103.
- Ochropsora* 605.
Odontia 379.
Olpidiopsis 834.
Olpidium 833.
Omphalia 59.
Ordonia 447.
Oudemansiella 127.
- Panæolus* 230.
Panus 122.
Paxillus 200.
Peniophora 405, 866.
Peridermium 746 (et 720-722).
Peronospora 862.
Phacopsora 607.
Phæocyphella 424.
Phallogaster 464.
Phellorina 491.
Phlegmacium (Cortinarius) 185.
Phlyctidium 844.
Phlyctochytrium 844.
Pholiota 149.
Pholiotina Earle
 = *Pholiota* 152.
Phragmidiella 731.
Phragmidium 724.
Phylloporia Murr. 325.
Phylloporus 255.
Phyllostus Earle
 = *Pleurotus* 63, 66.
Physalacria 441.
Physoderma 846.
Phytophthora 859.
Pilaira 827.
Pilobolus 827.
Piptocephalis 829.
Pistillaria 440.
Plasmopara 861.
- Platyglœa* 447.
Pleolpidium 837.
Pleoravenelia 745.
Pleotrachelus 835.
Pleurotus 63.
Pluteus 130.
Podaxon 468.
Polioma Arth.
 = *Puccinia* 657.
Polyporus 255.
Polysaccum 492.
Polystictus 308.
Pontisma 851.
Poria 325.
Prosopodium Arth.
 = *Puccinia* 662.
Protocoronospora 421.
Protodontia 457.
Psathyra 222.
Psathyrella 232.
Pseudocolus Fisch.
 = *Colus* 463.
Pseudohydnum 375.
Pseudolpidium 834.
Psilocybe 217.
Pterula 437.
Ptychogaster
 = *Ceratomyces* 354.
Puccinia 615.
Pucciniastrum 732.
Punctularia 404.
Pycnoporus Karst.
 = *Polystictus* 322.
Pyropolyporus Murr.
 = *Fomes* 286-293.
Pythiacystis 856.
Pythiomorpha 856.
Pythium 854.
- Ravenelia* 735, 865.
Resticularia 857.
Rhizophagus 847.
Rhizophidium 842.
Rhizopus 822.
Rigidiporus Murr.
 = *Polyporus* 276.
Rœstelia 751.
Rostrupia 723.
Russula 91.

- Saccoblastia* 442.
Saccomyces 849.
Saitomyces 829.
Saprolegnia 851.
Scleroderma 490.
Sclerospora 861.
Scopuloides 381.
Sebacina 450.
Secotium 467.
Septobasidium 445.
Simblum 464.
Sirobasidium 448.
Sirolopidium 834.
Skierka 609.
Solenia 362.
Sorosporium 512, 865.
Sparassis 425.
Sphacelotheca 508.
Sphærophragmium 734.
Spinellus 825.
Spongiporus Murr.
 = *Polyporus* 275.
Sporodinia 826.
Sporophlyctis 848.
Steccherinum Bank.
 = *Hydnum* 370.
Stereum 386.
Strobilomyces 253.
Stropharia 209.
Suilellus Murr.
 = *Boletus* 237.
Suillus 252.
Syncephalastrum 830.
Syncephalis 829.
Synchætophagus 857.
Synchytrium 838.

Telamonia (Cortinarius) 194.
Thamnocephalis 831.
Thecaphora 516.
Thecopsora 734.
Thelephora 382.
Theleporus 361.
Tieghemella 826.
Tilletia 517, 865.

Togaria W. G. Smith
 = *Pholiota* 149.
Tolyposporium 515.
Tomentella 415.
Tomentellina
 = *Tomentella* 381, 418.
Trabecularia Bon.
 = *Corticium* 400.
Trametes 339, 866.
Tremella 454.
Tremellodendron 451.
Tricholoma 24, 864.
Triphragmium 734.
Tubaria 183.
Tuburcinia 523.
Tulasnella 452.
Tylostoma 469.
Typhula 438.
Tyromyces Karst., Murr.
 = *Polyporus* 277.

Uredinopsis 609.
Uredo 788.
Uredopeltis 746.
Urocystis 524.
Uromyces 529.
Uromycladium 593.
Urophlyctis 849.
Uropyxis 614.
Ustilaginoidea 527.
Ustilago 497.

Veluticeps Cooke
 = *Hymenochaete* 404.
Volvaria 127.
Volvopolyporus 282.
Vuilleminia 331.

Whetstonia 492.
Wiesnerina 385.

Xerocoprinus Maire
 = *Coprinus* 223.
Xerotus 123.

Zygorhizidium 845.
Zyorrhinchus 825.







